



Ϝ Hippocratis

omnia

1564






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3183/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3183/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3183/A

A. x. v

3183 A


Contraffo Loffeyid





[Faint, illegible handwritten text in a cursive script, likely from a 15th-century manuscript.]

Ex Libris Franci de Hono
Dijet Medici



429/40
HIPPOCRATIS
COI MEDICORVM

OMNIVM LONGE

principis, Opera quæ

apud nos extant

omnia,

*

Per Ianum Cornarium Medicum Physicum

Latina lingua conscripta.

Accessit Hippocratis De Hominis Structura liber,

Nicolao Petreio Corcyrao interprete,

antea non excusus.

Cum Indice rerum copiosissimo.




L V G D V N I,

Apud Antonium Vincentium.

1564.

Ex libris Johannis de Sponza Medici



AUGUSTISSIMIS

AC PRUDENTISSIMIS,

HONESTISSIMISQUE VIRIS,

Senatui populoque Imperialis urbis Au-

gustae Vindelicorum, Ianus Corna-

rius Medicus Physicus,

S. D.



ON alienum, nec ab re esse arbitror, Augustissime Auguste urbis Senatus, hoc in loco, hac instituta ad amplitudinem tuam, in Hippocratis Coi medicinae principis scriptorum, à me in Latinam linguam translatorum editionem, praefatione, paulò altius repetere, qualis fuerit nostro hoc ævo rei medicae, & simul etiam aliarum artium ac studiorum status: qualis factus sit progressus: quantum accesserit incrementi: & quid de toto hoc studiorum genere sit sperandum. Nam & necessariam esse Hippocratis librorum editionem, lectionem, ac cognitionem, inde clarè constabit: & me hæc vel peractorum laborum gratia, meminisse iuuabit: & qui ista legent, non inutilem consequentur huius narrationis cognitionem: & Amplitudo tua, spero, harum rerum memoria iucundè afficietur, & si quid praesidij ac opis ad hæc studia conseruanda opus fuerit, (sicut reuera vestram, urbiū Imperialium opem desiderant ac implorant) huc libenter incumbet, quo literæ unicū totius vitæ ornamentum durent ac vigeant, in Germania nostra, ne si hæc corruant ac iaceant, verè neutra vita vocari mereatur, haud secus quàm neutrum corpus medicis dicitur, quòd neque sanum, neq; aegrotum appellari potest. Talis autem futura vita mihi videtur, ut miti ac familiari nobis similitudine, res omnium tristissima, & perpetua nocte obscurior adumbratur, si horum studiorum lux extinguatur, si literarum decus deturpetur, si robur illud, quod & pacem, & rerum publicarum ac priuatarum tranquillitatem retinet, elanguescat.

AA 2

Quum.

Epistola

Quum itaq; primū animū ad medicinæ studia adiicerem, magna erat bonorū & professorum, & librorū penuria: adeo ut Hippocrates & Galenus medicæ sectæ optimæ, rationalis illius, principes, ne nominibus quidem suis iustis, in scholis satis noti essent, quū vulgo Hippocras & Galienus à plerisq; omnibus appellarentur. Itaq; quum essem adolescēs viginti natus annos, ex Petri Mosellani, viri & eruditi, & imprimis sua eloquēti facundia ornatī auditoribus. (Nam neque hūc, neq; alium vllum vnquā priuatū præceptorē habui, post primā grammaticæ rudimēta) in literis vtriusq; linguæ eo progressus, ut nō modo grāmatica docerem, sed etiā Poetas ac Oratores Græcos publicē enarrarem, plurimū mox ab initio, ab honestissimæ artis discendæ proposito decidebam. Auertebāt enim me barbari scholarū magistri, & nō multo expositoribus suis potiores scriptores, quibus tum medicorū scholæ pro optimis autoribus utebātur, Auicenna, Rasis, Albucasis, Auenzoar, Mesuas, & alij nō citra tædium nominandi, Arabicum hominū genus. His accedebant practices scriptores superioris seculi ac illius quoque, gens per omnia inepta, sordida, ac impura, & tam spurcē Latine loquēs, ac tam infeliciter id quod docere vult tradens, ut penitus desperare ex tam putidis libris fore posse, ut vnquam ad medicinæ cognitionem peruenirem, eam videlicet quam ex Hippocratis aliquot libellis, aphorismis dico, prognostico, & eo qui de vitæ ratione in morbis acutis inscribitur, olfecissem: & quā mihi ex Galeni aliquot libellis Latine itidem extatibus delineassem. Erant autem hi Leonicieni interpretatione, De februm differentiis libri duo, & Copi versione sex libri De locis affectis inscripti. Et his interpretibus, tum extabant quoque Hippocratici illi libelli. Ac in philosophia quidē eo tempore extabat sua lingua Plato, Aristoteles, Theophrastus, Xenophon, & Plutarchus, magno erga bona studia Aldi Manutij beneficio. Verū in medicina nihil Hippocratis ac Galeni ipsorum lingua habebatur, præter Hippocratis aphorismos, quos Philippus Melanchthōn mihi cōmunicauerat, & vnā Galeni methodum, quam Romæ si rectē memini, excusam, apud amicum quēdā videram. Hic ego dum ambiguus quid facerem sæpe mecum cogitarem, tandem illud statui, quod præsens esset boni consulendum esse, donec aliquando

Nuncupatoria.

do dies meliora proferret. Proinde relictis magna ex parte Arabibus illis scriptoribus, & ex practicis quoque paucis aliquot, melioribus ut fieri solet in malorum electione, assumptis: videbantur autem tales esse, Bertrutius, Gatina-
ria, Guainerius: his ad prædictos libellos Hippocratis ac Galeni additis ac collatis, sed magno interposito interuallo, aliquot annis medicinæ studia sectatus sum, donec cum his simul magister magnus artis vëter persuasit mihi, ut artis periculum facerem, quod iam per annos vigintiquinque facere pergo, ab eo tempore quo primum animum ad medicinæ studia, velut dixi, adieci. Quanto verò meo commodo hoc fecerim aut etiam aliorum vtilitate, non est quod multum iactem. Diligentiam meam & fidem, tum in docendo qualiacunque didici, tum in curando qualia ars præstare potuit, multis cognitam esse scio. Opes velut studiorum impedimenta, non anxie quæsiui, & ea quoque quæ contingere potuissent, contempsî. Hoc nondum scio an commodum, aut potius incommodum dici debeat, quòd totum istud studiorum priorum genus, per totos nouem annos à me tractatum, relinquere ac quasi dediscere coactus fuerim, quum iam magnam Europæ partem, rerum medicarum experiendarum gratia peruagatus, Basileam peruenissem. Et quod quidem incommodum hoc sit, tot horas malè collocasse in studiis dediscendis, nemo non intelligit, etiam ex his quibus non dediscenda, sed amplectenda esse illa adhuc hodie videntur. Quòd verò commodum sit, totam barbaram medicinam à me esse relictam, & Græcam assumptam, productam & non parum per me etiam auctam, & ampliatam, nondum persuasum esse scio plerisque, qui adhuc cum Gryllo grunnire malunt, & glandibus vesci frugibus optimis repertis. Profectò horum ingenia velut ineptissima, & iudicia velut nihil sani habentia auersatus, tum mox toto pectore ad Hippocratem Græcum, ac Galenum, itémq; Paulum me contuli, paulo ante Veneriis ex Aldi itidem officina allatos: quibus etiam alienis ad tempus utebar, atque in his ita versabar, ut vel totum Hippocratem ad Latinos trāscribere me posse non desperarem, si tam magni laboris præmium alicunde affulisset: nedum de Galeno ac Paulo ambigerem, quos faciliores esse, vel leuiter Græca scientibus con-

Epistola

stat: si quis modo non penitus rudis eos autores aggredi con-
 netur. Et extant libelli duo Hippocratis eo anno à me con-
 uersi, alter de aere, aquis, & locis: alter de flatibus inscriptus,
 qui animum meum studiosis satis declararunt, quantum vo-
 luerim medicinam illinc adiutam. Nec deerāt nobis inhor-
 tatores ad rem tentatam strenuè obeundam, inter quos ma-
 gno erga optima studia merito præcipuè mihi nominandus
 est Des. Erasmus Roterodamus, cuius etiam scripta ad me
 epistola extat, qua ad me constanter prosequendum id quod
 in Hippocratem medicinæ principem orsus essem, inhorta-
 tur. Ad idē me institutū Frobenius ac Episcopus, qui prius
 etiam aliquot mihi commentationum fuere autores, tātum
 non cocebant: digni profectò propter sua in doctos homines
 merita, vt ab omnibus bonis viris aduersus *improbes* a mu-
 los instar ignauorum fucorum insidiantes libris ipsorum
 sumptibus & industria in lucem editis, foueantur & tuean-
 tur. Quum igitur hæc mea tunc fuerit voluntas, & nō omni-
 no desperata etiam præstandi facultas, Cur, inquit aliquis ex
 illis, ad tot annos dilatum est, quod propter communem vti-
 litatem, si ita est veluti ipse dicis, quàm primum inuulgari
 oportuerat? Fatebor sanè hic quod res est. Primum quidem
 voluntatem meam remorata est maxima operis difficultas.
 Nam vt glossas & voces penitus obsoletas omittamus: vt di-
 cendi genus breue illud, & quo velut per ænigmata, innuere
 magis quàm significare sententiam voluit, ne producamus:
 adeò vt ne Galenus quidem se ex omnibus extricare valeat:
 vt nihil etiam dicamus de lectione varia, ac subinde à pluri-
 mis priscis Hippocratis expositoribus mutata, & temporis
 insuper iniuria corrupta: vel ipsa vetustatis reuerendi senis
 maiestas detertere posset, ne quis familiarius versare doctif-
 sima, & per omnia grauissima scripta audeat. Quòd verò
 tantæ grauitatis, maiestatisque scriptor sit Hippocrates,
 idēque optimus methodi doctor, etiam Plato testatum de
 ipso reliquit, cuius verba ex Phædro adscribere non pigebit.
 Fierine posse putas, inquit Socrates, vt quis animæ naturam
 prodignitate consideret, absque vniuersi natura? Si quidem
 Hippocrati Asclepiadarum generis credere oportet, inquit
 Phædrus, neque corporis, circa hanc methodum. Bene, in-
 quit Socrates, amicissime Phædre, Hippocrates dicit, Opor-
 tet

ret tamen insuper ad Hippocratem, etiam rationem expen-
dere, & an consona est, videre. Ita sentio, respondet Phædrus,
Proinde de natura considerare, inquit Socrates, quid tandem
dicit Hippocrates, & ratio vera? Nonne hoc modo? De cuius-
cunque rei natura considerare oportet, primum simplexne
sit, an multarum specierum, id in quo artifices esse volumus,
& alios ut tales sint facere. Deinde si simplex est, vim ipsius
considerare, quam à natura habeat, ad hoc ut in aliud faciat,
quid, aut quam ut ab alio patiatur. Si verò plures species ha-
buerit, his enumeratis, id quod in vna, hoc in singulis consi-
derare, quidnam à natura facere solet, aut quid ab alio pati.
Consequens, inquit Phædrus, hoc est ò Socrates. Proinde me-
thodus, ait Socrates, absque his similis est itineri cæci. Hæc
nunc Plato. Et non sunt quidem hæc ita ad verbū in Hippocra-
te, sed talis est omnino doctrinæ methodus libri De natura
hominis inscripti, ut de nullo alio loqui hæc videatur Plato:
quāquam similis methodus etiam in aliis huius viri scriptis
genuinis esse videatur. Quare quum hætenus reperti sint,
qui Platonem, qui Aristotelem, qui Theophrastum, qui reli-
quos Græciæ philosophos ac scriptores, ad Latinos conuer-
tere aggressi sint, & aliquid operæ precij præstiterint in Hip-
pocrate nemo hoc feliciter tentavit, ex toto, ut ne in minu-
tissimis quidem libellis aliqui satis aptos artifices se declara-
uerint. Non igitur nihil est quod & nos de difficultate hu-
ius scriptoris queramus, qui hætenus omnes ex æquo à se
auertit: etiam si nunquam ex toto à nobis desperatum sit, fo-
re ut aliquando omni difficultate superata, Latinus à nobis
factus Hippocrates legatur. Accessit ad hanc difficultatem
alia remora ex temporum infelicitate. Quum enim per vi-
ginti ferme iam annos medicina Græca renouiscere cœpe-
rit: reducti sint Hippocrates, Galenus, Aetius, Paulus, Diosco-
rides: & hi non sua solum lingua, sed Latini etiam magna ex
parte (vno Hippocrate hætenus saltem excepto) tum per do-
ctos aliquot viros, tum per nos quoque facti, tamen ea est se-
culi infelicitas, ut nemo tantæ artis, quæ ipsam etiā vitam,
qua nihil homini preciosius esse potest, conseruat: pretium
agnoscat. Vidimus ardens primum studium multorum cir-
ca linguas addiscendas: deferbuit hoc paulatim. Vidimus
maximum studiosorum cōcursum ad discendā theologiam,

quum primum in Germania sincerior pietatis doctrina illu-
cesceret: Durauit hic aliquot annis. Transiitum est ad stu-
dium Iuris ciuilib: Nec puto vllō vnquam tempore tot fuisse
studiosos, qui leges Imperatorias sequerentur, aut doctorum
titulis insignirentur. Sola Medicina vbique contempta
iacet, frigent gymnasia, torpent professores, ars ipsa in
ἀρετῇ abiit, & non nisi apud delyras aniculas, & recutitos
Apellas, & eos qui multorum periculis de sua ignorantia ex-
perimenta faciunt, eius vsus quæritur: paucis quibusdam bo-
nis medicis non in vsum publicum, sed in priuatum sibi the-
saurum, vera medicinæ studia possidentibus. Quāquam ego
quidem grauiorem adhuc, ac similem timeam optimæ artis
ruinam, si continget vt altius aliquando euehatur, qualem
videlicet Christianæ religionis studium pertulit, & qualem
iuris scientia minari videtur. Sicut enim dum pij aliquot vi-
ri euangelium Christi purum ac sincerum reducere conati
sunt, factum est vt apud plerosque Christus penitus fabula
factus sit, & parum adhuc in paucorū cordibus hæreat: Ita ex
magna iuris scientia eò peruenitur, vt ius sit in armis ac vi-
positum, vt sint qui quiduis sibi licere adstruant, adulterare,
scortari, prædari, prodere, rapere, agere, capere, & cœlum ac
terram miscere, modo apex sit in iure scripto, qui vt ipsorum
cupiditatibus inseruiat cogi possit, quomodo summum ius
summam iniuriam esse, iuxta vetus adeò verbum, atque ita
omnem optimarum legum doctrinam, vsum ac necessita-
tem intercidere, nemo non sentit. Atque vtinam non similis
casus maneat rectissimum medicinæ studium, si quando etiā
hoc ad summum adductum fuerit: & ex scholæ vmbra, ad
publici exercitij theatrum productum. Sed quis prohibere
potest malos vt ne sui similes sint, in quocunque studiorum
genere peruertendo: & ea quæ ad multorum salutem inuen-
ta sunt, partim per ignorantiam, partim ex malitia, ad per-
niciem abutendo: Propter tales cessandum à nobis non est, vt
non optima faciamus, doceamus, ac in lucem proferamus, &
artem per se optimam ad summum statum euehamus. Nos
certè vt quod possumus huc conferremus, & vt & ocij, & ne-
gocij nostri ratio publicè omnibus constaret, sæpe in partia-
libus editis libellis promissum sæpe repositum sæpe reperiri-
tum Hippocratem nostrum Latinum tandem etiam his in-
felicissi

felicissimis tēporibus, quibus præter ea quæ iam relata sunt, omnia perpetuo metu consternata grauātur, infidiis pertentantur, proditiōibus obtinentur, bello expugnantur, incendiis consumuntur, edere voluimus atque hunc inæstimabilibus laboribus, & non leui sumptu ac rei familiaris iactura, perpetuis quindecim annis absolutum. Non quod hos totos in hoc solum opus impenderimus: hoc enim verè esset suo sibi iumento malum accersire: sed quod nunquam hanc curam reiecerimus huius quoque operis absoluendi, dum illa partim de Græcis plurima translata, partim à nobis scripta ac commentata, in publicum emisimus, non omnino nulla nostra priuata vtilitate. Fatendum enim & prædicandum quoque hoc est, quum & magnorum principum, & præclararum vrbium, magnificentiam ac liberalitatem simus experti, & ad hæc præstanda quasi fomite quodam coaliti, ac prouecti. Superauimus autem hanc operis difficultatem, tum sæpe repetita Hippocratis lectione, tum locorum subinde alibi ab ipso Hippocrate repetitorum collatione, tum perlecta denuo tota Galeni Græca ac Latina editione, eo studio vt totum aliquando editurus sim Galenum, aliqua parte ex mea translatione, & reliquis itidem versionibus ad veram Græcam lectionem correctis. Et profectò longum esset hic declarare, quibus rationibus inductus, multa ex lectione Aldini, plurima præter lectionē Frobeniani exemplaris, à nobis ad multa manuscripta exemplaria collati ac editi, in hac nostra Latina Hippocratis cōuersione mutauerimus. Statuimus autem huc impendere quinquennium plus minus, vt si deus vitam tamdiu prorogarit, totius nostræ conuersionis ratio ac aliqua expositio extet, in diurnaliorum siue coniecturarum libris, tot à me scribendis, quot omnino existunt libri Hippocratis scriptorum. Interim tamē hunc præcipuū nobis fuisse scopum, studiosos omnes non celabimus, quem etiam pro iustissima lege Galenus agnoscit, dum sic scribit: Hæc, inquit, Lex mihi in exponendo ac interpretando obseruatur, vt vniuscuiusque scripta ex illo ipso declarentur & non vanis opinionibus, & pronunciata citra demonstrationem sententia quisque quicquid velit deblateret. Hanc legem nobis in scopum, in Hippocratis libris Latine conscribendis proposuimus, & omnes obscuros locos, collatione ad

Epitola
alios facta, vbi hoc fieri potuit, exposuimus, reddidimus ac
expressimus, multis immutatis, non paucis reiectis, plurimis
appositis, quæ nec in impressis, nec manu scriptis codicibus
ita habentur: sed tamen vt alicubi vestigia veræ lectionis
etiam ex illis odorati simus. Quorum omnium iusto opere à
nobis ratio reddetur. Atque hæcenus suffecerit protulisse me
studiorum nostri æui statum, progressum ac augmentum, &
præcipuè rei medicæ. Cuius primum, summum ac maximum
authorem, tandem ego Latinis hominibus non minorem, sed
aliquanto, nisi penitus fallor, meliorem quam Græcis extat
legendum produco, edo ac publico. At ne ego mihi tanti be-
neficij publici gratiam expetere videar, aut ne tanti autho-
ris ac operis patronum præstare me posse, aliunde confidere
puter: ad te Augustissime Senatus Augustane confugio. Tuæ
amplitudini hanc auctoritatem defero, Tuæ erga literas &
litteratos benignitati hanc gratiam deberi confiteor, quod
Hippocrates Latinus noster publicè extat, habetur, legitur:
quod rebus mortalium iuuandis opus expositum est, ultra
duo millia annorum ab omnibus in Latina lingua desidera-
rum. Nec verò videri possum aut velut ignotus, aut temerè,
ad tantorum virorum præsidium confugisse, dum in publicè
recepto illo more dedicandorum ac consecrandorum libro-
rum, ad vos viri Augustenses me recipio. Nam quam vestra
Respublica, per omnem non modo Europam, sed orbem ter-
rarum celeberrima sit, à bonis legibus, à probatis ac graui-
bus moribus, à seuera in malos animaduersione, à clementi
erga bonos benignitate, à pietissimo religionis cultu, ab in-
genti erga literas & bona studia fauore, à doctissimis consi-
liisq; ac prudentia præstantissimis viris, videri non debeo te-
merè magis quam recto iudicio, ad tam augusti senatus, ad
tantorum virorum tutelam, Hippocratis & pariter meum opus
attulisse. Nec ignotus ego vobis esse possum, cuius scripta ac
opera tot principes viros, tot claras vrbes fouere ac tueri non
dum, quod sciam, pœnituit. Hic non referam quibus viris
semper Respubl. vestra floruerit. Non recensebo Fuggaros,
non Paungaitneros, non Ilfongos, non Vuelferos, non Here-
brotios, non alias magnas familias principum opes adæ-
quantes, & simul pietate, prudentia, fortitudine, magnificen-
tiâq; ac summa liberalitate præstantes. Non dicam de Mo-
nopol

nopolliorum apud vos extantiū vtilitate, per quæ fit vt Ger-
 mani ab hominibus sub polo Antartico habitatibus, & ab
 ipsis Antipodib⁹ mercimonia, in quotidiano vsu habeat. Nō
 dicā de plebis sedula opera, & laudatissimis operibus, vnde
 linei generis, biliciorum, triliciorum, quadriliciorum variis
 texturis, multiplicibus tincturis, non modo Germania, sed
 omnes exteræ etiam nationes redundant. Nec dicam de vr-
 bis magnitudine, splendidis extructionibus ac ædificiis, &
 populositate, quæ vt peculiare laudes urbium sunt, ita & lo-
 ci optimum situm, & terræ, ac nascentium omnium copiam
 ac vbertatem coarguunt. Verū studiū vēstrum circa lite-
 ras, bonas artes, pietatem ac rectam religionem conseruan-
 dam non tacebo. Quum enim videretis studiorum omnium
 fluctuationē, sursum deorsum omnia iactari, in præcipiti om-
 nes linguas, artes, ac disciplinas cōsistere, nullo vnquam tem-
 pore plures in omnibus scriptores extitisse, partim sua ma-
 gnificē iactantes, partim aliorum & veterum quoq; scripta
 damnantes: Vos optimos semper apud omnes rectē sentien-
 tes habitos authores Græcos, magna copia per occasionem
 nuper adeō vobis oblatos non neglexistis, sed velut rem rei-
 pub. imprimis vtilem, eorum opera ac libros cōparastis, co-
 emistis, ac pro ingenti thesauro, velut reuera est, reposuistis,
 habetis, & possidetis: non tamē vt priuatā vtilitatē hinc vo-
 bis quærat, sed publicum bonum iuuetis, vt si opus sit, in-
 de rebus humanis subsidium afferatis. Neq; enim quicquā
 ad respub. optimē instituendas ac retinendas, vtilius est bo-
 norum virorum bonis scriptis. Sicut contra mera pestis est,
 quæ ex malis malorū libris hauritur. Rectæ enim artes, bo-
 ni mores, optimæ disciplinæ traduntur ac seruātur in bonis
 libris. At sine rectis artibus, sine bonis moribus, sine opti-
 mis disciplinis, & in summa, sine literis vita non est vita cen-
 senda, velut supra ab initio dixi, & vetus illud chaos, rudis
 indigestaq; moles reducitur. At vos sane in illo librorū Græ-
 corum thesauro vestro, non vnus alicuius liberalis artis aut
 disciplinæ authores habetis, sed ex tota philosophia, medici-
 na, mathesi, ac Theologia optimos, & eos neq; hætenus ty-
 pis excusos, neque multis adeō adhuc visos, imò ne nomi-
 nibus quidem plerisque omnibus notos, & fortassis nusquā
 alibi extantes, velut ex indice cognoui, quem multarum re-
 rum

rum vſu ac experiētia clarus medicus apud vos Geryon Seilerus ad me miſit. Imò non modo indicem hic amicus noſter miſit, ſed quæ veſtra eſt viri Auguſtenſ. erga recta ſtudia benignitas, de vobis eorum librorum etiam vſum mihi promiſit, multa ſimul de veſtra magnanimitate, ac magnifica voluntate mecum loquutus, ac mihi pollicitus. Quamquam autem antea mihi virtutum veſtrarū gloria nō ignota eſſet: (Quī enim ignota eſſe poſſit, quæ per totum orbem decantata eſt?) tamen ex referēte plura cognoui, & propius introſpexi, quàm antea ex auditu & aliorum ſcriptis intellexeram. Acceſſit ad huius narrationem vir excellenti iuris ſcientia, & eximia prudentia præditus Claudius Peutingerus, clariff. Iuriſconſulti Conradi Peutingeri filius, non modo in paternis virtutibus referēdis, ſed in maximis etiam rebus ac negotiis, pro patria obeundis ac gerendis, non iam ſpem, ſed ipſam rem præſtās. Cum hoc viro ante paucos annos mutua aliqua cognitio mihi interceſſit, quæ ſanæ iudicium de vobis meum confirmavit, & in id conſilij me abduxit, & breuiter effecit, vt non dubitauerim Hippocratē hunc Latinum meum ad vos referre, vobis inſcribere ac dedicare, ære ac libra veſtrum facere. Caterum erunt fortaiſis qui vel hoc nomine Hippocratē à nobis Latinè cōſcriptum impetent, quod præſtiterat Græcum legere, ac ſatis fuerat Græcum extare. His ſanè larga data eſt eius rei faciendæ etiam per me copia. Nam & Græcum exemplar per me editum ex Frobeniana officina, non paucis locis melius ac correctius eſt quàm Venetum. Et ſi vere Hippocratis ſtudioſi ſunt illi, nō pœnitebit ipſos vel ambo coemere, habere, ac legere, ambo etiam plura inquirere, quo tandem emendatiſſimus ſua lingua loquens Hippocrates habeatur. Quin & ego ſemper ita ſenſi, melius eſſe quosuis ſcriptores in ſua lingua, qua ipſi ſcripſerunt legere, quàm optimè etiam in aliam trãſſatos. Sed quid facient hi qui Græcum non intelligunt? Antea oſtendi huius autoris difficultatem, breuitatem, & ænigmatiſ ſimilem obſcuritatē. Quandiu verò expectādum nobis eſt hoc ſeculum, in quo medicinæ ſtudioſi ex æquo omnes ad legendum ac intelligendū Hippocratem Græcum ſufficient? Eſſe autem Hippocratem talem rei medicæ autorem, vt ſine ipſo res medica integrè conſiſtere non poſſit, &
ſæpe

Nuncupatoria.

sæpe aliàs dixi, & nunc non minus asseuerantissimè affirmo. Totus enim Galenus omnem suam doctrinam ad Hippocraticam methodum, velut adamussim direxit. Idem fecerunt & antè, & post Galenū, optimi quinque tum medici, tum philosophi, vt ineptissimos, pariter ac indoctissimos se esse declarauerint, qui vnquàm ab Hippocrate descuerunt, aut ipsius dogmata impetuerunt, quorum multos adeò in libris suis hinc inde, ex omni occasione Galenus reuellit, ac explodit. Demus autem hoc seculum spem nobis iniicere de futuris. Nam reuera nullum antea fuit, in quo per omnem ferè Europam pariter vtriusque linguæ cognitio in tantum aliquandiu floruisse. At quid vetat, aut quid adeò obfuerit, hæc etiam accessionem linguæ Latinæ contingere, vt Hippocrates Latinus pariter & Græcus legatur? maximè quum etiam Græcus ex nostra Latina interpretatione clarior euadat, & expositionis Græci vicè Latinus supplere possit. Verum mihi, velut antea quoque dixi, videntur omnia nunc ingenia, omnes artes ac disciplinæ in summo ac præcipiti stare: atque vtinam sic retinerentur, non retro vt reuerent, & esset aliqua saltem spes in paucis, qui in posterū suis magistris discipuli euaderent præstantiores. Ego profectò quum multis annis à scholis absuerim, à docendi munere abhorruerim, studiis meis ad scribendum, & ad exercendam medicinam collatis: proximum ferè triennium rursus professor medicinæ consumpsi, non omnino surdo ac muto auditorio, in Heforum ac Cattorum principis Academia Marpurgensi. Sed vt verum apertè fatear, longè infra meam spem, & inferiore successu quàm Illustriss. Herois Philippi Heforum principis, vel erga me. vel erga studiosos, magnifica liberalitas deprecere videtur. Non tamen desunt huius rei causæ. Pleriq; omnes fugimus immensum studiorum laborem, delicias ac voluptatem in his consecramur. Itaque vel quantum iucundum est, vel minimè molestum didicisse satis esse putamus. Alij ad ea studia se conferunt, vnde quàm breuissimo tempore, ac minima impensa assequantur, quo ventri sit cōsultum, & *πρὸς τὰ ἀλφειά* respiciunt, non cogitantes plerunque quàm sint ad ea tractanda appositi. Medicina verò requirit naturā idoneam, à puero institutionem, doctrinam linguarum, literarum, philosophiæ, mathematicum, & totius naturæ

Epistola

naturæ cognitionem: multâ insuper industriam ac diligentiam, locum studiis commodum, & longissimū etiam tempus. Si non hæc sunt quæ studiosos à Medicina auertunt, libenter patiar alium potiores causas afferre. Ego Hippocrati in libro De lege hæc referenti accedo. Detineo amplitudinem tuā Augustissime Senatus longius quàm proposueram: Vnum si adhuc retulero dimittam. Non conatus sum in hac mea translatione Ciceronianus videri, non quòd omnino improbem hoc nouæ sectæ hominum genus, qui per omnia Ciceroni in dicendo similes fieri student: aut quòd penitus negem fieri posse, vt omnes artes ac disciplinæ, Ciceronis dictione in imitationem assumpta ac seruata, tradantur. Sed vt simpliciter dicam, primū quia non placet. Deinde quòd videam magna ex parte longum & inutilem laborem, & postea etiam omnibus factis, conatum infelicem, ac successu carentem, quo plerique ex illis referunt Ciceronem, non aliter quàm Nero princeps Catonē, aut vt vicinius comparem, cuculus lusciniæ. Accedit his seruilitas & mancipatio, nullam linguæ, imo ne cogitandi quidem diuersum aliquid, libertatem relinquens. Et quando desinemus esse turpiciulæ simiæ, pulcherrimum hominum genus creati? Sed oportuit hoc quoque ad reliqua seculi incommoda accedere, vt haberemus qui non solum loquendo ac scribendo, Ciceronis simiæ vt essent, se excruciant, sed etiam Græca omnis generis scripta in Latinam linguam conuertendo, tanta sui mancipatione, vt si modo Ciceronis verbis vndique conquisitis loqui videantur, etiam à sententia subinde excidere nec vereantur, nec animaduertāt: quasi magni adeò referat Ciceronem ita exprimere, & quasi nemo alius bonus Latinus scriptor extet, quem sequi oporteat, ipso etiam Cicerone, si cognoscat, risuro suos *κακομήλας*, præsertim si quomodo se ad Lælios, Scipiones, Terentios, atque alios composuerit, in memoriam reuocet. Et tamē hic nihil dicam de his rebus quas medicus tractat, quas ne ipse quidem Cicero Ciceronianè eloqui posset, etiam si à Medico de his edoceretur: quum sanè aliàs non multus sit in rerum naturæ tractatione, nimirū intra moralis ac rationalis philosophiæ limites cōclusus. At tum demum Simia verè simia est, quum etiā supra hominē præstare quid molitur. Hoc itaq; agant hi quibus istud placet,

Nuncupatoria.

cet, ac datum est, ego neminē prohibeo. Sed sic sentio, Hippocratem istos fucatos ornatus auersari, & amare ut sicut in sua, ita in omni lingua, brevis & verbis, & sententiis, & tamen plenus ac grauis, clarus item ac dilucidus, quantum ad eius aetatem posteris assequi datur, & quod potissimum est, rectus legatur. In hoc si quid praestiti, quod volui sum assecutus: nec est quod verear vltos nasos, vel *ῥιπνικώρας*, quantum in cornu exacutos. Quo verò sciant studiosi aliquam huius operæ à nobis transactæ partem, Habent in hoc nostro Latino Hippocrate librum De aëre, aquis, & locis, duplo auctum, & nisi fallor integrum: Habent libri de capitis vulneribus principium, quod in Græcis codicibus impressis deest: Habent librū verum *μολινίον*, id est Vestiarium eundemque De ossibus inscriptum: quæ omnia in Græcis exemplaribus partim desiderantur, partim alieno loco posita, iustis locis restituta sunt. Quorum omnium gratiam ut vobis viri Augustenses, medicinæ studiosos debere volo, ita nec pudebit, nec pigebit vos, spero, summum medicum Hippocratem vestra autoritate tutum, vestro fauore commendatum, in publicam utilitatem, & meæ erga Augustissimum Senatum voluntatis declarationem, vobis inscriptum ac dedicatum prodisse. Valete viri magnifici. Marpurgi Hessorum. Calendis Septembribus. Anno Christi M. D. XLV.

INDEX LIBRORVM IN HOC volumine contentorum.

Hippocratis vita ex Sorano,	De natura hominis.	23
folio 1	De salubri diæta, Polybi.	29
Hippocratis iusiurandum. 2	De genitura.	31
Lex Hippocratis. 3	De natura pueri seu foetus.	
De arte liber. 4	34.	
De veteri medicina. 8	De carnibus.	44
De medico. 16	De septimestri partu.	48
De decenti ornatu. 18	De octimestri partu.	52
Præceptiones. 21	De superfætatione.	53
	De exsect	

Index.

De exsectione foetus	58	morbis mulierū adiecta	
De dentitione.	59		298
De corporum resectione.	60	De sterilibus.	301
De corde.	61	De morbis popularib ⁹ liber	
De glandulis.	62	primus.	310
De ossium natura.	65	Liber secundus.	320
De locis in homine.	71	Liber tertius.	328
De aere, aquis, & locis.	83	Liber quartus.	338
De flatibus	94	Liber quintus.	344
De medicamentis purganti-		Liber sextus.	354
bus.	98	Liber septimus.	363
De diætā siue victus ratione,		De victus ratione in morbis	
liber primus.	98	acutis.	379
Liber secundus.	108	De iudicationibus.	396
Liber tertius.	118	De diebus iudicatoriis.	399
De insomniis.	124	Prænotiones.	401
De alimento.	128	Predictionum, liber primus.	
De humidorum vsu.	130		408
De humoribus.	133	Liber secundus.	413
De morbo sacro.	137	Coacæ prænotiones.	423
De morbis, liber primus.	143	De vulneribus capitis.	444
Liber secundus.	154	Chirurgiæ officina.	450
Liber tertius.	172	De fracturis.	454
Liber quartus.	180	De articulis.	469
De affectionibus.	192	De vlceribus.	498
De internis affectionibus.		De fistulis.	503
203		De Hæmorrhoidibus.	505
De virginum morbis.	224	De visu.	507
De natura muliebri.	225	Aphorismi.	508
De morbis mulierum, liber		Hippocratis epistolæ.	520
primus.	242	De hominis structura	540
Liber secundus.	273		
Notia ad finē primi libri de			

FINIS.

INDEX COPIOSISSI-

mus in opera Hippocratis.



- | | | | |
|------------------------------|---------------|------------------------------|-------|
| Bortus grauior | res quā par- | rum curatio | 229.a |
| tus | 263.f | Acetabulorum vteri pituita | |
| Abortus pluri | | plenorum curatio | 258.a |
| mi in pri- | | Acida pituitosa | 81.e |
| mis quadraginta diebus | | <i>ἀνποχρίν</i> | 116.f |
| 49.b | | Acyli | 114.c |
| Abortus deformes quando | | Acuti morbi iudicium | 397.a |
| fiant | 37.f | Ad hominis generationē se- | |
| Abortus sanatio | 168.e | mē ex oībus & viri & mu- | |
| Abortus variæ causæ | 251.a | lieris mēbris manat | 180.c |
| Abscessus tabidorū qui me- | | Admonitio sufficiens rerum | |
| liores | 416.c | omnium vicissitudo | 528.f |
| Abscessus iunioribus, quarta | | Ad mulierē parere nequeun- | |
| næ senioribus magis fiunt | | tem medela | 305.d |
| 407.c | | Adolescētis in foro decum- | |
| Abscessus quo tēpore magis | | bentis historia | 330.e |
| fiant | 407.c | Adolescens in Melibœa ex | |
| Abscessus circa aures | 405.d | venere calfactus mortuus | |
| 411.d.e | | 337.d | |
| Abscessus circa aurem | 398.b | Adolescēs multo meraco po- | |
| Abscessus in febribus | 134.e | tus periit | 352.f |
| Abscessus boni | 320.f | Adstringentia & corroboran- | |
| Abscessus humorum quid fa- | | tia | 199.e |
| ciat | 357.c | Aegri quæ sibi nocent quā- | |
| Aceti facultas | 132.a.b.113.a | quæ iuuant assumere ma- | |
| Acetum mulsum quibus de- | | lunt | 5.f |
| tur | 76.e | Aegri quatuor signis seruan- | |
| Acetum mulsum in morbis | | tur | 34.c |
| acutis quale esse oporteat | | Aegris non semper creden- | |
| 386.b | | dum | 7.c |
| Acetum biliosis magis con- | | Aegro petenti omnia, modo | |
| fert | 386.e | non noxia, danda | 200.c |
| Acetum mulieribus magis | | Aegrorum variæ historiar | |
| quā viris aduersatur | 386.e | 366.367.368.375 | |
| Acetabulorum pituita pleno | | Agrotorum sedecim narra- | |
| | | tio | 333.e |

B B

Aegro

Index.

- Aegroti variis morbis corre
 pti 321.e.f.322.a.d.325.a
 Aegrotus quis 24.f
 Aegroti cur non pareant 5.f
 Aegrotum quæ vexent 23.e
 Aegrotantis ac medici error
 259.d.e
 Aegrotantis cupiditas 22.d
 Aegrotatium varia historia
 338.a.b.339.& 340.341
 Aegrotantium victus 202.f
 Aegrotorū quatuordecim va
 riæ agitatorū histor. 316.b
 Aegrotorū duodecim histo
 ria 328.b.329.330.331
 Aequinoctium 118.c
 Aes optimum 105.e
 Aesculapius & Hercules in
 hominum vtilitatem nati
 538.f.2.d
 Aetatis transmutatio 337.e
 Aestas & hyems in fracturis
 quid poscat 464.d
 Aestas bilem, ver autem san
 guinem parit 136.a
 Aetatum singularum morbi
 512.a.b
 Aetatum & locorum differē
 tiæ 417.a.b.106.e
 Aetas sana & morbosa 106.
 a.b
 Aetati cuiq; cōueniētia 106.c
 Aetatum cognitio 106.d
 Aetas omnium morborum
 capax quæ 439.f
 Aetatis cuiusq; vitia 529.e
 Aetates tabi obnoxia 436.e
 Aegyptiæ terræ benignitas
 & fecunditas 51.c
 Aegyptij inter se similes 90.e
 Aegyptij & Lybici Asiaticis
 similes 89.b
 Affectus morbo neapolitano
 similes 332.a
 Affectuū variorū causæ 11.c
 Africani cur non sanarentur
 137.f
 Aglaidæ filia 314.f
 Alia cōtrariis alia similibus
 curantur 80.f
 Alimentum vnde tale 129.b
 Alimētum hominis, humor
 leuis 188.b.c.d
 Alimentorum vnum genus,
 species verò plures 128.d
 Alimento copiosiore qui e
 geant 509.c
 Alimenta plura quando &
 quare adhibenda 509.c
 Alui secessus quos enecaue
 rit. 332.f
 Alui liquidæ curatio 389.f
 Alui fluxus variij 311.c.312.c
 408.b
 Alui profluvia 420.c
 Alui egestiōes 397.d.f. 403.c
 Alui solutio 395.f.298.f
 Aluum subducentia 158.d
 Aluus plena, vel vacua quid
 efficiat 189.a
 Aluus turbata, quibus sit ma
 lum 145.f
 Aluus nimis soluta hominē
 enecat 176.e
 ἀλὺδνοῖς 116.f
 Allij natura 393.e.113.b.201.f
 Alumen melium 500.f
 Amphictyones populi 535.e.f
 Amyg

Index.

Amygdala	114.c	tia	112.c.d
Anaxionis Abderitani histo- ria	335.d	Animas vnā cum corporibus purgandas	525.c
Anaxyridæ	92.e	Anni partibus morbi proprij	511.c.512.a
Andreas Hippocratem infā- mauit	1.c	Anni constitutiones quæ sa- lubriores	511.c
Androgyni, id est, effemina- ti	105.b	Anni quatuor partes	118.d
Anethum	113.c	Annus omnis, particeps	4.
Anhelationis muliebris cu- ratio	238.e	qualitatum	26.c
Angina eiūsque signa	174.e	Antiquorum ac recentium morborum curatio	79.e
Angina siue Cinanche	155.f 159.e	Antilochus & Aleuas	321.d
Angina & eius curatio	78.f 79.a.299.b	Antiphonis ægri historia	313.e
Anginaquādo fiat	388.f.389.b	A pituita in aquam inter cu- tem transitus	211.e
Angina secūda & ter.	160.b.c	Apium	113.c.202.a
Anginæ vexatio	360.c	Aphtha & ei⁹ curatio	165.e.f
Anginæ varietas	406.f.359.f	Apollonij Abderitani histo- ria	336.e.f
Anginæ, lippitudinis, & ītesti- ni vulnerati curatio	327.f	Apollo nomius	138.c
Anginosa cur moritur	353.f. 366.c	Apollinis responsum	536.a
Anginosorum affectus	123.a	Ἀποπληξία	64.d
Aīa admiscetur animę	105.c	Apoplexiæ vel Syderationis causæ	97.c
Animæ similitudo cum car- bonibus	105.c	Ἀπορία	14.c
Anima in somnis vigilās non est sui iuris	124.f	Apparentia quo tēpore fiant	125.d
Anima hoīs vsq; ad mortem semper producitur	358.c	Apparitiones in somnis	517.f
Anima quales ab æthere sūt fluxus somniat	126.d	Appendices	72.f.73.a
Animæ hominis qualitas & temperamentum	101.d	Apprehensio venarū brachij	17.f
Animalia quibus conseruen- tur	135.c	Aqua potabilis	130.e
Animaliū & carniū differen-		Aqua in morbis acutis	386.e
		Aqua curandis vulneribus qualis	452.e
		Aquæ leuioris cognitio	322.c
		Aquæ potus	116.f
		BB 2	Aquæ

Index.

Aquæ facultas	112.f	Argumentis septē probatur	
Aqua calida oculis utilis		potum in pulmones non	
132.e		deerrare	191.f
Aqua frigida q ^b p ^s it	132.c.e	Aristoteles & Plinius taxan-	
Aqua cœlestis	179.e	tur	43.a.b
Aqua cur hyeme calida, æsta		Aristochidis ægi i historia	
te frigida	41.a	313.c	
Aqua fontis profundī qualis		Arithmeticæ vsus	532.f
41.b		Arteria & vena caua	45.b.
Aquæ quæ morbosæ, & quæ		60.d.66.d.67.b.68.c	
salubres	85.c	Arteria vulnerata & curatio	
Aquæ palustres	85.c	166.e	
Aquæ potoribus familiares		Arteriæ conuulsæ curatio	
morbi	85.d.e	204.b.c	
Aquæ optimæ	85.f.86.a	Arteria magna ventrem &	
Aquæ falsæ	85.f.86.b.c	intestina depascitur	62.b.
Aquæ pessimæ	68.a	c.69.a.435.c	
Aquæ pluuiiales	86.c.d	Arteriæ à rene ortæ	326.b
Aquæ ex niue & glacie om-		Articularis morbus eiusque	
nes malæ	86.f	curatio	198.c.d
Aquæ inuestitiæ	87.b	Articuli pulmonis conuulsi	
Aquarū robur ex ventis	87.b	& curatio	167.a
Aquarum per somnum bibe		Articuli manus	73.a
re quid significet	128.a	Articuli pedum	73.c
Aquarum & ciborum quali-		Articuli parui i corpore	73.c
tas	358.a.83.d	Articulorum generatio	46.b
Aqua intercus ab hepate &		Articulorum tumores	132.d
splene cum curatione	212.	Articulorum curatio & repo-	
d.e.f.213.a.b.c.d		sitio	493.a.495.c.497.a
Aquæ inter cutē caussa	212.a	Ars quid	19.d
Aquilo qualis & Auster	141.	Ars exercēdi corpora & me-	
ef		dicina contrariæ	79.d
Arbor quī plantetur, & cre-		Ars tam nocentibus quā etiā	
scat	39.f	iuuātibus cōprobatur	5.c
Arbor multum tenera fru-		Ars vaticinandi & medicina	
ctum non producit	40.d	ferè similes	103.a
Arcturus	88.d.311.c.313.f	Artes quæ probandæ	19.a
Arcturi ortus	118.b	Artis medicæ magna pars iu-	
Archigenes	136.f	dicium	337.f
		Artium	

Index.

Artium variarum partes & officia	103.a b	193.c.358.d	Aurifices	103.e
Artificum differentia	380.a		Auster à similib. Boreæ natu- ra regionibus spirat	109.d
Ascarides quando magis ve- xent.	320.c		Austri facultates	109.
Ascaridum eiectio	293.a		Autumnus lethalis	313.b
Asiana pulchriora & maiora	88.e		B	
Asianorum genus cur imbel- le	90.b		B Alnea quibus profint	387.d.e
Asianorum & Europæorum differentia	90.a		Balnea calida	115.b, 29.f. 124. a b. 201.f
Asiatici imbelles & effœmi- nati	89.a. 90.a b		Balnea frigida	115.c
Asparagus	113.d		Balneorum vsus	387.b
Aspretudines culicum mor- sibus similes	323.f		Barbarorum victus ratio	9.f
Astra visa per somnum splen- dida quid significant	126.c		Beta refrigerat	123.e. 113.e
Astrorum cognitio necessa- ria medico	106.a		Biduum sine cibis viuitur	184.d
Astrorum exortus	88.d		Bilis & pituita homini con- genitæ	144.b
Astrorum obseruatio utilis medicinæ	83.e		Bilis corpus possidet	26.b
Astrorum iudicium	126.f		Bilis eductio	300.b
Atheniensium 2. historia	346.b		Bilis, sanguis, pituita quomo- do fiant	180.d
<i>ἀρετὴ</i>	5.c		Bilis per æstatē effectus	135.e
Atra bilis qualis	28.f		Biliosa ac pituitosa mulieris signa	305.d
Attenuatio vnde	185.a		Biliosi lassitudine affligun- tur	74.a
Attoniti siue stupidi	107.d		Bionis ægri historia	313.d f
Atriplex	113.d		322.f	
Auditus qui fiat	47.a. 71.e		Bitonis ægri historia	330.e
Auena comesta	111.b		Blitum	113.e
Aures purulentæ	64.e		Bona vel mala à medico fa- cta	146.a b
Auriculæ fractura	480.c		Bonis aut malis præter ratio- nem factis nihil creden- dum	510.c
Auris dolor quando lethalis	406.d		Boreas frigidus	109.c
Auris incisæ curatio	480.f		Botri	114.b
Aurium doloris curatio	74.e		BB 3	Brachij

Index.

Brachij fracti coaptatio

457.b

Brachij caput 66.b

Brachij luxati signa 472.d

Brachiū antrorsum & retror
sum luxatū quale 468.b.c

Brassica 113.e.202.b

C

CAdentes tā ex alto, quā
ex plano quid patian-
tur 446.d

Cæcitatis signum 399.e

Calamintha 113.d

Calcanei cura in tibiæ fractu
ris 462.b

Calculi varia causa 190.f

Calculi quique signa 190.f.87.d

Calculi causa & curatio

208.f

Calculi duo vel plures quī
fiant 191.a

Calculus puerorū vnde fiat
190.c

Calculi cur pueris fiant 28.a

Calculi cū ferro similitudo
190.e

Calidi seu ætheris vis & actio
44.c

Calidus vel frigidus cur quis
fiat 152.a

Calida aqua copiose vtētib?
quid accidere soleat 131.b

Calidum hoc vel contra ne
sit, certum non est 12.e

Calida apposita 82.e

Calida spiritū emittunt 34.f

Calidiores tenaciore habent
memoriam 107.f

Calfactio 131.a

Calfacientia sunt dulcia, aci?
da, salsa, amara, austera &
carnosa 114.f

Calor & frigus nō putrescit
14.c

Calligenis curatio 373.d

Caluiciei causa 256.c

Caluus in Larissa quarto die
moritur 335.a

Caluitij causa 38.e

Calūnia, artis ignorātia 4.b.c

Canales an cruribus fractis
supponendi 460.d

Cancris curatio 328.a

Cancris occulti futuri signa
& curatio 280.f

Cācri occulti nō curādis 17.d

Canicula 88.d

Canicies vnde 38.e

Canī à natiuitate 38.e.f

Cātharides 217.d.227.a.229.

Carbunculi æstiuī 320.b

Carcinoma mulierem eneca
uit 353.e.377.d.378.a

Carnes roborantes 201.b

Carnes leuissimæ & graues
201.e

Carnes fluxu laborantibus
dandæ 277.e

Carnes piscesque dandi pitui
tosis 211.d

Caries ossis cap.155.d.159.c.d

Carnes conditæ 114.c

Carnis cuiusque animalis fa-
cultates 111.d.e.f.112.a

Carnium attracticū indicia
359.a

Carnosi oēs & iter se similes
qui Riphæos incolūt 91.c

Carno

Index.

- Carnosorum affectus 122.d
 Caro quâ fiat 46.a
 Caro est medijs temperamēti
 intēr ventrē & venas 102.c
 Caro cū generatur, quid fiat
 36.d
 Capillū fluentē sistētia 293.b
 Capillorum vel pilorum na-
 tura & origo 38.c.46.f
 Capitis repentinus dolor
 158.f.193.b
 Capitis & colli differentia
 16.a
 Capitis vlcera ac vulnera ma-
 gna 48.d
 Capitis dolor assiduus quan-
 do lethalis. 406.d.410.a
 Capitis dolor in febre quid
 significet 396.c
 Capitis dolorē sedātia 260.a
 Capitis vulnera lethalissima
 418.a
 Capitis grauitas qui fiat 155.a
 Capitis dolor duplex 421.c
 Capitis dolor grauidis perni-
 ciosus 410.e
 Capitis torpor 156.b
 Capitis tumor. 357.e
 Capitis dolentis curatio 355.
 e.174.c.239.c.292.d.80.a
 Capitis fluxio 79.c
 Capitis os qua parte robu-
 stius sit 445.a
 Capitis vulneribus conferen-
 tia & contra 418.b
 Capitis dolor vocem inter-
 cipiens. 155.c
 Capitis rheuma 148.c
 Capitis vuln^o icurabile 446.a
 Capitis rigor, dolor ac febris
 cum curatione 157.f.158.a
 Capitis dolor cum febre vn-
 de 96.c.397.b.398.f
 Caput quale 63.e.15.d
 Caput purgantia 75.b
 Caput oblōgum & ceruices
 321.b.c
 Caput lapide percussus pe-
 riit 351.a
 Caput vlceribus plenū 156.f
 Caput pituitæ locus, cor san-
 guinis, lien aquæ 183.e
 Caput instar cucurbitulæ tra-
 hit 181.d.e
 Caput brachij fractum 468.e
 Caprinæ carnis facultas 394.a
 Caulis siue pudendum 69.d
 Causæ morborū non statim
 cognoscuntur 7.c.129.a
 Causæ variæ. 129.a
 Causi solutio 398.c.d.400.b
 Καὶ οὐ 153.a.310.c
 Cautio in admouendo tere-
 bello 450.c
 Cautio circa os in vulnere cu-
 rando 448.d
 Cauæ partes 44.e
 Cauma, Rheuma. 14.a
 Casei facultas 112.e.393.f
 202.b
 Caseus esu malus 14.e.f
 Castaneæ 114.c
 Cataplasma ad fluxus 293.f
 Cataplasmata vlcerati pudē-
 di 240.c
 Cencron ventus. 90.a
 Cēpa 113.b.201.f
 Ceratum in deligaturis qua-
 le

Index.

le	452.e	Χυμὸς	15.b
Cerebri corruptio cum cura		Chirurgiæ officinæ quæ con	
tione	173.d	ducant	450.d
Cerebri vsus & situs	533.b	Chirurgus prospicienda quæ	
Cerebrum glandulæ simile		450.e	
64.a b		Chirurgi manus & digiti	
Cerebrum in vtero purgatur		quales esse debeant.	451.a
139.c		Chœnix	179.f
Cerebri tumor cum curatio-		Cholericæ affectiones qui &	
ne	172.e	quando fiant	374.d
Cerebri situs ac sensus	444.f	Cibaria leuissima & grauiâ.	
Cerebri venulæ superuomē-		200.ef	
tes	154.e	Cibaria describuntur	9.c
Cerebri repletio dolorosa e-		Cibi quantitas	81.b c
iūsque curatio	173.a	Cibi vel potus conferentes &	
Cerebri corruptio	155.b	contra	201.a b
158.e.159.c		Cibi & potus omnia irrigant	
Cerebri ac capitis morbi, &		& augent	46.e
curaciones	158.b c	Cibi quatenus medicamen-	
Cerebri biliosi morbus & cu-		ta sint	98.d
ratio	Ibidem.d	Cibi distributio per singulas	
Cerebri madētis signa, & cu-		atates	130.a
ratio	157.d	Cibi quo tempore facilius	
Cerebro, osibus, dentibus,		coquantur	509.d
neruis frigida inimica, ca-		Cibi hora cū præterit quid	
lida verò amica	131.c d e	faciendum	11.b c
Cerebri membranæ duæ	71.f	Cibis vexantibus quid agen-	
Cerebri affectiones	64.f	dum	202.e
Cerebrum quale	44.f	Cibi & labores vires habent	
Cerebrum quorum sit causâ		contrarias.	99.f
142.b		Cibi si mox in corpore gra-	
Cerebrum quando insaniat		ueolent quid fieret	184.c
Ibidem.c		Cibi si eodē die excernerentur, quid eueniret	Ibidē.e
Cerebrum hominis duplex		Cibi plus æquo in ventriculo	
139.a		retenti quid faciant	Ibidē
Ceruix	65.f	Cibi perturbantes	12.d
Cherionis ægri historia		Cibi frigidissimi qui	358.f
330.a		Cibi ac potus facultates mul-	
Χερσὸν οὐκ ἔστιν.	116.f	tas	

- tas ex terra trahunt 181.c
 Cibi qui celeriter excernan-
 tur 510.a
 Cibo non augeri, malum
 510.c
 Ciborum varietas 130.b.c
 Ciborum varietas 359.a
 Ciborum facultates 128.e
 Ciborum ac potuum singu-
 lorum vis 110.a.202.a.c
 Ciborum comparatio 10.c
 Ciborum facultas quæ cogno-
 scatur 200.d
 Ciborum facultas multis cõ-
 paratur 103.c
 Cibus sanorum ægrotis no-
 cet 10.b
 Cibus sensim augendus 118.a
 Cibus in vigore morbi dete-
 rior 384.c
 Cibus quando morbum ge-
 neret 510.a
 Cibus in tabido qualis 166.c
 Cicer album 111.c
 Ciceris facultas 393.f
 Circuitus, constitutio & de-
 cretoria 134.d
 Citharædi 47.f
 Citra sanitatem nihil vtile ef-
 se potest 120.b
 Clauda membra quæ & quo
 modo fiant 418.c
 Claudii vel cæci partus vnde
 fiant 49.f
 Claudicatio vnde 73.d
 Claviculæ fractæ curatio 474
 c.d.e. & causæ. 465.b.e.f
 Claves pectoris 66.b.72.f
 Clazomenius sanitati restitu-
 tus 318.e
 Cleanactides graui morbo li-
 beratus 317.f
 Clyster mitissimus 211.a
 Cnicus 111.d
 Coagulum asininum 293.e
 Coccus cnidius 165.c
 Coci obsonia parant 103.d
 Coctiones ac cruditates quid
 significant 312.e
 Cœlestis vis quid efficiat
 187.d
 Cœli clementia & soli vber-
 tas in Asia 88.f
 Cognitio vera quid præstet
 19.e
 Coitus voluptas vtriusq; est
 32.d.115.c
 Coitus quibus profit 358.f
 Coitus ebriis quid profit
 414.f
 Coi singulis annis Hippocra-
 ti sacra faciebant 1.c
 Colli dolor pessimus 409.e
 410.c
 Columellæ vuluæ curatio
 298.e
 Collutio biliosa & pituitosa
 270.d.f.271.b
 Collutiões purgatorię 270.e
 Collutiones variæ 198.c
 Collutiones ad fluxus 294.b
 Collutiones pudendi 240.d
 Collutionum mēsurā 269.a
 Colon 60.f
 Color ofsis capitis 444.d
 Colorū mutationes à corde
 70.e
 Comitiales morbi vnde
 B B 5 388

- 388.e
Comitialis morbus cur non
magis diuinus quàm alij
putandus sit 137.b
Comitialis morbi liberatio
510.f
Comitialium cur os spume-
scat 97.f. 98.a
Comitialis morbus senes ma-
ximè tollit 416.f
Comitiales omnibus sensi-
bus priuantur. 97.f
Commotiones. 116.e
Compressa à seipsis calidiora
40.c.d
Conceptus in vtero qualis
47.f
Conceptus signa 48.a.b. 32.f
Conceptus varietas 53.a
Conceptui tempus aptum
250.d
Cōceptus qui paretur 55.b.c
Cōceptus restauratio 56.a.b.c
Conceptum impediētia 56.b
420.e. 240.b. 266.b
Conceptus qui vltra plenilu-
nium fit 53.b
Conceptus fallacia quid por-
tendat 421.b
Conceptus à quo morbo li-
beret 227.b
Conceptus, partus, abortus &
morborum decretorium
50.c
Concepturæ mulieris signa
varia 302.b.c
Conceptus virgines à dely-
rio liberat 225.a
Conceptorum summū 307.b
Concubitus mox à partu mu-
lieri morbi est causā. 226.a
Congeniti homini 4. primi
humores 25.e
Conchylia 112.c
Coniectores quæ non asse-
quantur 125.a.b
Coniugio permutato cur per-
mutetur & soboles 33.c
Conformatio partus 36.d.e
Conformationis in vtero tē-
pus 50.e
Consideranda medico in vi-
ctus ratione describenda
509.c.d
Consideranda initio morbi
340.c
Consideranda in ægro quæ
391.a.b.c
Consideranda in muliere ste-
rili, & fluxu laborante
274.d.e
Constantes homines 107.a
Constitutiones morborum
& vigores quando magis
aut minus, citius aut se-
rius fiant 344.a
Cōstitutionis tēporis pestilē-
tis & morborū in ea graf-
fantiū descriptio 331.e 332
Consuetudo victus multum
potest 382.d
Contenta in manibus ac pe-
dibus 38.b
Cōtraria tollūt cōtraria 94.c
Contraria commista nō læ-
dunt 13.a
Contusionis species 445.d
Conuulsionis curatio 79.f
Conuulsionones

Index.

- Conuulsiones quibus vtilis 534.a.b
 Conuulsio puerperæ 326.f
 Conuulsiones faciles quæ 440.c
 Cor quid 61.d
 Cordis ventriculi, siue sinus Ibidem.d.e
 Cor quale 61.a.45.e.60.d.66.d
 Cordis latentes pelliculæ 62.b
 Cordis natura 45.b
 Cordis & præcordiorum facultates 143.b
 Cordis & arteriarum consensus 67.c
 Cordis dolentis curatio 321.e
 Cordis alimētum vnde 62.c
 Cordis auriculæ 61.f
 Cor creatoris optimi summum opificium 62.a
 Cor cur non afficiatur, caput & lien multum 183.e.182.e
 Cor calidissimum 45.c
 Cor & venæ semper mouentur Ibidem
 Cordis tunicula 61.a
 Coriandrum 113.c.202.a
 Corpus quale 71.d
 Corpus humanū medici subiectum Ibidem.d.e
 Corpus impurum puro alimento læditur 509.f
 Corpora attenuata quomodo reficienda Ibidem
 Corporis repentini labores 384.e
 Corpora formæ peregrinæ visa quid velint 127.f
 Corpus post calidam frigit magis, post frigidam verò calefcit 131.f
 Corpus ac venæ in icterico quales 217.c
 Corpus quo pacto humores 4.ex cibis trahat 180.c
 Corruptio omnium mutua 101.b
 Corna 114.a
 Κωρυνομαχίη 116.f
 Costæ 66.a.c.72.e
 Costæ quanto tempore coalescant 485.d
 Cotylidonū natura 307.a.b
 Coxa 65.f
 Coxendices 73.b
 Coxendicum dolor quæ ærat affligat. 422.f
 Cratiæ ægri historia 313.f
 Crapulæ morbi cum curatione 198.a
 Cranonis populares morbi 320.b
 Crapula morborum parens 393.b
 Cratistonax 315
 Crisæorum calamitas quantā 535.e
 Crysus primus murum conscendens 536.d
 Crisæi populi 535.d
 Critonis mors secundo die ab initio morbi 318.d
 Critobuli ægri historia 313.e

Κρίσις

Index.

- Kpionis** quid 23.e
Crisis morborum acutorum 427.b
Critiæ ægri historia 313.f
Cubiti & tibiæ ossa qualia 467.c
Cubiti repositio ibidem.e
Cubiti ossa vbi fracta, quid agendum 455.c
Cubiti luxati curatio 476. a b
Cucumeris agrestis facultas 358.f.114.c b
Cucumeris syluestris radix 78.d
Cucurbita 113.e
Cucurbitulæ forma cur talis 15.c.17.d
Culpa ægrotantium medico sæpe adscribitur 20.f
Cum foetus mortu⁹ crus aut manum præmittit, quid agendum 263.a
Cū morbus repullulat quid agendum 157.b
Cū loc⁹ cucurbitulæ admotæ aperitur, quid agendū. 17.e
Cum foetus manum aut crus præmittit quid agas. 262.f
Cuminum Aethiopicū. 179.d
Cur modo mares, modo fœ- minæ gignantur 33.a
Cur de articulis scribat 483. a b
Cur quædam natura sine la- tæ sint, quædam eo ante tempus destituatur. 264.a
Cur homo imparibus diebus moriatur 186.a
Cur Hippocrates capite te- sto pingatur 2.a
Cur corde nō sapim⁹? 143.a
Curationis lassitudinis facul- tas 117.f
Curationes variæ 327.c
Curatio vlcerū capitis 156.f
Curatio morbi à capite 156. c d
Curatio cum quis sanis ocu- lis non videt 508.a
Curatio anceps 210.b
Curatio celeris 121.c
Curatio ex victus ratione 122.a
Cursus longi 116.c
Cursus vestiti Ibidem.d
Cursus recti Ibidem.
Cursus circulares Ibid.
Custodia ac scientia multa prægnantibus opus est 251.c
Cutis capitis læsa periculosa 444.a
Cutis vstulata pilos non pro- ducit 38.d
Cydonia 114.a
Cyceonis facultas 110.e
D
Damnatur ars medica etiam cum deplora-
 tos non curet 4.a
Datharsei ægri historia 313.e
Deambulationes post exerci- tia 116.a c
De aqua cur in corpore au- geatur 182.c
Dealcis vxoris historia 337.c
Debilitatis signa 397.c
Debilitas

Index.

- Debilitas à partu 230.b
 Decimestres maximè educā-
 tur 50.b
 Decimestres, vndecimestres,
 & septimestres quando pa-
 riantur 52.f.53.a
 Decretoria februm 400.f
 406.a b
 Decretoria paria vel impa-
 ria 315.f
 Decretorij dies cur impares
 tantum sint 185.d.186.d
 Decretum Atheniensium in
 gratiā Hippocratis 534.c
 Decubitus qualis 401.e
 Decubitus ægrotantium pro
 morborū varietate eligen-
 di sunt 20.f
 Defriktionis potestas 453.a
 Deglabratio quā fiat 299.f
 Deligatio duplex 451.c
 Deligatione in fracturis qui
 non egeant 464.d
 Deligatio pedis & manus cur
 diuersa 460.b
 Deligamēta qualia esse opor-
 teat 451.f.452.b.d.455.d
 Deligandi modus 451.d.e.
 453.b.454.f
 Deligatura, in qua duo maxi-
 me profunt 17.a b
 Delyrij causa 224.f
 Delyrij vehementis signa
 384.b.c.391.d.509.f
 Delyrij curatio 225.a
 Delyratio quibus prodest 359.
 b c
 Democrit' insanus putat 1.d
 Democriti de mundo senten-
 tia 530.f
 Democritus quæ in vita vi-
 deat 528.a b
 Demonstratio iucundior quæ
 opere fit quàm quæ sermo-
 ne 8.c
 Dentati cur nascantur 46.c
 Dentes pueris quando rena-
 scantur 48.e
 Dētes posterius nascunt 46.c
 Dentes pueris quando ena-
 scantur 48.e
 Dentes stupefunt molarum
 attritu 135.a
 Dentitionis varietas 59.e
 Dentium generatio 46.c
 Dētium stridor quid porten-
 dat 402.a.409.b
 Dentium dolor 193.e
 Deploratos non expedit tan-
 gere 6.c
 Desidiosorū morbi & curatio
 122.d e f.123.b c d.124.b c
 Desidiosi copiosiore labore
 quàm cibo egent 122.f
 Desidiosorum victus ratio
 123.b d f.124.a
 Desilientium ex alto curatio
 258.a
 Destillationis remediū 358.e
 Destillationis signa 13.e
 Destillatione oculorum 13.f
 Deterior victus meliori quā-
 do præferendus 510.e
 Deus rerum humanarum po-
 tissima causa 225.b
 Diarrhœa eiusque curatio
 197.f
 Diata recta multum confert
 107.d

Index.

- 107.d
 Diata hominum perquirenda 83.d
 Diebus imparibus omnia ægrotantia discernuntur 186.b
 Dierum obseruatio 50.e
 Dies ac menses quātum possint 50.c d
 Dierum parium obseruatio Ibidem.d
 Dies in crisi bus considerandi 510.b
 Dies qui ossium repositionē non admittant 466.a
 Differentia inter Asiā & Europam 88.e
 Difficultatis spirādi curatio 274.c
 Digiti tanquam rami postremo disparātur 38.a b.73.a
 Digitorum articuli quot modis luxentur 497.c
 Digiti luxati repositio & curatio 477.a
 Dignoscenda in principio 134.b c
 Dilatio ab arte aliena 525.e
 Diligens inquisitio contrarij ac certissimi remedij 11.f
 Discenda etiā quæ malè successerunt 484.e
 Disciplina nulla probatur, quæ vitæ humanæ nō conferat 18.f
 Disparationis ossium cubiti signa 476.c
 Dispositio Athletica non est à natura 129.f
 Dispositio hoīs bona 14.d
 Dissectio & sedes idē 446.f
 Distentio maxima vbi fiat 453.a
 Distortiones faciei 422.d
 Diuersa medicamenta mentes detrahentia 264.b c d e
 Diuersa ex oculis cognitio 327.c
 Diuersa eiusdem morbi curatio, vnde 150.e
 Diuersi terræ humores 181.c
 Diuersitas cōsideranda 129.d
 Diuersitas languentiū 414.a
 Diuersorum morborum curatio 328.a b c
 Doctrina, vnā cum prudētia comparanda 3.d
 Dolor vnde 15.f
 Doloris sedatio 298.b
 Doloris hepatis solutio 436.f
 Doloris & vlceris vterorum curatio 298.d
 Doloris subiti curatio 398.d
 Dolores in lumbis & vesica breues 209.c
 Doloris circa lumbos aut coxam curatio 373.f
 Doloribus circa caput quid profit 421.d
 Dolores ex itinere qui 393.b
 Dolor auriū magnus tertio die hominem tollit 359.c
 Doloris ad clauiculam curatio 381.f
 Doloris sub diaphragmate curatio Ibidem.
 Domorum structura 103.c
 Dormientium consideratio 401.e

Index.

401. e
 Dormiens internis, vigilans
 verò externis partibus ca-
 lidior 358.a
 Dormire diu, quibus condu-
 cit 31.a
 Dorsalis morbus cum cura-
 tione 167.f
 Dorsi vlcus 502.e
 Dracon Theſſali frater 537.e
 Dromeada vxoris puerperæ
 mors 319.a.b
 Duorum victuum differenti-
 a 10.b.c
 Δυσεντερία 69.e
 Dysenteria eiúsque curatio
 197.b.f.121.b.300.c
 Dysenteria in quæ degene-
 ret mala 392.e
 Dysenteria mala quæ 419.f
 Dysuria cum delirio homi-
 nem enecat 137.b
 E
 Brietatis morbus & cu-
 ratio 159.a.b.155.d
 Edere aut bibere per somnū
 quid sit 127.f
 Elementorum quatuor vires
 & situs 44.c
 Epaminondas 314.f
 Epaminonis ægri historia
 313.e
 Epicratis vxor graui morbo
 liberata 317.e.d
 Epiglottis 61.b
 Epilepticis cur oculi distor-
 queantur 140.a
 Epilepticis cur os spumescat
 Ibidem.b
 Epileptici cur suffocentur
 140.b
 Epileptici cur calcitrent pe-
 dibus Ibid.
 Epilepsia inueterata, incur-
 bilis est 141.d
 Epileptici casuri fugiunt
 Ibidem.
 Epilepticis ventorū mutatio
 quid afferat 141.e.142.a
 Epilepsia cur pueros suffocet
 140.c
 Cur adultos non occidat
 Ibidem.e
 Cur senes perimat Ibid.e
 Cur dextram partem po-
 tius occupet Ibidem.f
 Cur vere periculosior sit
 141.b
 Equestre certamen 539.e
 Equitatio continua quæ ma-
 la afferat 91.f.92.e
 Erasini Bootis historia 318.c
 Eratonis ægri historia 313.d
 Error medicorū in sorbitio-
 ne exhibenda 381.c
 Errores ab initio commissi
 facilius corriguntur 383.f
 Errores quando patent 11.a
 Eruca tithymalidis 55.f
 Eruum 179.f.111.c
 Erysipelas 145.f
 Erysipelas pulmonis 147.e.
 & eius curatio 167.c
 Esus carniū in somno quid
 velit 127.f
 Etesia 311.c.313.b.123.d
 Euacuatio dolorem excitat
 25.a
 Euagon

Index.

- Euagon Diapharsis filius 314. f
iv. f. i. a natura quædã est 23. a
 Eunuchi cur non coëant 32. a
 Eunuchi in Scythia adorantur 92. a
 Eunuchi non caluescunt 38. e
 Europæi inter se dissimiles 92. e
 Europæi bellicosiores quàm Asiæ 93. a
 Europæi Asiæ corporum forma magis inter se discrepant 92. f
 Europæi cur seniores Ibidẽ.
 Euryphon medicus 1. d
 Euryanactis filiæ historia 330. c
 Ex abortu morbi ac curatio 354. a b
 Exacerbationũ indicia 509. b
 Excrementa cur vrinam odore referant 171. d
 Exercitationis facultates 185. b
 Exercitatorum morbi & curationes 124. b c d
 Exercitationis in puluere & oleo differentia 116. f
 Exercitationes desidiorum 122. e. 123. c e. 124. a
 Exercitia 30. e f
 Exhalatio humoris quomodo fiat 186. f
 Ex morbis, anni temporibus & tempestatib⁹ omnium fit coniectura 136. b
 Ex partu flux⁹ curatio 256. a
 Ex partu vomitus sanguinis curatio Ibidem.
- Ex rigore qui pereant 423. e
 Excreationes in febrib⁹ quales 513. e. 519. d
- F
- Fabæ alunt & c. 111. b
 Fabula de Amazonidib⁹ 487. c
 Faciei consideratio 429. a b
 Faciei ornamenta 293. b
 Faciei singularum partium situs & vtilitas 533. c
 Facies bona in malis tam magna quàm paruis quid significet 355. f
 Faciei rugas leuigãtia 293. b
 Facilitas quibus insit 146. d
 Fames quo soluatur 510. b
 Farinæ puræ & cum aliis mixtæ, facultas 111. a
 Farina ordeï pleni 179. e
 Fauces 44. d
 Fauces cruentæ 418. f
 Faucium exulceratio & inflammatio 96. f
 Fauciũ dolor 408. c. 410. a f
 Faucium exulceratio 406. e
 Faucium inflatio 193. d
 Fauis sicci 179. c
 Fauonius 118. b
 Februm quatuor species 28. e
 Februm differentia 354. f
 Februm duo genera 95. c
 Febris communis & peculiaris causa Ibidem.
 Febris ex mala diætã Ibidem.
 Febris ardens recidens 398. b
 Febris interficiens, & eius curatio 170. c
 Febris

Index.

- Febris continua & tertiana 189.c
 cum curatione 162.d.e.f
 Febrium omnium propria
 & species 315.d.e
 Febris continuæ varietas
 Ibidem.e
 Febres à bile & curatio 162.
 b.c
 Febris & vomitus contraria
 80.e.f
 Febrium omnium causa spi
 ritus transitus 96.c
 Febrium effectus 137.c
 Febre ardente quando mo
 riantur 153.f
 Febris ardens, & curatio 169.
 d.173.e
 Febris ardentis constitutio
 332.c
 Febris ardens quâ fiat 387.f
 388.b
 Febres erroneæ unde fiant
 224.f
 Febres erroneæ acutæ 246.d
 Febres incôstâtes donec cõsti
 terint finire oportet 390.d
 Febriû acutarû causa 509.c
 Febris continua 397.f
 Febris quartana & curatio
 163.a
 Febricitatiû medicamē 99.a
 Febris diurnæ signa 510.c
 Febris vexâtis curatio 78.b
 Febrium diuersæ species 311.
 d.e.315.d.333.b
 Febres leues ac lethales 396.d
 Febres hybernæ obseruandę
 194.f
 Febris post frigus quâ fiat
 189.c
 Febres in glâdularum tumo
 ribus exceptis diariis ma
 læ 324.d
 Febris singultiens cum cura
 tione 169.e
 Febris à pinguiore tantû hu
 more 186.c
 Febres in Perintho grassan
 tes 323.e
 Fel 66.d.70.c
 Femur 73.b
 Femoris ossis fracti curatio
 461.c.d
 Femur fractum quorum coa
 lescat ibidem
 Femur retrorsum luxatum
 489.a
 Femoris luxati signa 488.b
 Femoris luxati reposicio
 494.b
 Femur âtrorsû elapsû 490.c
 Femoris articulus quor mo
 dis excidat 486.c.d
 Feræ magnæ in Riphæis mō
 ribus non nascuntur 91.b
 Ferulæ quales esse deceat
 452.e.469.c
 Ferulæ quando apponendæ
 460.f.463.d.469.c
 Ferulæ quâdo firmadæ 456.c
 Fibræ à ventre in vesicâ 73.d
 Ficus 114.b
 Ficus quibus pro sit post cibû
 122.a b
 Figmentum de morbo sacro
 cur productum 138.c
 Figura fracturarum commo
 dissima 469.a
 CC Figu

Index.

- Figurarum summa 453.c
 Filij Cydis ægri histo. 364.d
 Fissuræ carnis & intercus
 morbus qui fiant 97.a
 Fistulæ caussa & curatio 503.
 d.e.504.a.b.c.
 Fistulæ tam faciles quàm dif-
 ficiles curatu 439.b
 Fistulæ pulmonis folium vel
 epiglottis quid faciat 191.f
 Flatus quid agat 15.f
 Flatus omnium morborum
 caussæ 98.b
 Flatus in vteris purgatio 291.
 f.292.b.298.c
 Flatus in vterum quomodo
 inducantur 308.d
 Flumina quæ salubria 93.c
 Fluminis cursus per somnū
 visus quid præsignet 127.b
 Fluor cruentus ante partum
 periculum affert 54.d
 Fluxio in aures 74.d
 Fluxio in oculos 74.f.75.a
 Fluxiones de capite septem
 sunt 74.a
 Fluxiones à frigore ac calo-
 re 73.c
 Fluxionis caussa 96.d
 Fluxionis diuturnæ signa ac
 curatio 257.f
 Fluxum resiccantia 294.e
 Fluxum sistentia, & dolorem
 sedantia 293.f
 Fluxus diuersi, eorumq; cura-
 tio 277.278.a.b.239.b
 Fluxus vteri caussa ac cura-
 tio 274.e.f.275.a
 Fluxus diuersæ ætatis caussa
 273.e
 Fluxus suppressi signa 259.e
 Fluxus ex partu corripientis
 curatio 237.d
 Fluxus pituitosus quid effi-
 ciat 247.b
 Fluxus consuetudo 246.f
 Fluxus albi signa ac curatio
 228.d.e.f.276.b.277.b
 Fluxus à partu aut labore cu-
 ratio 275.d.e.276.a
 Fluxus aquosi purgationes
 294.f
 Fœcunditatis præparatio
 250.d
 Fœcunditatis experimētum
 267.d
 Fœmellæ procreatio etiā tri-
 plex 105.c
 Fœmina cur ex coitu magis
 valeat 32.e
 Fœminæ corpus 65.b
 Fœminæ humidiores & fri-
 gidiores 106.e
 Fœminis quid in coitu acci-
 dat 32.d
 Fœtu corrupto & secūdis nō
 exeūtib⁹ qd sit agēdū 256.f
 Fœtus conformatio 130.a
 Fœtus qua parte existat 55.a
 Fœtus in vtero quo tempore
 moueatur 38.f.263.d
 Fœtus quomodo ex vtero pel-
 latur 236.f
 Fœtus in vtero, aut mortui,
 aut debilis signa 251.e.f.
 54.d.f
 Fœtus in vtero mortui expul-
 soria varia 273.b.c.308.a
 Fœtus

Index.

- Fœtus quo pacto erumpat 37.c.42.b
 Fœtus in vtero per vmbilicū inspirat & respirat 42.a
 Fœtus in vtero quomodo cre-
 scat 35.f
 Fœtus in vtero terræ nascentibus comparatur 41.f
 Fœtus immobilis expulsio 268.f
 Fœtus in vtero qd agat 45.d
 Folia viridia cum incenduntur spirant 35.a
 Fomenta calida dolorem mitigant 96.d
 Fomenta vtilia 107.e
 Fomenta pudendi 240.f
 Fomenta diuersa ad fluxus 294.a
 Fomentum ad vteros 281.a. 282.a.296.c
 Fomenta vterum durū purgantia 297.c
 Fomentum ex stercore bubulo 225.e
 Fontes iiii. pleni semper corpori distribuūti 83.a.180.b
 Fontes, putei visi in somno, quid velint 127.b
 Fontes humanæ naturæ 61.f
 Foris aut intus quæ prosint vel noceant 135.b
 Fortuna bona, aut infortuniū omni morbo accedit 4.f
 Fortuna sui iuris semper nec optanti sese offert 81.f
 Fracturarum & luxationum curatio 468.f
 Frictio 23.a
 Frictio ex oleo & aqua 117.a
 Frigefactio 131.a
 Frigidæ noxa 515.a.b
 Frigida sæpius vtentes quid patiantur 131.b
 Frigida & humida aluū subducunt 81.e
 Frigidum calido est alimentum 45.d.35.a
 Frigidum exulcerat 324.a
 Frigus vehemens quid faciat 356.q
 Frumentum & vinum inter se differunt 202.d
 Fulcimenta quibus adhibenda 453.e
 Fullonum tubercula magna 374.c
 Furoris causa bilis redundās 527.b
 G
 Galeæcones quales 488.a.473.f
 Gargarismus 159.f
 Gemellorū procreatio 105.d
 Gemelli cur. inter se similes Ibidem.e
 Gemelli vno coitu fiunt 43.e
 Gemelli aliquādo masculus & fœmella generatur 43.f
 Gemellos gestans, eadem die parit, velut concepit 54.e
 Geometria vtilitas 532.f
 Generationes hoīs tres 105.b
 Genituræ per venas via quomodo fiat 38.c
 Genuinus dolor 25.a
 Genu luxatum faciliè reponitur 73.c.467.c
 CC 2 Glan

Index.

Glandulæ quales	62.e.f	Hepatis & partium inferna-	
Glandulæ qua parte sint	63.b	rum descriptio	533.d
Glandulæ periculosa	473.c	Heracleius	315.a
Glandulæ intestinorum qua		Heragoras	321.b
les	64.a	Heraclidis ægri historia	313.c
Glandulæ intestinorum ma-		Herba brevis melior pecori-	
iores	63.d	bus	471.f
Glandulæ renum	Ibid.	Herbarum facultates à qua-	
Glandulæ morbum generat		litatibus	113.e.f
Ibidem.f		Hermocratis ægri historia	
Glandulæ & pili eiusdem uti		328.f	
litatis participes	Ibid.b	Herophon graui morbo libe-	
Gnato	115.a	ratus	317.a
Gracilium victus ratio	30.a	Heropythi Abderitani histo-	
Grammatica	104.a	ria	335.e.f
Grauedinis curatio	300.a	Herpetes mitiores	417.f
Graueolentiæ in pudendis cu-		Herpetes quibus familiares	
ratio	238.d	Ibidem.c	
Gratis nonnulli curadi	22.b	Hiatus præcedit febres	96.a
Gulæ effigies	60.e.61.b	Hiantia nihil attrahunt	15.c
Gutturis dolentis curatio		Hippace quid	91.a.187.e
3.27.e	H	Hippocratis diuersa curandi	
H Abit ^r boni causa	185.c	ratio à Cnidiis medicis	
Habitus bonus quando		379.b	
mutandus	508.b	Hippocrates contemptor pe-	
Hæmorrhoidum causa & cu-		cuniarum	2.b
ratio	505.f.506.a.c.f.507.	Hippocratis laus & genealo-	
b.395.c		gia	520.d
Hæmorrhoidum cognitio		Hippocrati oblata ab Artax-	
506.b		xerxe rege	Ibidem.f
Hæmorrhoidarum utilitas		Hippocratis ad Democritū	
136.d		aditus	526.c.d
Hæmorrhoidas patientes, à q-		Hippocratis inuētum	120.b
bus morbis tuti sint	357.b	Hirundo	118.b
Hemitriteos eiusque signa		Homo humores quatuor	
310.c		semper habet	26.c
Hepar iaculo percussus sta-		Homo totus ex natiuitate	
tim moritur	15.f.351.b	morbus est	529.f
Hepati infestissima	214.e	Homo quatuor locis purga-	
		tur	

Index.

- tur 184.a
Homo omnium artium par
 ticeps 104.c
Hominis temperamentum
 Ibidem
Hominis fundamentum, seu
 materia 11.e.f
Hominum species & colores
 boni 417.b
Homines sicuti arbores nu-
 triuntur 41.c.118.c
Hominis calefacti historia
 319.b.c
Hominum fancita mutabi-
 lia 102.e
Hormini semen 111.e
Horrentes quales 424.b
Horror qualis 151.f
Horroris ante febres causa
 95.f
Hortandus æger, vt bene spe
 ret 22.f
Humerorum dolor 422.e
Humerorum luxatio 469.d
Humeri luxati repositio
 470.a.b.d. & vltio 473.a
Humeri summi auulsi cura-
 tio 474.a.b
Humida cōpressa magis, sic
 ca minus putrescunt 40.c
Humidæ magis supernæ par
 tes quàm infernæ 73.f
Humidi quatuor species 32.c
Humidum & liquidum calo
 ris quid habeat 46.a
Humorum obseruatio & ef-
 festus 134.f
Humorum differentia ex pō
 dere 187.f
Humores quatuor in homi-
 ne imitatur quatuor anni
 tempora 26.d
Humorum impetus & fero-
 citas 133.c
Humorum qualitates 151.e
Humorū quatuor fōtes 180.b
Humores in corpore quo pa
 cto minuantur 183.f
Humores, succive & sapes
 in homine 12.c
Humoris aquæ in vtero si-
 gna ac curatio 225.d
Hydropis duo genera ac cu-
 ratio 394.c
Hydropis causæ 188.e
Hydropis origo 402.f. & di-
 uersitas 74.b. 403.a
Hydropis signa 97.b. 192.b.
 196.d.f
Hydropis præcognitio 136.c
Hydropicorū curatio 77.b.
 398.e. 351.e. 360.f. 415.d
Hydropicorum catapotia
 395.b.f
Hydropis curat. anceps 77.e
Hydropis in muliere causa
 259.a
Hydropice mulieris affectus
 Ibidem.b
Hydropis in vteris purgatio
 291.c.d
Hydropico cur solus venter
 turgat 192.c
Hydropi febris leuis ac bre-
 uis oboritur 188.3
Hydropis in vtero signa ac
 curatio 258.b.d
Hyems frigida quos morbos
 CC 3 iane

Index.

inuehat	84.a b c	Imperitia, malus thesaur ³	3.e
Hyemales morbos aestas suc		Impetiginis curatio	293.c
cedens transmutat	337.e	Impetigines, leucæ, & lepræ	
Hygea	2.d	vnde fiant	423.d
Hyslopum	113.e	Incertæ morborū prædictio-	
I		nes quæ	510.a
Icteri curatio	78.c	In cōceptus cupiditate quid	
Icterus niger & curatio		agendum	104.e
161.f		In Dealcis horto decumben-	
Iecur	45.e.60.e.66.d	tis historia	329.b
Ieiunium qui facilius ferant		Indicationes variæ	314.e
509.b		Indicia ex egestionibus	510.
Ignarorū graphica depictio		a.513.a.442.c	
4.c		Indicia ex atra bile	513.a
Ignis	115.c	Indicia crisis	509.f
Igni aquam superāte quales		Indicia ex somno	Ibid.e
fiant homines	107.e	Indicia ex febribus	513.e.f
Ignis & aqua omnia consti-		514.a	
tuunt	100.c d	In doloribus quid agendum	
Ignis & aqua quæ à se inuicē		359.a	
secernant	Ibid.e	Industria medicinæ cultura	
Ignis & aquæ vires	Ibid.de	3.e	
Ignis humiditas in vena ca-		In exacerbationibus obser-	
ua	102.c	uanda	134.c
Ignis quæ gubernet	Ibid.d	Inexercitati cū laborant.	
Ignis tres partes	Ibidem	quid patiantur	117.b c
Ignis inimicus nervis	473.e	In Helide morbi populares	
Ignem sacrum ab vlceribus		345.c	
prohibentia	500.b	In febre acuta siticulosus vo-	
Ignorātia vbi malum	409.d	mitus ex aqua frigida pro	
Ignorata à medicis	379.f	dest	345.a
Ignis sine spiritu non viuit		Inflationis parientis curatio	
94.f		238.e	
Illyrica pestilentia	537.d	Inflammatio ad palatum	
Imagines præ oculis cursitā-		161.a	
tes	72.a	Inflammationis curatio	
Impedimenta quominus exa		299.b	
cta victus ratio describi		Initio morbi purgandum ef-	
possit	118.b c	se	510.c
		Infœcum	

Index.

- Infœcundæ victus ratio & cu
ratio. 56.d e f
- In locis siccis nata. 114.e
- Inobediētia ægri caussa mor
tis. 6.a
- In Oeniadis morbi popula
res. 345.d.f. 346.
- In Perintho morbi popula
res qui. 323.d
- Infania citra medelam sana
tur. 525.e
- Infaniæ aut cerebri corrupti
caussæ. 2. & vtriusq; cogni
tio. 531.c
- Infaniæ species. 107.e
- Infanientis signa. 328.c
408.d
- Infaniæ solutio. 398.c
- In sita proprium fructum fe
runt. 41.e
- In somnis quæ obueniant.
124.f
- Insomnia phreniticū 408.b
- Insomnia quæ vexent. 399.e
- Insomnia & ebrietas animū
immutant. 97.e
- Instauratio faciliior qui fiat.
509.f
- Instrumenta. 17.a
- Instrumenti cōstructio 483.d
- Insularum qualitas 109.b
- Intelligentia & prudentia à
cerebro non à præcordiis
142.f
- Intemperantia moriētium,
mortis causa. 5.e
- In tempore quæ veniunt, bo
na sunt. 145.e
- In Thaso qualis tertia tēpo
ris constitutio 313.a
- Intestinorum morbi vnde
64.a
- Intestinorum diuturna leui
tas 322.e
- Intestini recti inflammati cu
ratio. 504.d e
- Instrumēta chirurgo in prō
ptu sint & ministri 451.b
- Instrumēta medico in prom
ptu esse debent. 20.b
- Instrumentorū omnium for
tissima quæ 465.f
- Inuentio medicinæ 2.f. 8.f
- Inuentum Hippocratis 128.b
- Ionia regio & Peloponesus
181.a
- Irio. 111.c
- Ischiados caussa & curatio
222.f. 77.c. 400.b. 198.b c
- Iuuantia & lædentia. 81.a
- Iudicationes bonæ vel malæ
316.a
- Iudicium sine signo iudica
tionis malum 324.d
- Iuniores cur magis seniori
bus afficiuntur 151.b c
- Iunonis templum 310.f
- Iuuenum victus ratio 29.e
- Iusiurandum. Hippocratis
2.d

L

- L** Abor viris quid cōferat
243.c
- Labor quando noxius 510.a
- Labor quando vlcera excitat
358.f
- Labores cibos præcedant
358.b

Index.

Labores in circuitibus	325.d	Lateris tubercula qui fiant	149.d
Labores subeundi in æsta- te	118.ef	Lateris tuberculum, & eius curatio	168.f
Laboris effectus	186.d.187.c	Laudandi potius quàm vitu- perandi qui vel tantillum vitam humanam adiu- uant	99.d
Laborum vis	115.ef	Lectus ægri qualis esse de- beat	384.c
Lac cur fiat	39.a	Legumina in Aeno	357.f
Lac nutrimentum	129.e	Leguminum facultates	193.f
Lac asininum pro sero coqui- tur	277.d	Legumina, arborei fructus & similia spiritum habent	35.a
Lac pustulas excitat	322.c	Lenientia,exasperantia,clau- dentia,& aperientia vte- rum aut locellos	57.b
Lac extinctum quamnam re- uocent	256.b	Lentes æstuosæ	111.c
Lactis facultas	110.e	Lentis ac Lupini vires	393.f
Lactis copia quando	39.b	Lethales alui egestionēs	443.c
Lactis procreatio	263.f	Letargus & eius curatio	170. a.173.d
Lactis potus	209.d.222.d	Lex Hippocratis	3.b
Lactis varietas	130.a	Leges sibi posuerunt homi- nes non intelligentes	102.e
Lactis supressi remedia	239.d	Libri Hippocratis in contro- uersiam adducti	2.b
Lachryma calida & salsa	419.b.342.f	Libum vestitus	191.d
Lachrymæ inuitæ fluentes	314.d	Libya,Delos & Scythia pro omnibus regionibus po- nuntur	407.f
Lachrymæ vltroneæ & inuo- luntariæ	354.e	Lien	70.c
Lactuca	113.c	Lienosorum signa	356.a
Læsiō ex aceto mulso	386.d	Lienosi eorūque curatio	196.c
Lagopyrus	501.c	Lienosi passiones	134.f.135.a
Lapis Magnesiae	211.c	Lien	
Lapis in vesica quī fiat	190.d		
Lapsus ab equo quid attule- rit	340.d		
Larinx	66.d		
Lassitudines spontaneæ mor- bos denunciant	509.e		
Lassitudinis curatio	117.c d		
Lateris dolor,ex sputis bilio- sis	410.c		
Lateris sinistri grauitas	317.e		

Index.

Lienteria eiúsque curatio	197.c. 399.f	Locum suum singula seruiant	101.c
Lienteria symptomata	437.c	Locus morborum differen-	tiam facit 94.e
Ligationum species	451.c	Locus affectus spiritu occu-	patur, vnde rupturæ 97.a
Ligna ardentia spiritum e-	mittunt 34.f	Locus ad disciplinam aptus	est velut eius nutrimen-
Lignum medico paratum	quale 495.a	tum 3.e	
Lini semen	111.c	Locri populi	535.d
Lingua saliuosa	399.c	Lucis ratio	16.e
Lingua vis	103.d	Lucis species duæ	450.e
Lingua affectæ causæ & no-	tæ variæ 358.e	Lucta	116.e
Lingua vocis que diuersitas	321.b	Lumborum dolor	409. b & mala alia 410.d e
Lingua obscuritas vnde	23.d	Lumborum doloris curatio	238.e
Lingua spasmi & tremor	408.d	Lumbi aut latera vexata eo-	rúmque curatio 230.b
Lingua immobilitas	323.a b	Lumbrici lati qui nascan-	tur 189.d
Linimentum omnia educens	297.b	Lumbrici rotundi pariunt,	non autem lati 189.e f
Linteola	16.f	Lumbricus longus	190.a
Lintea in deligaturis qua-	lia 452.a. 453.d. 455.d	Lumbrici lati signa	190.b
Linteorum in deligaturis	quantitas 463.f	Luna per somnum pati visa	quid portendat 125.f
Linteorum subligationes	duæ 452.d	Lupinum	111.c
Lippitudinis solutio	398.f	Luxationum curatio	472.c
Lippitudinis curatio	508.a. 299.e	Luxationis curationi com-	munia 476.e
Lippitudinis crisis	419.a	Luxationis summa	491.b
Loca corporis vacua	7.a	Luxationis articulorum pe-	dis curatio 468.a
Loca alta & squallida	108.f	Luxationis veteris repositio	471.c
Loca faucia curatu diffici-	lia 417.c	Luxationum mala	459.f
Locorum mutatio quos iu-	uet 359.c	Luxus domesticus prohibe-	tur 16.f
Locus bilis fel	283.d		

CC 5

Mac

Index.

M

- M** Achinamenta quibus
partibus adhibean-
tur. 464.e
- Macri** signa. 321.c
- Macrocephali.** 89.c
- Maculas solares purgantia.**
291.c
- Madefactio.** 131.a
- Meotis palus Europæ & Asiæ
terminus.** 89.b90.d
- Magi & expiatores.** 137.d
- Magi vel venefici quales.**
138.a
- Mala odorata.** 180.a
- Mala punica.** 114.b.202.a
- Mala dulcia.** 114.a
- Mala sylvestria.** 114.a
- Mala ex usu veneris.** 356.d
- Malorum humorum causa.**
14.a b
- Mala homini unde accidunt.**
14.b
- Malum ex articulo non repo-
sito.** 490.a
- Malum à bono non fit nec con-
tra.** 154.e
- Maligniora quæ derepente ap-
parent.** 325.f
- Malagmata pudendi.** 240.e
- Maliensis curru onusto calca-
ri historia.** 348.e
- Malicorium.** 214.d
- Mammæ.** 65.a
- Mammæ exasperatæ curatio.**
292.f
- Mandibulæ.** 72.e
- Maniacis seu atrabiliaris
quid contingat.** 523.c
- Manus natura est descriptio.**
454.c
- Manus luxatæ signa, reposi-
tio accuratio.** 476.ef
- Manuum latio quid porten-
dat.** 402.a.410.c
- Mare & fontes unde hyeme
calescant & turgeant.** 40.d
- Mare perturbatum in somno
quid velit.** 127.b
- Mare quibus proficit.** 132.a
- Marium corpus.** 65.b
- Mas & femella qui gignantur.**
104.e
- Masculi in omni genere cali-
diores & sicciores sunt.**
106.e
- Mas aut femina quomodo
generetur.** 57.a
- Masculus dextris in utero he-
ret.** 327.f
- Matutinæ deambulationes.**
116.b
- Maxillæ solæ inter omnia of-
sa venulas habent.** 46.d e
- Maxillæ luxatæ repositio ac-
curatio.** 477.a d
- Mazæ facultas.** 110.b c.12.b
- Meatus capitis septem, totq;
fluxiones.** 64.c
- Meconium quid.** 396.a
- Medicina quid.** 4.e.94.d
- Medicinæ antiquitas.** 8.f
- Medicina qualis.** 81.
- Medicinæ viæ seu partes.**
20.a
- Medica ars quibus constet.**
312.f
- Medicina cur sapientiæ so-
ror.**

Index:

ror	533.a	Medico cōsideranda ante cu
Medicina varia	126.b	rationem. 5.f.20.d.401.c
Medica ars nihil cæteris si-		Medici ad duos fines mili-
mile habet	7.c	tant. 525.e
Medicina diuīsa in chirurgi-		Medicū quæ nosse oporteat.
cen, pharmaceuticen &		143.c
diæteticen	10.c	Medicus quæ præstare de-
Medica ars cur refelli non		beat. 143.e
possit.	5.e	Medicus deos potissimum
Medicina quæ doceat.	81.f	colit. 19.f
Medicina constans & firma		Medicus Philosophus deo æ-
tota.	81.f	qualis. 19.e
Medicinæ pars potissima.		Medicus qui laudandus
399.a		379.e
Medicina non statim scitur.		Medicorum error in arenæ
80.b		iudicio 209.f
Medicinæ voluptates & mo-		Medicus assiduè legat 23.c
lestiæ.	94.a b	Medico quid agendum erga
Medicina morbos omnes nō		ægotantes 356.b.357.f
sanat.	4.e	Medicus considerat morbos
Medicinæ artis præstantia &		in corpore præualescentes
contemptus.	3.b	26.e
Medicinæ comparatio ad a-		Medici præparatio ad articu-
gricūturam.	3.d	lorum repositiones 459.c
Medica ars esse, & vera affir-		Medico præstanda in fractu-
matur.	8.e	ris 454.a
Medicina ars est de rebus vel		Medici imperiti taxantur
morbis vulgo notis.	9.b	454.b
Medicinam homines coacti		Medico curāda in capite vul-
sunt inquirere.	9.b	nerato 444.b
Medicus qualis esse debeat.		Medicus morbum, vbi nouit
16.c e		facilè pellit 7.d
Medici munus.	312.f.401.a	Medicus etiam rudes sciscita
508.d		ri debet 21.f
Medici munus in rectè tra-		Medicus admonetur 23.d
ctandis mulieribus.	225.e	Medicus de quib⁹ iniuste ar-
Medico diligenter obseruan-		guatur 149.c
da.	361.d e f.362.10.a	Medicus ægros crebro inui-
133.c d		sere debet 20.e
		Medici

Index.

- Medici plures conuocandi
22.e
- Medicus derebus vulgo no-
tis tractat 9.a
- Medicis non vtentes sanari
posse 5.a
- Medici fama multi, re pauci
3.c
- Medici personati Ibidem.
- Medicus malus qd agat 22.c
- Medici nauium rectoribus
comparantur 10.e
- Medici alimentum salubre
excogitauerunt 9.e
- Medicorum quorundam opi-
nio 24.b
- Medicamentorum vires & a-
ctio 81.c. 191.c
- Medicamentorum modus
324.b
- Medicamenta pro natura cu-
iusque danda 98.e
- Medicamenta ad cōceptum
295.a d e f. 266.a. 272.c
- Medicamenta cōceptum re-
parantia 302.f
- Medicamentum cōtra abor-
tum 55.d
- Medicamenta valentia mor-
bis acutis, debilia mitiori-
bus exhibenda 81.d
- Medicamenta valētia ad vl-
cera 500.d e f
- Medicamenta, cruda adhuc
materia quæ noceāt 88.d
- Medicamenta non adhiben-
da 79.b
- Medicamenta danda Ibid.c
- Medicamentis quæ nā & quan-
do mouēda 509.d e. 512.d
- Medicamenta nulla quando
adhibenda 509.d
- Medicamenta quibus non ex-
hibenda 532.d
- Medicamentum in repletio-
ne reicitur 121.d
- Medicamenta purgantia &
sistentia non satis sunt ad
conualescentiam 5.d
- Medicandum perperam non
esse 145.e
- Medicamenta sine fortuna,
sed meli⁹ cū ea sanāt 82.a
- Medicamentum tetragonum
220.f
- Medicamentum sanguinem
sistens 395.b
- Medulla ossis alimētū 130.d
- Medulla spinæ, improprie
medulla 45.a
- Medulla spinæ cur resicetur
208.c d
- Medullæ spinæ affecta signa
418.e
- Mel 113.b. 202.c
- Mel Atticum 223.b
- Mel semicoctum 82.f
- Melancholici & comitiales
communicant 362.d
- Melancholicum cacoëthes
408.c
- Melidia graui morbo libera-
ta 319.f
- Melissus 24.b
- Melos insula 346.b
- Membra adnascencia 51.b
- Membrorum confirmatio
104.d

Membro

Index.

- Membrorum origo** 71.a b
Membrana tunica 44.e f
Mens hominis obscura 102.f
Mens quando non fallitur 399.b
Mentis situs 62.c
Mente valere in morbis, bonum 510.d
Menses cur à natura inuenti 302.f
Menses quādo pauciores qd agendum 235.a.301.f
Menses quos morbos extrudant 440.c
Menses mali qui 439.c
Menses educentia 515.c
Menses quibus diu permanent 354.c
Mēses diutius quā quatuor diebus fluētes, malū 245.f
Mēses diutius suppressi quos morbos excitent 243.e
Menses sex mensibus retenti incurabiles 243.f
Mēsiū varius affect⁹ 244.a b
Menses cum in pudendum non procedant Ibidem.c
Mensium modus & qualitas 245.f
Mensibus septem annis suppressis qd euenerit 343.a
Mensium biliosorum signa 246.c
Mensium pituitosorum effectus 247.a
Mensium plus iusto fluentiū curatio 306.a d e
Mensium prouocatio 264.a
Mensium purgatoria 241.c
Mensium suppressorum curatio 238.a f.239.a.244.e 229.a b
Mēsiū defectu mortua 262.e
Mēsiū cognitio 271.b.247.d
Menstrua diutius retinentibus quæ ægritudines contingant 36.c d
Menstruarum purgationum circuitus est 325.e
Menstruorū in iunioribus & senioribus differentia 83.a
Mentha 113.d
Meretrices quæ docuerunt 48.a
Mespila 114.a
Mesocolon 66.d
Meton vehementi febre correptus 318.b
Milium quid sistat 321.e
Milium alit 111.c
Militarium vlcerum curatio 18.c
Ministri quales ægrotis dandi 21.a
Mira & brevis tum humorū tum partiū animalis enumeratione 129.c
Missio sanguinis vbi & quando facienda 17.c d
Missiones in hoīe bonæ 14.d
Modicis impleri & pluribus vacuari quī contingat 115.a
Molæ in vtero generatio & expulsio 292.a
Mollæ cōceptus causa, signa ac curatio 307.b c.363.c d
Mollitoria 267.b
Mollit

Index.

Mollitoria vteri varia	296.c	bonum	510.d
Morborum	115.e.200.b	Morbus quando debiliior &	
Moræ	113.f	quando fortior	510.e
Morbus typhos dictus cum		Morbus sacer quibus diis tri	
causis ac curatione	218.a	buatur	138.c d e.143.c
	b.219.a	Morbus sacer sanabilis	138.f
Morbus biliofus	223.c	Morbus deficcatorius & cu	
Morbus sanguineus. Ibidē.	d	ratio	170.b
Morbus liuidus & curatio		Morbus iudicare quid	194.b
	170.e	Morbi laterum caussa & cu	
Morbus ructofus eiufq; cu		ratio	Ibidem.a f
ratio	170.f	Morbi pituitofi caussa & cu	
Morbus pituitofus eiufq; cu		ratio	211.d
ratio	171.b.223.c	Morbi craffi & hydropis ea	
Morbus magnus, à renū mor		dem est curatio	222.e
bo	210.a	Morbi estate vexātes eorūm	
Morbus craffus sex annos ve		que curatio	195.a c
xat	222.e	Morbi hepatici caussa, signa	
Morbus locellorum	225.d	ac curatio	213.f.214.
Morbus ex abortu dolorem		a b d e.215.b	
vicinis vteri partibus com		Morbi varij	332.e
municans	225.d	Morbi æftiui & autumnales	
Morbus regius	338.d.313.c.		310.e.311.c
	373.d.396.e.398.a.400.c	Morbi lethales	228.b c
Morbus regius acutus eiufq;		Morbi qui ante pubertatem	
curatio	175.a.180.a.198.e	non fiunt	439.b
Morbus æftiuos hyems fucce		Morbi natura	327.e
dens soluit	337.e	Morbi popularis cura	27.b c
Morbus latentes opinio po		Morbi ex menfibus fuppres	
ti ⁹ quā m ars iudicat	94.c	fis	439.e
Morbus imaginationis	64.d	Morbi post canem fydus qui	
Morbus à venis ortus	62.c		363.a b.364.365.&c.
Morbus niger eiufque cura		Morbi à fpiritu fiunt	95.b
tio	172.a b c	Morbi.ii.à pituita cum cura	
Morbus ftercoris vomitū fa		tione	199.a
ciens	123.f	Morbi cur obfcuri	7.b
Morbus corruptorius eiufq;		Morbi obfcuri multi, mani	
curatio	172.d	festi pauci	6.e
Morbus aliquo modo affinis,		Morbi ex ptu curatio	284.a
		Morbi	

Index.

- Morbi paulatim accedunt 100.c
- Morbi cuiusq; vterorum se-
datio 298.a
- Morbi vernaculi 84.e
- Morbi acuti vnde 399.d
- Morbi lethales 151.d.144.c
- Morbi ex abortu causa & cu-
ratio 259.f.260.d
- Morbi comitialis diuersi af-
fectus 139.f
- Morbi ex repletionem curatio
& cōtra.510.b.120.f.122.b
- Morbi à capite orti 156.b
- Morbi partium anni 135.e
- Morbi mutilantes 144.d
- Morbi longi Ibidem.e
- Morbi citò decernētes Ibid.
- Morbi in alios transeuntes
Ibidem.
- Morbi necessariò ex aliis su-
peruenientes Ibidem.f
- Morbi acuti qui 379.e
- Morbi connutriti curatio
358.d
- Morbi dubij 144.d
- Morbi ab hepate & splene
321.d
- Morbi diebus imparibus iu-
dicantur 180.d
- Morborū causa.186.e.187.f.
24.f.26.f.135.d.144.b.
193.a
- Morbi vnius signa septē Ibi.
- Morborum tria principia
187.a
- Morborum quinq; crassorū
causa & curationes.221.a
b.f.222.a d
- Morborum acutorum natu-
ra 195.a
- Morborum causa aer & vi-
tus ratio 27.a
- Morborū ex victus ratione
curatio 393.c
- Morborum diuersi effectus
338.b.340.b
- Morborum omniū commu-
nes solutiones 393.a
- Morborum vteri ferè omniū
curatio 283.e
- Morborū cognitio & obser-
uatio varia 315.c.197.c
- Morborum modi 135.c
- Morborum effectus diuersi
130.f
- Morborum omniū idem mo-
dus 94.e
- Morborū duo genera 534.a
- Morborum natura medicus
358.c
- Morborum decreta 185.c
- Mores fieri 84.e
- Moribūdīs in Perintho quæ
acciderent 324.b
- Mori appetentium curatio
79.f
- Morituri & futuri supstitēs
quibus noscantur 408.e f
- Morituri ex vulnerato capi-
te signa 449.c
- Mors Hippocratis 1.f
- Mors quo tempore accidat
327.e
- Mors vnde contingat 51.a
- Mortis signum 409.c.418.c
- Morum diuersa ratio in Eu-
ropæis atque Asianis 92.f.
93.2

93. a
 Mucus à natura 73. d
 Muliebris menstrui causa 243. c
 Mulier vterum gerens cur à mensibus non doleat 36. a
 Mulier præter naturam pinguis non concipit 55. d
 Mulier quæ prægnans fiat 239. e. 241. a
 Mulier cur sit viro calidior 243. c
 Mulier ab vtero quo modo stranguletur 246. b. c
 Mulier concipere solita cur non concipiat 304. d
 Mulier bimestrem aut grandiorem foetum cur perdat 55. d
 Mulier lienosa 356. c
 Mulier Larissa decimo mense abortit 346. c
 Mulier concipere cupiens 349. f
 Mulieris non concipientis purgatio 241. d. 305. a. 247. c. 250. a
 Mulieris à partu non purgata curatio 227. b
 Mulieris corpore malè habere menses pauciores fluunt 246. e
 Mulieris cibum, ob vteri dolorem, auersantis curatio 237. c
 Mulieris semen retinētis sed non concipientis curatio 308. d
 Mulieris inuitæ abortum facientis curatio 308. f
 Mulieris quæ diu non concepit, curatio 237. d
 Mulieris præ obesitate non concipientis curatio 303. d. f. 305. f
 Mulieris decumbentis in litore historia 319. d
 Mulieris apud Tisamenū decumbentis historia 330. f
 Mulieris à morbo vteri obmutescantis curatio 287. b
 Mulieri post viri congressum quid agendum 248. b
 Mulieri semen non continenti quid agendum Ibid. d
 Mulieres rariore carne & teneriore quàm viri 243. a
 Mulieres cur steriles fiāt 301. b. d. 303. c. 226. f. cur nō concipiant Ibid. b. f
 Mulieres crassæ cur non concipiant 229. d
 Mulieres etiam hydropem patiuntur 192. d
 Mulieres quæ grauius è mē-sibus ægrotent 242. e
 Mulieres à vatibus deceptæ quid Dianæ consecrarent 225. a
 Mulieres quæ paterentur 313. e
 Mulieres in conceptu errant 49. e
 Mulieres, quæ longius quàm decem menses vterum gestasse visæ sunt, falluntur 42. d
 Mulieres nihil aut parum lactis

Etis habentes 43.a
 Mulieres vterū nō gerētes à
 suppsis mēlib⁹ dolēt 36.b
 Mulieres menstruis carentes
 non concipiunt ibidem.
 Mulieres plus vel minus in
 partu laborantes 37.b
 Mulieres cur falso se vterum
 gerere credant 280.e
 Mulierū diuersæ naturæ, tū
 à coloribus, tum ab ætati-
 bus petita 225.c
 Mulierum affectus 360.b
 Mulierum victus ratio 30.e
 11.a.c
 Mulierū diuersi morbi 341.e
 Mulierum trium ægrotan-
 tium historia 331.a.b.c
 Mulierum fœcunditatis cō-
 gnitio 420.c
 Mulierū Scythicarū formæ
 fluxæ 91.e
 Mulierib⁹ iudicio p̄ditis de
 parrub⁹ fides habēda 49.d
 Mulieribus omniū morborū
 causæ vteri 82.b
 Multi valetudinarij nascun-
 tur 52.c
 Multi etiam imprudentes in
 medicinam incidunt 5.a
 Multi priore cibo perierunt
 9.d
 Multa ex vno quo modo gi-
 gnantur 39.e
 Mundi imitatio 102.c
 Musculi solidiores 130.c
 Musica 103.c
 Mustum 113.a
 Mutatio ciborū quī fieri de-
 beat 382.c.383.
 Mutatio subita & magna pe-
 riculosa 383.b.384.f
 Mutationes locorū ac victus
 morbos gignunt 52.e
 Mutationes locorum, varios
 homines procreāt 93.b.c
 Mutationes mentem excitāt
 90.b
 Mutatiōes quæ cauēdæ 357.a
 Mutationes tēporis & aeris
 morbos pariunt 511.b
 Mutationes temporum ob-
 seruandæ 88.d
 Mutationes temporum mor-
 bos pariunt 136.a
 Mutus cur fiat qui comitali
 morbo corripitur. 130.f
 Muti vnde 47.e
 Mutili à natiuitate curabi-
 les 491.d
 Myli ægri historia 313.d
 N
 Nares repletæ nihile mū-
 gentes 120.c
 Nares humidæ habētes qua-
 les sint 359.d
 Narium qualitas 71.e
 Nasi fracti curatio 478.f
 479.b
 Nasturcium 113.c
 Natationes somniare quid
 velit 127.d
 Natura faciēda demon-
 strāt. 8.a
 Natura repugnante omnia
 irrita fiunt 3.d
 Natura calidior quantum à
 ceteris variet 108.a
 DD Natu

- Natura in omnib⁹ dux 19.c
 Natura ossium, neruorum,
 venarum, carnis & alio-
 rum humorum, quā co-
 gnoscatur 359.e
 Naturæ humanæ descriptio
 533.b
 Naturæ actio 7.f
 Naturæ conatus & vis 103.b
 Naturæ & morbi quib⁹ aque
 in potu salubres 86.a
 Naturæ diuersæ ignis & a-
 quæ varia temperatura fi-
 unt 107.c
 Naturæ variæ variis sensib⁹
 percipiuntur 107.c.d
 Naturæ calidioris victus ra-
 tio 107.f.108.b
 Naturæ diuersæ victus 107.
 f.108.a
 Naturæ quæ nulla cura aut
 victu mutantur 108.c
 Naturæ fastidium 7.d
 Naturæ modum excedēs ni-
 hil bonum 509.e
 Naturarum cognitio 106.c
 Nebri qui dicantur 536.b
 Nebula quid 40.f
 Necessaria medico futuro 3.d
 Nervus torpidus 66.c
 Nerui quomodo facti 44.d
 Nerui ubi non sunt 72.d
 Nerui à cerebro 68.c
 Nerui non lædendi 473.c
 Nerui cur dolore minus affi-
 gantur 15.f
 Neruorum generatio 46.b
 66.c
 Neruorū distributio 326.c.d
 Neruorum qualitas 72.c
 Nexus quā parte procedat
 451.d
 Nicodemi Abderitani histo-
 ria 336.a.b
 Nihil temerè iudicādū 355.e
 Nocumentum nullum à me-
 dico bono, aut ab arte me-
 dica oritur 5.d
 Nomæ, lethalissimæ 417.f
 Nomina artibus ex specie-
 bus imposita 4.d
 Nomina lege naturæ indita
 4.e
 Non eadem via seminis &
 vrinæ 31.f
 Nosse morbos & curare eius-
 dem est scientiæ 7.c
 Notæ ex collo & faucibus
 430.e
 Notæ ex præcordiis & vêtre
 431.a.b.d
 Notæ ex lumbis 432.a
 Notæ ex sanguinis eruptio-
 ne Ibidem.d
 Notæ ex dentibus 429.f
 Notæ ex maxillis, labiis, gin-
 giuis, sputis & secretioni-
 bus 430.e
 Notæ ex voce Ibidem.b
 Notæ ex dysenteria 437.c
 Notæ ex vrina 441.a
 Notæ ex sputo 434.e.435.f
 Notæ ex prægnatib⁹ 439.d.e
 Notæ ex variis affectibus
 436.a.b.438.d
 Notæ ex puris mictiōe 415.c
 Notæ ex lethargo 426.e
 Notæ ex vertigine 421.f
 Notæ

Index.

- Notæ ex oculo rupto & pro
minente 417.c
- Notæ ex doloribus aurium
428.c.d.f
- Notæ ex morbo regio 428.e
- Nota vberioris alimenti
509.f
- Notæ ex hydrope, tabe, poda
gra & morbo sacro 415.d.
416.d.e.f
- Nuces 114.c
- Nuclei 114.b
- Nyctalops qui curetur 507.f
422.a.359.f
- Nyctalopica affectiones in
pueris 360.b
- O** Besorum victus ratio
29.f
- Oblivio malum 409.d
- Oblivio & nocturna vocife-
ratio vnde 142.d
- Oblivio dysenterici quæ
374.a
- Oblivionis caussa 531.c
- Obseruanda in ægris 343.d
324.b
- Obseruanda medico in mor-
bis dignoscendis 531.a.b
- Obseruanda, ac cauenda cir-
ca victus rationem 394.e
381.c
- Obseruanda circa vlcera tra-
ctanda 417.a
- Obseruatio varia 414.b
- Obseruatio variorum peru-
tilis 133.f. 34.a.b
- Obseruatio præcipua in ocu-
lorum lippitudine 419.f
- Obseruatio in Typho mor-
bo 218.e
- Obseruationes morborum
26.f
- Obseruationes præcipuæ
414.e
- Obseruatione digna 99.f
100.a
- Obseruationis modus ad præ-
dictionem 414.c.d
- Obsonium in renum morbis
209.f
- Obsonia ex variis intritis
præparata 115.b
- Occasiones tēporum 144.f
21.c
- Occasiones morborum con-
sideranda 357.b
- Occasiones curandi tempe-
stiuæ 145.b
- Intempestiuæ. Ibidem.c
- Ochri siue phasioli 111.b
- Octimestris partus 48.c
- Octimestres non superstites
manent 49.e
- Octimestria & trimestria
cur non viuunt 51.e. 2.a
- Oculus totius corporis tem-
peraturæ index 358.b
- Oculi confractio mala 410.a
- Oculi corrupti qualitas & cu-
ratio 507.c
- Oculi humor 47.d
- Oculi fulgentes 74.e
- Oculi situs & vtilitas 533.b
- Oculi distortio malū 409.d
410.b
- Oculorū doloris curat. 517.c
- Oculorū consideratio 429.c

Index.

Oculorum medelæ	395.e	Opifex, naturæ vel artis in-	
Oculorum fluxiones	355.f	strumentis vtitur	6.b
Oculorum fluxionis in nares		Opinio in medicina perni-	
auersio optima	373.f	ciosa	19.d
Oculorum signa	354.f.e	Opisthotonos eiûsq; curatio	
Oculorû sordes siccæ	419.a	175.c.d.400.a.224.a	
Oculorum tumor	Ibid.b	Oratio Hippocratis ad aram	
Oculorû notæ	399.d.401.d	consistentis	534.e
Oculorum tumor	75.c	Oratio legati ad Athenien-	
Oculorum remedium	130.e	ses	535.b
Oculorum tres tunicæ	71.e	Ordei facultas	110.b
Oculis nullum pharmacum		Ordeum Achileum	179.d
adhibendum	75.c	Odeum torrefactum	Ibid.f
Oculis potius quàm opinio-		Origanum	113.e
nibus credendum	100.f	Origo venarum & arteriarû	
Oculis incômodi cibi	373.f	129.e	
Ocymum	113.d.202.a	Oris malè olentis purgatio	
Olera	201.f	292.e	
Oleum & oleosa	202.c	Oris vteri plus quàm in men-	
Oleû Aegyptiû album	229.f	sibus hiâtis curatio	289.f
Oleum quibus vlceribus in-		Oris vteri inflammati cura-	
utile sit	499.c	tio	282.c.283.a
Olerum quodnam bonum		Oris vteri semen præ duritia	
396.b		non suscipientis curatio	
Olfactus caussa	47.b.71.e	288.b.c	
Olfactum malè afficientia		Oris vterorum occlusi cura-	
133.f		tio	235.f.289.c.307.f
Omentum quando putrescat		Oris vteri humidi curatio	
144.f		229.e	
Omne vnum est	Ibid.a	Os vteri siue vuluæ conclu-	
Omne incôcretû cauum	6.f	sum	243.c.d
Omnes doloris causæ ad idē		Oris vteri vlcerati curatio	
referuntur	10.b	237.f.239.b	
Omnia terræ nascentia suæ		Os capitis duplex	444.d
terræ naturâ sequuntur	93.f	Os capitis tenuissimû quod	
Omnis attenuatio laxat ac		Ibidem.e	
corrugat cutem, renutri-		Os eminens quando præsecā-	
tio contra	357.a	dum	460.d
ὀφθαλμία	64.d.311.e	Os femoris quàm periculo-	
		sum	

Index.

sum	492.f	Palæstra & Pædotriba	104.a
Os intro cedit multis modis	445.e	Pallidorum curatio	80.c.d.e
Os quæ patiatur	46.d	Palpebrarum curatio	507.f
Os sacrum	65.f.326.d	Palpebrarum ficus	332.e
Os tibiæ eminens	492.e	Panacea	2.d
Osculi vteri aliò inclinati cu		Panificia varia	9.d.103.e
ratio	d80.d	Panis varietas	110.f
Ossa quæ fiant	44.f	Panis differētia	12.a.b.201.c
Ossa vnde	44.d	Panis calidus sitim, & alia in	
Ossa quare à propriis locis		ducit	283.c.111.b
discedant	456.c	Papauer	111.d.114.b
Ossa rupta minus periculosa		Pupilla qualis	47.c.d
quæ	449.a	παράδωμα à cucumere	33.f
Ossa puerorū qualia	Ibid.b	παράδωμα à rosa & allio	180.c
Ossa digitorū, manus, pedis		Paracynanche eiusque cura	
& articularū	65.e. & 66.c	tio	174.f
Osis maioris abscessus	464.b	Partheniū microphilū	501.b
Osis rupturā ambiguum co		Parij ægri historia	333.e.f
gnoscenti ratio	448.b.c	Pariunt statuto tempore pe	
Osis capitis confracti cura		cora	43.c
tio	326.f	Pars robustissima cur in coi	
Osis simplex fractura	462.c	tu secernatur	31.f
Osis suppurati signa	449.d	Partes mensis aliquot	53.a
Osium cautorum actio	38.a	Partes singulæ quæ nutrian	
Osiū, neruorū, carnis, cutis		tur	101.d.e.f
& venarum in corpore v		Partium internarum feruor.	
fus	68.d		195.b
Osium fractorū & eminen		Partus qualis	43.c
tium curatio	465.e	Partus septimestris	48.c.e
Osium coactio	465.e	Partus gemellorum	322.e
Oscitationum assiduarum		Partus quo morbo liberet	
curatio	324.f.355.b		225.f
Oves & capræ comitiales		Partus cū vlcere in coxa no	
	141.c	no mense editus	346.c
Ouorum facultas	112.e	Partus cur non omnes robu	
Oui candidum	179.f	sti edantur	33.e
P		Partus quādo piclicant	52.b
Alati fluxio	64.c	Part ^{us} macillēti ac tenuēs	50.a

Index.

Partus septimo mense quid agat 49.b	curatio 457.e
Partus quo pacto educat 53.e	Pedum tumor 502.e
Partus quomodo edantur 53.e	Pedum calor febris solutio. nem denotat 389.e
Partus mortuus quo pacto e- duceretur 53.f. 58.e	Pedum frigiditas febrium accessum significat 389.e
Partus varia similitudo 33.d	Pedum torporem quid discu- tiat 224.f
Partus acceleratio 43.b	Pedibus manibusq; distētus actort ^r curatur 79.f. 80.a
Partus retinēdi curatio 250.b	Pellicula spumosa 68.f
Partus difficultas qui tolla- tur 253.a.b	Pellicula ab aere præfrigido superinducitur 46.b
Partus appropinquantis si- gna 252.f	Pellium tinctorum 103.e
Partus difficultas unde 252.d 84.e	Penicilli plūbei præparatio & vsus 281.c. 282.a. 304.a
Partus frustulatim extractio 58.e	Percussus in palpebrā sine o- culi læsione sanatus 350.c
Partus directio 59.a	Perdiccas rex phthiſicus cre- ditus 1.c
Partus conceptio 102.a	Perforationis modus quis 449.f
Partum accelerātia 266.b.c	Perfrigeratio malū 409.d.f
Partum iuuantia 265.c	Periclis Abderitani historia 335.b
Patella 65.f	Periculū mortis in prægnan- te 252.a
παρῆματα 15.b	Perinthus 320.d. 323.d. 4.f
Puris in vtero semen corrū- pentis purgatio 304.d.e	Peripneumonia qui fiat 152. b.d. 179.d
Pecora prægnantia à potu & cibo pinguiora fiunt 39.b	Peripneumonia & eius cura tio 163.f. 64.b. 176.a. 193. f. 194.b. 392.d
Pectoris dorsive diruptio 207.b	Peripneumonia qui suffocet 153.f
Pecten 69.d	Peripneumonia quid faciat 400.d
Pectinis præ fluxu dolentis curatio 29.a	Peripneumoniace affectio- nes 391.a
Pectus 66.b	Perip
Pectus in dorsum ruptum & curatio 169.c	
Pedis cum manu collatio 457.e	
Pedis & ossiū eius fractorū	

Index.

- Peripneumoniæ causse 194.
 cf
 Peripneumoniæ & pleuriti-
 dis signa 435.b
 Peripneumoniæ & pleuriti-
 dis differentia 75.ef
 Pernicies fœminarum 409.f
 Pernionum curatio 373.f
 Perpendenda in luxationi-
 bus 471.d e
 Persarum bellū contra Græ-
 cos 526.f
 Pestilentia obsidentium sum-
 ma 535.f
 Petenda in vulneribus capi-
 tis 418.a
 Petenda à diurnas fluxio-
 nes patientibus 421.b
 Phagedænosus puer que pas-
 sus sit 339.f
 Phanocritus 315.a
 Pharmacum daturus quid
 prius agat 98.ef
 Pharmacum quid agat 25.e
 Pharmacū post dolores dan-
 dum 261.a
 Pharmaca fortuna reperta
 200.c
 Pharmaca cautius exhiben-
 da 198.f
 Pharmagoræ ægri historia
 313.e
 Phasianorum descriptio 89.f
 Phasis incolæ 89.e
 Phasis qui fluat Ibidem.f
 Pherecydis ægri historia
 374.e
 Φίλιππος Ἰωνίου 196.b c
 Philistis in Thaso ægri histo-
 ria 329.f
 Philini vxoris puerperæ Tha-
 sia mors 317.a b c
 Philisci ægri historia 313. e.
 314.f. 316.c
 Philonis filia cur mortua
 314.d
 Phreneticus moritur 334.f
 Phrenetici signa 408.c
 Phrenetici qui pereant 153.f
 Phrenitis qui fiat 153.c
 Phrenitidis solutio 398. c.
 408.b
 Phrenitides cum curatione
 174.d. 193.f. 194.c f
 Phthisis 64.f
 Φυμαλία 63.a
 Physicus hominis habitum
 acrobur considerat 306.f
 Phylam Alexandri pellicem
 Perdiccas deperibat 1.d
 Physiognomia 326.e
 Pilarum vsus in fracturis
 464.f
 Pinguedo conceptum impe-
 diens, quomodo curanda
 sit 56.f
 Pinguis signa 321.e
 Piper dentes iuuat 359.e
 Pira 114.a
 Pisa infant 111.b
 Pisces, edulium leue 201.f
 Pisces erronei 112.b
 Pisces grauiores & leuio-
 res Ibidem.b c
 Pisces falsi Ibidem.c
 Piscium facultates Ibid.a b
 Pittacus 321.c
 Pituita eiusque curatio 110.e
 DD 4 Pit

Index.

Pituita cur hyeme augeatur	25.f	borandum hyeme	119.b
Pituita alba eiusque curatio	171.d.398.e	Pluuia clemens visa in somno quid significet	126.e
Pituita ex ore ac naribus fluentis signa	253.e	Pneumonis siue pneumonia eiusque curatio	204.d
Pituita eductio	300.a	Pneumonia causa	205.b
Pituita vires	181.f	Podagra	198.d
Pituitosa ac biliosa mulieris purgatio	289.a	Podagra qui laborent & quando fiat	517.c. 517.f
Pituitosi & biliosi furores quales sint	142.c	Podagrae curatio & signa ex eadem	416.d
Pituitosi in ediam facilius ferunt	383.a	Podagrae medela	299.b
Planta spiritum habet	39.f	Podagrici morbi	397.c
Pleiades	88.d.310.b	Pœna quæ malis medicis irrogatur	3.c
Pleiadum occasus	339.b.e. 340.c	Polenta ex ordeo	201.c
Pleiadum ortus	118.d	Polenta recentes	111.b
Pleiadum occasus Ibidem.	b	Polypus cum curatione	161. b c d e f.193.e
Plenitudinis signa	120.d. 121.a	Poma	113.f.118.e
Plenitudinis curatio	120.d e. 121.b c f.122.b 125.e	Porcina carnis vires	394.a
Pleuritis quæ fiat	152.b c	Porrum	113.b.202.a
Pleuritis quando enecat	159.f	Portulaca	113.d
Pleuritis ex dorso eiusque curatio	177.c d e	Positio partis vulnerata qualis	452.f
Pleuritis sanguinea & eius curatio	178.b	Postrema in morbis qualia	314.b
Pleuritis sicca, & eius curatio	77.f.78.a	Post canem febres quales	351.f
Pleuritis & eius curatio	163. b c d.177.a.193.f	Post purgationem exhibenda	199.f
Pleuritides sicca & biliosa	177.b	Post partum quæ eueniant	256.c d
πλερίωμα.	150.a	Potestas mala res	539.b
Plus quiescendum quam laborandum hyeme		Potio ad fluxum rubrum	293.c
		Potio ad omnes morbos ab vteris ortos	Ibidem.d
		Potio ad fluxum album	295.a

295.2
 Potiones mensium & secundarum purgatoriarum 271.f.
 272.a
 Potiones refrigerantes in febre ardenti 119.c d e f
 Potiones in promptu habenda. 20.c
 Potus via 66.d
 Potus in pulmonem non devenit 191.b
 Potissimum in fracturis curandis 464.a. 462.e.
 463.b
 Prandium 115.f
 Praecautio ad convulsionem 30.e
 Praecisa, quae non coalescant 146.c
 Praecognitio & cognitio quid 120.c
 Praecordiorum inflammatio nes unde 388.c
 Praecordiorum dolor 410.b
 Praecordiorum tumores 397.b
 Praecordiorum notae 402. c d
 Praedicendum nihil quando 414.b
 Praedicendum quid sit medico 413.c
 Praedicendum prudenter 413.e
 Praedictio ex haemorrhoidibus Ibidem.d
 Praedictionis modi qui derideantur Ibidem.a
 Praedictiones ex potu & cibo immodico 414.a c
 Praedictiones exemplis confirmantur 413.d
 Praedictiones ex stercore 415.a b
 Praedictiones ex lippitudinis signis 419.e
 Praegnans non vtens coitu, facilius parit 54.e
 Praegnans unde moriatur 228.a
 Praegnans qui cognoscatur 240.c
 Praegnans cur sit pallida 252.e
 Praegnantis lienosae affectus Ibidem.b
 Praegnantis varia signa 302.e d. 54.f. 55.c
 Praegnantis foetum menstruum gestantis curatio 229.c d
 Praegnantibus quando purganda 512.d. 515.c d. 516.a b
 Praegnantium morbi 250.e f. 251.c
 Praegnantibus terram vel carbores edentibus quid eueniat 54.f. 55.a
 Praemium medico constituendum 21.f. 22.a
 Praenotio futurorum qui pareretur 83.d e
 Praesagia bona & mala ex insomniis 125.e
 Praesagia ex temporum qualitate 87.e f. 88.a b c
 Primiparae magis in partu laborant 43.d
 Primus dies in agro obseruand

- uandus 390.e
 Principium alimenti 129.e
 Principium sanationis cur
 nullum 146.d
 Principia artis supponenda
 44.b
 Priores artis medicæ taxan-
 tur 8.d
 Procreatio diuersa 104.f
 Priuatorum hominū victus
 ratio in hyeme, vere, æsta-
 te, & autumno 29.c.d.e
 Productionis & exacerbatio-
 nis morbi causæ 336.f
 Profluuium alui diuturnum
 398.e
 Profluuium alui 30.f. 97.d
 Profluuium alui & vomitus
 quibus conferat 508.d
 Profluuij alui ex partu cura-
 tio 270.a
 Prominentiæ capitis priore
 parte 444.c
 Proprium medicæ artis 8.b
 Prospicienda medico 83.b
 Prudens natura quātum pos-
 sit 31.d.e
 Prudentis viri consideratio
 31.c
 Ptisana 179.e
 Ptisana integra 179.f
 Ptisana quando exhibenda
 380.c
 Ptisanæ laus Ibidem.b
 Ptisanæ succus 176.f
 Ptisanæ conficiendæ ratio
 380.e
 Ptisanæ incommoda 380.f
 Pubertatis causæ 38.c
 Pudendi puerperæ obturati
 causæ & signa 255.e
 Pudendi exulcerati curatio
 238.b.f. 239.b. 240.c
 Puellæ cur tardius confor-
 mentur 37.f
 Puellæ à pueris qui diffe-
 rant 50.f
 Puer à mulo percussus 349.e
 Puer in caput prius naturali-
 ter procedit 42.c. 43.d
 Pueri cur semen non emit-
 tant 32.b
 Pueri situs in vtero 41.f
 Pueri quid peculiare à natu-
 ra habeant 50.f
 Pueri liuidi ac mortui expul-
 sio 268.f
 Pueri natura 327.d
 Pueri carnosi minus lactis su-
 gunt 59.d
 Pueri fugentes simul & me-
 ientes Ibidem.e
 Pueri modò parui, modò ma-
 gni nascuntur 31.f. 34.a
 Pueri cur mutilati nascantur
 34.a
 Pueri sani & integri fere sem-
 per ex mutilis nascuntur
 Ibidem.b
 Puerorum hydropicorum cu-
 ratio 77.f
 Puerpera gemellarum Cy-
 zicena mortua 337.b
 Puerperæ plus satis purgata
 signa 255.b.e
 Puerperæ recens enixæ cu-
 ratio 58.b.e
 Puerperæ diuersa purgatio
 267.a

Index.

- 267.a
Puerperæ Cyzicenzæ histo-
ria 337.b
Puerperæ in Thaso decum-
bentis historia 334.b
Puerperæ in quæ mala facilè
incidant 242.e f
Puerperæ non purgatæ cura-
tio 254.c d
Puerperæ non satis purgatæ
affectus 254.f
Puerperæ à secunda non libe-
ratæ curatio 256.c
Puerperæ cum non bene pur-
gantur periculum 37.d
Puerperij purgationis men-
sura & color 261.e
Puerperij purgationes. 266.d
e. 253.e
Puerperij non purgati mala
253.f. 254.c. 255.b
Pulegium 180.b. 113.e
Pulmo. 45.e. 60.d. 129.e
Pulmo cordis calorem mode-
ratur 61.e
Pulmo cor humectat 61.b
Pulmo tumens præ calore
cum curatione 174.a
Pulmo consumitur 64.f
Pulmo cum nihil plenus ex-
purgat, malum 404.c
Pulmo repletus & curatio
168.c
Pulmo ad latus prolapsus
cum curatione 168.d
Pulmonis arteria exulcerata
venæ rupta 203.a b
Pulmonis morbus & cura-
tio 166.d
Pulmonis suppurati signa
176.c
Pulmonis inflammatio 205.
c d
Pulmonis hydrops & eius cu-
ratio 169.a
Pulmonis & arteriarum di-
uersitas 151.a
Pulmonis tuberculum 149.a
Pulmonis tuberculum qui sa-
netur Ibidem b c
Pulmonis erysipelas, eiusque
curatio 205.f
Pulsus venarum 327.f
Pulsus & respiratio, signa sa-
nitatis & morbi 130.c
Pulsus circa tempora 96.c
Pura omnia à deo dari quare
per somnū videntur 126.e
Purgatio puerperæ in caput
progressa quid efficiat
255.e
Purgatio in faciem progres-
sa Ibidem.f
Purgatio qua parte ducen-
da 509.d
Purgatio sursum aut deor-
sum quando fiat 512.f
Purgatio ventris quibus vlce-
ribus proffit 499.e
Purgationem quid precede-
re oporteat 502.f
Purgationes quot diebus
fiant 37.f
Purgationes menstruæ mul-
tæ unde fiant 245.d
Purgationes diuersæ 271.f
Purgationes quomodo æsti-
manda 509.d e
Purg

Index.

- Purgatorium molle aquam**
 & pituitam ducens 242.c
Purgatorium ad multa
 271.c d
Purgatorium molliens 241.e
 242.c
Purgatorium tepidum 242.f
Pus è pectore sectione vel
 vstione educitur 204.f
Pus collectum quid faciat
 76.c
Pus qui fiat 499.a
Pus ex tumore interiore qui
 educatur. 164.e
Pus vlceris alimentum 130.d
Pus optimum quale 402.f
Puris emissio 206.f
Pustulæ ex lassitudinibus
 340.f
Pustulæ totius corporis vnde
 227.f
Pustulæ latæ 355.e
Pythicum templum 535.d
Pythionis ægri historia 328.
 d e 334.d
- Q
- Q**ua cura Hippocrates
 Græciam à pestilen-
 tia liberauit 1.e
Quæ aduersa vel secūda for-
 tuna fiant 82.a
Quæ agrè ac facilè pariant
 53.d
Quæ congelent 115.f
Quæ attenuētur & colliquē-
 tur in hydropico 192.a
Quædam citius, quædam po-
 sterius pariunt 43.e
Quædam opifici, quædam o-
 peribus imputanda 6.d
Quæ ex terra gignūtur quo-
 modo crescant 39.d
Quæ ex rupe ceciderat sup-
 stes mansit 350.e
Quæ generātur & pereunt,
 commiscuntur & discer-
 nuntur 100.f. 101. a b c
Quæ foetum expellant
 267.e.f
Quæ foetum perdere cona-
 batur, mortua est 359.e
Quæ mulieres facilius sup-
 pressos menses ferant
 242.f
Quæ præstare debeat medi-
 cus 2.f
Quæ prius conformentur
 51.f
Quæ prospicienda medico
 12.b. 15.a
Quæ recidiuas faciant 320.e
Quæ sint morborum princi-
 pia 180.d
Quæ sint in natura hominis
 24.f
Quæ superfœtant 53.e
Quæ vulnera poscant 17.a
Qualis panis & maza 12.d
Qualitates fortissimæ 12.e
Quando in partu matres fœ-
 tūve pereunt 43.d
Quanto tempore brachium
 fractum coalescat 457.c
Quantum ab omnibus cole-
 retur Hippocrates 1.e f
Quare nōnulli ab aliis diffe-
 rant

Index.

- rant 90.d
 Quare hoc calidū, illud contra putatur 12.f
 Quare morborum calor nō statim cessat 13.d
 Quartana quo tempore, & qua ætate grassetur 28.f
 Quartana à quibus immunes præstet 352.b
 Quartanæ longæ, & breues quæ 510.b
 Quartanæ diurnæ 355.d
 Quartanæ erroneæ 311.d
 Quartanas diurnas potio soluens 532.d
 Quatenus medicina vituperetur 4.f
 Quatuor paria nervorum 27.d
 Quibus diis supplicaretur 126.f
 Qui calor, & frigus cōcipiatur 13.b
 Qui causas morborū probe nouit, potest cōmoda adferre remedia 94.c
 Qui cito moriantur 409.e
 Quicquid fit, finis alicuius gratia fit 5.d
 Quid patiantur, diu à cibis abstinentes 11.d
 Quid per niues gelūque iter facientibus accidat 13.c
 Quid spectarint primi medicinæ inuentores 12.b.c
 Quid primum obseruet medicus 16.e. 20.a b d. 21.f
 Quid oporteat medicos scire 14.d
 Quid sit homo & quomodo gignatur sciat medicus 14.e
 Quies quibus conducatur 31.b
 Qui ex ægris perirent in magna morborum multitudine 314.e
 Qui humores singulis anni tēporibus augeſcant 26.a
 Quis error in ægris 10.e
 Qui probè augeantur 52.d
 Qui sani diutius perseuerēt 105.f
 Qui sine medicis à morbis conualeſcunt aliqua re ſanantur 5.b
 Quòd diutius quàm decem menſibus non contingat vterum gestare 42.e
 Quo gestu inuiſendus ſit æger. 16.d
 Quomodo omnia gignantur 24.e
 Quo pacto ſua quiſque ſons facultate trahat 183.c
 Quo plus cibi ſumpſimus eo plus expetimus 183.d
 Quota inedia 48.b
 Quota oſſium coaleſcentia 130.b
 Quot morbos ex vteris fieri contingat 284.e
 Quoto tēpore pedis oſſa fracta ſaneſcant 457.f
 Quum partus non ritè prodiit, quid agendum 262.e
 Quum plus iuſto comeditur quid agendum 202.d
 Radix

Index.

R

Radix humanorū mor-
borum caput 534.b
Raphanus 113.c
Rapum 113.e
Ratio cur de humano victu
scribat 99.c
Ratiocinatio 21.c
Recidiua quid portendat
427.2
Recidiuarum causa 509.f
Recte & non recte quæ fiant
145. c d e
Regij morbi quatuor cū si-
gnis & curationibus 216.e
217. a b f
Regio sterilis quales gignat
93.d
Regio montosa quales pro-
ferat 93.e
Regio alta quales producat
93.d
Regio pinguis quos gignat
93.e
Regiones insalubres 109.f
Regionum situs & natura
105.e f
Regionum inter se differen-
tiæ 89.b
Reiicitur à schola Hippocra-
tes falsa secta imbutus 23.f
Relicta post iudicationem
reciduias facere solent
324.f. 325.c
Remedia singulis exhiben-
da 78.c
Remedia secundas ac men-
ses educunt 230.c d. 231.
232. 233. 234

Remedia solū disciplina ac
natura inueniuntur 6.c
Remedium quibus tāquam
desperatis nullū adhibea-
tur 277.f
Renes 45.f. 60.c. 66.d
Renum affectus quibus sa-
nentur 361.b
Renum morbi quatuor 208.
e. 209. a b c
Repletionis mala 121.b
Repositio per scalam 470.f
Repositio optima 460.f
471.e
Responsio aduersus eos qui
mortuos medicis assignāt
5.e
Rigor lethalis 511.e
Rigor in morbis vnde 151.
d e
Rigoris causa 188.f
Rigoris ex partu aut abortu
curatio 238.c
Rigores vnde incipiant 356.
e. 325.c
Riphaei montes 91.a
Robur ac carnem producen-
tia 200.f
Robusti ex robustis cur non
generentur 3.e
Rumex 113.d
Ruptiones qui fiant 149.e f
Ruptura 79.f
Ruta 113.d

S

Sacer morbus 84.d e
Sacer morbus qui fiat
97.c e

Index.

- 97.c e
 Sacer morbus pituitosis acci-
 dit 138.f.139.c
 Sacer morb' cur nō diuinus
 sit. 138.a
 Sagitta percussus præter om-
 nem opinionem sanatus
 350.b
 Salaminus anchora vulnera-
 tus 349.e
 Salua suppressa & curatio
 159.f.160.a
 Salua 113.d
 Salutis & mortis causa
 185.f.198.b
 Sanguis in somno intro ma-
 gis fugit 358.f
 Sanguis ex naribus fluēs qui-
 bus proficit 359.d
 Sanguis albus ex glandulis
 erumpit 62.f
 Sanguis cur circa nervos cō-
 pingatur 245.c
 Sanguis quomodo mittendus
 394.f
 Sanguis coagulatur 45.f
 Sanguis diutius in vtero re-
 tentus totum corpus affi-
 cit 36.b
 Sanguis prudentiam iuuat
 97.d
 Sanguis putris in pus conuer-
 titur 96.f
 Sanguis calidus natura non
 est 62.e
 Sanguis quomodo sistatur
 158.f
 Sanguis serosus in quibus fiat
 356.a
 Sanguis ex naribus quibus
 erumpat, & pueris quādo
 incipiat 356.f
 Sanguinis fluxio in vlceri-
 bus quid faciat 499.b
 Sanguinis effectus & vis
 97.e f
 Sanguinis & aliorum humo-
 rum varietas 129.f.130.b
 Sanguinis vomitus causa &
 curatio 270.a
 Sanguinis venarum suppress-
 siones quæ faciant 360.d e
 Sanguinis eruptionis malæ
 quæ 411.c d e
 Sanguinem ex partu vomen-
 tis curatio 237.d
 Sanguinem ex vteris fluen-
 tem sistentia 293.e
 Sanguinem ex naribus sisten-
 tia 293.e
 Sanitas quæ contingat 184.a
 Sanitas & mors vnde contin-
 gant 50.c
 Sanitatis exercitatio qualis
 358.a
 Sanitatis & mortis causa
 cui attribuatur 530.c.531.e
 Sanitati qui restituantur &
 qui non 422.d
 Sanitati conducentia 200.f
 Sanus quis 24.f
 Sapa 113.a
 Saperda 215.d
 Sapientia qualis describen-
 da 19.e f
 Sapientia author aer 142.e
 Sapientia & desipientia caus-
 æ & signa 106.f
 Sapien

- Sapientissima anima & me-
 moria valentissima prædi-
 ta 107.a
 Sapientum victus & exerci-
 tatio 107.b
 Sata quomodo nascantur 39.c
 Satyrus pollutione mortuus
 est 362.c
 Sauromatae 90.d
 Sauciati signa 447.a
 Scapulæ 66.b.72.f
 Scythia 15.b
 Scientia facile ac feliciter di-
 scitur 81.f
 Scientiæ votum ac opus 4.b
 Scientiæ & opinionis diffe-
 rentia 3.f
 Scretio phrenetici 408.b
 Scripturo de humano victu
 necessaria 99.e f
 Scymnus 315.a
 Scytharum gens fulua 91.e
 Scythia gens infœcunda
 91.a
 Scythicum hominum genus
 90.d
 Scythæ Nomades qui viuant
 90.f
 Scytharum ditissimi potius
 quàm pauperes steriles
 cur efficiantur 92.c
 Scythæ minimè ad coitum
 valentes 92.e
 Scythiæ mulieres vnde steri-
 les 91.f
 Scythæ Eunuchi muliebria
 officia subeunt 92.a
 Secretio morbi causa 120.f
 Sectio 17.b
 Secundam quæ educant 267.
 b.268.a b.515.f.54.a
 Secundæ relictæ causa
 256.e f.
 Secundarum hærentium ex-
 pulsio 237.f.239.a c
 edes teli quid, & eius spe-
 cies 445.f
 Sedis procidentia 420.c
 Sedis procidentis varia cura
 tio 505.a b
 Sedis ex partu laborantis cu-
 ratio 257.b.270.a
 Segnitie 115.e
 Semel cibum sumere in die
 quos & quando oporteat
 30.f
 Semel cibum capere quando
 conducatur 123.f
 Semen lini 179.a
 Semen cur spumescat 31.e
 Semen fauo simile 66.d
 Semē in vtero cum perman-
 ferit quid agat 34.e.35.b
 Semen masculum & fœmi-
 neum in vitroq; inesse 33.a
 Semē in pellicula tanquam
 ouum continetur 35.d
 Semen genitale ab omnibus
 corporis partibus proce-
 dit 89.d
 Seminis, quod in vtero sex
 dies extiterat, forma 35.c d
 Seminis genitalis varietas di-
 uersas efficit formas 92.f
 Seminis in vtero putrescētis
 curatio. 249.b
 Seminis statim post coitum
 fluentis

Index.

fluentis causa & curatio 248.f	Siccum corpus citius humi- do agrotat & dolet 71.b
Seminis clandestinus fluxus 166.c	Sideratio 64.d
Semina ubi non nascantur 63.c	Sideratus morbus vel homo 155.e.159.d
Semina & plantæ cur contra riam habeant germinatio nem 40.a	Signa ab Erysipellate 406.f
Senes paucis fomitibus opus habent 505.c	Signa agrotantis 129.c
Seniores & iuniores à quib⁹ suppurationib⁹ magis mo- riantur 405.f	Signa bene curati & deligati 455.e.f
Seniorum & iuniorum affe- ctiones 150.f	Signa bonæ fidei 404.d.
Senum victus ratio 29.f	& malæ e.
Senum morbus & curatio 159.a	Signa breui morituri 397.f
Sensus maximus circa thora- cem 70.e	Signa ex angina 433.d.e
Sensus humanus septem figu- ris contingit 104.a	Signa ex colore 421.f
Sententiæ variæ de hominis natura 24.a	Signa ex conuulsione 514.e
Septenarij annorum in cor- poribus prævalent 51.b	Signa ex decubitu 428.d.e
Septimestres cur edantur 49.a	Signa ex distentione & sudo- re 433.d.440.f
Septimestres cur pauci super- stites maneat 49.b	Signa ex doloribus circa ar- ticulos 423.b
Septimestres alij plus, alij minus afficiuntur 49.b	Signa ex hæmorrhoidæ & cõ- uulsione 433.b.c
Septum transversum 60.f	Signa ex hydropæ 437.a
Sermonis facultas 47.e	Signa ex lienteria 420.a
Siccantia alimenta 200.a	ei⁹que curatio. b
Siccitates multæ post fauo- nium 353.b	Signa ex liguâ 408.b.429.e
	Signa ex lippitudine 418.f
	Signa ex morbis acutis 427. b.c
	Signa ex oculis 409.b
	Signa ex pallore 422.a
	Signa ex perfrigeratione 423.f
	Signa ex pleuritide 434.a
	Signa ex pupillarum colore 419.d
	Signa ex sanguinis mictione 415.c
	Signa ex soporosis affectio- nibus

E E

Index.

nibus	428.a.b.c	Silphium vbi nascatur	181.b
Signa ex spiritu	430.d	Similago	111.a
Signa ex splene sano	422.c	Similitudo genituræ obser-	
Signa ex sputis varia	344.f	uanda	36.f
Signa ex tabe	436.e.	Similitudinem iuuantia	
Signa ex timore & tristitia		51.d	
line causa	433.f	Simulatores & deceptores	
ex ignorantia & obliuio-		104.b	
ne	Ibid.f	Sinapi	113.c
ex rigoribus soporosis		Singula naturam suam con-	
Ibidem f	424.a.b	seruant	81.c
ex horroribus	424.a.b	Singultus quando malus	
ex vrina suppressa	Ibi-	408.e	
dem.c		Singultus curatio	391.f
Signa ex variis capitis dolo-		Si re vna homo cōstaret nun-	
ribus	427.d.e.428.a	quam doleret	24.c
Signa ex variis affectibus,		Sitis quando mala	409.c
maximè febribus & phre-		Smegma	261.d
nitide	424.d.425.426.	Sol	115.c
Signa ex voce	409.b	Sol fructus coquit	39.f
Signa ex vomitu	440.d	Sol, luna, cœlū, ac stellæ per	
Signa ex vrinis	397.c.d	insomnium visæ quid si-	
514.c		gnificent	125.d
Signa ex vrina crassa	415.e	Sol pati visus per somnum	
Signa inherendum telorum		quid significet	125.f
in corpore	18.d	Solanum	113.d
Signa maris & fœminæ in		Solstitium æstiuum	118.f
utero	302.d	Solstitium brumale	311.c.
Signa mortis & vitæ	318.b	315.a.338.d.118.b	
165.b		Solum mutare in lōgis mor-	
Signa obseruanda	129.d	bis, bonum	318.c
Signa suppuratorum & tabi-		Somnia diligenter obseruan-	
dorum	416.c	da	125.b
Signum venularum cerebri		Somnia veneris quibus fiant	
superuomentium	155.a	31.f.22.a	
Sileni ægri historia	313.c.d	Somniare vestes & calceamē-	
314.f.316.f		ta	127.d
Silentium in febribus perni-		Somniantium curatio	127.d
ciosum	409.c	Somniare mortuos quid sit	
		127.c	

Index.

- 127.e
 Sōnij Hippocratis interpre-
 tatio 525.a
 Somniorum diuersorum cō-
 sideratio & curatio 128.a.b
 Somniorum diuersorum ob-
 seruatio 126.a
 Somnus 115.e
 Somnus frigefacit 97.d
 Somnus hydropici qualis
 403.b
 Somnus interdiu vitādus ple-
 thorico 120.d
 Somnus quando est medela
 358.2
 Sonitus aurium vnde 139.d
 358.a
 Sopor vbi malus 409.d
 Soranus Cous 1.c
 Sorba 114.a
 Sorbitio in vasis pulmonis
 ruptis 204.a
 Sorbitiones 399.e
 Sorbitiones validæ 200.c
 Sorbitionibus quando vten-
 dum 385.a
 Sordes aurium quid porten-
 dant 358.e
 Spasmi solutio 398.f.400.a
 Species fortunæ nuda 5.a
 Specillum quale 56.c
 Spectanda in vulnerato capi-
 te 446.b.449.b
 Spina 65.d
 Spina gibbosa 481.d
 Spinæ natura pernoscentia
 482.c
 Spinæ obliquatæ curatio
 483.c.d
 Spiritus densus quid signifi-
 cet 402.a
 Spiritus omnia inter cœlum
 & terram replet 94.f
 Spiritus semper adducitur
 vel exhalat 95.b
 Spiritus varietas 355.b
 Spiritus vocem edit 47.f
 Spiritus vsus quàm sit neces-
 sarius 95.a
 Splen 45.f.60.f
 Splen turgidus 77.d
 Splen tumefactus quid effi-
 ciat 182.d
 Splenis morbi quinque, eo-
 rumque curationes 215.
 216.a
 Splenis natura 259.a
 Splenis vehementer dolentis
 curatio 278.c
 Splenis curatio 77.e
 Splenem attenuantia 215.e
 Spleniorum delectus 452.c
 Spleniorum numerus 464.c
 Splendidi viri quî generen-
 tur 105.a
 Spongiformes, lien, pulmo,
 & mammæ 15.d
 Sponte sua quæ in morbis
 fiunt, tum bona, tum mala
 145.e
 Sputi consideratio 404.b
 Sputi cruenti impedimen-
 tum 357.c
 Sputum in pleuriticis, & pe-
 ripneumonicis quale
 434.d
 Sputum liuidum à sanguine
 Ibidem.e
 EE 2 Spura

Index.

Sputa quæ mala	404.c	397.c.e	
Sputa rotunda quid agant		Sudor multus quando malus	
359.d		409.c	
Sputum subcruentum & liui		Sudoris caussa	151.f
dum	153.d	Sudores	115.c
Statuarij	103.f	Sudores in febribus	513.c
Stercus quî fiat	46.e	Sudores in diebus iudicato-	
Stercus omnium quale esse		riis	519.f
debeat	415.a	Sudores qui excitentur	96.b
Steriles vnde fiant	242.f	Sudores qui boni	396.b.&
Sterilitatis naturalis caussa		contra	402.b
301.e		Suffitus varij ad fluxus	294.c
Sterilitatis fluentibus etiam		Suffimentum vteri	292.c
menstruis curatio	238.d	Suffocationis ab vtero cauf-	
Stomachus	60.f	sa	246.a
Stomachus vteri	302.e	Suffocationis ab vtero cura-	
Stomachus os vuluæ	53.d	tio	229.f.278.e.395.
<i>stomach</i>	61.f	b.c.295.f.296.a.239.c.252.	
Strangulationis ab vtero co-		c.257.e	
gnitio	395.f	Suffocationis curatio	214.c
Stranguria.	156.c.311.d	Suillæ carnis facultas	394.a
Stranguria quare inflamma-		Sulphij facultas	393.f
tis intestinis succedat		Superfœtationes quomodo	
504.f		fiant	105.e
Stranguriæ solutio	318.a.	Supercilia	72.e
238.b.297.e.298.d		Superstites ex suppuratis &	
Stranguriæ signa & curatio		contra	405.c
ex forbitionibus, potioni-		Superstites post partum	50.a
bus & victus ratione	273.	Superuenientia quomodo vi-	
f.274.a.b		ribus adæquentur	188.a
Strumæ quos corripiât	417.b	Suppurati	74.b.75.f
Succi dulcioris sunt quæ iux		Suppuratus à vulnere	150.b
ta aquas nascuntur	525.d	Suppurationis caussæ	147.d.
Succorum facultates	128.f	150.d	
Succorum seu saporum con-		Suppurationis curatio	355.d
fideratio	16.a	Suppurationes diuersæ	
Sudor sani	397.f	404.d	
Sudor decretorius	397.a	Suppurationis principiū con-	
Sudor frigidus pefsimus		fiderandum	404.f
		Suppu	

Index.

- Suppurationis signa 76.c 165.e
 435.c
 Suppurati pulmonis signa 146.e.f
 Suppuratorū remedia 76.f
 Suppuratorum signa 405.a
 Suppurati vteri causa & auxilium 55.f
 Suppuratus venter superior quot modis fiat 147.e.f. 148.a.b
 Surditas in quibus malum 408.f
 Surditatis curatio 373.b
 Surditatis mala 429.a
 Sutor subula læsus perit 350.a
 Sutura capitis longior & breuior 444.c
 Sutura capitis H. literæ similes 444.d
 Sutura capitis diuersæ 444.b.72.e
 Sutura x. literæ similes 444.d
 Syderatus eiusque curatio 173.c.359.f
 Syderationes repentinæ malæ 409.f
 Syluestria omnia prius fuerunt 181.c
- T
- T** Abes 74.b.76.a.b. 64.e
 Tabes sicca 69.c
 Tabes spinea & eius signa 76.d. & curatio. 77.d
- Tabes mulierum 416.b
 Tabes dorsalis, & eius curatio 166.b.c
 Tabes erronea 311.a
 Tabes grauissima 333.c
 Tabis tres species 206.f
 Tabis triplicis causæ & curationes 207.a.b.c
 Tabis curatio in secundo, tertio ac quarto mense 208.a.b
 Tabidi à quibus male habeant 361.a
 Tabidi quo tempore moriantur 416.b
 Tabidorum bona signa 416.a
 Tabidorum forma 333.e
 Tabidorum curatio 77.a
 Ταχὺτροία 69.c
 Taxantur qui de ciborum facultate iudicauerant 110.a
 Thasæ mulieris morbosæ historia 336.c
 Telebuli agri historia 313.e
 Telorum varietas 446.f
 Temeni neptis mors 321.a
 Temeton bonum non est 14.f
 Temperaturæ diuersæ 199.e
 Templum Herculis 334.
 Templum Apollinis 536.e
 Tempus quid 21.c
 Tempus calidius quibus vulneribus profit 499.d
 Tempus concubitus 249.e.f
 Tempus coaugmentationis in vtero 37.a
- EE 3 Tem

Index.

Temporis in sex partes diuifio	118.c	tur, expelluntur	184.b
Temporis autores, fol & luna	51.e	Tetani mala. 398.a. & species	399.f
Temporum & hominum varietas	89.c. 310.b	Tetani tres eorumque curatio	223.e f. 175.b
Tempora cur periculosa	444.f	Tetanus lumborum	392.e
Temporū dolores quid portentant	422.b	Thasij morbi	310.b. 311.b
Temporum varietas quos producat	93.d	Theatrum Epigenis	314.e
Terebella aqua frigida ſæpe intingenda.	450.a	Theſſalus Dracōque Hippocratis filij	2.c
Terra æſtate rara & leuis	40.e	Thymbra	113.e
Terra qualis	102.c	Thymum	113.e
Terra omnem habet humorem	39.c	Tibia	73.c
Terræ qualitas	83.d	Tibiæ oſis luxati curatio	492.a b. 459.a
Terræ facultates infinitæ	181.c	Tibiæ oſis vtriuſque fracti curatio	459.f
Terræ vires	180.c	Tibiæ oſſa duo.	458.f
Terre motus circa ſolſtitium hybernū	340.e	Tibiæ oſſa quanto tempore coaleſcant	460.f
Terræ inferiora cur hyeme calida, æſtate frigida ſint	40.b	Timiditas & virilitas vnde	93.a
Terræ motus vel domus in ſomnis quid ſignificet	127.c	Tineſmus	197.e
Terræ inundationem ſomniare quid velit	127.c	Tinnitus aurium qualis	408.d
Terram nigram ſomniare quid præſignet	127.c	Tritici facultas	110.e
Terroris ac timoris cauſſa	142.c	Tonſillarū vlcera	59.f. 60.a b
Tertianæ naturales	355.d	Tonſillæ ac vicinæ partes	156.a b. 160.f. 63.e
Tertio quoq; die quæ ſumuntur, expelluntur	184.b	Torpori pruriginoso quid proſit	421.e f
		Toſta vel aſſata.	114.d
		Tremorem crurum ac pallorem quæ faciant	135.b
		Tremuli & gibboſi vnde	139.e
		Tres morborum obſervationes	399.b c
		Triduo excernenda ſunt excrementa	184.c
		Trifolium	180.a
		Trip	

Index.

Triplicia nutrimenta omnium	na	359.f	
animantium corpora sustentant	94.e	Tusses hyeme flantibus a-	
Trichiasis curatio	395.c	strinis	352.c
Trygis, id est Tragus	111.b	Tussicula aurium abscessus	
Tuberculum ventris ab igna		mollit	411.e
ris male sectum	244.c	Tussientes ex manuum agi-	
Tuberculum sub lingua, vel		tatione	344.c
hypoglossis	161.a	Typhi morbi causa	219.c.d
Tuberculum lateris	206.c	Typhi color qui leniatur	
Tuberculum in pulmone &		218.c	
eius curatio	168.a		
Tubercula bona & mala	354.	V	
d.198.f		Vacuacionis faciendae si-	
Tubercula circa aures, qui-		gnum	509.f
bus fierent	310.c.313.d.314	Valetudinis signa	390.f
d.315.a.340.d.357.d.363.f		Validis eduliis alij facile vtū	
Tuberculorum in pulmone		tur, alij laeduntur	9.d
suppuratio & curatio	212.b	Varietas rerum in Asia	88.f
Tumor narium	74.d	Variae sententiae de sumendis	
Tumoris circa poplitem aut		cibis	11.a
aliā partem curatio	461.f	Variorum affectuum enume	
Tumoris causa	187.c	ratio	372.b
Tumoris interioris signa &		Varix testium quid possit	326.e
curatio	164.d	Varix interior	147.c.d
Tumores ad articulos	354.d	Varicis curatio	147.d
Tumores quid portendant		Varices tibiae	503.a
355.a		Velocitas & tarditas ubi ad-	
Tumores praeter naturā ele-		hibenda est	17.b.c
uati prauum	325.f	Vena iecoralis	139.a.152
Tussis cum febre	312.a.b	f.62.a	
Tussis pueri qui discutiatur		Vena splenica	139.b.152.e
298.f		Vena heruosa	69.d
Tussis sedatio, testium tumor		Vena humeralis	68.f
& contra	320.f	Vena mammaris	68.f
Tussis varietas	360.a	Vena principalis	69.a
Tussis siccae curatio	327.a	Vena ex sinistris partibus	
355.d.361.a		70.d	
Tusses circa solstitia hyber-		Vena conuulsa percalefcit	
		150.a	
		Vena magna	60.e
		EE 4	Vena

Index.

Vena cordis	67.a	Venarum varij colores	357.b
Vena pulmonem occupans	69.c	Venarum descensus	67.d
Venæ costarum	66.f	Venarum in fœminis distributio	69.e
Venæ sinum cordis sinistrū perflant,arteria verò alterum	62.a	Venarum temporum consideratio	355.c
Venæ sinistrae morbus & curatio	210.d	Venulæ & arteriæ totius corporis	45.c
Venæ iugulares	182.e.183.e	Venulæ oculorum	71.e
Venæ crassæ	67.c.d.139.a	Venulæ in osse	444.e
Venæ in spinam insertæ	69.c	Venter humidus	102.b
Venæ capitis quadripartitæ	68.e.71.f	Venter	60.f
Venæ in lignum insertæ	68.e	Ventris morbi	312.c
Venæ à ventre	67.f	Ventris tubercula	397.b
Venæ sectio	Ibidem		402.e
Venæ hepatis & aliarum distributio	325.f.326.a.b	Ventris obdurati solutio	292.a
Venæ & arteriæ pulmonis ruptæ curatio	203.c.204.b	Ventris quotidiana purgatio quâ fiat	207.f
Venæ ruptæ signa	147.b	Ventris diuersitas	202.e
Venæ rhenum	66.f	Ventris combusti curatio	214.f
Venæ post aures sectæ sterilitatem inferunt	92.b	Ventrem superiorem nō mouendum	279.a
Venæ iuxta aures incisæ procreationem tollunt	32.b	Ventrem infernum non turbandum	280.c
Venæ plures supra sunt quàm infra	73.f	Ventrem ac vrinam subducentia	199.c
Venarum distributio	27.f	Ventrem perturbantia	21.c
Venarum natura	ibidem.d	Ventres quando calidiores	509.c
Venarum multarum & nervorum actio	7.a	Ventres humidi quando deficcantur,& contra	510.a
Venarum ex omnibus corporis partibus in pudendum concursus	31.e	Ventriculus infernus quâ suppurecat	148.d
Venarum distributio.	67.a	Ventriculus animalibus,quæ terra plantis præstat.	135.c
	68.a.69.f.70.a.b.c.72.a.b	Ventriculi qualitas	Ibidem
Venarū quatuor paria	67.d	Ventriculi corporis sunt plures	

res	6.f	529.d	
Ventriculi cum hydria colla		Vertebrae	46.c
rio	135.c	Vertigo vnde	155.a
Ventris finitio & vis	94.f	Verticula spinæ	480.f
Ventri qui viles & qui inuti			481.a
les	109.e	Verticula obliquata	484.e
Venti ab vrsis Riphæis perpe		Vesica	44.e.60.e.15.d
tui	91.b	Vesicæ signa	406.a
Venti mediterranei sicci		Verita à magis	137.d e
109.f		Via qua medico procedendū	
Venti montani insalubres		fit	21.d
Ibidem		Victus humidus quibus con-	
Ventorum natura & facultas		ferat	509.e
109.b.511.b		Victus simplex securior ad sa-	
Ventorum cum animalibus		nitatem	381.d
similitudo	109.c	Victus ab æquinoctio ad hye-	
Ventorum qualitas	83.b	mem	120.a
135.f		Victus hyemalis	18.d e
Ventorum cæterarūque re-		Victus ratio in fracturis &	
rum necessaria obseruatio		vlceribus	456.e 457.d
135.f.136.a		Victus refocillās vires	260.a
Venus vnde augeatur	39.c	Victus debilis ac robustus	
Veratri purgatio	358.f	quis?	358.a e
Veratrum quibus proſit, &		Victus ratio post potiones	
contra	531.a.532.a b		261.c
Veratrum quando periculo-		Victus ficcus	201.c
sum	512.f	Victus æstatis	118.d e
Veratro purgandi quibus à		Victus hydropici à pituita	
capite fluxio fertur	393.a		211.f
Veritas in arte medica non		Victus ratio conceptum iu-	
semper attingitur	11.e	uans	303.d
Veritatis nullum testimoniū		Victus tenuis quibus impe-	
530.d		randus	508.f
Veris ac æstatis mutata tem-		Victus consuetus etiam si ma-	
peratura	311.c.313.a b	lus fuerit, facilius, & con-	
Vermes stercorarij	55.f	tra	381.c
Versutiæ malorum infinitæ		Victus ratio somniantium.	
529.a			125.e
Versutiarum causa auaritia		Vigilia	115.e

Vigilia immodica	385.b	genitura nec mēstrua sint	
Vigor ætatis	23.d		38.c
Vinum Mendesium	208.e	Viriles & magnanimi leges	
Vinum dulce, austerum	131.b	auerfantur	90.c
Vinum acidum	113.a	Virtutis labor insania iudi-	
Vinum alimentum	129.e	catur	530.e
Vinum Coum	215.d	Visa diuersa quæ sanitatem	
Vinum Thasium	179.f	præsignant	126.f
Vinum Mendæum	210.a d	Visio Hippocratis	524.ef
Vinum quî extenuetur	201	Visus quî hebetetur	154.c
d.202.b		Visus quo alatur	71.e.72.a
Vinum aquosum quas partes		Visus caussa	47.c
iouet	185.d	Vita hominis septē dierum	
Vini albi facultas	385.c	est	47.f.78.b
Vini dulcis facultas	385.b	Vita Hippocratis	1.a
Vini fului vsus	385.c	Vitæ modus	118.c
Vina quæ aluum subducunt		Vlcus cur tardius, aut nun-	
201.a		quam sanescat	150.c
Vina alba aquosa	179.e	Vlcus ferinum	78.e
Vinorum differentiæ & fa-		Vlcus mortiferum	79.b
cultates	112.f	Vlcus vteri cur cito curandū	
Vir in coitu cur maiore volu-		301.d	
ptate afficiatur	32.e	Vlceris cum igni sacro mixti	
Vires singulorū simplicium		purgatio	499.e
quî detrahantur & augeā-		Vlceris in capite curatio	
tur	114.d	447.cd.448.e.449.f	
Virgæ corneæ	464.f	Vlceris in ore curatio	371.c
Virgo lata manu in finciput		Vlceris in vtero & ore eius	
percussa periit	350.d	curatio	273.a
Virginis Larissæ historia		Vlceris pus cum vrina con-	
336.d		fertur	397.a b
Virginis Abderitanę historia		Vlcere in alterutra parte	
335.c		existente, quid patiat	
Virginis à mensstruis dolen-		420.f	
tis curatio	58.a	Vlcere fanato locus qualis	
Virgines cur delyrent	224.d	420.f	
Virgarum numerus & dispo-		Vlcera ac tubercula iudican-	
sitio in fracturis	465.a	tia febres	357.b
Virginibus cur interdū nec		Vlcera capitis vnde	154.d
		Vlcer	

Index

- Vlcerā fame curanda 78.d
 Vlcerā maligna quæ 361.b
 Vlcerā ne inflammētur quid
 agendum 498.f
 Vlcerā pueris vtilia 139.d
 Vlcerā quæ non coeant
 499.e
 Vlcerā secanda quæ 447.e
 Vlcerum curatio 473.e.
 498.e
 Vlcerum in pudendis cura-
 tio 238.d.239.b
 Vlcerum mutilata curatio
 18.c
 Vlcerum pudendi curatio
 272.f.273.b
 Vlcerum quatuor viæ 18.b
 Umbilicus 43.d
 Umbilicus quando non sta-
 tim secandus 54.e
 Umbilicus abruptus, aut re-
 cisus ante tempus 54.c
 Umbilicus trahit secundam
 Ibidem.b
 Umbilici tormina 133.f
 Umbilici vsus 52.e
 Umbra 115.c
 Vnctio Ibidem
 Vngues cur densi. 38.b
 Vngues quando puero de-
 sunt 53.e
 Vnguium generatio 46.c
 Vocis exercitatio 122.e
 Vocis interceptiones 408.e
 Vocis interceptæ causā & cu-
 ratio 388.d
 Vocis labor & cæterorū quid
 ferat 370.a
 Vocis restitutio 327.a
 Vocis maximæ causā
 338.b
 Volsella 18.a
 Volucris ad hominem colla-
 tio 42.b
 Volucrum abundantia quan-
 do 358.b
 Voluptas coeuntium 69.e
 Voluulus arcuatus 220.f
 Voluulus quando desperatus
 176.a
 Voluuli mobi eorūque cu-
 ratio 220.b.c.d.175.e.
 196.e
 Voluulus redit etiā post duos
 annos 220.e
 Voluulus hæmatites 220.f
 Vomitionis causā 153.d
 Vomitionis remediū 299.a
 Vomitionis modus 118.f
 Vomitus 115.d.123.c
 Vomitus bonus quis & con-
 tra 404.b.408.c.
 409.c
 Vomitus præparatio 327.b
 Vomitus quī fiat 210.b
 Vomitus quomodo cietur
 30.c.d
 Vomitus qui prouocet 261.c
 Vomitus sanguinis quibus
 prodest 440.e
 Vomitus ventrem soluit &
 sistit 115.d
 Vrbes aquas falsas habentes
 84.a
 Urbis calidæ situs 83.f
 Urbium situs 83.c.84.c.f.
 85.a.b.c
 Urina magis morbos indi-
 cat

Index.

- cat 8.b
 Vrina delyrium soluēs, qualis 359.d
 Vrina bona quæ 396.c.403.e
 Vrina genitali semini similis 36.a
 Vrina rubra 66.f
 Vrina cruenta 342.b
 Vrina turbata quibus innoxia 411.c
 Vrina multa vnde fiat 154.b
 Vrina copiosior quàm pro potus ingesti ratione 333.a
 Vrina qualis & ex ea signa 415.b
 Vrina crassa vnde fiat 153.c
 Vrinæ diuersitas 28.d
 Vrinæ crudæ 398.b
 Vrinæ interceptio 409.b
 410.f.411.b
 Vrinæ morborum soluentes 397.a
 Vrinæ clandestinæ 408.e
 Vrinæ suppressæ 354.c
 Vrinæ malæ 409.e
 Vrinæ crassæ effectus 136.f
 Vrinarum cognitio 390.d
 Vrinarum varietas 339.c
 Vstio quæ 208.e.205.f.17.b
 Vstionis ferramenta qualia 473.a
 Vfus egregius magister 94.c
 Vterus 15.d
 Vterus ad hepar accedens quid faciat 225.f.296.a
 Vteri à grumo sanguinis affecti curatio 236.c.d.280.d
 Vteri ab vlceribus inflammati 246.f
 Vteri ad cor progressi curatio 238.c.395.d
 Vteri ad caput cōuersi signa ac curatio 237.c
 Vteri ad crura & pedes conuersi curatio 237.c.287.a
 Vteri ad hepar conuersi curatio 279.c.d
 Vteri ad inguina incumben-
 tis curatio 296.b
 Vteri ad latus allapsus curatio 235.e.280.a
 Vteri ad lumbos procedentis
 signa & curatio 258.c.
 280.b.295.e
 Vteri ad præcordia consisten-
 tis curatio 279.b
 Vteri ad sedem conuersi cura-
 tio 237.f.284.f
 Vteri ad ventrem nutantis
 curatio 237.b
 Vteri ad viscera conuersi cura-
 tio 238.f.295.c.e
 Vteri affecti curatio 82.c.d.e
 Vteri affecti causa & signa 373.b
 Vteri commoti & prolapsi
 curatio 236.e.238.f.281.d
 Vteri conclusi curatio 238.f
 280.e.288.e.f.289.d
 Vteri cū prociderint, curatio
 226.a.280.c.286.b.287.a
 296.d.58.b
 Vteri deficcati curatio 230.c
 Vteri dolentis curatio 239.a.
 b.d.290.f.292.e
 Vteri ex partu vlcerati cura-
 tio 256.f.257.f.260.e.
 261.b.d.e.f.262.b
 Vteri


Index.

- Vteri ex partu inflāmati cura-
ratio 257.a b d e. 270.b
- Vteri ex partu dolentis cura-
tio 257.c
- Vteri ex partu ad dextrā con-
uersi curatio 285.b
- Vteri ad sinistram declinan-
tis curatio Ibidem.c
- Vteri transuersi vel obliqui
curatio Ibidem,
- Vteri extra naturā progres-
si causa & curatio Ibidē.
e f
- Vteri vlcerati & foras prola-
psi curatio 286.e. 308.a
- Vteri huc & illuc vagātis cu-
ratio 286.f
- Vteri erysipelas, eiúsque cu-
ratio 227.f. 291.a
- Vteri fixi curatio 230.a
- Vteri gracilis curatio 305.e
- Vteri inflāmati mōrbi peri-
culosi signa ac curatio
227.d. 230.a b. 238.a. 239.a
290.b c
- Vteri inflammati & aliorum
affectuum curatio 279. e f
- Vteri inflati curatio 236.b
238.c. 287.d. 295.e
- Vteri in callū indurati caus-
sæ ac curationes 287.d e
- Vteri in coxam decumbentis
curatio 515.f
- Vteri leuigati curatio 237.a
301.c
- Vteri leuitatis signa 250.b
- Vteri molestiæ 82.b
- Vteri obdurati curatio 235.c.
d. 249.f. 287.d. 288.d
- Vteri obliqui curatio 236.a
- Vteri obtorti curatio 236.d.
248.f. 301.c
- Vteri oris angusti mala 255.b
- Vteri oris obdurati curatio
229.d. 288.e. 305.f
- Vteri oris pinguis curatio
249.a
- Vteri plus æquo aperti cura-
tio 290.a
- Vteri præ duritia non concipi-
entis curatio 241.b
- Vteri præter naturā hiantis
signa & curatio 228.b.
289. e. 236.f. 249.a. 301.e
- Vteri procidentia causa ac
curatio 287.b
- Vteri purgatorium 241.a
- Vteri puerperæ inflati cura-
tio 252.f
- Vteri purgationes 237.e.
239.d. 248.a. 307.d
- Vteri qualitas bona 420.d
- Vteri refrigerati curatio
292.e
- Vteri sani non concipientis
curatio 248.e
- Vteri semen non recipientis
purgatio 292.c
- Vteri semen non cōtinentis,
& eructātis curatio 309.a
- Vteri siccioris & humidioris
curatio 249.c.d
- Vteri transmoti curatio 238.
a. f. 239. a. 284. e. 287. b.
295.f
- Vteri vlcerati signa 254.b.
255.a. 259.e. 260.c
- Vterum gerentis victus ra-
tio.

Index.

tio	228.a	Vuæ passæ	179.c
Vterum gerentibus octauus mensis grauis	49.c	Vulnus carne replētia	199.d
Vterū purgantia	57. b c d e f	Vulnus quando non lauan- dum	327.b
Vteri cū adglutinati fuerint. quid agendum sit	226.d	Vulnus circa sineiput cur pe- riculosius	444.e
Vteri quib⁹ rebus facilè pro pellantur	285.a	Vulnus refrigerantia	199.c
Vteri vbi extra pudendū ex- ciderint , quid agendum	226.b. 239.b. 285.e. 286. b c. 309.c d	Vulnus omne quietē poscit	498.f
Vterorum affectorum reme- dia	237.e	Vulneris in capite modi ac species	445.c d
Vterorū , cum ad coxam de- currerint , curatio	226.f. 283.e. 284.b d. 305.f	Vulneris obseruatio	418.d
Vterorum fomenta	241.b	Vulnera magis lethalia quæ	417.c d
Vterorū oris cōplicati signa & curatio	226.e f. 286.d	Vulnera curanda	417.e
Vterorū pituita oppletorū, si- gna & curatio	227.c. 257.f	Vulnera lethalia	439.a
Vterorum variij morbi	244.f	Vulnera non lethalia	439.a
Vterorum dolor quī sedetur	297.f	Vulnera fortia sine tumore, malum	325.e
Vteros aperientia & purgan- tia medicamenta	242.b	Vulneratorum curatio	199.c
Vtilitas in dignoscendis so- mniis	125.a	Vxoris Hermoptolemi ægre historia	366.b
Vua morbus	156.a. 160.e	X	
Vuæ tumor	193.d	X Enophanis ægri histo- ria	313.f
		Z	
		Z Oilo ex tussi matura quæ contingerint	324.c
		FINIS.	

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3183/A



A HIPPOCRATIS

COI VITA EX SORANO,

IANO CORNARIO ME-
DICO PHYSICO IN-

TERPRETE.

*



B

HIPPOCRATES genere Coos fuit,
 Heraclidæ & Praxitheæ filia Phe-
 naretis filius. Ad Herculem autē &
 Aesculapium originem generis sui
 referebat, ab altero que se vigesimū,
 ab altero decimum nonum se nume-
 rabat. Eius autem genealogiæ Era-
 tosthene mentionem facit, & Phe-
 recydes, & Apollodorus, Arius item
 Tarsensis. Cæterum parentis sui Heraclidæ discipulus fuit,
 deinde Herodici, & ut quidam tradūt, Gorgiam Leontinum
 rhetorem audiuit, & Democritum Philosophū Abderiten.
 Floruit temporibus Pelopōnesiacis, natus (velut Istomachus
 in primo de Hippocratis secta tradit) primo octogesimæ O-
 lympiadis anno. Soranus verò Coos: qui Coorum bibliothec-
 as perscrutatus est, addit, sub Abriadæ monarchia, Agriani
 mensis septima & vicesima die, in qua etiam vsque in hunc
 diem Coos Hippocrati omnia sacra facere tradit. Porro quū
 in arte medica totūq; disciplinarum orbe exercitissimus
 esset, functis vita parentibus, ex patria discessit, ut quidem
 malignè de eo Andreas, in eo quē de Medicinæ origine scri-
 psit libro prodit, propterea quòd publicam Cnidiorum bi-
 bliothecam igne concremasset. Alij autem eo proposito eum
 patriam reliquisse dicūt, ut rei medicæ effectus & successum
 per multos locos cognosceret, & in his variis modis exerci-
 taretur. Quemadmodū verò Soranus Coos narrat, Somnus
 Deus eum per somnium admonuit, quo se ad Theſſalorum
 regionem inhabitandam conferret. Cæterum per omnem
 Græciam Medicinæ gloria omnibus admirationi fuit, adeò
 ut etiā à Perdicca Macedonū Rege, qui tunc laborare puta-
 batur,

Coi singu-
 lis annis
 Hippocra-
 ti parenta-
 bant.
 Andreas
 Hippocra-
 tem infamavit.

Soranus
 Coos.

Perdiccas
 phthiuscus
 creditus.

a

Hippocratis vita.

Euryphon batur, vocatus publice sit, ad ipsumque vnà cum Euryphon- D
 medicus. te, qui ipso ætate maior erat, peruenit animique hunc regis affectum esse certis signis deprehendit. Post mortem enim Alexandri parentis, vnam ex pellicum eius numero

Phyla Ale Phylam nomine Perdiccas deperibat, ad quam quum rem
 xandri pel- ipsam Hippocrates detulisset, postea ex illius conspectu o-
 lex à Per- maino illum mutari obseruauit, atque ita morbo depulso
 dicca ada- regem conseruauit. Vocatus est & Abderam, quo præsens
 mata. ipse Democritum ab insania liberaret, atque eo sanato à to-
 Democri- ta vrbe pestem depelleret. Quin & in Illyricum plurimaf-
 tus insanus que barbaras terras peste ingruente, & illarum gentium re-
 putatur. gibus ipsum ad se vocantibus, quum à legatis ipsorum, qui
 Qua cura ventu in illis regionibus vigerent, didicisset, ipsos re infecta E
 Græciam à pestilentia liberauit. dimisit. At verò quum prudenti ratiocinatione pestem in
 liberauit. Atticam grassaturam præuidisset, futurum id prædixit, &
 tum ciuitatum, tum discipulorum curam gessit, intantum-
 que Græciæ amator fuit: vt quum ipsius nominis celebritas
 Artaxerxes vsque ad Persas diuulgaretur, atque ea gratia ab Artaxerxe
 Helleston- per Histanidem Helleponti præfectum, magnis muneribus
 ti hippar- & precibus vt ad ipsum veniret inuitaretur, ob honestatem,
 chos. argentique contemptum, ac Græciæ amorem, regi id dene-
 garit, quemadmodum & hoc ex epistola eius ad illum ma-
 nifestè ostenditur. Propriam porro patriam liberauit, quum
 Athenienses ei bellum illaturi essent, Theſſalis ad auxilium
 Quantū ab ferendū rogatis. Quapropter splendorum honores apud Coos
 omnibus co consequutus est: imò & apud Theſſalos Argiuosque & Athe- F
 leretur Hip- nienses, qui cum Eleusiniis sacris secundum ab Hercule pu-
 pocrates. blice initiarunt, & ciuem conscripserunt, atque in Prytaneo
 alimenta tum ipsi, tum posteris eius dederunt. Liberaliter
 autem & minime inuidiose studiosos artem edocuit, decen-
 ti iureiurando prius adstrictos. Vita functus est apud Laris-
 Mors Hip- seos, quando & Democritus obiisse traditur, atque alij qui-
 pocratis. dem nonagesimo ætatis suæ anno, alij octogesimo quinto,
 alij centesimo quarto, quidam verò centesimonono, deces-
 sisse tradunt. Sepultus autem est inter Gyrtonem & Laris-
 sam, vbi vsque in hunc diem monumentum eius cernitur, in
 quo sanè ad multum tempus examen apum mellificantium
 erat, quo melle ad infantum oris vlcuscula iuxta tumulum
 illito, nutrices ea facile persanabant. Porro in multis ima-
 ginibus

A ginibus velato capite pingitur, vt quidam aiunt pileo, quod nobilitatis signum est: nam hoc modo etiam Vlysses Pileatus cernitur: Alij autem pallio velatum dicunt, atque ex his

Cur capite
tecto cer-
natur.

aliqui decoris gratia id fieri asserunt, quandoquidem caluus erat: aliqui verò ob capitis imbecillitatem id fieri perhibēt: aliqui autem significanter id ab eo factum volunt, nimirum quod principem rationalis animæ sedem probè munitam & coniectam esse oporteat. Alij signum peregrinationes amantis esse ferunt: alij verò rursus obscuritatem scriptorum ipsius per hoc significari contendunt. Alij postremum in testificationem id fieri volunt, quòd etiam sanitatis tempore ea quæ lādere possunt cauere debeamus. Quamquam B quidam affirmant, quòd in administratione rerum gerendarum, ne quod à circumfluo pallio manus ipsius impedi-
rentur, id ipsum complicatum in caput reicere consueue-
rit. Ceterum de scriptis ipsius multa dissensio est, quare fit vt
quum alia alij opinentur, non facile sit de ipsis certum quid
pronuntiare, ob multas præsertim causas, quæ iudicij cer-
titudinem obfuscant: velut est primum quidem cognomen.
Secundo quòd dictionis characterem possibile sit seruare.
Tertio quòd vnus & idem modo robustiore, modo remissio-
re dictione per ætatem vtatur: neque desunt etiam aliæ præ-
ter has causas, si referre libeat. Pecuniarum autem penitus
contemptor fuit, moribúsque sanctis, ac Græcorum amator,
quare etiam gentiles suos summa diligentia curauit, adeò
C vt à peste omnes ipsorum ciuitates liberarit, quemad-
modum suprà dixi. Vnde & splendidos honores
non apud Coos tantum, sed & apud Argiuos
& Athenienses est consequutus. Filios à
morte reliquit duos, Thessalum &
Draconem, discipulorum verò
magnum numerum. Cla-
rissimi verò ipsius fi-
lij fuisse perhi-
bentur.

Libri Hip-
pocratis in
controuer-
siam addu-
cti.

Thessalus
Dracóque
Hippocra-
tis filij.

HIPPOCRATIS^D

COI IUSIVRANDVM,


IANO CORNARIO ME-

DICO PHYSICO

INTERPRETE.

*

Apollo.
Aescula-
pius.
Hygeia.
Panaccia,



Quæ præ-
stet medi-
cus.

POLLINEM medicum, & Aescu-
lapium, Hygeamque ac Panaceam
iuro, deosque omnes, itemque deas
testes facio, me hoc iusiurandum, & E
hanc contestationem conscriptam
pro viribus & iudicio meo integrè
servaturum esse. Præceptorem sanè
qui me hanc edocuit artem, paren-
tum loco habiturum, vitam com-
municaturum, eaque quibus opus habuerit impertiturum:
eos item qui ex eo nati sunt pro fratribus masculis iudicatur-
um, artemque hanc si discere voluerint, absque mercede
& pacto edocturum; præceptionum, ac auditionum, reli-
quæque totius disciplinæ participes facturum, tum meos,
tum præceptoris mei filios, imò & discipulos, qui mihi scri-
pto cauerint, & medico iureiurando addicti fuerint, alij ve-
rò præter hos nulli. Cæterum quod ad ægros attinet sanan- F
dos, diætam ipsis constituam pro facultate & iudicio meo
commodam, omnèq; detrimentum & iniuriam ab eis pro-
hibebo. Neque vero ullius preces apud me adeò validæ fue-
rint, ut cuipiam venenum sim propinaturus, neque etiam ad
hanc rem consilium dabo. Similiter autem neque mulieri
talum vuluæ subditicium, ad corrumpendum conceptum,
vel fœtum dabo. Porro præterea & sanctè vitam & artem
meam conseruabo. Nec vero calculo laborantes secabo, sed
viris chirurgiæ operariis eius rei faciendæ locum dabo. In
quascunque autem domos ingrediar, ob vtilitatem ægrotan-
tium intrabo, ab omnique iniuria voluntaria inferenda, &
corruptione cum alia, tum præsertim operum venereorum
abstinebo, siue muliebria, siue virilia, liberorumve hominū
aut


A aut seruorum corpora mihi contigerint curanda. Quæcun-
que vero inter curandum videro aut audiero, imò etiam ad
medicandum non adhibitus, in communi hominum vita co-
gnouero, ea si quidem efferre non contulerit, tacebo: & tan-
quam arcanà apud me continebo. Hoc igitur iusiurandum
mihi integrè seruanti, & non confundenti, contingat & vitæ
& arte feliciter frui, & apud omnes homines in perpetuum
gloriam meam celebrari. Transgredienti autem & peieran-
ti, his contraria eueniānt.

H I P P O C R A T I S

B C O I L E X, I A N O C O R-
N A R I O M E D I C O P H Y-
S I C O I N T E R.

P R E T E.

*



MEDICINA omnium artium præcla- Medicæ ar-
tis præstan-
tia.
rissima est. Verum propter ignoran-
tiam eorum, qui eam exercent, & ob-
vulgi ruditatem, quod tales pro me-
dicis iudicat & habet, iam eo res de-
uenit, vt omnium artium longè vi-
lissima censeatur. At verò hoc pec-
catum ob hanc potissimum causam
mihi committi videtur. Soli nanque Quæ pœna
malis medi-
cis irroge-
tur.
Medicinæ nulla pœna in rebus publicis statuta est, præter-
quam ignominia, verum hæc ipsa non afficit, neq; contingit
eos, qui ex composito personam ipsius induerunt. Similimi-
enim huiusmodi Medici sunt personis, quæ in tragædiis in-
troducuntur. Quemadmodum enim illi figuram quidem &
habitum ac personam eorum quos referunt habent, illi ipsi
autem verè non sunt. Sic & Medici fama quidem & nomine
multi, re autem & opere valde pauci. Quisquis enim Medi-
cinæ scientiam sibi vere comparare volet, eum his ducibus
voti sui compotem fieri oportet, Natura, Doctrina, Loco

2 3

studijs

Hippocratis Lex.

Necessaria studiis apto, Institutione à puero, Industria, & Tempore. Pri- D
medico fu- mum quidem igitur omniū Natura opus est. Natura enim
turo. repugnante, irrita omnia fiunt. Si verò natura ad optima viā

Disciplina
cōparatio
ad agricul-
turam.

cum profectu fructus suos producat. Qualis enim eorū quæ
terra producit consideratio est, eiusmodi etiam disciplinæ
Medicinæ per omnia similiter existit. Natura enim nostra,
velut ager est, dogmata præceptorum, velut semina sunt. In-
stitutioni à puero cum eo conuenit, quòd opportuno tempo- E
re semina in aruum cadere oportet. Locus autem in quo di-
sciplina contingit, est velut ambiens aer, à quo è terra nascen-
tibus nutrimentum accedit. Industria autem, cultura est.
Tempus postremum hæc omnia corroborat, vt perfectè enu-
triantur. His igitur ad artem medicam allatis, & vera ipsius
cognitione comparata, tandem per vrbes obambulādo, non
sermone tantum, sed & opere medicos haberi conuenit. Im-
peritia verò malus thesaurus est, & infelices opes, his, qui
eam repositam habent, & insomnium, aut potius somnium
diurnum, & maximè verum, alacritatis fiduciæque ac veræ
exultationis expers, timiditatisque & audaciæ nutritrix. Ti-

Sciētia mul-
tum differt
à persua-
sione.

miditas equidem impotentiam, audacia verò ignoran- F
tiam artis significat. Duo enim sunt, Scientia &
Opinio, quarum altera quidem scire facit, al-
tera verò ignorare. Caterum res sacræ
sacris hominibus demonstrantur,
prophanis id fas non est, prius
quàm scientiæ orgiis
initientur.

H I P P

HIPPOCRATIS

COI LIBER

DE ARTE,

IANO CORNARIO

MEDICO PHYSICO

INTERPRETE.



SUNT QUIDAM qui artem putant, reliquas artes turpiter incedendo dehonestare, atque id quidem veluti putant non transigunt, ut ego sane assero, sed propriam cognitionem ac scientiam ambitiose ostentant. Mihi verò inuenire aliquid eorum, quæ nondum inuenta sunt, quod ipsum notum, quam occultum esse præstet, scientiæ votum ac opus esse videtur. Similiterque & semiperfecta ad finem perducere & absolvere. At verò verborum inhonestorum arte ad ea quæ ab aliis inuenta sunt confundenda, promptum esse, nihil quidem corrigendo: eorum verò qui aliquid sciunt inuenta apud ignaros calumniando, non sane scientiæ votum aut opus esse videtur: sed proditio magis naturæ suæ, aut ignorantia artis. Solis enim artis ignaris hoc ipsum factum conuenit, qui contentiose quidem gestiunt ac conantur, nequaquam verò possunt malicie sufficere, ad hoc ut aliorum opera quæ quidem recta sunt, calumnientur, quæ verò non recta sunt, reprehendant. Eos quidem igitur qui in alias artes hoc modo irruunt, quibus hæc curæ sunt, quorumque id interest, & præstare hoc possunt, prohibeant. Præsens verò sermo his, qui medicinam eo modo inuadunt aduersabitur, confidens quidem & animatus propter utilitatem eorum, quos infestatur: copiosus verò ob artem, qua præstat & auxiliatur: potens autem ob sapientiam, qua est eruditus. In vniuersum itaque nulla videtur mihi ars esse, quæ non existat. absurdum

dum enim est aliquid esse putare quod non est, quoniam eorum quæ non sunt, quānam substantia conspecta aliquis denuntiare possit quod sint? Si enim non existentia videre non datur, quemadmodum existētia, haud equidem scio quomodo quis mente concipere queat ea quæ non sunt, quemadmodum ea quæ sunt, quæ certè oculis videre est, mentēq; intelligere quod sunt. Verūm vte ea nec videas nec intelligas, non similiter contingere potest. Sed existentia quidē semper videntur ac cognoscuntur: nō existentia autem, neque videntur neque cognoscuntur. Cognoscuntur itaque demonstratis iam artibus, & nulla est ars quæ non ex specie quadā rerum videatur, arbitrōrque sanē ego etiā nomina artibus ex speciebus accipi & imponi. Absurdū enim est existimare ex nominibus species rerū germinare & provenire, imo etiam impossibile existit. Nomina enim lege quadā naturæ indita sunt, Species autem rerum nō lege sancitæ sunt, sed naturæ germina existunt, atque hæc quidē si quis ex prædictis non ad plenum intelligat, in aliis sermonibus fortassis clarius

Medicina
quid.

Medicina
mala omnia non sanat.

Quatenus
medicina
non probetur.

edocebitur. De Medicina verò, vtpote de qua hic institutus est sermo, claram demonstrationem faciā, & primū sanē definiā quod sentio, Medicinā esse morbos ab agris in totum tollere, & morborū vehementes impetus obtundere, & eorum qui à morbis victi sunt curationē nō aggredi, quum id in cōfesso sit, quod Medicina tales sanare nō possit. Quomodo igitur hæc Medicina faciat, & quali omnino facultate præstet, de hoc iam reliquum sermonem instituā. Ceterū in artis demonstratione simul etiam sermonē illorum qui eam dehonestare contendunt, quatenus quisq; eorū sibi quid transēgisse visus est, reuellā. Principiū itaque sermonis hoc erit, cui omnes assensuros scio. Quod quidem aliqui à medicina curati sanitati restituuntur, confitentur. Quod verò nō omnes ob hoc iam ars ipsa vituperatur: aiuntq; hi qui eā peius incessunt, quod hi qui à morbis apprehenduntur, eosque euadunt, fortunæ ope euadāt, & non auxilio ipsius artis. Ego verò nō priuabo quidem ipse fortunam tanquam nihil operæ precij faciat, puto enim morbis qui malè curātur vt plurimum infortunium accedere: qui verò bene, eos bonam fortunam nancisci. Postea verò interrogo: quomodo possibile est sanatos aliud quā artem causari, siquidē eius vsu & mi

A & ministerio sunt sanati. Nudam enim fortunæ speciem eos *Species for*
 respicere ac sequi noluisse, ex hoc apparet, quod seiplos arti *tunz nuda.*
 concrediderunt quare à gratia fortunæ referenda liberi sunt:
 ab ea verò quæ arti debetur minimè se vèdicare possunt, quo
 minus ei sanitatem acceptam ferant. In hoc enim quod se ei *Huc spe*
 commiserunt ac concrediderunt, palàm est ipsos speciem *mitis*
 eius esse contemplatos, vim verò eius patrato opere cogno-
 uerunt, Dicit sanè hic aduersarius, quod multi iam ægri etià *Medicis nō*
 citra medicorū vsum sunt sanati: & ego id dicentibus credo. *vtentes non*
 Videtur autē mihi omnino fieri posse, vt & qui medicis non *negat pos-*
 vli sunt in medicinam inciderint, non tamē vt scierint quod *se sanari.*
 in ipsa rectum fuerit, & quod non rectū: alioqui contigif-
 set vt seiplos eodem penitus modo curassent, quo curati fuif-
 sent, si medicos adhibuissent. & hoc tandem magnum signū
 est substantiæ ipsius artis, nēpe artē esse, & quidē magnam,
 quando sanè etiam hi qui eam esse nō putant, per ipsam ser-
 uati apparent. Valde enim necessarium est nosse, eos qui me-
 dicis etiam non sunt vli, si agrotauerunt & conualuerunt, *Qui sine*
 quod aut facientes aliquid, aut non facientes sanati sunt. Aut *medicis sa-*
 enim inedia, aut edacitate, aut vberiore potu, aut siti, aut bal- *nantur, ali-*
 neis, aut illuue, aut laboribus, aut quiete, aut somnis, aut vi- *qua re sa-*
 gilia, aut his omnibus promiscuè vtentes, conualuerunt. Et sa- *nantur.*
 nē propterea quod opem senserunt, valde necessarium est ip-
 sos nosse, quod fuerit aliquid quod opem tulerit. Et rursus si
 quid detrimenti acceperunt, necesse est & detrimentū nosse,
 & quod fuerit aliquid quod damnum dedit ac læsit. Non e-
 nim quiuis cognoscere potest ea quæ commoditate & detri-
 mento sunt disparata. Si igitur is qui agrotauit, siue lauda-
 re, siue vituperare nouerit quid: ex diætā, per quam conua-
 luit, omnia hæc Medicinæ esse comperiet, & sunt nihil mi-
 nus ea quæ damno fuerunt, quàm ea quæ opem tulerunt, in
 testimonium arti, quod ars ipsa sit. Quæ enim profuerunt, ob
 rectum vsum profuerunt: quæ verò nocuerunt, ob id quod *legi in*
 non rectè vsurpata sunt, nocuerunt. Atqui vbi rectum, & nō *Artes*
 rectum vtrunque suum finem habet, quomodo quis hoc ar- *aripia.*
 tem esse neget? Hoc enim ego artis expers esse dico, vbi ne-
 que rectum neque non rectum aliquid existit. Vbi verò vtrū
 que horum inest, quomodo hoc non artis opus, sed potius in-
 artificialitatis existat? Amplius autem si ex phar macis pur-
 gan

Hippocratis Liber

Medicamē gañtibus, & aluum sistētibus solū, tum Medicina, tum Me- D
 ta purgan- dicis sanationem facerent, infirmus sane sermo meus meri-
 tia, & sisten- tō iudicaretur. Nunc verò hi qui inter medicos maximè lau-
 tia nō satis dati sunt, & diætā, & aliis medicaminum formis sanāt, quas
 unt ad con- ne idiota quidem artis ignarus si audiat, nedum Medicus ar-
 alescētia. tis esse negare queat. Vbi igitur nihil neque in ipsis bonis

medicis, neque in arte medica inutile est, sed in plurimis eo-
 rum quæ ex terra nascuntur, & eorum etiam quæ fiunt, spe-
 cies & formæ insunt medelarum & pharmacorum: non est
 quod amplius aliquis eorum qui sine medico conualuerunt,
 casum spontaneum vero sermone vehere possit tanquā cau-
 sam suæ sanationis. Spontaneum equidem nihil esse appa-
 ret ac deprehenditur. Omne enim quod fit, propter quid fie- E
 ri comperitur, atque etiam in singulis adeò propter quid fie-
 ri videtur. Spontaneum verò nullam substantiā habere com-

Medica ars peritur, sed nudum tantum nomē. Medicina autem tum ex
 cur refelli his quæ propter quid de industria excogitata sunt, esse ad-
 non possit. paret, tum substantiam amplius habere conspicitur. Quare
 his quidem qui fortunæ sanitatem acceptam ferunt, artique

Quid con- derogant, hæc quæ dixi respondere quis possit. Cæterum
 tra eos qui eos qui ob morientium calamitatem, artem demoliri con-
 mortuos tendunt, miror quānam memorabili ratione commoti, in-
 medicis as- temperantiam quidem morientium causam mortis nō sta-
 signant, di- tuunt, scientiam verò eorum qui medicinam exercent, accu-
 cat. sant: tanquam sanè Medici quidem ea quæ non conueniant: F

Quid medi- imperare possint, ægri verò quæ imperata sunt, transgredi
 cus cōfide- non possint. Atqui longè magis rationi consentaneum est,
 ret ante cu ægros non posse facere quæ imperantur, quàm medicos non
 ram. conuenientia iubere. Medici nanque sana mente sanòq; cor-
 pore rem aggredientes, & præsentia considerant & de præte-
 ritis similiter iuxta præsentia ratiocinantur, intantum etiā
 vt aliquando palàm gloriari soleant ægri, se illorum opera

Cur lāguē sanitati restitutos esse. Aegri verò neque qua parte laborent,
 tes non pa- neque ob quam causam laborent, neque quid ex præsentibus
 reant. futurum sit, neque quid ex horum similibus fiet scientes,
 medici imperio subiacent, dolentes quidem ob præsen-
 tia, timentes autem futura: & pleni quidem morbo inanes
 autem ciborum, ea quæ morbo grata sunt, quàm quæ ad san-
 nitatem faciunt assumere malunt, mori quidem non aman-
 tes,

Ates, sed tolerare tamen non potentes. Hoc modo autem affectos, utrum verisimilius est, hos à medicis imperata facere, an alia facere quæ medici non iusserunt? aut medicos tales quales superiori sermone declaravi, non cōvenientia imperare? Nōne multò magis hos quidem quæ conueniant rubere: illos autem temere & impotenter nolle obedire: atque sic inobedientes in mortem incidere? Quæ sanè qui non rectè considerant, causas ad hos qui inculpabiles sunt, referūt: eos verò qui maximè accusandi sunt, à culpa liberant & defendunt. Porro sunt item quidā qui ob eos qui victis à morbis curam adhibere nolunt, medicinā ipsam reprehendunt, dicuntque quòd morbi quos sanare aggrediuntur illi, per **B** seipso fuissent sanati: qui verò auxilio opus habēt, eos non contingunt. Oportebat autem, inquiunt, siquidem ars erat, omnibus æquè morbis sanitatem afferre. Qui igitur hæc dicunt, si medicis indignarentur, quòd ipsorum talia dicentium, nō ut delirātium curam habeant, meritò sanè succensuerint magis, quàm quòd illa reprehendunt. Si quis enim ab arte potentiam in ea quæ non proficitur, aut à natura facultatem in ea ad quæ nata non est, exigat: is ignorat insaniam dementia potius quàm ignorantiæ cōuenire. Quorum enim instrumentorum siue naturæ, siue artium facultatem obtinemus, per ea sanè opifices esse possumus, per alia verò minimè licet. quum igitur homo morbo afficitur qui vehementior est quàm medicinæ instrumēta, ne sperare quidem **C** oportet ut à medicina exuperetur. Exempli enim gratia, Inter ea quæ in medicina vrendi vim habent, ignis extremè vrit, verum eo minus etiā alia multa. An verò ex eis præstantiora leuiore morbos curare non possint nondum satis constat, valentissimos autem morbos, potentissima etiā instrumenta curare nō posse, quomodo non sit manifestum? Quæ enim ignis non efficit, quomodo ea quæ ab illo non sunt domita non ostendant, quòd alia arte opus habeant, & nō ea in qua ignis instrumentum existit? Idem sentio & de aliis instrumentis quæcunque medicinæ opus adiuuant, quorum omniū singulatim successum si nō assequitur medicus, vim affectionis accusare oportet, mea quidē sententia, nō ipsam artem. Qui igitur eos reprehēdunt qui victis à morbo manu adhibere recusant, hortantur etiā ut ea quæ nō conueniunt attingant,

Damnatus
ars medica
quinetiā cū
deploratos
non curot.

Deplora-
tos nō ex-
pedit rā-
gere.

Hippocratis Liber

attingant, non minus quàm ea, quæ contingere interest ar- **D**
 tis, quod quum faciunt, his quidem qui nomine medici sunt,
 admirationi sunt: ab his verò qui arte præstant, deridentur.
 Nec verò adeo desipientes huius artis experti sunt: neque vi-
 tuperatoribus neque laudatoribus indigent, sed ratione, ad
 quam sanè actiones opificum absolutæ, plenæ sunt, & quæ ab
 ea destitutæ, mancæ. Amplius vero etiam defectus aliquos
 quidem opificibus imputare oportet, aliquos vero ipsis ope-
 ribus. Quæ quidem igitur ad alias artes pertinent aliud tem-
 pus, aliūque sermonem requirunt. Quæ vero ad medici-
 nam, qualia sunt, & quomodo iudicanda, partim quidem su-
 periori sermone ostendimus, partim vero præsentī oratione
 docebimus. Sunt enim his qui hanc artē probe norunt, mor- **E**
 bi partim non in obscuro positi, & non multi: partim non in
 manifesto loco hærentes, & multi sunt, Qui enim ad inter-
 na vertuntur, in obscuro siti sunt. Qui vero ad superficiem
 corporis erumpunt aut tumescunt, manifesti sunt. exhibent
 enim sese ut tum visu, tum tactu, & soliditas & humiditas
 ipsorum percipiatur, & qui calidi sint quique frigidi sentian-
 tur, qui sanè singulorū aut præsentia aut absentia tales exi-
 stunt. atque horū quidem omnium in omnibus certas ac
 infallibiles medelas esse oportet, non ob id quòd faciles sint,
 sed quòd certo inuento constent. Neque verò à quibusvis vo-
 lentibus inveniuntur, sed ab his qui volunt itēque possunt,
 possunt autem quibus tum disciplina non minus, sed pro-
 pè & largiter contigit, tum natura non infelix liberaliter **F**
 accessit. Ad manifestos quidem igitur morbos hoc modo ar-
 tem diuite facultate præditam esse oportet. Neque verò ad
 minus manifestos eam inopem ac dubiam hæere conuenit.
 Sunt autem morbi minus aperti, quique ad os, quique ad ven-
 triculum sunt conuersi. Habet autem corpus non vnum ven-
 triculum sed plures. Duo enim sunt qui cibum suscipiunt &
 demittunt, aliique præter hos plures, quos norunt hi quibus
 hæc res curæ fuit. Quæcunque enim membra carnem in or-
 bem circumsitam habent, quam musculum appellant, ea om-
 nia ventriculum habent. Omne enim incōcretum & quod
 non coaluit, siue pellicula siue carne contegatur, cauum est.
 Impletur autem dum sanum est flatu, dum ægrotat sanie.
 Habent itaq; brachia talem carnem, habent & scœmora, ha-
 bent

Quædam
 arti quædā
 artificia dā-
 la.

Mala pa-
 entia pau-
 a sunt, con-
 ra quæ nō
 patent mul-
 ta.

Corporis
 ventriculi.

A bent suræ. Quin & in macilētis & ex carnibus partibus eius-
 modi caro inest, similiter vt in carnosis esse demonstratum
 est. Nam & qui thorax appellatur, in quo hepar continetur,
 & capitis circulus, in quo cerebrum concluditur: ipsumque
 adeo dorsum, ad quod pulmo vergit, horum membrorum
 nullum est quod non & ipsum vacuum sit, ac multis segmen- Loca cor-
poris va-
cua.
 tis plenum ac quasi discriminatum existat, quæ parum ab-
 est vt vasa existant, quorum tamen aliqua habentem lædūt,
 aliqua vero eiam profunt. Præter hæc autem & venæ mul- Venæ, ner-
ui quid fa-
ciant.
 tæ, & nerui non in carne sublimes, sed ad ipsa ossa producti
 ligamentum sunt articularum: ipsi etiam articuli in quibus
 ossium quæ mouentur commissuræ inuoluuntur: & horum
B nullum est quod non subspumofum sit, & circa se forulos ha-
 beat, quos sanies prodit, quæ deductis ipsis, multa & magno
 multorum mœrore egreditur. Ex prædictis itaque omnibus
 nullum est quod oculis conspicienti videre ac cognoscere
 contingit, quapropter etiam obscura mihi appellata sunt: &
 ab arte quoque obscura esse iudicata sunt, non tamen quod
 obscura permaneant & nos vincant, sed quantum possibile Quæ cau-
sa cur non
cognoscan-
tur morbi
statim.
 est cognoscantur & superentur: possibile autem est quatum
 agrorum naturæ ad considerandum conferunt, & quantum
 eorum qui perscrutaturi sunt naturæ ad perscrutandum a-
 ptæ sunt. Cum multo enim labore, & non modico tempore
 præ oculis videntur & cognoscuntur. Quæcunque enim ocu-
 lorum conspectum effugiunt, ea mentis oculis obtinentur
 & superantur. Quæcunque vero ob id quod non statim co- Causæ mor-
borum non
statim co-
gnoscuntur.
 gnoscantur agri mala perpetiuntur, ea non ad medicos cu-
 rantes ipsos, tanquam ad ipsorum autores referenda sunt,
 sed ad naturam ipsius egri, itidemque ipsius morbi. Medicus
 enim quum non possit malum neque visu assequi, neque au-
 diendo ex aliorum narrationibus cognoscere, ratiocinatione
 ipsum persequitur. Etenim ipsi quoque agri qui obscuro mor- Languen-
tibus non
semper cre-
dendum.
 bo laborant, si conentur medicis de morbis suis narrare, ex
 opinione magis quam scientia narrant. Nam si sciuisent, in
 ipsos sanè medicos non incidissent, quum eiusdem scientia
 sit morborum causas nosse, & morbos ipsos omnibus medi-
 camentis quæ augescere morbum prohibent, curare posse.
 Quando igitur neque ex egri narrationibus ad infallibilem
 certitudinē peruenire possit, aliò certe respicere medicum
 necesse

Hippocratis Liber

Quid *flu-* necesse est. Quare huius tarditatis non ars ipsa, sed corporū D
beat natu- natura causa existit. Hæc enim malum sentiens, mederi ma-
ra. gnopere gestit, considerās tamen ne temeritate magis quā
 consilio, & ut facilitate magis quā violentia medeatur.

Medicus *cum mor-* Medicus verò si quidem suffecerit ad cognoscendum, suffi-
bum nouit, ciet etiam ad sanandum. Si verò is in quo morbus cognosci-
facile pel- tur, superetur, ob id sanē quòd serius medicum accerlit, aut
lit. ob morbi celeritatem peribit. Si enim ex æquo procellerit
 morbus cum medicina, velocior non est. Si verò præoccupau-
 erit, velocior omnino existit. præoccupat autem tum pro-
 pter corporum angustiam, in qua non in conspicuo inhabi-
 tant morbi, tum propter agrorum negligentiam. Differunt

pen. py
de. l.
no. p. p.
no. p. p.
no. p. p.
Medica *ars* si sunt, tum demum curari volunt ac expetunt. Quare artis
nihil cete- potentiam magis ex merito admiremur, si quem ex clande-
ris simile stino morbo agrum restituat, quā si impossibilibus & de-
habet. speratis opem ferre moliatur. Nequaquam vero in vlla ali-
 qua iam inuentarum artium tale quiddam inest, sed quæ ex
 eis igne opificium exercent, igne non præsentē, otiosæ sunt.
 Vbi verò illum contigerunt, operosæ. Quæ item tractabili-
 rerum materia artem suam exercent, veluti aliæ quidem li-
 gnis, aliæ coriis, aliæ sculpendo tum ære, tum ferro, aliisque
 similibus rebus earum quā plurimæ. Opera porro quæ ex
 hac materia, & cum huius materiæ instrumentis fiunt, tam
 et si facile retractari ac corrigi possunt, tamē non magis ve-
 locitate, quā velut decet perficiuntur, neque defunctoriē F

Natura *quid agat,* que fluxiones quæ singulis locis, per quos exitus eis dantur,
videto. destillare consueuerunt, quarum modo odores, modo colo-
 res, deinde etiam ponderatam tenuitatem ac crassitiem ob-
 seruat, ex eisque signa tum eorum quæ ægri iam perpetiun-
 tur,

A tur, tum quæ perpeti possint, colligit. Quum verò hæc significationem de se præbeant, neque ipsa natura voluntaria dimittat, vires amplius ac necessitates medicina ipsa inuenit, quibus natura coacta indemnitas tamen concedat. Natura autem stimulata & impulsæ, artis peritis quæ facienda sunt demonstrat. Cogit autem partim coalitum in nobis calorem, pituitam per ciborum ac potuum acrimoniam diffundere, quo intelligat quid sibi visum sit de illis, quæ ut viderentur ipsa machinata est: partim verò spiritum velut delatorem, tum viis arduis, tum cursibus accusare ac prodere cogit. Quin & sudores per prædicta ducens ac excludens, humorum calidorum exhalationem perficit. Sunt præterea
 B quæ per vesicam pergressa magis morbum ostendere possunt, quàm quæ per carnem exhalant. Inuenit igitur & tales potiones itémque cibos, qui calidiores aliàs calefacientibus existentes, illaque & eliquant, & profluere faciunt, quæ sanè non profluxissent si non hoc modo tractata fuissent. Alia itaque ex aliis, & alia per alia prodeunt, quæ corpus pergressa morbum ipsum produnt, ut nihil miri sit ipsis serius fidem haberi, & medendi conatus ac aggressiones tardiores esse, quum sic per peregrinas interpretationes ad medendi scientiam ac cognitionem medici perueniant ac erudiantur. Quòd igitur & rationes in seipsa plenas & ad ferendum auxilium abundantes habeat medicina, & quòd morbis qui corrigi non possunt meritò auxiliares manus negat, aut si
 C fortè opem ferre molita est, citra culpam eam exhibet, id ipsum tum iam habitus sermo manifestum facit, tum etiam artis peritorum demonstrationes palam documentum præbent, quas sanè ex operibus iucundius, quàm ex sermonibus ostendunt:
 utpote qui dicendo non magnopere exercitati, multitudini fidem sinceriolem ex his quæ videat, quàm quæ audiatur facere malint.

Lotium magis morbos indicat.

Proprium artis medicæ.

HIPP

HIPPOCRATIS^D

COI LIBER DE VETERI

MEDICINA, IANO COR-

NARIO MEDICO PHY-

SICO INTER-

PRETE.

Hipp
Priores ar-
tis medicae
scriptores
saxantur.



Medicam
artem esse,
& veram
assuevit.

Medicinae
antiquitas.
Certa esse
inuenta in
hac arte.

VICVNQVE de medicina dicere
aut scribere aggressi, dicendi sco-
pum sibiipsis ac fundamentum sup-
posuerunt, calidum aut frigidum,
aut humidum aut siccum, aut aliud **E**
quodcunque voluerint, rem in com-
pendium contrahentes, principium
causae, tum morborum, tum mor-
tis, hominibus omnibus idē, vnum
aut duo proponentes, hi in multis quidem quae dicunt ma-
nifesto errasse deprehenduntur. Iustior autem querela est de
arte, qua omnes in maximis vtuntur, & bonos artifices ma-
ximè colunt. Sunt autem opifices, alij viles, alij longè prae-
stantes, quod sanè si non esset omnino medicina, neq; in ipsa
observationes essent, neque quicquam inuentorum, non vti-
que extaret, sed omnes aequaliter eius ignari & inexperti es-
sent, & per fortunam omnes aegrotorum res gubernarentur. **F**
Nunc verò res non sic se habet, sed quemadmodum aliarum
omnium artium opifices multum inter se differunt, tum ma-
nu, tum mente, sic etiam in medicina. Quapropter non cen-
seo ego ipsam inani fundamento indigere, velut obscura &
dubia. de quibus si quis dicere conetur, necesse est fundamen-
to vti. Velut si quis de sublimibus in aere rebus, aut de sub-
terraneis dicat, & quomodo habeant sciat, tamen neq; dicenti,
neq; audientibus manifestum satis fuerit verane sint an secus.
Neque enim est ad quod quis se conferat, cuiq; innitatur, vt
veritatem cognoscat. Medicina autē iam ab antiquo existit,
& principium & via inuenta, per quam inuenta & multa &
probe habetia comperta sunt, per multum adeo tempus, & re-
liqua deinceps inuenientur, si quis sufficiens sit, & iam inuen-
torum gnarus, ex his ad perquirendum procedat. Quicūque
verò

Averò his reiectis ac omnibus reprobatis, alia via aliâque forma inquirere conatur, & quid inuenisse gloriatur, falsus est & fallitur. Impossibile enim id est, verum ob quas necessitates impossibile sit, ego demonstrare conabor, docens ac demonstrâs quòd ars existat. Ex hoc autem palam fiet, impossibile esse aliquo alio modo inueniri. Videtur autem mihi maximè, de hac arte dicturum oportere vulgo ac plebeis hominibus nota dicere. Neque enim de alio quopiam, neque quærere neque dicere conuenit, quàm de affectionibus, ex quibus illi ipsi ægrotant. Ipsos quidem igitur suas ipsorum affectiones condiscere, quomodo fiunt ac desinunt & quibus occasionibus augescunt ac deficiunt, quum idiotæ sint non est facile, verum ab alio inuentas ac proditas, procliue. Nihil enim libentius quisque recordatur quàm quæ sibi ipsi accidisse audit. Si quis autem idiotarum sententia destitueretur, & audientes non afficiet, ille etiam veritatis compos non fiet, & propterea neque fundamēto neque scopo opus habet. Et enim Ars medica neque inuēta ab initio fuisset, neque quæ sita, Nihil enim ea opus erat ægrotis hominibus, si eadem diætâ vterentur, & assumerēt quæ sani edunt ac bibunt, imò etiam alterius diætæ vsus eis profuisset, si non alia fuissent his meliora. Nunc autē ipsa necessitas homines coegit Medicinam inquirere ac inuenire. Quoniam ægrotis eadem in cibo assumentibus quæ sani solent, non fuit utile, velut neque nunc utile existit. Quin ut rem altius expendamus, neque ipsam sanorum diætâ ac alimoniam qua nūc vtuntur, inuentam fuisse censeo, si suffecisset homini idem cibus ac potus, qui boui acequo, & omnibus aliis præter hominē, veluti sunt ex terra nascentia, fructusq; ac herbæ & fœnum. Ex his enim nutriuntur, & augescunt, & illæsi degunt, nō indigentes alia diætâ. Quanquam ego sanè ab initio etiâ hominem tali victu vsum esse putem. Quæ verò nunc inuēta sunt edulia, multa arte excogitata & multo tēpore producta esse mihi videntur, quum multa & grauia, ex forti ac ferino victu homines paterentur, qui intemperatus, & magnas vires habens ingerebatur. qualia sanè etiam nunc ex ipso paterētur. doloribus vehementibus & morbis obnoxij, & breui etiam morti. Verisimile est autem hæc mala tunc minus perpeffos ipsos esse, propter consuetudinem: quanquam etiam tūc ve-

De rebus
cōmunibus
tractat me-
dicina.

Medica ars
est de re-
bus mor-
bisve vul-
go notis.

Quæ de ci-
bariis dicat
aspicito.

b

hemen

Hippocratis Liber

Multi prio
re cibo peri
bant.

Panificia
varia.

Medici hūc
cibū exco
gitarunt.

Principia
medicinæ.
Barbarorū
victus.

hemēter afflicti sint, & cōsentaneū est plurimos & debiliore D
natura præditos periisse, eos verò qui victū illū superare po
terāt lōgiori tēpore durasse ac restitisse. Quēadmodū etiam
nūc ex validis eduliis aliqui facilē liberātur, aliqui cū mul
tis doloribus ac malis. Ob hāc itaq; necessitatē etiā illi mihi
videntur quæsiuisse victū naturæ cōuenientem, & inuenisse
hunc, quo nūc vtimur. Ex tritico igitur macerato, & à corti
ce purgato, molitōq; ac cribrato, & subactō, ac assato, panem
fecerunt. Ex ordeo verò mazā, aliāq; multa ex hoc excogitā
tes, coxerunt, & assarunt, & miscuerunt, fortiāq; & intempe
rata, debilioribus temperarunt, effringentes omnia iuxta ho
minis naturam ac vires, quæ quidem fortiora essent, ab ipsa E
natura non posse superari, si ingesta essent, existimantes: ab
his ipsīs quoque dolores & morbos ac mortes oriri iudican
tes: cōtrā ab his quæ natura domare posset, alimentū & aug
mentum & sanitatē. Porro inuento huic quodnā iustius aut
magis cōueniens nomen quis imposuerit quā medicine?
quandoquidem ad hominis sanitatem alimentūmq; ac salu
tem inuentum est, in permutationē illius victus ex quo do
lores & morbi fiunt. Si verò ars ipsa esse non putatur, nihil
absurdi est. Nā cuius nemo ignarus est, sed scientes omnes,
ob vsum & necessitatem eius non cōuenit aliquem artificē
appellari. Atqui inuētum ipsum & magnum & multæ artis
ac considerationis existit. Quinetiā in hunc vsq; diem exer
citorum & reparandarum virium curam gerentes, semper F
aliquid amplius adinueniunt, iuxta eandē viam inuestigan
tes quod quis edens ac bibens maximē superet, ac seipso for
tior euadat. Consideremus itaque & confessam ab omnibus
medicinam, eam videlicet quæ propter ægros inuēta est, an
& nomen & artifices habeat, & ipsa dominari ipsīs velit, &
vnde tandem initium sumpsit. Mihi equidem, velut in prin
cipio dixi, nemo ne quæsiuisse quidem medicinam videtur,
si idem victus & ægrotis & sanis conuenisset. Itaque vsque
in hunc diem hi qui medicina non vtuntur Barbari ac Græ
cis confines, eodem modo quo sani visitant ad voluptatem,
& à nulla re quam concupiscunt, abstinēt, neque quicquam
deuitant. Cæterū qui Medicinam quæsiuerunt ac inuene
runt eandem cū illis de quibus superiori sermone dictū est,
sententiam habuerunt, & primū quidem ex his ipsīs cibis
copiam

A copiam detraxerunt, & pro multis paucos statuerunt. Quum verò ipsis aliquādo hoc ad aliquos agros sufficeret, palamque fieret quod prodesset, non tamen omnibus, sed essent quidā ita habentes, vt neque modicos cibos superare possent, imbecilliore sanè quopiam tales indigere illis visi sunt, sorbitionesque inuenerunt pauca ex fortibus multa aqua permiscen-
 tes, & robur ipsum tēperatura ac coctura detrahētes. Quod si qui neque sorbitiones superare possent, his detraxerunt etiam ipsas, & ad potiones peruenerunt, obseruaruntque vt hæc tum vsu, tum copia moderatè haberent, & neque plures quàm oportet, neq; meraciores & intēperatiores, neque defectuosiores offerentes. Probè autē nosse oportet quibus sorbitiones in morbis non cōducunt. Nam statim vbi hoc fecerint exacerbantur ipsis febres ac dolores, & manifestum sit, quod assumptū morbo quidem alimentum ac incrementum præbet, corpori verò tabes & infirmitas existit. Quicūq; verò homines in hac affectione existentes siccum cibum assumunt, aut mazā, aut panē, etiam si valde modicū, decuplo magis & manifestius læduntur, quàm si sorbitione vsi essent, ob nullā aliā causā quam fortitudinē edulij ad affectionē, in quo sorbere cōducit, edere autē non. Si enim plura comederit, plus vtique lædetur: si verò pauca, dolebit tamen omnino. Omnes itaque doloris causæ ad idē reducuntur, nimirū fortissima edulia maximè manifestissimè hominē lædere, siue sanus sit, siue ægrotus. Quid igitur aliud cogitasse videri queat hic appellat⁹ Medic⁹, & cōfessus artifex, qui agrorum diætā ac victū adinuenit, quā ille qui ab initio omnib⁹ hominib⁹ victū quo nūc vtimur, ex agresti illo ac ferino reperit ac subornauit? Mihi equidē videtur idē modus, & vnū quoddā ac simile esse inuētū. Hic enim ea quæ natura humana sana superare nō potuit incidētia & ingesta, propter feritatem intēperatiāmque, ille verò qualicūq; tandē vnus cuiusque affectione teneretur, vt superare nō posset, eadem detrachere quæsiuit ac institit. Quid hoc ab illo differt? præterquā quod multiplicior & variegatior ac maioris negotij est hæc species. Verū principiū fuit illa quæ prius est producta. Si verò quis cōsideret quæ sit agrotorū diætā, cōparatione ad sanorū diætā facta, is inueniet hæc agris nocētiorē quā eā quæ ferarū est & aliorū animalijū sanis. Etenim vir laborās morbo

Sorbitionū
& potionū
inuentio.

Quid ob-
seruandum
medicis.

Cibus sano-
rum lāguē
tib. c. best.

Duorū ho-
rum nutri-
catuum dif-
ferentia.
Medicina
in Chirur-
giam, phar-
maceuticā,
& Diætite-
cen.

Ciborū cō-
paratio.

Hippocratis Liber

neq; difficili & intolerabili, neq; rursus leui & despicabili, si panē aut carnē, aut aliud quid ex his quæ sani edētes iuuantur, comedere volet, nō multū, sed multo minus quā sanus poterat, cōtingat autē vt nec sit qui eum delinquere admoneat. Alius contra sanus naturam habens non omnino debilem, neque rursus fortem, si comederit quid eorum quæ bos aut equus comedens iuuatur, & edat sane eruum aut ordeū, aut aliud quid huiuscemodi, non multum, sed multo minus quā potest. Sanus vtique qui hoc fecerit, minus, & dolebit & periclitabitur quā ægrotus ille, qui panē aut mazā intē pestiue ingessit. Hæc itaque omnia signa sunt, quod ipsa ars medica via ac methodo quæ sita inueniri possit. Si quidem igitur simpliciter, velut aliqui putant, quæ fortiora sunt, nocerent, quæ debiliora, prodesse & nutrire, tum agrū, tū sanum, facilis sanē res erat. Multum enim de securo detrāhere oportebat vt ad debilissimum deduceretur. Nūc autē non minus delictum, nec minus lædit hominem, si pauciora & defectuosiora quā satis est, assumantur. Fames enim magnā potentiā in naturā hominis habet & sanandi & debilitandi & occidendi. Multa verò etiam alia mala, diuersa quidem ab his quæ ex repletionē fiunt, non minus autem grauiā, vacuationis sunt, quapropter multo variegatior est, & maiorem diligentiā requirit. Oportet enim modū aliquem coniectare. Modum autem neque pondus, neque numerum aliquem, ad quem referas cognosces: certitudinem enim exactam nō reperiēs aliā quā corporis sensum. Quapropter operosum est ita exactē cōdiscere, vt parum in alterutrā partem delinquas: quanquā ego etiā cū medicum vehemēter laudarem, qui parum delinquat. Certitudinē autem exactā raro videre contingit. Quare plerique Medici eadē quæ maioribus rectoribus gubernatores in se admittere mihi videntur. Etenim illi quum in tranquillitate gubernantes delinquunt, non fiunt manifesti: quum verò deprehenderit ipsos ventus magnus & tempestas, palām iam cōspicui sunt omnibus hominibus, quod ignorantia & culpa erroris sui nauem perdiderūt. Sic sanē etiam mali & plurimi medici, quū curant homines nihil graue patiētes, in quos si quis etiam maximē delinquat, nihil graue faciat. Sunt autē multi tales morbi, & multo sepius quā graues hominib⁹ accidūt. In talibus sane delinquentes, non

quis erret
in ægrotis.

Medicos na
uiū rectori
bus compa
rat.

1. de sanp.

A tes, nō sunt manifesti idiotis hominibus. Vbi verò obtigerit magnus & fortis & periculosus morbus, tunc ipsorum delicta & ars omnibus in conspicuō sunt. Neque enim longè ab sunt singulorum pœnæ ac cruces, sed breui adsunt. Quod autem non minores afflictiones ab intempestiua vacuatione quàm à repletione hominibus cōtingant, probè discemus si in sanis rem expenderimus. Sunt itaque aliqui ipsorum qui semel in die cibum capere conducit, & hoc propter utilitatem sic observant. Alij etiam prandent, propter eandem necessitatem, sic enim ipsis conducit: Sed & quidam nō propter utilitatem, sed aut ob voluptatē, aut ob alium aliquem casum alterutrum faciunt. Plurimorū enim hominum nihil B interest vtrum tandem faciant, siue semel tantum edant siue etiam prandeant, hac consuetudine uti. Sunt autem quidam qui non possint extra utilitatem facientes facile degere, sed contingit vtrisque ipsorum, per diem vnum atque eum non ociosè permutatibus, immēsa afflictio. Alteri enim si pransi fuerint, idque eis non conducit, statim graues & corpore se-gnes fiunt, itēmq; mente pigri, hiatūq; ac oscitatione & dormitatione & siti pleni. Si verò etiam insuper cœnauerint, & flatus, & tormina, & aluus effringitur, & multis magni morbi principiū hoc fuit, si eosdē cibos quos semel insumere cōsueuerunt, bis assumant, & nihil his ampliūs. Alteri verò si prandere consueuerunt, idque ipsis conducit, & non pransi fuerint, mox vbi tēpus præterierit, statim impotentia vehē-mēs, tremor, animi deliquiū, postea oculi pallidi, vrina crassa & calida, os amarum, & viscera pendere ipsis videtur, vertigo, iracundia, tristitia, hæc autem omnia vbi cœnare tentauerint. deinde autē pransuri cōsumere nō possunt quæ prius cœnarunt. atq; hæc ipsa cū tormine ac strepitu descendētia aluum concludunt, ipsiq; agrè dormiunt, insomniāque conturbata ac tumultuosa habet, plerisq; verò etiam horū hoc magni morbi principium fuit. Cōsiderare porrò oportet ob quas causas hæc ipsis acciderūt. Et sanè puto his qui semel cibum sumere cōsueuerunt, quod nō expectauerunt iustū tempus, donec ipsorum vter prius ingestos cibos perfectè consumpsisset & exuperasset, euacuatusque esset ac quievisset, sed in feruentem adhuc & fermentatum novos ingesserunt. Eiusmodi autē ventres multò tardius concoquūt, & maiori

Quando error patet.

Sumendi cibi varietas.

Hæc eadē de omni re.

Cū hora cibi præterit, quid fiat videto.

Cur variè hi afficiantur.

opus habent cessatione ac quiete. His verò qui prandere af- **D**
sueti fuerunt, quòd nò vbi citissimè alimento corpus indige-
bat, & iam priora consumpta erant, nec habebat aliquā am-
plius fruitionem, statim ipsi nouum alimentum suppedita-
tum est: deficit autē & cōsumitur prae fame. Nā omnia quæ

Qui diu ci-
ho abstinet,
quid patia-
tur.

Curnō sem-
per in arte
medica at-
tingitur ve-
ritas.

Suppositū
hominis,
materiæve.

Hoc consi-
derato.

potissimū
auxilium.

tales homines perpeti dixi, fami imputo. Dico autem etiam
alios omnes homines, qui duos aut tres dies in ediam pertu-
lerint, eadem passuros esse, quæ de impransis dixi. Caterum
tales naturas quæ citò & fortiter eiusmodi delictis offendū-
tur, imbecilliores aliis esse censeo, proximus est autem im-
becillis languenti: verum imbecillior est languens, & plus
laborare contingit ipsum, vbi iustum tempus nò est assequu-
tus. Quum itaque eiusmodi exacta certitudo circa artē exi- **E**
stat, difficile est semper quod rectissimum est assequi. Multæ
autem species in Medicina ad tantam certitudinem perue-
niunt, de quibus dicetur. Non censeo itaque propter hoc ar-
tem velut non existentem, neq; probè inuestigatā, veterem
oportere reiici, quòd non habeat circa omnia certitudinem
exactā. Verum multò magis propterea quòd propinqua est
recto, simulque ratione possit ad ipsum peruenire, admirari
oportere censeo ea quæ ex multa ignoratiā sunt eruta & in-
uenta, quòd probè & rectè adinuenta sunt, & non à fortuna
aut casu. Porro ad eos qui nouo modo artē ex scopis ac fun-
damentis suppositis quærunt, sermonem reducere volo. Si
enim calidum est aut frigidum, aut siccū, aut humidū, quod
hominē lædit, & oportet rectè medentem auxiliari, calido **F**
quidem in frigidum permutato, frigido verò in calidum,
sicco in humidum, humido in siccum contingat mihi homo
non fortis naturæ, sed ex debilioribus, hic autem triticum
edat quod ex area sustulit crudum & nò elaboratum, & car-
nes crudas, & bibat aquam. Hoc victu vtens satis scio quòd
multa & grauiā perpetietur, Nam & doloribus vexabitur,
& corpus debile euadet, & venter corrūpetur, & multò tem-
pore viuere non poterit. Quòd igitur auxilium prapare
oportet sic habenti? calidum an frigidum, vel siccum, vel hu-
midū? simplex enim est quodcunq; ex istis. Si enim id quod
ipsum lædit aliquod ex his est, contrario soluere oportet ac
liberare, quæadmodū ipsorū sermo testatur. Atqui certissi-
mū & manifestissimū medicamentū est, victū quo utebatur
auferre

A auferre & pro tritico panem dare, pro crudis verò carnibus coctas, insupérq; vinum propinare. His permutatis impossibile est non fieri sanū, nisi penitus fuerit tēpore ac victu corruptus. Quid itaque dicemus? Num quòd ipsi à frigido afflicto calida hæc oblata auxiliū tulerunt, aut contrā? Equidem opinor me multam hæsitationem interrogato præbiturum esse. Nā qui panem ex tritico parauit, calidū, aut frigidum, aut siccum, aut humidū abstulit: panis enim & in ignem & in aquam datur, & multis aliis elaboratus est, quorum singula propriā vim & naturā habent, & aliqua quidem à natura in ipso existentia abiicit, aliis autē temperatur ac permiscetur. Sed & hoc scio, quòd in corpus hominis refert pa-

B nis purus, aut cui nihil furfurum decessit, & ex tritico nō decorticato aut decorticato, & multa aqua subactus, aut contrā, & superassatus aut crudior, aliāq; præterea infinita. Similiter etiam de maza, & singulorum adeò vires magnæ, alteraque alteri nihil simile habet. Quicumq; autē hæc nō considerans nō nouit, haud scio quo modo ille affectiones in homine cognoscere possit: ab vnoquoque enim horū afficitur & alteratur homo, vel hoc, vel alio modo, & ex his omnis vita & sano, & ex morbo cōualefcenti, & ægroto. Nihil igitur vtilius neque magis necessariū quàm hæc cognouisse: quòd & probè & cōuenienti ratiocinatione inuestigātes, iuxta hominis naturā hæc primi inuentores inuenerunt, iudicaueruntque artem dignā quæ deo adscriberetur, quemadmo-

C dum etiam est receptū. Non enim siccum neque humidum, neque calidum, neq; frigidum, neque aliud quicquam ex his putauerunt hominem lædere, neque aliquo horum homini opus esse opinati sunt, sed quòd in vnoquoque forte & humana natura potentius est, quòdque non possit superare, hoc ipsum lædere duxerunt: & hoc auferre quæsiuerunt. fortissimum autē est inter dulcia, dulcissimum, inter amara, amarissimum, inter acida, acidissimum. & in omnibus adeò rebus vigor ipse ac summū. Hæc enim & in homine inesse viderunt, & hominē lædere. Inest enim in homine & amarum & salsum, & dulce, & acidum, & acerbum, & fluidum, & alia infinita, omnigenas facultates habētia copiāque ac robur. Atque hæc quidē iuxta ac inter se temperata, neque conspi-

cua sunt, neque hominē lædūt. Vbi verò quid horū secretum

Panis differe-
rentia.

Maza.
Quæ pro-
spicienda
medico.

Quid spe-
tarint pri-
mi artis in-
uentores.

Quæ valen-
tissima.
Qui humo-
res succive
& sapores
sint in ho-
mine.

Quæ per-
turbent.

Qualis pa-
nis, puls, ma-
záve.

Calidū, hoc
vel contra
ne sit, cer-
tum nō est.

Quare hoc
calidum il-
lud contra
putatur.

fuerit, atque ipsum in seipso fuerit, tunc & conspicuum est, D
& hominē lædit. Quin & ex cibis quicunque nobis incom-
modi sunt, & ingesti hominē lædunt: horum vnusquisq; aut
amarus est & meracus ac intemperatus, aut falsus, aut aci-
dus, aut alius quis intemperatus & fortis: & propterea turba-
mur ab ipsis, quemadmodum etiā ab his quæ ex corpore ex-
cernuntur. Omnia autē quæ edit aut bibit homo, talia edu-
lia palām est minimē hoc intemperato, & dissidente ac ex-
cedente succo participare, velut sunt panis & maza & his si-
milis, quibus adfuetus est homo plurimis & semper vti: ex-
ceptis his quæ ad voluptatē ac delicias condiuntur ac præ-
parantur: & ab his plurimis in hominē ingestis turbatio ac
secretio corporis facultatū minimē cōtingit. Verum robur E
& augmentum, ac alimentū præsertim, per nihil aliud con-
tingit quā quod probe temperatum est, & nihil habet in-
temperatum, neque forte, sed totū vnum factum est & sim-
plex & non forte. Et valde sanē dubitō ego, quōnam modo
hi qui talē sermonem proferunt, & artem ex hac via ad sco-
pum abducunt, curaturi sint homines, quemadmodū propo-
nunt. Non enim est ipsis, velut ego opinor, inuentum quid,
ipsum in seipso calidum, aut frigidū, aut siccum, aut humi-
dum, quod nulla alia specie communicaret. Verū arbitror
eosdem potus ac cibos ipsis esse, quibus omnes vtimur. Ap-
ponunt autem alij quidem, quod sit calidus, alij frigidus, alij
quod siccus, alij humidus. Quoniā illud sanē dubium est, im-
perare agroto calidum quid assumere: statim enim interro- F
gabit quid sit illud, vt nugas producere necesse sit, aut ad ali-
quid eorum quæ sunt cōfugere. Si autem est calidum quod-
dam acerbum existēs, aliud vero calidum fluidum, aliud ca-
lidum tenue, sunt enim & alia calida etiam alias vires sub-
contrarias sibi ipsis habentia, quod igitur ipsorum assumere
oportebit? calidum & acerbum, an calidum & fluidum, aut
simul frigidum & acerbum? Nam & hoc est, itēque frigi-
dum & fluidum. Etenim quod ego scio, totum cōtrarium ab
vtroque ipsorum euenit, idque nō solum in homine, sed etiā
in corio ac ligno, & aliis multis rebus quæ magis stupidum
sensum habent quā homo. Non enim calidū est quod ma-
gnam vim habet, sed ipsum acerbum & fluidum, & alia quæ
à me relata sunt, tum in homine, tum extra hominem, siue
edantur,

A edantur, siue bibantur, siue forinsecus illinantur, aut quomodocunque formata adhibeantur. Frigiditatem autem & caliditatem ego omnium facultatum minimè potentes esse in corpore existimo, ob has sanè causas. Quo equidem tempore ipsa inter se permixta simul frigidum ac calidum fuerint, non lædunt. Temperamentum enim & moderatio contingit frigido à calido, & vicissim calido à frigido. Vbi verò seorsim vtrunque secretum fuerit, tunc affligit. In hoc itaque tempore quum frigidum intus generatur, & cito hominem affligit, primum propter hoc ipsum adest calidum inde adeò ex homine ipso, nullo alio auxilio, neque præparatione opus habens, atque hoc & in sanis hominibus & in

Contraria
cōmixta nō
lædunt.

B ægrotis operatur. Itaque si quis sanus hyeme corpus perfrigerare velit, aut frigidæ lotionē, aut alio quopiam modo, quanto id amplius fecerit, si modo non omnino corpus congeletur, ubi vestimēta acceperit, & sub tegmen venerit, magis & amplius corpore calescit. Rursus si quis fortiter cal fieri velit, aut calido lauacro, aut multo igne, inde verò eandem vestem habens in eodem loco conuersari, in quo perfrigeratus, multo apparebit frigidior, & longe horridior, quàm aliquis qui præ estu ventilationem admisit, & sibi ipsi frigus præparauit, atque sic ex hoc modo recreatus est. Nam qui hoc facit, decuplo maiorem æstum ac ardorem percipit, quàm is qui nihil tale facit. Verum sunt adhuc testimo-

Qui calor,
& frigus
cōcipiatur.

C iter facientes, excellenter frigescent aut pedibus aut manibus aut capite, ubi se continuerint in noctem, quum cooperiti fuerint & in tepore extiterint, ab æstu & pruritu vexantur, quibusdam etiam bullæ velut ambustis ab igne exurgunt, neque prius hoc patiuntur quàm calfiant: adeò promptè vtrunque ipsorum ad alterum accedit. possem & alia innumera recensere. Cæterum circa ægrotos, nōne quibus rigor contingit, his acutissima febris relucet? sed non adeò fortiter, verum pauco tempore quiescens, & aliàs ferè innoxia, & quo tempore affuerit, percalida, & per totum corpus penetrans, desinens maximè in pedes, ubi sanè rigor & frigus validissimum diutissimè durauit. Rursus quum sudor prodierit & febris decesserit, multò magis frigescit æger, quàm si ne apprehendisset quidem ab

Quid per
niues ge-
lūque eun-
tibus eue-
niat.

b s initio.

Quorum
morbū ca-
lor nō sta-
tim cessat.

Destillatio
num signa.

Destillatio
nes oculo-
rum.

initio. Cui igitur breui adeo contrarium accedit, cuique vis **D**
adimitur sua sponte, quidnam ab hoc malum aut graue
fiat? aut quid opus est multo ad hoc auxilio? Verum dixe-
rit aliquis, Qui ardenti febre febricitant, itemque peri-
pneumoniis, & aliis fortibus morbis, non cito ex calore li-
berantur, neque adest hic frigidum aduersus calidum. Atqui
ego hoc maximum signum esse puto, quod non propter ca-
lidum simpliciter homines febricitent, neque hoc sit sim-
pliciter afflictionis causa: sed est & amarum ac calidum
idem, & calidum ac acidum, & falsum ac calidum, & alia
infinita, & rursus frigidum cum aliis facultatibus coniu-
ctum. hæc itaque sunt quæ lædunt, simul adest autem & ca-
lidum robore participans, nimirum ducens & exacerbans **E**
& augens simul cum illis, verum nullam potentiam, maio-
rem quam conuenit videlicet, habens. Atque hæc quidem
sic se habent. Signa porro primum quidem manifestissima
producemus, quorum omnes iam sæpe experientiam sum-
psimus. Itaque quibuscunque nostrum grauedo innascitur,
& fluxus per nares mouetur, hic ut plurimum acrior est eo
qui prius erat, & quotidie ex naribus prodibat, & tumesce-
re facit nasum, & exurit calentem & extremè ignitum. si ve-
rò manum admoueas, & diutius perseuerauerit, etiam exul-
ceratur locus minimè carnosus & durus existens. Sedatur
autem aliquo modo ardor in naribus, non quum fluxus
prodit, & inflammatio consistit: sed postquam fluxus cras-
sior & minus acris, concoctusque & magis permixtus prio- **F**
re fuerit, tunc sanè iam etiam ardor cessat. Rursus autem
aliis ex frigidity ipsa sola manifestè grauedo fit, nullo
alio accedente. Omnibus autem liberatio hæc est, ut ex fri-
giditate quidem affecti percalfiant, ex ardore verò perfri-
gerentur, atque hæc breui accedunt, & concoctione nulla
opus habent. Reliquæ autem omnes fluxiones quas pro-
pter humorum acrimonias & intemperantias ego fieri sen-
tio, restituuntur & curantur, ubi temperatæ fuerint & con-
coctæ. Rursus quæcunque fluxiones ad oculos vertuntur ut
fortes & omnigenas acrimonias habentes, exulcerant qui-
dem palpebras, erodunt autem aliquorum genas, & sub
oculis partes ad quasque tandem influxerint, rumpunt
etiam & peredunt eam quæ oculum ambit tunicam. dolores
autem

A autem & ardor, & inflammatio extrema adfunt aliquandiu, **Causa Rheuma.**
donec fluxiones fuerint concoctæ, & crassiores redditæ, & lemæ ab ipsis extiterint. Fit autem concoctio, ex permixtione, temperaturæque mutua, & quasi coctura.

Quinetiam fluxiones in fauces delabentes, ex quibus raucedines fiunt, angina, erysipelata, peripneumoniæ: Omnes hæc primùm quidem falsæ & humidæ acrisque descendunt, & in talibus morbi firmantur. Vbi verò crassiores & maturiores factæ fuerint, & ab omni acrimonia liberatæ, tunc iam & febres, & alia hominem lædētia soluantur. Oportet autem utique causas vniuscuiusque ea putare, quæ quum adfunt, talem

Causa horum malorum.

B peramentum, cessare. Quando igitur ab ipsa caliditate sincera, aut frigiditate fluxiones contigerint, & nulla alia facultate participauerint, sic sanè sedabuntur, vbi ex frigido in calidum permutatæ fuerint, & ex calido in frigidum. Permutantur autem eo quem dixi modo. Amplius porrò etiam alia quæcunque mala homo patitur, omnia à facultatum potentiis proficiuntur. Itaque quum amaritudo quædam diffusa fuerit, quam bilem flauam appellare solemus, quales statim anxietates & æstus & impotentia occupant? Verùm vbi liberati fuerimus ab illa & purgati, aut sponte, aut per medicamentum, si modò tempestiue quid ipsorum fiat, manifestè & à doloribus & à calore liberamur.

Mala homini vnde accidunt.

C autem tempore eadem eleuata fuerit, & cruda & meraca ac intemperata, nulla arte neque dolores, neque febres sedare possis. Et quos quidem acuta acrisque ac æruginosa bilis affligit, quales mox rabies, & morsus viscerum ac pectoris, & desperatio? Non sedantur autem hæc priusquam eadem expurgetur & prosteratur, & aliis permisceatur. Concoqui autem & permutari, attenuarique ac crassescere in humorum speciem, per multas & omnigenas species contingit. Quapropter & iudicationes, & numeri temporum, in talibus multum possunt. Hæc verò omnia minimè contingit calidum aut frigidum perpeti. neque enim hoc putrescere neque crassescere poterit. Quid autem ipsum esse diceremus? & temperamentum ipsorum est, veruntamen inter ipsa mutuo vim habens, quoniam nulli alij permixtum calidum, desinit esse calidum,

ἀπορία

Calor & frigus non putrescit.

quàm

Quæ in ho-
mine mi-
stio bona.

Hominis
bona dispo-
sicio.

Quid oportet
medicos scire.

Quid sit
homo, &
quomodo
gignatur,
sciat medi-
cus.

Casus esu
malus.

Temeton
bonum non
est.

Casus ma-
lus est.

quàm frigido: sic rursus non permutatur alio frigidum quàm D
calido. Reliqua omnia in homine, quantò pluribus miscen-
tur, tantò mitiora ac meliora fiunt. At verò homo omnium
optimè dispositus est, ubi concoquit & in quiete est, nullā pe-
culiarem vim præ se ferens. De his igitur videor mihi abun-
dè demonstrationem fecisse. Porro Medici quidam itémque
Sophistæ dicunt, quòd impossibile est medicinam cognosce-
re, eum qui non nouit quid sit homo, & quomodo primùm
factus & compactus sit. Ego verò ea quæ alicui Sophistæ aut
Medico, de natura dicta sunt aut scripta, minùs censeo medi-
cæ arti conuenire quàm pictoriæ. Iudico autem de natura
aliquid manifestum ac euident cognoscere, ex nulla parte
aliunde contingere quàm ex Medicina, atque hoc tunc con- E
discere possibile est, ubi quis ipsam medicinam totam rectè
comprehenderit. Verùm quatenus illi prodiderunt, multi
mihi cognouisse videntur, cognouisse autem dico, narratio-
nem scilicet hanc, Quid est homo, & ob quas causas nasci-
tur, & reliqua diligenter. Atqui mihi necessarium esse vide-
tur, ut omnis Medicus de natura sciat, & omni studio anni-
tatur ut cognoscat, si modo aliquid eorum quæ fieri debent
rectè præstare velit, Quid est homo ad ea quæ comeduntur
ac bibuntur cõparatus, & quid cuique ab vnoquoque contin-
get & accidet, & non simpliciter sic existimare, quòd malum
edulium est caseus. Dolorem enim affert repleto ex ipso. Sed
quem dolorem, & propter quid, & cui parti intra hominem
existenti incommodum existit. Nam & alia multa edulia ac F
pocula natura mala sunt, & afficiunt hominem non eodem
modo. Proferatur autè mihi verbi causa aliquid, velut Vi-
num meracum multum potum hominem aliquo modo de-
bilem reddit, & omnes, qui viderint hoc fatentur & cognos-
cunt, quod hæc est vis vini, & quod ipsum est causa, & in quas
in homine partes maximè possit, nouimus. Talem itaq; ve-
ritatem etiam de aliis ostendere volo. Etenim caseus (quan-
doquidem hunc in exemplū adsumpsi) non omnes homines
ledit, sed sunt qui ex ipso repleti, ne tantillum quidem offen-
duntur, imo gracilibus mirabiliter etiam cõferre proditur.
Sunt autem qui difficulter sum mouentes ipsum ab eo libe-
rantur. Horum verò naturæ differunt, differuntq; etiã iuxta
hoc quod est in corpore caseo cõtrarium. Nam à caseo exci-
tatur

Atatur & cōmouetur, in his quibus eiusmodi humor multus in corpore existit, & quo magis hic potens est, eo magis verisimile est ipsos malè affligi. Si verò toti humanæ naturæ malus esset, omnes vtique læderet. Hæc autem si quis nouisset, non incurreret ea neq; sanè pateretur. In refectionibus conualescentium ex morbis, insupérq; in longis ægritudinibus, multæ conturbationes & præuaricationes fiunt, partim sua sponte, partim à quibuslibet temere admissis. Noui autem medicos multos velut idiotas, qui vbi illi die aliqua noui quippiam fecissent, velut si lauissent, aut deambulassent, aut quid alienum comedissent, atq; hæc omnia melius esset adhibuisse quàm non, nihilominus tamen causam alicui ex his contribuebant, verà quidem causam ignorantes, & fortassis

Bid quod commodissimū erat damnantes. Quod ipsum certe facere non oportet, sed scire quid balneū intempestiue adhibitum operetur, quid item fatigatio & lassitudo. Nunquam enim eadem afflictio ab his prouenit, neque etiam ex repletione, neque ex cibo tali vel tali. Quisquis igitur hæc non cognoscet quomodo singula se habeāt ad hominem comparata, is neque cognoscere quæ ab ipsis fiunt potest, neque rectè vti. Caterū & hæc cognoscere oportere mihi videntur, nimirum quæ affectiones homini ex facultatibus ac potētis, quæ item ex figuris adueniūt. Quod autem dico tale est, Nempe facultatem quidem esse, humorum summas vires ac robur nosse. Figuras autem dico quæ in ipso homine insunt. Aliæ

Cenim cauæ sunt, & ex amplitudine in arctū coactæ, aliæ expansæ, aliæ solidæ & rotundæ, aliæ latæ & peniles, aliæ extensæ, aliæ longæ, aliæ densæ, aliæ raræ & hiantes, aliæ spongiformes ac molles. Quæ igitur ex his trahere ad sese allicerèq; humiditatē ex reliquo corpore maximè possunt? Num cauæ & expansæ, an solidæ & rotundæ, aut cauæ & in arctum ex amplitudine coactæ? Equidem puto tales esse, quæ ex cavitatē & amplitudine in arctum sunt coactæ. Id quod ex manifestis forinsecus condiscere oportet, partim quidem quod ore hians nihil sanè humoris attraxeris, vbi verò labra foras produxeris, contraxerisq; ac compresseris, insupérque fistulam admoueris, facilè sanè attraxeris quicquid volueris. partim verò quod cucurbitæ quæ corpori adponi solent, ex amplitudine in angustiam arctatæ ad hoc factæ sunt, ad trahendum

Medico
quid pro-
spiciendū.

παθήμα-
τα.
διωκται
σχέματα.
χυμός.

Figura
schematá-
ve.

Patentia
non sorbēt.

Cucurbi-
tulæ forma
cur talis.

Hippocratis Liber

dum videlicet & alliciendum ex carne. Sunt autem & alia **D**
Caput, vesica & vterus. multa eiusmodi. Verum intra hominem natura & figura
 talia, sunt vesica, & caput, & vterus in mulieribus: atque hæc
 manifestè maximè trahunt, & semper plena sunt attractæ
 humiditatis. At verò cavæ & expansæ figuræ, influentem qui-
 dem humorem maximè omnium susceperint, non autem si-
 militer attraxerint. Solidæ autem & rotundæ, neque attra-
 xerint, neq; susceperint: dilabitur enim & non habet sedem,
Lien, pulmo, & mamma. in qua maneat. Spongiformes verò & molles, velut lien, pul-
 mo, & mamma, ubi admotæ maximè fuerint & adhæserint,
 ebibunt, duræque fiunt ac augescunt humore accedente, ma-
 ximè pulmo. Non enim in vetriculo inest, in quo humorem **E**
 extrinsecus contineat ipse ventriculus in quo est humor, ut
 quotidie exhauriatur, sed quum biberit & susceperit ipse in
 seipsum humorem, & vacua & rara ac parva penitus explen-
 tur, & pro raro ac molli, durus ac densus euadit, & neq; con-
 coquit, neque dimittit. Atque hæc patitur propter figuræ na-
 turam. Quæcunque autem flatum & reuolutiones operatur
 in corpore, ea in cauis ac amplis, veluti vêtre ac pectore, stre-
 pitum ac sonitū facere solent. Etenim quod non sic repleant
 ut stent, sed habent transmutationes & motus, necesse est ut
 ab ipsis & strepitus & manifestæ commotiones fiant. Quæ-
 cunq; verò carnosæ sunt & mollia, in talibus torpores & ex-
 crescentia, velut in trucidatis fiunt. Cæterum quum incide-
 rit flatus in latum ac renitens, & aliquid ipsi restiterit, idque **F**
 natura fuerit neque forte, ut aduersus violentiam durare
 possit, & nihil mali pati: neque molle & rarum, ut excipere
 ac cedere queat: verum tenerum & floridum & sanguineum
Hepar. Flatus quid agat. ac densum, velut hepar, quod propter densitatem quidem ac
 latitudinem resistit ac non cedit, flatus verò subiens augescit
 ac fortior euadit, & aduersum reluctans maximè impetum
 facit. propter teneritudinem autem & sanguineitatem, absque
 doloribus esse non potest, & propter has causas, dolores acu-
 tissimi ac frequentissimi circa eum locum contingunt, sup-
 purationesq; ac tubercula plurima. Fiunt etiam circa septum
Dolor vnde. transversum fortiter, sed multominus. Distentio enim septi
 transversi lata est & renitens, natura autē nervosior & robu-
 stior, quapropter minus dolore affligitur: fiunt tamen & do-
 lores & tubercula circa ipsum. Multæ verò etiam aliæ & ex-
 tra &

Atra & intra corpus figurarum species sunt, quæ magnopere inter se differunt: quod ad affectiones pertinet, tum agroto, tum sano: velut capita parua aut magna, colla tenuia aut crassa, longa aut breuia, ventres longi aut rotundi, pectoris & costarum latitudines aut angustia, & alia infinita, quæ omnia nosse oportet quatenus differant, quo causas singulorum cognitas probè obserues. De potētis autem humorum perspectum habere oportet, quid singuli ipsorum in homine facere possint quemadmodum etiam prius dictū est, quomodo cognationes inter se habeant. Quod dico tale est, An videlicet dulcis humor in aliam speciem mutetur, non à contemperamento, sed ipse desciscēs & immutatus ab eo, qualis primū fuerat, amarus aut salus, aut acerbus, aut acidus. Sit sanè acidus. Ergo acidus humor reliquos præcellens, maximè incommodus fuerit: si utique dulcis, omnium commodissimus existit. Id quod si quis forinsecus quærens consequi possit, is semper quod melius est ex omnibus eligere queat. Optimū autem est, quod longissimè ab incommodo abest.

Capitis & colli differentia.

Succorum saporūve consideratio.


HIPPOCRATIS

COI LIBER DE MEDICO,

IANO CORNARIO MEDICO PHYSICO

INTERPRETE.

C



IC LIBER Medici gubernatio est, & præceptum quomodo officinam medicam instruere oportet. Medici equidem gubernationem esse putamus, ut videat quo bono colore, & bona, ac carnosa corporis habitudine præditus sit, iuxta existentem in ipso naturā. Vulgus enim existimat eos, qui nō sic bene dispositum corpus habent, neque aliis bene prospicere posse. Deinde ut opinionem capter apud ipsum vulgus vestitu decoro, & vnguentis odoratis, non suspectum odorem ad omnia habentibus. Inde enim agrotos iucunde affici contingit. Postea animaduertere

Medicus: qualis esse debeat.

Quo gestu
adecundus
est æger.

Qualis de-
beat esse
medicus.

Quid pri-
mum obser-
uet medi-
cus.

Luminis
ratio.

Luxum
domesticū
prohibet.
Linteola.

uertere ipsum oportet ut animum habeat modestum, non D
solum quod ad taciturnitatem attinet, sed etiam circa reli-
quam vitam probe compositum. Maxime enim ad opinio-
nem ac auctoritatem comparandam conducit, bonis ac hone-
stis moribus præditum esse. Nam quum talis fuerit, omni-
bus venerandus ac humanus iudicabitur. Promptitudo enim
temeraria, & facilitas contemnentur, etiam si valde com-
moda existant. Scopum autem præfigere oportet potesta-
tem facultatum suarum. Nam eadem ab iisdem non abun-
dantibus boni consuluntur. Figuram faciei habeat medita-
bundam ac subtristem, non tamen amarulentè. Contumax
enim esse videbitur & homines odio habens. Qui verò in-
risum exolutus est, ac nimium hilaris, onerosus iudicatur. E
Hoc itaque vitandum est, vel maxime. Iustum autem ad om-
nem conuersationem esse conuenit. Iustitia enim mul-
tum auxiliatur. Non exigua autem commercia agris cum
medico sunt. Nam seipsum medicis subditos faciunt, & omni
hora vxoribus, virginibus, & opibus maximi pretij, illi oc-
currunt. continenter igitur ad omnia hæc se habere oportet
animo itaque ac corpore sic dispositum esse conuenit. Porro
præcepta ad artem medicam, per quæ artificiosus esse vide-
bitur, ab initio considerabimus, ex quo primum homo di-
scere incipit. Quæ igitur in officinâ medica curantur, ferè
ad discentes pertinent. Primum quidem locum domus ha-
bere oportet, qui sanè talis sit, ut neque ventus ad ipsum ac-
cedens molestus sit, neque Sol, neque splendor infestet. Lux F
enim splendida medentibus quidem non est molesta, non si-
militer autem ægrotantibus. Itaque talem splendorem pe-
nititus fugere oportet, per quem oculos ægrotare contingit.
Tale igitur præceptum de luce obseruetur. Deinde ut nequa-
quam faciem aduersam splendori habeat. Infestat enim vi-
sum debilem, omnis autem occasio sufficiens est ad debiles
oculos conturbandos. Luce itaque hoc modo utendum est. Sel-
læ autem æquales altitudine sint quatum eius fieri potest, ut
in ipsis ægri collocentur. Aeramento exceptis instrumentis,
nullo utatur. Ornatus enim onerosus mihi esse videtur, tali-
bus vasis uti, Aqua exhibenda est agris potabilis & pura. Ex-
terforiis utendum est puris ac mollibus, ad oculos quidem,
lintheis, ad vulnera verò, spongiis. hæc enim per se probe au-
xiliari

A xiliari videntur. Omnia autem ritè fabrefacta ad vsum esse *Instrumēta* oportet, magnitudine, grauitate, ac tenuitate. Quæ verò offeruntur omnia considerare oportet vt conferāt, maximè si ægrotæ parti adhibebuntur. Talia autem sunt, ligamenta & *Quæ vul-* medicamenta, & lintea circa vulnus, & cataplasmata. hæc *nera po-* enim lōgissimo tempore circa ægrotantes locos sunt. At ve- *scant.* rò ablatio horum, refrigeratioque ac mundificatio & aquarum affusio, pauco tempore absoluuntur. Diligenter autem considerare quid horum faciendum sit oportet, & vbi magis aut minus ea adhibere conuenit. Vtrorūque enim vsus opportunis, itēque negligentia, magnam differētiam habet.

B Est autē propria & genuina medicinæ deligatio, ex qua æ- *Deligatio.* ger opē sentit. Maximè autem profunt duo hæc, quibus vtendum est, cōprimere videlicet vbi oportet, & remissè deligare. *Duo quæ his profūt.* Iuxta horæ verò tempus, quando integrè oporteat & nō, videndum est, vt neque debili, neque fortiore alterum horū vtaris. Concinnas autem deligationes ad spectaculum comparatas, & nihil iuuantes, reprobare oportet. *Onerosæ enim sunt, & omnino petulantes, sæpe verò etiam damnum dederunt.* Quærit autem æger non ornatum, sed auxilium. Cæterum in chirurgis quæ per sectionem aut vstionem fiunt, *Sectio, v-* *locitas ac tarditas æqualem laudem merētur. Est enim vtri-* *stioque.* *usque vsus. Nam in quibus per vnicam sectionem chirurgia absoluitur, velocem dissectionem facere oportet. cū enim contingat eos qui secantur dolere, id quod dolorem affert, quàm minimo tempore adesse conuenit, quod ipsum continget veloci sectione facta. Vbi verò multas sectiones fieri necesse est, tarda chirurgia vtendum est. Velox enim continuū & multum dolorem inducit. Tardus verò & intermittēs, requiem aliquam his qui curantur: exhibet. Idem de instrumētis quoque dici potest, Gladiolis enim acutis ac latis vti, non in omnibus similiter præcipimus. Nam partes quædam sunt *Missio san-* corporis, quæ celerem sanguinis fluxum habent, & non faci- *guinis vbi* *le est eum sistere. Tales autem sunt varices, & quædam aliæ & quando* *facienda.* *venæ. Itaque in talibus angustas sectiones facere oportet, ne que enim possibile est, vt fluxus in his sistatur. Conducit autem aliquando à talibus sanguinis detractionem facere. At verò ad locos non periculosos, & circa quos non tenuis est sanguis, latioribus gladiolis vtendum est: sic enim sanguis* *prodie**

Cucurbitu-
la modus.

me Gal.

de cucur

lib. 12

Cum locus
cucurbitu-
la admotus
aperit quid
agas.

n fac

captatio ve-
narum bra-
chij.

prodierit, aliter nequaquam. valde autem turpe est non con-
tingere à chirurgia quod velis. Cucurbitarum porro duo
modi commodi existunt. Quando enim fluxus procul ab ap-
parente carne compactus fuerit, circulum ipsius breuem ef-
fe oportet, ipsamque non ventrosam, sed prolixam parte ad
manum vergente, non grauem. Quæ enim talis est, in dire-
ctum trahet, & serolos humores separatos ac distantes pro-
bè ad carnem attrahet. Maiore autem dolore per carnem
disperfo, in reliquis quidem consimilem cucurbitam esse o-
portet, sed circulum magnū. Sic enim ex plurimis partibus
id quod dolorem facit educere comperies, ad locum conue-
nientem. Neque enim magnum esse circulum putat, si non
ex pluribus locis caro comprehendatur ac contrahatur. At si
gravis sit, ad supernos locos repit, infernè autem magis de-
tractionem facit, ut sæpe morbi relinquuntur. Lati itaq; cir-
culi, vnà cum incumbuntibus fluxionibus, & longè distanti-
bus à supernis locis, multa simul attrahunt de alia carne. Cō-
tingit igitur humiditatem inde detractam, apponi collecto
infernè sub cucurbita seroso humori, & quæ quidē infestāt,
relinqui: quæ verò nihil molestant, detrahi. Magnitudinem
porro cucurbitæ quæ cōmoda sit, iuxta corporis partes qui-
bus admoovere oportuerit, coniectare oportet. Vbi verò sca-
rificationem subter cucurbitam adhibere velis, sanguinem
scarificandorū locorum conspicuum esse oportet, aliàs neq;
circulum attractum scarificare ac pertūdere oportet. Debi-
lior enim est caro loci dolore affecti. Scalpris autem incur-
uis, in summo non valde angustis vtendum est. Aliquando
enim serosi ac saniosi humores viscosi ac crassi veniunt: pe-
riculum igitur est, ne in fissuris substent, vbi arctæ fuerint
incussæ. Porro venas in brachiis, funiculorum apprehensio-
nibus constringere oportet. Caro enim contegens in multis
non probè coaptata est venæ, vbi enim lubrica fuerit caro,
non cōtingit sectiones vtrorumque iuxta seipsas fieri. Nam
venam contactam insufflari contingit, & sanguinis fluxum
impediri. multis verò etiam propter hoc pus congregatur.
Quapropter duo nocumenta talis chirurgia inducit, secto
quidem dolorem, secanti verò multam ignominiam. Idem
in omnibus venis fieri præceptum est. Hæc quidē igitur ne-
cessaria sunt in officina medica instrumēta, & circa quorum
vsum

A vsus artificiosum esse oportet addiscētem. Volsellis autem Volsellis.
 tum dētium, tum vuarum, quilibet vti potest. simplex enim
 vsus ipsorum esse videtur. Ceterum de tuberculis & vlceri-
 bus quæ maiorum morborum sunt, amplius videndum est.
 Tubercula equidem deprehendere & dissoluere posse, maxi-
 mē artificiosum habetur, itēq; collectiones ipsorum impe-
 dire. Consequens est, ea in conspicuum & quā breuissimū
 locum contrahere, & compagem ipsam æqualem per totum
 tuberculum facere: vbi enim inæqualiter se habuerit, pericu-
 lum est vt rūpatur, & vlcus agrē curabile reddatur. ex æqua-
 re itaq; oportet similiterq; totū maturū facere & neq; prius
 diducere, neque sinere vt sponte rūpatur. Quæ verò maturū
 facere æqualiter possunt, in aliis libris relata sunt. At verò vl
 cera quatuor vias habere videtur. Vnā in profundū, hæc au-
 tem sunt fistulosa, & quæ sanie plena sunt, ac intus excauata.
 Alteram in altum, quæ videlicet carne superexcrescunt. Ter-
 tiā via est in latitudinē, atq; hæc sunt quæ appellātur serpi-
 ginosa. Quarta via est quæ sola secundum naturam motus
 esse videtur. Carnis itaque calamitates hæc sunt, omnes autē
 communem rationem habent ad hoc quod ipsis conducit: &
 signa quidem horum in aliis relata sunt, itēq; qua vtendū
 sit curatione, per quæ autem concretum dissoluatur, simili-
 tēq; id quod carne excrescente repletum, aut cauum factum
 est, aut quod in latitudinē iter fecit, de his omnibus in aliis
 scriptis nostris abundē dictū est. Amplius verò de Cataplas-
 matis sic res habet. Linteorum quæ imponuntur ac indūtur
 alicubi in morbo, vsus exactus esse videtur, & est sanē vlceri
 conueniēs linteolorum impositio. Verū cataplasmate per
 ambitum vlceris vtaris. Nam hīc vsus cataplasmatismatis & ar-
 tificiosus est, & multum prodesse potest. Videtur enim vlceri
 opitulari vis eorum quæ circumponātur Linteum autē con-
 terendum est ac emolliendum. Verū partibus extra vul-
 nus circūsitis cataplasma prodest. Talem igitur ipsorū vsus
 esse oportet. Porro de temporum occasionibus, quando sin-
 gulis horum vtendum est, & quomodo prescriptorum vires
 condiscere oporteat, in præsens relictum est. Talia enim lon-
 gē præstātissima in studio Medicinæ sunt, & procul in arte
 iam progressi existunt. His consequens est chirurgia vulne-
 rum in militia acceptorū, circa extractionē telorum. Nam ratio.

Vlcerū qua-
tuor viae.

Vlcerū vul-
nerūve mu-
tilacuratio.

Quæ præ-
termittat,
perpende.

Militarium
vulnerū cu-

Hippocratis Liber

Signa inhe-
rentium te-
lorum.

in vrbis conuersationibus modicus horū vsus existit. Ra- D
ro enim per omne tempus ciuiles ac hostiles expeditiones
fiunt. huiusmodi autem sæpe ac frequentissimè circa exter-
nas militias fieri solent. Qui igitur hac chirurgia vti volet,
eum militare oportet, & externos exercitus sequi. Sic enim
exercitatus fieri poterit ad eiusmodi vsu ac necessitatem.
Quòd verò circa hæc artificiosissimum esse mihi videtur, re-
feretur. Etenim signa exquirere ac inuenire telorum in cor-
pore existentium, maxima artis & chirurgiæ huc pertinen-
tis pars existit. Vbi enim hoc cognitum fuerit, non relinqui
potest vulneratus ex ignorantia neglectus, quum non conue-
nienter tractetur. Solus autem is qui signorum expertus est
hanc chirurgiam ritè aggredietur. Verum de his omnibus E
in aliis scriptum habetur.

HIPPOCRATIS

COI LIBER DE DECEN-

TI ORNATV, IANO COR-

NARIO MEDICO PHY-

SICO INTER-

PRETE.

*

Disciplina
nulla pro-
batur, nisi
quæ ad vi-
tam huma-
nam facit.



ON sine ratione faciunt, qui sapien- F
tiam ad multa vtilem esse præten-
dunt, eam videlicet quæ inter homi-
nes existit. Multæ enim ad superflua
curiositatem factæ apparent, dico
autem eas quæ de nulla re vtili dif-
ferunt. Assumi autem vtique pos-
sunt etiam harū partes ad illas, vel
propterea quòd neque ociositas est,
neque malitia. Ocium enim & ignauia malitiā quærunt, &
ad eam distrahuntur, vigilantia verò & mens ad aliquid in-
tentata, trahunt ad se quid eorū quæ ad vitæ honestatē perti-
nent, etiam ex disputationibus ni hil vtile tractantibus. Gra-
tiosior

- A** tiosior est enim sapientia, & ab aliis quibusdā in artem constituta, artem videlicet ad parandū honestum ornatū ac opinionem. Omnes enim non cū turpi lucro & turpitudine consistunt. Et illis methodus quādā est artificialis quæ operatur: quod si non innocēter fiat, raptores sunt. adolescentes enim in ipsos incidunt, verū in vigore constituti, propter verecundiam, videntes ipsos idiotas ducunt. Senes verò propter amarulentiam, legislationē in ipsos cōstituunt, ex ciuitatibus videlicet expulsionem. Hi enim sunt qui fora frequentant, ruditate ac inscitia sua imponentes, & in circulis ciuitatum versantes. Cognouerit autē quis ex vestitu & aliis lineamentis. Quamuis enim fuerint splendide ornati, multò
- B** magis fugiendi sunt, & à cōspicientibus odio habendi. Qui verò cōtrario modo se gerunt, frugi homines iudicādi sunt, quibus nō est excogitatus apparatus, neque superflua curiositas. Ex vestitu enim cognoscēs, & decenti in ipso ornatu ac frugalitate, non ad superfluitatem parato, sed magis ad bonam opinionem, & meditationem, animūmq; intra se compositum, & ad profectiōē. Imò quocunque vestitu ac ornatu, tales sunt minimē diffuentes, non curiosi, amarulenti ad occursum & obuiam itiones, appositi ad responsiones, graues aduersus resistentes, ad sui similes solertes, & familiares, ac affabiles, temperati ad omnes, ad seditiōes taciturni, ad tacendum animo obfirmato & continētes, ad tempus appositi, & ad occasionem arripiendā accommodati, ad victū frugales & cōtenti, patientes ad temporis expectationem, ad sermones expediti, omne demonstratum proferentes, suauiloquentia vtentes, gratiis affecti, & gloria horum omniū corroborati ac fortificati, ad veritatem ac demonstrationē audentes ac confisi. Principalissimum quidem igitur horum omnium prädicatorū est. Natura. Nā si hæc affuerit his qui artibus animū applicant, per omnia prädicta penetrare poterunt. Incognita enim vtilitas, tum in sapiētia, tum in arte adhibita, ad principium capiendum edoceri potest. Natura autem defluit & confunditur cū sapientia, ad cognoscendum ea quæ ab ipsa natura facta sunt. Etenim in vtrisque sermonibus multi conuicti, nullatenus vtrisque rebus vti sunt ad demonstrationem. postquam igitur quispiam ipsorū expenderit ad veritatem ea quæ rerulimus, nullatenus naturæ

Artes quæ
probandæ.

Dux natura
in cunctis
est.

bona ipsi procedent. Comperiuntur itaque hi non confimi-
li cum illis via progressi, quapropter denudati, omnem in-
duunt maliciam ac ignominiam. honestus est enim ex opere

Quid ars. quod quis edoctus est sermo. Quicquid enim artificiosè fa-
ctum est, ex ratione prolatum est ac productum. Quicquid autem
artificiosè dictum est, non autem factum, methodi inartificia-
lis demonstratiuum existit. Nam putare quidem non autem
facere, ignorantiae & inartificialitatis signum est. Opinio enim
maxime in medicina in crimen vertitur eam adhibentibus:

**Persuasio
in his peri-
culosa.**

**Cognitio
vera quid
faciat.**

**Medicus
philosophus
est deo æ-
qualis.
Sapientia
qualis.**

**Medicus
deos potis-
simum co-
lit.**

his verò qui ea in se vti sunt, perniciem affert. Etenim si sibi-
ipsis in sermonibus persuaferint, & opus ex disciplina se sci-
re putauerint, quemadmodum aurum adulterinum in igne
iudicatum, tales seipsum esse demonstrant. quanquam talis
prædictio nihil commouet ad prudentiam eos qui sunt eius-
dem generis quod autem rectus sit finis, cognitio manifestum
facit. Tempus porro etiam artem facilem ac peruiam facit,
aut in cõsimilem viam incidentibus processus manifestos fa-
cit. Quapropter singula prædicta suscipere oportet, & sapien-
tiam transferre ad medicinam, & medicinam ad sapientiã.
Medicus enim philosophus, est deo æqualis. Neque enim mul-
ta est inter ipsas differentia. Nam omnia quæ ad sapientiã
requiruntur, insunt in medicina: argenti contemptus, reue-
rentia, verecundia, habitus submissus, autoritas, iudicium,
quies, obuiam itio, mûdicia, doctrina, cognitio ad vitam vti-
lium ac necessariorum purificationum, alienitas à mercimoniis,
alienitas à superstitione, præeminentia diuina. Habet enim
quæcunq; habent ad coercendam intemperatiam, inscitiam,
auaritiam, concupiscentiam, rapinamq; ac impudẽtiam. Hac
enim est cognitio accedentium, & usus eorum quæ ad amicitiam
pertinent, & quomodo ad liberos, ac quasque res se gerere
oporteat: quatenus igitur cum hac societate habet, sapientiã
quandã est. Nam & plurima ex his etiã medicus habet. Etenim
sciẽtia de diis vel maximè animo ipsius implexa est. Etenim
in aliis affectionibus, & in symptomatis accidentibus, medi-
cina erga deos valde reuerteter se habere cõperitur. Medici
verò deis concedunt. Non enim est potentia in ipsa redun-
dans. Nam & hi multa quidẽ aggrediuntur, multa verò etiã
per seipsa ipsis superantur. Quæ verò nunc possidet Medici-
na, hinc exhibebit. Quæ enim via ipsius sit in sapientiã, ha-
tenus

A tēnus dictum est. Nam & illis ipsis hoc modo se res habet.

Quæ verò putāt, & cōfitentur ac profitentur, sic habēt. Quæ Medicine
viæ partēs-
ve.

circa corpora adsunt & adueniunt, quæ sanè per omnē ipsam artem procedunt, dum illa transformātur aut transmutantur. Quæ itē per chirurgiā sanant. Et quæ auxiliis & medelis aut victu curantur. Summa verò horum omnium tendat ad horum cognitionē. Quum igitur relata omnia tali modo se habeant, cōuenit vt Medicus comitatē quandā sibi adiunctā habeat. Austeritas enim & sanis, & ægris, difficilē accessum præbet. Maxime verò adseruare ipsum seipsum conuenit, vt ne multas corporis partes ostēdat, neq; cum imperitis multa fabuletur, sed necessaria. Hoc enim violentia esse conuenit, ad curationis prouocationē. Facere autem nihil horum

Medico
quid obser-
uandum.

B debet valde curiose, neq; ex imaginatione. Hæc verò omnia considerato, quo tibi præparata sint ad abundantiam, prout opus fuerit. Sin minus, instante necessitate semper penuria fuerit. Procurare autē oportet hæc in medicina, cum omni submissiōe: de frictione, & illitione, & perfusione, ad manuum concinnitatē: de linamētis vulsis, de spleniis, de ligamētis, de his quæ pro temporis constitutione requiruntur, de medicamentis ad vulnera, & ocularia, & ex his ea quæ ad singula genera pertinent: quo tibi præparata sint & instrumenta, & machinæ, & cōsequenter ferrum. Nam in his penuria detrimētosa est, & artem mancā facit. Sit autem tibi alter apparatus simpliciter ad peregrinationes instructus, ad manus

Quæ potis-
simum cu-
ret.
Instrumen-
ta medico
in promptu
esse debēt.

C promptus. Expeditissimus autē per methodi rationē. Neque enim fieri potest vt medicus omnia percurrat. Firma item memoria teneto medicamēta, & simplices facultates, & descriptas, si modo tales extant. Sint & in memoria tibi morborum curationes, & harū modi, quorupliciter & quomodo in singulis se habent. Hoc enim principiū est in Medicina, & medium, & finis. Præparata quoque tibi sint malagmatū genera ad singulos vsus. Potiones quæ incidere possunt, ex descriptione præparatæ iuxta genera. In prōptu sint & quæ ad medicationem pertinet ad purgationes, sumpta de locis con-

poriones in
prōptu ha-
bendæ.

gruis, & parata eo quo cōuenit modo, iuxta genera, & magnitudines, ad vetustatem ferendā curata. Recentia verò iuxta temporis occasionē: & alia iuxta rationē. His autē tibi præparatis hoc commodi erit, vt vbi ad ægrotum introieris, ani-

Quid præ-
cogitandū.

Quæ præ-
stare de-
beat medi-
cus.

Medicus
ægros cre-
bro inuise-
re debeat.

ut oue

Culpa ægro-
tantiū me-
dicis sæpe
adscribi so-
let.

Habitatio-
nes languē-
tiū pro va-
rietate mor-
borum eli-
gēdæ sunt.

mo incertus nō sis, quum appositè habeas singula ad id quod D
faciendum est. Antea verò hoc cognitū habeas quod facere
oportet, quàm ad ægrum ingrediaris. Pleraque enim neque
ratiocinatione, sed auxilio rerū opus habent. Itaq; euentum
ex experientia prius discernere oportet. Est enim hoc glo-
riosum, & facile cognosci potest. In ingressu verò meminisse
cōuenit & sessionis, & habitus submissi, amictus compo-
siti, autoritatis, breuiloquentiæ, vt nihil cū perturbatione fa-
cias, assensus, diligentia, responsionis ad ea quæ occurrunt, &
ad tumultus fientes cōpescendos, cōstantiæ apud te ipsum, in-
crepationis ad turbas castigandas, promptitudinis ad mini-
steria. Et ad hæc memor sis primi apparatus. Sin minus, reli-
qua citra errorē fiant, quæ ad promptitudinē parandā præ- E
cipiuntur. Ingressu vt ere frequenter, visita diligentius, his
quæ à deceptis per errorem fiunt occurrēs, vt mutentur. Fa-
cilis enim cognosces, simulque expeditior eris. Instabilia
enim sunt quæ in humidis cōsistunt. Quapropter etiā facile
& à natura, & à fortuna transmutantur. Neglecta enim ea
quæ circa temporis occasiōē administrare oportebat, im-
petu suo progrella occupāt ac perimunt. Nō enim est quod
opem ferat. Multa enim sunt quæ simul mali aliquid fa-
ciunt. Nā quod singulatim iuxta consequentiā fit, magis op-
portunum & frequētius est. Obseruare autē oportet ægroto-
rum quoq; peccata, per quæ multi sæpe mentiti sunt in assu-
mendis his quæ ingerēda exhibētur, postquam exosas potio-
nes non accipientes, aut pharmacis datis, aut alia curatione P
adhibita, perempti sunt. Et factū quidē hoc non ad ipsorum
confessionem vertitur, verū Medico culpa imputatur. Cō-
siderare verò oportet etiā decubitus, quosdam ex ipsis iuxta
anni tēpus, quosdam iuxta genera. Quidā enim in altis sedi-
bus, quidam in subterraneis ac tenebrosis decumbunt. Stre-
pitus quoque & odores, maximè vini, deterior enim hic est:
fugere ac transmutare oportet. Et omnia hæc facere placi-
dē, expeditē, cum ministerio, ita vt pleraq; ægroto occultes,
& hilari ac sereno vultu ipsum consoleris: quo à suis illū cu-
piditatibus auertas, simul cū amarulentia & cōtraria instan-
tia increpando, simulque cum cōmonefactione ac dexterita-
te suscipiendo accōsolando, nō tamen vt quicquam futuro-
rum aut præsentium ipsis indices. Plerique enim ob hanc
causam,

A causam, in vtranlibet partem compulsi sunt, propter rel-
tam videlicet prædictionem præsentium aut futurorum. Sit
autem ex discipulis aliquis præsens, qui instet vt præceptis *Quales mi-
nistri ægro-
tis dandi
sint.*
non amarulentè vtatur, & quod mandatū est, faciat. Deligi-
to autē ex ipsis eos qui iam in arte progressum fecerūt, quò
ea quæ vtilia sunt addant, aut secure offerant, vt & in inter-
uallis nihil te lateat. At verò imperitis nunquam quicquam
procurandum cōmittes. Sin minus, eius quod malè factum
est, vituperium in te recidet, si non ambiguè res habeat, ex
quibus id quod recta methodo tractatum est, procedet, & vi-
tuperationem tibi nō afferet. Sed & quod factū fuerit, ad ge-
B nus referetur. Proinde omnia hæc prædico in his quæ fiūt,
his quibus ea cognouisse propositum est. His igitur ita ha-
bentibus, ad bonā existimationem ac decentem ornatum, &
in sapientia, & in medicina, & in aliis artibus: oportet medi-
cum distinctis partibus, de quibus diximus, semper vtrisque
amictum, ea conseruare ac custodire, & tradere ac facere.
Quum enim apud omnes homines inclyta sint, conseruan-
tur. Et qui per ipsa procedunt, celebres sunt à parentibus &
liberis. Et si quidam ipsorum non multa cognitione præditi
sint, ab ipsis tamen rebus ad intelligentiam deueniunt.

HIPPOCRATIS

C COI PRAECEPTIONES,

IANO CORNARIO ME-

DICO PHYSICO

INTERPRETE.

*



Tempus est in quo occasio est, Occasio verò *Tempus*
in qua tempus non multum. Medela rem- *quid.*
pore, aliquādo etiam occasione contingit. *Occasio.*
Hæc sanè nosse oportet, & non ratiocina-
tioni prius probabili intētum curā aggre-
di, sed exercitationi cum ratione. Ratioci-
natio enim memoria quædam est, quæ componit ea quæ per *Ratiocina-*
sensum sunt percepta. Imaginatione enim concepta est eui- *tio.*
denter.

c 5

denter. Sensus autem perpeſſus iam delegator eſt eorū quæ D
ſubiacent ac obueniunt, ad ipſam cogitationē. Qui verò ſen-
ſus ſæpe mala perpeſſus eſt, & ſuſcepit, quibus, quando, qua-
liter, læſus ſit obſeruans, & in ſeipſum reponens recordatur.
Collaudo quidē igitur etiā ratiocinationem, ſi quidē ex for-
tuita occaſione initium faciat, & delationem in morbum ex
apparentibus perſequatur. Si enim ex his quæ palam perſi-
ciuntur, ratiocinatio initium fecerit, in mentis potentia eſſe
comperitur, ita vt ipſa ab aliis ſingula aſſumat. Proinde ſta-
tuendum eſt naturā à multis ac omnigenis rebus moueri ac
doceri, ita vt violētia quādā ſubſit. Mens autem ubi ab ipſa
accepit, velut dixi, poſtea ad veritatem perducit. Si verò non
ex euidentī aggreſſione, verūm ex probabili rationis ſigmen- E
to, ſæpe grauē & moleſtā inuehit affectionē. Tales autem
inuiā viā arripiūt. Quid enim tandē erat mali, ſi mercedē au-
ferrent hi qui medicinæ opera malè adminiſtrant? Nūc ve-
rò ægrotiſ qui extra culpam ſunt, non ſufficiens eſſe apparet
violētia morbi, niſi Medici quoq; imperitia accedat. Et de
his quidē hæc dicta ſatis ſint. At his quæ ex ſola ratione perſi-
ciuntur, frui nō datur: verūm his quæ ex operis indicatione.
Fallax enim eſt & ad errorem procliuiſ affirmatio, quæ ſit
cum garrulitate. Quapropter in vniuerſum his quæ ſunt,
inhærerē oportet, & circa hæc vel maximè verſari, ſi quis fa-
cilē ac minimè delinquentē habitū, quem ſanè Medicinam
appellamus, ſibi comparare volet. Valde enim magnā vtili-
tatem afferet, tum egrotantibus, tum horū artificibus. Non F
tamen cunctādum eſt & ab idiotis inquirere, ſi quid cōferre
viſum fuerit ad curationis occaſionē. Sic enim arbitror vni-
uerſam artē cōmonſtratam eſſe, eo quod ex vnoquoque ſine
obſeruatio facta eſt, & cōſonantia in idē cōcurrerit. Attende
re igitur oportet fortuitæ occaſioni, quæ plerunque ſe offert,
atque hoc cū vtilitate ac leni progreſſione potius, quā cū
promiſſione, & excuſatione ea quæ ſit cum actione. Vtilis eſt
autem & varia prædeſtinatio eorū quæ ægroto offeruntur.
Non enim aſſeuerare oportet, quod aliquid ſolū exhibitum
proderit. Omnes enim affectiones, propter multas caſuū cir-
cuſtantias ac mutationes, mora quādā diutiori adharēt. Et
hoc ſanè admonitione opus habuerit, ad diligentē cōſidera-
tionem faciendā. Si enim à mercede inceperis: cōducit enim
hoc

Qua via
medico pro-
cedendum
ſit.

Medicus
rudes etiā
ſciſcitari de-
bet.
Quid po-
tiſſimū ob-
ſeruādum.

Merces cō

A hoc vniuerso negotio: ægroto quidem huiusmodi cogitationem inducis, quod videlicet non ipso relicto abibis. Si verò non pacisceris, quod ipsum negliges, & de quibuldā in rem præsentē nō admonebis. Curare igitur oportet de cōstituen-
da mercede. Inutilem enim esse putamus eiusmodi ægroti ipsius cogitationē, multo autē magis in morbo acuto. Morbi autē celeritas temporis occasionē non præbens ad reuersionem, nō impellit bonum Medicū ad quærendū suā commoditatem, sed vt magis existimationis suæ rationē habeat. Itaque tūc melius est vt seruatis exprobetur, quā vt letaliter affectos præconturbet. Quāquam aliqui ægroti id expectant, hospitij ius, & facilem mali depulsionē producētes, digni quidē qui negligātur, nō tamen qui affligātur. Quapropter his te merito oppones, cum bolidis iactu in maris turbati fluctibus iter facientibus. Qui enim bonus Medicus est, is per Iouē fide magis quā duricia medetur. Quare in principio totā affectionē indagare oportet, & quædā suggere cōducentia ad curationē, curarēq; ægrotum, & non negligere. At verò remunerationis exigendæ acerbitatē, absque præparante ad disciplinam cupiditate, hortor vt ne valde inducas, sed & ad opulentiam & facultates respicias. Quādoque verò etiam gratis cures, ita vt gratitudinis memoriā potiorē nūquam curandam, quā præsentē existimationē auferas. Si verò occasio ferenda opis se obtulerit, & peregrino, & egeno, maximē talibus opituleris. Si enim affuerit erga homines amor, adest etiam

C anior erga artem. Quidā enim ægrotantes vbi percepērunt affectionē circa se nō esse in tuto, per Medici probitatem ac mansuetudinē gloriantur sanitati restitutos se esse. Laudabile est autē, ægrotum quidē curam gerere, gratia sanitatis; sanorum verò curam suscipere, ea gratia vt sine morbis degant. Sed & sanorum cura habenda est, gratia boni ac decori ornatus. Qui igitur in profundo ignoratiæ artis versantur, prædicta minimē percepērunt. Nā hi quum sint non initiati, miserabilēsque ac subito exaltati: fortunæ tamē indigi, à diuitibus quibusdam, ex angustiis remissionē acquirunt, semperque ob opera gloriantes, & in deterius dilabentes deliciantur, artis sinceritatē negligentes, ob quam bonus Medicus, qui ab artis cōiunctione socius artis appellatur, in vigore esse possit. Hic autē medelas citra delictū facile perficiēs, nihil

stituenda
medico.

Gratis non
nūquam cu
randum.

Quid ma-
lus medi-
cus agat.

Languētis
cupiditas.

Medici plu
res cur con-
uocandi.

Vt bene
speret hor-
tandus æ-
grotus.

nihil horum transilierit, non præ facultatis inopia. Non enim infidus est velut in iniustitia. Nam ad curationem hi non accedunt, vbi affectionem perniciosam esse vident, vitantes aliorum medicorum superinductionem, laudantes ægrotos propter prauæ auxiliij odium. At ægrotantes afflictī nātant in vtraq; improbitate, eo quod potiori in arte curationi seipsos non commiserunt ad finem vsque. Remissio enim morbi alicuius magnum ægroto refugium præbet. Quapropter sanam affectionem cupiētes, eundem vsum semper admittere non volunt, medici varietati se assimilantes. Sumptuum equidem opulentia ægroti carent, morum improbitate adorantes, & ingrati fientes. Quum autem consequi possunt vt ditentur, de mercede asseueranter affirmant, sani esse volentes, quæstum nimirum ex vsura, aut agricultura affore producentes, & postea de ipsis quæstum facere negligentes. Et de huiusmodi quidem declaratione hæc sufficiāt. Remissio enim & intensio ægrotantis, medicam administrationem requirunt. Nec verò indecore se ille geret medicus, qui in rei præsentis angustia circa ægrum aliquem, & imperitia tenebras offundēte, alios quoque accersere iusserit, quod ex communi cōsideratione, res circa ægrum inquirantur ac cognoscantur, & illi cooperatores fiant ad auxiliij ferendi facultatem. Nam in afflictionis assiduitate, augescente affectione, ob consilij inopiam, plurima ad rem præsentem effugiunt. In eiusmodi igitur temporis occasione confidendum est. Nunquā enim ego tale quid decerno, quod ars ipsa iudicat. Et de hoc nunquam contendere oportet affirmando, ac mutuis inter se cōuiciis decertando. Hoc enim iureiurando affirmare possim, quod Medici ratiocinatio nunquam alteri inuidere poterit. Imbecillis enim hoc modo apparuerit. Sed hæc magis expeditè faciunt hi, qui circa forensia negotia ac quæstus versantur. Quanquam neque falsò hoc cognitum fertur, quod in omni copia, inopia inest. At verò cū his omnibus magnum signum substantiæ artis apparuerit, si quis rectè medicans, ab eiusmodi compellatione non destiterit, iubēs ægrotos mente non turbari, in eo quod ad salutis tempus peruenire gestiunt. Hoc enim non inutile esse ducimus, & hoc sanè præcipiēs non peccabit. Ipsi enim ægroti propter dolorificam affectionem desperantes, seipsos vita exuunt.

Qui

- A** Qui verò ægrum sibi cōmissum habet, si artis inuēta demon-
strauerit, conseruans non mutans naturam, præsentē auferet *in egiā na-
tura quæ-
dam est.*
remunerationē, aut contrā, fidem suam statim amittet. Ho-
minis enim bonus habitus natura quædam est, quæ motum
non alienū ex natura acquisiuit, sed valde congrua est, & spi-
ritu, & calore, & humorū concoctione vndiquaq; & vniuersa
victus ratione, & aliis omnibus cōposita ac constructa: si non
aliquis ex natiuitate, aut ab initio defectus fuerit. Si verò e-
tiam quis fuerit, is si exilis est, conandū est vt subiectę nature
assimiletur. præter naturam enim est id quod imminutū est,
etiam per tempus. Porro fugienda est & frictio per lintea su- *Frictio.*
daria, propter parādā medendi auctoritatem. Itēmq; odor
B curiosē ascitus. Propter multā enim peregrinitatē, in calum-
niam incidēs: propter modicā verò, decentem ornatū con-
sequeris. In parte enim dolor modicus: in toto, multus. Gra-
titudinem autem qua hominibus cōplaceas, nō tollo. Digna
enim est medico præsidio. At verò appositionis per instrumē-
ta, & indicationis eorū quæ significant, & eiusmodi rerū me-
moriā adesse oportet. Si verò etiā vulgi gratia velis differ-
tationem ad audiendū te facere, nō valde gloriosē id captes:
non tamen cum testimonio ac ostētatione poetica. Impoten-
tiam enim industrij laboris ostēdit. Auerfor enim ad alium
vsum trāfferri industriā cum labore partam, quæ propterea
in seipsa sola gratiosæ sectæ electionem habet. Consequeris
enim instar fuci promptā cum comitatus deductione elatio-
C nem. Optanda est & eiusmodi dispositio quæ aliena sit ab eo
quod quis grandis iam natu discat. Hoc enim præsentīū qui-
dē nihil perficit, absentīū verò tolerabilis memoria existit.
Fit itaq; omnia tentans infortuniū, cum recēti perniciē, quæ
negligit decorū, & in præfinitis terminis, & in professione, &
in maximis iuramentis deorum gratia factis: dum Medicus
præest morbo, cum assidua lectione, instructionēque imperi-
torum fugitiuorū, ita vt sermones translatiuos imitetur, qui
etiā antea quā in morbo incertus animo esset, collecti fue-
runt. Taliū igitur vbi etiā præfectus essem, non sanē in colle-
ctitia curatione id facerē. Verū cōfidenter auxiliū peterē.
Cognitionis enim decoræ scientia in his dispersa est. Quum
igitur hi necessariō sint inscij ac imprudentes, hortor eos vt
commodā habeāt exercitationem, post dogmatum cogni-
tionis

Hippocratis Liber

tionis penuriam. Quis enim multifidam dogmatum sectio-
 ne se verè cognoscere posse sperarit, citra exercitationis con-
 stantiam? Quapropter hoc admoneo, vt dicentibus quidem
 attendant, facientibus autem incumbant, & contracta victus
 rationem non diu præscribant. Aegrotatis enim diuturnam
 concupiscentiam erigit indulgentia quoque, in morbo diu-
 turno. Si quis cæco animū aduertat, velut res magni timoris
 cauendus est, & gratia desperanda, per quam vnitas constat.
 Aëris repentina turbatio vitanda est. Vigor ætatis omnia ha-
 bet gratiosa, Decrepita verò ætas, vice versa. Obscuritas lin-
 guæ non satis claræ fit, aut propter affectionem, aut propter
 aures, ita vt priusquam priora enunciarit, alia adiiciat: aut
 priusquàm id quod mente concepit dicat, alia insuper cogitet.
 & quæ quidem citra affectionem visibilem appellatam, con-
 tingit linguæ obscuritas, his maximè qui artium studio te-
 nentur, accidit. Aetati etiam quum parū est aliquando sub-
 iectum, valde magna vis inest. In morbo trāquillitas, longi-
 tudinem significat. Iudicatio verò est morbi exolutio. Parua
 causa medelis exoluitur, nisi quid circa locum principalem
 affectum fuerit. Quandoquidē affectio per consensum a tri-
 stitia inducta vexat, quidam sanè ex alterius consensu vexan-
 tur. Vociferatio affligit. Fortis laboris studium subterfugien-
 dum est. Maritimus locus ad sanitatem commodus est.

Vigor æta-
 tis.

Lingua
 obscuritas
 vnde.

ætiæ quid

Quæ vexat
 ægrotum.

H I P P O C R A T I S

COI LIBER DE NATVRA
 HOMINIS, IANO CORNA-
 RIO MEDICO PHYSICO

INTERPRETE.



VICVNQVE de natura humana amplius
 differentes audire consuevit, quàm eius ad
 medicinam pertinet, huic non est commo-
 dum hunc meum sermonem audire. Ne-
 que enim omnino ex toto aerem dico ho-
 minem esse, neque ignem, neque aquam,
 neque terram, neque quicquam aliud, quia non manifestum
 est

A est vnum in homine esse: sed volentibus tamen hæc dicere permitto. At verò talia dicentes, mihi non rectè rem cognoscere videntur. Sententiam enim eandem omnes ineunt, verum non eadem dicunt, sententiæ tamen epilogum eundem faciunt. Aiunt tamen vnum quid esse, quodcunq; tãdem est, & id ipsum esse vnum ac totum, iuxta nomina autè non consentiunt. Etenim alius ex ipsis aerem esse, hoc vnũ ac totum dicit, alius ignẽ, alius aquam, alius terrã, & addit vnusquisq; ad sermonẽ suum testimonia ac signa quæ nullius momenti existunt. Quia enim eadem sententia omnes vtuntur, dicunt autem non eadem, manifestum facit quòd neque cognoscũt ipsa: quod ex eo vel maximè quis cognouerit, qui ipsorum disceptationibus interfuerit. Nam cùm iidẽ viri inter se disceptant, iisdem auditoribus præsentibus, nunquam ter consequenter idem homo vincit in eodem sermone, sed modò hic, modò alius superat, cuicunque fuerit lingua maximè fluida ac populo grata. Atqui iustum erat, vt is qui de rebus se rectè cognoscere pronũtiaret, semper sermonem suum victorem statueret, si quidem vera cognosceret, ac rectè sentiret ac iudicaret. Verum huiusmodi homines vidẽtur mihi seipsos oppugnare in verbis sermonum suorum, præ stultitia, & Melissus. *Melissus.*
 At verò ex medicis quidã dicunt, quòd homo sanguis solũ Medicorũ *Medicorũ*
 est, alij ex ipsis bilem aiunt hominẽ esse, aliqui pituitã, epilogum autem & ipsi omnes eundẽ faciunt. Vnum enim quid Cesse dicunt, quodcunq; cuiq; ipsoꝝ nominare visum est, & id ipsum vnum existens, speciẽ ac vim transmutare, coactum à calido ac frigido, fieriq; & dulce, & amarum & album, & nigrum, & omnigenũ quid aliud. Mihi verò neq; hæc sic se habere videntur. Plurimi quidem igitur talia quædam, & amplius his proxima pronuntiant. Ego autem dico, si vnũ esset Si re vna
 homo, nunquam sanẽ doleret. Neq; enim esset vnde doleret homo con-
 vnũ existens. Si verò etiã doleret, necesse esset & quòd me- staret, non
 deretur ac sanaret vnum esse. Nunc verò plura sunt. Multa langueret.
 enim sunt in corpore existentia, quæ quum mutuò præter na Morborũ
 turam calfiunt & frigescunt, siccanturque & humectantur, causa.
 morbos pariunt. Quare multæ quidem species morborum
 sunt, multaque etiam medela ipsorum existit. Atque ego sanẽ cen-
 seo eum qui hominem sanguinem solũ esse dicit, &
 nihil

Hippocratis Liber

nihil aliud, demonstrare debere, ipsum non trāsmutare speciem, neq; omnigenum fieri, vel saltem horam aliquam anni, aut hominis aetatem, in qua sanguis solus in homine inesse appareat. Verisimile est enim vnum aliquod esse tempus, in quo appareat ipsum in seipso vnum existens. Eadem censeo etiam de eo, qui pituitam solam esse dicit, & qui bilem. Ego enim demonstrabo ea quæ hominem esse dixerō, & iuxta receptum morem, & iuxta naturā, quod semper ea ipsa similia sint, & in iuvene, & in sene, & tempore frigido æquē ac calido. Exhibebo insuper signa, & necessitates ostendam, per quas vnumquodque augetur ac minuitur in corpore. Primum quidem igitur, necesse est generationem fieri

Qui omnia gignantur. non ab vno, Quomodo enim vnum existens, aliud quid generarit, si non alicui misceatur? Deinde neque generarint, si non eiusdem generis existentia misceantur, & quæ eandem vim habeant, neque sanè nobis similia perficerentur. Et rursus, Si non calidum ac frigidum, & siccum ac humidum, moderate ac æqualiter inter se haberent, sed alterum alterum multum præcelleret, & fortius debiliore præstaret, generatio fieri non posset. Proinde quomodo verisimile est, ab vno quid generari, quum neque à pluribus generetur, nisi habuerint temperamentum inter se probè conueniens? Necesse itaque est tali existente natura, cum aliorum omnium, tum humana, non vnum esse hominem, sed singula quæ ad generationem eius conferunt, vim quandam in corpore habere, & eam videlicet, quam contribuerunt. Et rursus necesse est secedere singula in suam ipsorum naturam, homine moriente humidum nimirum ad humidum, siccum ad siccū, calidum ad calidum, frigidum ad frigidum. Talis autē & animalium est natura, & aliorum omnium, generanturque similiter omnia, & occidunt similiter omnia. Cōstat enim natura ipsorum ex his prædictis omnibus, & desinit iuxta prædicta, in id vnumquodque vnde est compactum secedēs. At verò corpus hominis habet in seipso sanguinem, & pituitā, & bilem duplicem, flauam videlicet & nigram. atq; hæc sunt ipsi corporis natura, & per hæc & ægrotat, & sanus est. Sanus equidē maximè est, vbi temperamentū hæc inter se habuerint moderatum, tum facultate, tum copia, & vbi maximè fuerint permixta. Aegrotat autem cum horum quid minus aut amplius

Arhs
quod.
m. omni
comp. est
Quæ in corpore sunt.

Languoris causa.

Sanus quis.

Aegrotus

A plius fuerit, aut separatur in corpore, & non fuerit reliquis omnibus contemperatum. Necesse est enim quum quid horum secretum fuerit, & per se steterit, nō solum eum locum vnde secessit, morbidum fieri, sed etiam eum in quo stat, & in quem propter nimiā copiam diffusum est, dolore ac morbo vexari. Etenim quum quid horum extra corpus effluerit amplius quā redundat, euacuatio ipsa dolorē exhibet. Rursus itaq; si idem intus fecerit euacuationem, & transitio nem, & ab aliis secretionem, geminatum dolorem exhibere necesse est, velut dictum est, nempe & vnde secessit, & vbi receptum redundat. Dixi porro, quacūq; hominem esse dixerō, semper demonstraturum me esse, quod talia sint & iuxta receptum morem ac opinionem, & iuxta naturā. Et dico sanē esse sanguinem, & pituitam, & bilem flauam ac nigram: & horum primum quidem iuxta receptā opinionem nomina distincta esse dico, & nulli ipsorū idem nomen esse. deinde species iuxta natura separatas esse, & neq; pituitam similem esse sanguini, neq; sanguinem bili, neq; bilem pituitae. Quo enim modo hęc inter se similia sint, quorum neq; colores similes videntibus apparent, neq; ad manuum tactum similitudo aliqua esse deprehēditur? Neque enim similiter calida sunt, neque frigida, neq; sicca, neq; humida. Quum itaq; intantum inter se discrepent, tum specie, tum facultate, necesse est ipsa non vnum esse, quandoquidem neque ignis & aqua idem sunt. Quod autem hęc omnia non vnum sunt, sed C vnumquodq; ipsorum vim & naturam suam habet, vel hinc cognoscere licebit. Si enim homini alicui medicamentum dederis, quod pituitam ducit, pituitam tibi vomet, & si phar macum dederis, bilem ducens, bilem tibi vomet. Eadem ratione & bilem atram purgabit, si medicamentum exhibueris quod bilem atram ducit. Quod si ipsi partem aliquā fauciaris, vt vulnus fiat, effluet ipsi sanguis, atque hęc omnia faciet tibi totam diem ac noctem, & hyeme & aestate, donec spiritum in sese trahere potens fuerit, potens autem erit donec aliquo horum congenitorum fuerit priuatus. Congenita autem sunt prędicta. Quomodo enim non congenita essent? Primum etenim manifestum est hominem in seipso hęc omnia semper habere, donec vixerit. Deinde nata sunt ex homine hęc omnia habente. Postea nutrita sunt in ho-

d. mine

Hippocratis Liber

mine hæc omnia habente, quæ videlicet ego nunc dico ac demonstro. Qui verò dicunt, quòd vñum est homo, videntur mihi hoc consilio vñ esse. Nimirum quum viderint eos qui medicamenta hauserunt in superpurgationibus interiisse, alios quidem bilem vomentes, alios pituitam, vñumquodq; horum hominem esse putauerunt, quod vidissent his purgatum interiisse. Et qui sanguinem dicunt hominem esse, eodẽ consilio vtuntur. Nam quum vident iugulatos homines, & sanguinem ex corpore ipsorum effluentem, hunc ipsum animam in homine esse putant. atque his testimoniis sanè omnes vtuntur in sermonibus suis. Atqui primùm quidẽ in superpurgationibus, nemo vnquam mortuus est bile sola purgatus. Verùm quum quis pharmacum biberit, quod bile deducit, primùm bilem vomet, deinde pituita, postea per vim etiam atram bilem, postremùm moribundus etiam sanguinem purum vomet. Eadem perpetiuntur à medicamentis pituitam ducentibus. Primùm enim pituitam vomet, deinde bilem flauam, postea atram, moriẽtes autem sanguinem purum, & in hoc mox vitam finiunt. Etenim pharmacum vbi corpus intrauerit, primùm quidẽ ducit id quod ex omnibus in corpore existentibus, sibi maximè secundum naturam familiare fuerit, deinde verò etiã alia trahit ac purgat. Quemadmodum ex terra nascentia & in ipsam plantata ac seminata, vbi in terram peruenerint, vñumquodque trahit id quod naturæ suæ familiare in terra existit. Inest autem in terra & acidum, & amarum, & dulce, & salsum, & omnigenum. Primùm itaq; plurimum eius trahit in seipsum, quod sibi ipsi iuxta naturam maximè familiare fuerit, deinde trahit etiam reliqua. Huiusmodi sanè quiddam etiam pharmaca in corpore faciunt. Quæcunque enim bilem ducunt, primùm meracissimam bilem purgant, postea verò mixtã. Et rursus pituitæ pharmaca, primùm meracissimam pituitam ducunt, postea mixtam. Et iugulatis primùm quidem sanguis calidissimus & ruberrimus profluit, deinde pituitosior ac biliosior. Porro pituita in homine hyeme augetur. Hæc enim hyemi maximè secundum naturam conuenit ex omnibus in corpore existentibus. Frigidissima enim existit. Signa autem quòd pituita frigidissima est, hæc sunt. Si enim pituitam & bilem & sanguinem contingere libuerit, pituitam

Pharmacū
quid agat.

Pituita cur
hyeme vi-
geat.

A tam sanè frigidissimam esse comperies, quāvis viscosissima sit, & per vim maximè post bilem atram trahatur. quæ verò per vim trahuntur, calidiora fiunt, à violentia coacta, sed tamen suprà hæc omnia, frigidissima esse apparet pituita ex sua ipsius natura. Quòd autè hyems corpus pituita repleat, inde cognoscere datur, quòd homines pituitosissima & Qui humores per singula tēpora vigeant. spuunt & emungunt hyeme, & tumores laxi albissimi fiunt maximè hoc tempore, itēque reliqui morbi pituitosi. Cæterum vere pituita quidem adhuc fortis in corpore manet, sed sanguis augetur. Nam & frigora remittunt, & imbres superueniunt. Sanguis autem iuxta hæc augetur, ab imbris videlicet & calidiorum dierum tempore. Hæc enim anni pars maximè iuxta naturam ipsi conuenit, vt quæ calida & humida existat. Signa autem hinc colligere licet. Quòd homines Vere & æstate maximè dysenterici corripuntur, & sanguis ex naribus ipsis fluit, & calidissimi ac ruberrimi. At verò æstate sanguis adhuc viget, & bilis in corpore eleuatur, & vsque in autumnum porrigitur. In autumno verò sanguis modicus fit, cōtrarium enim eius naturæ id tempus existit. Bilis autem per æstatem ac autumnum corpus possidet, id Bilis corpori domina- quòd inde cognoscere potes: quòd homines sua sponte hoc tempore bilem vomunt, & in medicamentorum potionibus biliosiora purgantur. Manifestum fit & febribus, & hominum caloribus. Pituita autem æstate debilior seipsa est. Contrarium est enim naturæ eius id tempus, calidum enim est & siccum. Sanguis verò autumno paucissimus fit in homine, Siccus enim est autumnus, & hominem iam frigefacere incipit. Atra porrò bilis autumno & plurima & fortissima est. Postquàm autem hyems apprehenderit, bilis flaua perfrigerata modica fit, & pituita rursus augetur, tum ob pluiarum copiam, tum propter longitudinem noctium. Corpus quidem igitur humanum hæc omnia semper habet, verum pro temporis circumstantia, aliquādo plura seipsis sūt, aliquando pauciora, singula tum iuxta partem ac copiam, tum iuxta naturam. Quemadmodum enim annus omnis omnium particeps est, & caliditatum & frigiditatum, & siccitatum ac humiditatum. Neque enim quicquam horum ne minimo quidem tempore cōsisteret ac duraret, citra omnia ea quæ in hoc mūdo insunt, verum si vnū aliquod deficeret, omnia

Hippocratis Liber

omnia sanè abolerentur: ex eadem enim necessitate omnia **D**
 consistunt & mutuo aluntur. Sic etiam si quid ex homine de-
 fieret ex his quæ ipsi congenita sunt, non sanè viuere posset
 homo. in anno autem aliquando quidem hyems maximè vi-
 get, & aliquando ver, modò æstas, modo autūnus, Sic etiam
 in homine, aliquando pituita præualet, aliquando sanguis,
 aliquando bilis primum quidem flaua, deinde etiam nigra
 appellata, quorum omnium euidentissimum testimonium
 hinc habes. Si enim eidem homini idem pharmacū quater
 in anno dare velis, vomet tibi hyeme quidē pituitosissima,
 Vere autem humidissima, æstate biliosissima, autumno ni-
 gerrima. Itaque quum hæc sic se habeant, quicumque morbi
 hyeme augescunt, æstate desinere solent, quicumq; verò æsta **E**
 te augescunt, hyeme finire consueuerunt, nisi certo dierum
 circuitu discedant. de circuitu autem rursus dicam. Quicun-
 que autem morbi Vere fiunt, ad autumnum eorū discessum
 fore expectare oportet, Quicumq; postremū autūnales mor-
 bi sunt, eorū discessum necesse est Vere fieri. Quicumq; verò
 morbus hæc tempora transgressus fuerit, eum annuum fore
 scire oportet. Porro Medicum sic aduersus morbos instare
 oportet, prout vnumquodque horum in corpore præualet,
 iuxta tempus sibi ipsi maximè natura conueniens existens.

Medicus
 hæc omnia
 considera-
 to.

*Addititia sunt hæc, non genuina Hippocratis,
 ut ait Galenus.*

Quin & hæc insuper ad illa nosse oportet, quòd quoscunque **P**
 morbos repletio parat, euacuatio sanat: & quicumq; ex eua-
 cuatione fiunt morbi, repletio sanat. quicūque verò à labore
 fiunt, quies sanat. qui autē ob ocio gignūtur, labor sanat. In-
 summa, Medicum scire oportet, opponere se contrarium in-
 stantibus & morbis, & naturis, & tēporibus, & ætatibus, &
 distendētia soluere, & soluta distendere. Sic enim vel maxi-
 mē morbū sedauerit, & mihi sanè hoc ipsum sanatio esse vi-
 detur. Morbi partim ex diætiis, partim ex spiritu, quem ad-
 trahentes viuimus, fiunt. Vtrorūque cognitionem sic face-
 re oportet. Quando ab vno morbo multi homines corripitū-
 tur eodem tēpore, causam ad id quod communissimum est,
 & quo maximè omnes vtimur, referre oportet. Est autē hoc
 spiritus & aër quem inspirando trahimus. Manifestum est
 enim

Obserua-
 tiones mor-
 borum.
 Morbi vn-
 de oriātur.

Aenim iam, quòd diæta vniuscuiusque nostrum, causâ nō est, quum morbus omnes consequenter contingat, & iuniores, & seniores, mulierēsq; ac viros, & tam vinolētos quàm aque potores, & tam mazam edentes, quàm pane vescētes, & tam multum laborātes, quàm parū. nequaquā igitur diæta causâ fuerit, quum homines diuersa victus ratione vtētes ab eodem morbo corripīūtur. Quum verò omnis generis morbi fiunt eodem tēpore, palām est victus singulos singulis causas esse, & curam sanē facere oportet ex contrario instando aduersus morbi causam, quemadmodum & alibi à me relatū est, & victus rationem permutare. Cōspicuum est enim diætā qua homo vti consuevit, non esse ipsi cōmodā, aut in totum, aut magna ex parte, aut vnū saltem quoddam ex ipsa: quod vbi cognoueris transmutare oportet, hībitaque consideratione naturæ hominis, & ætatis, & speciei, horæque anni & modi ipsius morbi, curationem facere, aliquando detrahendo, aliquando apponendo, & quemadmodum iam dudum à me dictum est, ad singulas ætates, & horas, & species, ac morbos respiciendo, tum in exhibendis pharmacis, tum in constituenda diætā. At verò quum vnius morbi popularis grassatio consistit, manifestum est diætā non esse culpabilem, sed quem trahimus spiritum in causâ esse: palāmque est insuper eum ipsum spiritum siue aërem morbosam aliquam exhalationem habere. Eo itaque tempore homines in hunc modum cōmonestare oportet, Nimirum vt diætā non permutent, quia morbi causâ non existunt, verum vt videant quo corpus habeant quàm minimæ molis ac debilissimū: detrahendi insuper sunt cibi ac potus quibus vti consueuerunt, idque paulatim facere oportet: Nā si quis citò diætā permutet, periculum est etiam à permutatione aliquid in corpore nouatum iri. Quapropter victu solito quidem vtendum est, vbi hominem nihil lædere videtur, prouidendum verò vt quàm paucissimus aëris influxus in corpus ingrediatur, & vt ille ipse quàm peregrinissimus existat. Regionum etiam locos in quibus morbus consistit, quantum eius fieri potest, permutare oportet, & corpora attenuare: sic enim minimè multo ac denso spiritu homines opus habuerint. Porro quicunq; morbi à fortissima corporis parte fiunt, grauissimi existunt. Etenim si isthic vbi initium sum-

Medela
morbi pas-
sim vigen-
tis.

fugit ut

Hippocratis Liber

De venarū
natura.

Quatuor
paria vena-
rum.

Missio san-
guinis.

Venarū di-
gestio.

perferint, permanferint, necesse est fortissima parte laboran- **D**
te, totum corpus laborare. Et si à validissima ad quandā de-
biliores transierint, difficiliter solvuntur. Quicunque à de-
biliores partibus ad fortiores transierint, commodius sol-
ui possunt. Nam influentia à vi ipsarum facile consumun-
tur. Venæ crassissimæ sic se habent. Quatuor paria ipsarum
sunt in corpore, & vnum quidem à capite retrò per cerui-
cem forinsecus ab vtraque spinæ parte ad coxendices & in
crura progreditur, deinde per furas & malleolos forinsecus
ad pedes peruenit. Oportet igitur venæ sectiones, in dolo-
ribus dorsi ac coxendicum, de poplitibus facere & de mal-
leolis forinsecus. Alterum par principium ex capite iuxta
aures habet per ceruicem, & sphagitides appellantur, hoc **E**
est iugulares. deferunturque vtrinque iuxta spinam intrin-
secus ad lumbos, in testes ac femora, & per poplites ex in-
terna parte, deinde per furas ad malleolos intrinsecus & in
pedes. Quapropter in doloribus lumborum ac testium, ve-
næ sectionem de poplitibus ac malleolis facere intrinsecus.
Tertium par venarum extemporibus per ceruicem sub sca-
pulas tendit, & ad pulmonem deferitur, altera quidem à
dextris ad sinistram partem, altera verò à sinistris ad dex-
tram, & dextra quidem sub mammam abit & in splenem, &
in rhenem, sinistra verò in dextram partem tendit à pulmo-
ne sub mammam & in hepar, & in rhenem. Vtraque au-
tem in rectum intestinum ac podicem desinit. Quartū par à **F**
priori capitis parte & oculis, sub ceruicem ad clauiculas
deuenit, deinde super brachia supernè in flexuras, postea
per cubitos in manuum iuncturas ac digitos. deinde à digi-
tis rursus, per cubitos ac manus supernè in flexuras, & per
brachiorum infernam partem ad alas, vnde supernè à late-
ribus altera in lienem peruenit, altera in iecur, postea supra
ventrem vtraque in pudendum desinit. Et crassissimæ qui-
dem venæ sic se habent. Sunt autem & ex ventriculo venæ
per corpus multæ & omnigenæ, per quas corpori alimētum
accedit. ferunt autem à crassis venis, in ventriculum ac re-
liquum corpus, & ab externis & ab internis, & inter se mu-
tuo distribuunt internæ extrinsecis, ac vicissim extrinse-
cæ internis. Venæ igitur sectiones iuxta prædictum ser-
monem facere oportet. Enitendum est autem vt sectiones
quàm

A quàm longissimè à locis faciamus, vbi dolores fieri, & sanguis colligi solet. Sic enim mutatio minimè magna de repente fiet, & consuetudinè remouebit, vt nō amplius in eundem locum colligatur. Quicumque pus multum spuunt, citra febrem, & quibuscunque in vrina pus multum subsidit, citra dolorē, & quibuscunque alui recrementa cruenta, velut in disenteriiis, & tardè ac diutinè prodeuntia, velut in iuuenibus quinque & triginta annorum, atque etiā senioribus, his omnibus ex eadem causā morbi fiunt. Necesse est enim hos labori deditos, ac exercitationis studiosos, & corpore operarios in iuuentute fuisse, postea verò relictis laboribus, molli carne & multum à priore differente carnosos redditos esse, & corpus multum discrepās habere, vt id quod prius exitit cum eo quod nunc adepti sunt, nulla parte cōsentiat. Quum igitur morbus aliquis corripuerit sic dispositos, euestigio quidem effugiunt, postea autem à morbo progressu temporis corpus colliquescit, & serosi ac saniosi humoris species per venas, qua partē maximè amplæ fuerint, fluit. Siquidem igitur in inferiorem ventriculum processerit, ferè qualis in corpore inest, tale etiam recrementum prodit. Quum enim decliuis sit via, non multo tempore hæret in intestino. Quibuscunque autem in pectus influxerit, suppurati fiunt. Nimirum purgatione acclui existente, & multo tempore in pectore immorans putrescit, & purulenta redditur. quibuscunque verò eadem serosi humoris species in vesicam proruperit, à loci caliditate, calida & alba fit, & segregatur, & quod quidem rarissimum est, superstat, crassissimum verò infra mergitur, quod sanè pus appellatur. Fiunt autem & calculi pueris, propter huius loci caliditatem itémque totius corporis. Viris autem calculi non generantur, propter corporis frigiditatem. Nam id probè nosse oportet, quod homo primis diebus calidissimus est sui respectu, vltimis frigidissimus. Necesse est enim augescens, & ad vim procedens corpus calidum esse. Vbi autem inceperit marcescere corpus, delabens in ocium, frigidissimum euadit. Et iuxta hanc rationem, quanto amplius primis diebus homo augefcit, tantò calidior existit, & quātò plus vltimis diebus marcescit, tantò frigidiorē esse necesse est. Sani autem fiunt sua sponte illi prædicto modo dispositi ac affecti, plurimi quidem

Calculi cur
pueris fiāt.

Hippocratis Liber

**Lotij di-
uersitas.**

**Quatuor
febrü spe-
cies.**

**Qualis atra
bilis.**

dem ab hora qua liquefcere incipiunt, quinto & quadragesi-
mo die. Qui verò hoc tempus transgressi fuerint, anno fi-
nito sua sponte conualescunt, nisi quid aliud mali grauioris
hominem infestet. Quicunq; morbi sensim ex modici tem-
poris causa fiunt, & quorum causa cognita faciles sunt, se-
curissimi appellari possunt. Curationem itaque ipsorum in-
stitui oportet, vt causa morbi nos opponamus. Sic enim
soluitur vtique id quod morbum in corpore fecit. Quibuscun-
que arenosa aut tofi in vrinis subsident, his initio tuber-
cula circa crassam venam enata sunt, & suppurata. Postea
verò tuberculis nò citò effractis, tofi ex purè coaliti sunt, qui
per venâ foras exprimuntur vnâ cum vrina. Quibuscunque
verò cruenta vrina sunt, his venæ laborant. Quibuscunque
autem in vrina crassa existēte, caruncula parua capillifor-
mes simul prodeunt, eas à rhenibus prodire nosse oportet,
& ab artriticiis. Quibus verò pura vrina est, & aliâs atque
aliâs velut furfures in vrina innatant, horum vesica scabio-
sa existit. Febres plurimæ à bile fiunt. Species ipsarum qua-
tuor sunt, præter eas quæ ab occultis doloribus generantur.
Nomina ipsarum sunt: Continens, Quotidiana, Tertia, na,
Quartana. Continens itaque appellata, à plurima ac mera-
cissima bile prouenit, & iudicationes quàm breuissimo tem-
pore facit. Corpus enim nullo tempore perfrigeratum citò
colliquefcit, nimirum à multa caliditate calfactum. Quoti-
diana verò post continentem à plurima bile generatur, &
præ reliquis celerrimè discedit, verum longior est continen-
te, quanto à pauciore bile prouenit, & propterea quòd re-
quiem habet in ipsa corpus, In continente verò non quiescit
villo tempore. Tertia autem longior est quàm quotidiana
& à pauciore bile gignitur. Quanto verò longiori tempore
in tertia corpus quiescit quàm in quotidiana, tanto diu-
turnior hæc febris est quàm quotidiana. At verò quartanæ
reliquæ iuxta eandem rationem habent, sed tertianis diu-
turniores sunt, quâto pauciore bilis parte participant, vnde
caliditas augetur, & propterea quod corpus in ipsis plus per-
frigescit, id quod ab atra bile ipsis contingit superflue adeò
vt rgrè frigus depelli possit. Atra enim bilis inter omnes
corporis humores viscosissima est, & sedes diuturnissimas
facit. Quòd autem quartanæ febres atra bilis participes
sint,

A sint, vel hinc condiscere licet. Autumno enim maximè ho-
mines à quartanis corripuntur, & in ætate à quinque & vi-
ginti annis, vsque ad quadragesimum quintum. Hæc autem
ætas præ omnibus aliis maxime à bile atra infestatur & au-
tumni tempus omnium anni temporum ad eandem aptis-
simum est. Quicumque autem extra hoc tempus & ætatem à
quartana corripuntur, pro certo scire oportet eam febrem
non fore diuturnam, nisi quid aliud grauioris mali homi-
nem infestauerit.

Quo tēpo-
re & qua
etate, quar
tana in-
gruit.

B D E S A L V B R

DIAETA LIBER, IANO

CORNARIO MEDICO

PHYSICO INTER-

P R E T F.

Addititius est ad librum De natura hominis,

lib. d. 1. 1. 1. Polibi, Hippocratis discipuli,
ait Galenus.

ait Galenus.

DIETAS & priuatos homines hac
dieta vti oportet. Hyeme quidē co-
medere quā plurima, bibere autē
quā parcissimē. Sit potus vinum
quā meracissimum: cibi, panis, &
obsonia affata omnia. Oleribus
quā paucissimis hoc tēpore vten-
dum est, Sic enim corpus maximē
ficcum ac calidum reddetur. Vbi In Vere.

Priuatorū
hominū vī
ctus in hyc
mc.

verò ver apprehenderit, tunc sanè potum ampliorem assu-
mere oportet, vinum dilutius & paulatim: cibis quoque
mollioribus ac paucioribus tum vtendum est: & ablato pa-
ne, mazam exhibere, & iuxta eandem rationem obsonia de-
trahere, & ex assatis omnia cocta facere. Oleribus verò
paucis tunc vti oportet, donec ad ætatem perueniat ho-
mo,

Hippocratis Liber

mo, cibis mollioribus vtendo, & obsoniis coctis, & oleribus D
 tam crudis quàm coctis, similiterque potibus quàm dilu-
 tissimis ac plurimis, ita tamen vt paulatim non de repen-
 te his vtatur, ne videlicet magna mutatio fiat. At verò æsta-
 te maza molli nutriatur, & potu aquoso ac multo, obsoniis
 omnibus coctis. Sic autem his vbi æstas fuerit, vti oportet,
 vt frigidum sit corpus & molle. Tempus enim calidum est
 & siccum, & facit corpora æstuosa & squallida. Quapro-
 pter tali studio auxiliari oportet. Iuxta eandem verò ra-
 tionem, quemadmodum ex hyeme ad ver, sic ex vere ad æsta-
 tem deducendus est, cibo quidem detracto, potu verò aucto.
 Sic quoque contraria faciendo ex æstate ad hyemem per-
 ducatur. In autumno verò rursus cibi plures exhibendi sunt E
 & sicciores, & obsonia iuxta eandem rationem, potus ve-
 rò pauciores & meraciores, quo etiam hyems bona fiat, &
 In hyeme. homo in ipsa vtatur potibus meracioribus ac paucis, cibis
 verò quàm plurimis ac siccissimis. Sic enim & maximè sa-
 nus fuerit, & minimè frigore impetetur. Nam tempus hoc
 Carnosorum valde frigidum ac humidum existit. Porro habitibus cor-
 natura. porum carnosus & mollibus ac rubris, plurimo anni tempo-
 re siccioribus diætis vti conducit. Humida enim est ipsorum
 natura. Verum duros & graciles, fuluosque ac nigros humi-
 diore diætâ maiore temporis parte victitare oportet. Cor-
 In iuuenū vi- pora enim talia sicca existunt. Sed & iuuenibus corporibus,
 ctus. mollioribus & humidioribus diætis vti confert. Nam ætas
 ipsorum sicca est, & corpora compacta sunt. Seniores au- F
 tem siccioris victus modo, maiori tēporis parte degere oportet.
 Senum vi- Corpora enim in hac ætate humida sunt, & mollia ac fri-
 ctus. gida. Oportet igitur & ad ætatem, & ad tempus anni, &
 ad corporum species ac habitus, diætas constituere, ita vt
 consistentibus & caloribus, & frigoribus nos opponamus,
 Sic enim maximè sani fuerint. Quin & ambulandum hye-
 me quidem velociter est, æstate autem leniter, nisi per solis
 æstum iter faciendum sit. Oportet autem & carnosos ci-
 tius ambulare, graciles verò tardius. Balneis quoque multis
 Balnear. æstate vtendum est, hyeme paucioribus, Gracilibus autem
 magis expedit lauari, quàm carnosus. Vestes autem puras
 Obesorum induere hyeme oportet: oleo imbutas ac sordidas, æstate.
 victus. Caterum pingues, & qui graciles fieri volunt, omnes la-
 bores

A bores ieiuni facere debent, & cibos assumere anhelantes adhuc ex fatigatione, & non refrigerati, præpoto vino diluto, & non valde frigido, & obsonia præparata assumere ex sesamidis, aut condimentis hortensibus, & aliis huiuscemodi. Sint autem obsonia pingua quæ offeruntur, sic enim à quàm paucissimis impleri poterint. Sed & semel in die cibum sumere, & illotum manere, & stratum durum habere, & nudum deambulare oportet, quantum eius maximè fieri potest. Quicunque verò graciles sunt, & pingues fieri volunt, tum alia his quæ dixi contraria facere, tum ieiunos nullum laborem subire oportet. At verò vomitibus, & alui per infusa elotionibus hoc modo vtendum est. Sex menses hybernos vomendum est, Hoc enim tempus pituitosius est æstiuo, & morbi circa caput fiunt, & regionem eam, quæ est suprà septum transuersum. Quum verò æstas accalor fuerit, infusis vtendum est. Hora enim hæc æstuosa est, & corpus biliosius, & lumbi ac genua grauantur, & calores oboriuntur, & in ventre tormina fiunt. Quapropter corpus perfrigerare oportet, & quæ in sublime eleuantur, inferne subducere ex istis locis. Sint autem infusa pro crassioribus ac humidioribus salsiora & tenuiora, pro siccis verò & gracilibus ac debilioribus, pinguiora ac crassiora. Crassa autem & pingua infusa sunt, quæ ex lacte fiunt, & cicerum decoctum, & alia huiusmodi. Tenuia verò & salsa, sunt muria & aqua marina, & eiuscemodi. At verò vomitus sic facere oportet. Quicunque homines crassi ac pingues sunt, & non graciles, ieiuni vomant à cursu aut ambulatione cita, iuxta meridiem. Sit autem dimidia hemina hyssopi in aquæ congio contriti, atque hoc ebibat affuso aceto & adiecto sale, quo iucundius euadat. Bibat autem primùm sensim ac lentius, postea ampliùs & citius. Qui verò graciliores sunt ac debiliores, à cibis vomitum faciant hoc modo. Lotus calida præbibat meri heminam, deinde cibos omnigenos edat, & neque dum cibum sumit, neque à cibo bibat, sed contineat se donec quatuor stadia quis percurrat, deinde vina tria permixta ipsi in potu offerantur, austerum, dulce, ac acidum, primùm quidem meracius, & paulatim, & per multum temporis spatium. deinde verò dilutius, & citius, & multum. Quicunque autem

Gracilium
& macilentorum
vicius.

Vomitibus
quæ cietur.

Hippocratis Liber

autem bis in mense vomere cōsuevit, huic melius est vt con D
sequēter in duobus diebus vomat, quā per quintum & de-
cimum. Verū aliqui penitus contrarium faciunt. Quibus-
cunq; verò commodum est reuomere cibos, aut quibus alui
non probum transitum habent, his omnibus conducit sapē
in die comedere, & omnigenis eduliis vti, & obsoniis variis
modis præparatis, vinūque bibere duplex aut triplex. Qui
verò reuomunt cibos aut aluos habent humectas, his omni-
bus contrarium huiusmodi facere conducit. Cæterū pue-
rulos infantes per multum tempus in aqua calida madefa-
cere oportet, & vinum bibendum dare aquosum, & non peni-
tus frigidum. Dandum est & id vinū quod minimè ventrem
eleuet ac inflat. Hęc autem facere oportet, vt & conuulsioni- E
bus minùs corripiantur, & maiores fiant, ac meliorem calo-
rem adipiscantur. Mulieres porrò siccioris modi diætā vti
oportet. Nam & cibi sicciores ad muliebrium carniū mol-
liciem cōmodiores sunt, & meraciores potus præstabiliores
sunt ad vteros ac fœtuū nutrimenta. Qui exercitiis vtuntur,
hyeme currere ac luctari debēt. Aestate verò luctari quidem
parum, currere autem minimè, sed multum deambulare se-
cundum ventum ac frigus. Quicumque ex cursibus fatigati
fuerint, eos luctari oportet. Qui verò ex lucta fatigantur, eos
currere expedit. Sic enim laborans, fatigata corporis parte,
vel maximè calferi componiq; ac recreari queat. Quos-
cunque exercitiis vtentes alui profluuiā corripiunt, & recremen-
ta ciborum speciem referentia ac cruda habent, his exerci- F
tiorum non minùs quā tertiam partem detrahēre opor-
tet, & ciborum dimidium saltem exhibere. Palam est enim
quod ventriculus confouere non potest, quo ciborum multi-
tudo concoquatur. Sint autem his cibi, panis quā maximè
assatus in vino intritus, & potus quā parcissimi ac mera-
cissimi, & deambulationibus à cibo ne vtantur. Oportet au-
tem sub hoc tempus semel duntaxat in die cibū sumere. Sic
enim quā maximè concalescit ventriculus, & ea quæ inge-
sta sunt exsuperauerit. Fit hic profluuij alui modus maximè
his corporibus quæ densam carnē habent, quum ad carniū
esum homo cogitur, natura eiusmodi existente. Venæ enim
densatæ cibos ingestos non suscipiunt. Est autem hæc natura
acuta, & in vtranque partē vertitur, & ad modicum tempus
viger

Muliebris
victus.

Exercitia.

acutius
et fort

A viget bona habitudo in talibus corporibus. At verò rariores ac hirsutiores corporum species ac habitus, tum carniū esum suscipiunt, tum labores magis tolerant, & bonæ habitudines ipsis fiunt diuturniores. Quicumque postridie cibos eructant, & præcordia ipsis eleuantur, vt pote cibis crudis & incoctis existentibus, his longiori quidem tempore dormire conducit, verum & aliis laboribus corpora ipsorum cogere oportet, Vinum autem meracius & amplius bibant, & cibis paucioribus sub id tēpus vtantur. Palam est enim quod ventriculus præ imbecillitate ac frigiditate, ciborum multitudinem concoquere non potest. Quosunque verò sitis corripuerit, his & cibi & labores detrahendi sunt, & vinum bibant a-
B quosum & quā frigidissimum. Quibusunque autem dolores fiunt ex visceribus, siue ex exercitiis, siue ex aliquo alio labore, his quiescere conducit cibis abstinentes, potionem autem vtantur, quæ quā parcissimè in corpus assumpta, plurimam vrinam ducat, quo venæ visceribus insitæ non distendantur repletæ. Ex talibus enim tubercula oboriuntur, ac febres. Quibusunque verò morbi à cerebro fiunt, torpor primum caput occupat, & frequēter mingit æger, & reliqua velut in vrinæ stillicidio perpétitur, atque hæc sanè ad dies nouem patitur. Et si quidem erumpat per nares aut aures aqua siue mucus, à morbo liberatur, & vrinæ stillicidium sedatur.

Mingit autem multum, & citra dolorem, idque album,

donec viginti præterierint dies, & capitis dolor hominem relinquit. Intendenti autem oculos

splendor occultatur. Porro virum prudentem id secum reputare oportet,

quod res pretiosissima est sanitas, & proinde scire vt ex

suo ipsius consilio in

morbis utilita-

tem perci-

piat.

HIPP

HIPPOCRATIS^D

COI LIBER DE GENITV-

RA, IANO CORNARIO

MEDICO PHYSICO

INTERPRETE.

ut Polybius in 6.

*

Hic à Galeno Polybi esse perhibetur.

Prouidens
natura quā
cum possit
hinc perspi
cito.



EX QUIDEM omnia corroborat. Verū genitura viri prouenit ab omni humido, quod in corpore existit, ita ut id quod robustissimū est, secernatur. Argumentum autē eius, quod robustissimū secernitur, hoc est: quod à Veneris usu paucula ad eò re emissa, imbecilles reddimur. Habet autem res hoc modo. Venæ

Cur semen
spumescat.

Pars valen
tissima cur
in coitu ex
cernatur.

Nō eadem
via seminis
& lotij.
Sōnia Ve-

& nerui ab omni corpore in pudendū vergunt, quibus dum aliquantulum teruntur, & calefcunt ac implentur, velut pruritus incidit, & ex hoc toto corpori voluptas ac caliditas accedit. Quum verò pudendum teritur, & homo mouetur, humidum in corpore calefcit, ac diffunditur, & à motu conquassatur, ac spumescit: quemadmodū etiam alij humores omnes conquassati spumescunt. Sic autē in homine ab humido spumefcente, id quod robustissimum est ac pinguisimum secer nitur, & ad medullam spinalem venit. Tendunt enim in hāc ex omni corpore viæ, & diffundunt ex cerebro in lumbos, ac in totū corpus, & in medullam: & ex ipsa medulla procedunt viæ, ut & ad ipsam humidum perferatur, & ex ipsa secedat. Postquam autem ad hanc medullam genitura peruenerit, procedit ad rhenes, hac enim via tēdit per venas: & si rhenes fuerint exulcerati, aliquando etiam sanguis simul defertur: à rhenibus autem transit per medios testes in pudendū. Proce dit autem non quā vrina, verum alia ipsi via est illi cōtigua. Et sanē qui somnia venerea habent, propterea per somnū ge nituram effundunt, quum humidum in corpore diffusum & calfact

A calfactum fuerit, & siue ex labore, siue alia quapiam respu-
muerit, dum ab ipso secernitur, coitus imaginem repræsen-
tat. Habet enim humiditas hæc similiter vt in coeuntibus.
Sed non est mihi de his qui per somnum semen emittunt, &
de toto morbo quid est, & quæ operatur, & quare coitus lo-
cum expleat, sermo: atque hæc quidem de hoc dicta suffi-
ciunt. Cæterum eunuchi propterea non coeunt, quia geni-
turæ transitus ipsis sublatus est. Est enim per ipsos testes via
eius, & nerui tenues ac crebri ex testibus in pudendum ten-
dunt, quibus & eleuatur, & demittitur: atque hi nerui in ex-
sectione dum castrantur, rescinduntur, quapropter non sunt
vtilis eunuchi. Nam neruis ipsorum extritis, genituræ via
obturata est. Callus enim obducitur testibus, & nerui duri
ac torpentes à callo facti, pudendum neque tendere, neque
laxare possunt. Quibuscunque verò iuxta aures venæ sectæ
sunt, hi coeunt quidem & genituram emittunt, verum mo-
dicam & debilem ac infœcundam. Nam plurima genituræ
pars à capite iuxta aures in spinalem medullam procedit.
Ipse autem transitus, cicatrice sectioni inducta, consolida-
tus est. At verò pueris venulæ tenues & repletæ existentes,
genituræ transitum impediunt, & pruritus ipsis non simili-
ter accedit, & propterea neque conquassatur in corpore hu-
midum, ad genituræ secretionem. Quin & virginibus quo-
usque iuuenulæ fuerint, menses non procedunt, propter
eandem causam. Postquam autem adoleuerint & virgo &
puer, venæ in pudendum pueri tendentes, itémque virgi-
nis in vterum, amplæ sunt præ augmento, & oscula ipsarum
aperiuntur, & via ac transitus per angustias contingit, & hu-
midum tunc etiam agitationem habet. Nam spatiositas ipsi
tunc ab agitatione ac conquassatione contingit: & puero
sanè procedit genitura vbi plenè puber fuerit ob hanc cau-
sam, itémque virgini menses. Atque hæc mihi sic demon-
strata sunt. Porro genituram dico à toto corpore secerni, &
à solidis, & à mollibus partibus, & ab humido omni in to-
to corpore. Sunt autem humidi species quatuor, Sanguis,
Bilis, Aqua, & Pituita. Tot enim species congenitas homo
in seipso habet, & ab his morbi fiunt, aut etiam ex mor-
bis discretionones. Et hæc quidem dicta sunt à me, de genitu-
ra, vnde fiat, & quomodo, & quare, & quibus genitura non
est, &

neris cur
fiant.

Castrati
cur nō co-
eant.

Secundum
aures venæ
incisæ, pro-
creationem
tollunt.

Cur pueri
& puellæ
nihil demis-
tunt.

Quatuor
corporis hu-
mores.

Hippocratis Liber

Qui foemi- est, & quare non est, & de mensibus virginum, & quod mulie **D**
nis in coitu ribus in coitu, dum confricatur ac teritur pudendum, & vte-
fiat. ri mouentur, velut pruritus in ipsos incidat, & quod reliquo
corpori voluptas ac caliditas accedat. Emittit autem & mu-

Coitus vo- *emul.* **luptas vtro** oportuno est hiarit. Et delectatur mulier vbi coire ince-
ranque est. perit per omne tempus, donec vir semen emiserit. Et si qui-

dem appetit viro commisceri, prius quam vir emittit, & de
cetero non similiter delectatur. Si vero non appetit, simul

cum viro delectari definit: & habet res hoc modo, quemad-
modum si quis in feruentem aquam, alteram frigidam infun-

In vir **dat,** illa feruere cessat. Sic genitura viri in vterum illapsa, ca **E**
sem. **liditatem & voluptatem mulieris extinguit.** Exilit autem vo-

luptas & caliditas simul cum genitura in vteros illabente, de-
inde definit: quemadmodum si quis in flammam vinum in-

fundat, primum quidem contingit flammam exilire, & per
modicum tempus augeri, ad vini infusionem, deinde desinere.

Ita etiam mulieri caliditas exilit ad genituram viri: deinde
desinit. Ceterum multo minus delectatur foemina quam vir

in coitu, & vir etiam tempore longiore. Propterea autem quod
vir magis delectatur, secernitur ipsi de repente ab humido,

fortiori turbatione ac agitatione quam mulieri. Habet autem
& haec res hoc modo. Mulieres si cum viris coeant, magis sa-

nae sunt: si non, minus. Nam & vteri simul humidi fiunt in
commixtione: qui enim sicci sunt magis, quam conuenit, for- **F**

riter contrahuntur: vbi vero fortiter contrahuntur, dolorem
corpori afferunt: & simul coitus sanguinem calfaciens ac hu-

meccans, viam faciliorem mensibus facit. Mensibus autem non
procedentibus, corpora foeminarum morbosa fiunt. Quapro-

pter autem morbosa fiunt, in muliebribus morbis referetur.
Et de his quidem haec tenus. Postquam autem coiuit mulier,

si quidem conceptura non est intra se ipsam, pro more foras
procedet genitura ab utrisque, vbi foemina volet. Si vero con-

ceptura est, non procedit foras, sed manet in vtero genitura.
Nam vteri susceptam & conclusam in sese continent, osculo
nimirum ipsorum pra humiditate contracto ac concluso si-

mulque permiscetur, tum quae a viro venit, tum quae a mu-
liere emissae sunt. Quod si foemina partus perita sit, & cogno-

uerit

A uerit quando genitura non exciderit, sed intus manserit, sciet qua die intra seipsam concepit. Habes autem & hoc sic. Quandoque quidem fortius est semen à muliere emissum, aliquando verò debilius. Similiter etiam quod vir emisit. Et est tum in viro foemineum itémque masculum semen, tum itidem in muliere. Fortior autem masculus foemina est. necesse est igitur ipsum à fortiore semine generari, habetque res hoc modo. Si ab vtrisque semen fortius prodierit, masculus erit partus: si verò debile, foemina nascetur. Vtrum autem multitudine ac copia praeualuerit, iuxta illud ipsum partus nascetur. Si enim multò plus fuerit debilis feminis quàm fortioris, superatur fortè, & debili permixtum, in foeminam transit. Si verò plus fuerit fortis feminis quàm debilis, superatur debile, & in marem transit. Quemadmodum si quis ceram & adipem misceat, & de adipe tamen plus coniiciat, eaque ad ignem liquefaciat, Quandiu quidem liquida fuerint, non apparet vtrum tandem horum superet, vbi verò congelata fuerint, tunc iam conspicuum est, quòd adeps ceram copia exuperat. Sic habet etiam masculi & foeminae genitura. Quòd verò & in foemina, & in viro, genitura foeminea sit ac mascula, ex manifestis factis coniectare licet. Multae enim mulieres iam foeminas pepererunt ex propriis viris, verum ad alios viros transgressae masculos genuerunt. Et viri illi ipsi apud quos mulieres foeminas pepererunt, ad aliarum mulierum mixturam progressi, masculos genuerunt: & quibus masculus sexus gignebatur, aliis foeminis permixti foemineam sobolem genuerunt. Atque haec sanè ratio declarat tum virum, tum foeminam, & foemineam, & masculam genituram habere. Nam apud quos viros, foeminas pariebant, superabatur fortius semen à copia debilioris, & gignebantur foemellae. Apud quos verò masculos pariebant, superabatur debilius, & gignebantur mares. procedit autem non semper ab eodem viro genitura fortis, sed neque semper debilis, sed aliàs alià, atque sic etiam in muliere res habet, vt minime mirandum sit, easdem foeminas, eosdémque viros, sobolem masculam & foemineam producere. Habet autem & in brutis geniturae foemineae ac masculae ratio eodém modo. Et in ipsa genitura egreditur & foemineum, & masculinum

Semen masculu & foemineum in vtroque inesse.

Cur mares modò, foeminae modò gignantur.

Cur permixtato coniugio permittetur & soboles.

e

ab

Partus simi ab omni corpore, & à debilibus debilis, & à fortibus fortis: D
 litudinis va & necesse est sic in partum distribui. Et ex quacunque corpo
 rietas. ris viri parte plus prodierit in genituram, quàm mulieris,

partus ille magis similis erit patri. Vnde cunque verò à cor
 pore mulieris plus venerit, magis assimilabitur matri. Est
 autem impossibile, partū per omnia matri similem esse, &
 patri nihil: aut vice versa, neque alteri quicquam similem
 esse: sed vtrisque necesse est in aliquo similem esse, siquidem
 ab vtrisque corporibus semen in partum procedit. Vter au
 tem tandem plus contulerit ad similitudinem, & à pluribus
 corporis regionibus, illi magis similis est. Contingitque
 aliquando ut filia nata maiori ex parte, magis similis sit pa
 tri quàm matri, & filius natus aliquando magis similis est E
 matri quàm patri. Atque hæc tam multa à me relata decla
 rant superiorem sermonem, Quod & in muliere, & in viro
 tum mascula, tum foeminea genitura existat. Contingit au
 tem & hoc. Quandoque partus tenues & debiles generantur,

Cur non va
 lidi ex vali
 dis gignan
 tur.

Cur omnes
 partus non
 validi edā
 tur.

Cur modò
 parui mo
 dò magni
 nascantur.

Cur modò
 parui mo
 dò magni
 nascantur.

ex patre & matre crassis ac robustis: & si quidē multis iam
 generatis pueris tale quid contingat, manifestum est quod
 foetus in utero agrotavit, & ab utero quid de suo ipsius in
 cremento foras prodiit, utero nimirum amplius hiantes:
 & propterea debilis factus est. Vnumquodque autem ani
 mali iuxta proprium robur agrotat. Si verò omnes pueri
 nati debiles fuerint, uteri ipsi in causa sunt, angustiores
 quàm oportet existentes. Si enim non habuerint spaciosi
 tatem, in qua foetus nutriri possit, necesse est ipsum tenuem
 fieri, utpote qui non habeat satis amplum locum ad incre
 mentum capiendum. Si verò habeat satis amplum locum, &
 non agrotet, verisimile est ex magnis parentibus magnam
 sobolem generari. Habet autem hoc modo, Quemadmo
 dum si quis cucumerem qui iam defloruit, sit autem adhuc
 tenellus, & in cucumerario adhuc adhæreat, ponat ac im
 mittat in vas angustum, æqualis ac similis euadet cavitati
 ipsius vasis. Si verò quis eundem in vas amplum indet, quod
 verisimile sit cucumeris capax esse, sed non valde multo
 maius quàm pro cucumeris natura, æqualis itidem ac si
 milis erit cucumis vasis ampli cavitati. Nam in augeſcen
 do cum vasis cavitatem contendit, & ferme omnia nascentia
 sic habent, quomodo quis ipsa cogat. Sic sanè & in puero
 se res

A se res habet. Si enim spatiositas ipsi contigerit in augefcendo, maior euadet: si verò angustia, minor. At verò mutilum in vtero puerum, sentio aut contulum ex matris vterum gestantis plaga, aut eiusdem lapsu, aut alio quopiam violento affectu matri accidente, mutilatum esse. Qua verò parte mātundatur fœtus, ita vt pellicula ipsum continens rumpatur, perditur fœtus. Quin & alia huiuscemodi causa pueri mutilantur. Quum in vtero iuxta locum in quo mutilatus est fœtus, angustia fuerit, necesse est corpus quod in angustia mouetur mutilari, iuxta illum locum. Quemadmodum etiam arbores quæcunque in terra sunt, & non habent satis amplum locum, verum à lapide, aut aliqua alia re impediuntur, quum emergunt, oblique ac tortuosæ sunt, aut hac parte crassæ, altera tenues. Sic accidit etiam circa puerum, si in vtero iuxta aliquam corporis partem, angustior altera vteri pars altera fuerit. Caterum quod ex mutilatis hominibus sani & integri gignantur pueri, vt plurimum contingere solet. Habet enim mutilatū, numero omnia quæ sanum. Vbi verò morbus aliquis ipsis, & humido ipsorum acciderit, à quo semen provenit (quatuor sanè quum species sint humidi, quæ naturaliter in corpore existunt) geniturā non rotam exhibent, debiliorem autem, iuxta mutilatam partem.

Cur muti-
lari.Sæper fer-
me sani &
integri ex
mutilis na-
scuntur.

Quare nihil miri mihi videtur, si etiam mutilentur, quemadmodum parens. Et hæc mihi de hoc dicta sufficiant. Redibo autem rursus retro ad sermonem quem dicere reliqui.

e 2

HIPPOCRATES

HIPPOCRATIS^D

COILIBER DE NATURA

PVERI SIVE FOETVS.

IANO CORNARIO ME-

DICO PHYSICO

INTERPRETE.

*

*Et de hoc Galenus dubitat Hippocra-
tisne an Polybi sit.*

E

in trib
Quid agat
semē in vul-
ua cum re-
manfit.



Cur omnia
ardētia spi-
ritum emit-
tant.

6. hys.
Ligna viri-
dia cum ar-
dēt cur fla-
tū spiritum
ve emittāt.

I genitura ab vtrisque permanferit
in vtero mulieris, primum quidem
fimul mifcetur, vtpote muliere non
quiefcente, coaceruatūque ac cras-
fa per calorem euadit. Deinde fpiri-
tum concipit, nempe in calido exi-
ftens, & poftea matre fpirāte. Dein-
de vbi fpiritu repleta fuerit, viā hic
ipfe fibiipfi foras facit, & per mediā
genituram fpiritus erumpit. Quum autem fpiritu calido
via foras facta eft, rurfus alius frigidus à matre infpirat, at-
que hoc facit per omne tempus. Calefcit enim vtpote in cali F
do exiftens, & frigidum fpiritus concipit à matre fpirante.
Omnia autem quæ calefcunt fpiritus habent. Spiritus au-
tem erumpit & fibiipfi viam facit, ac foras procedit. Id autē
quod calefcit rurfus in feipfum alium fpiritus frigidū tra-
hit per fifsuram vnde nutritur. Atque hoc cōtingit etiam in
lignis, & in foliis, cibisq; ac potibus, fi fortiter calefciant. Eius
rei notionē ligna ardentia exhibent: omnia enim ligna hoc
faciunt, maximè verò fubuiridia. Emittunt enim fpiritus
iuxta fectionem. Spiritus autem quum foras procedit, circū
cæfuram volutatur, id quod femper fieri videmus. Manife-
fta igitur eft ratiocinatio de fpiritu, quod calidus exiftens in
ligno, attrahit alterum frigidum à quo nutritur, & à feip-
fo dimittit. Nam fi non alterum pro eo quem à fe dimittit
attrah

A attraheret, non volutaretur spiritus foras prodiens. Omne enim calidū frigidū moderato nutritur. Et vbi percalfactū fuerit humidum quod est in ligno, in spiritum mutatum foras procedit, & qua parte foras exit, ea ipsa calidus qui inest adhuc in ligno, alterum frigidum spiritum eius loco attrahit, à quo nutritur. Idem faciunt & folia viridia. Quum enim incenduntur spiritum concipiunt, deinde erumpit spiritus & viam facit, forasque prodit & circumuolutatur, procedens autem strepitum facit, qua parte inspirationem præbet. Quin & legumina & frumenta, & arborei fructus nunc generis calfacta spiritum habent, qui fissura facta foras prodit, & si humida fuerint, ampliorem spiritum emittunt, & rimam maiorem faciunt. Et quid multis verbis opus est? Omnia quæcunque calefiunt, spiritum emittunt, & alium frigidum vicissim eius loco attrahunt, à quo nutrimentum sumunt. Atque hæ necessitates ea gratia à me productæ sunt, ut cognoscatur quod genitura in utero calfacta spiritum habet, & emittit. Simul autem & à matre spirante, genitura spiritum habet. Quum enim mater frigidū attraxerit ex aëre in seipsam, fruitur eo etiam genitura. Calida autem est, utpote in calido existens, & tunc sanè spiritum habet, ac emittit, atque ipsa genitura inflata pelliculam acquirit. Circumtenditur enim quod forinsecus circumipsam est, cōtinuumque euadit, utpote viscosum existens, Quemadmodum in pane dum torretur, tenue quiddam pelliculæ specie in superficiem abscedit ac extat. Calefcens enim panis & inflatus eleuatur, qua parte verò inflatur, isthic pelliculæ species excitatur & cōsistit. Genituræ autem calfactæ ac inflatæ ex toto, pellicula forinsecus circundatur. Verum iuxta medium genituræ, spiritui transitus extrà ac intro fit per pelliculam, & hac parte tenuitas pelliculæ à genitura distat, & paucissimum quid de genitura inest. Ipsa autem reliqua genitura rotunda est in pellicula. Atqui genituram quæ sex diebus in utero misit, & foras prolapsa est, ipse vidi, & qualis tum animo meo obseruabatur, ex illis ipsis reliquorum cōiecturam facio. Ut verò ego viderim genituram sex dierum existentem enarrabo. Mulieris nobis familiaris famula cantrix magne existimationis ex virorum consuetudine erat, quam in ventre concipere non conueniebat, ut ne minoris existimatio

Folia viridia cū eomburuntur spirant.

Legumina & poma si miliaq; calfacta spiritū concipiunt.

Quid agat semen cū in vulua remansit.

Quali specie fuerit semen quod sex dies in

vulua man
ferat.

Semen in
membrana
molli tan-
quam ouū
continetur.

Fœtus in v-
tero quo-
modo cre-
scat.

in mens.

in mul.

p. 6. p.

Quomodo
sensim cre-
scit fœtus.

mationis redderetur. Audierat autem cantrix ipsa qualia D
mulieres inter se dicunt, quòd quando mulier conceptura
est in ventre, genitura non egreditur, sed intus manet.
Auditis autem his atque intellectis, hoc semper obserua-
uit, & quum quandoque sentiret genituram non exeun-
tem, dominæ exposuit, & sermo statim ad me peruenit.
Ego verò quum audissem, iussi ipsam ad terram saltare,
& postquàm septies iam exiliisset, genitura in terram pro-
fluxit, & strepitus factus est, atque illa conspecta ipsa ad-
mirata est. Qualis autem erat ego referam: velut si quis
ouo crudo externam testam circum circa adimat, in in-
terna verò pellicula inclusus liquor pellucescat. Modus qui-
dem talis erat, & vt abundè dicam, ruber erat liquor & E
rotundus. In pellicula vero fibræ quædam albæ ac crassæ
inesse videbantur, cum cruore crasso & rubro obuolutæ:
circum autem pelliculam foris cruenta vestigia instar su-
gillatorum, iuxta medium verò tenue quid eminebat,
quod mihi umbilicus esse videbatur, & per illum sanè spi-
rationem extra & intro primum facere apparebat: quin &
pellicula genituram ambiens ac complectens, tota ex illo
tendebatur. Talem sanè ego genituram sex dierum exi-
stentem vidi. Referam autem & aliam dinotionem, omni-
cupienti de hoc scire, qui mihi paulo post hanc manifestè
apparuit, & testimonio esse potest omni meo sermoni, quod
verus est, quantum homini de huiusmodi re dicere da-
tur. Atque hæc mihi de hoc dicta sunt. Quòd genitura in F
pellicula est, & spiritum habet intro & foras, & augetur à
matre sanguine in vterum descendente. Menses enim non
prodeunt, vbi mulier conceperit intra seipsam, si puer sa-
nus fuerit, & permanere debet, nisi in quibusdam primo
mense modicam sui indicationem faciant. Verum san-
guis à toto corpore mulieris descendens, in orbem forin-
secus pelliculam circumstat, Simulque cum spiritu sanguis
intra per pelliculam trahitur, qua parte perforata est, &
à genitura distat, congelaturque & futuro animali augmen-
tum præbet. Quum autem tempus accesserit, rursus a-
liæ pelliculæ intra primam pelliculam tenues & multæ
circuntenduntur, eo modo quo prima pellicula facta
fuit. Sunt autem & hæc ab umbilico extenæ, & inter se
mutua.

A mutua ligamenta habent. Quum verò iam hoc factum est, ex descendente à matre sanguine & congelato, caro fit. Iuxta mediam autem carnem umbilicus distat, per quem spirat, & alimentum ac incrementum capit. At verò mulier quum vterum gerit, à menibus non prodeuntibus propterea non dolet, quod sanguis non conturbatur, aceruatim abire solitus singulis mensibus, sed procedit sensim & modicè citra dolorem, quotidie in vterum ipsum, & quod inest intus in vtero augetur. Singulis autem diebus ea gratia procedit, & non semel per mensem, quod genitura in vtero existens semper à corpore trahit, prout vires, tum ipsa, tum spiratio habet. Et primum quidem modica spiratio fit, & sanguis modicus à matre procedit. Quum verò spiratio amplior redditur, magis sanguinem trahit, & vberior is in vterum descendit. Atqui vterum non gestantibus, ubi menses non prodierint, propterea dolor oboritur. Primum quidem sanguis in corpore singulis mensibus turbatur ab huiusmodi necessitate, quod mensis à mense multum differt, & secundum frigiditatem, & caliditatem. atque hoc percipit mulieris corpus, humidius enim est quam virile. Vbi autem turbatus est sanguis, & venas impleuit, ab ipso descendit, qualis ab initio naturæ fuit. Quare si quidem euacuatur à sanguine mulier, in ventre concipit: si verò repleta fuerit, no. Nam vacuis vteris, & venis à sanguine factis, mulieres in se fœtus concipiunt. Etenim post menstrui sanguinis purgationem mulieres in ventre concipiunt. Causa iam dicta est. Quando autem conturbatus & secretus sanguis foras non procedit, sed in vteros, vteri autem non hauerint, tunc sanè à sanguine diutius immorante vteri calefcere, reliquo corpori calorem transmittunt, quandoque etiam sanguinem in venas corporis distribunt, ut & venæ repletæ doleant, & tumores laxos producant. Quandoque etiam periculum est ne claudicatio ex hoc inducatur. Aliquando & vesicam obident, premuntque ac claudunt vesicam, & urinx stillicidium inducunt. Aliquando pleni quoque sanguinis existentes vteri prociunt, aut ad coxendices, aut lumbos, & dolorem exhibent. Aliquando ubi sanguis quinque aut sex menses in vteris moram traxit, putrefactus pus fit, & quibusdam pus per pudendum exit. Sunt etiam quibus circa inguem velut tuberculum

Fœmina cum vterum gestat menstruis cur non languet?

Mulieres quæ grauidæ non sunt, & menstruis carent, cur male habent?

Fœminæ menstruis carentes non concipiunt.

Sanguis in vuluis retentus totum corpus afficit.

Male

Menstruum diutius retinentibus,

quæ agri-
tudines cō-
tingant.

Caro cū gi-
gnitur quid
fiat.

χρῆσις.

Conforma-
tio partus.

Ἀνὰ.

Similitudi-
nem hanc cō-
sidera.

culum fit, illique suppuratum exit. Sed & alia multa huius-
modi mala mulieribus fiunt, ubi lunares purgationes non
procedunt. Sed quid opus est ea hic recensere? Referentur
enim in muliebribus morbis. Verum iam repetito eo quod
reliqui, sermonem absoluam. Quum autem generatur ca-
ro, tunc pelliculæ augescere in utero sanguine, etiam ipsæ
augentur ac sinuantur, & præsertim externæ. Et sanguis à
matre descendens, quem sanè caro spirans attraxerit, in in-
crementum cedit, & si utilis non sit, in sinus pellicularum se-
cernitur: & ubi sinuata factæ fuerint, ac sanguinem suscepe-
rint, tunc iam secunda appellatur. Et tantum de hoc mihi di-
ctum sit. Cæterum caro augescens à spiritu articulatur, &
abit in hac vnumquodque simile ad simile, densum ad den-
sum, rarum ad rarum, humidum ad humidum. & vnumquod-
que in propriam regionem abit, iuxta cognationem, ad id à
quo genitum est: & quæcunque à densis genita sunt, densa
sunt: & quæcunque ab humidis, humida: & reliqua iuxta ean-
dem rationem fiunt in incremento. Et ossa durescunt à ca-
lore conglutinata. Et sanè ramificantur velut arbor, & tum
interna, tum externa corporis, adhuc melius articulantur:
Ipsūque caput distantiam acquirit ab humeris, & brachia
ac cubiti à lateribus: & crura inter se disparantur: & nervi
exiliunt circum naturas articulorum: & os per se diducitur,
& nasus, & aures eminent in carne, ac perforantur: & oculi
implentur humore puro, & pudendum cōspicuum fit utrum
tandem sit: & viscera coarticulantur: & iam etiam supernis
partibus spirationem facit, tum ore tum naribus: & venter
inflatur, & intestina inflata supernè, per umbilicum spiritū
assumunt, ac disperdunt: & in podicem via fit à ventre ac in-
testinis foras, & in vesicam via foras. Atque hæc omnia à spi-
ritu coarticulantur, Nam inflata disparantur omnia, iuxta
cognationem. Etenim si velis fistulam vesicæ alligare, & per
fistulam immittere in vesicam, terram & harenam, & plum-
bi tenuia ramenta, insuperque infusa aqua in fistulam infla-
re, primum quidē illa aquæ permiscetur, deinde verò tem-
poris progressu inflata secedent, & abibit plumbū ad plum-
bum, harena ad harenam, terra ad terram. Et si quis ipsa
arescieri permittat, & distracta vesica cōtempletur, inueniet
simile ad simile progressum esse. Sic sanè etiam genitura &
caro

A caro coarticulatur, & vnumquodque in ipsa simile ad simile
abit. Atque hæc mihi de hoc dicta sunt, & factus iam est
puer, & ad hoc peruenit fœmella quidem in quadraginta &
duobus diebus vt longissimè, primam coagmentationem
ac coarticulationem accipiēs. Masculus verò vt longissimè,
in triginta diebus. Vt plurimum enim hoc tēpore, aut pau-
lò breuiore, aut paulò longiore, articulatio ipsis contingit.
Nam & purgatio fit à partu vt plurimum, in fœmellis qui-
dem, diebus quadraginta & duobus: atq; hæc tardissima est,
& perfecta. Vacauerit autem periculo, etiā si in viginti quin-
que diebus purgetur. In masculo verò purgatio fit diebus
triginta: atque hæc tardissima est, & perfecta. Citra tamen
B periculum fuerit, etiā si in viginti diebus mulier purgetur.
Postremo autē tempore purgatio quā paucissima procé-
dit, & in iunioribus paucioribus diebus purgantur, in senio-
ribus verò pluribus. Caterū maximè laborāt ac dolent in
partu, & partus purgationibus mulieres primiparæ, & quæ
rarius pariunt, magis dolent, quā quæ sæpius. Atqui pur-
gationes à partu mulieribus ea gratia fiunt, quòd primo
tempore vsque ad dies quadraginta duos in fœmella, in ma-
sculo verò ad dies triginta, paucissimus sanguis in augmen-
tum pueri descendit. Ab hoc autem tempore copiosior, do-
nec pariat. Oportet itaque purgationem reddi in toto puer-
perij tempore, & foras exire ac respondere pro dierum ra-
C tione ac proportionē. Principium autem huiusmodi purga-
tionis tale mulieri fit: Dum ex partu laborat, conturbatur
sanguis mulieri, & à forti pueri motu vehementer calefcit.
Conturbatus autem, primus quidem foras prodit. Deinde
puer, post puerum verò, mucus crassus sanguinolentus, &
deductio contingit huic, quemadmodū aquæ estulæ in men-
sa. Postea post illum per omnes dies purgatio procedit, vsque
ad prædictum tempus, copia Atticæ hemina vnius & dimi-
diæ primū, aut paulò plus minúsve, pro eius temporis ra-
tione, donec desinat. Procedit autem sanguis velut à victi-
ma, si sana est, & sana futura est mulier, & statim congela-
tur. Si verò mulier sana nō est, neque sana futura est, purga-
tio paucior procedit, & specie deterior, & non citò congela-
tur. Id verò hoc modo habet. Si mulier vterum gestans mor-
bum habuerit nō cognatum, in puerperij purgatione perit.

Tempus
cōformatio
nis in vte-
ro.

Quæ fœ-
minæ plus
minúsve in
partu, puer
perio quela-
borent.

Quo pacto
fœtus erū-
pat.

Si. Sane
pur. a

**Puerpera
sum nō ple
nē purgan
tur, pericli
tantur.
Purgatio
nes quot
diebus fūt.**

Si verò non purgetur in prioribus diebus vterum gerens, ita d
tim sana existens, aut etiam non commoueat autem ipsa
purgatio siue à pharmacis, siue sua sponte de repente, iuxta
dierum rationem procedet, quibus non vna vice procedit.
Si enim non purgetur mulier à purgationibus partus, mor
bus magnus ipsam corripit, & periculum vite incurret, nisi
citò curetur, & quis conuenientem ipsi purgationē inducat.
Hæc propterea produxi, vt ostenderē quod in pueris mem
brorum discretio longissima contingit, in fœmella in qua
draginta duobus diebus, in masculo in triginta. Argumen
to est purgatio à partu, quæ in fœmella fit in quadraginta
duobus diebus, in masculo in triginta, vt tardissimè contig
gat. Repetam autem iterum eandē rem iisdem verbis, ma
ioris lucis ac declarationis gratia. Dico enim talionem re
pendi, quod genitura in vtero existenti paucissimus sanguis
à matre in vterum venit, si fœmineam genituram habeat, in
quadraginta duobus diebus, in his enim coarticulatur pue
rorum membra: ab hoc verò tempore copiosior sanguis ve
nit. Et in masculo rursus iuxta rationem dierum triginta.
Quod verò hæc vera sint, etiam alterum testimonium adest,
hoc modo habens, Primis diebus vbi genitura in vteros illa
pfa est, paucissimus sanguis à muliere in vteros venit, dein
de copiosior. Si enim aceruatim & multus semel veniret, ge
nitura spirationem habere non posset, sed sanguine multo
accedente suffocaretur: Rependitur autem in purgatione
vice versa, purgatio enim puerperij in primis diebus pluri
ma procedit, deinde paucior, donec desinat. Multæ autem
mulieres puerum masculum iam perdiderunt paulò antè
trigesimum diem, & inarticulatus apparuit. Qui verò po
sterius perdit sunt, aut simul cum trigesimo die, omnes ar
ticulati apparuerunt. In fœmella itidem iuxta rationē qua
draginta duorum dierum habet. Nam vbi his absolutis per
ditur, articulatio membrorum apparet. Siue autem prius,
siue posterius perdetur puer, iuxta hanc rationem apparet.
Nam & secundum rationem, & necessitatē, articulatio con
tingit in fœmella, in diebus quadraginta duobus, in mascu
lo in triginta. Testimonium enim præbent abortus puero
rum, & à partu purgationes. Quod autem fœmella poste
rius conformatur ac coarticulatur, causâ hæc est: quod ge
nitura

**Quando
abortus in
formes.**

**Puella chr
tardius cō
formetur.**

A nitura foeminea debiliior est ac humidior quam mascula, & iuxta hanc rationē necesse est posterius conformari foemellam quam masculū, atq; ea gratia etiā purgatio diuturnior est in foemella quam masculo. Redibo autem rursus retrō vnde digressus sum. Postquam iam articulatus fuerit puer, speciebus membrorū ipsius augescantibus, tūc & ossa duriora fiunt, & cauantur, atq; hęc a spiritu fiunt. Caua autē existētia trahunt ad sese a carnibus quod in sanguine est pinguisimum: & progressu tēporis ramificantur rursus extremitates ossium, quemadmodū arboris extremitates postremum ramos spargunt, sic & in puero digiti manuum ac pedum inter se disparantur. In ipsis autem extremitatibus vngues enascuntur. Desinunt autē venę hominis omnes in digitos manū ac pedum. Et crassissimę quidē sunt venę totius corporis, venę capitis, deinde crurū, & brachiorū ac cubitorum. In pedibus autē & manibus, tenuissimę ac densissimę & plurimę venę sunt. Nervi itē tenuissimi ac densissimi & plurimi, & ossa magnitudine minima, atq; hęc maxime in digitis manū ac pedum existunt. Verū ex digitis, utpote ossa densa ac parua habetibus, venas itidem ac nervos, sic etiā vngues tenues ac densi nascuntur, & intercipiunt ac concludunt venarū extremitates, ut ne amplius augescāt, neque altera alteri pręmineat: ut nihil miri sit vngues in extrema corporis parte densissimos esse, ex densissimis enim constant. Simul autē cū vnguibus etiā capilli in capite radican-
C tur. Ceterum pilorum natura hoc modo se habet, Oriuntur quidē maximi ac plurimi, qua corporis parte cuticula rarissima est, & vbi pilus moderatū humorē in alimētum habet: & vbi cuticula posterius rara fit, ibi etiam pili posterius nascuntur, velut in mēto, & pube, & sicubi aliās pili nascuntur. Simul enim ut genitura prodit, etiā caro rarefcit, & cuticula & venę aperiuntur magis quam priori tēpore. Nā dum adhuc puer est, & venę tenues existunt, non procedit per ipsas genitura, eadē ratio de mensibus virginū est: Simul autē ut via fit & geniturę, & menstruis virginibus, etiā pilos emittit pubes, tum pueri, tum virginis, rara nimirum cuticula reddita, simulq; pilus moderatā humiditatem in alimentum habet, & non pauciorē. Si verō & in mento viri contingit. Rara enim fit cuticula, procedente in ipsam de capite humiditate,

Caua ossa
quid agāt.

Digitum tan-
quam ramus
musculi pos-
tremo dis-
cernuntur.
Quę in pe-
dibus & ma-
nibus in-
sunt.

Cur densi
vngues.

Capillus
pilusq; quo
loco fructi-
cet.

Seminis
per venas
via quādo
fiat.
Virguncu-
lis cur in-
terdū men-
ses non sint.
Pubertatis
caussa.

Simul

Hippocratis Liber

Simul enim & in coitu, simulq; interiecto tempore, pilus mo-
deratam humiditatem in alimentū habet, & tunc maximè,
quum tempus contingit humiditati de capite descēdenti in
coitu, ad mentum à pectore distās. Signum autem eius quod
in rarissimis cuticulæ partibus pili enascuntur: si quis velit
inurere cutem, & pustulam tantum facere, eamq; sanare, cu-
tis densa reddita per cicatricē pilos non producet. Quicunq;
verò Eunuchi dum pueri sunt, fiunt, propterea neq; in pube,
pubescant. neque in mento pilos producant, leuēsq; toti existunt, quòd
via genitura non facta, cuticulam non rarefacit per totā su-
perficiē. Intercepta est enim ac conclusa genituræ via, quem-
admodum paulo ante à me relatum est. At verò mulieres le-
ues fiunt, & mento, & corpore, quòd in coitu ipsarum humi-
ditas non similiter agitata velut viri, cuticulam raram non
facit. Quicunque autem calui fiunt, hi sanè pituitosi sunt. &
pituita in capite ipsorū simul cum coitu agitata & calfacta,
ad cuticulam allabens pilorū radices exurit, & defluunt pili.

Cute vstu-
lata pilus
non fruti-
cat.
Eunuchi
quare non
pubescant.

mul.

Caluitij
caussa.

+

Eunuchi
non calue-
scunt.
Canicies
cur.

Verum eunuchi propterea calui non fiunt, quòd vehementē
motum non faciant, neque pituita in coitu calfacta pilorum
radices exurit. Cæterum cani ob id fiunt quòd lōgo tempore
pertranseunte in homine humiditate, albissimum eius secer-
nitur, & ad cuticulam allabitur, & pilus albidiorē humi-
ditatem trahens albidior fit quàm priori tempore, itēque
ipsa cuticula, præsertim vbi cani sunt, albidior alia euadit.

Et quicunq; ex natiuitate canū quid in capite habent, etiam
illis cuticula summa vbi cani sunt, reliqua albidior existit. F
Illic enim albissima est humiditas. Habet autē res hoc mo-
do, Qualemunque humiditatem caro attraxerit, siue albā,
siue rufam, seu nigram, tali colore etiam pilus inficitur. Atq;

hæc de hoc dicta sunt, Redibo autem rursus ad sermonem
relictum. Quum itaque extremitates corporis pueri foras
ramos sparserint, & ungues ac pili radices egerint, tunc iam
etiam mouetur, & tempus ad hoc fit, masculo quidem men-
ses tres, foemellæ verò quatuor. Sic enim vt plurimū contin-
git. Sunt autem aliqui pueri, qui ante hoc tempus mouētur.

Mouetur autē primū masculus, quia fortior est quàm foe-
mella: & primū quoque conformatur masculus. nam à for-
tiore & crassiore genitura fit. Quum autem mouetur foetus,
tunc sanè lac indicationem sui, matri præbet. Mamme enim
attoll

Drum fit

vtos m

map. m

si fact. lac in mam. app.

A attolluntur, & papillæ gliscunt ac turgēt: Lac verò non pro-
dit: & in mulieribus densam carnē habentibus, lac posterius

significationem de se præbet ac prodit. in rarū verò carnem
habētibus, prius. Lac autem ob huiusmodi necessitatem fit.

Lac cur
fiat.

Quum vteri tumidi præ puero sunt, ventrem mulieris com-
primunt: eius autē pleni vbi cōpressio contigerit, pinguis-
simum de cibis ac potibus foras profilit, in omentum ac car-
nem. Quemadmodū si quis coriū illinat multo oleo, & imbi-
bere permittat, & vbi imbibit, coriū ipsum premat, oleum
vtique exilierit foras ex corio compresso. Sic etiam si venter
pinguitudinē in se habeat à cibis ac potibus, comprimatúrq;
ab vteris, pinguitudo profilit in omētum ac carnem. Et si ra-
ra carnis mulier fuerit, citius percipit eius persultationem:

Quomodo
lactis
probat.

B ræ carnis mulier fuerit, citius percipit eius persultationem:

si non, posterius. Quin & pecora pragnātia si non ægrotent,

Pecora gra-
uida potu
& cibo ma-
gis pingue
scunt.

ab eodem potu ac cibo pinguiora propterea fiunt. Similiter
autē & mulier. Et à pinguitudine calfacta ac alba existente,
quod edulcatū est à caliditate, quæ ab vteris accessit, expres-
sum venit in māmās, & in vteros quoq; parum venit, per eas-
dem venas. Tendunt enim & in māmās & in vteros venulæ

Lactis co-
pia quādo.

hæ, & consimiles aliæ. Et vbi peruenerit in vteros de lacte,

puer ipso paululum truitur, Mammæ verò suscepto lacte im-
pletæ attolluntur. Et vbi peperit mulier principio motus fa-
cto, lac in māmās ipsas procedit, si lactauerit. Sic enim res ha-
bet. Dum mamme lactāt ac exuguntur, venulæ in mammas

ampliores fiunt, ampliores autē factæ, à ventre pinguitudinē
trahentes, in māmās distribuunt. Nam & vir si multū coeat,

Salacitas
viris vnde.

venæ ampliores redditæ, Venerē magis inducunt. Habet au-
tem & hoc eo modo: Alimentum & augmentum puerorū fit,

vbi ea quæ à matre veniunt, in vteros processerint, & prout
mater habet iuxta sanitatem aut debilitatem, sic & puer ha-

Venerē

bet. Quemadmodum etiam quæ in terra crescunt, à terra nu-

ut me

triantur, & prout terra habuerit, sic etiam nascentia in terra

Quomodo

habent. Etenim semen vbi deiectum fuerit in terram, humi-

sata nascun-
tur.

ditate quadā ab ipsa impletur. Habet enim in se terra omni-

genum humorē, vt nascētia nutrire possit: impletum autem

humore semen, inflatur & intumescit, & vis quæ in semine

leuissima est, ab humore condensari cogitur, condensata au-

tem à spiritu vis, & humore folia producēte, semen rumpit,

& primum folia foras emergūt. Vbi verò emerferint, quum

non

non amplius ab humore in semine existēte folia nutriri pos-
sint, rumpitur infernè semen, itēque folia, & semen à foliis
coactū, vim suam ad inferna demittit, quæ videlicet in ipso
restat propter gravitatem, & fiunt radices ex foliis distentæ.
Postquā autem plāta iam firmiter radices infernè egerit,
& alimentum à terra sumit, tunc sanè totum evanescit, & in
plantam consumitur, præter corticē, qui solidissimus existit.
Rursus autem cortex in terra putrefactus progressu tempo-

**Quæ terra
gignuntur,
quomodo
procedant.**

ris evanidus fit, & quædam folia ramos producūt. Ex semine
itaq; tanquam ex humido nata planta, donec quidem tenera
& aquosa fuerit, in augmentū supernè ac infernè procedens,
fructum excludere non potest. Non enim vim habet fortem
ac pingue, ex qua semen condensari queat. Vbi verò solidior
facta est, & progressu temporis radices egerit, tūc iam & ve-
nas habet amplas, tum ad supernam, tum ad infernam par-
tem: & tunc sanè non amplius aquosum ex terra trahit ali-
mentum, sed crassius & pinguius ac copiosius quod calfactū
à Sole efferuescit in extremitates, & fit fructus iuxta cogna-

**Cur multa
ex vno gi-
gnantur.**

tionem, ex quali etiam generatus est. Multus autē ex modi-
co propterea fit, quod singula ex terra nascentia maiore vim
ex terra, quā ex eo vnde generata sunt, trahunt, & efferue-
scunt non secundum vnum, sed secundum multa. Quum au-
tem fructus prodierit, à planta sua nutritur. Planta enim à
terra trahens, fructui trāsmittit. Sol autem fructum coquit,
& solidū facit, quod aquosius in ipso est, ad sese trahens. Atq;
hæc mihi dicta sunt de his quæ ex semine nascuntur à terra & F

**Arbor qui
plantetur,
crescatve.**

aqua. Cæterum ex plantariis ab arboribus arbores fiunt, hoc
modo. Ramus vulnus habet, qua parte ab arbore defractus
est, in infima ad terrā parte, vnde radices prodeunt. Pangitur
autem, & in terram demittitur, hoc modo: Quum plāta quæ
in terra existit, humorem acceperit à terra, tumescit & spi-
ritum habet, quæ verò pars supra terram eminet, nondum.
Spiritus autem & humor condensans in inferna plāte parte
vim, quantū eius gravissimum est, in infernam partē erum-
pit, & ex ipso radices teneræ fiunt. Postquam autem in infer-
nam partem receptus fuerit, tunc iam ex radice humorē tra-
hit, & parti supra terram eminenti transmittit: & tunc sanè
rursus superna pars intumescit, ac spiritū habet, & quantum
ex vi in planta leve inest, id ipsum cōgregatum germinat, ac
folia.

A folia producit, & iam in supernā partem augmentum facit, itémq; in infernam. Sic itaq; contrarium contingit circa germinationem, in his quæ ex semine, & in his quæ ex plantariis proueniunt. Ex semine enim prius folium emergit, deinde radices in infernam partem demittuntur. Verum arbor primum radices agit, deinde folia acquirit, propterea quod in semine ipso humoris copia inest, & in terra quū totum inest, alimentum inest primum folio sufficiens, vnde folium nutritur, donec radiceatur. Verum in ramo non sic fit. Non enim gignitur ex altero, vnde folium primum alimentū habeat, sed ipse ramus est, & velut arbor habet, & multa eius pars supra terram eminet. Quare quum supra terram existat, humore impleri non potest, nisi ex inferna parte magna quadam vis procedens in supernam humorem distribuatur. Et plantarium primò necesse est sibi ipsi alimentum sufficere à terra in radices, deinde vbi sic à terra attraxit, sursum distribuere, & folia ad germen & augmentum concitare. Quum autē augmentum cepit planta, à tali necessitate ramos spargit, quam referam. Quū plus humoris ipsi accesserit ex terra attracti erum pit præ multitudine, quā parte quā plurimus fuerit, & hac parte planta ramos emittit: augetur autem & in amplitudinem, & in supernā, & infernam partem, propterea quod inferna terræ pars hyeme quidem calida est, æstate autem frigida. Atque hoc propterea contingit, quod terra humida est in hyeme, præ aqua de cælo delabente, & comprimitur in se ipsam, utpote humore grauiore existente: densior autem ab hoc ipso est, & nullam transpirationem habet. Non enim amplius magna raritas ipsi inest: & propter hoc inferna terræ pars hyeme calida est. Nam & fimum densius accumulatum, intus calidius est, quā quod rarum existit & aliās, humecta ac compressa, à seipsis concalescunt, & breui a calore valde exulta putrescunt. neque enim permeat spiritus per ipsa, nimirum quum densa existunt. Si verò sicca fuerint, ac rare posita, multo minus calescunt ac putrescunt. Atque sic sanè frumentum ac hordeum humidum, ac madefactum, intus calidius est, quā si siccum sit, & rare positum. Et vestes pelliceæ colligatæ ac fortiter compactæ, à seipsis comburuntur, velut ego vidi, quemadmodum ab igne exultæ. Sed & alia si quis velit considerare, Omnia quæ comprimuntur à seipsis, calidiora

Cur herba
& arbores
contrario
modo coa-
lescant.

Cur terræ
inferiora
hyeme ca-
lida, æsta-
te frigida
sint.

Cur humi-
da cum co-
acervantur
calescant.

4 diora reperiet, quàm quæ rarè posita sunt. Non enim habent
 unde frigiditatem inspirent à ventis. Sic etiam inferna terre
 pars cum plena sit, & ipsa à seipsa comprimatur, nimirum
 grauis ac densa existens, ab humiditate in hyeme calefcit, nul-
 lam enim caliditatis perspirationem habet. Sed vbi de cœlo
 aqua cadit in ipsam, quū spiritus prodierit ab ipsa in terra,
 non vltius penetrat, utpote terra densa existente, sed spiri-
 tus retrò ad aquā abit: & propterea fontes ac marinæ aquæ,
 hyeme calidiores sunt, & auctiores quàm æstate, quia spiri-
 tus dum exhalat, retrò abit ad aquā, quum terra densior exi-
 stat, & per se spiritum non transmittat. Et aqua multa exi-
 stens quæ contigerit, ea perrupens procedit, & viam sibi ipsi
 ampliorem facit, quàm si modica existat. Aqua enim in ter-
 ra non consistit, sed semper in decliue procedit. Si autem spi-
 ritum ab aqua prodeuntem terra per se hyeme transmittat,
 paucior aqua ex ipsa procederet, & fontes hyeme magni nō
 essent. Atque hæc omnia in hoc dicta à me sunt, quod terræ
 inferna pars calidior esse apparet hyeme, quàm æstate. Nūc
 autē dicere volo, quod æstate frigidior quàm hyeme, inferna
 terræ pars esse videtur. Terra æstate rara est & leuis, nimirū
 Sole vehemētius irruente, & ab ipsa humiditates ad sese at-
 trahente. Habet autē terra in se semper aquam plus aut mi-
 nus. Spiritus autem omnes nobis sunt ab aqua. Id quod sic se
 habet, unde coniectare polsis, demonstrabo. Etenim ab omni-
 bus fluminibus ac nebulis spiritus semper procedunt. Est au-
 tem nebula aqua in aere cohærens & continua. Et tunc sanè
 terra rara est ac leuis æstate, & aquam in se habet, & aqua in
 decliue fluit, procedente autem aqua semper inde alius ex alio
 spiritus exhalat. Qui verò exhalat, per terrā abit leuem
 ac raram existētem, & frigiditatē terræ inducit, & ipsa aqua
 simul perfrigeratur. Habet autē sic, Quemadmodum si quis
 aquam in vtre existentē fortiter comprimat, & per punctu-
 ram acus, vel paulò maiorem, perspirationē aquæ faciat, &
 ipsum vtrē in sublimi suspēdat, nullus spiritus per foramen
 procedat, sed aqua, non enim habet spatiositatem, per quam
 aqua spiritum emittat. Sic sanè se habet etiam hyeme aqua
 in terra. Si autem aquæ in vtre locum satis amplum feceris,
 & vtrē in sublimi suspenderis, spiritus per foramen proce-
 det. Locū enim spiritus habet ab aqua mota, procedendi per
 vtrē,

Mare &
 fontes cur
 hyeme ca-
 lescant, &
 turgeant.

Nebula
 quid.

τῆ ὁμοιωσὶς
 confirmat.

- A** vtre[m], & propterea per foramen spiritus transit. Sic sanè se habet etiam æstate aqua in terra. Satis amplū enim locū habet, nimirum terra rara existente, & sole ab ipsa humorē ad se trahente, & pertransit spiritus, utpote qui frigidus existit, ab aqua per ipsam raram existētem ac leuem. Ob hoc itaq; inferna ipsius pars æstate frigida existit, & aqua ipsa adhuc magis quā[m] spiritus, qui in terra frigidus existit, & ipsa in seipsam, & in terra, spiritum emittit. Sed & aqua quæ hauritur in puteo, spiritum semper mouet, velut flabellum, atque hoc ipsum aquæ frigiditatē inducit. Quæ verò nō hauritur æstate, sed stans densa existit, nō similiter spiritū in se à terra suscipit, neq; in terram à seipsa distribuit: & simul à sole & aëre in puteo non disperso, sed stante ac firmato, primū[m] superfacies ipsius calefit, deinde alia eius pars ad aliam deorsum caliditatem distribuit, & propterea aqua quæ æstate nō hauritur, calidior est ea quæ hauritur. Quin & fontes valde profundi æstate semper frigidi existunt: & aqua hausta hyeme terra calida existente, ex tali fonte, statim quidem calida est, vbi verò tēpus progressum fuerit, frigida est ab aëre videlicet frigido existēte talis facta. Perflatur enim à vento, & spiritus per ipsam pertransit. Quēadmodum etiam aqua quæ æstate hauritur, vbi hausta fuerit, statim frigida est, calida autē fit postea, propterea quod terra rara existēte, & spiritu in ipsa existēte, perfrigeratur: Vbi autem haustæ tempus accesserit, stabilis fit, & calida cōspicitur, Calefit enim ab aëre calido existente, quēadmodum & aqua quæ non hauritur in puteo æstate, ob hoc ipsum calida redditur. Atq; hæc à me de hoc dicta sunt. Repetam autem rursus quod æstate inferna terræ pars frigida est, hyeme verò calida. Superna autem vice versa. Et oportet arbori non duo calida simul accedere, neque duo frigida simul, si sana esse debet. Verū[m] si quidem ex superna caliditas accesserit, ex inferna frigiditatē ipsi accedere oportet, & vice versa, si ex superna parte accedat frigiditas, ex inferna caliditatem ipsi contingere oportet. Et radices vbi attraxerint, arbori transmittunt, & arbor vicissim radicibus: atq; sic & frigidi & calidi conseruatio contingit. Quemadmodum homini ingestis cibis in vētrem, qui dum concoquuntur calefaciunt, perfrigationem à potu facere oportet. Sic & arbori contrarium rependi oportet, ex infer-

Cur aqua
hyeme cali
da, æstate
friget.

Fontis alti
qualis aqua

Homines si
cuti arbo-
res nutria-
tur.

na parte ad supernam, & vicissim, & augetur arbor, & in su D
pernam, & in infernam partem, propterea quod alimentum
ex inferna & superna ipsi accedit. Et quandiu quidem vehe-
menter tenera fuerit arbor, fructum non producit. Non enim
est in ipsa pinguis vis, neque crassa, quæ ad fructum conferre
possit. Progressu autem temporis venæ in ipsa dilatata, pin-
guem ac crassam influxionem ex terra in ipsam faciunt, sol
autem ipsam diffundens, ebullire facit utpote leuem existē-
tem, in extremitates, & fructum producere, & tenuem qui-
dem humiditatem à fructu sol aufert, crassam autem conco-
quens & calefaciens edulcat. At verò arbores nō fructiferae,
in se pinguitudinem tantam non habent, quantum eius in
fructum est expēdendum. Omnis arbor autem quum per tē E

Cur insita
suū fructū
ferant.

iam penitus cōstanter augetur desinit. Quicumque verò in
arbores, ab aliis arboribus oculos indiderūt, & arbores in ar-
boribus enatae viuunt, & fructificant non similem fructum ar-
boribus, quibus insite sunt, id ipsum tali modo cōtingit. Ocu-
lus primum quidem germinat. Alimētum enim habet pri-
mum ab arbore, ex qua ablatus est, deinde ab ea, in quā in-
situs est. Vbi autem germinauerit, sic in arborem radices te-
nues à se demittit, & primum humore fruitur in arbore, in
quam insitus est, existente, deinde tēpore accedēte, demittit
radices in terrā, per eā in quā insitus est, & fruitur humore
quem à terra trahit, & alimentum inde ipsi contingit, ut non
mirū sit, insitas arbores, alios fructus producere, à terra enim F

Partus ter-
renis com-
paratur.

viuūt. Hæc mihi de arboribus & fructibus dicta sunt ea gra-
tia, quod indignum mihi factum videbatur, & ne poteram
quidem, hæc tractationē semiperfectam relinquere. Redibo
nunc rursus retrò ad illum sermonē, cuius gratia à me hæc
de istis relata sunt. Censeo enim terræ nascentia omnia viue-
re ex terræ humore, & qualē terra humorē in seipsa habet,
talem etiam nascētia ex ipsa habere. Sic etiam puer viuit de
matre in vtero. & quali mater sanitate prædita est, talē etiā
puer habet. Quod si quis cōsiderare velit ea quæ de his dicta
sunt, ab initio vsque in finem, inueniet naturam omnem cō-
similem esse, & ex terra nascētium & hominū. Et hæc mihi
de hac dicta sunt. Caterum puer in vteris existens manus a-
pud genas habet, caput autē prope pedes: & non datur probē

Pueri situs
in vtero.

genæ

ac cer

A ac certo cognoscere, etiam si puerum in vtero videas, vtrum ca-
put sursum habeat, an deorsum. Verum ex vmbilico pelliculae
tentae sunt ipsum continentes. Nunc autem referam dinotionem,
quam paulo ante me demonstraturum dixi, quantum huma-
nae menti possibile est manifestam existentem, omni qui de
hoc cognoscere velit, quod genitura in pellicula est, & quod iux-
ta medium ipsius vmbilicus est, & per illum sanè, primò spi-
ritum in seipsam trahit, & foras emittit. & quod ex vmbili-
co pelliculae tentae sunt. Sed & alia pueri naturam, quam dixi,
sic totam habere usque in finem reperiet, quomodo videlicet à
me in his sermonibus declaratum est, si quis testimoniis, & o-
cularibus inspectionibus à me producendis uti velit. Etenim si
B quis ova viginti aut plura, quo pulli ex ipsis excludantur gal-
linis duabus aut pluribus subiicere velit, & singulis diebus
à secunda exordièdo, usque ad ultimam qua excludetur pullus ex
ouo, subtrahere, confringere, ac videre, inueniet omnia se ha-
bere iuxta meum sermonem, quomodo volucris naturam,
ad humanam conferre oportet. Quod enim pelliculae ex vmbi-
lico tentae sunt, & reliqua quae de puero dicta sunt, sic se ha-
bere in ovo volucris reperies, ab initio in finem. Atqui si quis
nondum vidit, mirabitur in volucris ovo vmbilicum inesse.
Atque haec sic habet, & sic à me relata sunt. Quando verò mu-
lieri partus appropinquat, tunc puero se mouente, & manibus
ac pedibus calcitrante, pelliculam quandam internam rupi-
C contingit, rupta autem una, etiam alia debiliorem vim ha-
bent, & rumpuntur primum quidem illi contiguae & cohaeren-
tes, postea extrema. Quum autem ruptae fuerint pelliculae, tunc
foetus à vinculo exoluitur, & agitatus foras procedit, Neque
enim amplius robur habet pelliculis amissis, neque vteri am-
plius puerum continere possunt, pelliculis velut dixi amissis, &
ab ipsis abruptis. Cohærent enim pelliculae etiam vteris, ubi cir-
cum puerum obuoluuntur, non adeo vi valida ac multa. Quàn-
do autem procedit puer, violat & dilatat vteros in exitu, ut
pote teneros existentes. Procedit autem in caput, si secundum
naturam prodierit. Grauiissimae enim sunt ipsi superne partes,
si ex vmbilico perpédantur. Quum autem in vteris est, ma-
gis continens existit usque ad pellicularum rupturam simul cum
decimo mense, quando partus matri propinquat, & adest. Si
verò violentam affectionem perpetiatur puer, etiam ante
f 2 prae-

Per ovum
hoc confir-
mat.

Quo pacto
puer erum-
pat.

Caput pri-
us si natu-
raliter ex-
eat.

præfinitū tempus ruptis pelliculis prodit. Quin & si alimen-
tū à matre prius puero defecerit, etiā sic partus matri prius
aduenit, & ante decimū mensem puer prodit. Caterum quæ
longius quā decem mēsum tempus vterum gestare sibi vi-
se sunt: nam hoc iam sepe audiui, illæ ipsæ hoc modo quem
dicturus sum deceptæ sunt. Quum vteri spiritū acceperint in
seipso, à ventre flatum exhibente, eleuantur ac intumescūt,
contingit enim hoc, Videntur sanè sibi mulieres tunc conce-
pisse. Præterea si menses non procedentes, cōgregati fuerint
in vtero, & diutius manserint, semper perfluūt in vteros, ali-
quando vnā cum flatu à ventre, aliquando etiam calescētes,
& sanè tunc quoq; in vtero habere mulieres sibi vidētur, ni-
mirum mensibus non prodeuntibus, & vteris eleuatis. Dein
de aliquando menses sua sponte erumpunt, aut aliis superue-
nientibus à corpore in vteros, & priores protrudentibus, &
flatus egreditur, & multis iam statim post mēsum purgatio-
nem vteri hiant, & ad pudendū vertuntur, & tunc viris per-
mixta, ad se genituram concipiunt, eadem die aut omnino
in paucis. Existimant autem inexpertæ harum rerum ac ra-
tionum, etiam illo tēpore se in vtero habuisse, quando men-

Cur plus-
quam decē
menses par-
tus in vtero
esse nō pos-
sit.

Cur nutri-
mentum an-
te decimū
mēsem pue-
ro in vtero
deficiat.

ses non prodibant ipsis, & vteri erant eleuati ac tumentes.
Quod autem non diutius quā decem mensibus contingat
vterum gestare, ego demonstrabo. Alimentum & augmen-
tum quod à matre descendit, non amplius sufficiens est pue-
ro, vbi decē menses præterierint, & foetus auctus fuerit. Tra-
hit enim quod dulcissimum est in sanguine ad sese, simulq; F
etiam lacte modice fruitur. Quum autem hæc ipsi rariora
ac pauciora sint, & puer plenus ac maturus existat, copiosius
alimentum desiderans calcitrat, ac pelliculas rumpens, ini-
tium partus matri inducit, & hoc perpetiuntur magis mu-
lieres primiparæ: deficit enim pueris alimentum, vt ad de-
cimum vsque mensem sufficere non possit. deficit autē per
hunc modum. Sunt quædā mulieres quibus sufficientes mē-
ses purgantur, quædam quibus pauciores: hoc ipsum si sem-
per fiat, in natura, & genere, maternum ipsis existit. Quæ ve-
rò menses paucos demittunt, hæc etiam pueris postremo tem-
pore, vbi iam maturi fuerint, alimentum rarius exhibentes,
ipso calcitrare faciunt, vt & ante decimum prodire festi-
nent. Modicus enim sanguis à iuueniculis ac nouellis matri-
bus

Abus procedit: ut plurimum verò cōtingit tales mulieres etiā *Quæ parū*
 sine lacte esse, quæ paucos menses demittunt. Sicciore enim *lactis ha-*
 sunt, & densiorem carnē habent. Huic autem rationi, quod *beant.*
 videlicet deficiente alimento prodit puer, etiā si nō aliqua
 violenta affectio ipsi accidat, etiā hoc testimonio esse potest.
 Volucris ex oui luteo nascitur, hoc modo. Incubante matre
 ouum calefcit, & quod in ouo inest à matre mouetur, cale-
 fcens autem id quod in ouo inest, spiritum habet, & alterum
 frigidum ab aëre per ouum attrahit. Ouum enim adeò ra-
 rum est, ut spiritum qui attrahitur sufficientem ei quod in-
 tus est transmittat: & augetur volucris in ouo, & coarticula-
 tur modo eodem ac consimili velut puer, quemadmodum

Biam antea à me relatum est. Nascitur autem ex luteo oui vo-
 lucris, alimentum verò & augmentum habet ex albo, quod
 in ouo est. atque hoc iam omnibus manifestum factum est,
 qui animum aduerterunt. Vbi autem deficit alimētum pul-
 lo ex ouo, non habens id sufficiens vnde viuat, fortiter moue-
 tur in ouo vberius alimentum quærens, & pelliculæ circum-
 dirumpuntur, & vbi mater sentit pullum vehementer mo-
 tum, putamen exalpens ipsum excludit. atque hæc fieri so-
 lent in viginti diebus, & manifestū est quod ita se habent.
 Vbi enim exclusa est volucris, nullus humor in oui testis in-
 est, qui sanè memorabilis existat, expensus est enim in pul-
 lum. Sic etiā vbi auctus fuerit puer, mater non amplius suf-
 ficiens alimentum ipsi exhibere potest. Vberius itaque præ-
 sente alimentum puer quærens, calcitrando pelliculas dirū-
 rat.

Cpit, & à vinculo exolutus simul foras prodit. atq; hæc ut lon-
 gissimè in decem mensibus fiunt, & secundum hanc ratio-
 nem etiam pecoribus ac feris partus aduenit, in tēpore quo
 singula pariunt, non tardius. Etenim unicuique animali ne-
 cesse est tempus esse, in quo alimentum fœtui rarius erit, &
 deficiet, & partus adest, Et quæ quidem paucius alimentum
 pueris præbent, citius pariunt. Quæ verò vberius, posterius,
 Atque hæc mihi de hoc dicta sunt. Porro diruptis pelliculis,
 si pueri momentum in caput inclinatum prædominabitur,
 mulier facilè parit. Si autē obliquus, aut in pedes procedet,
 contingit enim hoc sæpe si momentum huc inclinat, siue
 præ vterorum spaciositate, siue si mater in labore ex partu
 primū non quieuit: & si sic procedet, mulier difficulter pa-
 riēt.

Hoc cōtra
 Plinium &
 Aristotelē
 esse videt.

Partusquā
 do accele-
 rat.

Pecora si-
 militer eni-
 tuntur.

Cur quæ-
 dā tardius
 quædā ce-
 lerius pa-
 riant.
 Partus
 qualis.

Hippocratis Liber

Quando in riet. Multæ autē vel ipsæ perierunt, vel puer, aut simul ma-
 enixu ma- tres vnâ cum foetibus. Caterum ex parientibus ac puerperis
 tres partû- maximè laborant primiparæ, propter inexperientiâ dolorû,
 ve pereunt. & dolent quidē totū corpus, maximè verò lumbos ac coxen-
 Cur primi dices. Nā coxendices ipsarū disparantur. Verū expertæ iam
 paræ ma- partus, minus primiparis dolent. Quæ verò multoties perpe-
 ris in eni- rerūt, multominus dolēt. Si porro in caput processerit puer,
 xu laborāt. caput primū foras prodit, deinde alia mēbra consequuntur,
 Caput postremus autē vmbilicus. Ex vmbilico autē secunda tenta
 prius exit, est. Post hæc aquositas & mucus sanguinolētus tum à capite,
 deinde cæ- tum à reliquo corpore secretus, præ violētia & dolore ac ca-
 tera. lore, atq; hic viam struit purgationi à partu cōsequenti. Post
 Vmbilicus. exitū autē eius mucī cruēti, purgatio fit per tēpus antea re-
 latum. Et tū mām & tū reliqua mēbra quæ humidiora sunt,
 mulieribus rumpūtur, minimè quidē in primo partu, postea
 verò prout plures pariunt, ita ampliùs rumpūtur, euacuatis
 Quī gignā venis præ partus purgatione. Atque hæc à me de hoc dicta
 tur gemel- sunt. Gemelli autē fiunt ab vno coitu, hoc modo. Vteri sinus
 li. frequentes & curuos habent, alios remotiores, alios propin-
 quiores pudēdo. Et animalia quæ multa gignūt, plures sinus
 habent, quā ea quæ pauca. Similiter autē habēt & pecora &
 feræ, & volucres. Vbi itaq; cōtigerit geniturā findi, & in duos
 sinus peruenire, & vteri, geniturā susceperint, & sinus alter
 ad alterum nō hiauerit, nec dimiserit, segregata genitura in
 utroque sinu pelliculas induit, & viuificatur eodē modo quō
 Canes & vnus foetus, quapropter verò id fiat diximus. Quod verò ab F
 fues hoc cō vnō coitu gemelli gignātur, hoc testimonio cōstat. Est canis,
 firman. & sus, & alia animalia, quæ ab vno coitu pariunt & duo, &
 plura, & vnū quodq; animal in vtero, in sinu ac pellicula exi-
 stit: atq; hæc ipsi fieri videmus, & hæc omnia eadē die vt plu-
 rimum pariunt. Sic autē & mulieri ab vno coitu gemelli fa-
 cti, vterq; in sinu & pellicula est, & eadē die vtrunq; parit. &
 alter prius foras procedit, & pellicula ipsius siue secunda.
 Quod autem gemelli, fœmella & masculus generantur, hoc
 causæ esse sentio. In muliere & in viro, & in omni animali,
 in singulis & debilior, & fortior genitura inest, & non semel
 ac simul genitura procedit. sed & bis & ter ebullit ac eiacu-
 latur: & nō est possibile omnē esse fortē, tum quæ prius exi-
 uit, tum quæ posterius. In vtrū autē sinum, crassiorē ac for-
 tiorem

Atiorem geniturā ingredi contigerit, illic masculus gignitur. In vtrū verò rursus humidiorē ac debiliore, illic fœmella generatur. Si vero in vtrunque fortis ingredietur, ambo masculi fient. Sin debilis, ambo fœmellæ. Atque hic sermo sic relatus totus finem habet.

HIPPOCRATIS

COI LIBER DE CARNI-

BVS, IANO CORNARIO

MEDICO PHYSI-

CO INTER-

PRETE.



Ego ad hunc usque sermonem communibus sententiis vtor, tum aliorū qui me præcesserunt, tum etiā meis. Necesse enim est commune principiū sententiis supponere eum qui velit hanc de arte medica tractationem componere. Verū de rebus sublimibus in aere ac cœlo, neque opus habeo dicere, nisi quòd quantum ad hominē & reliqua animantia, quæ sunt, & nata sunt, pertinet, demonstrabo, & quòd anima sunt, & quòd sanitas, & quòd morbus, & quòd in homine malum ac bonum, & vnde moritur. Nunc autem ipse meas sententiās profero. Et videtur sanè mihi id quod calidū vocamus, immortale esse, & cuncta intelligere, & videre, & audire, & scire omnia tum præsentia, tum futura. Huius igitur plurima pars, quum turbata essent omnia, in supernam circumferentiam secessit. Et videntur mihi ipsum veteres Aethera nominasse. Altera pars inferna, appellatur Terra. frigidū quid & ficcum. & multis motionibus obnoxium, & in hac sanè multum calidi inest. Tertia pars aeris, mediū locum occupavit, calidum quid ac humidum existēs. Quarta verò pars terræ proximum locum cœpit, humidissimum quid ac crassissimum. Hæc itaq; quum turbata essent, & in orbē circunvoluerentur, multa calidi pars in terra cōclusa est, alibi maior, alibi minor, alibi valde pauca, alibi copia multa: & tempo-

Calidū ca-
lorve sol &
aether quid
possit.

Terra.

Aer.

Aqua.

Hippocratis Liber

ris progressu terra à calido arefacta, hæc cōclusa in ipsa pu- D
tredines faciunt veluti tuniculas, & quātum quidem ex pu-
tredine terræ pingue fuit, & minimum humoris habuit, id
ipsum per multum tempus calescēs, celerrimè exustum est,
Ossa vnde. & in ossa mutatum. Quæ verò glutinosiora fuerunt, & frigi-
ditate participarunt, ea calefacta exuri nō potuerunt, neque
Nerui quo verò liquida fieri, propterea speciem alieniorem ab aliis ac-
modofacti. ceperunt, & nerui solidi facti sunt. Neque enim multum fri-
giditatis ipsis inerat. Verū venæ frigiditatis multum ha-
Mēbrana. bebant, atque eius frigidi quantum circumcirca glutinosif-
simum erat, à calido exassatum, membrana euasit. frigidum
verò quod erat, à calido superatum, dissolutum est, & ob id
Fauces. liquidum factum. Iuxta eandem autem rationē etiam fau- E
Stomachus ces, & stomachus siue gula & venter, & intestina in podicem
intestina, vē ter vsq; ad vsque, caua facta sunt. Quum enim frigidum semper cale-
anum caua scat, quantum eius circumcirca glutinosum erat, exassatum
cur. est, & membrana tunica facta est. Quod verò intra frigi-
Vesica. dum erat, colliquatum est, & factum est liquidum. Nō enim
erat in ipso, neque pingue, neque glutinosum multum. Iuxta
eandem rationem etiam vesica. Multum frigidum quod
ipsum circumcirca conclusit, à calido calfactum, dissolutum
est, & euasit liquidum, quum neque pingue, neque glutino-
sum in ipso esset: quòd verò supererat, tunica euasit. Sed &
de aliis quæ caua sunt eodem modo res se habet. Vbi enim
plus glutinosi quàm pinguis erat, membrana tunica facta F
est. Vbi verò pinguis plus quàm glutinosi, ossa facta sunt. Ea-
dem ratio & ossium est. Vbi quidem non inerat glutinosi,
verū pinguis & frigidi, citius exusta sunt propter pin-
guitudinem, atque hæc ossa durissima & rigidissima exi-
stunt. Vbi verò pingue & glutinosum similia sunt, hæc ossa
antrosa sunt. Et de his quidem sic habet. Frigidum quidem
congelat, Calidum autem diffundit, in multo verò tempo-
re etiam exliccat. Vbi autem pinguitudinis aliquid affue-
rit, citius exurit & ficit. Vbi verò glutinosum affuerit frigi-
do, citra pinguitudinem exuri non vult, sed tempore calef-
cens congelatur. Cæterum cerebrum sedes & metropolis est
frigidi ac glutinosi. Calidum verò pinguis sedes & metro-
polis est. Quod enim calefcit primum omnium quum dif-
funditur pingue fit. Et propterea cerebrum, quia minimum
ping

Fr. Hy.
Sum
Ossa quæ
fiat cauaq;

Cerebrum
quale.

A pinguitudinis habet, plurimum verò glutinositatis, à calido exuri non potest, sed tempore tunicam, membranam crassam accepit, circum membranam verò ossa, quantum **Medulla spinæ cur propriè medulla non sit.** calidum superauit, & in quibus pinguitudo erat. Sed & medulla spinalis appellata, à cerebro descendit, & non est in ipso, neque pinguis, neque glutinosi multum, quemadmodum & cerebro. & propterea neque nomen medullæ iuste possidet. Non enim est alij medullæ similis, quæ in aliis ossibus inest. Sola enim membranas habet, quas alia medulla non habet. Signa porro horum manifesta sunt. Si quis enim nervosa & glutinosa, itémque alia assare velit, alia quidem cito assantur. Verum nervosa & glutinosa assari **B** non volunt, minimum enim pinguitudinis habent. Pinguissimum autem & vnguinosum celerrimè assatur. At vero viscera sic mihi constituta esse videntur: nam de venis prius à me dictum est. Cor multum glutinosi ac frigidi habet, & à calido calfactum, caro euasit dura & viscosa, & membrana circum ipsum, & cauum factum est, non quemadmodum venæ: & situm est in capite venæ cauissimæ. Duæ enim sunt cauæ venæ à corde, alteri nomen est arteria, alteri vena caua, iuxta quam cor situm habet. Et plus habet calidi arteria, quàm vena caua, & spiritum condit ac conseruat. Verum præter has duas venas, etiam aliæ in corpore sunt. Cauissima autem vena, ad quam cor situm est, per ventrem omnem trāsīt, & per septum transuersum, & in vtrunque rhenem finditur, & in lumbis finditur, & exilit tum in alias partes, tum in crus vtrunque. Sed & supra cor ad ceruicem, partim in dextram, partim in sinistram, & tunc in caput ascendit, & in temporibus finditur vtrinque. Possunt **Venulæ corporis de veniant.** autem & numero maximæ venæ dici. Verum in summa, à vena caua, & ab arteria, aliæ venæ per totum corpus fissæ sunt, cauissimæ autem sunt prope cor, & ceruicem ac caput, & infra cor vsque ad coxendices. Et calidum plurimum in venis ac corde inest. & propterea spiritum cor habet, vtpote quod omnium intra hominem membrorum calidissimum existat. Procliue est autem condiscere, quod spiritus calidus est. Cor & venæ cauæ semper mouentur, & **Cor calidū est. Cor & venæ semper agitantur.** plurimum calidi in venis inest, & propterea spiritum cor trahit, ex omnibus in homine maximè calidum existens.

Hippocratis Liber

τῆς ὁμοιωσῆς Potest etiam aliter cognosci. Si quis ignem in domo accen- D
 -dēre velit, quum ventus non inspirat, flamma mouetur ali-

quando magis, aliquando minus. Sed & lucerna accensa &
ardens, eodem modo mouetur, modò magis, modò minus,
vento nullo mouente, quem sane nos spirantem cognosce-
re possumus, & alimentum calido frigidum existit. Cate-

Frigus ca- rum puer in vtero comprimens labra ex vtero matris su-
lorem nu- git, & tum alimentum, tum spiritum, cordi intro trahit, vbi
arit. sine mater respiravit. Est enim hoc solidissimum in pue-

**Puerulus in
vtero quid
faciat.**

Côfirmat. spondendum est. Pueri nascuntur stercus in intestinis ha-
bentes, & vbi nati fuerint celerrimè ventrem, tum homi- E

nes, tum pecora exonerant. Atqui non haberent stercus, nisi in vtero suxissent, Imo neque mammam statim ut natum est sugere nosset, si non in vtero suxisset. Et de motu cordis ac venarum sic habet. Porro pulmo iuxta cor ita na-

Pulmo. rus est. Cor ex humido quod glutinosissimum erat calfa-
ciens cito exsiccauit, veluti spumam, fecitque antrosum, &
venulas multas in ipso. Venulas autem ideo fecit. Quantum

enim in glutinoso inerat frigidi, id ipsum quidem à calido
 Iecur, colliquatum est, & liquidum evasit. Ab ipso verò glutino-
 so tunice facta est. At verò Iecur sic compactum est Quum

vnà cum calido multum humidi conclusum esset, citra glutinosum ac pingue, frigidum superauit calidum, & conge-

Cōfirmat. latum est. Huius signum hoc est: Quando quis victimam
mactat, donec calidus fuerit, liquidus est sanguis, postquam

Sanguis autem perfrigeratus est, congelatur. Si vero quis ipsum con-
quasset, & fibras eximat, non congelatur, fibræ enim fri-
gidæ sunt & glutinosæ. Splen autem hoc modo constitutus

Splen. est. Cum calido & glutinoso conclusum fuit, calidum quidem plurimum, frigidi autem minimum, tantum solummodo quantum ad glutinosi compositionem satis erat: fuit

modo quantum ad glutinon compactionem fatiserat : sunt
autem id fibræ in splene existentes, & propter has fibras,
mollis est splen, & fibrosus. Rhenes porro sic producti sunt,

Rhenes. Parum glutinosi, parum calidi, multum frigidi conclusum fuit, & ab hoc congelatum est, & durissimum viscus euasit, & minimè rubrum, quia non multum calidi simul con-

sticit.

Astitit. Eadem de carnibus ratio est. Frigidum quidem con-

Caro.

stituit & compegit ac fecit carnem, glutinosum autem in foramina transit, in foraminibus autem his humidum est, velut in venis magnis. Calidum autem in toto corpore est, plurimum verò & humidi in corpore est, & frigidi multum in humido: tantum autem est frigidi, quantum congelare humidum ac liquidum potest, sed superatur à calido, quare

Humidum liquidum-ve caloris quid habet.

etiam ab ipso diffunditur: Quòd verò humidum calidum est, hac demonstratione confirmatur. Si quis corpus hominis faceret, ubicunque velit, sanguis calidus fluat, & quandiu sanè calidus fuerit, liquidus erit, postquam verò refrigera-

Tuniculā spiritus aërve & frigis semper superinducit.

tus est, tum ab intrinseco frigido, tum extrinseco, pellicula fit & membrana, & si quis hac pellicula detracta, modico tempore sinat, aliam pelliculam factam videbit, si verò quis hanc semper adimat, alia rursus pellicula è frigido generatur. Ceterum ea gratia plura dixi, ut ostenderem, quòd extremum corporis ad aerem conuersum, necessario pelliculam induit, præ frigido & ventis impetentibus. At verò ar-

Articuli iūturæve.

ticuli sic generati sunt. Quum ossa facta essent, quæcunque quidem ex ipsis pingua erant, celerrimè exusta sunt, quemadmodum etiam prius dictum superiore sermone. Quantum autem ex ipsis glutinosum erat, id ipsum exuri non poterat, sed medio inter vstum & siccatum loco contentum, à calido in neruos, & saliuam ac mucum transiit. quantum

Nerui.

autem ex glutinoso liquidissimum erat, hoc cal factum crassius redditum est, utpote liquidum existens, & ex hoc saliuam facta est. verum ex illo glutinoso vngues producti sunt.

Vngues.

Etenim ab ossibus & articulis semper liquidissimum ipsorum discedens, glutinosum redditur, & à calido siccatum ac arefactum, foras in vngues delegatur. Dentes autem poste-

Dentes.

rius generantur ex hac causa. Ex ossibus capitis ac maxillarum incrementum fit glutinosi, & quod ex pingui, inest à calido siccatum exurit, & fiunt dentes reliquis ossibus duriores, quia nihil frigidi inest. Et primi quidem dentes nascuntur à victu in vtero, & postquam natus fuerit puero lactenti à lacte. Vbi verò hi exciderint à cibis & potibus, excidunt autem, vbi ad annos primi alimenti peruenerint, quibusdam etiam prius, si à morbido alimento nati fuerint. Plurimis verò quum septem annos impleuerunt. Qui verò

Dentati cur nascantur.

postea

Hippocratis Liber

Maxillæ so-
æ ossium
venulas ha-
bent ventri-
culisque.

Stercus quæ
fiat.

Cibus &
potus om-
nia irrigat,
conseruant:
& augent.

Capilli.

Dentes

postea enascuntur simul cōsenescunt, nisi præ morbo perfo-
rentur. Ceterum dentes propterea posterius alius nascuntur.

In maxilla venæ sunt, & hæ huic ossi soli inter omnia ossa,
ex inferno ventre alimentū præbent. Ossa verò tale augmen-
tum dant, qualia existunt, sed & alia omnia tale augmen-
tum reddunt, qualia ipsa existunt. Etenim venæ ex vêtre ac
intestinis, in quæ cibi ac potus colliguntur, postquam hi fue-
rint calfacti, tenuissimū ac liquidissimum trahunt, crassissi-
mum autē & fæx isthic relinquitur, computrescitque & fit
stercus in inferioribus intestinis. Tenuissimū verò trahunt
venæ ex ventre ac intestinis, quæ suprà ieiunum intestinum
existunt, atque hoc calfactis iam cibis. Vbi autem ieiunum
intestinum transierint, & in inferiora intestina collecti fue-

rint, stercus fiunt. At verò alimentum vbi accesserit, vnum-
quodque talem speciem vnicuique reddit, qualia sanè erant.
Singula enim ab alimēto irrigata augmentum capiunt, cali-
dum, & frigidum, & glutinosum & pingue, & dulce, & ama-
rum, & ossa & alia vniuersa quæ in homine insunt. Et ob id
dentes posterius nascuntur. Dictum autem à me prius est,
quòd solæ ex ossibus maxillæ, ipsæ in seipsis venas habent:
& ob id alimentum amplius in ipsas quàm in alia ossa tra-
hitur, & quia vberius alimētum, & densiorem influxum ha-
bent, augmentum ipsæ à seipsis tale pariunt, quales sanè ipsæ
existunt, atque hoc donec homo integer augeat: augeat
autem vbi conspicuus euadit, conspicuus verò fit maximè à
septennio, vsque ad decimum quartū annum. & in hoc tem-

pore, tum maximi ex dentibus, tum alij omnes nascuntur,
postquam exciderint hi qui ab alimento in vtero nati sunt.
Augeat autem & in tertium annorum septenarium, in quo
adolescens fit, vsque ad quartum & quintum septenarium.
Quin & in quarto septenario dentes enascuntur, plerisque ho-
minibus duo, qui sapientiæ dentes appellatur. Porro capilli
sic nascuntur. Ossa sunt & cerebrum à quibus tale augmen-
tum venit, vtpote glutinoso circumcirca existente, quemad-
modum & neruis, & pinguitudinis nihil inest. Si enim pin-
guitudo affuisset, ex calido sanè exusta esset. Fortassis autem
mirabitur quis quòd etiam sub alis & in pube pili multi, &
quibusdam in toto corpore existunt. Verum hic sermo de eo
est, quòd ubicunque in corpore glutinosum est, ibi pili à ca-
lore

A lore fiunt. Auditus autem inde contingit, foramina aurium ad os durum & ficcum lapidi simile pertingunt. Iam verò ad ipsum os est cavitas antrofa. Strepitus autem ad durum firmantur, os autem cauum resonat per durum. Pellicula verò in aure iuxta os durum tenuis est, velut aranei tela, & omnium pellicularum ficcissima. Quòd autem id quod ficcissimum est maxime resonat, multa signa sunt. Quum igitur plurimum resonuit, maxime audimus. Et sunt quidam qui de natura scribētes prodiderūt, quòd cerebrum est quod sonum edit. hoc autē fieri non potest. Ipsum enim cerebrum humidum est, & membrana siue tunica circum ipsum humida est & crassa, itēq; circum tunicam ossa. Nullum igitur B humidum resonat, sed ficca, resonantia autem auditum faciunt. Olfacit porrò cerebrum humidum existens, aridorum odorem vnà cum aere, per corpuscula cartilaginosa ipsum trahens. Cerebrum enim in cavitatem nasi pertingit, atque hac parte non est ante ipsum os aliquod, sed cartilago mollis velut spongia, neque caro, neq; ossiculum: & vbi quidem cavitas nasi sicca fuerit, ipsum seipso exactius arida olfacit. Aquā enim non olfacit, humidior est enim quā cerebrum, nisi sit putrefacta. Putrefacta enim aqua crassior fit, & alia omnia. Quum verò nares humectæ fuerint, olfacere nō possunt. Non enim aerem attrahit cerebrū ipsum ad seipsum. Similiter etiam vbi cerebrum ipsum de seipso plurimum liquefecerit, in palatum, & fauces, & pulmonem, ac reliquum C ventrem: cognoscunt autem hoc homines, & ex capite destillare dicunt, destillat autem & in reliquum corpus. Et est modus eius calidus. At verò visus propterea contingit: à cerebri membrana vena in vtrunq; oculum per os descendit: per has duas venulas, quòd est glutinosissimi tenuissimū de cerebro percolatur, & propterea ipsam circum ipsum oculum tunicam talem facit, quale est ipsum oculi pellucidum, quod ad aerem vergit, ad quod venti ac flatus irruunt, eadē planē ratione quemadmodum de aliis mēbranis ac tunicis dixi. Sunt autē multæ hæ tunicæ præ oculis pellucidæ, quales ipsi existunt. Huic enim pellucido lumen & omnia splendida relucet, per hoc igitur relucens videt: quòd verò non splēdidum est, neque relucet, per hoc non videt. Verum reliquum quod C circum oculos est album, caro est. Quæ verò pupilla oculi qualis appella

Auditus
quī fiat.



Odoratus
caussa.

Visus quī
fiat.
Visus quæ
causæ sint.

Pupilla
qualis.

Hippocratis Liber

**Oculi hu-
mor qualis.**

**Sermo vn-
de.**

**A mutis
hoc confir-
mat.
Cantorum
exemplum.**

**Vitruuius
hinc sum-
psit.**

**Spiritus lo-
cationem
& vocem
præbet.**

**Conceptus
in vtero
quotus.**

appellatur, nigra apparet, ob id quod in profundo est, & tu-
nica circum ipsam nigra sunt: tunicam autem appellamus
id quod velut pellicula inest. Est autem non nigra si quis in-
spiciat, sed alba ac pellucida, humidum verò oculi, glutino-
sum existit. Sæpe enim vidimus, in oculo rupto exire humo-
rem glutinosum, & si quidem adhuc calidus fuerit, liquidus
est, Postquam verò perfrigeratus est, siccus euadit, velut thus
transparens. Atq; hoc & in hominibus & in brutis similiter
habet. Cæterum oculum molestia afficit omne quod incide-
rit, & venti irruentes, & alia quæ splendidiora sunt, quàm ipse
est. Et si quis interroget, respondere licet, propterea quod
consimilis coloris existunt. Quemadmodum os, & lingua, &
reliquus venter, humida sunt. Sermonis porrò facultas in-
de est. Totum corpus spiritum intro trahit, plurimum verò
in cavitates sibi ipsi accumulatur. Is autem qui per inane foras
currit, strepitum facit. caput enim resonat, lingua verò arti-
culat, occurrens in faucibus, obturansque ac pellens ad pala-
tum & dentes, claritatem eius facit. Si autem lingua semper
occurrere non articulet, non posset homo clare dissere,
sed singula à natura vnā vocem haberent. Huius signum
est. Muti ex natiuitate dissere non possunt, sed vnā tan-
tū vocem sonant, etiam si quis spiritum efflans sermonem
proferre conetur. Manifestum autem hoc est, Homines vbi
voluerint magnam vocem edere, attrahentes spiritum fo-
rinsecum, eum foras propellunt, & magnam vocem edunt,
prout spiritus durat, postea verò vox contabescit. Sed & ci-
tharædi, quum ipsos vocem intendere oportuerit, spiritum
quàm plurimum intrò trahentes pronuntiationem exten-
dunt, & vociferantur ac vocem magnam edunt, prout spi-
ritus durat. Vbi verò spiritus defecerit, desinunt. Ex quibus
manifestum est quod spiritus est, qui vocem edit. Vidi au-
tem iam quosdam, qui sibi ipsis manu illata guttur penitus
præfecuerant, atque hi viuunt quidem, verum nullam vo-
cem edunt, nisi quis guttur constringat, hi autem sermonem
proferunt, Manifestum verò, & hoc est, quod præfecto gut-
ture spiritum attrahere intrò in cavitates non possunt, sed
per præfectam partem exhalat. Sic sanè res de voce ac ser-
mone se habet. Porrò vita hominis septem dierum est. Pri-
mum etenim postquam genitura in vteros peruenit, in septē
diebus

A diebus habet quæcunque corpus habere debet. Mirari autem quis possit, quomodo ego id sciam. Verum multa ego vidi hoc modo. Meretrices publicæ quæ sæpius de seipis periculum fecerunt, ubi cum viris rem habuerint, sciunt quando in ventre concipiant, & postea conceptum intra se perdunt. Postquam autem iam perditus est, elabitur velut caruncula. Hanc carunculam in aquam coniectam si conspiciatus consideraueris, omnia membra habere reperies, & oculorum regiones, & aures, & manus & manuum digitos, & crura, & pedes & pedum digitos, & pudendum, & reliquum totum corpus manifestum. Satis etiam manifestum est harum rerum peritis, quod mulier quum in ventre concepit, statim horret, & calor, & dentium stridor consequitur, & conuulsio occupat tum articulos, tum totum corpus, & utrumque segnities ac torpor. Et quæ puræ sunt, hoc perpetiuntur. Quæ verò crassæ & mucosæ hoc perpetiuntur, pleræque ex his mulieribus non percipiunt, nec cognoscunt. Certè quatenus mihi ostenderunt, hoc ipsum se cognouisse, eatenus scio ac prodo. Quod verò vita hominis septem dierum sit, etiam ex hoc manifestum redditur. Si quis in septem diebus nihil edere aut bibere velit, plerique quidem in ipsis moriuntur. Sunt autem qui ipsos transmittunt, & tamen moriuntur. Sunt etiam quidam, qui persuasi sunt, ut ne desperarent seipsos fame conficientes, sed comedere ac biberent: verum venter non amplius suscipit. Ieiunum enim intestinum in his diebus concreuit, moriunturque etiam illi. Sed & ex hoc coniectare licet, hominis vitam septem dierum esse. Puer septimestri partu, natus, proportionem natus est, & viuit, & rationem talis habet, ac numerum ad hebdomadas ac septenarium exactum. Octimestris autem natus nullus vnquam vixit. Nouem verò mensium & decem dierum partus fit, & viuit, & habet ad hebdomadas numerum exactum. Quatuor enim denarij hebdomadam, dies sunt ducenti & octoginta, In denarium autem hebdomadam septuaginta dies incurrunt. Habet autem & septimestris partus tres denarios siue decadas hebdomadam, & in vnaquaque decade septuaginta dies. Tres verò hebdomadam decades, ex toto sunt dies ducenti ac decem. Quin & morbi acutissimi sic hominibus fiunt, præteritis diebus hebdomada

Meretrices
quæ docue
runt.

Conceptus
signa.

Quota in
dia.

Septime
stris par
tus.

nullus
tunc viuit

Prænotio
morborū.

Hippocratis Liber

domadis dimidiæ, aut vnius, in quibus iudicantur, & moriuntur aut sani euadunt: & tertij generis in vndecim diebus, hoc est vna & dimidia hebdomade: & quarti in duabus hebdomadis. & quinti in duodeuiginti diebus, hoc est duabus & dimidia hebdomadis. At verò alij morbi non habent, vt certa sententia pronuntiari possit, quanto tempore homines ab ipsis sani euadant. ad eundem modum etiam **Capitis vl-** **cera.** **✱** vlcera magna in capite ac reliquo corpore, quarto die inflammari incipiunt, in septem autem inflammatio sedatur, aut etiam quatuor & decem, aut duodeuiginti. Si quis autem diligenter medeatur, & vulnera in capite magna in hoc tempore non sedentur, homines moriuntur. Cæterum inexpertus quispiam mirari queat, quòd septimestris puer nascatur. Ego quidem igitur hoc ipsum vidi, & quidem frequenter. Si autem hoc deprehendere vult, facile est obstetrices adire, quæ parientibus adsunt, & ex ipsis percuntari. Est autem & aliud signum. Pueri septem annis præteritis dentes explent. Et in septem annis sunt & ratione & numero exactè hebdomades trecentæ ac sexaginta. Necessitatem autem naturæ, quapropter in septem hæc singula dispensentur, ego aliis locis declarabo.

Dētes pueris quando renascūtur.

H I P P O C R A T I S C O I L I B E R D E S E P T I - M E S T R I P A R T V, I A N O C O R N A R I O M E D I C O P H Y S I C O I N T E R - P R E T E.

Macrobius
& Galenus
in Epide-
miarū com-
mentariis
hoc disse-
rit.



SEPTIMESTRES autē nascuntur diebus cētum & octuaginta duobus ac dimidio, & insuper accedente diei particula. Si enim primi mēsis dies quindecim supputaueris, deinde quinque mensium, dies cētum quadraginta septem ac dimidium. In vndesexaginta enim diebus quàm proximi duo menses perficiuntur.

- A** tur his igitur sic habentibus, ad septimum mensem super-
sunt dies non plures quam viginti. Et est tota summa dimi-
dij anni, vnà cum aliquantula diei parte. Quum itaque ad
hoc perfectionis principium partus peruenerit, maturescēte
fœtu, & robore multum augeſcente, in perfectione magis
quàm aliis temporibus pelliculæ in quibus ab initio nutri- Cur septi-
mestres e-
dantur.
tus fuit, quemadmodum spicarum membranæ laxantur, ad
id coactæ anteaquàm fructus perfectè matureſcat: & fortissi-
mi ac plenissimi fœtus violantes ac dirumpentes pelliculas,
partum fieri cogūt, & plurimi ex his pereunt. Quum enim
parui sint, transmutatione maiore quàm alij vtūtur, & qua-
draginta dierum afflictionem perferre coguntur, ex vtero
- B** egressi, id quod etiam in decimestris multos peremit. Sunt Cur pauci
septime-
stres viuāt.
autem ex his septimestribus qui etiam superſtites manent,
ex multis pauci. Propterea quòd ratio & tempus in quod e-
nutriti sunt in vtero, cōstitit, vt omnium participes sint, quo-
rum etiam perfectissimi participes existunt, maxime qui su-
perſtites manent, & processerunt de matre prius pariente,
vt pote in octauo mense ægrotaturi. Si enim in his laboribus
succedant, vt in conspicuum prodeat puer, impossibile est su-
perſtitē esse, ob prædictas affectiones, quas ego octimestres
perimere dico, Imò etiam multos decimestres. Cæterū mul- Cur plus
minùs ve
quidam
septime-
stres par-
tus afficiā-
tur.
ti fœtus septimestris ætatis quum pelliculæ laxantur, sece-
dunt in id quod cedit, & hic alimentum sumunt, primos qui
dem quadraginta dies laborantes, alij plus, alij minus: pro-
pter permutationem autem ex locis & pelliculis quæ ipsos
aluerunt, transmutantur, & pro vmbilico, trahunt & transu-
munt etiam per matrem labores. Pelliculæ enim dum ten-
duntur, & vmbilicus conuulsus, dolores matri inducunt. Et
fœtus ex antiquo vinculo exsolutus, grauior redditur. Multæ
verò mulieres etiam febricitant his cōtingentibus, quædam
etiam pereūt vnà cum fœtibus, verū omnes in breui ex hoc
contaminantur ac inquinantur. Aiunt autem & octonos mē-
ses difficilimè vteros ferre, rectè id dicētes. Est autē octauus
mensis non solum hoc tempus, sed & dies accedūt à septimo Cur octa-
uus mensis
grauis sit.
Cur fœmi-
næ in cōce-
ptu errent.
mense, & à nono, & ab ipso anno. Verum dies non similiter,
neque dicunt, neque cognoscunt mulieres. Decipiuntur enim
ex eo quòd non eodem modo fiunt, sed aliquando à septi-
mo mense plures dies accedunt ad quadraginta, aliquando p-
tinent ad nono

à nono Tunc enim fieri necesse est, prout contigerit mulie- **D**
 tem in ventre concipere, tum mense, tum tempore. Mensis
 autem octauus minimè dubius est, secundum hunc enim cōtin-
 git, ut iudicatio difficilis existat. Et mea sententia pars etiā
 in vndecimo mense, mensis est, ut hic satis memorabilis exi-
 stat. Porro mulieribus de partibus fidem derogare nō opor-
 tet, dicunt enim omnia, & semper dicunt, & semper profe-
 runt. Neque enim aut opere, aut sermone persuasæ sunt, sed ex
 eo quod cognouerunt in corporibus suis cōtigisse. Licet au-
 tem & volentibus aliud dicere, Quæ verò iudicio prædixæ
 sunt, & victoriā de hac sententia pronunciant, semper dicunt
 ac testantur, nasci septimestres, & octimestres, & nouimestres **E**
 & decimestres, & vndecimestres: & ex his octimestres nō su-
 perstitēs manere. Dicunt autem & abortus plurimos in pri-
 mis quadragenta diebus fieri, sed & reliqua conscripta his
 accidere, in quadragenariis, ac in singulis mensibus fieri di-
 cunt. Quum autem septimo mense pelliculæ dirumpantur, &
 foetus secesserit, labores qui circa octauum mensem, & sextū
quadragenarium, in partu fieri traduntur, corripiunt. hoc au-
 tem tēpore præterito, quibus bene futurū est, inflammationes
 tum foetus, tum matris exoluuntur, ut venter molliatur, & tu-
 mor à præcordiis & laterū mollitudine descendat ad locos
 inferiores, ad facilem partus tempore progressionem. & se-
 ptimo sanè quadragenario plurimo tēpore foetus isthic exi-
 stunt. Nam loci ipsi molles sunt, & transmotiones ipsis faci-
 liores ac frequentiores fiunt, & propterea ad partum magis **F**
 solubiles consistunt, & mulieres per hos vltimos dies ex to-
 to quadragenario facilius vteros ferunt, donec cōtigerit foe-
 tum verti. Postea verò dolores partus ac labores incumbunt,
 donec a puero & à secūda mulier liberetur. Quæcumque verò
 di, cæcæ mulieres multos pueros pepererunt, & quidam ex ipsis clau-
 partus edū- dus natus est, aut cæcus, aut aliud quoddā malū habens, aiunt
 tur. in hoc puero octauum mensem ipsas difficilius transgisse,
 quā in his quos pepererūt nihil mali habentes. Foetus enim
 mancus in octauo mense fortiter ægrotauit, ut etiā morbus
 abscessum ac ablationē siue mutilationē alicuius partis fe-
 cerit, quemadmodum etiā viris fortes morbi faciūt. Qui ve-
 rò foetus in alio tēpore fortiter ægrotāt, pereunt prius quā
 ipsis abscessus eiusmodi fiat. Quicumque autem octimestres
 foetus

Quid agat
 partus se-
 ptimo men-
 se.

Quare clau-
 di, cæcæ
 partus edū-
 tur.

A foetus non valde agrotant, sed iuxta vnam aliquam partem, ex secessu afflictionem pertulerunt, quadraginta quidē dies in imbecillitate tranfigūt, & plurimū in vtero, propter praedictas necessitates, sani autem fiunt. Quicunq; autem natus fuerit in his quadraginta diebus, eum impossibile est superstitem manere, agrotanti enim adhuc ipsi in vtero transmutationes & afflictiones post partum accedunt. Quicunq; vero agrotans in vtero ad nonū mensem peruenierit, & in hoc mense natus fuerit, superstes erit. Et superuiuit quidem nō minūs hi quā septimestres, verū pauci etiam ex his educantur. Neq; enim crassitudinem habent, quā perfectissimi habent, & labores in vtero non diu ante tolerauerunt, vt **B** tenues euaserint. Seruabitur autem vel maximē talis puer, si nouem mensium fuerit in exitu, fortior autem euadet etiā is, qui plurimū abest a morbis, qui octimestribus accidere solent. Qui enim in septem quadragenariis nascuntur, decimestres appellati, ob id maximē educantur, quod fortissimi sunt, & plurimū a vulgariū puerorū tempore absunt in quo affliguntur quadraginta agrotantes diebus, circa octauum mensem. Declarant autem de morbis & afflictionibus octimestrium, etiā nouimestres tenues nascentes. Iuxta multitudinem enim temporis, etiam magnitudo corporis cōtingit, ex morborū afflictione progressus, & non velut septimestres carnosī gignuntur, & crassitudinem probē coactam habentes, vt qui tempus quo in vtero gestabantur sine morbis transegerunt. Verū enim uerō cōceptus, & abortus, & partus mulieribus in eo tempore, in quo etiam morbi, & sanitas, & mors omnibus hominibus fiunt, hae verō omnia partim secundum dies, partim secundum menses, partim secundum dierum quadragenarios, partim secundum annum, significationem sui praebent. In omnibus enim his temporibus insunt ad vnumquēq; & vtilia multa, & hostilia multa. Ex vtilibus igitur, sanitas & augmentū contingit, ex contrariis, morbi & mors. Dies quidem igitur maximē insignes in plurimis sunt, primi & septimi, multū potentes in morbis, & multū in fortibus. Nam plurimi abortus in his diebus fiunt, nominantur autem tales effluxus, non abortus. Verū alij dies intra quadagesimū insignes quidem minūs sunt, multi verō iudicant. Ceterum in mensibus, eadem quae in die

Qui post
enixum vi-
uant.

Cur maci-
lenti fiant.

Decime-
stres cur e-
ducentur.

Conceptus
& cetero-
rum decre-
torium.

Quae faciās
hac.

Dierū ob-
seruatio.

Quantum
dies & mē-
ses possint,

in diebus fiunt, iuxta rationem insunt. Menses enim mulie- D
ribus sanis singulis mensibus apparent, tanquam peculiarē
in corporibus vim mensis habeat. Vnde sane septimi men-
ses his quæ uterum gestant, foetus in principium perfectio-
nis constituunt. Pueris vero ubi septem menses à natiuitate
impleuerunt, tum alia utilia in corporibus fiunt, tum dentes
in eo tempore apparere incipiunt. Eadem ratio est etiam in
decretoriis diebus, si quidē fortassis vnā cū his quos recensui
coniungere, quis velit historię ac cognitionis gratia referen-
tur. Etenim medicum qui ægrotorum salutem rectē conie-
ctare velit, animaduertere quidem oportet, & contemplari
omnes dies, ex paribus verò decimum quartū, & vigesimū
octauum, & quadragesimum secundum. Hic enim terminus E
ponitur à quibusdā pro harmonię ratione, & integer ac per-
fectus numerus, verū ob quam causam, longius fuerit in
præsenti exequi. cōtemplari autem sic oportet per ternarios
ac quaternarios, ternariis quidē omnibus copulatis, quater-
narios autem, duobus ad duos connexis. At verò quadrage-
narij primū in foetibus iudicāt. Quisquis enim primos qua-
draginta dies trāsmiserit, abortus effugit ex omni causa cō-
tingentes, plures autem fiunt in primō quadragenario abor-
tus, quā in aliis omnibus. Hoc autem tempore præterito,
foetus fortiores sunt, & ipsorum corporis per singula mem-
bra discretio fit: & masculorum quidem partes omnes valde
conspiciæ fiunt foemellæ verò in hoc tempus, carnes appa-
rent exortus ac processus solū habentes. Similia enim lon- F
gius tempus in simili sunt, & tardius discernuntur, propter
consuetudinem & amicitiam: quanquā aliās quum à matre
segregatæ fuerint, filia citius quā filij pubescant, & sapiant,
ac senescant, propter corporum imbecillitatem, & victus ra-
tionem. Alter quadragenarius est, in quo circa octauū men-
sem foetus in utero ægrotant, de quibus hic totus sermo in-
stitutus est. Tertius est, in quo ubi nascantur pueri etiā ma-
le afflictī, si effugerint quadraginta dies, apparent magis ro-
busti ac sapientes. Nam & splendores clariū vident, & stre-
pitum audiunt, quod prius non potuerunt, tanquam incre-
mentum habeat hoc tempus, cū iuxta alia, tum iuxta sa-
pientiam ex corpore elucescentem. Peculiarem quidem sa-
pientiam in corpore inesse manifestū est, in prima sanē die.
Nam

Dierum pa-
rium obser-
uatio.

Conforma-
tionis tem-
pus in vte-
ro.

Quæ puel-
læ à pueris
differant.

*non
Ait*

Quid sua-
pte natura
pueri sa-
pient.

A Nam in somnis, statim ubi nati sunt pueri, ridere & plorare videntur. Vigilantes quoque sua sponte statim rident ac plorant, prius quam quadraginta dies transeant. Non rident autem, etiam si titillentur ac irritentur, priusquam hoc ipsum tempus transeat. habetatur enim vires in muccis: quâquam mors etiam per fatum sit sorte designata. ut hoc exēplo omnibus sit, quod omnia existentia quæ naturâ ex iisdem habent, transmutationes per tempora venientia habeant. Declaratur autem in singulis, quum alia nascantur, alia corrumpantur. Porro anno finiente multi quidem morbi fiunt, multæ etiam sanitates, iuxta temporis rationem, ad mentes, & ad singulos dies. Septenariis autem annorum, cum alia multa insignia corporibus fiunt, tum dentes pueris excidunt, & alij nascuntur. Quæ enim in corporibus fiunt, ea scribam.

Mors & cætera cur fi-
ant.

Septimana
in corpori-
bus præua-
lent.

*Principium autem huius septimestris
in alijs codicibus sic ha-
beatur.*

DE septimestribus autem quidam sic dicit, quod negotium oculis nondum vidi, sed tantum audiui. Quo autem modo mihi fieri posse videatur, declarabo. Multæ naturæ mutationes, conuersiones, & excessus in animalibus & arbutis, cæterisque satis, sponte nascuntibus aucto perpetuo, longumque sunt: nam alicubi iam fœmina & mas multis manibus, oculis auribusque conformati, natique sunt, variisque aliis formis. concreta ora, & ossa alij habentes mirandam naturæ præuaricationem, mutationem, & excessum. cuncta enim temporibus labentibus & discreta, & confusa & peculiaria perficiuntur. Nam secundum priscam generationem, cum omnia animantia condita & creata sunt, sic conformata fuerunt. Scitòque etiam nunc eodem modo & per eadem secundum leges & ritè cuncta conformari nascique posse, Mihi verò (quemadmodum homini circa septimestria definienti datur) hæc statim specie, pro cæli, terræque benignitate, quemadmodum fructus oriri videntur. Quod videre est in Aegypto, ubi omnia perfecta nascuntur, & perficiuntur, multa etiam & per annum totum omni; tempore terræ benignitate, calorisque circumaggeratione, Nilive inundatione scaturiunt. Simili modo & circa animantia septimestriaque perfecta vitaliaque, illic omnia

de mēbris
agnascenti-
bus.

Terræ Ae-
gyptiæ fœ-
cunditas.

Quid ad si
multitudine
faciat.

nascuntur. Quamobrem si quæ conceptura est, uti sibi suc-
cessionem pariat, bene habeat, virque ad eam rem demit-
tendam promptus, præstoque sit, corpus siue corporis alueus
creatur & perficitur. Collatio enim & concordia, validaque
necessitas & vis cogit, uti perficiatur & adolescat suo satori
non dissimile. Nam si maior minorve, & dissimilis forma &
figura sit, illi unde orta est perfecta non haberetur. Quare
dicito, statuitove, medium quid esse in magno negotio, con-
formationem rylmonve. Si ergo conformatio aliqua ad ho-
mines peruentura est, leni & miti modo perueniat necesse
est, perque hominum commoda, si minus, quidam præpu-
bescent & præsenescunt, quemadmodum qui præsenescunt,
& si ritè & secundum legem fiat. Conformatioque conta- E
bescit, & ad ossium comoda, fibrarum venarum, nervorum,
viscerum, intestinorum, uteri, cæterorumque perfectionem
cōuertitur. Sed forsitan aliqui petent, cur octimestria, & tri-

Cur octime-
stres & tri-
mestres nō
viuant.

mestria non viuant? quoniam fluxi parvuli que sunt, quædā
enim sic æuum, & ætatem nata sunt & per similia cōforma-
ri & discerni consueverunt, quemadmodum quæ in terra se-
runtur & plantantur. quædam enim pluribus, quædam pau-
cioribus diebus nascuntur secundum tempus. Tempus au-
tem solis & lunæ circuitu perficitur, & sequitur, nec etiam

Temporis
autores sol
& lunasūt.

undecimestres, nec duodecimestres secundum eandem ratio-
nem horum viuent, donec pueruli sunt: nihil enim præter
sua vestigia & naturā sit, aut adolescit, nec etiam si quid fa-
bulentur. Sed cuiusque conformatio, forma figurave, & si F

Quæ prius
conformen-
tur.

militudo, siue rylmos, secundum naturalem legem perfici-
tur, & ritè finitur. Nam naturalis machinatio cun-

cta in oculos, vel aures, vel nares, vel os trans-

fert: quæ conformationibus his contine-

tur, vel per alias concreciones, syn-

crisèsvē absūmit. Quare nunc

periti cū sint, conceptus

omnes noscent quæ

prius excogi-
taui.

AHIPPOCRATIS


COI LIBER DE OCTI-

MESTRI PARTV, IANO

CORNARIO MEDICO

PHYSICO INTER-

PRETE.



DE octimestri partu sic sentio. Impossibile
esse vt duas consequenter succedentes affli-
ctiones pueri ferre possint, & propterea
octimestres non superstites manere. Con-
tingit enim ipsos consequenter affligi, tum
ea quæ in vtero sit afflictione, tum ea quæ
in partu accedit, & ob id nullus octimestris vitalis est. Insu-
per & decimestres appellatos, in septem quadragenariis die-
rum magis in lucē edi sentio, & maximē cōtingere vt edu-
centur. Nam perfectissimus est foetus in primis quadragin-
ta diebus, vbi verò plures accesserint, perit. Coguntur enim
multa in pauco tēpore allumentes ac perferentes, multum
agrotare, ex quibus mors cōsequitur, incipit autē laborare
Cpuer ante partum, & interitus periculū subit, quum in vtero
vertitur. Producentur enim omnes sursum habentes caput,
pariuntur autē multi in caput, & securius discedunt ac libe-
rantur his qui in pedes pariuntur. Flexibiles enim corporis
partes nō impedimēto sunt, puero in caput exeunte. Verūm
quum in pedes prodierit, obturamenta cōtingunt. Versiones
scilicet in vtero, & alia pericula, & vmbilici puerorum iam
sepe circa colla apparuerunt. Si enim iuxta partem quam-
cunque vmbilicus fuerit in vtero porrectus, magis hac parte
puer vmbilici circumactionē, dum vertitur, faciet, quā cir-
ca ceruicem. Si verò iuxta humerū, vmbilici circumactionē
retrahit, hoc autē vbi sit etiā matrem magis laborare neces-
se est, & puerum aut perire, aut difficilius exire. Quare mul-
ti iam pueri principiū morbi intus nacti prodire, & conse-
quenter alij perierūt, alij morbidi superuixerunt. Quicunq;

Cur oti-
mestria nō
viuant.

Quando
partus peri-
clitatur.

Melius in
caput exe-
unt.

Multi de
vētre mor-
bos trahūt.

Qui probe
coalescat.

verò probè ac tuto prodierint, & in conspicuum exierint, de D
repente ex necessitate in ventre liberati, & crassiores ac ma-
iores, quàm pro ratione statim existūt, his nō ex augmento,
sed laxo tumore id contingit, & multi sani ex his pereunt. Si
enim tumor nō residat citius quàm tertio die, aut paulo se-
rius, morbi ex ipso fiunt. Quare etiā alimenta ac respiratio-
nes periculose mutantur. Si quid enim morbidum inducunt
per os & per nares inducunt: & pro eo quòd tanta ingeratur
edulia quāta sufficiunt, & ea etiā nō superentur, multo plura
ingeruntur: vt necesse sit & cogantur prae ingestorum copia,
& prae ipsa adeò affectione, qua pueri corpus affictum est,
alia quidē per os & nares rursus exire, alia verò per intesti- E
num ac vesicā inferne transire, antea nullo horum ita cōtin-
gente. Sed & pro flatibus ac spiritibus, & humoribus ita co-
gnatis, cum quibus necesse est in vtero consuetudinē ac be-
neuolentiā habuisse omnibus peregrinis vtitur, crudioribus

Mutatio lo-
ci & cibo-
rum quid
possit.

Proprietas
vmbilici.

ac siccioribus, & minus mansuetis, vt necesse sit dolores obo-
riri multos, plerisque etiā mortes: quandoquidē etiam viris
transmutationes locorū ac victus, morbos faciunt. Eadē ra-
tio est & de vestibus. Pro eo enim quòd carne & humoribus
induti fuerunt, iisq; tepidis ac liquidis & cognatis, tales ve-
stes pueri induunt quales ipsi viri. At verò vmbilicus per
quem alimēti ac spiritus ingressus pueris contingunt, solus
ex omni corpore vtero adhæret, & per hunc introitus ac in-
gressus ingredientium particeps fit, reliquæ partes conniunt,
& nō prius apertæ sunt, quā vbi in exitu fuerit puer ex ven- F
tre. Quum autē in exitu fuerit, reliquæ omnes aperiuntur,
verum vmbilicus attenuatur, & cōnuiet ac resiccatur. Quem
admodum autē in his quæ ex terra nascuntur, fructus pleni
ac maturi secernuntur, ac decidunt, iuxta discriminationem
qua parte inhaerent: Sic etiā pueris maturis ac perfectis, vm-
bilicus quidē conniuet ac clauditur, reliqua verò aperiun-
tur, vt & ingredientia suscipiāt, & exitus habeant secundum
naturam, quibus necesse est viuentes vtī. Singula enim sepa-
rantur iuxta modū quo agmina cōgregantur repentiā: opti-
ma autē sunt, quæ maximē soli cōnutrita sunt. Cæterum de-

Decime-
stres & vn-
decime-
stres & se-

cimestres & vndecimestres partus, ex septē quadragenariis
eodem modo fiunt, velut ex dimidio anno septimestres. Plu-
rimis enim mulieribus necessarium est in ventre cōcipere,
post

A post menstrua purgamenta, ubi ab his exoluta fuerint. Oportet igitur mulieri tempus dare mensis, in quo ipsa purgatio continget: & hoc tempus quibus breuissimum fit, tres sunt dies, Plerisque autem multo plures. Sunt autem & alia multa impedimenta etiam in viris, ex quibus conceptus retardatur. Oportet autem vel maximè hoc considerare. Quod nouilunium quod dies vnus existit, exactissimè trigesima mensis pars est. duo autem dies, fermè quindecima mensis pars sunt. Tres verò dies, pars mensis decima sunt, & reliqua iuxta horum rationem. & non est possibile in paucioribus partibus fieri, neque menstruorum solutione, neque foetuum conceptionem. Ex his igitur omnibus necessariū est plerisque mulieres circa plenilunium, & vltra in ventre concipere, vt ducenti & octoginta dies, saepe vndecimum mensem apprehendere videantur, tot enim dies septem quadragenarios constituunt. Nam quum vltra plenilunium mulier concipit, necesse est eum conceptum vndecimum mensem attingere ac apprehendere, quo ad vltimum circuitum perueniat.

ptin effres
quando pa
riantur.
Conceptus
varietas.

HIPPOCRATIS

COI LIBER, DE SVPER-
FOETATIONE, IANO COR-
NARIO MEDICO

PHYSICO INTER-
PRETE.



QUUM superfoetarit mulier, si primum puerum in medio vteri habuerit, superfoetatio elabitur, à primo ac veteri expulsa. Si verò in altero cornu superfoetationem habuerit, posterius ipsam insuper parit non vitalem, nimirum vitalitate vbi vterus laxatus & humectus fuerit exsoluta. Si verò nō statim secedat superfoetatio, dolores exhibet, & fluxum foetidum, ac febrē: & facies intumescit, tibiaeque ac pedes, & si pereat, cibū auersatur.

Qua super
conciplant.

fatur donec exciderit. Superfoetât autem mulieres, quarum D
stomachus id est vteri os, post primum cōceptum non clau-
ditur ita valde, idque apparentibus signis constat, clauditur
autem post superfoetationes quæ posterius insuper pariun-
tur. Si superfoetatio nondum partium discriminationē ha-
beat, sed caro sit, non quidem intumescit, sed putrescit do-
nec ex vtero exeat. Si cui exeat secunda pueri in vtero, prius-
quam puer foras procedere incipit, ægrè parit; & magis ad-
huc periculose, si caput non præcedat. Si verò alicui vna cum
secunda puer foras exierit, & ad stomachum, id est os vte-
ri progressus, rupta secunda emerferit, magis facillè parit.
Itémque si puer quidē foras prodit, secūda verò adhærescit,
& seipsam retrahit, atque isthic manet. Quum puer non vi- E
talis futurus nascitur, caro ipsius vngues supereminet, vn-
gues verò tum in manibus, tum in pedibus deficiūt. Quum
vitali puero nascente manus præminuerit, primum retro
retrudenda est, donec retruseris: & si ambæ præminuerint,
ambas retrudes, Et si crus præminuerit, etiam hoc repelles.
Vbi verò ambo crura in propatulo manserint, neque aliò
processerint, fomento vti opus est, à quo humectissimus vte-
rus reddatur, habeat autem odorem ipsum fomentum. Et
quum caput in propatulo fuerit, reliquum verò corpus in-
tus erit, etiam sic fomento vteris. Et quum pars corporis in
vtero, pars in pudendis, pars extra pudenda intumescit ac
manet, etiam sic fomentum adhibebis. Et si quidem à fo- F
mento processerit, satis est: sin minus, os vteri elaterio cras-
so aqua diluto oblines, quo partum producat. Sed & à poti-
bus ac cibis partus promouendus est, & pudenda ipsa cera-
to illinenda, si sicciora quàm ex re est, esse tibi videbuntur.
Quomodo
partus mor-
eius educe-
tur. Quum pueri capite ex stomacho apparēte, reliquum corpus
procedere non vult. puer autem mortuus est, digitos aqua
madefactos inter stomachum ac caput immittito, & in or-
bem circunducito, deinde subditum sub mentum digitum
in os intrudito, ac foras trahito. Quum verò reliquum cor-
pus extra pudenda fuerit, caput autem intus, in pedes videli-
cet prodeunte foetu, postquam digitos in orbem circundu-
xeris, ambas manus inter stomachum ac caput aqua præma-
defactas immittito ac extrahito. Si verò extra stomachum
fuerit, verum intra pudenda, immisis manibus apprehen-
sum

Quæ nō fa-
cile & con-
tra pariant.
Stomachus
vulvæ.

Quādo vn-
gues de-
sunt puc-
ro.

Quo pacto
partus edu-
catur.

Quo pacto
partus edu-
catur.

Quomodo
partus mor-
eius educe-
tur.

A sum capite educito. Si porro foetus intus maneat mortuus, & non possit neque sponte, neque per medicamenta iuxta naturam excidere, manu cerato maximè lubricante vncta, deinde in vterum intrusa, humeros à collo magni digiti conamine deducito. Oportet autem ad huiusmodi etiam vnguem instrumentum in magno digito habere, & distractione facta manus educere, deinde rursus immissa manu, ventrem diffindere, & ex diffissio intestina sensim eximere: deinde his exemptis latera confringere, quo confidens corpusculum leuius ac expeditius fiat, & facilius exeat non tumidum existens. Carterum si secunda non facilè excidat, maximè quidem ad foetum appendere sinenda est, & puerpera

Secunda quæ extrahatur.

B velut super sella ventri exonerando destinata, lasanum Græci vocant, locanda. Sit autem in altum extructa sella, vel simile quiddam, quo foetus dependens gravitate sua secundam simul extrahat. Sensim autem hoc faciendum est, nō violenter, ne præter naturam diuulsa, inflammationem inducat. Substernere igitur lanas molles quàm maximè recens carminatas foetui oportet, quo paulatim remittant ac confidant, Aut vtres duos copulatos aqua plenos supponere, & supra vtres lanas insternere, & supra has puerum. deinde vtrunque vterum stilo perforare, quo paulatim aqua effluat, effluente autem aqua, vtres remittunt ac confidunt, confidentibus autem vtribus, foetus vmbilicum attrahit, vmbilicus verò attrahit secundam. Si verò supra lasanum, vel simile quiddam puerpera sedere nequeat, super reclinatam sellam perforatam collocetur. Si verò adeò debilis est, vt omnino sedere non possit, lectum, quàm erectissimum à capitis partibus struemus, vt deorsum declinet ac repat, & sic foetus gravitas quàm maximè simul secundam trahat. Verùm puerperam sub alis, foris ad lectum fascia, aut loro lato ac molli, alligare oportet, vt ne quū erectus sit lectus, corpus ipsius deorsum feratur. Iuxta eundem autem modum etiam si vmbilicus abruptus sit, aut etiam ante tempus recisus, moderatè grauibus ponderibus appensis, secundæ educationem facere oportet. Optima enim hæc curatio in talibus existit, & minimè lædit. Si cui puer in vtero immoriatur, & non egrediat humido vtero existente, & quum iā nō habeat amplius humiditatem, sed siccatus fuerit vterus, primū quidē intumescit puer.

Quid faciat vmbilicus ruptus, vel ante tempus abscisus.

Partus im-
mortui si-
gna.

puer, deinde colliquescent ac putrescent carnes, forasque ef-
fluunt, postremum autem ossa procedunt: & fluxus aliquan-
do corripit, si non prius moriatur. Quū puer immortuus fue-
rit, tum aliis signis cōiectare id licet, tum iubere, vt aliquan-
do in dextro latere iaceat, aliquando in sinistrum transmutet.
Trāslabitur enim in vtero puer eo quò mulier se vertit,
velut lapis aut aliud quiddam, si mortuus fuerit, & pectinem
frigidum mulier habet. Si verò viuat, & pecten calidus est, &
venter totus translabitur vnà cum reliquo corpore extētus,

Cū fluor
cruētus par-
tum præce-
dit, pericu-
lum est.

& in ipso nihil translabitur absque reliquo corpore. Si cui
ex partu laboranti fluxus multus sanguinolentus citra dolo-
rem, ante puerum prodeat, periculum est puerum mortuum
exoluendum esse, & non vitalem processurum. Prægnanti-
bus mulieribus plerisque stomachus vteri propè extrat ante

Quæ facili-
pariant.

partum. Mulier prægnans si non coitu vtatur, facilius à
partu liberabitur. Quæ gemellos gestat, eadem die parit
velut concepit, habet autem vtrosque pueros in vna secun-
da. Muliere ægrè pariente, si puer in genitalibus locis hæ-
reat, & non facili exeat, sed cum labore ac medici machina-

Quādo um-
bilicus non
statim se-
candus est.

mentis, tales pueri modicæ vitæ sunt. horum vmbilicum se-
care non oportet, priusquā mingant, aut sternutent, aut vo-
ciferentur, sed sinendi sunt, & mulier proximè apud puerum
permaneant, & si sitierit, aquam mulsam bibat, & si vmbili-
cus infletur velut stomachus, & moueatur, aut puer sternu-
tet, aut vocem rumpat, tunc sanè secetur dum puer respirat, F
si verò non infletur vmbilicus, neque moueatur, tempore ac-
cedente viuet. Prægnantem mulierem si aliter non cogno-
scas, oculi tracti & cauiores fiunt, & candidum oculorum al-
bedinis naturam non habet, sed liuidius existit. Si qua par-
turi vicina sit, & oculos cauos habeat, & facies intumescat, &
ipsa tota itémq; pedes tument, vt velut à pituita alba appre-
hensa appareat, & habeat aures albas, & summum nasum al-
bum, & labia liuida, ea ipsa mortuos gestat quos pariet, aut
vivos prauè, & non vitales, & exangues, vtpote morbosos, aut
prius peperit non vitales. Huic sanguis in aquositate con-
uersus est. Oportet igitur tali post partū odorata in vuluam
appondere, & comedere ipsam ac bibere odorata. & primū
in facie nasus summus insignis euadit, ac colorem recipit. Si
qua prægnans terram edere concupiscat, aut carbones, eaq;
edit,

Signa gra-
uidæ.

Quæ par-
tum mor-
tuū gesta.

Quum gra-
uidæ terrā

A edit, in capite pueri ubi natus fuerit, signum à talibus apparet. Mulierem id nosse expedit, vtra mamma ipsi maior est, illic enim fœtus existit. Similiter autem & oculum confiderabit. Maior enim & splendidior omnino erit intra palpebram, etiam eius partis, cuius mamma maior existit. Si cui ab apposis in vuluam non valde fortibus, dolores in articulos perueniant, & stridor dentium corripiat, & membris ten datur, ac oscitat, hanc magis concepisse spes est, quàm eam, quæ nihil tale patitur. Mulier quæ præter naturam crassa est, ac pinguis, & pituita repleta, non concipit hoc tempore. Quæ verò ex natura talis est, horum gratia concipit, si non aliud quiddam ipsam impediat. Mulieribus plerisq; quum menses apparituri sunt, stomachus vteri in seipsum contrahitur, magis quàm aliàs. Mulier quæ facile concipiebat, si prægnans esse desiit, bis per annū à manibus ac cruribus venam secari sinat. Si cui dolores in coxendice, aut in capite, aut manibus, aut aliqua alia corporis parte fuerint: quū verò prægnans est, desinunt, conceptu autem ab vtero exoluto rursus insunt, odorata & bibere, & ad vteri os apponere conducit. Quum mulieri alicui conceptus gratia medeberis, ubi purgata esse videbitur, & os vteri rectè habuerit, lae tur, & caput confricetur, nullo autem vngvine illinatur, de inde linteum in odorem lotum circum capillos ipsos circun datum, reticulo loto aut nihil olenti obliget, ita vt primū linteū ipsum capiti imponatur, postea quiescat galbano ad vteri stomachum appposito, quod coctum ac mollitum sit ad ignem, & nō ad Solem. Deinde manè deposito reticulo cum linteo, verticem suum alicui olfaciendum exhibeat, & si quidem oluerit, probè purgata est, sin minùs, malè. Hæc autē ieiuna faciat, & si non fœcunda fuerit, nunquam olebit, neque purgata, neque aliàs, & si prægnanti idem medicamentum apponatur, neq; sic probè olebit. Quæ verò prægnans futura est frequenter, & facile concipit, ac sana existit, etiam si non apposueris neque purgaueris, vertex ipsius olebit, aliud verò nihil. Vbi autem omnia probè videbuntur, & ad virum accedere oportuerit, mulier ipsa ieiuna sit, Vir autem non ebrius, frigida lotus, & commodo alimento nutritus. Et si cognouerit mulier genituram se cōcepisse eo tempore virum non accedat, sed quiescat. Cognoscet autem si quidem vir se emisisse

vel carbon-
es edunt,
quid eue-
niat.
Qua parte
sit parrus.

Crassæ præ-
ter naturā
cur nō con-
cipiant.

Conceptus
quī pare-
tur.

**Cur quæ-
dā partus
bimestres,
vel maio-
res perdāt.**

emississe dixerit, ipsa verò præ ficitate ignorauerit. Si verò D
vterus rursus in pudenda genituram reddat, ipsaq; humecta
fiant, rursus cum viro coeat, donec concipiat. Mulier quæ
concepit quidem, perdit autē fœtus bimestres, exactè in eo-
dem tempore, & neque prius, neque posterius, atque hoc ite-
rum atq; iterum perpeffa fuerit, imò si etiam trimestres aut
quadrimestres, siue vetustiores perdiderit, iuxta eūdem mo-
dum. Talibus vteri puero augefcente, & bimestre aut trime-
stre, aut quantumcunque tempus transgrediente, si quando
etiam alias augefcit, in maiorem amplitudinem non porri-
guntur, ita vt non ampliùs sufficiāt capiendō fœtui, sed pro-
pterea perditur eodem tempore. Huic cucumerarium me-

Medela.

✱ ac inflare pharmacis apposititiis hisce. Cucumeris syluestris
medulla contundatur ac cribretur, deinde modicum de ipsa
melle cocto copiosiori misceatur, addito silphio modico: sit
autem velut dixi, mel coctum, hoc circum specillum oblinat-
ur, crassitudine formata quātam vteri stomachus suscipere
potest: apponatur autem ad os vteri, & impellatur quo in in-
ternam vteri partem penetret. Quum verò colliquerit medi-
camentum, specillum extrahatur. Sed & elateriū hoc modo
præparatum apponere potes, Similitérque colocynthidem
syluestrem. Per hoc autē tempus edat allia quā plurima,
& silphij caulem, & quicquid flatum in ventre inducit. Hoc
✱ apposititium pharmacum per tertiam diem apponatur, do-
nec, probè habere visa fuerit, copia quātam vterus admittit. F

**Purulentæ
vulvæ caus-
sa & mede-
la.**

Interiectis diebus, molliētibus vtendū est: postquā autem
ex mollientibus præparatum fuerit os vteri, post mēsum
apparitionem vbi sicca fuerit, cū viro cōmisceatur. Si cui
vterus suppuratus fiat, aut post partū, aut ex abortu, aut quo-
modocunque aliās, & non in vase alio ac tunica, velut in tu-
berculo solet, pus fuerit: huic conducit specillum vñctorium
in vteri os demittere. Minus enim opus fuerit vstura, si ad
specillum processerit, deinde erucas à tithymalide colliges:
habēt autem velut aculeos quosdam, quos leniter rescindes,
ne pabulum internum ex ipsis elabatur, deinde ficcabis ipsas

**Eruca ti-
thymali-
dis.**

Scarabæi.

in Sole, ac teres. Vermes quoque stercorarios similiter in So-
le ficcabis ac teres, & erucæ quidem pondus duorum obolo-
rum Aeginetorum, vermium verò duplum miscebis, modico
aniso

Aniso addito, aut aliquo eius generis. Nam mali odoris medicamentum euadit. Hæc autem leuia facta ac contrita vino albo odorato diluito, Et postquã biberit, grauitas accedit, & torpor in ventrem irruit. Si itaq; accedit, aquã mulsam modicam insuper bibat. Si qua liberis carēs, imprægnatione ac **Conceptus** puerorum generatione indigeat, atque ea iam prægnas fuit **reparatio.** ac peperit, & hoc ipsi contingat, aut quum stomachus vteri ficcus, aut summa parte affectus, aut cõclusus fuerit, aut non rectè habuerit, sed ad coxendicem alterum distortus, aut ad rectum intestinum occultatus, aut in seipsum contractus fuerit, aut labium stomachi sibi ipsi vtcunq; incubuerit, aut stomachus vteri asper & callosus fuerit: durus autè sit, & à con-

Bclusionè, & à callositate: his menses non apparèt, aut pauciores quàm oportet, & per longius tempus apparent. Sunt autem in quibus etiam menses iuxta corporis sanitatè, & vterorum exitum reperiuntur, imò consueto & iusto modo, & stomacho vteri præ caliditate ac humiditate mensium non valde læso. Verùm genituram non suscipit propter hanc læsionem, quæ impedit susceptionem, stomacho non rectè habente. Huic per totum corpus fomentũ adhibere oportet, & **Quæ con-** pharmacum bibendum dare, ac corpore primũ purgatam **ceptum im-** ac mundã reddere, siue supernè & infernè opus habuerit, siue **pediant.** supernè solũ. Et si quidem supernè purgãs medicamentum dederis, fomentum ante purgationem non præmittes. **Medela.** Verùm fomentum adhibebis infernè purgaturus. Si verò supernè purgante medicamẽto non egere videbitur, præmissio fomento, infernè purgans bibendum dato. Cũ autè probè purgatum esse corpus videbitur postea vtero fomentũ adhibeto, frequentes infusus ipsis adornans, si ita conferre videbitur. Immitte autem in fomẽtum, cupressi ramenta, & lauri folia contusa, lauabisq; multa & calida aqua. Vbi verò recēs lauta fuerit, & fomentum admiserit, vteri os dilatabis specillo stanneo, corrigesque vbi opus fuerit: potes & plumbeo vtri, initio per paruum factò, deinde crassiore adhibito si suscipere potest, donec rectè habere videbitur. Intinges autem specilla in mollitorio quopiam diluto, aut etiam liquido red **Specillum** dito, si conferre videbitur. Specilla ipsa retrò caua faciendã **quale in** sunt, deinde circum ligna longiora adaptanda, sicque ipsis **his velit es-** utendum. Cæterũ hoc tempore bibat, in vino albo odorato **se, videto.** dulci,

dulci, & quàm suauissimo decoctam tædam, quàm pinguis-
 simâ, in tenuia segmenta concisam, & apij semen contusum,
 & cumini Aethiopici semen, & thus quàm optimû. ex hoc bi-
 bat ieiuna copia quanta moderata esse videbitur, tot diebus
 quot satis habere videbitur. Et edat catulos coctos, & poly-
 pum in vino dulci coctum, iusculumq; ipsum bibat, & bras-
 sicam coctam, Vinum autem albû insuper bibat, & ne sitiat,
 & calida bis per diem lauet. A cibis autem hoc tempore ab-
 stineat, ab eo verò tempore si quidem processerit per stoma-
 chû, & quid purgationis foris apparuerit adhuc de potione
 bibendum est vnum atq; alterum diem, & à specillorum vsu
 desistendum, ac conandû vt vteri apposititiis medicamentis

**Stomachus
locellorû.**

purgentur. Cuicunq; autem stomacho recto, ac magno & sa-
 no existente, ac probè habente, & in loco vbi cõuenit & opor-
 tet sito, menses non apparuerint extoto, aut pauciores, & per
 longius tempus, & non sani, morbum ipsum inuestigabis
 quemcunq; tandem vteri habet, & si corpus quoque aliquid
 conferat, causam perscrutaberis ob quam non concipit: &
 hæc sic habeant, & curationem facies si medelam suscipere
 volet, initio à fortibus factò, prout opportunum visum fue-
 rit, ita vt desinas in molliorum vsu, donec vterus visus tibi
 fuerit probè esse purgatus, & stomachus recto statu esse con-
 stitutus, & ritè situs. Si verò à potu ac medicamento menses
 non processerint, etiam si moderato tempore id biberit, ne-
 quaquam à potu cessandû est: vbi verò probè habuerit, spe-
 cillorum vsu os stomachi molliendum est, & faciendum vt
 hiet, ac viam præbeat appposito medicamento, idq; pharma-
 cis suffitui aptis ac molliëtibus perficies. Quum autem satis
 suffitum ac mollitum esse videbitur, appposito medicamento
 subditio vteri purgationem facies, donec ritè habere vide-
 bitur, à mollibus ad fortiora progressu factò, ita vt rursus in
 mollibus ac odoratis desinas. Nam pleraque ex fortibus me-
 dicamentis stomachum exulcerât ac corrodunt. Deinde ve-
 rò tum stomachum ad rectum statum ac sanitatem redigi-
 to, quo aptus sit ad suscipiendam genituram, tum vterum sic-
 cum reddito, & flatû immittito. Si mulier præ pinguitudine
 vterum ad cõcipiendum læsum habere videatur, attenuatio
 quàm maximè, & gracilitas inducatur, suprâ reliquam cu-
 ram. Tempus porro vernum aptissimum est ad concipien-
 dum

**Cum pin-
guedo con-
ceptum im-
pedit, quid
agendû sit.**

- A** dum. Vir autem non sit ebrius, neque vinum album bibat, sed quod fortissimum est ac meracissimum, itemque edulia fortissima, & calida nō lauet: robustus autem sit, & sanus, & à cibis abstineat ad rem non conferentibus. Et vbi marem generare voluerit, mentibus desinentibus aut defectis misceatur, & quā penitissimè intrudat, donec defœuiat. Vbi verò fœmellam generare volet, quum plurimi menses prodierint mulieri, & dum adhuc eunt, coeat, ac dextrum testē obliget, quantum id tolerare poterit: sed si marem generare expetat, sinister testis obligandus erit. Stomachus vteri à suffimentis quidē, vbi conclusus fuerit, hians redditur, ab emollientibus verò mollescit. Suffire autem oportet, loti corticē, lauri semen siue baccas, & folia eiusdē viridia contusa, thus myrrham, artemisiæ semen aut folia: item anisum & adipē aut ceram simul contusa, sulphur, cupressi semen, peucedani radicem, myrti folia viridia contusa, fibri testē, asini masculi sterqus, allia, styracem, adipem suillum. sed & si distortum os vteri fuerit, his suffiendum est. Sic quidē igitur hians redditur ac conuertitur. Mollire autem per hæc vteri os oportet, sandaracham videlicet, adipem caprinum, fici succū, silphij succum, cyclamini succum, Thapsiam, succum tithymalli, cardamomi semen, herbam quæ peplos appellatur, fibri testem, lini semen, nitrum, ari radicem, staphidem syluestrem, calamithæ folia viridia, herbæ lanariæ sine struthij semen scillæ internam partem.

Medicamenta emollientia, & ad ciendum idonea, quo fortis purgatio fiat.

T Hapsiæ radicem, medullam bouis, adipem anserinum, rosaceum, hæc trita ac feruefacta per quatrimum apponat, & bibat porri succum, ac vinum dulce albū. Item resinam, & oleum tepidum, cumini, nitrum, mel, sordida lana excipiat, & per quatrimum vtatur, bibatq; apij semen, & thuris nucleos quinque, & cumini Aethiopicū in vino albo meraco dulci, lauetq; bis per diem. Item myrrham, thus, fel bouis resinā terebinthinā, aut netopon siue metopium vnguentum, horum singulorū æqualem mensurā misceat, & in lana pura, aut linteo tenui apponat. Intingat autē linteū in vnguento albo Aegyptio odorato, & filo obligatū, à balneo subdet,

h

& po

Quo modo mas fœminave generandus. Similequid præcipit Columella in ouibus.

Quæ leniant, asperant, claudant aperiantq; vuluam, locellosve.

Medicamina purgantia locellos.

Diuerfa locellorū purgantia.

& polypum plagis molitum edat, & apij ac asparagi semen **D**
ac vinum album bibat, ter in die ieiuna existens. Aut myr-
rham, cassiam, thus, cinamomum, netopū, singulorum aquas
portiones lana exceptas, aut in glandes redactas apponat.

Aut cucurbitæ sylvestris interiora, cuminum tostum, ane-
thi semen, cupressi radicem, trita ac melle cocto subacta in
glandes cogito, easque subdendas exhibeto, & bibat Pæonia
radicem, apij semen, ac filphij succum, cum vino. Sed & Bul-
bium ipsum subditum purgat. Item myrrham primariam,
& florem æris modicum in vino albo odorato subdat.

*Medicamenta subdititia ad uterum pur-
gandum conuenientissima.*

Accipe æris florem ac nitri tertiam partem, melléque
cocto subacta in glandulas iustæ magnitudinis ac cras-
situdinis redige, atque sic ad vteri osculum appone. si verò
fortius facere velis, elaterium ammisce, ad florem solum, &
hoc modo coactas glandulas subdendas præbe. Potes & ra-
mulorum fici corticem derasum ac tenuiter tritum ammi-
scere, quum os vteri ficcius esse videbitur, dimidia portione
eodem modo. Aliud. Elaterium & æris florem trita,
duabus floris partibus, vna elaterij acceptis, dilue, & cycla-
minum tritum prout oportunum videbitur ammisce, & in
lana simul coacta subde.

Glandule album fluxum purgantes.

Artemisiam herbam, nitrum, cyclaminum semiaridū
acuminum, subde. Alia. Artemisiam herbam viri-
dem tritam, & myrrhæ tertiam partem, ammixto vino odo-
rato, in lana alba obuolue, eamque vino tinctam apponendā
præbe. Vbi verò hiauerit vterus nitrum, cucumeris sylue-
stris medullam, cyclaminum semiaridum, in lana appone.

Subdititia omnis generis purgare potentia.

Staphidem sylvestrem viridem tritam, artemisiæ her-
bæ folia trita, melle cocto excipe, & in vmbra ficcata in
glandulas coge, ac subdendas exhibe. Aliud. Florem æris,
& alumen Aegyptium cum cyclamino dilue, & velut prio-
ra melle cocto excipe aut in caricā inde, cum modica myr-
rha. Aliud. Cyclaminum tritam vino albo odorato am-
mixto, in linteo tenuissimo puro obliga, & subdendā præbe.

Aliud

A Aliud. Cyclaminum semiaridum, nitrum, cantharidas, adipem, sandarachem, subde.

De virgine.

SI virgini menses maturi non prodeant, multum & febricitat, & dolet, & sitit, & esurit, & vomit, & furit, & rursus resipiscit: vterus mouetur, & quum ad viscera vertitur, vomitus, ac febris, & delirium accedit, vbi verò sedatur vterus & hæc quiescunt, esurit, ac sitit, & febris lenis, hepialon Græci dicunt, tenet. Huic pelles agninas calidas ad ventrem apponere oportet, & suffitum facere in ipsa pudenda quàm penitissimè, ita vt super amphoræ collo desideat, & fumū admittat. Fiat autem suffitus ex myrrha magnitudine fabæ, & **B** thuris dupla portione, ammixta etiam zea fresa, hæc simul suffire debet, & in ignem immittere maximè dum ieiuna est, & multa calida lauare.

Medicamentum subdititium.

A Lumen Aegyptium emollitum lana inuolutum subdat. Aliud. Artemisiam tritam, & vino albo subactā, apponendam præbe.

Puerpera recens enixa.

Rosaceum, myrrham, ceram, mixta in lana apponenda præbe. Vbi autē vterus ipsi prociderit, acida & acerbior offerenda sunt, tum potanda, tum foris adhibenda. Item sicū **Cum vterus procidit.** nigram, allium, nitrum, cuminum, hæc omnia tenuiter trita in lana apponenda dato. Aliud. Sepiæ testam tusam & vino imbutam, cum leporinis pilis, lana excipe, & apponendam præbe. Si verò post partum vterus doleat, pristanā & porrum, ac adipem caprinum coquat, indèque modicum forbeat. Subdititium medicamentum. Nitrum, cuminum, ficum, omnium æquas portiones subde.

Subdititium purgans & molliens.

Netopum, rosaceum vnguentum, adipem anserinum, linteis tenuibus excipe. Si menses multi prodeunt, **P**eonix grana nigra bis septem numero, in vini cyathis duobus bibenda præbe. Si verò vteri frequenter prolabantur, vteros aqua tepida madefacies, ipsam verò mulierem supinam reclinabis, miscebisque malicorium, gallam, & rhoem **Fabius Caluus legit, Si menses multino prodeunt.**
h 2 rubram

rubram, hisq; in viuo albo tritis vteros illines, ac immittes. **D**
 Postea lauri folia in vino austero bibenda dabis. Quum autem
 mulier pragnas menses profluos habet, stercus asini siccu, &
 rubrica, ac sepiæ testâ, trita simulq; linteo illigata apponat, si
 verò secunda nō purgetur, elaterij oboli Attici pondus in vini
 albi Cyathi mensura tritum bibendu præbe, & purgabitur.

HIPPOCRATIS

COI LIBER DE EXECTIONE

FOETVS, IANO COR-

NARIO MEDICO PHY-

SICO INTER-

PRETE.

in eade
 6 Partus fru-
 stulatim ex-
 tractio.
git



DE his qui non iuxta naturalem modum pa-
 riuntur, sed excinduntur, hoc modo se res ha-
 bet. Primū quidē Sindone supra mulierē
 iniecta, eam supra mammas circundato, &
 caput obuelato, ne vidēs quod facturū es ti-
 meat ac exhorrescat. Si itaq; foetus oblique
 prolapsus manū protensam habuerit, manu apprehensa fo-
 ras producere quā maximē conare, & brachiū ipsum exco-
 riato. atq; vbi os brachij denudaueris, squatinæ pellem circū **F**
 duos manus digitos obligato, ne caro lubricitate sua elaba-
 tur. Deinde verò carnem circa humerum rescinde, ipsumq;
 iuxta iūcturā exime, post ea caput iuxta naturā protrusum
 foras producere tenta, foetū verò ipsum intrò protrudito, fer-
 ramento per latus & costas, siue clauiculam adacto, quo fla-
 tum emittat foetus, & confidat ac contrahatur, atq; ipsi faci-
 lior exitus pateat. Caterū caput si fieri potest iuxta natu-
 ram extrahe, sin minū, confringe: atque sic foetum vnā sub-
 extrahe. Postea calida largē perfusam, & oleo illitā decum-
 bere iubeto, pedum situ alternatim variato. bibat autem vi-
 num dulce, album, meracius temperatum. Sed & resina mel-
 le trita ac vino ammixta, in potu præbeat. De cæterò verò
 curanda est, velut dixi, iuxta ea quæ relata sunt. Quum verò
 parien

A parienti mulieri fœtus obliquè prolapsus fuerit: id quod cōtingit dum vertitur puer, & vmbilicus circum collum obuoluitur, & exitum fœtus impedit, & caput in coxendicem incumbit, & manus vt plurimum foras prominet, quod ip- Partus di-
rectio.

sum mortui fœtus signum est. Quibus autem manus non exerta est, vt plurimum viuunt fœtus, periculum autem etiam hoc modo est. Aliquæ enim purgamenta ante partum mittunt, & necesse est cognoscere ex eo partum siccum, & cum dolore laboriosum esse. Quibus autem purgamenta ante partum non prodeunt, hæ in pariendo facilius liberantur. Concutere porro oportet hoc modo. Sindone substrata mulierem reclinabis, & aliam superiniicies, quo pudendum **B** ipsius sit obuelatum, obuoluésque sindonem circum vtrunque crus & circum vtranque manum. Mulieres autem duæ vtrunque crus apprehendant, & aliæ duæ vtrâque manum, deinde concutiant validè ipsam tenentes non minus quàm decies. Postea in lectū reclinetur mulier in caput, ita vt crura sursum vergant, & mulieres omnes ipsum pedibus corripiant, manibus dimissis, sæpèque cōcutiant, ac reiectionem in humeros faciãt in lecto, quo fœtus in spaciosiorem locū retrusus vertatur, & naturaliter prodire possit. Et si dictamnum creticum habueris, ipsum bibendum dabis: sin minus, fibri teltem in vinū chium derades. Si verò vteri foras prodierint, siue ex dolore, siue ex partu, si quidem iuenculæ fuerint, aggressiōem facito: sin minus, finito. Aggressio autem **C** hoc modo fiat. Pelliculam vteri iuxta naturalem modum & obliquè incisam, linteo confricato donec inflammetur, & illinito phocæ oleo siue adipe, aut pice, aut mali punici flore integito, & molles spongas vino respersas apponito, & ex humeris ipsas alligato. Mulier verò decumbat cruribus quàm maxime sursum versus porrectis.

Moderatis autem eduliiis vescatur.

h 3

HIPP.

HIPPOCRATIS^D

COI LIBER DE DENTITIONE, IANO CORNARIO MEDICOPHY.

SICO INTER-

PRETE.

*

Carnosi, minus lactis hauriunt.



Dētionis varietas.

VERI natura habitiores, non pro carnositatis ratione etiam lac sugunt. Voraces verò & multum lactis trahentes, non pro ratione carnosii fiunt. Pueri sugentes si multum mingant, minimè anniculi fiunt. Quibus aluus multum profluit, & bene concoquunt, hi saniores sunt. Quibus modice profluit, & voraces sunt, & non pro ratione similiter nutriuntur, morbofi. Quibus multum lactosum reuomitur, his aluus supprimitur. Quibus in dentitione aluus amplius subducit, minus conuelluntur, quàm quibus parum. Quibus in dentitione febris acuta accedit, parum conuelluntur. Quicunque dentientes habitiores manent, & altiore somno vtuntur, periculum est ne conuulsione corripiantur. Qui hyeme dentiunt, reliquis similibus existentibus, melius liberantur. Non omnes in dentitione conuulsi moriuntur, sed multi etiam seruatur. Qui cum tussicula dentiunt, tardius dentes producant, in perpunctione autem magis gracilescunt. Quicunque in dentiendo hvenem habent, si attente tractentur, dentitionem facilius ferunt. Qui plus mingunt quàm egerunt, pro ratione habitiores sunt. Qui non pro ratione mingunt, verum aluus frequenter cruda à pueris egefit, morbofi sunt. Qui bene dormiunt, & habitiores sunt, multum alimentum adsumunt, idq; adiacet, nō sufficienter distributū. Qui dum sugunt interim cibum adsumunt, facilius ablactationē ferunt. Qui sæpè cruenta ac cruda per aluum egerunt, pluri in febre somniculofi sunt. Vlcera in tonsillis citra febrem facta, securiora sunt. Quibus infantibus in sugendo tussis instat, vna maiore habere solēt. Quibus citò in tōillis vlcera

Tonsillarū vlcera.

A vlcera serpentia confidunt, febribus ac tussi permanentibus, periculum est rursus generanda esse vlcera recurrētia.

Vlcera tonsillarum in infantibus periculosa. Pueris memorabilis magnitudinis, si vlcera in tonsillis sint, & deglutire possint, salutis signum est. Quum verò maiores prioribus, deglutire in tonsillarum vlceribus nō possunt, his multam bilem reuomi, aut per aluum prodire, periculosum est. In vlceribus tonsillarum si quid arenosum inest, nō bonum. In tonsillarum vlceribus post prima tempora, pituitam per os effluere, si prius non fuit, commodum est, & tamen reducenda est. Si verò incipiat, & omnino remittat, gaudendum est. Si autem non sic effluat, vereri oportet. Qui tonsillas destillatione vexatas habent, his aluus amplius subducta, siccas rufes soluit. Verum pueris si quid concocti supernè prodierit, amplius soluit. Vlcera multo tempore in tonsillis citra augmentum manentia, ante quintum aut sextum diem periculosa non sunt. Sugentes qui multum lactis adsumunt, vt plurimum somniculosi sunt. Sugentes qui non probè

B aluntur, macilentissimi sunt, & ægrè vires colligunt. Vlcera in tonsillis æstate facta, peiora sunt quàm aliis temporibus, citius enim proserpunt. Vlcera in tonsillis circa vnam proserpentia, in his qui seruantur vocem alterant. Vlcera proserpentia circa fauces, grauiora & magis acuta, vt plurimum spirandi difficultatem inducunt.

C

h 4

HIP

HIPPOCRATIS^D

COI LIBER, DE CORPO-

RVM RESECTIONE, IANO

CORNARIO MEDICO

PHYSICO INTER

PRETE.

Arteria.

Pulmo.

Cor.

Magna ve-
na.

Hepar.

Rhenes.

Vesica.

in xt.

Gula.

Stomachus

Septum.

Lien.

Venter.

Colon.



ARTERIA exvtraque faucium parte exortum faciens, in summitate pulmonis definit, circulis composita con-
similibus rotundis, in superficie se-
mutuo contingentibus. Ipse autem pulmo testitudinem coadimplet, in
sinistram conuersus, quinque apices habes, quos lobos & summitates
vocant, cinereo colore præditus, no-
tis cauernosis compositus, naturæque antrosus existens. Ad me-
dium verò ipse cor situm est, rotundius ac oblongius quam
in omnibus animalibus. A corde verò ad hepar multa char-
tilaginosa arteria procedit, & cum ipsa vena magna appel-
lata, per quam totum corpus nutritur. Hepar autem similitudi-
nem quidem cum omnibus aliis habet, verum sanguinolentius
quam alia existit, apices habens duos, quos portas appellat,
in dextris locis sitas. Ab hoc verò obliqua vena infernè ad
rhenes tendit. Rhenes autem consimiles colore malorum spe-
ciem præ se ferunt. Ab his canales obliqui ac fermè triangu-
lares in summum vesicæ apicem tendunt. Vesica autem tota
neruosa est, magnâque ac latè se extendens capacitas intra eam
a natura disposita est. Et has sex partes intus per mediū cor-
pus natura disposuit. Gula autem à lingua principium faciens,
in ventrè definit, quam sanè Græci etiā œsophagum, & sto-
machum, id est os ventris, significanter appellant. Cæterum
à spina retro hepar, septum transversum productum est. Ex la-
tere verò notho, sinistro videlicet, lien initio sumpto exten-
tus est ad humani vestigij similitudinē. Venter autem hepati
adiacens iuxta sinistram partem, totus quidem est nervosus. A
ventre verò extat intestinum ventri com simile, longum cubito-
rum non minus duodecim, pampinoformiter in sinibus in-
uolutum,

A uolutum, quod aliqui colum vocāt, per quod alimēti delatio contingit. A colo autē situm est rectum ac princeps intestinum postremū, carnem copiosam habēs, & in summū anum desinens. Reliqua porrò natura ipsa ordinauit ac disposuit.

HIPPOCRATIS

COI LIBER, DE CORDE,

IANO CORNARIO MEDI-

CO PHYSICO IN-

TERPRETE.

B



OR figura velut pyramis est, colore autē Cor quale. abundē puniceum, & tunicam leuem cir Cordis tuncundatam habet, & est in ipsa humor modi nicula. cus velut vrina, vt putare possis in venia cor diuersari. Facta est autem ea gratia, vt sanum in custodia florescat. Habet autem humiditatem tantā quanta satis est aestuanti in medelā. Cæterum hunc humorē cor emingit, bibendo ipsum assumens ac cōsumens, pulmonis nimirū potum lambēs. Etenim homo multo maximā partem in ventre bibit. Gula enim siue stomachus velut infundibulum, potus copiam & quæcunq; volumus excipit. Bibit autem & in guttur ac arteriam, minus verò & quantū latere possit per rimam illapsum. Operculum enim exactum epiglossis, lingula siue minor lingua appellata, ne permiserit quidem aliquid amplioris potus penetrare. Signum autem huius rei, hoc est: Si quis enim aquam cæruleo colore, aut rubrica temperatā, sitienti valde bibendam dederit, maximè sui, hoc enim pecus non est curiosum, neque mundiciei deditum. Deinde dum adhuc bibit ipsius guttur refecet, hoc colore ipsum tinctum reperiet: ab exēplo. sed non est cuiusuis hæc chirurgiæ aggressio. Nequaquam igitur fides nostra suspecta esse debet de potu, quod homini in guttur vergat. Sed quomodo aqua acruatim irruens, turbationem actusim multā exhibet? propterea inquam, quod contra respirationem fertur. Quod enim per rimam illabitur, tanquam iuxta parietem delabens, aeris elationi

Paulò cor humectat.

Stomachi effigies.

Epiglossis

Aliq. Potus

et q. gutt.

B. Bainis, ab exēplo.

D. Bainis

u. Bainis

t. Bainis

e. Bainis

n. Bainis

t. Bainis

h s

nor

non instat, sed leuem ac lubricā quandā viā humectatio ipsi D
præbet. Hunc itaq; humorem cor de pulmone vnā cum aere
abducit. Aerem quidē igitur vbi in medelā celsit, necessario
oportet retrò per eandē viam qua adduxit reicere. Verum
humorem partim in culeum ac vaginam suā expuit, partim
rursus vnā cum aere foras propellit. Quapropter etiā pala-
tum eleuat, quū spiritus recurrit. Meritò autē recurrit. Non
enim humanæ naturæ alimenta hæc sunt. Quomodo enim
hominis alimentū sunt ventus & aqua cruda? sed sunt magis
cognatæ affectionis castigatio & medela. Porro vt ad institu-
tum sermonē reuertamur, Cor musculus est valde fortis nō

Cor quid.
Cordis vē-
triculi, siue
sinus.

neruo, sed densitate ac cōstrictione carnis, & duos ventricu-
los habet discretos in vno amiculo, ab vtraq; parte vnū. Ni- E
hil autē inter se similes sunt, Alter enim in dextris ad osculū
situs est, cōtingens alterā venā. Alter in sinistris. Totū enim
cor in his sedem suā firmavit. Sed ille etiā omnino amplio-
ris ventris, & magis inanis quā alter est, neq; extremitatē
cordis attingit, sed caudā eius ambit, solidus item est, veluti
extrinsecus assutus. Alter autē subter sinistrā mammā maxi-
mē in directum situs est, vbi etiā saltus ipsius significationē

✱

sui præbet. Amiculum autē habet crassum itēmq; foueā. Fo-
ueæ enim speciem præ se fert similē mortario. Sed enim hic
etiam pulmonē subit cū māsuetudine, & circuniectu ipsius,
caloris intemperantiā castigat. Etenim pulmo natura frigi-
dus est, sed & inspiratione perfrigeratur. Ambo autē densi ac
asperius sunt interna sui parte, & velut subcorrosi, magisque F
sinister quā dexter. Nā insitus natura ignis non est in dex-
tro. Quare mirū est sinistrū asperiorē fieri, vbi intemperatū
aerem inspirauerit. Quapropter etiā roboris caloris custo-
diendi gratia crassius intus cōstrictus est. Oscula autē ipsis
non sunt aperta, nisi si quis cordis auriculas præsecet, aut ca-
put cordis præcidat. Si autē quis præsecet, apparebunt dupli-
cia oscula in duobus ventriculis. Crassa enim vena ex altero

σιματα.

Fons vita
hominis.

excurrrens visum decipit, si fuerit resecta. Hi fontes sunt hu-
manæ naturæ, & hic flumina sunt quibus totū corpus irriga-
tur: atq; hi etiā vitam homini cōferunt, & vbi resiccati fue-
rint, homo moritur. At verò prope exortū venarū corpuscu-

Cordis au-
riculæ.

la circū vētriculos cōsurgunt, mollia cauernosa, quæ auricu-
læ appellātur. Nō sunt autē foramina aurium, nō enim cla-
morem

A morem exaudiunt. Verū sunt organa quibus natura aerem rapit. Et sanè videtur mihi boni ac præstantis artificis opificium esse. Quum enim cōsiderasset figurā solidam futuram ipsius visceris, propter sanguinis ex venis effusi collectionē ac concretionē, deinde attractorium ipsum esse totū vidisset, folles ipsi opposuit, quemadmodū fabri ferrarij fornacibus solent, quo per ipsos spiritū apprehenderet. Signū autem sermonis hoc est. Etenim cor videas ex toto ventilari, aures verò priuatim tum inflari, tum confidere ac cōtrahi. Et propter hoc etiā dico, quod venæ quidem operātur respirationē in sinistrum ventriculū, arteria autē in alterū. Molle enim magis attrahit, & incrementū capit. Oportebat autem nobis magis incumbētia cordis tegmina perfrigerari. Est enim calor non in dextris: quare propter hāc affectionē, non acceperunt amplum organum, vt ne in totū ab ingrediente aere superarentur. Restāt dicendæ cordis pelliculæ latentes, opus dignissimum cognitione. Sunt enim & aliæ quædam in ventriculis pelliculæ, velut araneorum telæ extensæ, quæ vndiquaque oscula cingunt, & strias ac segmēta in solidum cor inferunt. Hæ mihi nerui ipsius visceris & vasorū principia aortis esse vidētur, est autem ipsarum par vnum. Cate-rum osculis singulis tres pelliculæ subornatæ sunt, rotundæ in summo, velut circulus semisectus. Et qui rei intelligētes sunt, admirantur, quomodo oscula & aortarum fines claudunt. Et si quis veteris, eximendi cor mortui, moris gnarus, aliam auferat, aliam reclinet, neque aqua, neque flatus immissus in cor penetrarit: atque hæ magis in sinistri ventriculi osculis exactius, & meritò sanè subornatæ sunt. Mens enim hominis in sinistro ventriculo insita est, & reliquæ animæ imperat. Nutritur autē neque cibus neque potibus à ventre, sed pura & illustri substantia ex sanguinis discretionē nata. Adsumit autē alimentum ex proxima sanguinis cisterna, radios suos eò immittēs, & depascens, velut ex ventre intestinorum alimentum non naturale existat. Quo verò non in mora sit, qui in arteria est in fluctuatione cōstitutus cibus, viam in ipsam occludit. Magna enim arteria ventrem depascitur ac intestina, plenāque est alimento non principali. Quod autem nō nutritur sanguine apparētē, & quem videmus, arteria ipsa magna, ex hoc manifestū existit.

Macla

Creatoris
optimi sum-
mum opifi-
cium cor.

Venæ si-
num fini-
strum per-
flant.

Arteria ma-
gna dex-
trum.

Cordis re-
liqua.

Vena aor-
ta.

Cor nihil
afficitur.
Mentis si-
tus.

Arteria ma-
gna ven-
trē depasce-
tur.

Hippocratis Liber

Arteria
parua.

Sanguis ca-
lidus natu-
raliter non
est.

Maſtato enim animali, & ſiniſtro ventriculo diſſecto, tota D
deſolata apparet, modico ſeroſo humore excepto, flauaque
bile, ac pelliculis, de quibus iam mihi dictum eſt. Arteria au-
tem altera ſanguine non eſt deſtituta neque ventriculus dex-
ter. Hoc quidem igitur vas cauſſa fuit, mea ſanè ſententia, vt
pelliculæ producerentur. Id verò quòd ex dextro fertur ven-
triculo etiam ipſum quidem commiſſura pellicularum clau-
ditur, verum non valde ſalutis præ imbecillitate. Sed aperitur
quidem in pulmonis vaſa, ſanguinem exhibens ipſis in ali-
mentum, clauditur autem in cor, non tamen conſeſtim, quo
ingrediatur quidem aer, non autem multus. Debilis enim
eſt hic calor, frigiditatis facultate ſuperatus. Sanguis enim
non eſt natura calidus, neque enim alia aliqua aqua, ſed ca- E
leſcit. Multis autem videtur natura calidus eſſe. Et de corde
ſanè talia dicta ſint.

HIPPOCRATIS

COI LIBER DE GLAN-

DVLIS, IANO CORNA-

RIO MEDICO PHY-

SICO INTER-

PRETE.

*

Glandula
quales.

Sanguis al-
bus de glā-
dulis ma-
nat.



DE GLANDVLARVM tota natura
ſic habet. Natura ipſis eſt ſpongioſa,
Sunt enim rare & pingues, & neque
carnes ſunt reliquo corpori ſimiles,
neque aliud quid ſimile corpori, Sed
friabiles ſunt, & venas multas ha-
bent. Si verò diſſeces, ſanguis largus
erūpit, ſpecie albus & velut pituita.
Tangenti autē velut lanē apparent.
Et ſi multa vi ipſas digitis cōpreſſeris, glādula humorē oleo-
ſum remittit qui & ipſe conteritur vt plurimum, ac diſperit.
Aegrotant autem non valde, ſed vnā cum reliquo corpore.
Quum

A Quum verò proprio morbo ægrotant (nam parum etiã cum reliquo corpore ægrotant) morbi tubercula fiunt, & strumæ resultant, & febris corpus occupat. Perpetiuntur autem hæc, *φύματα* vbi humiditate repletæ fuerint, ex reliquo corpore in ipsas influente. Influit autem ex reliquo corpore per venas, quæ per ipsas extentæ sunt multæ & cauæ, vt humor quæcunque tandem traxerint, facile in ipsas sequatur. Et si multa ac morbosa fuerit fluxio, glandulæ reliquũ corpus in se distendunt, atque sic febris incenditur, & eleuantur ac inflammantur glandulæ. Cæterum gládulæ in corpore sunt plures siue maiores, in cauis ipsius partibus, quàm in articulis, & quæcunque in aliis humectis ac sanguinolentis locis consistunt: atq; illæ quidẽ, vt quod supernè in cauas partes influit, suscipientes in se trahant, hæ verò vt rursus nascentem præ laboribus humiditatẽ in articulis, si quam articuli remittant, eius multitudinẽ susceptent: & sic nimia humectatio in corpore non inest. Nam si etiam quid gignatur humiditatis, non statim nimia humectatio inde successerit. Reflectitur enim & consumitur tum multa, tum modica, in ipsas glandulas, atq; sic reliqui corporis redundantiam glandulæ sibi lucrifaciunt, & alimentum hoc est ipsis coalescens. *Qua parte sint glandulæ.* Quare vbi cœnose partes sunt & humectæ, ibi etiam glandulæ. Cuius signum est. Quod vbi est glandula, ibi etiã pili. Natura enim facit glandulas & pilos, vtrique eadẽ vtilitate participantes, illas quidem vt quod influit, velut antea dictum est, suscipiant. Pili verò ex glandulis opportunitatem habentes nascuntur & augescunt, colligentes id quod in extremitates redundat ac effervescent. Vbi autem corpus siccum est, neq; glandula, neque pilus inest. At verò teneræ & exercitiis deditæ & humectæ partes, glandulosæ sunt ac pilosæ. Glandulæ porro sunt ab vtraq; anriũ parte iuxta iugulares colli venas, & pili etiam ibidem. Item sub alis vtrinq; & glandulæ & pili sunt. Inguina & pubes similiter vt alæ, & glandulas & pilos habent. Et hæ quidem cauæ corporis partes sunt, & ad humoris redundantiã expositæ. Nam & laborant hæ, & ex omnibus corporis partibus maximè mouentur. Reliquæ verò glandulas tantum habent, velut intestina. Habent enim & hæ glandulas in omentum maiores: pilos autem non habent. Nam & in *Sata vbinã nascuntur.* cœnosis ac humectis terræ locis, semen non nascitur, neque *supra*

Hippocratis Liber

capitulum
**Viscerum
glandulæ
magnæ
sunt.**

**Rhenum
glandulæ.**

**Tonsillæ.
Caput
quale.**

**Quando
glandulæ
vexant.**

flans
man

supra terram ascendere conatur, sed per redundantiam pu- **D**
trefcit ac suffocatur. Violat enim semen, violat autem & in
intestinis copia ac multitudo humoris, & pilos enasci non fi-
nit. Glandulæ autem in intestinis maiores sunt, quàm alibi
in corpore, & pascuntur humectatione nimiam ex intestinis
exprimentes. Intestina verò ex vasīs in omentum suscipiunt
ac remittunt humiditatem. Omentum autem in glandulas
distribuit. Habent præterea etiam rhenes glādulas, Nam &
hi multa humiditate exsatiantur. Maiores verò etiam hac
parte quàm aliæ glandulæ existunt. Influxus enim humor in
rhenes non imbibitur, sed perfluit infrà in vesicam. Quare
quicquid eius lucrifaciunt de canalibus, hoc ad se trahunt.
Sed & aliæ in corpore glandulæ sunt parvæ valde. Verùm **E**
non volo hunc sermonem longius euagari permittere, Nam
earū quæ alicuius momenti sunt gratia, hoc scriptum insti-
tutum est. Nunc itaq; sermone progressum faciam, & dicam
de tota natura glandularū colli. Collum ab utraq; sui parte
hinc & hinc glandulas habet, & vocantur hæ glādulæ tonsil- **+**
læ, in hunc usum atq; utilitatem. Caput suprà situm est, tur-
sum cauum ac rotundum existens, & humiditatē ex reliquò
corpore complectēs, & corpus simul vapores omnis generis
sursum in caput demittit, quos caput rursus retro dimittit.
Non enim immorari ac manere potest id quod influit, non
habens ubi sedē firmet. Nisi sanè caput ægrotet. Tunc enim
non remittit, sed isthic retinet. Postquàm verò attractionem
remiserit in glandulas fluxio vergit, & nihil molestat, donec **F**
pauca & moderata fluxio fuerit, & ipsæ glandulæ validæ ac
potentes extiterint. Si enim multa & acris influxerit, manse-
ritque acris & glutinosa, inflammatur ac intumescit & col-
lum distēditur, atque sic ad aurem progreditur, & si quidem
in utranq; partem processerit, utraque auris: sin ad alteram,
altera tantum ægrotat. Si autem pituitosa, & multa ac lenta
fuerit fluxio, etiam sic inflammatur, & inflammatio quum
stabilis humor existat, strumas pessimum colli morbum ge-
nerat. In alas autem etiam tunc quid cōfluit. Sed ubi copiosi
fuerint acres & serosi humores, etiam sic in ipsis tubercula
producuntur. Sed & in inguinibus glādula à partibus suprà
sitis humiditatē trahet, Sed ubi multitudo eius occupauerit
inguina intumescit, & suppuratur, ac inflāmatur, similiter
ut alæ,

A ut alæ ac collum. Atque hæc sanè tum bona, tum mala glandulæ exhibere videntur. & de his quidem hæc suffecerint.

Porro intestina multam satietatē ex cibis ac potibus habent, & præterea humiditatem sub cuticula habent. Sed & hæc tota reflectitur ac consumitur in glandulas, similiter velut superior. Morbos autem non facit ferè, quemadmodū in articulis contingit. Frequentes enim glandulæ & expansæ, ac non cauæ sunt, & altera alterius multitudine nō multum fruitur, & aliàs si quā etiam plus habere velit, copiam eius habere non potest, Sed quod in paucas ac singulas confuit in articulis, id in multas hic diuiditur, & æqualitas ipsis existit.

Caput etiam ipsum glandulas habet, cerebrum nimirum simile glandulæ. Est enim cerebrum album ac friabile, quemadmodum etiam glandulæ. Et ob id in commoditatem capitis glandulas facit, & per relatas à me cerebrum auxilium ferens humiditatem aufert, & in extremitates foras ablegat per fluxiones ex magna parte. Maius autem est cerebrum quàm aliæ glandulæ, & capilli etiam maiores quàm alij pili. Maius enim est cerebrum, & in amplo spatio in capite situm est. Facit autem morbos, & minores, & maiores, quàm aliæ glandulæ. facit autem quum in infernas corporis partes redundantiam ac superfluitatem suam ablegarit. Fluxiones porro de capite vsque ad secretionem contingunt, per aures secundum naturam, per oculos, per nares, atq; hæc tres sunt, & aliæ per palatum in guttur, & in gulam, & alia per venas in medullam spinalem, & in sanguinem. Quæ omnes septem numero existunt, hæc fluxiones cerebri sordes ac purgamenta discedentes existunt, & si non discesserint, morbus ipsi inde oboritur. Sic autem & reliquo corpori aliqui morbi accedunt, si intrò abierint ac discesserint hæc fluxiones, & non foras. Et rursus turbatio multa oboritur, si hianter ac affatim attrahat, & acrem quidem fluxionem cerebrum demittat, quæ influxiones corrodit & exulcerat. Et si id quod cerebro influit copiosum fuerit, fluxio descendens non desinet, donec multitudinem influentis exhauserit, atque sic id quod influit foras demittens, & aliud suscipiens, ac semper in consimili statu consistens, & humores trahit, & morbos facit. Ambo autem magno tædio ac molestia naturam frangūt quæ si fuerit affecta, dolorosa afflictio existit. Affectiones enim

Viscerum
mala vnde

Glandulæ
intestina
quales.

Cerebrum,
glandulæ
simile.

Septem ca-
pitis me-
tus fluore-
que.

enim naturæ sunt prædictæ fluxiones, & multitudinem moleste ferunt, & morsum ac rofionem perceptant, ex eo quo præter rationem & non cōsuetum existit. Cerebrum autem cladem perfert, etiam ipsum non sanum existens, sed si quidem rodatur, turbationem multam sustinet, & mēs desipit, & cerebrum conuellit ac distrahit totum hominem, qui in seipso vocem non edit, ac suffocatur, & hæc affectio sideratio ac Græcè apoplexia appellatur. Aliquādo verò acris quidem non est fluxio, sed copiosa in cerebrū irruens, ipsum affligit, & mens perturbatur, & homo circum ambulat, aliena cogitans, & aliena videns, perferens morbi mores, visis, risu, & peregrinis imaginationibus. Alia fluxio ad oculos ophthalmia Græcis, Latine lippitudo appellatur, & oculi in ipsa tumescunt. Si verò ad nares defluxio fiat, arrodūtur nares, & nihil aliud graue accedit: nam viæ ipsarū amplæ sunt, & sibi auxiliari possunt, insuperq; non compactū est quod ab ipsis discedit. At verò aures intortus quidē meatus & angustus, cerebrum autem prope ipsum ipsis auribus apprimitur. Agrotās verò hoc morbo, plurima excernit, & auris à frequenti fluxione per tempus vexatur, & pus graueolens effluit. Sic etiam fluxiones ad oculos foris conspiciæ sunt, & non lethales in totum. Si verò fluxio retrò processerit per palatum, & in ventrem pituita peruenerit, fluunt quidem horum ventres, non autem agrotant. Si verò inferne maneat pituita, affectiones voluolosæ sunt diuturnæ. Aliis autem si per palatum in guttur multa fluxio cotingat, vt plurimum morbi tabis oriuntur, replētur enim pulmones pituita, atq; ea ipsa pus fit, id quod pulmones exedit, & egroti non facile superites manent, & mens medici si bonus & prudens est, vt plurimum causam intelligit. Alius morbus oritur ex defluxione capitis per venas in spinalem medullam. Inde autem in sacrum os impetum facit, quo medulla ipsa fluxionem perducit, & in coxendicum acetabula siue iuncturas deponit: & si tabem fecerit, homo marcescit, atque hoc modo cōtabescit, & viuere non expetit. Statim enim scapulæ dolent, amboque pedes ac crura consequuntur, & semper tandem pereūt multo tempore curati: atq; sic desflorescit homo ac moritur. Hæc mihi de fluxionibus capitis dicta sunt. Sunt autem affectiones cerebri, etiam alij morbi, deliria, insania, omnia pericu

Sideratio,

Σοπαλῆζια.

Morbus

imago-

sus.

ὀφθαλμία.

Purulentæ

aures.

Palati de-

illatio.

x vent

idus.

Tabes.

Pulmo qui

consuma-

tur.

Phthisis.

med

f. f. f.

f. f. f.

f. f. f.

f. f. f.

f. f. f.

f. f. f.

f. f. f.

f. f. f.

f. f. f.

f. f. f.

f. f. f.

f. f. f.

f. f. f.

f. f. f.

f. f. f.

f. f. f.

f. f. f.

f. f. f.

A periculosa, & ægrotat cerebrum, & aliæ glandulæ. Habet enim & dolorem, & alius congressus corporis hic contingit. Quin & glandulæ in pectoribus mamme appellantur, & at- Mammæ. tolluntur ac lac faciunt, aliquibus verò lac nō faciunt. Et faciunt quidem lac mulieres, viri verò non faciunt. Mulieribus enim rara est glandularum natura, quemadmodum etiam reliquum corpus rarum habent, & alimentum quod in se trahunt, in lac permutant. Et ab utero accedit ad mammas, quod post partum puero cessurum est in alimentum, quod ipsum sanè exprimit ac sursum mittit omentum, ad supernas partes ab ipso foetu coarctatum. Verum maribus lo-

B ut glandulæ non sint magnæ, Mas enim plenus est, & velut Marii corpus quale. Fœminæ corpus. pallium densus, tum ad visum, tum ad tactum: fœmina verò rara & laxa, & velut fluida, tum ad visum, tum ad tactum. Quare humiditatem nō remittit id quod est rarum & molle. Mas autem non amplius quid eius susceperit, quum densus existat ac cohærens & compactus, sed & labor corpus ipsius corroborat, ut non sit locus ubi redundantia ac superfluitates recipiat. Atque hoc modo cogit ac cōcludit hæc ratio, & pectora, & mammas, & reliquum corpus mulieribus laxa ac mollia esse tum ob otium ac segnitiam, tum ob alia prædicta, Viris autem vice versa. Porro faciunt etiam mammarum tubercula ac inflammationes, lac ipsum putrefacientes. Cō-

C moda autem habent superioribus similia, & reliqui corporis redundantiam auferunt, testimonium abundè præbent mulieres, quibus morbus, aut alia quædam calamitas mammas adimit. Nam & vox ipsarum aspera redditur & humores in gulam feruntur, & multo spuito vexantur, & caput dolent, & ab his ægrotant. Lac enim proficiscens ac influens ab utero, quemadmodum etiam antea in superna vasa transibat, quum propria vasa non habeat, nec

reperiat utpote ipsis per mammarum ademptionem priuatum, in principales corporis partes incurrit, cor videlicet ac pulmonem, atque

hic suffocantur.

HIPP

HIPPOCRATIS^D

COI LIBER DE OSSIVM NA- TVRA MOCHLICVS, ID EST VECTIARIVS. IANO COR- NARIO MEDICO PHY- SICO INTER- PRETE.

Manus pe-
disque ossa
articuli.



Patella.

Coxa.

Os sacrum
Spina.

SSIVM natura hæc est. Digitorum quidē ossa ac articuli simplicia sunt. Manus autem & pedis multa alia, alio modo coarticulata. Maxima verò suprema parte. Calcanei verò vnum, velut extra apparet. Ad ipsum autem posteriores tendines tendūt. Tibiæ verò duo sunt, quæ supernè ac infernè cohærent. Iuxta medium verò distant. Paruum est quod extrinsecus est, iuxta paruum digitum paulò tenuius. Plurimum autem hac parte distant, & minore momento iuxta genu: & tendo ex ipso enascitur, qui circa poplitem foris est. Habent autem infernè communem appendicem, ad quam pes mouetur. Aliam verò supernè habent appendicem, in qua femoris articulus mouetur simpliciter, & expeditè in longitudinem, specie nodosa, patellam habens. Ipsum autē femur foras, & in anteriore parte incuruum est. Caput autem eius appendix est rotunda, ex qua nervus, qui in coxæ acetabulo est, nascitur. Subobliquus autem etiam hic annexus est, minus verò quam brachium. Coxa verò magno verticulo, quod iuxta os sacrum est, ex ligamento chartilagineo ac nervoso adhæret. Spina verò à sacro osse, vsque ad magnum verticulum gibbosa est, & vesica, & genitura, & recti intestini pars inclinata, in hac parte est. Inde verò vsq; ad septum transversum peruenit, in directum repanda est, & muscoli lumbares hac parte existunt. Hinc verò vsq; ad magnum verticulū, quod supra supernas humeri partes est, è directo gibbosa est. Imò magis esse videtur quam est. Nam posteriores ossiū propagines hac parte alt

A te altiffimæ ſunt. Ceruicis autem articulus repādus eſt. Ver **Ceruix.**
 tricula verò intrinſecus inter ſe æqualia ſunt: ab externis au-
 tem chartilaginibus ac neruis continentur. Coarticulatio
 verò ipſorum in poſteriore medullæ ſpinalis parte eſt. A po-
 ſteriore autem parte exortū acutum habent, qui appendicē
 habet chartilaginofam, vnde neruorū propago prona fertur
 quemadmodum etiam muſculi à ceruice ad lumbos adna-
 ſcuntur, coſtarum ac ſpinæ medium explentes. Coſtæ verò
 iuxta diſcriminationes verticulorum **Neruo** annexæ ſunt à **Coſtæ.**
 ceruice uſque ad lumbos intrinſecus. Ab anteriore autē par-
 te, iuxta pectus, laxam ac mollem ſummā partem habentes,
 ſpecie præ cunctis animalibus maximè obtorta. Hac enim
B parte anguſtiſſimā molem homo habet. Qua verò parte co-
 ſtæ non ſunt, exortus obliquus, breuis & latus, ad ſingula ver-
 tricula neruo annexus eſt. At verò pectus cohærens ipſum ſi- **Pectus.**
 biipſi, diſcriminationes habet obliquas, qua parte coſtæ an-
 nexæ ſunt. Laxū autem eſt & chartilagineū: clauiculæ verò **Claues pe-**
 rotundæ ſunt ad anteriore partem, ad pectus quidem breues **toris.**
 motus habentes, ad ſummum verò humerum frequētioreſ.
 Summus autē humerus ex ſcapulis naſcitur, in plerique diſſi-
 milit. Scapula ad ſpinā chartilaginea eſt, reliqua parte la- **Scapula.**
 xa, inæ qualem partem foras habens ceruicem verò & aceta-
 bulum habet chartilagineum, ex quo coſtæ motum habent.
 Facile autem vt inter oſſa exoluitur, brachio excepto. Huius
C autem caput ex neruo & acetabulo dependet, chartilaginis **Caput hu-**
 laxæ rotūdā appendicem habens. Ipſum verò brachiū in- **meri.**
 curuum foras, & anteriore parte obliquum, non rectum eſt
 ad acetabulum. Pars verò ad cubiti gibbum lata eſt, & nodo
 fa, & repagulo ſimilis, & ſolida, poſteriore parte caua, in qua
 cornix ineſt ex cubito, quum manus fuerit extenta. Ad hanc **Neruoſtor**
 etiā torpidus neruus, qui ex cubiti oſſium diſcrimine media **pidus.**
 enaſcitur, perficitur ac terminatur. Oſſa manus viginti ſe- **Manus, pe-**
 ptem ſunt, pedis viginti quatuor. Colli uſq; ad magnum ver- **dis, cætero-**
 ticulum ſeptē, lumbi quinque, ſpinæ viginti, capitis vnā cum **rūmque of-**
 oculorum oſſibus octo. in vniuerſum nonaginta vnum, cum **ſa.**
 vnguibus verò centum ac vndecim, Cæterum vt nos ipſi
 ex hominis oſſibus didicimus, verticula ſupra clauiculam **Vertebra**
 vnā cum magno ſeptem ſunt. Iuxta coſtas autem tot quot **Coſta.**
 coſtæ ſunt, duodecim videlicet. Iuxta laterū mollitudinem
 i 2 verò

Hippocratis Liber

Semen ge-
 tale fauo-
 rale.
 otus quò
 ndat.
 arynx.
 lepar.
 el.
 or.
 Mesocolo-
 rhenes.
 arteria.
 Nerui.
 Venæ rhe-
 num.
 Urina qua
 re rubeat.
 Venæ co-

verò forinsecus vbi coxendices, in lumbo quinque. Semen D
 porrò velut fauus ab vtraque vesicæ parte est. Ex ipsis au-
 rem rhenibus venæ ab vtraq; meatus vrinæ parte, in puden-
 dum tendunt. Potus per fauces ac gulam: larynx enim qui
 caput arteriæ est, in pulmonem ac arteriam tēdit: ab his in
 summam vesicam. Hepatis extremitates quinque sunt, su-
 per quarta autem extremitate foli incumbit, quod osculum
 ad septum transuersum & cor, ac pulmonem profert. Cir-
 cum cor pellicula est. Intestina crassa homo maiora quàm
 canis habet, dependent autem ex Mesenterij membrana,
 quæ Mesocolon hac parte vocatur, Mesocolon autem ex ner-
 uis de spina sub vētrem. Rhenes ex neruis de spina. Arteriæ E
 fons cognatus cor est. Vena tendit per septum transuersum,
 hepar, splenem, rhenes, ad coxendicem, circa suram ad sum-
 mum pedem. Altera autem ex corde sub alas, clauiculas, iu-
 gula, caput, nasum, frontem, iuxta aures, humeros, dorsum,
 pectus, ventrem per cubitum. Aliæ verò per alias ad cubi-
 tum ad summam manum. Neruorum exortus ab occipitio
 vsque ad spinam, ad coxendicem, in pudenda, in femora, pe-
 des, tibias, in manus. Alij in brachia, partim in carnes, par-
 tim ad fibulam, in magnum digitum, partim ex carnibus in
 alios digitos. Alij ad scapulas, pectus, ventrem, ossa, ligamen-
 ta. A pudendo verò ad princeps intestinum ac podicem, ace-
 tabula coxarū, partim suprā femur, partim infrā ad genua.
 Inde alius ad genu extentus ad tendinem, pernam, pedes, F
 alius ad fibulam, alius in rhenes. Ipsæ porrò venæ in vtran-
 que partē bifariam maximè finduntur, partim ab vna vtri-
 usq; rhenis parte, partim ab altera: & perforatæ sunt in rhe-
 nes. Habent autem cordis formam ipsi rhenes. Nam etiam
 ipsi ventriculos habent. At verò Rhen cauiam sui partem ad
 venas magnas habens situs est. Vnde enascuntur ex ipso ve-
 næ in vesicam, qua parte potus trahitur per venas in rhenes,
 & per ipsa intestina per quæ procedit. Deinde verò velut per
 qualum, per rhenes aqua percolatur. Spongiforme enim est
 ipsorum corpus ad vesicam, & hic percolatur ac secernitur
 à sanguine vrina, quapropter etiā rubra existit. Neq; enim
 in rhenes aliæ procedunt venæ quàm quæ dictæ sunt, neque
 est alius locus vbi potus colliquescat, quantum ego noui.
 Venæ circa costas tendentes, subter vnamquaq; costam
 sunt,

A sunt, non à capite, inferius etiam ab arteria. Arteria quidem staturum.
 igitur subtermeans in costas distribuit. A crassa verò vena à Vena co-
 corde recurrit vna in sinistram partem inclusa. Deinde hæc dis.
 quidem per medias vertebrae vsq; ad summas costas meat,
 non ex æquo distribuens costas à dextris ac sinistris ramos ac
 segmenta sua. Alia verò æquos quidem, verum supernè in
 dextris finditur. Cæterum iuxta vtranque claviculam duæ Venarū d-
 venæ sursum, duæ sub pectus, partim ad dextras, partim ad gestio.
 sinistras, ramos siue segmenta, spargunt, illæ quidem magis
 ad ceruicē, duæ verò alteræ magis ad cor, partim ad dextras,
 partim ad sinistras, ab vtraque parte iuxta costas, & sub ipsis
 velut inferiores scinduntur, donec recurrenti infernè à cor- Arteria.
 de commiscuntur. At verò sanguiflua vena ab arteria hac,
 propterea finditur, quòd sublimis hic est per cor means. In-
 fra verò costas vena sanguiflua crassa appellata, verticulis
 rursus seipsam ingerit, & hic adhæret, & non ampliùs pen-
 det, velut supernè per hepar means. Est autè iuxta lumbum
 quidem supernè arteria, infra autem sanguiflua, ab hepate
 per septum transuersum sublimis veniens, & ad dextrā cor-
 dis fertur vsque ad claviculas simplex, præter quàm quan-
 tum cum corde communicat, iuxta vasa quidè in ipso ma-
 gis in superficie fissa, verum iuxta vasa in ventriculo cordis
 penetrans, postea à corde ad sinistram se demittit, & simplex
 ad spinam rursus currit, ad superna quidem corporis vsque
 ad supremas costas, & ramos à seipsa habet iuxta vnam-
C quamque costam extentos iuxta naturam vsque ad pectoris
 commissuram, & in sinistram, & in dextrā, & rectitudo ipsius
 magis ad verticulum est, quàm arteriæ extensio, itémque
 venæ ab hepate venientis. Ad inferiorem verò cordis par- Tenor arte-
 tem, recta extensio ab ipsa magis ad verticulum est, quàm ar- riæ & cor-
 teriæ extensio altera, quæ iuxta cor & in infernas partes se- dis.
 pti transuersi ad spinam appensas conuersa est. Inde verò ra-
 mi in vnamquamque rectitudinē inferuntur, per ossa & car-
 nes mutuò transeunt. At verò venæ crassæ sic habent. Ex
 oculo iuxta supercilium per dorsum iuxta pulmonē sub pe-
 ctore, altera ex dextra in sinistram, altera ex sinistra in dextrā
 transit, & quæ quidè ex sinistra venit, per hepar in rhenem
 ac testiculum descendit. Quæ verò ex dextra, in splenem &
 rhenem ac testem, his autem osculum est ipsum pudendum.

Hippocratis Liber

A dextra verò mamma in sinistram coxendicem, & in crus **D**
 descendit, & rursus à sinistra in dextrā. Oculus verò dexter,
 ex sinistro venam fuscipit, itémque testiculus. Iuxta eūdem
Venarum modum rursus sinister ex dextro. Crassissimæ porrò venæ
 quatuor pa- in hunc modum se habent. Quatuor paria sunt in corpore.
 ria. & aliquæ quidem ex ipsis, à capite retrò per ceruicem foris
Venarum iuxta spinam ab vtraque parte ad coxendices perueniunt, &
 descensus. ad crura, deinde per tibiae ad malleolorum partes externas,
 ac in pedes procedunt. Oportet igitur venæ sectiones in
 doloribus in dorso, ac in coxedicibus, à poplitibus facere &
 à malleolis forinsecus. Alteræ verò venæ ex capite iuxta au-
 res per ceruicem, sphagitides, id est iugulares appellatæ, in-
 trinsecus iuxta spinam, ab vtraque parte iuxta lumbos pro-
 cedunt in testes, & in femora, & per poplites ab interna par-
 te, Deinde per tibiae ad malleolos intrinsecus, & ad pedes. **E**
 Oportet igitur venæ sectiones facere ad dolores lumbo-
Tertia. rum ac testium, à poplitibus ac malleolis intrinsecus. Ter-
 tiæ venæ ex temporibus per ceruicem in scapulas procedunt.
 deinde in pulmonem deferuntur. & perueniunt altera qui-
 dem à dextris in sinistras sub mammam, in splenē & in rhe-
 nem. Altera verò à sinistris in dextras ex pulmone sub mam-
 mam in hepar & in rhenem, desinunt autē ambæ hæ in inte-
Quarta. stinum rectum ac podicem. Quartæ autē venæ ab anteriore
 capitis parte ac oculis, sub ceruicem & sub clauiculas proce-
 dunt. Deinde à brachiis supernè sub curuaturas, postea per
 cubitos, ad manuum iuncturas ac digitos. Postea rursus à di- **F**
 gitis, per manuū pectora, hoc est volas, & per cubitos in cur-
 uaturas, & per brachiorum infernam partē ad alas, & ex co-
 stis supernè, altera quidem in splenē procedit, altera in he-
 par, deinde suprā ventrem ambæ in pudendum desinunt. Et
 crassæ quidem venæ hoc modo se habent. Sunt autem & à
Venæ aliæ ventre venæ per corpus multæ & omnigenæ, per quas ali-
 ex his ma- mentum corpori venit, procedunt autem & à crassis venis
 nantes. in ventrem ac reliquū corpus, & ab extremis, & ab intimis,
 & inter se mutuò distribuunt, internæ foras, externæ intro.
 Venæ igitur sectiones facere oportet iuxta hos modos. Ope-
 ramque dare oportet, vt quàm longissimè à locis, vbi dolo-
Sanguinis res fieri solent ac sanguis colligi, secemus. Sic enim minimè
 mittendi ra- mutatio magna de repente fiet, & consuetudinem transtu-
 tio. leris,

- A**leris, vt ne amplius in eundem locum colligatur. Cæterum Hepatitis vena in lumbo vsque ad magnum verticulum, inferne etiam verticulis se ingerit, inde sublimis eleuata per hepar, & per septum transuersum in cor: & hæc quidē recta ad clauiculas procedit. Inde verò aliæ quidē ad collum, aliæ ad scapulas, aliæ deorsum reflexæ iuxta verticula ac costas declinant, à sinistris quidem vna prope clauiculas, ex dextris autem in quendā ipfarum locum. Alia verò vtrinque deflexa. Alia paulò inferius deflexa, vbi illa quidē deficit, costis se ingerit, donec ad venam in ipsum cor accesserit ad sinistras deflexa. Infra autem decurruata ad vertebrae descendit donec perueniat, & inde incipit eleuari, ingerens se costis reliquis omnibus, & hinc atq; hinc ramos iuxta singulas spargens quum vna existat, à corde quidem in locum quendā in sinistris magis existens, deinde infra arteriam, donec consumatur & perueniat eo, vbi hepatitis eleuata est, priusquam autem eo venit, iuxta extremas duas costas bifida fit & altera pars hinc, altera inde ad vertebrae progressa consumitur. Altera verò recta à corde ad clauiculas tendens, supra arteriam est, & ab hac (quemadmodū & ea quæ iuxta lumbum infra arteriam est) in hepar exilit, partim in portas, & extremitatem, partim in reliquum consequenter procedit paulò infra septum transuersum. Septum autem transuersum hepatis adnatū est, vt nō facile separari possit. Duplices autem venæ à clauiculis, alteræ hinc, alteræ inde, sub pectus ad pubem ac pectinem tendunt, quò verò inde, nondum noui. Septum verò transuersum iuxta verticulum infra costas, ea parte qua rhen ex arteria confurgit. Arteriæ verò ex rhene oriuntur, hinc & hinc ab arteria neruum habentes. Et hac parte in recurrēte à corde hepatitis desinit. Ab hepatitide verò per septum transuersum maximæ duæ, altera hinc, altera inde sublimes feruntur. Multifidæ autem per septum sunt, & circum ipsum innascuntur. Verum supra septum hæc magis conspicuæ sunt. Duo autē crassi nerui, à cerebro sub os magni verticuli supernè, & magis ad gulam, ab vtraque arteriæ parte vterque progrediens, inter se committuntur, vt vni similes existant, Deinde verticula ad septum transuersum hic sunt vbi desinunt. Et quidam dubij, ad hepar & splenem ab hac societate tendere ipsos putauerunt. Alius

Hepatis vena.

Venarū distributio variā.

Arteria.

Nerui à cerebro.

neruus

neruus vtrinque ex verticulis iuxta clauiculam ad spinam tendit, ex obliquo verticulorum, & se in costas ingerit: atque hi quemadmodum venae per septum transversum ad mesenterium mihi tendere videntur. ubi autem haec deficiunt, rursus hinc ubi septum exoritur, ab eo continui ac cohaerentes existentes, iuxta medium infra arteriam, de cetero ad verticula se ingerunt quemadmodum venae, donec totum sacrum os pergressi consumuntur. Ossa corpori stabilitatem, & rectitudinem, ac speciem exhibent. Nervi flexionem & contractionem ac distentionem. Carnes & cutis omnium colligationem ac constructionem. Venae per corpus diffusae spiritum & fluxum ac motum exhibent, ab una multae germinantes.

Quid ossa, nervi, caro, cutis, venae corpori praestent.

Vena capitis.

Capitis venae quadripartitae.

Vena sub lingua.

Pellicula spumosa.

Mammarii vena.

atque haec una vnde oriatur, & ubi desinat, non scio, Circulo enim facto principium non inuenitur. Ceterum rami ac germina ipsius vnde pendeant, & qua parte corporis desinant, & quod una his consentit, & in quibus locis corporis extentae sunt, ego declarabo. Circa caput iuxta medium ex obliquo circumscripta est vena lata & tenuis, non multi sanguinis, In cerebrum enim iuxta commissuras multae tenues venulae radices egerunt, & circum totum caput extentae sunt, usque ad frontem ac tempora. Ipsa autem in rectum extenditur retro caput forinsecus iuxta spinam cutem, inde vero circa externam ac internam venam ex his quae in iugulis sunt, demittitur. Ultra aures autem subsissa a gena forinsecus tendit crassa. Ab hac in linguam multae & tenues procedunt, excepta ea quae sub linguam & sub maxillares dentes fertur. Ipsa autem crassa per clauiculam descendit sub scapulas: & hac parte ab ipsa germinat per nervum subter summam humeri partem siue cuticulam, Vena humeralis appellata. Ipsa autem sanguiflua est & sanguine plena, & aegre curatur, si rumpatur aut couellatur. Ab altera enim parte nervus latus ipsam ambit, ab altera chartilago, medium vero locum ipsa tenet, & pellicula spumosa. Quum igitur locus non sit carnosus, facile rumpitur, & carnem circum nasci non contingit. & si sanguis in hanc partem subtercurrat, nactus spaciosum locum non discedit, sed induratur. Induratus autem morbum & dolorem exhibet. Atque haec quidem finit ubi prius dixi. Illa vero sub scapulas germina emittit sub mammis densarum & tenuium ac varie implicatarum inter se venularum, & per

A & per humeralem venam, prætergrediens chartilaginem, ipsam subter subattingens ad brachium tendit, musculū in sinistra habēs. Dextra autem ipsa finditur circa humerum, & cubiti supernā partem. Inde verò cubitum vtrunque penetrans, postea manus iuncturā, inde autem defluens per totam manum variè vagans radices agit. Cæterum principalis vena iuxta spinā sparsa, per dorsum, & iugulum, ac guttur, in cor inferitur, & de seipsa venam magnam multorum osculorum in corde producit, inde verò in os procedens fistulam facit, quæ sanè arteria appellatur, per pulmonem transiens, pauci sanguinis ac multi spiritus existens. Propter spaciositatem enim ac raritatē visceris, multis locis per pulmonē deriuatur, cætera verò chartilaginosa facta est. Quapropter sanè etiā si quid in has vias pulmonis delatum fuerit ex insuetis, vel in potu, vel in spiritus ac sanguinis trāsitu, vtpote venis talibus existentibus, & viscere spongiformi, ac multum humorem suscipere potente, & fursum procedente: tum humorum ingressorum lex constituta est, tum sanguis amplius per has venas nō multus cōtinetur, neque multum constringitur, & non cito procedens, illabentia non educit. Iphis autem nō subductis, sed intus manentibus, callosa con- crescit duricies. Sic autē destruitur alimenti accessio ac ingestio, quum hac parte arteriæ capitis accessus ad externas partes existat. Interceptis verò transitibus per callosam duriciem, velocitas ac difficultas spirādi oboritur, quum neq; emittere neque attrahere spiritum facilè possint. Ex huiusmodi autem tales morbi fiunt, velut sunt anhelationes, & tabes sicca. Si verò humor amplior in ipsis cōsistens præualuerit, vt crassefactus spissari non possit, & pulmonem putrem facit, & vicinas ipsi partes, fiuntq; suppurati ac tabidi. Fiunt autem hi morbi etiam ob alias causas. Inde porrò hæc vena pulmonem occupat, & per extremitates duas magnas intro conuersas, sub septum transuersum extenta est ad spinā, alba ac nervosa, venulas per reliquum condensatum corpus spargens. hinc autem per verticula densis venulis in spinalem medullam inferitur, ac instar hederæ implicatur. Et aliæ quidē venæ in corpus distributæ ex omnibus partibus ad spinam tendentes, vnaquæque quod tenuissimum ac fincerissimum est colligens hic eructat. Hæc verò velut præ-

Vena prin-
cipalis.Arteria
magna.ταχυπνοια
δυσπνοια.
Tabes sic-
ca.Vena quæ
pulmonem
petit.

Vena ner-
uus fit.

Caulis pu-
dendorum.
Pecten.

Fœminis
quæ distri-
buantur ve-
næ hæ.

Voluptas
coeuntibus
quæ fiat.

Venarum di-
uersa distri-
butio.

ses imposita per demissas plicationes in idem cogit. Inde D
verò etiam in rhenes radices agit, tenuibus ac fibrosis venu-
lis iuxta spuriam costam: hinc autem tendens condensatur,
posteaque etiam nervosa fit ad princeps intestinum ac podi-
cem, cōprimensque musculos adstrictorios ipsi inferitur. In
vesicam etiam, & testes, ac adstites radices agit, multiplici-
bus implicatis tenuibusque ac solidis & fibrosis venis. Inde
verò crassissima ac rectissima ipsius pars rursus conuersa in
caulem transit, hoc est pudendum. In reflexu autem in illa
ipsa adaptatur. Et per pectinem supra subter cutem ventris
& ipsius venæ, procedunt venæ ad eas quæ deorsum tendunt,
quæ in seipsas mutuo deriuantur. Penetrant autem & per
pudendum venæ crassæ, & tenues, & densæ, & curvæ. At ve- E
rò in fœminis illa ipsa in vteros tendit, & in vesicam ac vri-
næ meatum. hinc autē recta procedit, & mulieribus quidem
circa vteros pendet, masculis verò circa testes disseminatur.
Ob hanc autem naturam ipsa vena etiam plurima fœcunda
ac genitalia concipit. A plurimis enim ac sincerissimis par-
tibus cōnutrita, paucique sanguinis existens ac caua, & den-
sa instar nerui, ac spiritu referta, intentaque à pudendo, de-
missas ad spinā venulas cogit: hæ verò velut cucurbita me-
dicinali in seipsas coactæ, omnia in supernam venam emit-
tunt. Confluit autem & ex aliis corporis partibus in hanc,
Verum multo maxima pars velut dictum est, de medulla
hac colligitur. Voluptas verò accedit, vena hac genitura
expleta, Quum igitur soleat reliquo tempore modici san- E
guinis ac multi spiritus esse, repleta & calfacta & semine
deorsum confluyente, ea quæ in seipsa habet constringit. Spi-
ritus autem in ipsa existens, & præsens violentia, & calidi-
tas, & venarum vndiquaque concitatio, titillationem indu-
cit. Illa autē quæ à seipsa germinauit, per dorsum & iugu-
lum iuxta spinam sparsa, multis venulis costas intertexit, &
verticula per carnes alternatim condensat, vt & probe nutri-
ta & sanguine plena existat. Ipsa autē iuxta coxendicem ac
nates meat, per musculum sub fœmore submersa, à natibus
verò iuxta acetabulū femoris iuxta caput in venam perfo-
rata est, quæ femori respirationē exhibet, trans femur autē
iuxta flexurā ad genu. Alteram verò iuxta inguina demit-
tit frequentibus radicibus, & ægrè transeuntem. Hæc ve-
rò per

A rō per musculum tendens, & circa genu diffeminatur, & per ossis tibialis summitatem venam de se in fistulā cauat, quā medullam nutrit, & deriuatur per infimam tibiā, iuxta pedis illigationem ac cōnexionem. Ipsa autem per patellam genu ad interna per tibiā musculum submersa extenditur, & per malleolum implicatur, intus crassa & sanguine plena, atque hic circa malleolum, & tendinem, venas a grē cognobiles producit ac inuoluit. Ipsa verò infrā ad pedē, sub summum pedem decurrit, & hic se implectens, & in magnum digitum innitens, duplam sanguine refertam venam supernè sub cutem ex summo pede reflectit, & apparet sanè crassefacta iuxta externam malleoli partē, ac sursum spargitur iuxta oppositum tibiā radium. Iuxta suram autem velut fundam facit. Inde extenditur iuxta internam genu partem. Immittit etiam patellæ venas, & iuxta internam patellæ partem quæ caua est, venam implicat, quam si quis doleat, celerrimè biliosum seorsum ac saniosum humorem colligit. procedit autem ipsa iuxta internam genu cavitatem. Distribuit etiam de se in poplites multas implicatas venas, Quæ inde tendentes iuxta neruos sub femore, radices agunt in testes, & in rectum intestinum ac podicem, & circa os sacrum attenuatæ vnitæ circuntenduntur. Illa verò procedens iuxta internam genu cavitatem, sursum iuxta internam femoris partem, in inguen transit, & per coxendicem vltra ad spinam & lumbum foras veniens, crassa & lata ac sanguine plena sursum porrigitur ad hepar, & vbi bifidam produxit sanguine refertam venam, dextram hepatis extremitatem, ad rhenem occupat, Rursus verò subter hepar dispersa in venam crassam finditur. Fissa verò in crassitudinem hepatis inseritur, & altera quidem ipsius pars in superficie visceris extat, in qua etiam est fel, habetque multas radices instar cirrhorum ac plicationū per hepar dispersas. altera verò pars per internas ipsius partes deriuatur.

Dux autem venæ inter duas latas extremitates explicantur, & vna quidem per vertices ac cutem penetrās ex vmbilico effertur. Altera verò premens spinam, in rhenem, ac vesicam, & pudendum, velut ancoris iactis inseritur. Verūm ex coxendice incipiens ascendere ad pubem. multas vagabundas producit venas, & costas ac verticula ad spinam illigat, & propa

Vena quæ
de sinistris
dextra ten-
dit.

Lien.

Sensus cor-
poris to-
tius cur in
pectore.

& propagines suas multipliciter per venas transmittit, & in-
testina ac ventrem inuoluit. Et aliæ quidem à pube ad mam-
mas, & suprâ mentum, & summos humeros exporrecte diua-
gantur. Alia verò procedēs iuxta crassitudinem hepatis, vbi
fel in fistulam coegit, sursum sub spinam dispergitur, per se-
ptum transuersum itinere facto. Cæterum vena ex sinistris
partibus, in reliquis quidem iuxta eandem naturam, velut
ea quæ in dextris, radices agit. Verum ex sinistris emergens
in hepar non se ingerit, sed in splenem inseritur, iuxta caput
quod in crassitudine ipsius consistit. Inde verò internas sple-
nis partes subit, ipsasque venulis sanguinolentis instar ara-
nearum telæ intertextit. Hic verò totus ex omento eleuatur,
venulis ex seipso sanguine plenum ipsum reddens. Quæ ve-
rò à capite splenis ad spinam accedunt, per septum transuer-
sum penetrât. Inde verò sursum & dextra & sinistra sub pul-
monem extenduntur. Quæ autem sanguine plenæ sunt, sub
ipsum & in ipsum corruuntur. Quæ verò pauci sanguinis
& tenues à pulmone intrinsecus procedentes, qui natura ra-
rus existit, vtpote ab ipso emulctæ, in cor frenantur circa au-
riculas ipsius, & in cavitates internas diffluunt. Ingerunt au-
tem & priores in ipsum. Etenim in angustia transitus situm
est, velut ex omni corpore habenas habens. Quapropter ex
omni corpore maximè circa thoracem sensus existit.
Colorum quoque mutationes corde adstringente
venas ac laxante fiunt. Laxante quidem igitur
rubicundi colores fiunt, & bene colorati
ac pellucidi, constringente verò, vi-
rides cum pallore & liuidi. Ve-
rùm tales euariant iuxta
præsentes in vno-
quoque co-
lores.

H I P

71
A H I P P O C R A T I S

COI LIBER DE LOCIS

IN HOMINE, IANO

CORNARIO MEDICO

PHYSICO INTER-

PRETE.

*



I H I quidem videtur principium corporis nullū esse, sed omnia similiter principium, & omnia finis. Circulo enim scripto principium non reperitur. Similiter etiam morborū in toto corpore. Quod enim siccus est, morbos magis recipere, ac magis dolere, à natura solet. Humidum verò minus. Morbus enim, qui in

Membra
hominis
qualia.

Corpus sic-
cum magis
morbo ob-
noxium,
quàm hu-
midum.

ficco est, stabilitur & non cessat. Qui verò in humido, diffuit, & aliàs aliam corporis partē occupat, & semper transfugiens requiem facit, & citius quoque sedatur, utpote non stabilitus. Corporis autem singulæ partes altera alteri, ubi hinc aut illinc processerit, morbū statim facit, venter capiti, caput carnibus ac ventri, & reliquæ omnes iuxta eandem rationem, quemadmodum venter capiti, & caput carnibus ac ventri. Etenim quum venter egestionem moderatam non fecerit, & in ipsum cibus ingeratur, humiditate ciborum ingestorum corpus irrigat. Ipsa autē humiditas à ventre obstructa, acruatim ad caput viā facit, & ubi ad caput peruenerit, à vasis in capite non recepta, fluit quocunque contigerit, & circum circa caput, & in cerebrum per os tenue, & partim quidem os ipsum subit, partim verò circū cerebrum per os tenue. Et si quidem in ventrē rursus peruenerit, ventri morbum inducit. Si verò ad aliam aliquam partē incubuerit, illi ipsi morbum facit. Ita etiā reliquæ partes altera alteri morbum inducit, & optimum fuerit sic curare ægrotas per has quæ morbos faciūt. Sic enim quàm optimè principium ægro-
tantis

Corpus quale. tantis quis sanauerit. Corpus porro ipsum sibiipfi idem ac D simile est, & ex iisdem compositum est. Similiter autem habet & paruas & magnas partes, itémq; infernas ac supernas. Et si quis minimam corporis partem acceptam malè afficere velit, totum corpus affectionem sentiet, qualiscunque tandem ea fuerit: propterea quòd minima corporis pars omnia habet quæcunque & maxima. Insuper quicquid tandem minima pars pertulerit, ad gentilitatem refert ac tràffert, vnaqueque ad sua, siue bonum siue malum id fuerit, & propterea corpus & dolet, & lætatur, cùm minima gente, quia in minima omnes insunt partes, & hæ ad gentiles sibiipfis singula

Corpus huiusmodi medicum materia est. Auditus. tranfferunt, & omnia denuntiant. Cæterum natura corporis, principium sermonis in arte medica, primum perforata E est qua parte audimus. Etenim vacua circum circa aures, non aliud inaudiunt quàm strepitum & clamorè, Quicquid autem per membranam in cerebrum peruenerit, id liquido & clare auditur. Ob id etiam foramen solum per membranam

Narium qualitas. Odoratus. circum cerebrum extentam est, In nares autem non inest foramen, verum mollis laxitas velut spongia, & propterea per longiorem distantiam audit quàm olfacit, odor enim ab olfactu longè dispergitur. Et in oculos venulæ tenues ad visum ex cerebro per ambientem membranam feruntur. Hæ

Visus quoque pascatur. Tres oculorum tunica. autem venulæ visum alunt humore de cerebro purissimo, qui etiam in oculis apparet. Eadem venæ etiam visum extinguunt, vbi fuerint resiccatae. Membranæ autem tres sunt quæ oculos custodiunt. Superna quidem crassior, media tenuior, tertia tenuis, quæ humorem conseruat. Ex his superna & crassissima si lædatur ac mutiletur morbos facit. Media verò etiam ipsa periculosa est, & vbi rupta fuerit prominet foras, velut vesica. Tertia autem tenuissima omnino periculosa est, quæ humorem conseruat. Membranæ cerebri

Cerebri duæ membrana. duæ sunt, altera superna crassior, altera tenuis cerebrum attingens, non ampliùs eadem permanens, postquam fuerit

Venulæ capitis. vulnerata. Venæ autem transeunt ad verticem per carnem venientes ad ossiculum, feruntur & per carnem duæ ex vertice rectæ, qua parte supercilia clauduntur, & desinunt ad angulos oculorum. Vna autem à vertice ad nasum fertur, & in vtranque nasi cartilaginem finditur. Aliæ verò duæ venæ iuxta tempora feruntur, in medio temporum & aurium, quæ

A quæ premunt oculos, & semper pulsan. Solæ enim hæ ex venis sanguine non rigantur, sed auertitur ex ipsis sanguis. Qui autem auertitur influenti occurrit, & qui quidem auertitur volens discedere, qui verò supernè influit volens infrà procedere, hic impelluntur ac diffunduntur ac mutuò circūagitantur, & pulsus venis exhibent. Visus humore de cerebro nutritur, quum autem quid eius de venis acceperit, fluxione turbatur, & humor ipse nō apparet, & ob oculos moueri ipsi videntur aliquando velut auicularum imagines, aliquando velut lentes nigræ, & nihil exactè iuxta rei veritatem videre potest. Aliæ duæ venæ in medio aurium & aliarum venarum, quæ feruntur ad aures, & premunt aures. Aliæ duæ venæ ex ossis conuersione in aures feruntur. Quædam verò infrà ad corpus conuertuntur: duæ quidem venæ iuxta tendines colli feruntur & iuxta verticula, & desinunt in rhenes, hæ autem etiam in testes penetrant, & quum hæ affectæ fuerint homo sanguinem mingit. Aliæ duæ venæ à vertice ad humeros feruntur, & sanè humerales vocantur. Aliæ duæ venæ à vertice iuxta aures, ab anteriore colli parte vtrique ad cauam appellatam venam feruntur. Caua autem vena finitur quidem velut gula, consistit autem inter gulam & guttur siue arteriam, ferturque per septum transversum & per cor, & inter septum, & finditur ad inguina, & ad femora intro, & disparationes in femoribus facit, & ad tibias intus fertur ad malleolos. Hæ & infœcundum faciunt hominem, quum fuerint sectæ, & in magnos digitos desinunt. Ex caua autem vena producit quædam in sinistram manum, fertur autem subter splenem ad sinistri lateris mollitudinem, vnde splen propagatur, per omentum, & finem sortitur ad thoracem. Producit autem iuxta septum, & cum humerali committitur subter cubiti articulum: atque hæc splenis gratia secatur. Alia etiam ad dextram manum eodem modo à caua producit. Communicant autem omnes venæ, & confluunt inter se mutuò, & aliæ quidem sibi ipsis per se committuntur ac coincidunt, aliæ verò per venulas à venis extensas. Quæ autem carnes nutriunt, ea parte inter se confluunt. Et quicūq; morbus à venis oritur leuior est quàm qui à nervis. diffluit enim vnà cū humore qui in venis inest, & non quiescit. Et natura venis in humore est, in carnibus. Nervorum autem qualitas, sicci

Quæ imagines
gunculas
præ oculis
cursitantes
creant.

Venarum
digestio.

ficci sunt, & ventriculos siue cavitates non habent, & ad ossa consistunt, & maxima ex parte ab ossibus nutriuntur. Nutriuntur & à carnibus, & valorem ac robur inter ossa ac carnem medium habent: & humidiores quidem sunt ac carniores quàm ossa, sicciores autem ac magis ossei quàm carnes. Quicumque autem morbus in ipsos peruenerit, roboratur & quiescit in eodem loco, & difficile est ipsum educere. Maxime verò impetunt ipsos distentiones, & alij morbi, à quibus tremor corpus occupat, & qui temerè ipsum faciunt. Nerui autem premunt articulos, extentique sunt per totum corpus. Robusti autem maxime & semper crassissimi sunt in illis corporis partibus, in quibus paucissimæ carnes sunt.

Nerui ubi
non sunt.
Capitis
futuræ.

Et corpus quidem omne neruis plenum est. Verum circa faciem & caput non sunt nerui, sed fibræ confimiles neruis, inter ossa & carnes, tenuiores & solidiores. Capita futuras habent, alia tres, alia quatuor, & quæ quidem quatuor habent, his sunt vtrunque iuxta aures, & tertia ab anteriore, quarta à posteriore capitis parte. Sic quidem in capite quòd quatuor habet, in eo verò quòd tres, iuxta aures vtrunque sunt, & ab anteriore parte tertia. Posteriore verò parte futura nulla est, velut in eo quòd quatuor habet. Saniores autem capite

Supercilia.
Mandibulæ.

sunt, qui plures futuras habent. Inter supercilia os descendit ac transit, & mandibularum clausura in medio mento, & supernè ad caput est. Verticula alij plura, alij pauciora habent. Qui pauciora habent, his duodeuiginti sunt, horum

Costæ.

alia sursum ad caput, alia deorsum ad sedem tendunt. Costæ septem à posteriore corporis parte, ad verticula connectuntur, anteriore parte in pectore inter se committuntur. Clauiculæ articulos habent, alios in medio pectoris iuxta guttur, atque hic coarticulatæ sunt, alios verò ad humeros, reclinatos ad scapulas, qui humeris semper adhærent. Scapulæ verò ad membra brachij siue totius manus coarticulantur, incumbentes in ipsum os quòd in membro est. Iuxta os autem appendices duæ prodeunt, altera intrinsecus, altera forinsecus, quæ ad scapulas ossi adnascetes, infra coarticulatæ sunt. Quæ verò in cubiti flexura sunt, infra quidem radio coarticulatæ sunt, iuxta os natura cauum existens, supra autem radium paululum, in cubiti gibbum, & tunc tum os, tum radius in idem commissa, articulum in cubiti gibbo faciunt.

Clauiculæ
pectoris.

Scapulæ.

Appendices.

Iuxta

- A** Iuxta vlnam verò appendices prodeunt tenues valde quatuor, duæ sursum, duæ deorsum, & ad cubiti gibbum quidē duæ appendices consistentes, suprà ex ossē hærent, hæc cum ossē coherentes, iuxta ossis articulum in cubiti gibbum coarticulatur. Quæ verò infrà sitæ sunt, & intus reclinatæ, hæc utraq̃ue committuntur ad radius ex supernis à mēbro procedentem, & intus ad membrum coarticulantur, & radius appellatum faciunt hæc sibiipsis intus in cubito commissæ. Infra autem ad manum os articulum habet. Appendices verò hac parte teneræ existentes, duæ quidē non exeunt in articulum. Superna autem & inferna, cum ossē coarticulantur ad manū. Cæterum manus articulos multos habent. Quæ Appēdices quatuor.
- B** cunque enim ossa inter se committuntur, omnia articulos faciunt. Digiti articulos habent multos, unusquisq; tres. Vnū ad vnguē, in medio vnguis & nodosa prominentiæ, alterum in ipsa nodosa prominentia, qua parte etiam digitos confleunt. Tertium qua parte digitus à manu exoritur. At verò in coxendicibus articuli duo sunt, quæ acetabula appellatur, & femora in hos inarticulata sunt. Iuxta femora autem appendices duæ protenduntur, altera intus, altera foris, & in articulum neutra procedit, neq; ab altera parte, sed ad os ad femur inferuntur. Femur autem supernè ubi in acetabulum ingruit, bifidum est huiusmodi bicipitate. In ea quidem parte quæ intrò inclinata est, in summitate rotundum est ac leue, quæ etiam in acetabulum ingreditur. Altera autem bicipitatis pars exterior, magis foras prominet, & inferius apparet ad nares, & coxendix appellatur. Ad genu verò os femoris taliter biceps est. Bicipitio autem huic os tibia appellata, velut in cardine adaptatum est, suprà adaptatum autem Mola siue patella incumbit, quæ humiditatem à carne in articulum expassum descēdere prohibet. Iuxta tibiam autem appendices duæ procedunt, quæ infernè ad malleolos pedis finiunt, supernè ad genu, non autem perueniunt ad articulū. Manus articuli. Digiti.
- C** Ad pedē verò tibia iuxta malleolos articulū habet, & aliū infra malleolos. Et in pedibus articuli multi quemadmodū in manibus sunt. Quot enim ossa, tot sunt articuli, & in digitis pedum eodem numero sunt, ac pari modo habent. Articuli insuper multi in corpore parui sunt, nō similiter omnibus, sed alij aliis. Hi autē qui scripti hic sunt, omnibus similes. Coxēdices.
- Femur.
- Genu. Tibia.
- Pedum articuli.
- k liter

Mucus. liter habent. Aliæ etiam venæ aliis sunt, sed non memora- **D**
biles. Mucus omnibus à natura est, & cum hic purus fuerit.

**Claudica-
tio vnde.
Ventriculi
venulæ
quæ vesicâ
petunt.
Fluxiones
frigore ma-
gis fiunt.**

Calore etiâ

**Cûr supe-
riora hûme-
scât magis.**

articuli sani sunt, & bene moueri possunt, vtpote lubrici in-
ter seipsos. Labor autem & dolor fit, vbi à carne humiditas
fluxerit vitiosa, Primum enim articulus stabilitur, Nō enim
lubrica est humiditas quæ de carne influxit. Deinde vt mul-
ta, & valde sparsa, & ex carne nō irrigata, semper resiccatur.
& vt multa existens, & articulo ipsam non capiente, effluit:
& malè stabilita eleuat neruos, quibus articulus colligatur,
ipsosque inconnexos ac dissolutos facit. & propterea claudi
fiunt, quum hoc magis fit, magis: quum minus, minus. in ven-
trem porrò ea quæ comeduntur ac bibuntur procedunt. Ex **E**
ventre autem, fibræ in vesicam, qua parte humorem percol-
lat, extentæ sunt. Fluxiones autem, & perfrigerata valde
carne, & percalfacta fiunt, ac superinflammata. Fluxiones
propter frigus fiunt, quum caro in capite, & venæ tensæ fue-
rint, Hæ enim horrente carne, & ad angustias perueniente,
adstrictæq; ac excludēte, humiditatem exprimunt. Et simul
carnes ipsæ contra exprimunt, ad angustias peruenientes: &
capilli sursum erecti fiunt, vtpote simul vndiquaque fortiter
compressi. Quicquid igitur inde expressum fuerit, id ipsum

quocunque contigerit fluit. Fluit autem etiam propter ca-
liditatem, quum carnes rarefactæ transitus præbuerint, &
humor calefactus tenuior redditus fuerit. Omnis enim hu-
mor calefactus tenuior fit, & omne cedens fluit, Maximè ve-
rò vbi valde fuerit inflammatum propter hanc fluit causam. **F**

Carnes valde plenæ factæ quum capere non possint, fluit
humor qui capi non potuit, fluit autem quocunque contige-
rit. Vbi verò semel fluidæ factæ fuerint fluxiones, disfluunt
ad locum quò tandem contigerit, donec transitus fluxionis
compressi fuerint propter gracilitatem. Quum autem cor-
pus fuerit resiccatum, & alioqui corpus ipsum sibiipso com-
municans sit, etiam quum siccum est, diducit, & concipit ac
ducit, vbicunque humor tandem obtigerit: ducere autem
ipsum non difficile est, vtpote corpore vacuo, & non intu-
mescente, præ gracilitate. Aliquando autem infernæ par-
tes siccæ fiunt, supernæ verò humidæ. Magis autem su-
perna vasa humida sunt. Venæ enim plures suprâ sunt quâ
infra, & carnes in capite minori humiditate opus habent.

Ducit

A Ducit itaque sicca corporis pars humiditatem ex capite, & simul transitus magis ducenti patent, quàm ei quæ ducitur. Nam ipsi transitus, utpote sicci existentes, eam sibi lucrificiunt, & simul humores à natura deorsum procedere solent, si vel modica quædam necessitas contingat. Fluxiones de capite septem sunt, in nares, in aures, in oculos, atque hæc ex capite fluxiones ob oculos conspicuæ existunt. Postquàm autem in thoracem fluxerit præ frigore, bilis fit. Magis autem in thoracem præ frigore fluit, propterea quòd facilis est fluxio ad guttur, utpote non contestum, præ frigore verò à bile infestati propterea lassitudine affliguntur, quia carnes quum bilem habuerint, non quiescunt, sed concutiuntur, & concussæ laborant ac delassantur, utpote velut in itinere faciendi concussæ, & suppurati fiunt quum in thoracem fluxerit, itémque tabidi. Quum verò in medullam fluxio contigerit, tabes occulta ac inconspicua oboritur. Quum autem retrò ad vertebrae, & in carnes defluerit, hydrops fit. Id quod ex hoc cognoscere datur. Sicca enim anteriores partes sunt, caput videlicet, & nares, ac oculi: & oculis amplius hebetudo accedit, fiuntque cum virore pallidi, itémque reliquum corpus, & nihil expuit homo, etiam si multum fluat. Fluxus enim per mediâ carnem retrò fluens, & ab anteriore auersus, anteriores partes siccas facit, posteriorum verò carnem irrigat, & magis eam quæ intus est ad ventrem, quàm quæ foris est ad nasum. Et propterea corpus foris magis solidum est, quàm intus, & angustiores meatus ac foramina habet. Quare sanè quum tenuia sint foramina, constringuntur, ipsaque sibi ipsis medentur, & fluxus nullus hac transire potest. Intus verò foramina ampliora sunt, & intermedia tenuiora habent, fluxus verò utpote ab altioribus procedens, & tenuia impedimenta contra se habens, influit & carnes humiditate replet. Sed & humiditas à cibis in idem procedens corrumpitur, corrupta autem ipsa præ ammixtione, & simul cum ipsa ea quæ à capite defluit, corpus nutriunt. Carnes verò multo humore nutritæ, & morbofo augescētes, hydrope plenæ sunt. Si autem modicus fluxus fuerit, coxendicum & articularum diuturnam affectionē facit, ubi fluere cessauerit. Nam ut modicus, & undique ab omnibus fortioribus depulsus, ad articulos refugiū facit. Fiunt præ-

Septē fluxio-
ris descen-
sus.

Biliofi ma-
gis lassitu-
dine affli-
guntur.
Purulent.
Tabidi.

Hydrops.

k 2 terea

Hippocratis Liber

terea articulorum ac coxëdicum affectiones, à talibus mor- **D**
bis sanatis, quum morbum quidem efficiens sanatur, in car-
ne verò quid relictum fuerit, cui non sit exitus, neque rursus
intrò, neque foras, sed ad cutem egressum tuberculum uti-
que fecerit, fugit autem in id quod cedit, articulos videli-
cet, & aut articulorum, aut coxendicum affectiones inducit.

**Cum nares
tument.**

Si porro intumuerint nares, & pituita plenæ fuerint, at-
que ea compacta, oportet pituitam compactam ac congela-
tam attenuare aut fomentis, aut medicamento, & non auer-
tere. Si enim fluxus auersus aliò procedet, omnino maiore

**Cum aures
fluxio pe-
tit.**

morbum faciet. Quum verò in aures fluxerit, primùm do-
lorem exhibet, violenter enim procedit: dolorem autem ex-
hibet, donec in fistulam redactus fuerit. Vbi autē fluere con- **E**
fueuerit, non ampliùs dolorem facit. Ei verò quem dolor af-
fligit medicamentū natura calidum, tepidum factum & ne-

**Cucurbitu
la quo loco
in hoc dan-
da.**

topo dilutum, infundendum est, & retrò cucurbita medica
affigenda, si sinistra auris doluerit, ad dextram, sin dextra, ad
sinistram, non autem scarificando pertundere oportet, sed
ut trahat solum sinenda est. Si verò per hæc dolor non sede-

Quæ potio

tur, frigefacientia à natura frigida infundantur, & medica-
mentum potandum præbeatur, quòd secessum deorsum fa-
ciat, sursum autem non, quandoquidem vomitus non auxi-
liatur: & de cætero frigidis vtendum est, & semper non sa-
nātem variare oportet modum, & si quidem peius reddi-
derit malum, ad contrarium te conuerte, si verò ad sanita-
tem tendat, omnino nihil ab his quæ adhibentur auferre **F**
oportet, neque quicquam aliud addere aut apponere. Si ve-
rò iam in fistulam redactus fuerit, & multa purulēta fanies
fluxerit, quæ graueolens sit, sic facere oportet. Spongiam
ficcante quopiam sicco medicamento imbue, & in aurem
quā penitissimè inde, & in nares purgatoriū medicamen-
tum mitte, quo ea quæ prius in aures fluebant, in nares ferā-
tur, & non id quod morbosum est in caput rursus recedat.

**Cum oculi
fluore ve-
rantur.**

Cæterum vbi in oculos fluxio processerit, oculi inflam-
mantur & tument, Sic autem affectum hominem medica-
mento liquido, sicco inspersili curare oportet. Si verò sta-
tim inflammati fuerint, nihil omnino illine, sed aut fortissi-
mo quā infimè vrito, aut alio quopiam aluum subducēte
medicamento attenuato, vitando ne vomitum facias. Si ve-

rò

A rō velut lapilli subtercurrerint, medicamentū illines quod plurimam lachrymam ducere potest, & reliquū corpus humectabis ac tumidum facies, quo oculi humidiores fiant ac colluantur, vt lachrymam adstrictam ac compactam decurrere facias. Quum autē in oculos paulatim fluxerit, & pruritum fecerit, sic affectum molli medicamēto illines, quod siccare potest. simulq; modicā lachrymam ducere, & ad nares medicamentum adhibebis, aut singulis diebus, aut alternis eodem vtens. Sit autem tale medicamentum, quod non plus quā acetabulum per nares deducat, idque paulatim: quod verò oculis adhibetur resiccet, vt quod oculorum pharma-

Profluuiū
oculorum.

B cum resiccarit ac obstruxerit, id ipsum ad nares feratur.

Medicamenta caput purgantia, quæ quidem fortia sunt, à toto capite ducunt, quæ verò debilia, ab oculis & hinc à vicinis naso partibus. Si autem à carne & osse, mucō inter os & carnem subsistente, fluxus ad oculos fiat, ex hoc manifestum fit quod inde profluit. Cutis in capite compressa cedit, & vlcera in capite enascuntur, & oculi lachrymantur, & palpebræ nō exulcerantur, nec mordax est fluxus, nec visum hebetat, sed homo ipse acutius videt. Fluxus enim non est salsus, vtpote non de cerebro, sed magis mucosus. Hunc sic sanare oportet. Medicamento caput purgandum Medela. est non forti, & corpus attenuandum, & cibus & medicamentis infrà corpus subducentibus, donec attenuato corpore fluxus resiccet, aut medicamento in nares indito emoueat. Verū ad ipsos oculos nullum pharmacum adhibendum est. Si verò neque sic sanus fiat, caput secare donec ad os perueneris oportet, nō superficialibus neque transuersis aut obliquis fissuris inculsis vsquequo ad os ipsum pertigeris, frequenter autē secare oportet, vt compactus humor citius prodeat per vlcera effluens, & simul vt frequentes sectiones, extensionem carnis ad os faciant. Sic mederi oportet, si huic hoc modo res succedat. Si verò hæc non comoda fuerint, & fluxus non eluitur, vt elutus acutè cernere faciat, semper ab incumbente oculi magis splendescentes fiunt, & acutus visus hominis extinguitur. Si in visum, in humorē purū cruentus aliquis humor ingreditur, huic visus intra oculum non rotundus esse apparet, propterea quod in quocunque inest cruentus humor, id ipsum non ap-

Cum ful-
gent oculi.

k 3

paret

Hippocratis Liber

Medela.

**Tumor o-
culorum.**

**Peripneu-
monia ,
pleuritidq;
quæ diffi-
cili.**

Suppurati.

paret. huic itaque deficit ut visus rotundus appareat, & ante oculos aliqua moveri ipsi videtur, & nihil reuera videt. Huius venas visum prementes exurere oportet, quæ videlicet semper pullant, & inter aurem ac tempora consistunt: & ubi has obturaueris, oculis pharmaca quæ humectant adhibe, & lachrymam quàm plurimam prolecta, quo id quod in oculis compactum est, & morbum facit, eluatur. Si verò oculus rumpatur, mollibus medicamentis & acerbis utendum est, ut vlcus adstrictum in angustum coeat, & cicatrix tenuis fiat. Si autem adhuc humoribus plenus fuerit, lachrymare oculo conducit. At verò quum in thoracem fluxerit, & bilis fuerit, ex hoc manifestum fit. dolor lateris mollitudinem occupat, & clauiculam eiusdem partis, & febris adest, & lingua supernè pallida ac viridis fit, & excreat compacta. huius morbi periculum septima aut nona die instat.

Alia bilis. Quum ambo latera doluerint, reliqua autem similia velut in priore fuerint. Hæc quidem peripneumonia est. Illa verò pleuritis. Hæ autem propterea fiunt.

Quum in pulmonem fluxerit ex capite, per guttur, & aortas appellatas appendentes partes pulmonis, pulmo tantum natura rarus & siccus, trahit in se humorem quantum eius capere potest, & ubi influxerit maior fit: & ubi quidem in totum fluxerit, extremitas eius maior reddita utrunque latus contingit, & peripneumoniam pulmonis appellatum morbum, facit. quum verò alterum tantum, pleuritis id est costalis morbus fit. Peripneumonia multò periculosior est, & dolores multò fortiores sunt, qui ad laterum mollitudinem & ad clauiculas tendunt, & lingua multò viridior ac pallidior, & fauces præ fluxione dolent, & lassitudo fortis occupat, & spiritus sexta aut septima die corripit. hunc si non septima die febris dimiserit, moritur aut suffocatur, aut utrunque. Si verò nona die, duabus diebus interpositis, corripiat, ut plurimum etiam hic aut moritur, aut suppuratus euadit. Si verò duodecima die, suppuratus fit. Si quarta & decima, sanus fit. Et quicumque præ peripneumonia aut pleuritide suppurati fiunt, non moriuntur, sed sani fiunt. Suppurati ut plurimum fiunt, quum fluxus in idem velut in bile contingit, sed in bile quidem multum defluit, & ubi defluxit sedatur. Suppuratis verò minus defluit, & non sedatur.

Fiunt

- A** Fiunt etiam suppurati, quum minus excreant quàm influit in pulmonem. Hoc enim quod in pulmone cōsistit, & quod influit, pus fit. Pus autē in pulmone & in thorace consistens ac congregatū, vlcerat & putrefacit, & postquam exulcerata fuerint, ab vlcerato influit, & quum excreat caput simul cōcūsum magis fluit, simulq; ex vlcerato in thorace ac pulmone magis fluit, & vlcera agitata refringuntur, vt etiam si fluxus à capite cesset, is qui ab ipsis vlceribus venit sufficiens sit morbum facere. Fit præterea etiā ab vlcere suppuratus, & leuior hic morbus existit. Fit etiā extra pulmonem, maxime quidem à ruptura, & vbi caro cōtusa fuerit. Iuxta hāc enim pus congregatur, & congregatū fluctuat, si quis corpus concutiat, & strepitum facit, & hæc vruntur. **Tabes.**
- B** fit quum in idem, velut in suppurato, fluxio fit per guttur, & appendentes pulmonis partes, appellatas aortas, quæ pulmonem & guttur cōtinent ac coniungunt. Fluit autē in pulmonem frequenter & paulatim, & humiditatē in pulmone non multā facit. Resiccātū enim id quod influit, & in gutture compactum, vtpote quod nō eluitur, sed paulatim influit ac detinetur, tussim excitat, & in aortis id quod influit detentum, vtpote quum angusta foramina aortæ habeāt, angustum spiritui locū exhibet, & talem spiritū habere facit, qui velut defectus semper respirare concupiscit. Et in pulmone velut nō vehementer humido existente, pruritus contingit. Quum verò multū de capite fluxerit, pruritus in pulmone non fit. Multum enim est quod in ipsum influit, & suppurati ex his tabidis siue phthificis Græcè appellatis fiunt, vbi corpus humectius factum fuerit, & contrā vbi siccus fuerit factum, ex suppuratis tabidi. Suppurati hoc modo cognoscuntur. Lateris mollitudinē à principio dolor occupat. Quum verò iam pus collectum est, & dolor similiter habet, & tussis fit, & pus excreat, & spiritus corripit. Si verò nondum erupit pus, in lateris mollitudine concutitur, & velut in vtriculo strepitum facit. Si verò horū nihil adsit, suppuratus autē sit, ex his cōiectare oportet. Spiritum multum habet, subraucosusque loquitur, & pedes ad gēua intumescunt, magis autē ab ea lateris mollitudinis parte, in quā pus est, & thorax concuruatus est, & membrorū dissolutio fit, & sudor per totum corpus diffluit, & aliquando sibi ipsi videtur calidus esse, ali-
- Pus intus
quid fa-
ciat.

Hippocratis Liber

Tabes spi-
nea.

Pleuritidis
curatio.

Acetū mul-
sum qui-
bus detur.

Purulento
rum mede-
la.

quando frigidus, & vngues circumtensi sunt, & aluus calida **D**
fit. Ex his suppuratos cognoscere oportet. Porro quum re-
tro in spinā fluxio processerit, huic tabes fit eiusmodi. Lum-
bos dolet, & anteriores capitis partes vacuæ videntur ipsi
esse. Bilis autem periculosa est, si icterus siue regius morbus
in oculis accedat, & in vnguibus liuiditas si fiat. & si corpus
vlcera habeat, & partes circa vlcera liuidæ sint, & quum su-
dor nō toto corpore erumpit, sed vna aliqua corporis parte,
& quum febre adhuc existente excreat ager pallidū viride,
aut si dum adhuc in pulmone inest pallidum viride, excrea-
tio cesset. Sic autē quum inest, & non inest, cognoscere oportet. **E**
Quum inest, in faucibus respirantis strepit, & spiritus
periculosus est, & singultus adest, & febris discedit, excrea-
tione adhuc in pulmone hærente, & aluus debili iam existen-
ti secessum facit. Hæc pleuritidis & peripneumoniæ pericu-
losa indicia existunt. Cæterum pleuritidem hoc modo cura-
re oportet. Febris sedanda nō est per septem dies. Potu vten-
dum aut aceto mulso, aut aceto & aqua: hæc autē quàm plu-
rima offerre oportet, quo humectatio fiat, eaque facta ex-
creationem faciat: & dolor sedandus est calfactoriis medi-
camentis, & absorbendum dandum est quicquid excreatio-
nem facit, & balneis vtendum quarta die, quinta autem &
sexta oleum illinendum est. Septima lauandum est, si febris
dimittere non velit, quo præ balneo sudor contingat. Insu-
perque & quinta & sexta fortissimis vtendū est excreato-
riis medicamentis, quo septimam diem quàm facilimè tran- **F**
figat. Si verò neque septima die febris cesset, nona cessabit,
si nō aliud quid periculosum accedat. Postquam autem fe-
bris dimiserit, sorbitiones quàm debilissimæ offerantur. Si
verò euacuatio oborietur, si quidem iuuenile adhuc est cor-
pus, potus auferendi sunt. Si verò febris dimisit, triticeis sor-
bitionibus vtaris, Et eodem modo peripneumoniā curato.
At verò suppuratis, caput purgare oportet non fortibus me-
dicamentis, sed paulatim auertere in nares, & simul eduliis
ventrem subducentibus vti. Et quum principium morbi
nondum est, sed eò fluxus vertitur ac vergit, excreationem
facere, & tussim excitare, & medicamentis infusilibus in na-
res vti, & cibis simul ingestis. Quum autem excreationem
facere oportet, pluribus cibis & salis ac pinguibus vtendum
est, &

A est, & vino austero, & quum sic habet tussis inducenda. Tabidos item eodē modo quod ad reliqua attinet curabis, præterquam quòd cibi nō multi simul ingerēdi sunt, & obsonia non plura quàm cibaria frumētacea, & vino inter edendum vtendum est aquoso, vt ne calfaciat, & corpori debili existenti caliditatem exhibeat, & simul ambo calfaciant in eodem tempore, & caliditate multū fluxum inducāt. Quum porrò per gulam fluxus in ventrē processerit, morbus infra sit, aliquando etiam supernè. Huic si quidem in ventre dolor inerit, subducendus est primū medicamento aut succo, deinde pharmaco fortiore vtendū est, cibis verò aluum subducentibus, donec dolor perseueret. Vbi verò dolor sedetur, cibis validioribus vtatur. Eodem modo vbi morbus multos dies hæserit curabis. Si verò debilis fuerit, & præ imbecillitate hæc offerri non possint: primū quidē ptisanæ succo per clysterem infuso, alius eluenda est, post vbi per hunc purgaris, aliquo ex adstringentium numero. Quum autem retrò in carnē iuxta vertebra fluxus illapsus hydropē fecerit, sic mederi oportet. Caro in collo inter venas cruitis tribus vratur, & vbi vlsio, cōstringatur, & cicatrices quàm tenuissimæ inducantur, & vbi fluxum obturaris, medicamentum in nares adhibe, vt eò vertatur, & aliud rursus donec auertatur. & anteriores quidē capitis partes calfacito, posteriores verò perfrigerato. Et postquam anterioribus capitis partibus excalfactus fuerit, cibos edat quàm pituitosissimos, ac minimè ventrem subducentes, quo fluxionum meatus in anteriore capitis parte quàm maximè dilatētur. Postea vbi obturaris & auerteris influxionem, si quid prius quàm curaris fluxum, in corpus peruenerit, sic mederi oportet. Si quidem magis ad cutem secesserit, externis partibus fomētum adhibebis. Si verò intrò ad ventrē, foris autē non cōspicuum sit, medicamentū bibendum dabis. Si verò in vtranque partem, ab vtraque detrahes. Verū hoc studio habere oportet, vt proximū exitum facias, siue infernè siue supernè, aut etiam alia aliqua corporis parte, vbi exitus sunt. Quum coxendicum morbus à fluxione fiat, cucurbitā medicam affigere oportet, & foras trahere, & nō scarificando pertundere. & calfactoriis medicamētis in potu exhiberis intus calfacere, quo exitus fiat tum foras ad cutem per cucurbitæ tractionem.

Hydrops
quī cure-
tur.

Ichiados
medela.

k s

nem

Hippocratis Liber

Tabes spi-
nae & eius
medela.

Lien turgi-
dus.

Medela.

Hydropis
curatio an-
ceps.
Pueri hy-
dropici qui
curentur.

Pleuritis
sicca.

nem tum intus ad ventrē per caliditatem. Nā quum obtura- D
tus fuerit fluxus, & non habeat quò iter faciat, viam ad arti-
culos facit, & in id quod cedit influit, & sic coxēdicum mor-
bum inducit. Tabes ex fluxione retrorsum. Qui hac affe-
ctus est, ei caput est purgandum debili medicamento, donec
fluxus auertatur, diæta autem vtēre velut in tabe superiore.
Medicamētum potandū præbe Elateriū deorsum purgans,
& infernē aluum lacte infuso elue, de cætero fomentis vtēre.
Quum splen præ febre magnus factus fuerit, fit autem
quum corpus attenuatur. Ex iisdem enim & splen florescit,
& corpus cōtabescit. Quum autem corpus tenuē fuerit, &
splen floruerit, & omentum simul cū corpore attenuatū fue- E
rit pinguitudo in omento colliquescit. Vbi verò vasa pin-
gitudine vacua facta fuerint, & à splene florente ac auge-
cente in omentum defluerit, vtpote vicinū valde existens,
& vt vasa habens eaque vacua, excipit, & vbi morbus semel
in corpore factus fuerit, ad id quod est morbosum vertitur,
nisi quis probè disponat ac curet. Nā etiam si quis bene tra-
ctet, periculo non vacat. Hunc sic sanare oportet. Medicamē-
ta in potu exhibenda sunt quæ aquam purgent, & edulia
quàm pituitosissima offerenda. Si verò neque sic leuior fiat
inurendæ sunt crustæ quàm tenuissimæ, & quàm maximè in
superficie quo aquam cōtinere possis, circum circa vmbili-
cum, & vnā in vmbilicū, & emittere singulis diebus. Quum
enim morbus periculosissimus sit, in his periclitari oportet.
Si enim successerit, sanum facies: sin minus, quod etiam aliàs F
futurum erat, id ipsum perpetitur. Cæterum in puero hydro-
pem sic curare oportet. Partes tumidæ & aqua plenæ ape-
riendæ sunt scalpello, & frequenter ac parū educendum est.
Educendum autē est à singulis corporis partibus, & fomētis
vtendum, & semper locum apertum vnde eduxeris calfacto-
rio medicamento illines. Pleuritis sicca citra fluxum fit,
quum pulmo valde exsiccatus fuerit præ siti necessaria. Pul-
mo enim natura ficcus existens, vbi amplius quid quàm pro
natura ficcatus fuerit, gracilis fit, & impotens redditus, & ad
latus præ impotentia reclinatus, latus cōtingit, & postquam
contigerit ipsum humidū existens, & cohæret & adglutina-
tur, & pleuritidem hoc est lateris morbum facit. Tūc verò &
dolor fit in latere, & clauicula, & febris, & album exsereat.
hunc

A hunc multis potibus curare oportet, & lauare, & doloris medicamentum præbere, & alia quæ excreationem faciunt. hic in septē diebus sanus fit, & morbus minimè periculosus est, & cibos præbere nō oportet. Febres porro propterea fiunt, quum corpore superinflammato carnes intumuerint, & pituita ac bilis cōclusa quieuerint, & neque refrigeretur quicquàm, neque exeat, neque moueatur, neq; aliud quid subeat. Quum itaq; lassitudo occuparit & febris ac repletio, lauare multa aqua oportet, & oleo illinere, & quàm maximè calfacere, quo caliditas aperto corpore, præ sudore egrediatur. cōsequenter autem hæc faciēda sunt per tres, aut quatuor dies: & si non sedetur ac cesset, pharmacum in potu exhibendum.

B est quod bilem educat, & febris perfrigeranda est, præterquā si quartana existat. Medicamentū tamen donec corpus floridum est ne propinato, non enim vacuantur, nisi parum, utpote corpore turgente. Quum autem gracilis ac macilentus fuerit, tunc bibendum exhibe, & euacuabitur. Febrienti cibum ne offeras, neque sorbitionibus subitus aluum ducas. In potu dabis aquam calidam, & aquā mulsam, & acetum cum aqua. hæc autem quàm plurima bibat. Si enim non frigidus ingressus fuerit potus calidus existens ac manens, ex corpore ægroto detrahet, & vel per vrinam eiiciet, vel exsudabit. Vn diquaque autem apertum, & respirans, ac motum corpus, id quod conducibile est, faciet. Quum verò gracilem existentem febris vrat, manifestum est quod non propter corporis tumorem febris occupet, & si non cesset, nutrire oportet ac tumidum facere, & si neque sic conducatur, palàm est quod nō oportuerit febrem inducere. Hunc itaque medicamentum potare oportet quod educat, qua parte febris magis hæret, siue supernè siue infernè, & si quidem supernè hæreat, supernè, si infernè, infernè. Nihil autē minus oportet etiam debiles fortia medicamenta potare, sed similiter: aut solū sic, fortibus quidem forte, debilibus verò debile exhibeas. Ardore verò potionibus & sorbitionibus, quemadmodum febrem frigefactorio medicamēto exoluere oportet, cammaro videlicet, aut alio quopiam huiuscemodi: & si nausēā contrahat à frigefactorio, calfactoriis vttere consequenter. Vbi verò non cesset, frigefactoriis rursum vttere. Icterus siue regium morbū sic curare oportet. Quum susceperis nutritio, &

Cum febris
vexat quid
agas.

Quæ medi-
camēta sin-
gulis dāda.

Morbus
regius quā
curetur.

balneis,

Hippocratis Liber

**Cucume-
ris sylue-
stris radix.**

**Ferinum
vltus.**

Angina.

balneis, & pinguefacientibus, potibusque ac cibis humectato, per tres aut quatuor dies. Postquam autem humectatum fuerit corpus, purgato & reficcato ipsum, pinguitudinemque; derepente exhausto, & vndiquaque si possibile sit medicamentum adhibens, humiditatem educito, ad caput verò purgatorio debili vitior: & vrinam ciente bibenda dato, eaque ante cibos hoc tempore quo turbatam humiditatem purgaueris in potu præbe, ne ab eo tempore corpus nutriatur. Quum verò attenuatū fuerit, etiam balneis purgato, & confusa cucumeris sylvestris radice, eaque in aquam coniecta, inde lauato. Cæterum medicamenta bilem ducētia ne propinato, ne corpus magis conturbes. Vbi verò siccū fuerit id quod conturbatum fuit, nutrito, nullo aluum subducente medicamēto, neque vrinam ciente vtens, sed vino vinoso, & his quæ rubicundiores hominē faciunt. Si verò viridis ac luteus sit, rursus exhausto, nequaquam verò ficcato, vt ne is color stabilis reddatur. Vltus ferinum in corpus propterea venit. Postquam caro tumida & inflammata circum circa fuerit, & margines vltus magni extiterint, & vltus ipsum humidū, & in vlcere sanies reficcata inerit, aut vltus constrictum fuerit. Sanies computrefaciens ab vlcere defluens, foras prodire à constricto ad carnem vlcere prohibetur. Caro autem suscipit, vtpote eleuata existens ab inflammatione, & quum in ipsam peruenerit sanies subterfluens, putrefacit & attollit. Hunc medicamentis humectantibus ipsum vltus illinere oportet, vt ex humectato vlcere fluxus foras effluat, & non subter carnem. Influentia etiam in vltus frigefacientibus, pharmacis illinēda sunt, quo perfrigerata caro existat, & non dirupta rursus fluxionem immittat. Sed & alia vlcera frigefacientibus oblinenda sunt, & super ipsa humectantia imponenda. Angina quam cynanchen Græci vocant à sanguine fit, quum sanguis in venis quæ in collo sunt cōpactus fuerit. Sic affectis à venis quæ in brachiis sunt, sanguinem detrahes, & simul aluum infernè subduces, quò id quod morbum exhibet, detrahatur. Lingua quoque quum magna vlcera habuerit, similiter curanda est. Morbos à principio curare oportet, & si quidem à fluxionibus fiunt, primū fluxiones sedare. si verò ab alia causa, principium morbi sedare ac curare: deinde id quod influxit, si quidem multum fuerit, educere,

A educere, sin modicum, per diatam moderari ac componere.

Capitis fracturæ. Si quidem os fractum fuerit ac contritum, periculo vacat, & curare oportet hunc humectantibus medicamentis. Si verò rumpatur, & fissura fiat, periculosum est. Huic ferram adhibere oportet, ne in ossis scissuram sanies influens membranam cerebri putrefaciat, Nam ut per angustum intrans, non autem exiens affligit, & furere hominem facit. Huic itaque ferram adhibere oportet, ut sanies exitum habeat, non solum ingressum, ampla ferratura facta. Medicamentis autem utendum quæ humorem in sese trahunt, & lauandum. Febricitanti caput ne purgato, ut ne furiosus fiat. Calfaciunt enim caput pharma purgatiua, & sanè ad caliditatem febrilem accedens ea quæ in medicamento est, insaniam facit. Ex quacunque causa malè affligente quis atram bilem reuomuerit, moritur qui vulnus habet. Et qui ab euacuatione detinetur, & debilis est, & tenuis existens derepente siccus sublidit, moritur. Quum à caliditate detento, vlcuscula eruperint debili existenti circum circa liuida, moritur. Quum à morbo quopiam detento, debili iam existenti, liuida vlcuscula enata fuerint, mortale. Quum quis à medicamento potu superagrotarit, & infernè ac supernè ab ipso secesserit, vinū sorbeat primum quidem dilutum, deinde meracum frequenter, & sanabitur.

B Medicamentum autem neque euacuatium, neque vomitorium sumat. Bilis ubi sua sponte eruperit, aut infernè, aut **C** supernè, difficilius sedatur. Quæ enim sponte procedit, præ violentia corpori facta impellitur. Si verò à medicamento fluat, non à gentilitatis cognatione violatur. Quum susceperis vinosum & vomentem, vomitum ne sedato. Vomitus enim euacuationem sedat, facilius autem vomitus postea sedabitur. Si verò debilis fuerit qui hæc patitur, somnificum medicamentum à vomitu præbebis. Sanguis quum morbum facit, dolorem exhibet, Pituita autem gravitatē ut plurimum. Morbum si quis non cognoscat, medicamentum bibendum præbeat non forte. Si itaque leuior inde fiat, demonstrata via est, quòd gracilitatem inducēdo curandus est. Si verò non leuior reddatur, sed peius habeat, contraria facienda sunt. Si nō profuerit gracilem facere, tumidum facere conducet, & frequenter permutare, ita ut hoc consilio utaris.

Quæ vulnera mala.

Quod medicamentum non dandum.

Quæ medicamenta danda.

Hippocratis Liber

Medica ars
& exercita-
toria gy-
mnicave
cur con-
traria.

Capitis flu-
xio.
Morbi ve-
rusti & re-
centes quī
curentur.

Mori sta-
tuētes quī
cures.
Conuulsio
nismedela.

Ruptura.

Manus pe-
desque si
torquean-
tur, quid
portēdant.

ris. Si quis in morbis quid permutaturus est, forti quidem D
 ægroto, debili autem morbo, tunc quidem confidenter for-
 tiore quàm morbus est, medicamento vtendum est. Nam
 etiam si quid de sano abducatur vna cū debili ac ægroto, nul-
 lum detrimentum est. Si verò morbum fortiorem, ægrotum
 autem debilem acceperis, debilibus pharmacis curabis, quæ
 ipsum morbum superent & abducant, verum ægrotū nihilo
 debiliorem reddant. Ars exercitandi corpora, & Medicina
 contrarię sunt. Ars enim exercēdi corpora (gymnastice Græ-
 cis appellata) non opus habet permutatione, sed Medicina.
 Sano enim non auxiliatur transmutatio ex præsenti statu,
 verum ægroto. Morbi quicunque vlcera sunt, & super reli-
 quum corpus eminent, eos simul cū medicamentis etiam E
 fame curare oportet. Fluxione ex capite fluente vomitus con-
 ducit. Antiqui morbi difficilius curantur quàm recentes,
 verum morbos antiquos primū recentes facere oportet.
 Vlcus callosum factum, eiectā primū duritia per putrefa-
 ctorium medicamentū, constringere deinde oportet. Phar-
 maca quę tumefacere maximè solent, ea pura vlcera adstrin-
 gunt. Quæ verò attenuant, ea purgant. Si verò quis constri-
 gat vlcera nondum matura, corpus ægrotum nutrit quòd vl-
 cus habuerit. Et si quidem adstringere oporteat vlcus ac
 implere, tumefacere prodest, etiam si in capite carnem velis.
 Renutrita enim à cibis caro, propulsat eam quæ à medica-
 mento putrefacta est, & simul cū natura debellat. Verum
 eleuatam aut leuem carnē, cibis gracilem reddere oportet. F
 Tristes anxios & ægrotos, ac se strangulare volentes, man-
 dragoræ radice manē in potu data minore pondere quàm
 quod insanire facit, curabis. Conuulsioni sic mederi opor-
 tet. Ignis ab vtraque lecti parte succendatur, & mandragorę
 radix in potu præbeatur minore pondere quàm quod insa-
 niam facit. Et ad tendines posteriores sacculi calidi impo-
 nantur. A conuulsione si febris inuaserit, sedatur eadem die,
 aut sequenti, aut omnino tertia. A ruptura febris non corri-
 pit ampliùs quàm tres aut quatuor dies. Si verò corripiat, &
 quis putat se à ruptura habere, ab alia sanè quapiā causa cor-
 ripitur, & non oportet ipsam velut à ruptura curare. Quum
 homo manibus ac pedibus distentus ac tortus fuerit, insaniā
 sibi ipsi facit. Venam porrò sic vrere conuenit commodam
 ad

A ad morbum, ex quocunque tandem quis agrotarit. Si vltus fuerit homo, & fluxerit sanguis, ita vt hoc non periculosum sit ipsi, ambo hæc facere licet. Si verò percusseris ipsam in dolore, cuius gratia vrebatur, non coalescit, verum fluxui prodest. Si enim perusta fuerit, non fluit. Nam postquã perusta est, extremitas vtræque venæ recurrit, qua parte perusta est, & exarescit. Si verò quid relictum fuerit, præ relicto perfluente fluxum humectatur. At si sanguis ex vena fluit, pertransuersum perurito. Si verò non cesset, ad hæc supra ac infra vtrinque diffecato, quo sanguinis fluxus auertatur. Diductum enim facilius est medicamēto sedare, quàm coaceruatum. Doloris in capite gratia, sanguinẽ de venis detrahit.

B Si verò nõ sedetur, & diurnus sit, perure venas, & sanus euadit. Si verò caput purgaueris, magis affliges. Medicinam citò discere non est possibile, propterea quod impossibile est statam ac certam doctrinã in ipsa fieri, velut (verbi gratia)

Qui scribere didicit, iuxta vnum modum, quem omnes docent, nouit, & scientes omnes similiter nouerunt, propterea quod idem & similiter factum, & nunc, & non nunc, non potest fieri contrariũ, sed semper exactẽ simile est, & non opus habet occasione. Medicina verò & nunc, & statim, non idem facit, & ad eundem contraria facit, & hæc etiam contraria si-

Capitis do-
loris mede-
la.

Medicina
cur penitus
non sciatur.

C biip̃is. Primum aluũ subducentia non semper hoc faciunt, & aluum subducentia vtrunque faciunt. Fortassis autem neque sic se habent aluum subducentia, velut aluum sistenti-
bus contraria. Restitante enim aluo, propter vehementem stabilitatem corpus intumescit, pituita in ventrem perueniente, sic stabilitas secessum facit. Vbi enim pituita in ventrem ingressa fuerit, euacuatio cõtingit. Insuper verò aluum subducentia ex natura, stabilitatem faciunt in ventre, si quidem non subducentia feceris, Si autem exoluatur & humectetur id quod morbum facit, postquam exolutum fuerit, sanus euadit. Et sic ventrem sistencia, subducentibus stabilitatem ventris faciunt, & vicissim subducentia ventrem, sistenti-
bus. Eodem modo res se habet circa rubicundos & palli-
dos. Nam & pituitosa ac tumefacientia & pallidos faciunt, & boni coloris, Itẽque attenuantia. vtriusque autem medicamentum sunt contraria contrario. Verbi causa, Quum intumuerit pallidus existens, exoluitur sanẽ si quod medica-
mentum

Pallor.

mentum attenuans adhibitum fuerit. atque hic tumentis at- **D**
 tenuans opitulatur. Rursus autem quod aliquādo vtilitatem
 coepit, nunc hic opitulanti opitulatur, quum sanè præ graci-
 litate decolor & pallidus factus fuerit. Si quis enim pituito-
 sum ac tumefaciens medicamentum exhibuerit, pallor seda-
 tur. Insuper verò etiam dolor, & propter frigiditatem fit,
 & propter caliditatem, & propter valde exuperans, & pro-
 pter imminutum. Et in perfrigeratis quidem natura extra
 corpus ad cutem, propter calfaciens valde, dolor fit. In cali-
 dis verò natura, propter frigidum. Et in siccis natura, si hu-
 mectentur. & in humidis natura, si resiccentur. In singulis e-
 nim quorum natura permutatur ac corrūpitur dolores fiūt. **E**
 Sananturq; dolores contrariis, idq; etiam vnicuique morbo
 proprium est. Nam in calidis natura propter frigiditatem
 ægrotantibus, dolores calefiunt, & reliqua iuxta hanc ratio-
 nem fiunt. Alius porrò modus hic est, per similia morbus
 fit, & per similia adhibita ex morbo sanantur. Velut, vrinæ
 stillicidium idem facit, si nō sit, & si sit idem sedat. Et tussis
 eodem modo, velut vrinæ stillicidiū, ab iisdem fit & sedatur.
 Alius rursus modus hic est. Febris quæ propter tumefactio-
 nem ex pituita fit, aliquando quidem ab iisdem fit, & seda-
 tur, aliquando autem à contrariis. Aliquando enim si quis
 vult aqua calida lauare, & multum potum exhibere, sanus
 æger fit, & febris quæ propter tumefactionem facta est, pitui-
 tolis ac tumefactionem facientibus oblatis, & adhibitis sa- **F**
 nescit. Et si quis vult medicamentū bibendum dare, aluum
 subducens & vomitorium eodem modo & à facientibus se-
 datur, & sedantibus fit. Nam si quis homini vomenti, aquā
 multam bibendam dare velit, eluentur ea propter quæ vo-
 mit, vnā cum vomitu. Et sic quidem per vomitum vomitus
 sedatur. Rursus autem propterea quod sedatur, quia infernè
 procedere ipsi fecit, ex illo id quod intus est vomitum facit,
 & ambobus cōtrariis modis homo sanus fit. Et si quidem sic
 in omnibus haberet, stata sanè ac certa medicina esset. Ita
 alia quidem contrariis curare oportet, qualia tandem sint, &
 à qua causa fiant: alia verò similibus, qualia tandem sint, &
 à qua causa fiant. Huius autem rei causa corporis debilitas
 existit. Corpus enim à cibis æqualibus æqualiter nutritur, à
 corpore verò cibi superatur. Postquam verò plus aut minus
 in ipsum

Febris &
 vomitus
 medicamē
 ta non cer-
 ta.

Causa.

A in ipsum ingestum est, aut alia quæpiam transmutatio facta est, superatur, superant autem cibi. Et quum sanè superatur corpus ab his quæ ipsi offeruntur, florere hæc ipsa facit, & superant hæc simul corpus, & contraria ipsi faciunt. Et calida lauari, donec quidem corpus superat eius exhibitionem, florere corpus facit. Quum verò superatū fuerit, gracile corpus facit. Et conuiuari similiter vt lauari facit. Hæc enim donec superantur florere corpus faciunt. Vbi verò superauerint, & alui secessus & varia vitia inducunt. Quum autem id quod offertur, transmutatur, necesse est & id cui offertur, transmutare. Etenim corpus transmutatum parum efficax ac potens est, & ab omnibus offensiones percipit. Hoc autem faciunt,

Quæ corpus iuuent & contra.

B & aluum subducentia: & florere ipsum facientia, gracile corpus faciunt, & reliqua omnia contraria his facientia. At verò Medicina breuem occasionem habet: & qui hoc nouit, illa stata ac certa habet: & scit quæ consueta sint, & quæ non consueta, ad quæ cognoscenda non est occasio in medicina, & quod aluum subducentia, non subducentia sunt, & reliqua quod contraria sunt, & contrariissima non contrariissima. Occasio autem hæc est, vt cibos offeramus ea copia, quantam corpus cui offeruntur superare valeat. Nam si quis sic fecerit, omnino necesse cibum est aluum subducentem oblatum, subducentē esse, & pituitosum, pituitosum. Si igitur superauerit corpus ipsos cibos, neque morbus, neque contrarietas fit ex his quæ offeruntur, & hæc est occasio quam medicum nosse oportet. Quum verò occasionem supergressus fuerit, contrarium fit, & antequam ei excessum factum esse putant, consequens est vt cale scat. Donec enim corpus id quod oblatum est superauerit, corpus nutritur. Vbi verò hæc occasionem transmiserit, contrarium fit, nam attenuatur & gracilescit. Sed & alia omnia, & quæ tumefaciunt, donec quidem superauerit corpus, ampliùsque pro occasione offeruntur, etiam iuxta naturam suam singula faciunt, & pituitosa siue tumefacientia tumefaciunt. vbi verò occasionem transmiserint, contraria sunt. Medicamenta sunt omnia quæ præ sente in statum transmouent. Omnia autem fortiora transmouent. Licet autem si velis, medicamento transmouere, & rursus si velis, alimento ac cibo. Omnia verò ex præsentia statu transmouere, ægrotanti opitulatur. Si enim id quod morbum

Qualis medica ars.

Quando omnia suam naturam conseruant. Medicamenta quid faciunt.

facit

facit, non transmuteris, augetur. Medicamenta fortia à natura, in debilibus morbis dare non oportet, neque paucitate medicamenti, debilitas ipsius facienda est. Sed fortibus natura, fortibus pharmacis utendum est, debilibus verò, pharmacis non fortibus. Neque partiendum est medicamentum, sed singulis secundum naturam, debilibus quidem debilia à natura, fortibus verò morbis, fortis naturæ pharmaca exhibenda sunt. Cæterum morbi ea parte qua proximi sunt, educendi sunt, & qua parte singulis exitus quam proximus est extrahendi. Alium autem subducentia talia sunt, quæcunque lubrica & incisiva sunt, & quæcunque in calidis attenuantur. Vetus enim calidus est: & reliqua quæ salsuginosa sunt, & quæcunque ex talibus plurimum participant. Contra alium non subducentia, sed sistentia sunt, quæ flatum exhibent, humida enim resiccata flatum faciunt: & quæ adstringunt, & quæ à calore compacta sunt, & friabilia, & sicca.

Acida pituitosa.

Medicina quæ.

Fortuna in his parum facit.

Omnia autem quæ foris extenuant, intra corpus assumpta tumefactionem inducunt, eadem autem & ventrem sistentia, & pituitosa, ac tumefacientia existunt. Et quæ alium subducunt ac extenuant, cum calefacientibus eadem sunt. Insuper autem etiam acida pituitosa sunt. Omnia verò quæ frigefaciunt ea quæ in ventre sunt, talia alium subducunt, Item quæ frigida sunt, & quæ humida. Quum autem non alium subducentia fuerint, calefaciunt. Frigefaciunt autem & calida in ventrem assumpta, & citò secessum faciunt. Si verò secessum non faciant, calida in ventre existunt. Ex his quæcunque repletionem faciunt, maximè pituitosa sunt. Quæ verò plurima assumpta repletionem non faciunt alium subducunt. Medicina itaque mihi iam tota inuenta esse videtur, quæ sic habet & quæ docet singulas & consuetudines, & occasionem. Qui enim sic medicinam nouit, minimè fortunam respicit, aut expectat, sed & citra fortunam, & cum fortuna, rectè faciet. Constans enim ac firma est tota medicina, & doctrine optimæ in ipsa compositæ, minimè fortuna egere apparent. Nam fortuna sui iuris est, & nullius imperio subest, neque optantis est ad ipsam peruenire. Scientia verò imperata facere cogitur, & facile est ipsam feliciter assequi, si quis sciens uti velit. Deinde verò quid opus est Medicinæ fortuna? Si enim morborum medicamenta clara sunt & manifesta, velut equid

Aequidem arbitror, nō expectant sanē fortunam: ad sanandos morbos siquidem sunt medicamenta. Si verò cūm fortuna exhibere ipsa prodest, non magis medicamenta quā ea quæ non sunt medicamenta, vnā cūm fortuna adhibita sanos faciunt. Quicunque verò fortunam ex Medicina, aut alia quam artē expellit, dicitque eos qui probē rem aliquā sciūt fortuna non vtiis contrarium mihi iudicare videtur. Mihi enim soli hi fortunatē assequi, itēque infortunatē non assequi videntur, qui rectē quid, & malē facere sciunt. Fortunatē enim assequi, est rectē facere, hoc autem hi qui sciunt faciunt. Non assequi autem hoc est, si quis non sciat, hoc non

Medicamē
ta sine for-
tuna sanāt.

Quæ ad-
uersa vel se-
cunda for-
tuna huic
videatur.

B rectē faciat. Indoctus autem qui est quomodo fortunate assequi possit? Si quid enim etiam assequatur, non memorabilem sanē successum habebit. Qui enim non rectē quid facit, non fortunatē assequi poterit, quum reliqua quæ æquum est facere non faciat. Morbi muliebres. Vteri omnium morborum causæ sunt: hi enim vbi ex natura transmoti fuerint, morbos exhibent, siue ascenderint, siue descenderint. Et quū quidem vteri osculum suum non demittentes, & pudendi eminentias non contingentes, transmoti fuerint foras, leuissimus morbus est. Quum verò in anteriorem partē promoti fuerint, & osculum in pudendi eminentias ac labra immiserint, primū quidem ipso contactu dolorem vterus percipit ac exhibet: deinde obturatus, & velut operculo cōtectus, ex eo quòd pudendi eminentiis incumbit, fluxus non contingit, qui mensium nomine venit. Hic verò fluxus congregatus, tumorem ac dolorem exhibet. Et si quidem infrā descendens & auersus, in inguen se immiserit, dolorem exhibebit. Si verò sursum ascendens auersus & obturatus fuerit, etiam sic propter raritatem ac coarctationem dolorem exhibet. Quum verò propter hoc ægrotarit, coxendicum ac capitis dolorem facit Vbi verò vteri impleti intumuerint, nihil fluit, & pleni fiunt: quum autem pleni facti fuerint, coxendicæque contingunt, dolores exhibent, & in coxendices, & in inguen, & velut pilæ in ventre discurrunt, & caput dolore affligunt, modo altera ipsius parte, modo totum, prout contingit ipsi morbus. Hæc itaque sic curanda sunt.

Vteri om-
niū morbo-
rum causæ
feminiis.
Vteri mo-
lestiæ.

Si quidem descenderit solum, & illini possit, vtere quocūque libet ex graueolentium genere, aut cedro, aut alijs intri-

Medela.

Hippocratis Liber

to, myttoto Græcis appellato, aut aliquo alio ex grauitate & male olentium numero, eoque suffitum facito, & fomenta ne adhibeto, neque cibo neque potu vrinam ciente hoc tempore vititor, neque calida lauato. Si autem sursum ascenderit, & non auersa fuerit, medicamentis apposititiis bene olentibus, & quæ simul calfaciunt vtere. Velut sunt myrrha, aut vnguentum, aut aliud quoddam odoratum simulque calfactorium. Et his quidem subdititiis vteris, fomentum autem ex infernis ex vino adhibebis, & calida aqua lauabis, & vrinam cientibus vteris. Ex hoc autem manifestum fit auersa sit necne. Si enim sursum progressa auersa non fuerit, fluxus procedit. Si verò auersa sit, fluxus, menstrua appellata, non contingit. Hunc morbum fomento primum tali curare oportet. In vinum grossos immittito, ipsumque vinum calfacito, & cucurbitam circum osculum vasis in quo calefit addito, hoc modo: Cucurbitam per medium dissectam euacuato, & summitate ipsius modice rescissa, velut in vtriculis fieri solet, hanc ipsam vasi velut operculum circundato, quo odor per angustiam means ad vterum perferatur. Insuper autem & calida aqua fouere, & calfacientibus medicamentis subdititiis vti oportet. Calfacientia autem sunt ea quæ ducunt ex superius relatis, itemque hæc. Stercus bubulum, fel bubulum, myrrha, alumen, galbanum, & si quod aliud eiusmodi est. Plurimis etiam ipsarum per purgantia infernè medicamenta alius subducenda est, & per debilia quæ vomitum faciunt, ne euacuatio ex supereuacuatione fiat. Ceterum subdititias glandulas sic facere oportet, si fortes facere velis. Mel semicoctum facito, & ex præscriptis subdititiis pharmacis ea quæ valde efficacia sunt immittito, & ubi immiseris, glandulas formato instar earum quæ in sedem induntur, verum longas facito has ac tenues. Mulierem verò supinam reclinato, locis à pedibus lecti altius instratis, deinde apponito, & panniculo intecto, aut alia quadam re consimili calfacito, donec colliquecat. Si verò debiliorem glandulam subdere velis, in linteolum illigato. Sed & si humore pleni vteri osculum tumidum habuerint, & non fluxerint, fluxionem facere oportet, & subdititiis pharmacis sanare, itemque fomentis velut scriptum est, ita faciendo velut in priore fluxione suppressa. Quin & si in anteriorem partem proced

Calida appo-
posita.

A procedens vterus auersus fuerit, fluxionem facere oportet, velut in superiore fluxione suppressa. Quum verò fluxus nimius fuerit, neque calida aqua, neque alio quopiam calface-re oportet, neque vrinam cientibus vti, neque cibis aluum subducentibus. Lecti autem partes à pedibus altiores esse oportet, vt ne declinatio fluxui facilitatem præbeat. Vtere autē simul etiam subdititiis adstringentibus. Fluxiones por-rò quum confestim venerit purgatio statim subcruentæ fiunt, quum verò tardius prodierit, purulente. Et iunioribus subcruenta magis prodeunt. Seniores verò magis mucosa menstrua habent.

B H I P P O C R A T I S

COI LIBER DE AERE, A-

QVIS ET LOCIS, IANO

CORNARIO MEDICO

PHYSICO INTER-

P R E T E.



C

VICVNO VĒ artem medicam integrè ad-
sequi velit, primū quidem temporum an-
ni rationem habere debet, quantum poten-
tia quodlibet eorum valeat: nō enim simi-
le quicquam in illis existit, verū differunt
inuicem propter varias quæ in eis sūt mu-
tationes. Deinde ventōrum calidorūmq; & frigidorum, ma-
ximè qui ex his omnibus hominibus sunt cōmunes, & mox
qui in vnaquaque regione sunt indigenæ & proprii. Neque
verò negligentiorē se circa aquarum facultates cogno-
scendas exhibere conuenit. Quemadmodum enim gustu dif-
ferunt, & pondere ac statione, sic quoque virtute aliæ aliis
longè præstant. Quare si quis ad urbem sibi incognitā per-
ueniat, circūspicere oportet eius situm, quomodo scilicet
ad ventos, & solis exortus iaceat: non enim æquales vires
sunt, ad Septentrionem sitæ, & vergentis ad Austrum: neque
eius quæ solem exorientem, & que eundem occidentem

Quæ pro-
spicienda
sunt medi-
co.

Venti.

Situs vrbis

1 3

spēct

Hippocratis Liber

Aquarum qualitas. spectat. Hæc itaque diligenter oportet perscrutari, ac simul quo modo habeant circa eam aquæ: nū ne palustribus utantur & mollibus, aut duris & ex sublimi loco prolabantibus, & scaturientibus ex petris, siue salis, & crudis. Terra etiam ipsa consideranda, nudane sit & aquis carens, aut densa & aquosa & an concava sit & æstuosa, vel alta & frigida, hominum insuper diæta perquirenda, qua maximè capiatur. An bibuli sint & lurcones & ocio dediti, aut exercitiis variis vtentes, & tolerantes laborum, ciborumque plus adpetentes quàm poculorum. Ex his enim singula sunt inuestiganda. Nam qui hæc omnia probè, quantum fieri potest, cognouerit, aut horum plurima, eum non latere possunt quum in urbem etiam ignotam sibi peruenerit, neque morbi regioni peculiare & patrij, neque communis regionis natura, quæcunque tandem ea fuerit, ut non possit in cognoscendis morbis dubius hærere, aut errare sicubi ad morborum medicationem adhibeatur. Quæ ambo illis euenire solent, qui non prius prouidi hæc diligenter cognouerunt. Quare qui ea studiosè rimatus fuerit, vniuscuiusque temporis, ac anni futuri constitutionem prædicere poterit, qui videlicet morbi communi adfectione ciuitatem sint inuasuri tum æstate, tum hyeme, & quæcunque pericula vnicuique sint timenda ex diæta ac victus immutatione: quum enim tēporum mutationes, & astrorum ortus ac occasus obseruauerit, quemadmodum singula horum eueniant, prænosceat utique & de anno, qualis hic sit futurus: hoc nanque modo si quis rimatus fuerit ac præcognouerit temporum occasiones, maximè de singulis sciet, ut plurimùmque sanitatem adsequetur, & recta via procedet, non minima artis suæ gloria. Quod si cui hæc sublimiora videantur, is si ab hac sententia discedat, discet sanè non minimam partem conferre ad rem medicam ipsam Astronomiam, sed omnino plurimam, quū vnà cum temporibus & ventriculi in hominibus mutantur. Quomodo autem singula quæ diximus scrutari ac explorare oporteat, deinceps dicam manifestè. Quæcunque quidem ciuitas ad ventos sita est calidos, puto autem eos qui inter brumalem solis exortum itidèmq; occasum perflant, huic hi venti sunt peculiare. A Septentrionalibus autem ventis tuta ac protecta ea ciuitas existit. Aquæ verò eius multæ &

Aer & subsalsæ sunt, & necessario nõ sublimes, æstate quidem calidæ, hyeme frigidæ. Et quæ quidem vrbes bene sitæ sunt Quæ vr-
ad solem, & ad vêtos, & aquis bonis vtuntur, hæ minus à ta- bes salsas
libus mutationibus afficiuntur. Quæ verò aquis palustribus aquas ha-
ac lacustribus vtuntur, & non bene sitæ sunt ad ventos, & ad bent.
solem, hæ magis. Et si quidem æstas sicca fuerit, citius sedan-
tur morbi. Si verò pluuiosa, diurni fiunt: & phagedænas
ad edentes ex omni occasione oboriri verisimile est, si vlcus Hyem fri-
fiat. Si verò hyems frigida sit, homines capita humida ac pi- gida quæ
tuitosa habere par est: & ventres ipsorum frequenter extur- mala inue-
bari, pituita à capite influente: & formas ipsorum vt pluri- hat.
mum debiliores esse: ipsosque ad edendum ac bibendū non
B appositos esse. Nā qui capita debilia habent, non fuerint bo-
ni potores. Crapula enim magis grauat. Morbi verò hi ipsis
vernaculi sunt. Primū quidem mulieres morbosæ, ac flu-
xionibus obnoxie sunt, deinde multæ steriles sunt ex mor-
bo, non à natura, & frequenter abortiunt. Pueris verò inci-
dunt conuulsionēs ac anhelationes, quæ morbus puerorum,
& sacer esse putatur. Viris autem dysenteria, & alui proflu-
uia, & febres lenes, diurnæ, hybernæ, & pustulæ nocturnæ
multæ, & hæmorrhoides in recte. Pleuritides autem, & peri-
pneumonix, & febres ardētes, & quicunque acuti morbi pu-
tantur, nõ multum proueniunt. Non enim fieri potest vt isti
morbi vigeant, vbi alui liquidæ existunt. Lippitudines verò
oboriuntur humidæ, non graves, nec diurnæ: si nõ ex mu-
C tatione temporum in morbus aliquis omnibus communis oc-
cupet. Et vbi quinquagesimum annum transgressi fue-
rint, defluxiones ex cerebro accedentes, homines semisylde-
ratos faciunt, vbi caput derepēte insolatum, aut frigore cor-
reptum fuerit. Atque hi quidem morbi ipsis vernaculi sunt:
præterquam si morbus aliquis omnibus communis ex tem-
porum mutatione oboritur, nam & huius participes fiunt.
Quæcunque verò ciuitates his ex opposito sitæ sunt, ad
ventos frigidos, inter occasum solis æstiuum, & orientem
æstiuum: etiam ipsis hi venti vernaculi ac indigenæ sunt, ab
austro verò & calidis ventis protectæ sunt. Et de his vrbi-
bus sic se res habet. Primū quidem aquæ & duræ & frigi-
dæ vt plurimum dulcescunt. Homines autē vegetos & ficos
esse necesse est: & plures ventres infernos crudos ac duros

Hippocratis Liber

habere, supernos verò fluidiores: biliososque magis quàm D
pituitosos esse. Capita verò sana ac dura habent, & plerunq;
vasa ipsis rumpuntur. Morbi autem populares ipsis hi sunt,
pleuritides & quos acutos esse receptum est. Neesse est au-
tem ita habere, quum alui duræ existant, & suppurati multi
ex omni occasione fiunt. Huius autem causa est, corporis ex-
tensio, ac ventris duritia. Siccitas enim & aquæ frigiditas fa-
cit ut vasa rumpantur. Edaces autē tales naturas esse neces-
se est, & nō multum bibaces. Non enim fieri potest ut simul
multum edant ac bibāt. Lippitudinesque his fieri ex tempo-
ris interuallo neesse est, duras autē ac vehemētes, & statim
oculos rumpi. Sanguinis itē ex naribus fluxiones vehemen-
tes ætate fieri iunioribus triginta annis. Morbos etiam sa- E
cros appellatos, paucos quidē, verum vehemētes. Longæ ve-
rò vitæ magis quàm alios, hos homines esse par est: & vlcera
nō pituitosa oboriri, neque efferari. Mores verò magis feros
quam mansuetos. Ac viris quidem hi morbi vernaculi sunt:
præterquàm si quis omnibus cōmunis ex temporum muta-
tione ingruat. Ex mulieribus verò, primū quidē multæ ste-
riles fiunt, propter aquas quæ duræ sunt ac crudæ, & frigidæ:
Purgationes enim mensium nō cōtingunt cōmodæ, sed pau-
cæ ac prauæ. Deinde pariunt difficulter, & non valde abor-
tiunt. Vbi verò pepererint, pueros nutrire non possunt. Lac
enim ab aquarum duricia ac cruditate extinguitur, & tabes
frequentes à partu fiunt. Præ violentia enim ruptiones ac F
vulsuras habēt, pueris autē hydropes in testibus fiunt, quan-
diu parui fuerint, deinde ætatis progressu euanescent. Pu-
bescent autē serò in hac ciuitate. Et de calidis quidē ventis
ac frigidis, & vrbibus ad hos sitis, hoc modo velut dictū est,
res se habet. Quæcunque verò ciuitates sitæ sunt inter æsti-
uos ac hybernos solis ortus: & quæcunque ex opposito harum,
de his ita habet. Quæ quidem ad orientem solem sitæ sunt,
eas par est esse salubriores his quæ ad septentrionem con-
uersæ sunt, & his quæ ad calidos ventos sitæ sunt, etiamsi sta-
dium solum interfit. Primum enim moderatior est calidi-
tas ac frigiditas. deinde aquas quæ ad solis ortus sunt, omnes
splendidas esse neesse est, & odoratas, & molles, & amabi-
les oriri in hac ciuitate. Sol enim emergens ac illustrans
ipsas castigat. Matutinum enim tēpus ipse aer ut plurimum
semper

A semper occupat. Et hominum formæ boni caloris sunt, & magis floridæ, si non quis alius morbus prohibeat. Et clara voce præditi sunt homines, & ad iram ac intelligentiâ præstantiores septentrionalibus, si quidē & alia quæ in ipsa nascuntur meliora existunt. Et ciuitas quæ hoc modo sita est veri maximè similis est, iuxta caliditatis ac frigiditatis moderationem. Et morbi pauciores fiunt ac debiliores, similisque sunt morbis, qui in ciuitatibus ad ventos calidos conuersis oriuntur. Et fœminæ isthic valde fœcundæ sunt, ac facile pariunt. Et de his quidem ita habet. Quæ verò ad occasus sitæ sunt, & ipsæ à ventis ab oriente spirantibus protectæ sunt, & tum calidi venti leuiter affiant, tum frigidi ab Vrsis præterflant: eas vrbes necesse est situ morbosissimo positas esse. Primum enim aquæ non sunt splendidæ. Causa verò est quòd aer matutinum tempus vtplurimū occupat, qui aquæ immixtus claritatem eius disperdit. Sol enim priusquam eleuetur, non illustrat. Aestate verò, mane quidem auræ frigidæ spirant, & ros decidit. de cætero verò sol ad ipsas occidens, quàm maximè homines percoquit. Quapropter etiam decolores ac infirmos ipsos esse par est, & ex omnibus prædictis morbis participare. Nulla enim re ab ipsis separantur. Verisimilisque est ipsos graui voce præditos ac raucos esse, propter aerem, eo quòd impurus plerunque isthic est, & morbosus. Neque enim ab aquilonaribus valde expurgatur. Non enim perseverant venti. Qui verò perseverant ac ipsi incumbunt, aquosissimi existunt. Nam venti occidentales, similes sunt autumno. Et huiusmodi ciuitatis situs est ad diei mutationes, eo quòd multum temporis inter matutinum ac vespertinum intercedit. Et de ventis quidem qui commodi sunt ac incommodi ita se res habet. Cæterum de aquis deinceps narrare volo, quæ morbosæ sint, & quæ saluberrimæ: & quæ mala ab aqua fieri verisimile est, itémque quæ bona. Plurimam enim partem conferunt ad sanitatem. Quæcunque igitur palustres sunt, & stabiles ac lacustres, eas necesse est æstate esse calidas, ac crassas & olentes. Quum enim non defluant, sed aqua pluuia semper noua inferatur, & sol urar, necesse est ipsas decolores esse, & prauas ac biliosas. Hyeme verò glaciatas & frigidas ac turbatas præ niue ac glacie, vt pituitosissimæ ac raucosissimæ existât:

Hippocratis Liber

Bibentibus autē splenes semper sint magni ac pleni : & ventres duri, tenues ac calidi. Humeri vero & clauiculæ & facies attenuata. In splenem enim carnes colliquantur, quapropter graciles existunt. Edaces autem esse tales ac siticulosos par est, ventresque tum supernos, tum infernos, calidissimos habere, ut etiam fortioribus medicamentis opus habeant. Atque hic morbus ipsis & æstate & hyeme familiaris est. Ad hæc etiam hydropes plurimi ac letalissimi fiunt. Aestate enim dysenteria multæ ac alui profluvia incidunt, & febres quartanæ diuturnæ. Hi autem morbi prolongati, tales naturas ad hydropas deducunt ac occidunt. Et hi quidem morbi ipsis æstate fiunt. Hyemē verò iunioribus quidem peripneumoniæ, & insaniam morbi, Senioribus verò, febres ardentes, propter ventris duriciem. Mulieribus autem, tumores oboriuntur, & pituita alba, & vix in ventre concipiunt, ac difficulter pariunt, & fœtus magnos ac tumidos, deinde ex alimentis tabescentes ac deprauati fiunt. Et purgatio commoda post partum mulieribus non contingit. Pueris verò herniæ accedunt, & viris varices, & vlcera in tibia. Quare fieri non potest ut tales naturæ longæ sint, sed ante temporis aduentum senescunt. Præterea fœminæ se in vtero habere putant, & ubi partus tempus adest, ventris moles illa ac plenitudo euanescit. Hoc autem contingit ex aqua quum vteri ex aqua concepta laborant. Atque has quidem aquas ad omnē rem improbas esse censeo. Secundo verò loco eas quarum fontes è petris scaturiunt. Duras enim esse necesse est: aut isthic ubi calidæ aquæ existunt: aut ferrum nascitur, aut æs, aut argentum, aut aurum, aut sulphur, aut alumen, aut bitumen, aut nitrum. Hæc enim omnia præ violentia caloris nascuntur. Non itaque ex huiusmodi terra aquæ bonæ prodeunt, sed duræ & æstuosæ, quæ & difficulter minguntur, & ad alui egestionem contrariæ sunt. Optimæ verò sunt quæ ex sublimibus locis, ac terreis collibus fluunt. Hæ enim & dulces sunt, & albæ, & vinum modicum ferre possunt. & hyeme calidæ fiunt, æstate verò frigidæ. Tales enim fuerint ex profundissimis fontibus. Maximè verò laudare eas oportet, quarum fluxiones ad solis exortus erumpunt, & præsertim ad æstiuos. Necesse est enim odoratas esse ac leues. Quæcunque verò falsæ, & crudæ ac duræ sunt,

Aquæ quæ optimæ.

Aquæ falsæ.

Aer sunt, ad hoc quidem ut eas omnes bibant, non bonae sunt. Sunt tamen aliquae naturae & morbi, quibus tales aquae in potu commodae sunt, de quibus statim dicam. Habet autem & de his hoc modo. Quae quidem aquae fontes suos ad orientes habent, haec praeter omnibus optimae sunt. Secundum ab his locum habent, quae inter aestivos solis exortus ac occasus emergunt, & magis haec quae ad orientes. Tertio loco sunt, quae inter occasus aestivos ac hybernos scaturiunt. Pessimae vero quae ad austrum, & quae inter aestivum ortum & occasum. Et haec quidem ad australes partes valde pravae sunt, ad boreales vero meliores. His autem hoc modo uti convenit. Quisquis sanus est ac valet, is nullum discrimen faciat, sed semper eam quae praesens est bibat. Quicunque vero morbi gratia, eam quae commodissima est bibere volet, is si ita fecerit, maxime sanitatem assequi poterit. Quorum quidem ventres duri sunt, & idonei ad hoc ut ambularentur, his dulcissimae & leuissimae ac splendidissimae conducunt. Quorum vero molles ventres, & humidi ac pituitosi sunt, his durissimae & crudissimae, ac subsalsae aquae conferunt. Sic enim maxime relinquantur poterint. Quaecumque enim aquae optimae coctae sunt, ac facillime liquefcunt, eas par est & ventrem maxime exolvere ac eliquare. Quae vero crudae sunt, & minime coctae bonae, haec magis constringunt ventres ac relinquant. At enim mentiuntur homines de falsis aquis, propter imperitiā, in eo quod per aluum secedere eamque solvere putantur. Maxime enim contrariae sunt ad alui egestionem ac secessum. Sunt enim crudae, & coqui non possunt. Quare venter magis ab ipsis adstringitur quam eliquatur. Et de fontanis quidem aquis hoc modo res se habet. De pluviialibus autem, & quae a niue fiunt, ut habeat, deinceps dicam. Aquae igitur pluviales leuissimae & dulcissimae, & tenuissimae ac splendidissimae sunt. Primum enim sol quod tenuissimum ac leuissimum est in aqua educit ac sursum rapit. Clarum autem hoc, ipsum mare facit. Quod enim falsum est isthic relinquitur, praeter crassitudine ac gravitate, & fit mare. Quod vero tenuissimum est sol sursum rapit, praeter leuitate. Rapit autem tale non solum ab aquis stagnantibus, sed etiam ex ipso mari, & ex omnibus in quibus aliquid humoris inest. Inest autem in omnibus rebus. Et ex ipsis hominibus tenuissimum ac leuissimum.

Hippocratis Liber

ac leuissimum humorem ducit. Eius rei maximum signum. D
inde sumere licet, vbi homo vestibus indutus in Sole iter fe-
cerit, aut federit. Quascūq; enim corporis partes Sol aspicit,
hæ non exudant. Sol enim quicquid cōparet sudoris sursum
rapit. Quæ verò sub veste contactæ sunt, aut sub aliqua alia
re, hæ exudant. Educitur enim ac domatur à Sole sudor. Ser-
uatur autem ex tegmentis, vt ne disperdatur à Sole. Quū ve-
rò in vmbra deuenerit, totū corpus similiter sudore per-
fluit. Non enim amplius Sol affulget. Quapropter etiam ex
omnibus aquis hæ citissimè putrescunt: & odorem malum
pluuiæ aqua habet, eo quòd ex plurimis congregata est ac
permixta, vt citissimè putrescat. Ad hæc verò, vbi rapta est &
in sublimè eleuata, dum circūfertur & ad aerē permiscetur, E
quod turbidum est in ipsa, ac noctem refert, id excernitur, ac
decedit, & fit aer, & nebula. Quod verò tenuissimum est ac
leuissimum in ipsa, hoc relinquitur ac dulcescit, dum à Sole
urit ac coquitur. Fiunt autē & alia omnia quæ coquuntur
semper dulcia. Quandiu igitur dispersa fuerit, & nondū con-
gregata, fertur sublimis. Vbi verò coaceruata fuerit, ac si-
mul congregata derepente à ventis inter se aduersariis: tunc
deorsum prorumpit, quæ parte plurima collecta fuerit, Tūc
enim hoc magis fieri verisimile est, quū nebulas à vento sta-
bilitatem non habente concitatas ac procedentes, derepente
ventus cōtrarius, ac aliæ nebulæ reliserint: atq; tunc quidem
prima ipsius pars congregatur, quæ verò à posteriore parte
sunt, insuper accedunt, & sic crassescunt, & nigrescunt, ac si- F
mul congregantur, & præ grauitate deorsum prorumpūt, &
pluuiæ fiunt. Atq; hæ quidem aquæ optimæ sunt secundum
hanc rationem. Verū opus habent vt decoquantur, ac exco-
lentur. Sin minùs, odorem prauum habent, & raucedines &
vocis grauitatem bibentibus inde accedere par est. At verò
aquæ ex niue ac glacie fientes, omnes malæ sunt. Quū enim
semel concretæ fuerint, non amplius in pristinam naturam
restituuntur. Sed quod quidem in ipsa clarū ac leue, & dulce
est, excernitur ac disperditur. Quod vero turbidissimum est
ac ponderosissimum, relinquitur. Hoc verò cognoueris hoc
modo. Si enim volueris hyemis tempore, vasculū certa aque
mensura infusa, sub dio exponere, quo maximè congeletur:
deinde postridie in locum calidum deportatum sinere, quo
maximè

A maximè glacies liqueſcat, & vbi exoluta fuerit, aquam metiri: reperiēs aquam multo pauciorē. Atq; hoc ſignum eſt, quòd à cōgelatione id quod leuiſſimum ac tenuiſſimum eſt diſperditur, & non quod grauiſſimum ac craſſiſſimum exiſtit. Non enim hoc diſperdi poterit. Hac igitur de cauſa has aquas, quæ à niue ac glacie eliquantur, peſſimas eſſe puto ad omnes res: Itēque eas quæ ad has ſequuntur. Atque ſic quidem de pluuialibus, & nivalibus, ac glacialibus aquis res ſe habet. Calculo verò maximè laborāt homines, & ex rheum affectionibus, & vrinæ ſtillicidio, & coxendicu morbo corripuntur, & herniæ fiunt, vbi aquas omnigenas bibunt, & de magnis fluminibus in quæ alia deferuntur: & de ſtagno, in quod fluxiones multæ ac omnis generis deueniunt. Et qui aquis inuectitiis vtuntur, quæ ex longo, & non breui locorum interuallo afferūtur. Non enim fieri poteſt, vt alia aqua ſimilis ſit alijs. Sed aliæ dulces ſunt, aliæ ſalſæ, & aluminosæ, aliæ de calidis fluūt. Vbi verò hæ ſimul inter ſe miſcentur, diſſident: & quæ fortiſſima eſt, ſemper ſuperat. Præualet autem non ſemper eadem, ſed aliàs alia. Sed & ex vêtis, alijs quidem Boreas robur exhibet, alijs verò Auſter, & de reliquis eadē ratio exiſtit. Talibus igitur neceſſe eſt limum & arenā in vaſis ſubſidere, & ab his ſi potentur, morbi prædicti fiūt. Quòd autem non omnibus, cōſequenter declarabo. Quorum quidem alius ſatis fluida eſt ac ſana, & veſica non ardens, neq; ſtomachus veſicæ valde coardeſcit, hi facile vrinam eiiciunt, & in veſica nihil ipsis congregatur. Quorum verò alius ardēs ac feruida fuerit, in his neceſſe eſt etiam veſicam idem perpeti. Quū enim magis quàm pro natura fuerit calefacta, ſtomachus ipſius inflamatur. Vbi verò hæc perpetitur, vrinam non dimittit, ſed in ſeipſa concoquit & adurit: & quod quidem tenuiſſimum in ipſa eſt, excernitur: & quod puriſſimum eſt, tranſit & emingitur. Quod verò craſſiſſimum ac turbidiſſimum eſt, coaceruatur, & cōcreſcit primū quidem parum, deinde maius fit. Dū enim voluitur ab vrina, quicquid craſſum compactum fuerit, ad ſeipſum adaptat, atque ſic augeſcit, & in toſum concreſcit. Et quum vrinā emittit, ad veſicæ ſtomachum allabatur ab vrina impulſum, & vrinæ emiſſionem impedit, & dolorē vehementem exhibet. Quare pueri calculoſi fricant ac trahūt pudēda. Videtur enim ipsis cauſa miſc

Hippocratis Liber

mictionis eo loco esse. Signum autē eius quod hęc ita se ha-
 bent, hoc est: Vrinam splendidissimam calculosi mingūt ad
 similitudinem seri, eo quod id quod crassissimū est ac bilio-
 fissimum isthic manet, & coaceruatur ac cōcrescit. Et pleri-
 que sanē hoc modo lapidem & calculū contrahūt, sit autem
 pueris etiā ex lacte, si nō salubre id fuerit, sed valde calidum
 ac biliosum. Ventrem enim percalefacit, & vesicam. Quare
 vrina dū aduritur, hęc patitur, & sanē sentio melius esse pue-
 ris vinū quā aquosissimū dare. Minus enim venas adurit
 ac resiccat. Mulieribus autem pudendis non similiter con-
 tingit. Meatus enim vrinæ in vesica breuis est & amplus, vt
 facile vrina impellatur. Neq; enim manu pudendum fricat,
 veluti masculus, neq; vrinē in vesica meatū contingit. Ad pu-
 enda enim perforatus est. Et quia meatus sunt ampli, etiam
 plus bibūt quā pueri. Et de his quidem sic res se habet, aut
 his quā proximē. Caterū de annis hoc modo considera-
 tione facta quis cognoscere possit, qualisnam annus sit futu-
 rus, salubrisne an morbosus. Si enim secundum rationē fiant
 signa in astris occidentibus ac orientibus; & in autūno aquæ
 fiant; & hyems sit moderata, & neq; valde clemens, neq; mo-
 dum excedēs frigiditate; & in verē ac æstate tēpestiuē plu-
 uat; sic sanē saluberrimū esse annum par est. Si verō hyems qui-
 dem sicca sit, & borealis, ver autē pluuiosum & australe, ne-
 cesse est æstatē febriculosam fieri, & lippitudines inducere.
 Quum enim æstus derepente accedat, terra humida existēte
 à vernis imbribus, & ab austro: necesse est æstū duplicatum
 esse, & à terra irrigua ac calida, & à Sole vrente: quū ventres
 in hominibus nondum cōstricti sint, neq; cerebrum resicca-
 tum. Non enim fieri potest, quū ver tale existat, vt corpus &
 caro non humore fluida fiant, adeò vt febres acutissimæ in
 omnes irruant, maximē autem in pituitosos. At dysenterias
 par est fieri & mulieribus, & viris humidioribus. Et si quidē
 circa canis exortum accedat aqua ac tempestas, & Etesia spi-
 rauerint, spes est cessationis, & vt autumnus salubris fiat. Sin-
 minus periculum est ne & pueri, & mulieres moriantur: Mi-
 nime verō senes: & ne qui superstitēs euadunt, in quartanas
 desināt, & ex quartanis in hydropas. Si verō hyems australis
 fiat, & pluuiosa, & clemens, ver autem boreale & siccum &
 tempestuosum, primū quidem mulieres quæ vterum gestāt,
 & par

**Prognosti-
 ca ex tem-
 porū qua-
 litate.**

- A** & partus ipsis ad ver instat, abortum facturas esse verisimile est. Quæ vero etiâ pepererint, impotentes ac morbosos pueros parere, ita vt aut statim pereant, aut tenues & debiles, ac morboſi viuant. Atq; hæc quidem mulieribus, reliquis verò dysenterias & lippitudines siccas: & aliquibus defluxiones à capite in pulmonem. Pituitosis igitur dysenterias fieri verisimile est, & mulieribus, pituita de cerebro defluente, propter naturæ humiditatē. Biliosis verò lippitudines siccas, propter carnis caliditatem ac siccitatem. Valde autem semibus defluxiones, propter raritatem ac eliquationem venarū, adeo vt aliqui quidē derepente pereant, aliqui verò semisiderati, aut dextra aut sinistra parte fiant. Quum enim hyems sit australis, & pluuiosa, ac calida, & corpus non adstringatur neq; venæ, vere accedente boreali & sicco ac frigido, cerebrū postquam ipsum dissolui ac purgari contigit, à grauedine ac raucedine, tunc simul cum vere stabilitur ac cōstringitur. Quare derepente æstate accedēte, & ardore ac mutatione contingente, hi morbi incidunt. Et intestinorum leuitates & aqua intercus ferè reliquis morbis desinentibus superueniūt, quū non queant facilē ventriculi à cōcepta humiditate exsiccari. Si autem æstas pluuiosa sit & austro multū persiletur, similisque sequatur autumnus, necesse est hyemem morbidam esse, & his qui pituita abundant, & qui quadragesimum annum exceſſerunt febres ardentes fieri verisimile est, qui verò bile abundant, costarū inflammationes & pulmonis, pleuritis ac peripneumonias dictas. Si verò æstas sicca existat, & borealis, sequens verò autumnus pluuiosus & australis, capitis dolores ad hyemē expectare conuenit, & cerebri corruptiones, ampliūque raucedines, grauedines, & tussēs, aliquibus etiam rabes. Quod si borealis sit autumnus ac siccus, ac neque sub caniculam, neque sub Arcturi occasum pluuiosus, cōfert pituitosis natura, & maximè qui natura sunt humida, & mulieribus. Biliosis autem infestissimum hoc tēpus existit. Valde enim exsiccantur, acciduntq; eis lippitudines aridæ, & febres acutæ, ac diurnæ, & aliquibus bilis atra, siquidem quod liquidissimum & aquosissimum in bile est consumitur: dēſissimum verò & acerrimū relinquitur, quod idem accidit secundum eandem rationem & circa sanguinem, unde hi morbi his accidunt, pituitosis autem hæc omnia com-
moda

moda sunt. Exsiccantur enim & in hyemem perducuntur, minime humecti, sed resiccati. Hæc igitur si quis mente concipiet & considerabit, is præcognoscet plurima omnino quæ

Mutationes ex huiusmodi mutationibus sint futura. Maximè autem ob-
temporum seruire oportet magnas temporum mutationes, ut neq; me-
observandæ. dicinas in illis libentes exhibeamus, neq; vramus quæ circa

ventrem, neque secemus, priusquam prætereant dies decem aut plures, & non pauciores. Periculosissima sunt etiã ambo solstitia, maximè verò æstivum. Periculosum etiam æquino-

Canicula. astrorum exortus considerare, præcipue canis, deinde arctu-
Arcturus. ri, & Pleiadum occasum. Morbi enim in his maximè diebus
Pleiades. iudicantur, aliique perimunt, alij verò desinunt, aut in aliam E-

Differetia dem, sicut dixi, habet. Volo autem & de Asia & Europa de-
inter Asia monstrare, quantum differant inter se per omnia, & de gen-
& Europã. tium formis quid distent, & nihil inuicem simile habeant.

Verum de omnibus si quis dicere velit in immensum excre-
sceret sermo, quare de maximis, & plurimum differentibus
diuersitatibus dicam, quantum saltem mihi in ea re est com-
pertum. Ac dico quidem plurimũ differre Asiam ab Europa

Pulchriora secundum naturas omnium ex terra nascentium, itẽmq; ho-
maioraque minum. Longè enim pulchriora & maiora omnia nascuntur
sunt Asia- in Asia. Estque regio ipsa, hac nostra multo mansuetior, sunt
na, & cur. etiam hominũ mores benigniores & cultiores. Causa verò

horum est temporum anni temperata mixtura. Siquidem in
medio solis exortu sita est ad aurorã, à frigiditate ac calidi-
tate omni remotior. Incrementum autem & benignitatẽ in-
de proficisci omnibus in confesso est, quũ nihil sit præcellens
& cogens violenter, sed per omnia æqualitas vigeat, quan-
quam non habeant ubiq; per omnẽ Asiam omnia secundum

Varietas eundem modũ. Quæcunq; enim in ea regio in medio sita est
rerum in calidique & frigidi, ea omnium fertilissima existit, & arbo-
Asia. ribus refertissima & maximè serena, aquisque vtitur & cœ-

Cœli ele- lestibus & ex terra promanantibus. Neq; enim à calore com-
mẽtia & so- busta est valde, neq; à squalore & aquarũ inopia exsiccatur,
li vbertas neq; à frigore oblæditur. Verum austris perflatur & irrigua
in Asia. est, tum propter imbres multos, tum propter niues. Fructus
autẽ suo tempore maturos multos in ea nasci par est, siue ex
sparsis

A sparsis seminibus hi proueniant, siue terra ipsa per se sponte producat eorum plantas, quarum fructibus utuntur homines, eas ex agrestibus cicures & domesticas facientes, & pro commoditate sua transplantantes. Pecora etiam ipsa pleniora proueniunt, quæ & pariunt sæpius & pulcherrimè educantur. Quin & homines habitiores esse ac specie pulcherrimos, & magnitudinis eximiæ, minimèque differentes, quantum ad formam ac corporum proceritatem attinet, constat. Certumque est hanc regionem proximè accedere ad naturam ac temperaturam optimæ constitutionis, verum virilitatem, laboris

Asiaticorum
poris robo-
re non præ-
stant.

B ac perpetui sunt amatores. Vincit enim in ipsis voluptas, quæ ratio est multiformes generari partus, præcipuè in feris. Atque sic quidè de Aegyptiis ac Libycis mihi habere videtur.

Qui verò ad dexteram hybernæ ortus solis usque ad Mæotidem paludem habitant (hic est enim Europæ & Asiæ terminus) sic habent. Multò maior diuersitas est inter illas ipsas gentes quam de quibus iam dixi, quum propter varias temporum mutationes, tum ob regionis naturam. Habet autem eodem plane modo, quemadmodum & circa aliorum hominum terras accidit. Vbi enim tempora magnas mutationes faciunt & frequentissimas, illic & regio agrestis & maximè inæqualis existit, inueniuntque & montes plurimos & densos, itemque campos & prata. Vbi autem non valde variant tempora, illic æqua-

Europæ &
Asiæ termi-
nus.
Gentes cur
inter se dif-
ferant.

C lissima regio est, quod idem & de hominibus ipsis est intelligendum. Si quis enim rectè consideret, videbit quorundam naturam, montanis, syluosis ac asperis locis similem esse, aliorum verò aquosa ac exilia loca referre: sicut quidam pratorum ac paludum naturam præ se ferunt, atque alij sunt à quorum planitiebus nudisque ac siccis terris constitutio similis existit. Tempora enim quæ formarum naturam variant, sunt diuersa: quum ergo inter sese fuerint maximè diuersa, varias & multiplices formas producunt. Porro quæ parum inter se differunt gentes relinquam, quæ autem plurimum non natura solum, sed & legibus & consuetudinibus discrepant, de illis referam quomodo habeant. Ac primum omnium de Macrocephalis, quum nulla omnino alia gens sit, quæ similia ca-

Macroce-
phali.

m tam

Hippocratis Liber

tam longis capitibus essent. Nunc autem natura ipsa cum **D** consuetudine conspirauit, Siquidem generosissimum apud eos putatur, caput habere quàm maximè longum: consuetudinis autem hoc initium fuit. Quum recēs infans natus est, caput eius adhuc tenerum ac molle existēs, quàm celerrimè constringunt manibus, coaptantēsque cogunt in longitudinē augeri, quin & vinculis connectunt, ac aptis instrumētis colligant, quo rotunditas capitis prohibeatur, ac longitudo augeatur. Ea cōsuetudo tantum effecit vt eiusmodi natura capitum existeret. Temporis verò progressus natura quoque tales produxit, vt non esset necesse consuetudine priore cogere. Quum enim femen genitale ab omnibus corporis membris procedat, à sanis quidem sanum, à morbidis morbosum **E** fūtque vt ex caluis calui gignantur, ex cæsiis cæsi, & vt plurimum distortus distortum generet, eadēque ratio sit circa reliquas formas, quid prohiberet vt non ex Macrocephalis Macrocephali gignerentur? Nunc autem non nascuntur ita magnis capitibus quemadmodum prius, quum consuetudo nō amplius daret, per incuriam hominum intercēpta. Et de his quidem hęc sufficiant. De illis autem qui Phasim accollunt adiiciam. Regio eorum palustris est, calida, aquosa & densa, imbrēsque in eam decidunt omnibus temporibus & magni & impetuosius, homines verò ipsi vitam agunt in paludibus, domosque ligneas, & ex arundinibus in ipsis aquis habent extructas, neque multum inde prodeūt, vt adeant vel emporia vel vrbes. Verū nauiculis ex vno ligno fabrefactis permeant sursum ac deorsum, habent enim fossas ac ductus aquarum plurimos. Bibunt autem aquas calidas & stagnantes, quæ & à sole sunt putrefactæ, & ab imbrium casu auctæ. **F** Ipsæque fluuius Phasis omniū fluuiorū stagnantissimus est, & qui lentissimo cursu profluat: fructus autē qui illic nascuntur omnes insalubres sunt, euirati imperfectique præ multitudine aquarum, neque vnquam maturescunt. Atque quum multus aer ab aquis regionē occupet, ob hanc ipsam causam, quod ad formā ac corporū speciē attinet, Phasiani sunt à reliquis hominibus longè diuersi. Sunt enim magnitudine ingenti, ac corpulentia valde excellēti, neque iuncturæ eorū vllæ neque venæ comparent, pallidūque præ se ferunt semper colorem, quemadmodum qui regio sunt obnoxij morbo; loquuntur autem

Phasis accollunt.

Phasis qua liter fluat.

Phasiani quales.

- A** autem ut si qui alij omnium hominum gravissimè, nimirum aere utentes non sereno, sed obscuro, & maximè humectato. Sunt insuper ad laborem à natura ipsa segniores, anniq; tempora non varias habent, neque ad æstum, neq; ad frigus permutationes. Venti autem eis sunt plurimi austrini omnes, præter unum eius regionis proprium, & indigenam, qui aliquando violentior ac molestior calidus existens spirat, quæ Cenchrona patrio vocabulo appellant. Verum Boreas non valde ad eos pertransit, quod si aliquando spiret, debilis tamè existit ac valde lenis. De natura ergo ac diuersitate & forma eorum qui Asiam & Europam incolunt, ita habet. Quod autem timidiore, effeminatione, ac imbelles præ Europæis
- B** Asiani existant, moribusq; mansuetiores, tempora ipsa anni in causa sunt, quæ non magnas permutationes faciunt, neque caloris, neque frigoris, sed semper æqualia permanent: unde neq; mentes stupore percelluntur, neque corpora fortè transformationem incurrunt. A quibus verissimile est iram exasperari, cognitionemq; & calorem ampliùs excitari, quàm si semper in eodem statu quis persistat. Mutationes enim sunt quæ hominis mentem semper excitant, neque sinunt quiescere. Propter quas sanè causas imbelles vniuersum Asianorum genus existit, atque adhuc ampliùs propter leges. Multò maxima enim Asiæ pars sub regibus est. Vbi autem non in sua potestate viuunt homines, neq; sui iuris sunt, sed dominis subiecti, ibi non multum curiosi sunt quo modo se ad bellum adparent, imò magis hoc curant, ut ne bellicosi videantur. Pericula enim eis non æqualia instant. Nam hi in militiâ proficisci, laboresque perferre, ac mortem oppetere pro dominis suis coguntur, relictis interim domi liberis, vxoribus ac reliquis amicis: atq; siquidem viriliter & feliciter bellum gesserint, dominis inde commoda accedunt, eorumq; facultates inde augentur. Verum ipsis præter pericula & cædes nihil demetitur. Proinde neque his hominibus regionem frequenter habitata esse necesse est, Imò eam propter inertiam bellicam ac otium à plerisque relinquunt. Ut enim quisq; maximè à natura virilis & magnanimus est, ita plurimum eius animus leges auersatur: cuius rei magnum indicium vel inde habere licet, Quod quicumq; in Asia Græci itemq; Barbari dominis non subsunt, sed iure suo degunt, sibiipsisque omnes labores

Cur Asiani
imbelles.

Mentēque
excitant.
Asiani cur
non bella-
ces.

Fortes, le-
ges auersan-
tur.

Hippocratis Liber

lucrificiunt, illi bellicosissimi omnium existunt. Periclitantur enim ipsi sibi, virilitatisque premia ipsi reportant, sicut timiditatis ac ignaviae poenam luunt pariter. Inuenias autem & Asia nos ipsos inter se plurimum differentes, generosiores alios, alios degeneres, quorum omnium causa ad temporum mutationes est referenda, quemadmodum & in precedentibus dixi.

Quare non
nulli ab aliis differant.
Scythica gens.
Maotis palus.
Sauromatae.

Atque sic quidem habet in Asia. In Europa vero genus hominum est Scythicum, circa paludem habitans Maotim, quod a reliquis gentibus maxime differt, Sauromatae appellantur, Horum foeminae equites sunt, arcubus utuntur, ac sagittas iaculantur ex equis, cum hostibus congregantes, dum virgines existunt, neque deuirginantur prius, quam hostium tres contulerint, neque prius maritis cohabitant, quam sacra deo patrio more fecerint. Quod si qua sibi virum acceperit, ab equitatu libera est, nisi necessitas cogat communi expeditione omnes exarmari. Dexteram autem mammam non habent, Nam puellis adhuc infantibus matres aereo instrumento in hunc usum parato, igneque candefacto eam auferunt, ac exurunt, ne iterum succrescere contingat, atque ut omnis vis ac robur in dextrum humerum & brachium deferatur. Ceterum reliqui Scythae quod ad formam adtinet, ipsi sibi similes sunt, aliis dissimiles. Sicut quoque Aegyptij ipsi inter se, praeterquam quod hi a vehementi calore, illi ab intenso frigore sunt compressi. Verum solitudo quae Scythica dicitur, in planitie sita est, pratis abundans, sublimis & mediocriter aquosa. Sunt enim flumines in ea magni, in quos aqua ex capis per riuos deducitur. In hac itaque Scythae degunt, qui Nomades vocantur, propterea quod nullas habeant domos, sed in curribus habitant. Sunt autem currus ex quibus minimi quatuor rotis, reliqui sex circumaguntur. Sunt etiam luto obturati ac instar domorum fabricati, aliqui simplici, aliqui etiam triplici tabulato, Unde robur illis inest aduersus omnes iniurias aquarum, niuis ac ventorum propellendas. Trahunt currus aliquos quidem bouum paria duo, aliquos tria, atque hi cornibus carent, quum praefrigore regionis cornua eis non enascantur. In his itaque curribus degunt mulieres. In equis autem vehuntur viri. Sequuntur autem simul oves, boues & equi. Tandiu deinde in vno subsistunt loco, dum sufficit ipsis pecoribus pabulum, quo deficiente in aliam regionem commigrant.

Aegyptij
cur inter
se similes.
Scythae.
Nomades
quomodo
viuant.

- A** grant. Vescuntur autem ipsi carnibus coctis, bibuntque lac equinum, comedunt etiam Hippacen, id autem est caseus Hippace equinus. Haecenus ergo de victu & moribus diximus, tempore quid. ribusque anni ac formis, quae à reliquis hominibus longissime sunt Scythiae genti diuersae. Ipsa enim sibi inter se gens similis existit quemadmodum & gens Aegyptiorum. Minime autem foecunda ea gens est, regioque ipsa minimas feras nutrit, neque numero, neque specie insignes. Sub ipsis enim Vrsis Riphæisque montibus sita est, unde Boreas spirat, Solque ipse supremo aestiuo solstitio deficiens proxime accedit, ac tum quidem exiguo tempore calefacit. Neque vero venti à calidis locis spirantes valde ad eam regionem penetrant, nisi parumper & debiles. Verum ab Vrsis venti procedentes sunt illic perpetui frigidi à niuib, glacie imbribusque condensati. Qui nunquam à montibus decedunt, ut propterea etiam inhabitabiles fiant. Aerque ipse totum ferè diem nubilus campos occupat. Ipsi verò in humidis locis degunt. Et ferè perpetua est ipsis hyems, aestas autem paucissimis diebus atque illis non valde multa, Sunt enim planities eminentiores, & nuda, neque ullis montibus circumseptae, sed ferè sub ipsis Vrsis accliuës. Neque fera nascuntur illic magnae, sed quales possibile est sub ipsa terra cõtegi. Prohibet enim hyems & nuditas terrae, quae & diuerticulis & umbraculis caret, propter temporum anni mutationes, neque multas neque fortes, sed similes semper, vel parum admodum diuariantes, unde & formas corporum inter se similes habent, quum eodem vtantur victu & amictu, estatis & hyemis tempore, attrahuntque aërem aquosum cõdensatum, aquam insuper bibentes à niuib & glacie resolutam, nullo etiam corporis exercitio accedente, quum non verisimile sit corpus aut animum ullis exercitationibus apta fieri, vbi non mutationes temporum sunt fortes. Propter quas causas formae eorum sunt crassae & carnosae, Iuncturae verò humectae & inefficaces, ventriculi que humidi omnes, maxime omnium tamen inferior aluus, Nequit enim ipsa exsiccare in eiusmodi quum regionis, tum naturae & temporis constitutione. Sed pinguedine & nuditate carnis formae inuicem sunt similes, masculorum masculis, & foeminarum foemellis. Tempora enim quum sint inter se similia, nullas corruptiones, neque malignitates inferunt les.

Riphæimō
tes.Qui venti
hic spirent.Cur nō ma
gna anima
lia illic gi
gnantur.Cur omnes
hi carnos
pingues
que.Cur inter
se dissimi
les.

Hippocratis Liber

in feminis genitalis mixturam ac compactionem, nisi quid-
dam aliud fortuito vel casu contingat, aut à morbo. Magnum
autem argumentum humiditatis corporum Sytharum hoc
exhibebo. Multos enim ipsoꝝ, præcipue qui Nomades sunt,
reperias exustos humeros ac brachia habentes manuūque
iuncturas, pectora, coxas, & lumbos, nullā sanè aliam ob cau-
sam, nisi ob humoris & molliciei naturæ detractiōē. Nam
neque arcus intendere, neq; telum torquere possunt præ im-
potentiā humiditatis humerorū. quum autem vruntur, hu-
mor ipse à iuncturis exoluitur, fiuntque corpora ipsoꝝ va-
lidiora, melius nutriuntur, & magis redduntur articulorum
vsu potētia. Fluida verò fiunt ac lata primū propterea quòd
fasciis non colligantur, quemadmodum fieri solet in Aegy-
pto. Deinde quòd non animaduertunt quomodocunque in-
ter equitandum equis insideant. Postremum etiam propter
desidiā perpetuā. Masculi enim eorū antequā potentes
fiant equos cōscendere, atque in illis vehi, plurimū temporis
desident in curribus, raroque prodeunt vt inambulent, pro-
pter exilia ac perpetuas circulationes. Muliebrum autem
corporum formæ ad miraculum vsque fluxæ existunt. Porro
Scytharum gēs fului valde coloris existit propter frigus in-
gens. Non enim vehemens accedit ad eos sol, à frigore verò
albedo, exurit & fit fulua. Neque verò possibile est fœcun-
dam esse eorum naturā, quum viri minimè cupidi sint cum
fœminis cōmisceri, ob nimiam corporis liquiditatem, ven-
trisque molliā ac frigiditatē, quæ causæ adparent minimè
viros ad coitum incitari. Accedit his lassitudo ex continua
equitatione cōtracta, quæ eos ad cōmistiōem reddit impo-
tentiores, atq; hæ sunt causæ cur viri infœcundiores puten-
tur. Mulieres pinguedo carnis & humiditas steriles facit,
præ quibus vteri earum genitale semen nequeunt cōtinere.
Lunares naque purgationes eis non eueniunt quemadmo-
dum est necesse, sed minus & intempestiue per longius tem-
pus. Ipsūque ampliùs vteri os præ pinguedine concludi-
tur, vt nequeat semē suscipere. Sunt enim otiosæ & pingues,
ventrēsque earum frigidi & molles, vnde necessariò sequi-
tur non multū fœcundā Scytharum gentem esse, cuius rei
famulæ earū indicium exhibent. Nā hæ viris misceri pluri-
mum gaudent, in vterōq; cōceptum cōtinent, propter corpo-
ris

Mulieres
scythæ mol-
lissimæ.

Quid con-
tinua equi-
tatio fa-
ciat.

In Scythia
cur mulie-
res steriles.

Sterilitatis
altera caus-
sa.

Aris exercitium frequens carnisque gracilitatem. Amplius autem plurimi Scythæ Eunuchi fiunt, & muliebria officia obeunt, instarque fœminarum omnia faciunt, & loquuntur, vocanturque hi effœminati. Et regionis quidē incolæ causam ad Deum referunt, coluntq; hos ipsos homines & adorant, sibi ipsis timentes ne quid tale accidat. Mihi verò affectus diuini quidem esse videntur, sicut & reliqui omnes, neque vllum aliquem alio esse diuiniorē aut humaniorē, sed diuinos omnes, verum vnusquisque eorum suam propriam habet naturam, neque aliquis citra naturam accidit. Quare quomodo hic affectus contingat, vt mihi videre videor, narrabo. Ab equitatione ipsa diuturni eos corripunt

B articulorum dolores. Nimirum propendentibus semper ex equis eorum cruribus, deinde claudi fiunt, contrahunturque coxendices quum inualuerit morbus. Medicantur autem sibi ipsis hoc modo, A principio morbi vtranque venam retro aures incidunt, quo facto sanguine multo promanante, somnus eos corripit præ imbecillitate, sicque obdormiscunt: quorum quidem aliqui depulso somno sani exurgunt, aliqui verò minimè. Atque mihi sanè videntur ea medicatione seipsos perdere. Venæ enim retro aures sunt, quas si

quis secet sterilitatem inferat his quibus secantur, quare id etiam ipsis ex earum incisione accidere certum est. Quando igitur postea vxores adeunt impotentēque se factos vident cum illis coire, primū quidem nihil molestius cogitan-

Ctes quiescunt, quum autem bis aut ter, aut amplius frustra opus tentarunt, neque quicquam proficiunt, mox putant se Deum offendisse, in quem culpam reiciunt, Induuntque se veste muliebri, palam se euiratos esse confitentes, ad mulierūque contubernia transeunt, earum opera tractantes. Hoc itaque malo ditissimi Scytharum afficiuntur, minimè verò infimi. Imò qui maximè & genere & potentia præualent ex nulla alia, quàm continuæ equitationis causa hoc perpetiuntur. Pauperes verò minus, quum non multum equitent. Vnde si hæc affectio aliis diuinior censenda esset, non nobilissimis, non ditissimis Scytharum ferè solis accideret. Sed esset omnibus, æqualiter peculiaris. Imò magis inuaderet pauperes circa cultum deorum negligētiore, si saltem gaudent dij in hominum admiratio-

Quæ venæ
secæ steri-
lem red-
dunt.

Cur ditio-
res potius
quàm pau-
peres hoc
patiuntur.

Hippocratis Liber

ne constitui, & pro hoc beneficia hominibus retribuunt. Di-
uites enim sæpius diis sacra faciunt, victimas offerunt, sta-
tuas erigunt, coluntque, quum pecuniis abundant, pauperes
autem minus id faciunt, quum non habeant. Quin etiam
aliquando deos detestantur, qui eis opes non suppeditent, vt
verisimilius esset, pauperes ac parum abundantes hoc ma-
lo propter crimina sua puniri, quàm diuites & qui opibus
abundant. Verùm sicut & prius dixi, diuinus quidem hic
affectus est, secundumque naturam accidit similiter vt alij
omnes, neque alia eius causa quàm ea quam dixi, Scythis
existit. Simili autem modo & reliquis hominibus euenit.

Continua
equitatio
vbique no-
cet.

Vbi enim frequenter & continuè homines equitant; ibi plu-
rimi à diurnis doloribus articulorum, coxendicūmq; ma-
ximè & pedum corripuntur, ad coitumque fiunt impoten-
tes, quæ omnia mala Scytharum genti adsunt. Atque pro-
pterea Scythæ omnium hominum minimè sunt ad coitum
valentes. Et quod Anaxyridas (braccharū siue fœminalium
id genus est) semper habent, & plurimum temporis in equis
delides degunt, vt neque manu tractare pudenda liceat, atq;
præ frigore & lassitudine voluptatis ac iucunditatis coeun-
di obliuiscantur, neque prius aliud sibi faciendum putent,
quàm vt euirati fiant. Hactenus ergo de Scytharum gen-
te recensui. Reliquum autem in Europa hominum genus

Cur in Eu-
ropa homi-
nes inter se
dissimiles
sint.

valde inter se dissimile est & diuersum, tum quod ad ma-
gnitudinem adinet, tum quod ad formam, atque id propter
temporum mutationes contingit apud eos magnas & fre-
quentes. Sunt enim eis calores vehementes, & hyemes for-
tes, pluuia multæ, rursumque siccitas diutina, & venti plu-
rimi, ex quibus multæ & omnimodæ fiunt transmutatio-
nes. Neque à vero discrepat circa generationem has ipsas
mutationes sentiri, inque seminis genitalis coactione aliam,

Seminis ge-
nitalis va-
rietas va-
rias formas
reddit.

neque ex eodem etiam eandem, ætatis pariter vt hyemis,
pluuioso vt sicco tempore, progigni. Eaque causa est, cur
putem Europæos magis quàm Asianos secundum corpo-
rum formas inter se discrepare, & magnitudines diuersissi-
mas in singulis adeo vrbibus prouenire. Plures enim corrup-
tiones contingunt in seminis coactione, quum tempora
frequenter variant, quàm si eadem sunt & similia. Eadē au-
tem morum ratio in vtrisque existit. Feritas, integritas, &
audacia

Cur (æui-
res in Euro-
pa.

A audacia à natura Europæis innascitur. Frequentes enim mentis percussiones feritatem inducunt, mansuetudinē contra & benignitatem extirpant. Quare etiam magnanimos magis eos qui Europam incolunt Asianis iudico. Siquidem similitudo & æqualitas segnitiam parit. Mutatio autem & animum & corpus ad exercitationē excitat. Augetur itaque à desidia & ocio timiditas, ab exercitio verò & laboribus crescit virilitas. Vnde bellicosiores quoque Europæi extant, non ob hanc solum causam, sed & propter leges. Non enim regibus obediunt quemadmodū Asiani. Vbi enim sub regibus viuitur, ibi necesse est homines timidissimos esse, quem admodum & suprā ostendi. Seruitute nanque animi eorum

B pressi non libenter, neque volentes temere pro aliis se periculis exponunt. Europæi autem suo iure viuētes, quum pro seipsis pericula belli subeant, magna cupiditate feruntur, volentesque ac alacres difficultates omnes adgrediuntur, ipsique sibi ex re bene gesta præmia reportant, vt certum sit leges plurimum ad magnanimitatem conferre. Tota itaque & vniuersa res de Europa & Asia sic vt retuli habet. Ceterum Europa ipsa adhuc habet gentes inuicem differentes, non magnitudine & forma solum, sed & magnitudine ac fortitudine. Quæ verò in eis hanc diuersitatem faciant, in præcedentibus dixi dicamque amplius magis manifestè. Quicunque regionem montanam, asperam, nudam & nō aquosam incolunt, his mutationes temporum cōtingunt magnæ

C & diuersæ, vnde & hominum formas magnas progigni conuenit, qui & ad laborem & ad viriliter agendum à natura præstent, quibusque feritas & immanitas non mediocriter à natura sint congenita. Qui verò loca concaua, pratensia & æstuosa habitant, ventosque calidos plus sentiunt quàm frigidos, & aquis vtuntur calidis, hi magni quidem esse non possunt, neque bene cōpositi & longi ac erecti, sed in amplitudinem à natura producti carnosus sunt, & capillis nigris. Imò & ipsi toti nigri magis quam albi, & qui minus depicta habeant quàm de bile. Virilitas autem & tolerātia laboris non æquē ipsis à natura inest, nisi consuetudo accedat, & hæc in eis efficiat. Quòd si flumina extent in ea regione, quæ stagnantes & pluuias aquas euehant, homines ipsi incolumes ac splendidi viuent. Si verò flumina desint, aquasque

Segnities
vbi magis
vigeat.

Europæi
cur bellico
siores quā
Asiani.

Locorum
varietas va
rios homi
nes creat.

Quæ flu
mina salu
bria.

m s

puteorum

Hippocratis Liber

puteorum stagnantes & olentes bibant, necesse est ab ipsis **D**
 illis aquis & ventrem lædi & splenem. Quicunque autem
 altam habitant regionem, planam, ventis expositā & aquo-
 sam, eorū formæ magnæ ac inuicem similes & erectæ. Ani-
 mi quoque eorum existunt mansuetiores. Qui verò macra,
 aquis carentia, & nuda loca tenent, & quæ temporum mu-
 tationibus non sunt permixta, horum formas necesse est esse
 asperas & vegetas, flauas magis quàm nigras, mores etiam
 eorum rigidi sunt, pertinaces & contumaces. Vbi enim mu-
 tationes temporum cōtingunt frequentes, & plurimum in-
 ter se diuersæ, ibi & formas, & mores, & naturas reperias
 plurimum differentes. Temporū itaque varietates potif-
 limæ sunt, quæ naturam ipsam permutant. Deinde etiam **E**
 regio in qua multæ variationes fiunt, postremum autem
 aquæ. Inuenias enim ferè semper & formas hominū & mo-
 res regionis naturæ compares. Nam vbi terra pinguis est &
 mollis, & aquosa, aquæ autem valde sublimes, ita vt æstate
 calidæ sint, & hyeme frigidæ, & temporum ratio aliàs pro-
 bè conueniat, ibi & homines carnosī, articulis non adparen-
 tibus, humidi, laboris intolerantes, & vt plurimum maligni
 nascuntur. Segnitieque & somnolentia eis inest multa.
 Sūntque ad artes tractandas crassi, non acres aut subtiles.
 Vbi autem regio est nuda, natura munita & aspera, quæque
 & à frigore hyberno prematur, & à sole æstiuo exuratur, ibi
 duros & robustos, & articulis probè disiunctos, vegetosque
 & hirsutos reperias homines, & in quibus à natura laboris **F**
 tolerantia, & vigilantia insit. Quique mores habeant perti-
 naces, ad iram procliuēs & contumaces, magisque feritate
 participantes quàm mansuetudine. Insuper ad artes etiam
 acutiores & plus solertes, & ad res bellicas gerendas aptio-
 res. Quin & omnia quæ è terra proueniunt, terræ ipsius na-
 turam resipiunt & sequuntur. Atque hætenus quidem maxi-
 mè contrarias corporum naturas & formas diximus, è qui-
 bus coniectura facta, si quoque reliqua consideraueris, nun-
 quam à vero aberrabis.

HIPP

46. y Method Cap. 12 Arb. 94
A H I P P O C R A T I S

46. Hippoc
C O I L I B E R D E F L A T I -

B V S , I A N O C O R N A R I O

M E D I C O P H Y S I -

C O I N T E R -

P R E T E .

prob. anit
nel moye.



B VNT quædā artes, quæ illis quibus earum *Medicinæ*
cognitio contingit, multum laboris ac mo *qualitas.*
lestiarum exhibet: illis verò qui earum vñ
indigent, iucundæ ac vtilis existunt. Imò
ignaris etiam ac plebeis hominibus com-
mune quoddam sunt bonum. His verò qui
eas exercet planè molestæ. Ex harum artium numero est &
ea quæ medicina appellatur. Medicus enim oculis perlustrat
singula pericula, contrectat etiam nulla voluptate, & ex alie
no malo proprias sibi demetit molestias. Aegrotantes autem
artis beneficio, à maximis malis liberantur, à morbis, à do-
loribus, à tristitia, à morte. Omnibus enim his evidens me-
dicina auxiliatrix reperitur. Huius autē artis quæ vilia vul-
go putantur, cognoscere difficile est. Quæ verò alicuius pre-
tij existunt, facile: atque vilia quidem soli medici norunt, vul-
gus ignorat. Non enim corporis, sed animi opera existunt.
C Quæcunque quidem manuum operam exigunt, ad ea con-
suetudine perueniendū est, Est enim vsus ipse egregius ma-
nuum exercitator & magister. Verum de non adparentibus
& difficillimis ægritudinibus planè opinio magis quam ars
ipsa iudicat. In his ergo plurimum refert expertusne sit quis,
an omni experientia carens. Vnum autem est horū omnium
iudicium, hoc scilicet, Quæ tandem causa sit morborum,
& quod principium ac quasi fons sit, ex quo corpori mala o-
mnia scaturiant. Si quis enim causas corporis affecti probe
cognouit, potens est valde ea adferre, quæ corpori commo-
dent, nimirum cōtraria corporibus morborum natura per-
specta. Est enim maximè secundum naturā ipsa medicina.
Quare statim vbi fames molestat, morbus fit. Quicquid
enim

Leg. P. 1.

Vsus peri-
tiave do-
tor & ma-
gister sum-
mus.

Morbi la-
tentes gra-
uesque opi-
nionem non
arte censen-
tur.

Quid pri-
mū in mor-
bis, & quæ
medela.

Contraria
tollunt con-
traria.

Hippocratis Liber

enim homini molestiā ac tristitiā infert, hoc morbus vocatur. Quod ergo est famis remedium? hoc scilicet quod famem sedat, id autem facit cibus, eo ergo malum illud medicandum. Amplius autem ubi fitis urgeat, bibere compescit: & rursus, repletioni euacuatio, euacuationi repletio, labori quies succurrit, & quietis medelā ex labore reperias: atq; ut breuiter dicā, contraria cōtrariorum sunt medicamina. Medicina enim nihil aliud est nisi adpositio & ablatio. Ablatio quidem eorum quæ excedunt, adpositio verò eorum quæ deficiunt: qui autē istud optimē facere potest, is optimus medicus censebitur, quantumque quis ab hoc præstando deficit, tantum deficit quoq; ab ipsa arte. Atque hæc quidem præter institutum futuri sermonis à me dicta sunt. Morborū autem omnium vnus & idem modus est. Locus verò ipse eorū differentiam facit. Quare videntur quidē morbi inter se nihil simile habere, propter diuersitatem scilicet locorum, quum sit tamen vna morborum omniū & species & causa quoque eadem. Quæ autem hæc ipsa sit, in sermonis huius progressu manifestum facere conabor. Corpora enim omnia tum hominum, tum reliquorum quoq; animantium à triplici nutrimento sustentantur. Horum autē nutrimentorum nomina hæc sunt, cibus, potus, spiritus. Ac spiritus quidem qui in corporibus sunt, flatus vocantur: qui verò extra corpora existunt, aer. Qui sanē maximus est in omnibus quæ corpori accidunt & autor & dominus. Quare operæ precium est eius potentiam diligentius perspicere. Ventus enim ipsius aeris fluctus & vnda existit. Quando igitur multus aer fortes fluctus facit, tum & arbores radicitus euelluntur, & mare vndis exæstuat, spirituum potentia ita cogente, & naues onerarias etiam & ingentes in altum disiciens. Talem itaque vim in ista exercet, etiam si oculis minimē sit conspicuus, & tantum consideratione cognoscatur, & effectū suo fiat manifestus. Quid autem sine hoc sit tandem? aut cui rei non adest? Omne enim quod inter cælum & terram est, spiritu repletum est. Hic & hyemis & æstatis causa est. In hyeme quidem frigidus & condensatus. In æstate autē mitis & tranquillus. Quin & solis & lunæ, & astrorū omniū cursus per spiritum procedunt. Etenim igni spiritus nutrimentum præbet. quo si ignis priuetur, viuere nō possit. Et solis perpetuum cursum,

aer

Medicina
quid

602
ut

Loci mor-
bos dissi-
miles faciunt.

Tria sunt
quæ corpo-
ra hominū
& anima-
lium cun-
ctorum su-
stentant.

Vetus quid
& quid pos-
sit.

Spiritu ae-
rē cūcta
vigent.

A aer perpetuus & tenuis cōseruat. Verūm neque mare ipsum spiritus exors esse omnibus manifestū esse puto. Non enim viuere natantia animantia possent, si non spiritu participarent: quomodo autem participarent, si non per aquam & ex aqua spiritum adtraherent? Et Lunæ hic fundamentum est, & terræ vehiculum, neque quicquam vsquā est spiritu vacuum. Atque hactenus quidem quantum aer aliis commodet diximus. Mortalibus autem vitæ, & morborum ægrotis, solus is est autor. Tantæque omnibus corporibus spiritus necessitas extat, vt siquidē omnibus aliis abstineat homo, neq; cibum sumat, neque potum, possit tamen dies duos vel tres & plures ducere, Si cui verò spiritus in corpus viæ intercipiantur, in breui parte vnius diei intereat, vt vel hinc quāto vsui spiritus corpori sit liceat æstimare. Amplius autem ab omnibus operibus aliquando immunes quiescunt homines: multæ enim sunt mutationes in vita, verūm ab hoc opere nulla omnibus mortalibus animantibus requies cōtingit, vt cessent spiritū adducere, ac rursus exhalare. Vides ergo ex his quæ dixi quanta cōmunio omnibus animātibus in fruendo aere existat. Subiiciam igitur mox & illud, quod nō aliunde vnquā verisimile sit morbos euenire quā inde, si is aut plus, aut minus, aut cumulatior, aut morbidis sordibus inquinatior in corpus se ingerat. Sed hæc de vniuersa hac re dicta sufficiant. Ad ipsa nunc opera sermonem conuertens demonstrabo, omnes morbos ex hoc oriundos corporibus innasce-
C sci, ac generari. Primū autem à communissimo morbo febrili exordium sumam, & qui omnium morborū comes est: præcipuè tamen ex inflāmate & tensione abscessuū. Quod satis indicant sequentiæ offendicula, statim enim cum inflāmate inguinū abscessus & febris cōsequitur. Sunt autem febrium genera duo, vt hoc quoq; nunc attingā, quorum alterū cōmune omnibus pestis adpellatur, alterū propter malam diætā priuatim his contingit qui ea vtuntur, vtriusq; autem generis aer autor & causa existit. Communis ergo febris propterea omnibus accidit, quod eūdem spiritū omnes adtrahunt, fitque vt simili corpori similes spiritus similiter permixti, similes gignāt febres. Sed est fortasse qui dicat, Vt quid ergo non omnibus animantibus, sed alicui eorum generi incidunt hi morbi? Cui ego sic responderim, Differt corpus

Spiritus
vsus quam
necessarius
sit.

Spiritus
semper tra-
hitur vel
emittitur.

Morbi vna-
de.

Febrium
duo gene-
ra.

Communis
peculiaris-
que febris
causa.

Hippocratis Liber

Febris ma-
li nutrica-
tus.

Horroris
tremorisq;
caussa.

pus à corpore, natura à natura, & nutrimentū à nutrimento. **D**
Non enim omni animantium generi eadem aut non confe-
runt, aut commoda sunt, sed sunt alia aliis magis conuenien-
tia. Quando igitur aer eiusmodi inquinamenti plenus est,
quibus humana natura offenditur, homines agrotāt. Quan-
do verò alteri cuiuspiam animantiū generi aer inconueniens
est, tum morbus illud genus corripit. Qui ergo populares
sint morbi haftenus dictum sit, & quare, & quomodo, & qui-
bus, & vnde gignantur. Quomodo autē propter malam diæ-
tam febris accidat deinceps exponam. Est autem mala diæta
hæc. Primum quidem quum quis plures cibos, liquidos aut
siccos ingerit in corpus, quàm ipsum corpus ferre queat, neq;
laborem aliquem ciborū saltem multitudini parē adiungit. **E**
Deinde quum varios & dissimiles inter se cibos adsumit, se-
ditionem enim mouent quæ sunt inæqualia, aliquāq; citius,
alia difficilius cōcoquuntur. Cū multorum autē ciborum
ingestione necesse est & multū spiritū ingredi. Omnia enim
quæ eduntur & bibuntur, spiritus in corpus inferūt, aliquan-
do plures, aliquādo etiā pauciores. Id autē inde manifestum
fit, quòd plurimis eructationes post cibos & potus euenire so-
lent, discurrete nimirū aere incluso, vbi per ruperit bullas
quibus fuerat inclusus. Quādo igitur corpus cibis expletum
est, ac spiritus quoque multitudo vehementer excellit, cibiq;
ventri diu immorantur, quum præ multitudine exire ne-
queant, & inferior venter vel alius ipsa sit obturata, per vni-
uersum corpus permeant flatus, sanguinéque plenas corpo- **F**
ris partes maximè petentes eas infrigidant: infrigidatis au-
tem his locis vnde fontes & radices sanguinis prodeunt, per
vniuersum corpus horror cōsequitur: vniuerso autē sangui-
ne frigefacto, totū corpus horret. Quæ ratio est cur primum
horrores ante febres corpus concutiant, quantòque maiore
impetu multitudinis & frigiditatis ipsi flatus præcelluerint,
tantò maior sit & horror, à pluribus videlicet & frigidiori-
bus fortior, à paucioribus ac minus frigidis, minùs etiā for-
tis. Cum horroribus autem & tremores corporis accidunt,
secundum eundem planè modum. Sanguis enim præsentis
horroris timore percussus concurrit, ac penetrat per omne
corpus ad locos maximè calidos. Hi enim sunt eius saltus.
Decedente itaque ab extremis corporis partibus sanguine,
viscera

A viscera contremiscunt & carnes. Sunt autem quædam corporis partes sanguine plenæ, quædam verò exangues. Exangues itaq; propter frigus non tremunt, sed parumper commouentur quum calor ex eis defecerit. Sanguine autem abundantes propter sanguinis multitudinem & tremunt, & inflammationes suscitant. Nequit enim fieri ut sanguinis multitudo conquiescat. Hiatus etiam præcedere solet febres, siquidem **Hiatus.**

multus aer coaceruatus, cumulatim supernè petens commouet ac diducit os, quum per hoc facillimus ei exitus pateat. Quemadmodum enim ab aquis in lebetes feruentibus vapor multus eleuatur: Sic & corpore calefacto penetrat per os aer conuolutus, & quadam vi erumpens. Amplius autem & articuli exoluuntur ante febres, calefacti enim nerui diducuntur.

B Quando autem cōgregatus fuerit cumulatim plurimus sanguis, calefit rursus ipse aer, qui antea sanguinè infrigidauit. Nimirum à calore multo victus, accensusq; ac velut igneus factus per omne corpus calorem spargit, cooperâte ei in hoc etiam ipso sanguine. Liquefit ergo quicquid ignea vis illa attigerit, fitque inde spiritus. Qui cum ad meatus corporis iruerit, sudores fiunt. Siquidem spiritus compactus in aquam transmutatur, & per meatus penetrans extra prorumpit, eodem plane modo, quo à feruentibus aquis vapor eleuatus, si obstaculum habeat, ad quod impingere oportet, pinguescit ac condensatur, guttæque destillant ab his corporibus quibus vapor ipse fuit impactus. Insuper autem & dolores ca-

**Sudores
quæ creen-
tur.**

C pitis simul cum febre accidunt, cuius rei hæc causa est. Sanguinis transitus in capite magna angustia coarctantur. Repleti enim sunt multo aere. Cuius abundantia ac conclusio dolorem excitant in capite. Sanguis enim ipse natura calidus existens, vi coactus per angustam viam transire celerimè non potest, quum multa impedimento sunt obstacula, & oppilationes, quapropter etiam pulsus fiunt circa tempora, Hoc ergo modo, ut dixi, febres fiunt, & cum febribus dolores, ac aliæ quædam ægitudines. Porro sunt aliquæ aliæ infirmitates utpote voluuli, agitationes intestinorum, tormina atq; opilationes: quod autem hæ ipsæ omnes à flatibus causentur, nemini puto non manifestum esse. Omnium enim horum causa est spiritus transitus. Nam is quum contingit locos teneros, inconsecutos, ac prius intactos, quemadmodum spiculum

**Capitis do-
lor cum fe-
bre cur-
fiat.**

**Pulsus tem-
porū cur.**

Hippocratis Liber

**Calor fo-
menti foris
appositi
quid fa-
ciat.**

**Distillatio-
nis causa.**

**Fauces quæ
exasperan-
tur, tussis
que fiat.**

**Sanguis cū
putruit pus
efficitur.**

spiculum infixum penetrās per carnem perrumpit, aliquan-
do præcordia petens, aliquando ilia. Imò quandoq; vtraque
simul adstringens. Quare solent quidam calida fomenta extra
adhibentes dolorem mitigare. Rarefacto enim corpore à ca-
lore fomentum spiritus inde exhalat, vt quies inde aliqua &
mitigatio cōtingat dolorum. Sed dixerit fortassis quispiam,
Quomodo ergo fluxus generantur per ipsos flatus? Et quo-
nam modo sanguinis rupturarum circa pectus flatus autor
& causa existit? Opinor autem ego me ista per hæc manife-
stè declaraturum. Quum igitur venæ circa caput aere reple-
te sunt, primū quidem caput ipsum propter flatus inclusos
aggrauatur, deinde conuoluitur spiritus cum sanguine pro-
pter angustiam viarum, tenuissimum autem ipsius sangui-
nis per venas excluditur, atque id ipsum tenuissimum liqui-
dum quum coaceruatur, per alios meatus fluit, & vbi tādē
cumulatim progrediens constitit, ibi constituitur & mor-
bus. Si itaque ad oculos peruenerit, sequitur eorum dolor. Si
ad aures, morbus & illas occupat. Si ad nares, grauedinē ge-
nerat. Si ad pectus, raucedinē. Pituita enim ipsa acribus hu-
moribus permixta, quocunque proruperit, maximè in non
consuetos locos, eos exulcerat. Quòd si fauces teneras aliàs
fluxus petiuerit, eas exasperat: spiritus enim qui fauces ingre-
ditur, ad pectus vsq; procedit, ac rursus effertur per eandem
viam. Quum autem spiritus ingrediens in fluxum qui intus
est inciderit, tussis gignitur, & repellitur sursum pituita.
Quæ quum sic habeant, fauces exulcerantur, exasperantur
& inflammantur, adtrahuntque calefactæ humorem de ca-
pite, caput autem rursus ab aliis corporis partibus adtrahēs
his transmittit. Quum igitur hic fluxus consueuit sic mana-
re, implentur meatus, & transmittūt in pectus. Acris autem
quum sit pituita carnem penetrans, exulcerat ac perfringit
venas. Ex quibus sanguis effusus in alienos sibi locos vbi mo-
ram traxerit putrescit, ac in pus conuertitur, & neq; sursum
potest conscendere, neque infra exire. Sursum non, nam non
facilis est via humori ad ardua prodire, sicut neque aliis re-
bus, quæ aliquam admixtam secum habent grauitatem. In-
fra autem procedere prohibet septum transuersum. Quare
sanè contingit fluxum aliquem citra spiritum rumpi, & ali-
quando quidem sua sponte, quandoque etiam propter dolo-
res,

A res, Ac sponte quidem quum aer in venas vltro receptus sanguinis meatus coarctat. Multitudine nanq; sua compressus sanguis meatus perfringit, qua eius copia maximè prorūpit. Effusione autem eius facta, venæ rursus spiritu complentur, & ex eo dolor sequitur. Necesse est enim affectum locum spiritu occupari, aliæque dictis similia fieri. Rupturæ autem omnes fiunt hoc modo, Quum violentia quadam inuicè discedunt & finduntur carnes, fissurâ subtercurrit spiritus, ac dolore adfligit: quum autem ipsi flatus carnes pergressi, meatus corporis rarefecerint, sequitur post flatus humiditas, cui viam iam antea aer præstrauit. Irriguo itaq; corpore ab humiditate facto, liquefiunt carnes, tumoresq; in furas descendunt, atq; morbus fit, qui aqua intercus adpellatur. Maximū autem signum est, morbum hunc à flatibus generatum esse, quòd iam sæpe aliqui hoc malo affecti exoluti sunt, & ab aqua euacuati. Atq; his quidē subito aqua ex ventre prorumpens multa adparet, post morā autem paucior fit. Cur verò hoc fiat satis manifestum est. Nam primū subito prorumpens aqua aere plena est, is tumorem ac aceruum præ se fert ingentem, cum autem aeris spiritus euauerit, remanet planè eadē aqua, & adparet quidem paucior, verū penitus eadem existit. Adiiciam autem aliud adhuc signū. Si quis vniuersum ventrē penitus euacuet, non tres procedunt dies rursus plenus fit. Quid ergo aliud quod impleat putandum est quam spiritus? Quid enim aliud tam repētē impleffet? Nā neq; tantum potuum in corpus ingestum est, neque carnes in causa esse possunt, vtpote antea liquefactæ. Superfunt autem ossa, nerui, chordæ, fibræ, à quorū nullo vllum aliquod aquæ augmentū potest prouenire. Ergo quomodo aqua intercus fiat iam sit dictū, quod verò stupor attonitus vel syderatio à flatibus fiat, deinceps demonstrabo. Cū ergo flatus frigidi multi penetrent ac inflēt carnes, partes corporis stupidae fiūt, & siquidē plurimi flatus per vniuersum corpus discurrāt, totus homo syderatur. Si per partē, pars illa percutitur. atq; vbi abierint flatus, cessat & morbus, quādiu autem permāserint, cōsistit & morbus, idq; sic habere indicat perpetuus syderatorū hiatus. Videtur autē mihi amplius & sacrū adpellatū morbū ab ipsis flatibus gigni: à quibus autē ratio- nibus ego persuasus sum, illis ipsis & auscultaturos persuade-

Locus affectus spiritu vexatur.

Scissura carnis fragmentave quæ fiant & hydrops.

Syderationis apoplexiæve causa quæ.

Sacer morbus comitialisq; quæ fiat.

n

re

**Sanguis
quid possit**

**Somnus
qualis,**

**Insomnia,
Temulētia
quoque sen
sus variat.**

**Sacer mor
bus quā fiat
Sanguis
quid possit
& faciat.**

**Comitiales
cur nihil
sentiant.
Comitialiū
eur os spu-
mescat.**

re conabor. Opinor autem inter omnia quę in corpore sunt, D
nihil magis ad prudentiā conferre, quā sanguinē. Hic ergo
quū in cōtanti habitu persistit, cōsistit & prudētia: sanguine
verò permutato, cōcidit simul & prudentia. Quod autē hęc
ita habeant. multa sunt testimonia. Ac primum quidem, qui
omnibus animantibus communis est, hęc cōfirmat somnus,
Quū enim corpus inuaserit somnus, sanguis frigescit. A natu
ra enim somno frigefaciendi vis est. Infrigidato autē sangui
ne, lāguidiores fiūt eius meatus: quod hinc palā fit, quod cor
pora adgrauata reclinantur. Omnia enim grauiā natura ad
fundum deferuntur: & oculi ardent, & prudentia permuta
tur, opinionēsque peregrinę mentē occupāt & exercent, quę
sanē insomnia adpellantur. Quin & temuleus per ebrieta- E
tem aucto repēte sanguine percellitur animus, & in animo
prudētia, fiūtque pręsentium malorum obliuioſi, ac futuro
rum bonorum fœcūda spe beantur. Possem autem plurima
eiusmodi cōgerere, in quibus sanguinis permutationes, ani
mi quoque prudētiā permutāt. Siquidē igitur penitus totus
conturbatus est sanguis, penitus & prudentia proſternitur.
Affectus enim & cognitiones à consuetudine contingunt:
quū autem à cōsuetudine solita recedimus, aufertur nobis
prudētia. Dico itaque & sacrum morbum tum fieri, quū plu
rimus spiritus per omne corpus vniuerso sanguini fuerit
permixtus: tum enim multę oppilationes fiunt multifaria
per omnes venas, quūque in crassiores & pleniores sanguine F
venas aer prodierit, progressusque diutius maneat, prohibet
sanguinis cursum, atque alio quidem loco consistit, alio lētius
penetrat, alicubi adhuc tardius. Quā sanē inæqualitate tran
situs sanguinis per corpus facta, omnigenę inæqualitates
per omne corpus contingunt. Omne enim corpus vndiqua
que contrahitur ac turbatur, nimirum corpore partes suas
ad tumultum ac conturbationem sanguinis subministran
te, cōtinguntque ex sanguinis peruerſione, totius omnino cor
poris subuerſiones. Eo enim quo corripiuntur à morbo, tem
pore, neque sentiunt quicquā, neque audiunt quę dicuntur, neque
vident quę fiunt, neque vlllos aliquos dolores percipiunt. Sic
nanque aer conturbatus sanguinem turbauit, ac cōspurcavit.
Spumaque etiam per os illis excurrit, neque id ab re est. Nam
per iugulares venas aer transiens, penetrat quidem ipse, ad
ducit

A ducit autem simul secum quod tenuissimum est in sanguine, id ipsum quum humidum sit, multa permixtione albescit. Tenuis enim membranas purus permeans aer pellucet, quapropter & alba spuma omnes adparent. Porro liberantur aliquando huic morbo obnoxij, maxime accedente hyeme. Quomodo autem id fiat, dicam. Quando variis laboribus exercitatum corpus calefactum est, calefit & sanguis, qui calefactus, rursus calefacit & flatus, hi vero calefacti, dissoluuntur & ipsi, & compactum sanguinem dissoluunt simul, proceduntque e corpore partim cum spiritu, partim cum pituita eiectioni. Deferuente itaque spuma, & consistente sanguine, tranquillitateque per omne corpus facta, quiescit etiam morbus.

B Quare, ut dixi, flatus ipsi vere omnium istorum morborum omnimodae existunt causae. Caeteraque omnia quae causae videriqueant, vel hos adiuuant, vel consequenter post hos in corporibus morbos generant. Haecenus ergo morborum omnium causas flatus esse demonstraui. Id enim a principio receperam me facturum. Recensui autem spiritum ipsum, quum in aliis omnibus rebus potentem, tum maxime in animantium corporibus plurimum posse. Deduxi autem sermonem usque ad morborum cognitionem, atque adeo aegritudinum singularum, in quibus verum argumentum huius sermonis est a me manifestatum. Quod si pergerem singula aegritudinum genera recensendo amplius corroborare, longius quidem sermo ipse extenderetur. Verus autem nihilominus futurus esset, & qui fidem suam omnibus probaret.

Flatus
quid faci-
ant.

HIPPOCRATIS

COI LIBER DE MEDICA-

MENTIS PURGANTIBVS,

IANO CORNARIO ME-

DICO PHYSICO IN-

TERPRETE,

*

2

MED



EDICAMENTORVM purgantiũ res non D
ita se habet, quẽadmodum vulgò putatur.
Eodem enim medicamento purgantur &
non purgantur. Quandoque verò alia pur-
gat quàm quæ purgare solet. Aliquando ni-
mum purgat. Aliquando ea quæ debet, fa-
cit. Quare fieri non potest vt quis medicamentis confusus, ea
Cibi quate temerẽ exhibeat. Nam & cibos nos alentes, medicamẽta ef-
min⁹ nobis se putadum est, verũ minus quàm illa. Homines enim qui
medentur. his rectẽ in cibo vtuntur, sani sunt: qui non rectẽ, ægrotant:
qui verò modum excedunt, purgantur quidem velut à sin-
ceris medicamẽtis, verũ minus & tardius quàm à sinceris
medicamentis. Clarum igitur est, quòd & hi medicamenta E
existunt. At verò hi tardiores, qui & familiares nobis sunt, &
quotidie in corpus ingrediuntur, si temerẽ & negligẽter ex-
hibeantur, temerẽ homines turbant, & quodammodo mor-
bos inducunt. Quin & sinceros & acidos cibos si quis citra
delectum ac inconsideratẽ exhibeat, nihil cõmodi perficiet.
Oportet igitur primũ biliosis dare quod bilem purgat. Pi-
tuitosis quod pituitam, hydropicis quod aquam, atrabilia-
riis quod bilem atram. Si verò extra hæc purgaueris, quæ
quidem purgari debent, nõ purgabis: quæ verò nõ debent, ea
euacuabis. Quare in vtranq; partem peccabis. Quum itaq;
pharmacũ alicui dare voles, siue deorsum siue sursum pur-
gãs, interrogare ipsum oportet, an prius biberit medicamen- F
tum, & an alius ex deorsum purgãtib; cita sit, & celeriter
obediat, aut dura. Et si citam ac facilem solutu esse dixerit,
mollioribus & paucioribus medicamentis opus habet. Si ve-
rò dura fuerit, fortioribus indiget. Idem modus in sursum
purgantibus requiritur. At si nõquam neque sursum, neque
deorsum, se purgatum esse dixerit, neque medicamentum
bibisse: cognoscere oportet an ad ea quæ sanus in corpus in-
gressit, alius deorsum solutu facilis fuerit, aut sursum versus
apposita ad vomitionem, & an ad repletionem aliquam al-
ui profluuium ipsi successerit. Hæc omnia interrogare opor-
tet, quo rectẽ consulere possis. Turpis enim est calamitas,
medicamento purgante dato hominem occidere. Quicun-
que igitur à febribus fortibus corripiuntur, his medicamen-
ta purgatoria dare non oportet, donec remiserit febris. Sin-
minus,

Medicamẽ
ta pro natu
ra cuiusq;
danda.
Pharmacũ
daturus
quid prius
agat.

Febricitan-
ti qualia
medicamẽ
ta danda.

le quando

A minus, saltem non intra quatuordecim dies. Carnes enim
 ipsorum & ventres, quum calidi sint, medicamentum assu-
 munt, & nihil depurgantur, & febris maior fit, & color euer-
 titur, & morbi regij speciem præ se ferunt. Commota enim
 bile, & non purgata, non forbere vult eger, neque bibere, sed
 omnia abominatur, & plerumque perit, Si vero detinet me-
 dicamentum, ante meridiem nihil purgatur: à meridie vero
 nimium purgatur, & perit. At si hac die superstes maneat, &
 vnà cum purgatione remittat febris sanus fit. Quapropter
 in febribus vehementibus medicamenta purgatoria exhi-
 bere non oportet. Verum si alicui opus fuerit, infusum per
 B clysterem adhibere potes, quotiescunq; volueris. Hoc enim
 minoris periculi est. Iuxta eandem rationem etiam tempo-
 re æstatis, à canis ortu, per dies quinquaginta vitare oportet
 & non dare medicamentum, sed infusis per clysterem vti.
 Idem enim periculum imminet.

HIPPOCRATIS

COI DE DIAETA SIVE VI-

CTVS RATIONE, LIBER

PRIMVS, IANO CORNA-

RIO MEDICO PHY-

C

SICO INTER-

PRETE.

*



I Quis mihi ex prioribus, qui de Ratio cur
 diæta humana ad sanitatem confe- de humano
 rente scripserunt, rectè cognouisse victu scri-
 ac omnia per totum, quantum hu- bat.
 mana menti possibile est, conscri-
 ptisse videretur: latis esset mihi alio-
 rum laboribus, quos nossem rectè
 habere, vti, prout singula vtilia es-
 se viderentur. Nunc verò multi qui-
 dem iam scripserunt, nullus autem rectè nouit, quidnam

n 3

fuerit

Hippocratis Liber I.

potius lau-
dādi, quam
vituperan-
di qui ali-
quatenus vi-
tam adiu-
uant.

fuerit ipsis scribendum. Et alij quidem aliud assequuti sunt, D
Verum totum nullus adhuc ex prioribus. Immerito autem
vllus aliquis ipsoꝝ reprehendatur, propterea quod inueni-
re non potuerunt. Imo laudandi potius omnes quod inuesti-
gare conati sunt. Itaque redarguere ea quæ non recte dicta
sunt, minime institui, Verum his quæ sufficienter cognita
sunt, testimonium præbere animus est. Quæcunque qui-
dem igitur recte à prioribus dicta sunt, vt non sit possibile
me aliter conscribere, recte cōscribam. Quæcunque verò nō
recte dixerunt, si quidem redarguam hæc quod nō sic se ha-
bent, nihil perfecero. verum exponendo qua de causa singu-
la ipsoꝝ recte mihi habere videntur, declarare volo.

Propterea verò hunc sermonem præpono. Quod multi E
homines vbi audierint aliquem prius de re aliqua exposuif-
se, eum qui de his posterius disserit non recipiunt, non co-
gnoscentes quod eiusdem intelligentiæ est, ea quæ recte di-
cta sunt posse iudicare. Ego igitur velut dixi, recte qui-
dem dictis testimonium præbebo, quæ vero non recte dicta
sunt ac cognita, qualia sint declarabo. Quæ autem nullus
ex prioribus explanare tentauit, ea etiā ipsa qualia sint de-
monstrabo. Porro eum qui de victu humano scripturus
est, censeo primū quidem totius hominis naturam nosse
ac diiudicare oportere. Nosse quidem ex quibus ab initio
constitutus est, diiudicare verò quæ in ipso partes dominium
obtineant. Si enim constitutionem ab initio non cognoscet,
& id quod in corpore dominatur, non poterit ea quæ homi-

Quæ scire
oporteat
qui de hu-
mano vi-
ctu scribit.

ni conducunt offerre. hæc igitur scriptorē cognoscere oportet. Deinde verò ciborum ac potuum omnium, ex quibus vi-
ctum habemus, facultatem, quam tandem singula habent &
secundum naturā, & secundum necessitatem ac artem hu-
manam. Oportet enim scire quomodo fortium natura vim
detrahere oporteat, & quomodo debilibus robur per artem
addere oporteat, prout singulorum occasio se obtulerit. Et si
relata iam etiam cognouerit nondum sufficiens est hominis
curatio, propterea quod homo edens sanus esse non potest,
nisi etiam laboret. Contrarias enim inter se vires habent ci-
bi & labores. Verum inter se mixti conferunt ad sanitatem.

Quæ obser-
uanda.

Labores enim ea quæ insunt consumere solent, cibi autem
& potus ea quæ euacuata sunt, explent. Oportet autem
velut

A velut par est laborū vim pernoscere, tum naturalium, tum eorum qui per vim sunt, & qui ex ipsis carnes in augmentū preparant, & qui in defectū. & non solum hæc, sed etiā mensuram ac proportionē laborum ad multitudinem ciborū, & hominis naturā, & corporum staturas ac ætates, & ad tempora anni, & ad mutationes ventorum, & ad situs regionum in quibus degunt, & ad anni constitutionē ac statum. Sed & Astrorum ortus & occasus cognoscere oportet, quo mutationes & excelsus ciborū ac potuum, & ventorū, & totius mundi, ex quibus sanè morbi hominibus oriuntur, obseruare sciat. Quum autē hæc omnia cognouerit, nondum sufficiens inuentum est. Siquidē enim supra hæc inuenta fuerit ciborum mēsurā, & laborum ad vnāquamque naturam numerus, ita vt excelsus neque supra, neque infra modum fiat, inuenta sanè exactē fuerit hominibus sanitas. Nunc verò prædicta quidē omnia inuenta sunt, qualia sint, hoc verò inuenire impossibile est. Si quidē igitur præsens quis sit, & inspicat, cognouerit vtique hominē exeuntem & in gymnasiis exercitantem, vt custodire sanum possit, alia detrahēdo, alia apponendo. Verūm non præsentī impossibile est cibos ac labores exactē præscribere. Nam quantum possibile est inuenire à me iam relatum est. At enim etiā si valde parum defectuosiora quàm alia fiant, in multo tēpore necesse est corpus ab excelsu superari, & ad morbum peruenire. Alij itaq; huiusque inquirere conati sunt, & neq; hæc dixerunt ac prodiderunt. A me verò hæc inuenta sunt priusquam homo agrotet, vt ab excelsu in vtrā tandē partē factus fuerit, prænotio contingat. Nō enim derepēte morbi hominibus accedunt, sed paulatim collecti, acervatim apparent. Priusquam igitur in homine sanitas à morbo superatur, quæ perpetiuntur homines à me inuentū est, & quomodo hæc in sanitatem restituere oportet. Hoc autem vbi accesserit ad ea quæ scripta sunt, ratiocinationum huius doctrinæ conatus perficitur. Cōstituuntur quidem igitur tum animātia alia omnia, tum homo ipse ex duobus differentibus quidem facultate, cōcordibus verò & cōmodis ysu, igne inquam, & aqua. Hæc autem ambo simul sufficientia sunt, tum aliis omnibus, tum mutuo sibi ipsis. Vtrumvis verò seorsum, neq; sibi ipsi, neque ulli alteri sufficiens est. Vim igitur ac facultatem vtrunque

Astrorum
ratio cogno
scenda me
dico.

ij

Gul. Loc.

L. aliorum

Morbi sen
sim pullu
lant

ad acc
app.

Ignis & a
qua cuncta
gignunt.

ipforum talem habet. Ignis enim omnia per omnia mouere D
 potest, Aqua vero omnia per omnia nutrire, Particulatim
 verò vtrunq; superat & superatur, ad summū ac minimum,
 quantum eius fieri potest. Neutrum enim superare penitus
 potest, ob hanc sanè causam. Igni quidē vbi ad extrema-
 tem aquæ peruenit, deficit alimētum: auertitur igitur eò
 vnde nutriri potest, Aquæ verò vbi ad extremitatem ignis
 peruenit, deficit motus. Siftitur itaq; in hac, quum vero ste-
 terit, nō amplius potens est, sed ab illabente igne in alimen-
 tum cōsumitur. & propterea neutrum penitus superare po-
 test. Si verò etiā alterutrum superetur, nihil sanè ex his quæ
 nunc sunt fuerit velut nunc habet. Quum autem sic semper
 se habeant, erunt & eadem & neutra, & neq; simul deficient. E
 Ignis igitur & aqua velut à me dictum est, sufficientia sunt
 omnibus per omnia ad summum ac minimū similiter. Cæ-
 terum vtrique horum hæc adsunt. Igni quidem caliditas &
ficcitas, aquæ verò frigiditas & humiditas. Habent autē in-
 ter se mutuo, ignis ab aqua humiditatē. Inest enim ab aqua
 humiditas. Aqua verò ab igne ficcitatē, Inest enim in aqua
 ab igne ficcitas. Quum autem hæc sic habeant, multas &
 omnigenas formas ac species, tum seminum, tum animalium,
 à seinuicem secernunt, quæ nihil inter se simile habēt, neque
 visu, neque facultate. Etenim quum nunquam simul in eo-
 dem cōsistant, sed semper alterentur, necessarium est etiā
 ea quæ ab ipsis secernuntur ac producuntur dissimilia fieri.
 Equidem nullum omnino corpus perit, neque fit quod prius F
 non erat, Verum permixta & discreta alterantur. Homines
 autem putant hoc quidem ex orco in lucem auctum gene-
 rari, illud verò ex luce in orcum imminutum perire ac cor-
 rumpi. Oculis autē magis credere oportet quam opinionibus.
 Ego verò hæc ex sententia exponā. Animalia enim sunt
 & illa & hæc, & neque animal mori possibile est non cum
 omnibus (Vnde enim moriatur?) neque quod non est gene-
 rari, quum non sit vnde generetur. Sed augentur omnia ac
 minuuntur, ad summum & ad minimum, quātum eius fieri
 potest. Quid verò dicam generari & perire, vulgi gratia in-
 terpretabor. hæc autem commisceri & discerni significare
 declaro. Habet autem res hoc modo. Generari & perire siue
 corrumpi, idem est. Idem est commisceri & secerni. Genera-
 ri idem

Potestas
 ignis & a-
 quæ

Quæ ignis
 & aqua in-
 ter sese per
 mutant.

Quid igni
 & perire.

Ari idem est quod cōmisceri. Perire corrumpique ac minui idem est quod secerni. vnumquodque ad omnia, & omnia ad vnumquodque ide sunt. Cōsuetudo enim in his naturæ cōtraria est. Seorsim autē omnia & diuina & hūmana sursum ac deorsum vicissitudinē habent ac transeunt, dies & nox ad summum ac minimū, Sic & Luna ad summum ac minimū. Ignis accessus est & aqua, Sol ad longissimū ac breuissimū. Rursus hæc, & non hæc. Lux Ioui, tenebræ orco. Lux oreo tenebræ Ioui. Accedunt & transmutātur illa huc, hæc illuc, Omni tēpore transfigunt illa res horum, hæc autē illorum, & quæ quidē faciunt, non sciunt, quæ verò faciunt, scire sibi videntur. & quæ quidem vident, non cognoscunt, attamen

B omnia ipsīs fiunt per diuinā necessitatem, & quæ volunt, & quæ nō volunt. Accedentibus autem illis huc, his verò illuc, & inter se permixtis, vnumquodque destinātū fatum explet, & ad maius, & ad minus. Corruptio autem omnibus mutuo inter se est, maiori à minore, & minori à maiore. Et augetur maius à minore. Reliqua autē omnia, & hominis anima, & corpus velut anima, ornantur ac gubernantur. Irrepunt autē in hominem partes partium, tota totorū temperaturam habentia, ignis videlicet & aquæ, partim acceptura, partim datura, & quæ quidē accipiunt, plus faciunt, quæ verò dant, minus. Secant homines lignum per ferrā, alter trahit, alter protrudit, Idē autem hoc faciunt, & minus facientes, plus laborant ac faciunt. Sic & hominis natura, aliud

C protrudit, aliud trahit, aliud dat, aliud accipit, & alij dat, ab alio accipit, & alij quidem tanto plus dat, ab alio verò nihil minus accipit. Locum autē vnumquodque suum seruat, & quæ quidē ad minus eunt, ad minorem locum secernuntur, quæ verò ad maius vadunt, permixta in maiorem ordinem mutantur. Peregrina verò non eosdē mores habētia, ex aliena regione protruduntur. Semper autē anima & maiora, & minora habens, suas ipsius partes circumambulat, nō appositione, neq; detractione partium indigens, verū augmento & decremento earum quæ iam sunt opus habens. Locum verò vnique perficit, ad quem perueniant. & allabentia suscipiant. Non enim potest id quod non similes mores habet, in discordibus locis permanere. Oberrant enim velut ignota, permixta verò inter se cognoscuntur. Concors enim

A S concordi

Hippocratis Liber I.

Qualis ho-
minis ani-
ma perspi-
cito.

...aia

concordi adhæret ac assidet, discordia autem rebellât, & pu-
gnant, atque inter se dissident. Quapropter anima hominis,
in homine augetur, in alio verò nullo, & aliorum magnorum
animalium similiter. Quæcunque verò aliter ab aliis per vim
secernuntur, de aliis quidē animalibus prætermittā, de ho-
mine verò declarabo. Irrepat in hominem anima, ignis &
aquæ temperamentum habens, partem corporis humani. Fœ-
mellæ autem & masculi, & multi & omnigeni nutriuntur,
Nutriuntur autē & augescunt per dietam qua homo vititur.
Necesse est autem omnia quæ ingrediuntur partes habere,
Cuiuscunque enim pars non inerit à principio, augeri nō po-
terit, neque multo, neque modico alimento ingrediente. Non
enim habet quod augescere faciat. Id verò quod omnia ha-
bet, augescit, vnumquodque in suo loco. Alimento autē ingre-
diente ab aqua & igne, sicco & humido, alia quidem intra
coguntur, alia verò foras protruduntur. Quemadmodum fa-
bri lignarii lignum serra dissecant, & alter quidē trahit, alter
protrudit, idē sanē facientes: & qui deorsum premit, superio-
rem trahit, neque enim alias admitteret deorsum ire. Si verò
violenter cogant, toto opere aberrabunt. Similiter & circa ho-
minis alimentum se res habet. aliud trahit, aliud protrudit. in-
tro autē coactum, foras repit. Si verò importunē & violenter
cogatur, omni successu priuabitur. Singula autē tanto tem-
pore eundem ordinem habent, donec locus nō amplius susci-
piat, neque alimentum aquarum ac ignis sufficiens ad summum
habeat. Postea ad extremam regionem transeunt & fœmellæ &
masculi, eodem modo præ violentia & necessitate impulsæ.
Quæcunque autē destinatum fatum expleuerint, ea primū secer-
nuntur, ac simul commiscuntur. Singula enim secernuntur,
omnia autē hæc commiscuntur. Postquam verò regionem per-
mutauerint, & nati fuerint harmoniam rectē habentē sym-
phonias tres comprehensim penetrantes per omnia, viuunt
& augescunt iisdem quibus etiā antea. Si verò harmoniam
non assequuti fuerint, neque graui acutis consona fiant, pri-
ma symphonia perit. Et si etiā secunda generetur, propterea
quod vnus per omnia corruptus est, omnis tonus vanus est.
Non enim cōcentum habuerit, sed transitio fit ex maiore ad
minus, ante destinatum fatum quod qui faciunt, non sciunt
quid faciāt. Cur autem vtrique tum masculus, tum fœmina
fiant,

A fiant, in sermonis progressu declarabo. Vter autem ipsorum **partus cō-**
 harmoniam allequetur humidus existens mouetur ab igne, **positio.**
 motus autem viuificatur, & alimentū attrahet ab ingredien-
 tibus in mulierem cibis ac spiritu, primū quidē vndiquaq;
similiter, donec recenter rarus est. à motu autē & ignis sicca-
 tur ac consolidatur, consolidatus autē & firmatus circum cir-
 ca densatur. Et ignis inclusus non amplius sufficiens alimen-
 tum attrahere potest, neque spiritū expellit, propter ambien-
 tis corporis densitatē. Consumit enim humorem intus exi-
 stētem. Quæ igitur solida natura sunt in cōpacto ac sicco, ea
 non consumuntur ab igne in alimentū: sed valida ac robusta
 fiunt, & consistunt humore deficiente, atque hæc sanē ossa ac
 nerui nominantur. Ignis autem ex cōmixto ac moto humore
B corpus secūdam naturam ordinat ac disponit propter talem
 necessitatem. Nam per solidum & siccū non potest diutinos
 transitus facere, quia alimentū non habēt, per humida verō
 & mollia potest, hæc enim ipsius sunt alimentū, Inest autem
 & in his siccitas, quæ ab igne nō cōsumitur, Hæc autē inter
 se congregantur mutuo. Ignis igitur penitissimē ad intima
 obturatus, & plurimus est, & maximū exitū facit. Plurimus
 enim humor in ea parte inest, quæ venter appellatur, & exci **Venter.**
 dit inde vbi alimentū non habet foras, & exitum facit. Pluri-
 mus autē humor in ventre inest, tum propter alimenti in ge-
 stionem, tum propter concoctionem. Qui verō in reliquum
 corpus cōclusus est ignis, triplices circuitus facit. Etenim
C quod humidissimū est in igne, in his locis quæ venæ cauæ ap **Venæ.**
 pellantur, existit. In media autem horū id quod reliquum est
 aquæ congregatū stabilitur, atq; ea vocantur carnes. In sum- **Caro.**
 ma, ignis omnia quæ in corpore sunt, secundum suū ipsius
 modum exornauit, ad vniuersi imitationē. parua ad magna, **Mundi imi-**
 & magna ad parua, Ventre quidem maximū, sicco & humi- **tatio.**
 do promptuarium, vt det omnibus, & accipiat ab omnibus,
 iuxta maris facultatē quod est animalium in ipso nutritorum,
 ac nutriri solitorū alimentū, discordium verō pernicies. Cir-
 cum hunc autē aquæ frigida & humida cōgregatio: transi-
 rus spiritus frigidi & calidi, ad terræ imitationē, omnia quæ **Terra qua-**
 in ipsum incidunt alterantis, Et alia quidem consumens, alia **lis.**
 verō augens, atq; tenuis ac ignis dispersionē fecit, insuperq;
non obscuri & apparētis à cōpacto secretionē, in quo delata
 omnia

Partes
ignis.

Leges qui
sibi fecerunt
nesciunt.

omnia in apertum perueniunt, singula iuxta destinatum fa-
tum. In hoc verò triplices circuitus ignis fecit, inter se mu-
tuo intro ac foras terminantes, alios quidem ad cavitates hu-
morum Lunæ facultate, alios verò ad externam circunferen-
tiam, ad ambientem soliditatem astrorum facultate. Medij
verò & intro & foras terminantes, calidissimum ac fortissi-
mum ignem habent, qui sanè omnibus dominatur, omnia
secundum naturam gubernans, sine strepitu, tum ad visum,
tum ad tactum. In hoc Anima, Mens, Prudentia, Augmentū,
Motus, Imminutio, Permutatio, Sonus, Vigilia. Hic omnia
per omnia gubernat, & hæc, & illa, nunquam quiescens. At
verò homines ex manifestis obscura considerare non noue-
runt. Quū enim artibus vtantur similibus humanæ naturæ,
id ipsum ignorāt. Diuina enim Mens edocuit ipsos sua ipso-
rum imitari, ita vt cognoscant quæ faciunt, & non cognoscāt
quæ imitentur. Omnia enim similia sunt, dissimilia existen-
tia, & omnia concordia, discordia existentia, quæ comproba-
mus, non comprobamus, æquitatē habentia, iniqua sunt. con-
trarius est modus singulorum ei quem cōfitentur. Lex enim
& natura, quibus omnia transigimus, non confitentur quæ
confitentur. Legem enim posuerunt ac tulerunt homines
ipsi sibi ipsis, non cognoscentes de quibus tulerunt. Naturam
verò omnes dij exornauerunt. Quæ igitur homines fanciue-
runt, nunquam eodem modo habent, neq; rectè, neque non
rectè. Quæ verò dij fanciuerunt, semper rectè habet. Et recta
ac non recta intantū differunt. Ego verò Artes hominis ma-
nifestas, affectionibus & manifestis, & obscuris, similes esse
declarabo. Vaticinatio tale quid est. Ex manifestis quidem
cognoscere obscura, ex obscuris verò manifesta, & ex præsen-
tibus futura, & ex mortuis viuentia. Et ea quæ intelligi non
possunt, vates intelligunt, qui quidem doctus est, semper re-
ctè, qui verò non doctus est, aliàs aliter. Naturam hominis
etiam hæc quātum possibile est, imitantur. Vir mulieri con-
cumbens puerum facit, Hoc manifesto obscurū cognoscere
datur, quòd sic futurum est. Mens hominis obscura, cogno-
scens manifesta, ex puero in virum transit, hoc præsentī fu-
turum cognoscit. Non simile à morte vllum aliquod animal
existit, neque mortuo animal viuum. Venter quod intel-
ligi non potest, nouit. per hunc enim intelligimus quod fit
aut

- A** aut esurit. Hæ artis vaticinandi & humanæ naturæ affectiones, cognoscētibz quidem semper recte habent, verum non cognoscentibus aliàs aliter. Artis fabrilis ferrariæ instrumenta ferrum circumliquant, statu ignem fabri cogunt, & alimentum iam præsens auferunt, vbi verò rarefecerint, feriunt ac tundunt. Aquæ autem alimento ferrum rursus roboratur. Eadem patitur homo à pædotriba, præsens enim alimentum igne detrahitur, quum præ spiritu homo cogatur, rarefactus autem tunditur, atteritur, subuertitur. Aquæ autem aliunde accessione corroboratur ac fortis euadit. Et fullones idem transigunt, calcitrant, feriunt, destruētes, tundunt, trahunt destruētes, robustiora faciunt, deradentes supereminētia, & attexentes pulchriora reddunt. Eadē etiam homo perpetitur. Sutores coriarij tota in partes dissecantes, scindentes & pungentes, marcida ac lacera, sana & integra, faciunt, Et homo idem patitur. Ex totis partes secantur, & ex partibus compositis tota fiunt. Punguntur & secantur à medicis marcida, sananturque, ac viuit homo. Medicina id quod molestat, tollit, & id à quo homo ægrotat auferens, sanum facit. Natura eadem sua sponte nouit. Desidens conatur resurgere, currens conatur requiescere, & alia eiusmodi natura habet quæ medicinæ sunt. Fabri lignarij ferra secantes, alter trahit, alter protrudit, Idem autem uterque facit, & in vtranque partem tendit. Idem terebrant, alter trahit, alter protrudit, & qui premit, superiorē deorsum trahit, & minus facientes plus faciunt, naturæque hominis imitantur. Spiritus alter trahit, alter protrudit, Idem autem uterque facit, & in vtranque partem tendit. Cibi partim deorsum premuntur, partim sursum vergunt. Ab vna anima diuisa, plures & maiores, & minores & pauciores fiunt. Aedificatores ex diuersis rebus vnā concordem faciētes, sicca quidem humectantes, humida verò siccantes, & tota diuidentes, diuisa verò componentes, Si enim non sic contingeret, nihil priuatim ac proprium constitui posset: diatam humanam in hoc imitantur. Nam & in hac sicca humectantes, & humida resiccantes, tota quidem diuidunt, diuisa verò componunt. Hæc omnia diuersa ac discordia existentia cum natura concordant. Musices autem organum primum producere oportet, in quo harmonia quæ vult declarabit. Con-

vaticinatio
& medici-
na fere si-
miles sunt.

Cibariorū
potestas
multis cō-
paratur.
Domorum
structura.

Musica.

struct

structiones ex iisdem non eadem sunt, ex acuto, ex graui, no- D
mine quidem similibus, sono autem non similibus. Quæ plu-
rimum diuersa sunt, maximè concordant, & quæ minimum
diuersa sunt, minimè concordant. Si verò quis similia omnia
faciat, non inest delectatio. Plurimæ ac multiformes trans-

Coci.

mutationes, maximè delectant. Coci obsonia hominibus
parant, omnis generis diuersa commiscentes, ex iisdem non
eadem, ad hominum cibum ac potum. Quod si omnia simi-
lia facerent, non haberent delectationē, & si in eodem etiam
omnia construerent, non utique recte haberent. Pulsantur to-
ni in musica partim supernè, partim infernè. Lingua musi-

Lingua
vis.

cam imitatur, cognoscens quidem dulcedinē & acorem eo-
rum quæ allabuntur itémque dissonantia, pulsat autem fo- E
nos supernè ac infernè, & neque ea quæ supernè pulsan-
tur, si infernè pulsantur recte habent, neque quæ infernè, si supernè.

Quum autem lingua probè fuerit attemperata, symphonix
delectatio contingit. Si verò discors fuerit ac incongrua, mo-
lestia. Pellium tinctorum tendunt, terunt, pectinant, lauant.

Coriarij.

Eadem est puerorum curatio. Plicatores ac textores du-
centes in orbem fila plicant, à principio in principium defi-
nunt. Idem circuitus in corpore est, unde incipit, in hoc defi-
nit. Aurum operantes, tundunt, lauant, molli igne liquant,

Aurifices.

forti autem non conflatur, Vbi verò elaborarunt, ad omnia
vtuntur. Homo frumentum tundit, lauat, molit, & ubi igne
coxit, vtitur, & forti quidem igne in corpore non conflatur,

Panificiū.

Statuaria.

verum molli ac lento. Statuarij imitationem corporis fa- F
ciunt, anima excepta, mentem autem habentia non faciunt,
ex aqua & terra humida siccantes, & sicca humectantes, ab
his quæ superabundant detrahunt, & ad ea quæ deficiunt ap-
ponunt, ex minimo ad maximum augentes. Eadem patitur
homo, augefcit à minimo ad maximum, ex superabundan-
tibus detrahens, & deficientibus apponens, sicca humectans

Figlina.

& humida siccans. Figuli rotam versant, & neque retror-
sum, neque antrorsum procedit, sed simul in vtranque par-
tem, Vniuersi hæc imitatrix circularis existit. In eadem au-
tem quum iam circumfertur, omnis generis opera efficiunt,
vt alterum altero in nulla re simile existat. Ex iisdem homi-
nes eadem patiuntur, itémque reliqua animalia in eadem
circunferentia omnia operantur, & ex iisdem nihil simile,
iisdem

A iisdem instrumentis ex humidis sicca faciētes, & ex siccis hu-
mida. Grammatica tale quid est, figurarū compositio, quæ
signa ac notæ sunt humanæ vocis, facultas reuocandi in me-
moriā præterita, & quæ faciēda sunt declarandi. Per se-
ptem figuras notitia contingit, Eadē omnia homo transigit,
siue sciens literas, siue literarum rudis. Per septem figuras
etiam sensus hominibus contingit. Auditus sonorum, Visus
manifestorū, Nasus odoris, Lingua voluptatis & iniucundita-
tis, Os sermonis, Corpus tactus calidi aut frigidi, Spiritus
transitus intro ac foras. Per hæc cognitio hominibus contin-
git. Palæstra & pædotribæ tale quiddā docent, præuaricari

Literaria.

Sensus hu-
mani.Palæstra
& pædotribæ
institutio.
Hypocrita.
Procreatio.

B pere: violare honestissima ac turpissima. Qui hæc non facit,
malus, qui hæc facit, bonus est. Ostentatio multorum ac vul-
gi est, desipientiæ hæc esse vident, & vnū ex vniuersis bonum
iudicant, reliquos vero malos. Multi mirantur, pauci cogno-
scunt. Homines in forum progressi eadem perpetrant, de-
fraudent vendentes & ementes, Qui plurimū defraudauit
in admiratione est. Bibentes & insanientes eadem perpe-
trant, currunt, luctantur, pugnant, furātur, defraudant. Vnus
ex omnibus præfertur. Simulatores & deceptores alia ad
scientes dicunt, & alia sentiunt, Idem ereptant, & irrepunt
non iidem. Inest autē homini, alia dicere, alia facere, & eun-
dem non esse eundem, & nunc aliam habere mentem, nunc
rursus aliam. Sic quidem artes omnes cum humana natura
C communicant. Cæterū anima hominis, quemadmodum
etiam antea à me dictum est, ignis & aquæ temperamentum
habens, partes autem hominis, irrepit in omne animal quod
sanè spirat, itēque in omnem hominem, & iuniorem, & se-
niorem. Non autem similiter in omnibus augefcit, sed in iu-
uenibus corporibus, vtpote celeri circunvolutione existēte,
& corpore auctili, expassæ & attenuatæ partes illæ animæ: in
corporis augmentum cōsumuntur. In senioribus autem, vt-
pote tardo existente motu, & corpore frigido in decremen-
tum hominis consumuntur. Quæcunque autem corpora in
vigore sunt, & in ætate fœcunda, eas nutrire & augere pos-
sunt. Potentes autem homines, vt quisque plurimos homi-
nes alere potest, ita fortis iudicatur ac potēs, vbi verò defece-
runt quos alat, imbecilior censetur. Sic etiā circa singula cor-
pora

pora res se habet. Quæcunq; plurimas animas nutrire possunt, ea fortiora sunt, ubi verò hæ discesserint, imbecilliora.

Quicquid igitur in aliud corpus ingressum fuerit, non au-
gescit. Quicquid verò in fœminam, augetur, si ea quæ ipsi
congrua sunt, contingant. Discriminantur autem partes &
augescunt simul omnes, & neque prius alteræ alteris, neque
posterius. Verùm maiores natura priores apparent minori-
bus, quum non priores existant. Non autem in æquali tem-
poris spatio omnes fœtus exornantur, sed alij citius, alij tar-
dius, prout singuli & ignem & alimentum fuerint nacti. ali-
qui itaque in quadraginta ac tribus diebus scaturiunt ac for-
mantur, alij in quatuor mensibus. Similiter etiam vitales
fiunt ac gignuntur, alij citius, septimo mense perfectè: ali-
qui tardius, perfectè nono mense in lucem prodeunt, & osten-
dunt se temperamentū habere, quod semper habebunt. Ma-
sculi igitur & fœmellæ hoc modo gignuntur, quantum eius
fieri potest. Cæterum fœmellæ ab aqua magis, & à frigidis
ac humidis & mollibus augescunt tum cibus, tum potibus,
itemque studiis ac exercitiis. Masculi verò magis ab igne, à
ficcis videlicet ac calidis cibus & reliqua dicta. Si igitur fœ-
mellam parere velit, diata ad aquam vergente vtendum est.
Si verò masculum, exercitiis ac victu ad ignem tendente vte-
tur. Et non solum virum hoc facere oportet, sed etiam mu-
lierem. Non enim solum quod à viro secernitur auctile est,
sed etiam quod à muliere, ob hanc sanè causam. Vtraq; qui-
dem pars sufficientem motum non habet ad humoris mul-
titudinem, vt quod influit consumat, & propter ignis debili-
tatem coagmentantur. Quum verò ambæ coinciderint, mu-
tuo inter se incurrunt & obuoluuntur, ignis ad ignem, & aqua
similiter. Siquidem igitur in sicco loco circunvoluitur
ignis, coillapsam aquam superat, & ab hoc ignis augetur, ne
ab illabente vnda extinguatur, aliūque accedentem susci-
piat ac sibi consociet. Si verò in humorem inciderit, statim
ab initio extinguatur ab illabente vnda, & in minorem or-
dinem dissoluitur. In vna autem die vniuscuiusque mensis,
consociare ac superare ea quæ accedunt potest, & hoc si coin-
ciderint ab vtrisque in vnum locum. Consistere autem pos-
sunt inter se & fœmella & masculus, propterea quod anima
quidem idem est in omnibus animatis. Corpus autē vniuf-
cuiusque

Conforma-
tio mem-
brorum.

19. infra
3 dies

Qui mas-
& fœmella
gignantur.

Quid in
conceptus
cupidine
agendum.

Procreatio
diuersa.

A cuiusque differt. Anima quidem igitur semper similis, & in maiore, & in minore. Non enim alteratur neq; per naturā, neque per necessitatem. Corpus autem nunquā idem in vllō aliquo est, neque secundum naturam, neque ex necessitate, propterea quod partim secernatur in omnia, partim permisceatur ad omnia. Si quidē igitur mascula corpora ab vtrisque secreta fuerint, augescunt pro re præsenti, & fiunt hi viri animis splendidi, & corpore fortes, si non à diata postea detrimētum sentiant. Si verò à viro quidem masculum seceratur, à muliere verò fœmineum, & superauerit si ita cōtingat masculum. (Genitura enim ammiscetur ad fortiorē aut debiliore, Non enim habet ex præsentibus aliquid ad quod familiarius secedere possit. Suscipit enim parua maiorem, & maior minorem. In commune autem super hæc quæ adfunt dominium exercent) corpus sanè masculum augescit, fœmineum vero minuitur, & in aliam sortem secernitur. Et hi quidem minus prioribus splendidi fiunt, tamen quia masculum à viro superauit, viriles euadunt, & hoc nomē meritò habent. Si verò à muliere quidem masculum secretū fuerit, à viro autem muliebri, superauerit autem masculū, augescit eodem modo sicut prius, fœmineū verò minuitur. Et fiunt hi Androgyni, id est viri effœminati, atque sic rectè appellantur. Tres quidē igitur hæ sunt generationes hominū, differentes in eo quòd magis aut minus tales sint, propter partium aquæ temperamentū, & alimenta, & institutiones, ac consuetudines declarabo autē in progressu sermonis etiā de his. Caterum fœmella eodem modo gignitur. Si enim ab vtrisque fœmineū secretum fuerit, fœminosissimæ ac ingeniosissimæ fient, Si verò à muliere quidem fœmineum, à viro autem masculum, superauerit autem fœmineum, audaciores quidem prioribus fient, veruntamen ornatae ac modè ratae etiam ipsæ. Si verò à viro quidem fœmineum, à muliere verò masculum secretum fuerit, & fœmineū superauerit, augescit eodem modo, & fiunt hæ audacioces adhuc prioribus, & viriles ac viragines nominantur. Si autem quis non credat animam animæ admisceri, demens est. Si quis enim carbones ardentes ad ardentes adiiciat, fortes ad debiles, & alimentum ipsis præbuerit, simile corpus omnes exhibebūt, & alter præ altero non cognoscitur, sed in qualicumque corpore

Clarus vir
quando gi-
gnatur.

Semimares

Fœmellæ
procreatio.

Similitu-
do animæ.

**Gemello-
rū procrea-
tio.**

**Cur simi-
les.**

**Superfoeta-
tiones quo-
modo fiāt.**

**Qui sani
diutius
perseue-
rent.**

pore ignem susceperint, tale in omnibus erit. Vbi verò præ-
sens alimentum consumpserint, secernuntur ac obscurantur. **D**
Idem hoc anima hominis patitur. At verò quomodo gemini
nascantur, hoc sermone declarabo. Equidem natura vtero-
rum in foeminis ut plurimum in causa est. Si enim similiter
in utranque partem iuxta osculum dispositi à natura fuerint,
& similiter hauerint, & à purgatione siccantur, alere possunt,
si semine viri conceperint ita ut statim discindatur. Sic enim
necesse est dispergi in utrumque; utrumque similiter. Siquidem igitur
multum semen ab utrisque; & forte secretum fuerit, in utrisque
locis augeri potest, dominium enim habet in alimentum quod
accedit. Si verò aliter contingat, gemini non fiunt. Quum itaque
masculum ab utrisque; secretum fuerit, necessarium est in utrisque **E**
masculos gigni, quum verò foemineum ab utrisque; foemellæ
fiunt, quum autem alterum foemineum, alterum masculum fue-
rit, utrumque altero preualefcet, id ipsum augetur pro ea ratione.
Similes porro inter se fiunt gemelli, ob hanc causam. Pri-
mum quidem quod æquales sunt loci in quibus augetur.
Deinde quod simul secreti sunt. Postea quod iisdem alimentis
augetur, vitalesque in lucem prodeunt. Cæterum superfoe-
tationes hoc modo fiunt. Quum uteri calidi & sicci natura
fuerint, ipsaque; mulier eiusmodi, & semen calidum ac siccum
illapsum fuerit, non sit amplius ulla aliqua humiditas in ute-
ris, quæ semen superillabens contineat. Quapropter consistit
ab initio ac vivit, perseverare autem non potest, sed etiam id
quod iam adest insuper corrumpit, quia non eadem utrisque **F**
conferunt. Etenim quod tenuissimum est in aqua, & quod ra-
rissimum in igne, si in hominis corpore temperamentum ac-
ceperint, sanissimum habitum constituunt. Propterea quod
neque in temporum anni maximis mutationibus, neque in regio-
num permutationibus, neque in ciborum ac potuum alteratio-
nibus, aqua dissolutissima euadit in aquæ impetuosius incursum,
neque ignis in ignis impetu. Possunt enim ambo & generatio-
nem & satietatem plurimam suscipere. Aë molliissimum ac ra-
rissimum, plurimum temperamentum suscipit, ac optimum eua-
dit. Eodem modo etiam quod tenuissimum est in aqua, ac rarif-
simum in igne, ubi temperamentum acceperint. Qui igitur hanc
naturam habent, sani perseverant omni tempore usque; ad qua-
dragesimum annum, aliqui vero etiam usque; ad extremam sene-
ctutem

Actutem. Qui verò à quadragesimo anno, à morbo aliquo cor-
repti fuerint, nunquam ferme euadunt. Quæcunq; autē cor-
pora ignis fortissimi, & aquæ densissimæ temperamentum
acceperint, fortia & robusta fiunt, verū multa custodia opus
habent. Magnas enim transmutationes in vtranq; partē ha-
bent, & in aquæ incurlibus in morbos incidunt, & in ignis
cōsimiliter. Qui igitur eiusmodi naturā habet, eū victu vti
conducibile est tēporibus anni contrario. Et aquæ quidē in-
cursu cōtingente, vti oportebit eū ab his quæ ab aqua sunt,
paulatim pro tēporum ratione discedendo. Porro vbi aquæ
crassissimæ & ignis tenuissimi in corpore mixtura facta est,
talια cōtingunt, ex quibus frigidam & humidam naturā co-

Bgnoscere oportet. Talia enim corpora in hyeme morboſio-
ra sunt, quā in æstate, & in vere quā in autūno. Cæterū
quod ad ætates attinet, Sanissimi ex talibus pueri sunt. De-
inde adoleſcētes. Morboſissimi autem senes, & his vicini, &
hæ naturæ cito senescunt. Talibus in victu cōferunt quæ cal-
faciunt ac siccant, tum in cibis, tum in exercitiis, & externas
corporis partes magis quā internas exercere conducit. Si
verò humidissimū in igne, & densissimum in aqua, in corpo-
re mixturā acceperint, ex his humidā ac calidam naturam
cognoscere oportet. Laborant quidem ex morbis huiusmodi
maximè in vere, minimè in autumnno, quia in vere excessus
est humiditatis, in autumnno vero symmetria & moderatio
siccitatis. Ex ætatibus verò morboſissimæ sunt iuniores. Cor-

Cpora autem citò augescunt, & tales distillationibus obnoxij
sunt. His cōducit exhibere quæcūq; siccant ac frigefaciūt, &
in cibo, & in potu ac laboribus. Verū labores intra corpus
his facere maximè cōfer. Si verò mixturā acceperint fortis-
simum in igne, & tenuissimū in aqua, sicca & calida est natu-
ra, & talibus morbus in ignis accessionibus contingit, sani-
tas verò in aquæ. Et in ætatibus vigētibus ad carnis bonam
habitudinē, morboſissimi sunt, sanissimi autē senes. Ita etiā
vtrisq; proximi. Diætæ quæ frigefaciunt ac humectant, & ex
laboribus qui minimè excalfaciunt ac colliquant, plurimā
frigiditatē exhibebunt. Huiusmodi naturæ viuacissimæ ac
sanissimæ existunt. Si autem mixturam acceperint corpora
ignis rarissimi, & aquæ siccissimæ, sicca & frigida talis natu-
ra est, morboſa quidē in autūno, sana verò in vere, & vicinis

Quæ ætas
sana vel cō-
trā.

Quæ cuiq;
ætatī cōue-
niant.

Naturarū
cognitio.

Hippocratis Liber I.

temporibus. Similiter ætates ad annos quadraginta morbo-
se, pueri sanissimi, Ita & vtrifq; proximi. Diætæ his cōferūt
quæ calidæ existentes humectāt, & labores sensim adhibiti
leuiter calfacientes, & non multū ab his quæ sunt auferētes.
De naturæ igitur cognitione sic à prima constitutione co-
gnoscere oportet. Caterū ætates ipsæ ad seipsas hoc modo

Cognitio
ætatum.

habent. Puer itaque ex calidis & humidis tēperatus est, quia
ex his constitutus est, & in his augmētum accepit. Humidif-
sima igitur & calidissima sunt corpora proxima generatio-
ni, & augescunt quā plurimū, & quæ his proxima sunt
eodem modo. Adolescēs autē calidus quidem est, quia ignis
impetus aquæ dominatur. Siccus autē, quia humidū ex pue-
ro consumptum est, partim in augmētū corporis, partim in
motum ignis, partim præ laboribus ac exercitiis. Vir quum
steterit iam corpus, siccus est, & frigidus, quia caliditatis im-
petus non ampliū dominatur, sed stat corpus ab augmento
quiescens, ac perfrigeratū. Verūm ex adolescenti ætate sicci-
tas inest. Ab insequenti autē ætate & aquæ accessu, humidi-
tatē nō habet, quapropter ex siccis & frigidis exuperatus est.

Quomodo
inter sese
ætates dif-
ferant.

Cur mares
fæminis ca-
lidiores
sint.

Prudentia
qui præ-
stent.

Qui pru-

Senes autem frigidi sunt & humidus. Quia ignis quidē re-
cessus cōtigit, aquæ autem accessus, & siccōrū quidem subla-
tio, humidorum autem status. Ex omnibus autem masculi
calidiores sunt & sicciores, fæminæ verò humidiores ac fri-
gidiores. Propterea quod ab initio vtrique in talibus geniti
sunt, & à talibus augescūt. Vbi verò in lucē editi sunt mascu-
li, victu ac diætā laboriosiore vtuntur, vt excalescant ac resic-
centur. Fæminæ verò humidioribus ac pigrioribus diætis
vtuntur, & caliditatis purgationē ex corpore singulis men-
sibus faciunt. Porro de animæ sapientia ac desipientia, hoc
modo se res habet. Quod humidissimum est in igne, & sic-
cissimum in aqua, si in corpore tēperamentū acceperint, sa-
pientissima sunt. Quia ignis quidem habet humiditatē ab
aqua, aqua autem siccitatē ab igne, vterq; autem sic sufficiē-
tissimus est. Neq; ignis alimēti indigentior multū procedit,
neque aqua motus indiga multū leuis redditur. Sic itaque
vtraque & per se sufficientissima sunt, & inter se permixta.
Quod enim minimē vicinis indiget, hoc maximē præsentibus
obtēperat, velut ignis qui minimē mouetur, nō præ ne-
cessitate, & aqua quæ maximē, nō præ violētia. Ex his autē
anima

A anima temperata, sapientissima est, & memoria valentissi-
ma prædita. Si verò aliquo ascitamento vtens, alterutrū ho-
rum augeſcat aut contabeſcat, deſipientiſſima redditur, pro-
pterea quòd quū ſic habeant ſufficientiſſima exiſtunt. Si au-
tem ignis ſinceriſſimi, itémq; aquæ temperamētum anima
fortiatur, ſit autē ignis paulo inferior ac defectuoſior quàm
aqua, ſapientes quidē ſunt etiā hi, verū defectuoſiores quā
in priore temperamento; propterea quòd ignis ab aqua ſu-
peratus: & tardiore motum faciēs, ſegnius ſenſibus allabi-
tur. conſtantes autem cum manſuetudine ſunt eiufmodi ani-
mæ, ad quācunq; tandem rem animum applicuerint. Si ve-
rò recto victu vtantur, & ſapientiores & acutiores præter na-
turam fieri queant. Talibus confert victu vtī ad ignem ma-
gis tendente, & non repletionibus, neque ciborum, neque po-
tuum. Curſibus itaque vtendum eſt velocibus, quo & corpus
humore euacuetur, & humor amplius citius ſiſtatur. Luſtis
autem & fricationibus & eiufmodi exercitiis vtī non condu-
cit, vt ne meatus cauioreſ redditi repleantur. A talibus enim
animæ motum grauari neceſſe eſt. Confert & deambulationibus
vtī, tum à cœna, tum mane, itémque à curſibus. A cœ-
na quidem, quo alimentum ſiccius anima ſuſcipiat ab ingre-
dientibus ac ingeſtis. Manè verò, quo tranſitus humoris eua-
cuentur, & meatus animæ non obturentur. Ab exercitiis ve-
rò, vt ne in corpore relinquantur quod ſecretū eſt à curſu, ne-
que animæ commiſceatur, neque tranſitus obturet, neque a-
limentum conturbet. Confert & vomitibus vtī, quo corpus
depurgetur, ſi quid defectuoſius labores tranſegerunt. à vo-
mitu autem paulatim adiiciendo cibus offerendus eſt, mini-
mum ad quatuor dies. At vero vngi conducibilius eſt quā la-
uari. Coitu vtendum eſt, aquæ accēſibus cōtingentibus, fre-
quentiore, in ignis autē impreſſionibus, pauciore. Porro ſi
in aliqua anima defectuoſiorem vim ignis accipiat quàm
aqua, eam tardiore eſſe neceſſe eſt. & appellantur tales ſto-
lidi. Nam vt tardiore exiſtente circuitu, ſenſus paulatim al-
labuntur, & qui acuti exiſtunt parum cōmiſcentur, propter
circuitus tarditatē. Senſus enim animæ qui per viſum ac au-
ditum contingunt acuti ſunt, qui verò per tactum, tardiores
& facilius percipiuntur. hos quidem igitur percipiunt etiā
tales nihilominus, velut ſunt frigida & calida ac conſimilia.

Cōſtantes.

Horum vi-
ctus & exer-
citatio.Cur his plu-
rimum la-
borandum
ſit.Diuerſæ
naturæ.
Ignis & a-
quæ tempe-
ratura di-
uerſa ſiūt.

Hippocratis Liber I.

Quæ verò per visum aut auditum percipere oportet, quæ nō prius sciunt, percipere non possunt. Si enim non commota fuerit anima ab igne allabente, non percipere poterit quale quid tandem sit. Tales igitur animæ non perpetiuntur hoc ob celeritatem, Si autem recta diætā vtatur, etiam talis homo melior fieri possit. Conferunt itaque huic eadē quæ priori, Verūm ficcioribus ac paucioribus cibis vtetur, laboribus autem pluribus & acutioribus ac velocioribus. Cōfert & fomentis vti, & vomitibus à fomentis, & exhibitionibus ciborum à vomitibus ex longiori tempore, si defectuosius contingerint vomitus. Et sanè hæc faciens, sanior ac sapientior fuerit. Si verò ampliùs adhuc superetur ignis à præsentī aqua, hos iam alij delipientes, alij attonitos huc stupidos appellāt. Et hæc insanix quædam species tardior existit. hi plorant ne mine molestante aut verberante, formidantque non formidanda, & tristantur in rebus nihil ad se pertinentibus, & sentiunt ea quæ nō conueniunt sapientibus. Confert itaque his, fomentis vti, & à fomentis veratrīs expurgari, ac diætā vti quam prius dixi, indigētque talis homo attenuatōe pulmonis ac ficcitate. Si autem aqua defectuosiorē vim accipiat quā ignis, quum alias sincerum temperamentum habeant, sani sunt homines corporibus, & sapientes. Talis autem anima citò percipit allabentia, & non sæpe ab vna re ad aliam transit. Natura quidē igitur, talis animæ bonæ est. Melior autem reddetur rectæ diætæ vsu, & peior prauæ. Cōfert huic, diætæ vsus ad aquam magis vergentis, ita vt excessus vitet & ciborum, & potuum, & laborum. Vtetur & cursibus curuis & rectis reuertentibus, luctis que ac reliquis exercitiis, ita vt in nullo excessum faciat. Si enim sanum fuerit corpus, & non ab aliquo alio perturbetur, animi temperamentum sapiens existit. Si verò ampliùs aquæ vis ab igne superetur, tali homini necesse est tantò acutiorem animam esse, quanto citius mouetur, & ad sensus citius allabi, verūm minùs constantem priore, propterea quòd iudicat ea quæ obueniunt, & in pulmonem procedit ob celeritatem.

Confert tali homini diætā vti magis ad aquam vergente, quā priori, & maza magis quā pane, & piscibus magis quā carnibus, & potu aquosiore, & Venere rariùs vtetur, & laboribus qui sunt maximè secundum naturam quā

Nutricatus
multum fa-
cit.

Attoniti si-
ue stupidi.
Tardus fu-
ror.

Cum ignis
aquam su-
perat qua-
les fiant.

Nature hu-
ius nutrica-
tus.

Diuersæ na-
turæ & nu-
tricio.

- A** quàm plurimis, violentis autem uti non est necesse. Utetur & vomitibus paucioribus ex repletionibus, quo corpus quidem euacuetur, quàm minimè vero caleseat, Cōducit etiam talibus ad sapientiā, ut minimè carnosī sint. Nam ad carnis bonam habitudinem, ardoris inflammationē fieri necesse est. Quum autem tale quid huiusmodi anima perpetitur, ad insaniam adigitur, ex superata aqua adacta. Talibus confert actiones obire ac transigere à cibo accepto magis quàm ieiunīs. Stabilior enim redditur anima alimento commo-
do ammixto, quàm alimenti indiga. Si verò adhuc amplius superetur aqua ab igne, talis anima valde acuta est, & tales necesse est somnia videre, vocant autem ipsos subfuriosos.
- B** Nam res valdè propinqua insanīæ est. Etenim à breui & incommoda inflammatione insanīunt, & in ebrietatibus, & carnis bona habitudine, & præ carniū esu. Verùm talē oportet ab his omnibus abstinere, itēmq; à reliqua repletionē, ac exercitiis violentis. In victu utendum est Maza vino dulci non subacta, & oleribus coctis, sed non purgantibus, & pisciculis ex muria, & aquam bibere præstantissimum est, si fieri possit, sin minus, vinum molle & album quod aquæ sit proximum. Deambulationibus quoq; multis mane utendum, à cœna verò satis est exsurgere, quo cibi quidem nō resicentur à deambulationibus post cœnā, corpus autem euacuetur à matutinis. Lauare autem magis cōducit aqua tepida circumaffusa, quàm vngi. Confert & in æstate interdū somno uti breui nō multo, ut ne corpus ab anni tempore resicetur. Conueniens est etiam vere veratris purgare, fomentis antea præparatos, deinde sensim ad diætā inducere, & neque hunc ieiunium actiones obire oportet. Et ex hac sanè cura, huiusmodi anima sapientissima fuerit. Sapientis quidem igitur ac desipientis animæ hoc temperamētum causa est, quemadmodum à me scriptum est, potestque ex diætā & melior, & deterior fieri. Cæterum cursus impetu igne præualecente, impossibile forte fuerit aquæ aliquid apponere, Similitēq; aqua præualente in temperamento, ignem augere. Ex his verò & sapientiores & desipientiores animæ fiunt. At verò talium non amplius temperamētum est, quā-
lis est, Iracundus, Segnis, Dolosus, Simplex, Infestus, Beneuo-
lus. Talium omnium natura meatuum per quos anima

Quàm va-
ria hæc na-
tura à cæte-
ris.

Qui nutri-
catus.

Quæ nulla
cura mutē-
tur.

Hippocratis Liber I I.

meat caussa est, per qualia enim vasa secedit, & ad qualia D
allabatur, & qualibus ammiscetur, talia sapiunt. Ob id itaq;
impossibile est talia ex diætâ transmutare. Naturam enim
obscuram transformare non est possibile. Similiter autem
& vocis qualiscunque tandem fuerit meatus spiritus caussa
sunt, per qualescunque enim aer mouetur, & ad qualescunq;
allabatur, talem necesse est esse vocem: & hanc quidem tum
deteriorem, tum meliorem facere possibile est, quia leuio-
res ac breuiiores meatus spiritus facere possibile est. Verùm
illa ex diætâ alterare impossibile existit.

HIPPOCRATIS^E

COI DE DIAETA SIVE VI-

CTVS RATIONE, LIBER II.

IANO CORNARIO ME-

DICO PHYSI-

CO INTER-

PRETE.

*

Regionum
qualitas.



Loca alta.

REGIONVM singularum situm & natu-
ram hoc modo cognoscere oportet. Et in
summa res hoc modo se habet. Regio F
ad meridiem sita calidior est, & ficcior,
quàm ea quæ ad septentriones iacet, pro-
pterea quòd soli propinquior est. Et in his
regionibus necesse est & hominum genera, & nascentia ex
terra, ficciora ac calidiora & fortiora esse, quàm in contra-
riis, velut Libyca gens ad Ponticam, & vtrisque vicinæ. Ipsa
autem loca iuxta seipsa hoc modo habent. Alta & squallida
& ad meridiem sita, ficciora sunt quàm campestria & æqua-
liter sita, propterea quòd pauciores humores habent, Illa
enim stationem pro aqua pluuiâ non habent, hæc habent.
At verò lacustria ac palustria humectant & calfaciunt. Et
calfaciunt quidem quia caua sunt & circumdata, & non per-
flantur: humectant autem, quia nascentia ex terra quibus
homines

A homines aluntur, humidiora sunt, & spiritus quem attrahimus crassior est, propter aquæ stationem ac immobilitatem. Verùm caua loca & non aquosa, siccant, & calfaciunt.

Et calfaciunt quidem quia caua sunt & circumdantur. Siccant autem, tum propter alimenti siccitatem, tum quòd spiritus quem inspiramus siccus existens, humorem ex corporibus trahit in alimentum sibi ipsi, quum non habeat alium humorem ad quem allapsus nutriatur. Vbi autem regionibus montes adiacent ad austrum, in his squallidi austri & morbosi afflant. Vbi autem ab Aquilone montes adiacent, in his aquilones perturbant ac morbos faciunt. Vbi verò ab Aquilone caua loca vrbibus adiacent, ab æstiuis ventis calida & morbosa hæc regio existit, propterea quòd neque Aquilo perflans puram spiritus inductionem exhibet, neque ab æstiuis ventis perfrigeratur. Caterùm insulæ propinquæ continenti tempestuosiores sunt & agrè in ipsis hybernamus. Marinæ verò hyeme tepidiores sunt, propterea quòd niues & glacies incontinenti stationes habent, & ventos frigidos in vicinas insulas mittunt. Verùm insulæ intra pelagus positæ non habent in hyeme niuium stationem. Porro de ventis quam naturam ac facultatem singuli habent, hoc modo cognoscere oportet. Naturam quidem habent omnes venti humectandi ac frigefaciendi, tum animalium corpora, tum nascentia ex terra, ob hanc causam, Necesse est omnes ventos spirare à niue, à glacie, & gelu vehementi, & fluminibus, & stagnis, terræque humecta ac perfrigerata. Et fortiores quidem ventos, à maioribus & fortioribus, debiliores verò à minoribus & debilioribus. Quemadmodum enim animalibus spiritus inest, Sic etiam aliis omnibus, aliis quidem minor, aliis verò iuxta magnitudinem. Naturam quidem igitur habent humectandi ac frigefaciendi omnes venti, Verùm propter situm regionum ac locorum, per quæ venti ad singulas regiones accedunt, diuersi inter se fiunt, frigidiores, calidiores, humidiores, sicciores, morbosiores, salubriores, Singulorū autem causam sic cognoscere oportet. Boreas siue aquilo frigidus spirat ac humidus, quia progreditur à talibus regionibus, meätque per tales locos, ad quos non accedit sol ipse, neque aerem resiccans, humorem ebibit ac exhaurit, Quare

Qualitas
insularum.

Ventorum
natura.

Septentrio.

Auster.

Qualis sit
auster.Qui venti
boni sint.Loca non
sana.Cur medi-
terranei vē-
ti ficci.Montani
venti.

ad terram habitabilem accedit suam ipsius vim habens, vbi non per regionis situm corrumpitur. & his quidem qui proximè habitant frigidissimus est, qui verò remotissimè, minimè. Auster autem à similibus aquiloni natura regionibus spirat. Ab Australi enim polo spirans, & à niue multa glacièque ac gelu fortibus procedens, necessariò his qui prope ipsum illic habitant talis spirat, qualis nobis est Aquilo. Verùm omnem non item similis accedit regionem. Nam quum per solis iter & in meridiem spiret, humiditas ipsius à sole ebibitur, & resiccatus rarefcit, quapropter necesse est ipsum calidum ac siccum huc accedere. In proximis igitur regionibus necesse est ipsum talem vim calidam ac siccam exercere. & hoc sanè in Libya facit, Nam & terræ nascentia exarescunt, & homines latenter resiccat, Quum enim non habeat nec mare, nec fluuium vnde humiditatem accipiat, ex animantibus ac plantis humorem exhaurit. Vbi vero pelagus transit, tanquam calidus & rarus existens, multa humiditate regionem in quam illabitur implet, & necesse est ipsum calidum ac humidum esse, vbi non regionum situs alterius qualitatis causa existat. Eodem modo etiam aliorum ventorum facultates se habent. Cæterum iuxta singulas regiones venti hoc modo se habent. Venti ex mari in regiones illabentes, sicciore quodammodo sunt. Qui verò à niue aut glacie, aut stagnis aut fluminibus procedunt, omnes humectant ac frigefaciunt, tum plantas, tum animalia, & sanitatem corporibus exhibent qui non frigiditate superexcellunt. Hi enim lædunt, propterea quòd magnas mutationes calidi ac frigidi in corporibus inducunt. Hæc autem perpetiuntur hi qui in regionibus habitant palustribus ac calidis, prope flumina magna. Reliqui verò venti qui à prædictis spirant viles sunt, tum aerem purum ac sincerum exhibentes, tum animæ calori humiditatem præbentes. Quicumque verò venti ex terra accedunt, eos necesse est sicciore esse, tum à sole, tum à terra resiccatos, Quum autem non habeant venti vnde alimentum trahant, à viuētibus humorem trahentes, & plantas & animalia omnia lædunt. Et quicumque venti relictis montibus ad vrbes accedunt, non solum siccant, sed etiam turbant spiritum quem inspiramus, & corpora hominum morbosa faciunt. Naturā quidem igitur & vim

A & vim singulorum sic cognoscere oportet. Quomodo autem ad singulos se præparare oporteat, in sermonis progressu declarabo. At verò ciborū ac potuum singulorum vim, tum eam quæ secundum naturam est, tum eam quæ per artem accessit, hoc modo cognoscere oportet. Quicunque igitur *Quæ non rite priores digessere.* in summa dicere aggressi sunt, aut de dulciū, aut pinguium, aut salforum, aut alterius cuiusdā consimilis facultate, non rectè iudicant. Non enim eandem vim habent, neque dulcia inter se, neque amara, neque vlla aliqua eiusmodi. Multa enim ex talibus sunt quæ & aluum emolliunt, & sistunt, siccantque & humectant, Similiter autem etiā in reliquis omnibus. Sunt & quæ adstringunt, itémque aluum mouēt, & vri

B nam cient. Sunt quæ neutrum horum faciunt. Similiter & ex calfacientibus ac reliquis omnibus, alia aliā facultatem habent. De omnibus quidem igitur impossibile est qualiānam sint declarare, Verūm quam singulatim vim habeāt, docebo. Ordeum natura quidem frigidum est & siccum. *Ordeum.* Inest & purgatoriū quiddā à succo pælearum. Eius signum habebis si voles ordeum non purgatū coquere, Purgat enim is succus fortiter, Si verò decorticatedum coxeris, perfrigerabit magis ac aluum sistet. Quum autem tostum fuerit, humor quidem purgatorius præ igne perit. Frigiditas autem & siccitas relinquitur. Quæcunque verò perfrigerare ac siccare oportet, id ipsum polentæ transigunt. *Maza-* Maza omnis generis sic vtimur, facultatem autē habet maza hæc talem, farina

C rinæ ex toto collatæ alimentum quidem minus habent, verū magis per aluum secedunt. Puræ autē magis nutriunt, minùs verò per aluum secedunt. Maza prius subacta, resperfa, vino dulci non emollita, leuē facit, & per aluum secedit, ac frigefacit. Et frigefacit quidem, quia frigida aqua madefacta est, per aluum autem secedit, quia cito concoquitur. leuē verò facit, quia multum alimentum cum flatu foras excernitur. Quum enim transitus alimenti angustiores sint, aliud insuper accedens non suscipiunt, & quod quidem cum flatu attenuatum est, foras excernitur, quòd vero intus manet, flatum inducit, & partim supernè eructatur, partim infernè secedit. Multum itaque alimentum à corpore diffatur. Si verò velis mazam statim vt subacta est exhibere, talis resiccatoria est. Quum enim polenta sicca existat, & aqua sit madefacta

madefacta, atque sic præparata in ventrem illabatur, humo- D
rem ex ipso trahit calidum existentem. Solet enim calidum
attrahere frigidum, & rursus frigidum calidum. Cōsumpto
autem humore ex ventre necesse est siccari. Aqua verò quæ
vnà cum maza ingressa est, frigefacit. Quæcunque igitur sic-
care oportet aut frigefacere, aut ventris profluuium diffusum,
aut alia quapiã eiusmodi caliditate, maza efficax existit. At
verò siccam, vino dulci emollita ac trita maza, siccatur quidem
non similiter, propterea quòd vehementer est adstricta, ali-
mentum verò plurimū corpori præbet. Nam vt leniter lique-
scentis alimentū transitus suscipiunt. Per aluum quidem igi-
tur tardè secedit, flatum autem non inducit, neq; eructatur.
Quæ verò & aqua, & vino dulci emollita ac prius subacta E
est, nutrit quidem minus, per aluum autem secedit, & flatum
magis inducit. Cyceon autem solum in aqua quidem frige-
facit ac nutrit, in vino verò calfacit ac nutrit, & aluū sistit. In
melle autē calfacit quidem minus ac nutrit, per aluum verò
magis secedit, si non meracū mel fuerit: sin minus, non sece-
dit, sed aluum sistit. In lacte verò bene alunt omnes Cyceo-
nes, hoc est farina. Veruntamē ouillum aluū sistit, caprinum
verò magis per aluū secedit. Bubulum verò minus. Equi-
num autem & asininum magis secedunt. Triticum fortius
est ordeo & magis nutrit, minus autē per aluum secedit, tum
ipsum, tum succus. Panis autem ex tota farina collata, siccatur
& per aluum secedit. Purus autem magis nutrit, minus verò
secedit. Ex ipsis porrò panibus, fermentatus quidem leuis F
est & secedit. Et leuis quidem est, quia à fermenti acore hu-
miditas consumpta est, quæ sanè alimentum existit, secedit
autem, quia cito concoquitur. Non fermentatus secedit qui-
dem minus, nutrit autem magis. Qui succo subactus est, le-
uior est, & multum nutrit, ac per aluum secedit. Nutrit, quia
purus est, leuis est, quia leuissimo subactus est, & fermentatus
ac tostus ab eodem est: per aluū secedit, quia passus, & aluum
mouente tritici parte, permixtus est. Ex ipsis autem pani-
bus maximi maximè alūt, propterea quod minimè exuritur
humiditas ab igne. Et furnacei panes magis alunt quàm fo-
carij & veruarij, propterea quod minus exuruntur ab igne.
Clibano autem cocti & subcinericij siccissimi sunt, hi qui-
dem propter cinerem, illi verò per testam humore priuati.
Simil

Cyceon.

Lac.

Triticum.

Panis va-
rietas.

A Similaginei omnium horū fortissimi sunt, Et adhuc magis qui ex alica fiunt, valdeque nutriunt, verum non similiter secedunt. Farina pura in aqua pota frigefacit, & lotura polli-

Farina.

nis tritici. Furfurum succus coctus, levis, per aluum secedit. Verum farinæ in lacte datæ magis per aluum secedunt, quàm in aqua, propter serum, & maximè inter aluū mouen-

tia numerantur. Quæcunq; verò farinæ cum melle & oleo coquuntur, aut assantur, omnes æstuosæ sunt, & ructum ciēt. Et ructum quidē ciēt, quia probè alentes non secedunt. A-

Similago.

B cedunt. Trygis, id est, Tragus siue olyra, leuior est tritico, & quæ ex ipsa fiunt similiter vt ea quæ ex tritico parantur, & magis per aluū secedunt. Avena comesta humectat ac per-

Trygis.

frigerat, itēque in sorbitione accepta. Polentæ ac farinæ recētes sicciores sunt vetustis, quia igni & præparationi propinquiores existunt. Vbi verò vetustæ fiunt, calor exhalat, & frigiditas inducitur. Panes calidi siccant, frigidi minùs, gra-

Avena.

Polentæ
recentes.

cilitatem autem quandam inducunt. Fabæ alunt, aluum sistunt, & inflant. Inflant, quia meatus aliud insuper accedens alimentum non suscipiunt. Aluum sistunt, quia totam ali-

Panes ca-
lidi.

Faba.

menti fecem habent. Pisa inflant quidem minùs, per aluum autē magis secedunt. Ochri siue eruiliæ, & dolichi siue phasioli ac filiquæ, hi magis per aluum secedunt, minùs inflant, & probè alunt. Cicer album per aluum secedit, & per vri-

Pisum.

Ochri.

Cicer.

C nam eiicitur, & alit. Et alit quidem, carnosum in ipso. Per urinam verò eiicitur, dulce, per aluum autem secedit, saluginosum. Milij grana ac paleæ siccant, & ventrem sistunt, & cum ficibus, fortibus doloribus conferunt. Ipsum autē Mi-

Miliū.

lium coctum alit, non tamen aluo secedit. Lentæ æstuosæ sunt & turbatiuæ, & neque per aluum secedunt, neque ipsam sistunt. Eruum aluum sistit, & robustum est, & crasse facit, & explet, & boni coloris hominem facit. Lini semen come-

Lens.

Eruum.

Linū.

stum aluum sistit, habet & quiddam frigefactorium. Hormini semen consimilia lini semini facit. Lupini natura robusti sunt & calidi, verum per præparationē leuiiores ac frigidiores fiunt, & aluo secedunt. Irio humectat & aluo sece-

Horminū.

Lupinum.

Irio.

dit. Cucumeris semen per lotiū magis abit quàm secessum. Cucumis.

Explet

Cnicus.
Papauer.

Caro cuius-
que anima-
lis.

Caro auiū.

Explet autem & crassescit. Et secedit quidem per aluū, propter paleam externā, explet autem & crassescit, propter carnem. Lotum verò secedit quidem verum minus, crassescit autem & explet magis, humectat autem & vrit, propter pingue & oleosum. Cnicus aluum mouet. Papauer aluū sistit, magis autem nigrum hoc facit, sed & album idem agit, alit autem & robustum est. Horum porro omnium succi carnis aluum mouet, oportet itaq; in præparatione id obseruare, ut quæ siccare velis, ab his succos detrahas, & carne vtaris. Quæ verò aluū mouere velis, ut succo copiosiore, carne verò pauciore & succulentiore vtaris. Cæterum de animalibus quæ in ciborum vsum veniunt, sic cognoscere oportet. Carnes Bubulæ robuste sunt, & aluum sistunt, & agere in ventre concoquuntur, propterea quod crassi ac multi sanguinis est hoc animal, & carnes graues, itemq; sanguis, ac lac. Quorum autem animalium lac tenue est, & sanguis similiter, eorum etiam carnes confimiles sunt. Caprinæ carnes his leuiiores sunt, & magis aluo secedunt. Suillæ robur quidem magis quam hæ corpori inducunt, multum autem aluo secedunt, propterea quod tenues & modici sanguinis venas sues habent, carnem verò multam. Agninæ leuiiores sunt ouillis, & hedinx caprinis, quia exanguiiores sunt & humidiores. Quum enim sicca & robusta natura sint animalia, dum quidem tenere sunt, aluo secedunt, vbi verò augmentum sumpserint, non similiter. Et vitulinæ carnes eodem modo se ad bubulas habent. Verum porcine suillis grauiiores sunt. Quum enim animal sit natura carnosum & exangue, humiditatis excessum in tenella ætate habet. Quum igitur meatus superaccedens alimentum non suscipiant, intus manens calfacit ac perturbat ventrem. Asininæ carnes aluo secedunt, & pullorum adhuc magis. Equinæ leuiiores sunt. Caninæ calfaciunt ac siccant & robur inducunt, non tamen aluo secedunt, catulinæ verò humectant & secedunt. Suis syluestris caro siccatur & robur exhibet, ac secedit. Cerui siccatur, minus autem secedit, magisque vrinam prolicit. Leporinæ siccae sunt & aluum sistunt, vrinæ autem citamentum quoddam faciunt. Vulpinæ humidiores sunt & vrinam cient. Et erinaceorum terrestrium carnes humidiores sunt ac vrinam cient. Porro de volucrum generibus sic res se habet. Omnia ferme volucrum genera ficciora sunt quam

- A** quàm quadrupedia. Quæcunque enim vesicam non habent, neque mingunt, neque sputum aut saliuam fundunt, omnino sicca sunt. Propter caliditatem enim ventris, humiditas ex corpore consumitur in alimentum caliditatis, quare neque mingunt, neque sputum aut saliuam fundunt. Cui autem tales humiditates non insunt, id ipsum necessario siccatur. Siccissima igitur caro est palumbis, deinde columbæ, tertio loco perdices, ac galli, & turturis, Humidissima verò anseris. Semini-
leges autem volucres prædictis sicciores sunt. Verum anatis carnes, & reliquarum auicularum quæ in paludibus degunt, aut in aquis, omnes humidæ sunt. At verò ex piscibus siccis-
Pisces.
- B** perca, thrissa. Leues autem sunt petrosi ferme omnes, velut tur-
Pisces er-
dus, phuca, elephetis, gobio. Tales autem & prædicti itidem, rones.
leuioribus sunt erronibus. Nam hi ut quiescentes raram ac le-
uem carnem habent, Errones autem & vndas verberantes la-
boribus fracti, solidiorem carnem habent. Torpedines autem
& squatinæ ac Rhombi, & huiusmodi, sunt leuioribus. Qui-
Pisces gra-
cunque verò pisces in lutosis & aquosis locis alimenta habent, uiores, &
velut capitones, mugiles, anguillæ, & reliqui eiusmodi, gra-
uiores sunt, propterea quod ab aqua & luto, & in his nascenti-
contra.
bus, alimenta habent, à quibus etiam spiritus in hominem
ingrediens ipsum lædit ac grauat. Fluuiatiles autem & palu-
stres his adhuc grauioribus sunt. Polypi verò & sepiæ, & eius-
modi pisces, neque pisces velut videntur sunt, neque per aluum
C secedunt, quapropter etiam oculos comesti grauant. Iuscula
tamen horum aluum mouent. Caterum conchylia velut
Conchylia.
sunt pinæ, purpuræ, patellæ, buccina, ostrea, ipsa quidem sic-
ca sunt, succi autem ipsorum aluum mouent. Mituli verò &
pectines ac tellinæ magis aluo secedunt. Vrticæ autem &
chartilagini generis pisces, maxime humectant ac aluum
mouent. Caterum Erinaceorum oua, & locustarum humor,
& musculi & vrsæ, ac cancri, magis quidem fluuiatiles, sed &
marini, aluum mouent & urinam cient. Salsamenta siccant
Saliti pi-
& attenuant, pleraque etiam aluum leniter mouent. Ex falsa-
ces.
mentis siccissima sunt marina, deinde fluuiatilia, Humidissi-
ma autem sunt palustria. Ex ipsis autem salsamentis pisces
Animaliū
perca appellati valde sicci sunt. Animalium porro cicurum & carniū
& carniū
ea quæ in syluis & agris pascuntur, sicciora sunt his quæ intra
diuersitas.
ædes

ædes nutriuntur, quia labore reficcantur, itémq; præ Sole ac frigore, & spiritu sicciore nutriuntur. Verū syluestria sicciora sunt mansuetis, & crudiura ac sylvarum materie pasta, itémque parum edacia, sicciora sunt edacibus. Et frugiuora herbiuoris sicciora sunt, Et frugiuora non frugiuoris, & paucibiliba multibilibis, & sanguine referta exanguibus ac paucū sanguinem habentibus, & quæ in vigore sunt vetustis valde ac iuueniculis, & mascula fœmineis, & castrata non castratis, & nigra albis, & hirta nudis. Contraria verò his humidiora sunt. Ex ipsis autem animalibus carnes hæ fortiores sunt, quæ optimè exercētur ac sanguinolentissimæ sunt, & in quibus recumbunt, Leuissimæ autem carnes sunt, quæ minimè exercētur, & in vmbra degunt, & in intimis animalis partibus sitæ sunt. Exanguium autē partium robustissimæ sunt, cerebrum & medulla. Leuissimæ verò carniū partes sunt capitales, & sub ventre, muscoli, pectines, pedes, Ex piscibus siccissimæ sunt supernæ partes, leuissimæ sub ventre, Et capita ipsorum humidiora sunt, propter pinguedinē ac cerebrum.

Oua qualia.

Oua volucrum robustum quid habent, & alunt, & inflant. Robustum quid habent, quia generatio est animalis. Alunt, quia hoc est pulli lac. Inflant, quia ex parua mole in multam diffunduntur.

Caseus.

u. 46.

Caseus robustus est & æstuosus & alit, Robustus quidem, quia proximus est generationi. Alit autē, quia carnosæ reliquæ sunt lactis. Aestuosus est, quia pinguis. Aluum autem sistit, quia succo & coagulo compactus est.

Aqua.

Vinum nigrum.

frigefacit. Vinum calidum est & siccum, Habet & purgatorium quiddā à materia. Vina nigra & austera sicciora sunt, & aluum non mouent, neque vrinam cient, neq; saliuam faciunt. Siccant autem & calefaciūt, humiditatem ex corpore confumentes. Mollia verò nigra humidiora sunt, & inflant atq; aluum magis mouēt, Dulcia nigra humidiora sunt, calfaciunt autem & inflant humiditatem inducentia. At verò alba & austera calfaciunt, magisque vrinam cient, quàm aluum mouent. Noua vina aluum magis mouent, quia propiora musto sunt, itémq; alunt, & odorata magis quàm inodorata eiusdē ætatis, quia magis concocta sunt: & crassa magis quàm tenuia. Verum tenuia dulcia magis vrinam cient, & aluum mouent, & humectant corpus & sanguinem debilem faciunt, & aduersarium corporis sanguinem in corpore au

A re augent. Mustum inflat, & subducit, ac conturbat feruens Mustum.
 in ventre, & aluo secedit. Inflat quidem, quia calfacit, subdu-
 cit autem ex corpore, quia purgat, cōturbat autem, quia fer- Vinum a-
 uet in ventre, atq; ita aluo secedit. Vina acida frigefaciūt, at- cidum.
 tenuant & humectant. Frigefaciūt quidem & attenuant hu-
 miditatis euacuationē à corpore facientes, humectant autē
 per aquam vnā cum vino ingredientem. Acetum frigefacit, Acetum.
 quia colliquans humiditatem in corpore consumit. Sistit au-
 tem magis quā mouet aluum, quia nō alit & acre est. Sapa Sapa.
 calfacit & humectat ac subducit. Calfacit, quia vinosa est. hu-
 mectat, quia alit, subducit quia dulcis est. Vinum recens sub
B torculari expressum & nondū excolatum, humectat, subdu- Mel.
 cit, & inflat, quia etiam mustum idem facit. Mel calidum est
 & siccum, si meracum sit, cū aqua autem humectat & aluū
 mouet biliosis, pituitosis verò sistit. Dulce verò vinum pitui-
 tosis magis aluo secedit. De oleribus porro hoc modo res se Allium.
 habet. Allium calidum est, & aluum mouet & vrinam ciet
 corpori, oculis verò non est commodum. Multam enim cor-
 poris purgationem faciens, visum hebetat, aluum autem &
 vrinam mouet, propter vim purgatoriam: coctum debilius
 est quā crudum, flatum autem inducit, propter spiritus in- Cepa.
 rentionem. Cepa visui cōmoda est, corpori verò mala, quia
 calida & æstuosa est, & aluo secedit, & alimentū quidem nul-
 lum corpori præbet neq; vtilitatem, calfaciens autem siccatur
 propter succum. Porrum calfacit quidem minus, vrinam ve Porrum.
 rò ciet, & aluū mouet, habet & quid purgatoriū, humectat
 autem & ructū acidum sedat. Præstat à reliquis cibis postre-
 mum ipsum edere. Raphanus siue radícula, humectat pitui- Raphanus
 ram diffundens sua acrimonia, folia minus prosunt, præter-
 quam ad articulare morbum. Radix vitiosa est, innatās ac
 ægrè concoctilis. Nasturcium calidum est, & carnē liquat. Nasturciū.
 sistit autem pituitam albam, quare vrinæ stillicidiū inducit.
 Sinapi calidum est & aluum mouet, sed & hoc vrinæ diffi Sinapi.
 cultatem facit. Quin & Eruca idem facit. Coriandrum cali- Coriandrū
 dum est, & aluum sistit, & ructum acidum sedat, & somnum
 conciliat, si postremum edatur. Lactuca frigidissima est, Lactuca.
 prius quā succum habeat, debilitatem autem quandam
 corpori inducit. Anethum calidum est, & aluum sistit, & Anethum.
 sternutamenta sedat olfactatum. Apium magis vrinam ciet Apium.
 p quā

quàm aluum mouet, & radices magis quàm ipsum, aluum **D**
Ocymum. mouent. Ocymum siccum est & calidum: & aluum sistit.
Ruta. Ruta vrinam magis quàm aluum mouet, Habet & vim
quandam condensandi, & ad medicamenta noxia commoda
est præparata. **Asparagus** siccus est & aluum sistit. **Salvia**
Salua. sicca est & aluum sistit. **Solanum** frigefacit, & semen in
Solanum. somnis effunderè nō permittit. **Portulaca** fluuiatilis frige-
Portulaca. facit, sale verò condita ac seruata, calfacit & purgat. **Calamin-**
tha. mintha calfacit & purgat. **Mintha** calfacit & vrinā ciet, &
Mintha. vomitus sistit. Et si quis semen eius sæpe comedat, collique-
facit vt quis diffuat, & arrigere prohibet, & corpus debile
facit. **Rumex** calfacit ac aluum mouet. **Atriplex** humida
Atriplex. est, non tamen aluum mouet. **Blitum** calidum est, non mo-
Brassica. uens aluum. **Brassica** calfacit ac aluum mouet, & biliosa **E**
ducit. **Beta** succus quidem aluum mouet, ipsum autem
olus comestum sistit. Radices verò magis aluum mouent.
Cucurbita. Cucurbita frigefacit & humectat, & aluum mouet.
Rapum. Rapum æstuosum est, humectat autem & conturbat cor-
pus, non tamen aluum secedit, & vrinæ difficultatem indu-
cit. **Pulegium** calfacit & aluum mouet. **Origanum** cal-
Origanum facit, & biliosa subducit. **Thymbra** similia origano effi-
cit. **Thymum** calidum est, per aluum secedit & mingi-
Thymum. tur, ducit & pituitosa. **Hysopum** calidum est & pituitā du-
Hysopum cit. Porro syluestria olera, quæ os calfaciunt, & odorata
Herbarum sunt, ea calfaciunt & minguntur magis quàm per aluum se-
vires. cedunt. Quæ verò humidam habent naturam frigidamque
ac fatuam, & odores graues, magis per aluum secedūt, quàm **F**
per vrinam. Quæ autem acerbæ & austerae sunt, aluum si-
stunt. Quæ acria & odorata sunt, vrinam ciet. Quæ acria
& sicca in ore sunt, ea omnia siccant. Quæ acida sunt, frige-
faciunt. Cæterum succi vrinam cientes sunt, crethmi, a-
pij, alij cremor, cytisi, fœniculi, porri, adianti, solani, qui &
frigefacit. Item scolopendrium, mintha, seseli, caucalides,
hypericū, vrticæ. Aluum autem mouent & purgant, cicer,
lenticula, ordeum, beta, brassica, mercurialis, sambucus, cni-
cus. Hæc omnia aluum magis mouent quàm vrinam. At ve
Poma. rò de pomis hoc modo se res habet. Quæ quidem seminibus
referta sunt, ea magis aluum mouent, Item viridia magis
Mora. quàm sicca. Verum vis & facultas ipsorum referatur. Mora
calfac

A calfaciunt & humectant ac aluo secedunt. Pira matura cal-
faciunt & humectant ac aluum mouent. Dura verò sistunt.
Pira syluestria, hyberna, matura, aluum mouent ac purgāt.
Cruda verò sistunt. Mala dulcia ægre concoquuntur. Acida
verò & matura, minùs. Cydonia adstringunt, & non mouēt
aluum. Succi autem malorum, vomitus sistunt & vrinā ciēt.
& ante vomitum odores ipsorum idem præstant. Mala syl-
uestria aluum sistunt. Cocta comesta magis aluum mouent.
Verùm ad respirationē quæ erecta ceruice fit, & succi ipso-
rum, & ipsa quoque, hausta profunt. Sorba, Mespila & Cor-
na, & quæcunque alia huius generis poma, aluum sistunt &
acerba sunt. Mali punici dulcis succus aluum mouet, habet
B autem quid æstuosum. Mala punica vinosa, minùs æstiosa
sunt. Acida verò magis frigefactoria. Nuclei autem omniū
sistunt. Cucumeres crudi, frigidi sunt & ægre concoctiles.
Maturi autem & pepones, mingūtur & per aluum secedunt.
verùm flatuosi sunt. Botri vuarum calidi sunt & humida, ac
aluum mouent, maximè albi. Dulces quidē igitur calfaciūt
fortiter, propterea quòd multum iam caliditatis habent. Im-
maturæ verò minùs calfaciunt, magis autē purgant potati.
Ficus & vux passæ æstiosæ sunt, sed aluum mouent. Ficus
viridis humectat & aluum mouet, ac calfacit, humectat,
quia succo plena est. Calfacit, propter succum itidem, aluum
mouet, propter succi dulcorem. Primæ ficus pessimæ sunt,
quia succulentissimæ, optimæ autē sunt postremæ. Ficus ari-
dæ æstiosæ sunt, sed aluo secedunt. Amygdalæ æstiosæ sunt,
C verum probè nutriunt. Aestuosæ quidem sunt propter pin-
gitudinem, nutriunt autem propter carnositatem. Nuces
rotundæ similes his sunt. Latæ verò maturæ probè alunt, &
aluum mouent. Depuratæ verò etiam flatum inducunt. Tu-
nicæ verò ipsarum aluum sistunt. Acyli ilicis glandes, & quer-
cinæ fagineæ glandes, aluum sistunt crudæ & assatæ, coctæ
verò minùs. Pingues carnes æstiosæ sunt, sed aluum mouēt,
Carne conditæ ac asseruatæ in vino quidem siccant & alūt,
& siccant quidem propter vinum, alunt autem propter car-
nem. In aceto autem asseruatæ calfaciunt quidem, verùm
minùs propter acetum, multum autem nutriunt. At verò
sale seruata minùs quidem alunt, humiditate per salem pri-
uatæ, attenuant autem & siccant, ac sufficienter aluum mo-
uent,

Pira.

Mala dul-
cia.
Cotonea.Sorba.
Mesp. Cor-
na.Mala puni-
ca.
Cucumis.
Pepones.
Vua.

Ficus.

Amygdala

Nuces.

Castaneæ.

Caro variè
condita
quid possit

Quæ vires uent. Cæterum vires singulorum detrudere, & addere ac au- D
dematur & gere, hoc modo oportet. Ex igne & aqua omnia constituun-
augeantur. tur, & animalia, & terra nascentia, & ex his augescunt, & in

Tosta.

In siccis lo-
cis nata.

hæc secernuntur ac resoluuntur. Fortiū quidem igitur edu-
liorum vim sæpe coquendo ac frigefaciendo detrudere oportet, & vice versa augere. Humidorum autem torrendo ac as-
fando humiditatem eximere. Siccorum verò rigando ac ma-
defaciendo. Salforum rigando & coquendo. Amarorum &
acrium dulcium mixtura. Acerborum pinguium tempera-
mento, & de reliquis omnibus ex prædictis iudicium facere
oportet. Quæcunque tosta aut affata sunt, alium magis si-
stunt quam cruda, propterea quòd humiditas itémque pin-
guitudo per ignem ablata sunt. Quum itaque in ventrem E
inciderint, humiditatem ex ventre trahunt, & oscula vena-
rum cōcludūt siccantq; ac calefaciunt, quare transitus humi-
ditatis sistunt. Quæ verò ex inaquosis ac siccis & æstuosis lo-
cis veniunt, ea omnia sicciora ac calidiora sunt, & robur am-
plius corpore exhibent, propterea quòd pari mole ac copia
graviora sunt & densiora, & maiore redditū tribuūt, quam
quæ ex humidis & riguis ac frigidis. Hæc enim humidiora
sunt & leuiora ac frigidiora. Non igitur ipsius cibi & potus,
& animalium ipsorum vim nosse oportet, sed etiā patriæ unde
sunt. Quum igitur forte alimentum corpori offerre voles, &
ex iisdem cibis, his quæ ex inaquosis locis veniunt vtendum
est, & cibis, & potibus, & animalibus. Vbi verò leuiore & hu- F
midior, his quæ ex riguis veniunt vteris. Dulcia & acria, &
falsa, & amara, & austera, & carnosæ calfacere solent. Item
quæ sicca sunt, & quæ humida. Quæcunque igitur de sicca
parte plus in se habent, ea siccant & calfaciūt. Quæ verò hu-
midæ partis plus habent, ea omnia calfacientia humectāt, &
alium magis mouent quam sicca. Nam vbi alimentum am-
plius corpori præbuerunt, reuulsionem in ventre faciunt, &
humectantia alio secedunt. Quæ autem excalfacientia sic-
cant, tum edulia, tum pocula, neque saliuam, neque vrinam,
neq; secessum facientia, corpus siccant, idque ob hanc caul-
sam. Corpus calfactū humore vacuatur, & pars eius ab ipsis
cibis, pars in alimentū caloris ipsius animæ cōsumitur. Pars
etiā calfacta & attenuata per ipsum corpus expellitur. Dul-
cia & pingua ac oleosa replent, quia ex modica mole mul-
tū

A tùm diffunduntur. Calfacta autem & diffusa, caliditatem in corpore replent ac tranquillam esse faciunt. At verò acida, & acria, & austeria, & acerba, & ex toto collata, & sicca, nō replent: propterea quòd oscula venarum aperiunt & expurgant, & partim siccantia, partim mordentia ac adstringētia, humiditatem carnis horrere ac confidere & in modicā molem contrahi faciunt, atque ita vacuum multum in corpore fit. Quum igitur voles à modicis implere, aut à pluribus euacuare, talibus vtaris. Recentia omnia maiorē quàm alia fortitudinē habēt, propterea quòd propinquiora viuo sunt. Verùm antiqua & marcida, magis quàm recētia aluum mouent, quia propiora putredini sunt. At verò cruda alunt &

Quā pauca
satiēt.

B rustus cient, propterea quòd quæ ignem coquere oportebat, ea venter transigit, debilior quàm ingesta sunt existens. Cæterum obsonia ex variis intritis præparata, æstuosa & humida sunt: propterea quòd pingua, & tosta, & calida, & inæqua les inter se vires habentia, in eodem cohærent. Verùm quæ in muria præparantur, meliora sunt, & non æstuosa. Porro de balneis hoc modo habet. Aqua potabilis humectat & frigefacit, exhibet enim corpori humiditatē. Salsum autē balneum calfacit ac siccit. Quum enim natura calidū sit, trahit à corpore humiditatem. Calida autem balnea ieiunum attenuant ac frigefaciunt: per caliditatem enim humiditatē de corpore auferunt, euacuata autem de carne humiditate, corpus perfrigeratur. à cibo accepto eadē calfaciunt, ac humectant, ea quæ supereminet in corpore diffundentia in maiorem molem. Balnea autem frigida vice versa, vacuum quidem corpore præbent quandam caliditatē. Vbi autem cibus ingestus est, ab humido existente detrahunt, & frigidum existens siccitate replent. Non lauari siccit quum humiditas consumatur. Similiter etiam vnctionis neglectus.

Obsonia
ex intritis
variis con-
dita.

Balnea.

Balnea ca-
lida.

Frigida.

C vnctio verò calfacit, humectat, ac mollit. Sol & ignis siccant, propterea quòd quum calida sint & sicca, humiditatem ex corpore trahunt. Vmbra & frigus moderatē humectāt, dant enim magis quàm accipiunt. Sudores omnes abeunt, siccant & attenuant, humore ex corpore deficientē. Coitus attenuat, humectat & calfacit, Calfacit quidem propter laborem & excretionem frigiditatis. Attenuat autem propter euacuationem: humectat, propter colliquationis reliquias

Vnctio.

Sol, ignis.

Vmbra.

Sudores.

Coitus.

- Vomit.** quias in corpora præ labore. Vomitus attenuant propter cibi euacuationem, non tamen siccant, si quis postridie recte curet, sed humectant, propter repletionem & colliquationem carnis præ labore. Si verò quis sinat hæc postridie consumi in alimentum caliditati, & diatam sensim adhibeat, siccant. Ventrem autem compactum vomitus soluit, & egerentem magis quam oportet, sistit, illum quidem humectans, hunc verò siccans. Quum igitur aluum quis sistere volet, auidè deuoratum cibū euomere oportet, priusquam humescat & infrà detrahatur: & magis acerbis & austeris eduliis uti. Vbi verò soluere aluum quis velit, plurimo tempore cibis immorari confert, & acribus, ac salis, & pingui-
bus ac dulcibus, tum cibis, tum potionibus uti. Somni ieiun-
num attenuant & frigefaciunt, si non longi fuerint, præsentem humiditatem euacuantes, Qui verò magis calefaciunt, colliquant carnem, & corpus diffundentes exoluunt, ac debiles faciunt. à cibo verò sumpto calefacientes humectant, alimen-
tum in corpus diffundentes. à matutinis autem deambulationibus somnus maximè siccatur. Vigilia in exsatiatis cibo
noxia est, non permittens cibum liquari ac concoqui. Ieiunos autem attenuat quidem, verum minus lædit. Segnicies ac ociū humectat, & corpus debile facit. Anima enim quies-
cens humiditatem ex corpore non consumit. Labor sic-
cat, & corpus robustum facit. Semel in die cibum capere attenuat, & siccatur, & aluum sistit, propterea quod per animæ caliditatem humiditas ex ventre & carne consumitur.
Prandium. Prandium contraria facit, Aquæ potus calidus attenuat, similiter & frigidus. At verò & spiritus, & cibus, & potus, humiditatem in corpore congelant, si excellenter frigida fuerint, & per cōgelationem ac frigiditatem aluos sistunt. Nam animæ humiditatem superant. Rursus autem etiam caliditatis excessus eandem congelant, in tantū ut diffundi nequeat. Quæcunque verò calefacientia corpus, & alimentum non præbentia, carnem humiditate euacuant etiam excessum non facientia, ea frigiditatem homini exhibent. Nam præsentem humiditatem mota, flatu ab ipsa repletur ac perfri-
geratur. Cæterum quam vim labores habeant nunc exponam. Sunt enim alij naturales, alij violēti. Naturales igitur sunt. Visus, labor, auditus, vocis, curarum. Visus quidē igitur talis

A talis vis est. Anima in id quod videtur intenta, mouetur & calefcit. Calfacta verò, euacuata humiditate ficcatur. Per auditum verò allabente sono, anima cōcutitur & laborat, laborans autem calefcit & ficcatur. Quæcunque fiunt hominibus in cura, anima etiā ab his calefcit ac ficcatur, & humiditatem cōsumens laborat, & carnes attenuat, & hominē euacuat. Quicunq; labores vocis sunt, velut sermo, aut lectio, aut cantus, omnes hi animam mouent, Mota autem ficcatur & calefcit, & humiditatem in corpore consumit. At verò **Deambulationes.** deambulationes etiam ipsæ maximè præ reliquis naturales sunt, Habent autē quid violentum. Vis ipsarum talis est.

B Deambulatio à cœna & aluum, & corpus, & ventrem fccat, ipsūque amarum fieri nō finit, ob hāc causam. Quum mouetur homo, calefit corpus, itēq; cibi. Attrahit igitur humiditatem caro, & aluum amarū fieri non finit. Corpus quidem igitur repletur, aluus verò attenuatur. Siccatur autem eadem, ob hāc causam. Quum corpus mouetur & calefcit, quod tenuissimum estimenti cōsumitur, partim per insitum calorē, partim verò vnā cū flatu foras excernitur, partim etiā per lotium eiicitur. Quod verò siccissimum est de cibis relinquitur, Quare vnā cum aluo etiā caro reficcatur.

Matutinæ deambulationes. Matutinæ deambulationes attenuant, & partes circa caput leues, & agiles, ac promptas reddunt, & aluum solunt. Attenuant quidē, quia motum corpus calefcit, & humiditas attenuatur ac purgatur, partim per spiritum ac flatum, partim vero emungitur & excreatur: sed & aliqua pars in alimentum caliditatis animæ cōsumitur. Aluum autē solunt quia quum calida sit, frigido spiritu supernè allabente, caliditas frigiditati cedit. Leues autem partes circa caput faciunt, ob hanc causam. Quum euacuata est aluus, ex reliquo corpore & capite humiditatē in seipsam attrahit, nimirū calida existens. Euacuato autem capite, & visus & auditus depurgantur, & homines agiles fiunt. **Deambulationes.** Deambulationes autē post exercitia, corpora pura reddunt, & attenuant, non permit-

C tentes carnis colliquationem fieri præ labore, sed ipsam depurgant. Cæterum cursus longi ac curui sensim facti, calfacientes carnem, concoquere ac diffundere possunt, & vim ciborum in carne concoquunt: verum corpora tardiora ac crassiora reddūt quàm cursus circulares. Et multa comedē-
ribus

tibus commodiores sunt, & hyeme magis quàm æstate. D

*Cursus ve-
fici.*

Qui verò in veste fiunt, eandem vim habēt, magis autem excalfaciunt, & corpora humidiora faciunt, & decoloratio-
ra: quia sincerus spiritus allabens ipsa non depurgat, sed in
eodem spiritu exercentur. Conferunt itaque & siccis, & car-

*Cursus re-
cti.*

nosus qui carnem demoliri & abolere volunt, itēque senio-
ribus, propter corporis frigiditatem. Cursus autem recti
reuertentes, & equestres indefiniti, carnem minus diffun-
dunt, attenuant autem magis, propterea quod externis ani-

*Cursus cir-
culares.*

mæ partibus hi labores sunt, & humiditatem ex carne re-
uellunt, & corpus attenuat ac siccant. Circulares verò cur-
sus carnem minimè diffundunt, attenuant autem & disten-
dunt carnem & ventrem maximè, propterea quod acutissi-
mo spiritu vtentes, humiditatem in seipsos celerrimè tra-
hunt. At verò concussiones siccant quidem derepente, non
sunt autem idoneæ, neque commodæ: nam conuulsiones in-
ducunt: quia excalfactum corpus, cutem quidē fortiter atte-
nuat, carnem verò minus coagmentat quàm cursus circula-
res, carnem autem humore euacuant. Commotiones &
alleuationes carnem quidem minimè excalfaciunt, corpus
autem & animā irritant, & spiritu euacuant. E

Lucta.

Lucta & fri-
catio, externis corporis partibus magis laborem exhibent:
calfaciunt autem carnem, & corroborant ac augeri faciunt,
ob hanc causam. Quæ ex natura solida sunt, confricta con-
fidunt ac coagmentantur, quæ verò caua sunt, augescunt.

Quod itaque densum est in carne, id confrictum coagmen-
tatur, caua verò augescunt, itēque venæ. Nam carnes cal-
factæ ac siccatae, alimentum in seipsas per venas trahunt, de-
inde augescunt. F

ἀλινδνοση.

Voluratio in puluere consimilia luctæ
efficit. Magis autem siccatur propter puluerem, & minus in-
carnat. Micatio per summas manus attenuat, & carnes
furfum trahit. Follis, & manuum ad rythmum motus,
consimilia faciunt. Spiritus detectio, meatus disparare, & cu-
tem attenuare, & humiditatem sub cutem extrudere potest.

ἡνδοχρίν.

Exercitia in puluere & oleo in tantum differunt, quòd
pulis quidem est frigidus, oleum autē calidum. In hyeme
igitur oleum corpus magis auget, propterea quòd frigus
prohibet à corpore quid auferre. In æstate verò calidita-
tis excessum faciens, carnem liquat: quum & à tempore, &
oleo,

ἡνδοκομα-

χιν, ἡνδοχρίν.

χιν, ἡνδοχρίν.

χιν, ἡνδοχρίν.

χιν, ἡνδοχρίν.

χιν, ἡνδοχρίν.

χιν, ἡνδοχρίν.

χιν, ἡνδοχρίν.

χιν, ἡνδοχρίν.

χιν, ἡνδοχρίν.

χιν, ἡνδοχρίν.

χιν, ἡνδοχρίν.

χιν, ἡνδοχρίν.

χιν, ἡνδοχρίν.

χιν, ἡνδοχρίν.

χιν, ἡνδοχρίν.

A oleo, ac labore, corpus calefiat. At verò pulvis qui inter exercendum accedit, in æstate quidem magis auget. Nam frigefaciens corpus, in excessum calferi non permittit. In hyeme verò frigus & algorem inducit. Morari in pulvere post exercitia in æstate, modico tempore, confert frigefaciendo. Verum longior mora superexiccat, & corpora dura ac lignosa efficit. Frictio ex oleo & aqua mollior, & non vehementer exalfieri finit. Porro de lassitudinibus quæ in corpore fiunt, hoc modo res se habet. Homines in exercitati ab omni labore lassantur. Nulla enim corporis pars exercitata est ad ullum aliquem laborem. Corpora autem exercitata, ab insuetis laboribus delassantur. Aliqua verò **B** etiam à consuetis exercitiis lassantur, si modum excesserint.

Confrictio olei cū aqua.

Species quidem igitur lassitudinum eiusmodi sunt. Vis **Desiderio** autem ipsarum sic habet. Etenim in exercitati humidā carnem habentes, quum laborauerint corpore calefacto multam colliquationem remittunt. Quicquid igitur exsudauerit, aut cum corpore depurgatum fuerit, non exhibet magis laborem in corporis parte præter consuetudinem euacuata. Quicquid verò ab excretionē intus remanserit, non solum huic laborem exhibet, sed etiam ei parti quæ humiditatem suscepit. Non enim commoda est corpori, sed infesta. Et in carnes quidem corporum non similiter congregatur, Verum in carnosas partes, quare his laborem exhibet, donec exiuerit. Tanquam enim circuitum non habens, quiescens calefit tum ipsa, tum quæ allabuntur. Si igitur multum fuerit quod excretum est, etiam sanum corpus exsuperat, ut totum concalescat, & febrem fortem inducit. Calefacto enim sanguine & attracto, celerem circuitum faciunt ea quæ in corpore sunt, & tum reliquum corpus præ spiritu purgatur, tum quod compactum est calefcens attenuatur, & simul ex carne foras sub cutem extruditur, atque hoc sudor calidus vocatur. Hoc autē excreto, & sanguis in naturalem statum restituitur, & febris remittit, & lassitudo sedatur maximè tertia die. Caterum eiusmodi lassitudinē sic curare oportet, ut fomentis & balneis calidis id quod compactum est dissoluamus, & deambulationibus vehementibus depurgemus, & modico cibo ac attenuationibus carnis euacuationē cogamus ac coagmentemus, & oleo sensim multo **P** **S** tempore

quid patiantur.

tempore fricemus, ut ne violenter excalescat. Unguentis etiam D
tum exudatoriis, tum mollientibus, vngere ac mollire con-
ducit. At verò exercitatis, ab insuetis laboribus propterea
lassitudo contingit. Quum corpus non fuerit laboribus exer-
citatum, necesse est carnē humidam esse ad eum locum, ad
quem non est aduersus se laboribus exercere, quemadmodū
etiam ad singula exercitationū genera. Carnem igitur ne-
cesse est colliquari, & excerni, considerēque ac contrahi, ve-
lut priori. Confert autem hoc modo curari. Exercitationi-
bus utendum est consuetis, quo id quod compactum est cale-
scens extenuetur ac depurgetur, & reliquum corpus nō hu-
mectetur, neque inexercitatum maneat. Utile est & hunc
balneis calidis uti, itēque frictione similiter ut priorē. Ve-
rū fomentis nihil habet opus. Labores enim calfacientes
sufficientes sunt attenuare & depurgare id quod cōpactum
est. Lassitudo autem à consuetis exercitiis hoc modo fit. A
moderato quidem labore lassitudo nō mouetur. Quum ve-
rò maior quā oportet labor fuerit, carnem superexsiccat,
euacuata autē humore caro, calefit, & dolet, & horret, & ad
febrē perducitur longiorem, si non quis rectē curet. Opor-
tet autem primum quidem ipsum balneo non valde multo,
neque nimis calido lauari, deinde exhibito à balneo molli
vino, in cœna offerre plurima & omnigena edulia, & potu
aquofo, vino verò molli ac multo uti. Postea longo tempore
his immoretur, donec venæ repletæ attollantur. Deinde ve-
rò vomat, & post modicam stationem, molliter dormiat. Po-
stea per dies sex sensim ad cibos & labores consuetos adhi-
beatur, atque ita ad cōsuetum cibum ac potum perducatur.
Vim autem habet hæc curatio talem. Resiccatum excellen-
ter corpus, humectare potest citra excessum. Si quidem igi-
tur possibile esset, laboris excessum nosse, quantus is esset,
commodum foret ipsi per moderatum cibum mederi. Nunc
verò illud impossibile est, hoc verò facile. Corpus enim re-
ficcatum, ab ingestis omnigenis eduliis id quod conducibi-
le sibi ipsi est, sumit, vnaquæque pars de singulis cibis reple-
tum autem & humectatū, aluo per vomitum euacuata, rur-
sus excessum remittit. Aluus autem vacua existens reuellit.
Excedentem itaque humiditate caro eructat, moderatam
verò non remittit, nisi per vim, aut labores, aut medicamen-
ta, aut

Curatio.

Medela.

Curationis
eius vis.

A ta, aut aliã quandã reuulsionem. Qui autem additione cibi
sensim crescente vitur, is corpori diætã placidè constituit. Qui aptè
nutricabit.

HIPPOCRATIS

COI DE DIAETA SIVE VI-

CTVS RATIONE, LIBER III.

IANO CORNARIO ME-

DICO PHYSI-

CO INTER-

PRETE.

*



DE diætã humana exactè quid conscribere,
vt ad ciborum copiam, laborum commen-
suratio ac symmetria fiat, non est possibi-
le, quemadmodum etiam antea à me rela-
tum est. Multa enim sunt impedimenta.
Primum quidem hominum naturæ, di-
uersæ existentes. Nam & sicca ipsæ ad se ipsas, & ad alia col-
lata magis ac minus sicca sunt & humidæ. Similiter etiam
aliæ omnes. Deinde ætates non iisdem indigentes, Insuper
& regionum situs, & ventorum mutationes, & temporum
C alterationes, & anni constitutiones. Est & inter ipsos ci-
bos multa differentia, Triticum enim à tritico differt, & vi-
num à vino, & reliqua omnia ex quibus victum facimus di-
uersa existentia, impediunt quo minus possibile sit exactè
de diætã conscribere. At enim prænotiones inuentæ sanè à
me sunt eorum quæ in corpore dominantur, siue labores
cibos, siue cibi labores superent, & quomodo singulis me-
deri oporteat, prædisceréque sanas naturas, & vt non acce-
dant morbi, nisi quis valde multum delinquat ac sapè. hæc
autem medicamentis iam opus habent. Sunt autem quæ ne-
que per medicamēta sanari possunt. Quantum quidem igi-
tur inueniri possibile est quæ maximè ad rem faciunt, à me
inuentum est. Verùm exactè à nullo. Primum igitur mul-
tis ac vulgò hominibus cōscribam, ex quibus maximè utili-
tatem

Quid ve-
tet perfectã
victus ra-
tionem.

Qui mo-
dus vitæ.

tatem capere possint, qui sanè cibis vulgaribus vtuntur, ac laboribus necessariis, profectionibusq; necessariis, ac operis marinis ad vitam degendam repertis, quique calescent plus quam expedit, perfrigeranturque præter commoditatem, & reliqua diætâ inconstanti vtuntur. His itaq; ex præsentibus sic victum facere conducit. Annum equidè in quatuor partes diuidunt, quas pleriq; omnes nouerunt, hyemem, ver, æstatem, autumnum. Et hyemem quidem à pleiadum occasu, vsq; ad æquinoctium vernum. Ver autem ab æquinoctio vsque ad pleiadum exortum. Aestatem verò à pleiadum ortu vsque ad arcturi exortum. Autumnum ab arcturi ortu, vsq; ad pleiadum occasum. In hyeme quidem igitur tempore frigido & compacto se opponendo, hoc victu vti conducit. Primum quidem semel tantum in die cibum capere conuenit, nisi quis valde siccum vèrem habeat. Id verò si fieri non possit, modicum prandere. Victu autem vtendum est sicco & austero, & calfactorio, & ex toto collato, ac meraco. Pane autè magis vti expedit, & obsoniis assatis potius quam coctis. Et potionibus nigris meracioribus ac paucioribus. Oleribus minimum, præterquam calefacientibus & siccis. Succis item ac sorbitionibus minimè vtendum est. Laboribus autè multis omnibus, cursibusq; curuis sensim crescente accessione, & lucta in oleo longa, à leuibus ordiendo ac sensim addendo. Et deambulationibus ab exercitiis, acutis ac celeribus, à cœna verò, tardis in tepore. Matutinis autem multis, leni initio facto, ac sensim crescēte accessione, ita vt placide rursus desinas. Vtendum est & strato duriore, & nocturnis itineribus, & funambulationibus, ac cursibus per funem vti cōfert. Omnia enim hæc attenuant ac calfaciunt. Vtendum etiam nauigatione. Vbi autem quis lauari velit, si quidem in palæstra se exercuerit, frigida lauetur. Si vero alio quopiam exercitio vsus fuerit, calida commodior existit. Vtendum & vomitibus, si humidiores sint ter in mense, sin sicciore, bis à cibis omnis generis. à vomitibus sensim perueniendum est ad consuetum cibum per dies tres, eoque tempore laboribus leuioribus ac paucioribus vtendum. à bubulis autem & porcinis carnibus, aut aliis, quicquid tandem modum excesserit, repletus vomat: & à caseosis & dulcibus ac pinguibus, eum qui non est adsuetus repleti, vomere conducit: & ab ebrietate,

Anni quatuor partes.

Victus hybernus.

Vomitionis modus.

A tate, ac ciborū mutatione, & regionum alteratione vomen-
dum est. Oportet autem frigori seipsum purum exhibere,
præterquàm à cibis ac exercitiis. Sed & in matutinis deam-
bulationibus vbi corpus calefieri cœperit, itémq; in cursibus
etiam in alio tempore, excessum vitare oportet. Melius est
enim corpori hyemem ferre, quàm exerceri hoc tempore.
Nam neque arbores quæ hyemem non pertulerunt hoc tem-
pore, fructum ferre possunt, neq; ipsæ sanæ esse. Utendum est
& laboribus hoc tempore multis vsque ad excessum, nisi las-
situdines succedant. Signum autem docebo idioras, osten-
dámque quapropter hæc ita se habent. Tempore existente
frigido ac compacto, consimilia patiuntur etiam animalia
ipfa. **B** Necesse igitur est corpora tardè calefieri à labore, &
modicam quandam humiditatis præsentis partem excerne-
re. Deinde modicum tempus concessum est quo laborent, **Plus otij**
multum autem quo quiescant. Dies enim brevis est, nox ve- **quàm labo**
rò longa, propterea igitur neque tempus, neque labor exces- **ris hyeme**
sum habet. Ob hanc itaque causam hoc tempore sic diætā **datur.**
instituere oportet, à pleiadum occasu, vsq; ad solstitium hy- **Vergilia-**
bernū diebus quadraginta quatuor. Circa solstitium au- **rū occasus**
tem maximè in custodia ac tutela esse, & à solstitio alios to- **solstitium.**
tidem dies eadem diætā vti. Postquàm autem tempus ad- **Fauonius.**
duxerit fauonium, & mollius factum fuerit, oportet etiam **Arcturi or-**
cū tempore diætā sequi, diebus quindecim, quum arctu- **tus.**
rus oritur & hirundo volat. Sequens verò tempus magis va- **Hirundo.**
C rie transigere oportet vsque ad æquinoctium diebus trigin-
ta duobus. Oportet igitur etiam diætā vti hoc tempore va-
riegatiore, molliorēque ac leuiore, & cibo, & potu, & labore,
atq; ita sensim ad ver perducere. Quum autē æquinoctium **Aequino-**
iam factum fuerit mollius, & dies longiores, ac noctes bre- **ctium.**
uiiores, & tempus calidum ac siccum constiterit, etiam præ-
sens victus probè nutriens ac meracius sit. Quemadmodum
igitur arbores rationem non habentes, hoc tempore præpa- **Homines**
rant sibi ad æstatis commoditatem, tum incrementum, tum **arbores**
vmbra: Sic oportet hominem, quum sanè mente ac ratio- **imitentur.**
ne præditus sit, carnis incrementum salubre sibi præparare.
Oportet igitur vt ne derepente diætā transmutetur, tempus **Diuisio tē-**
in sex partes diuidere, per octo dies. In prima itaque parte, **poris in sex**
& labores detrudere oportet, & reliquis quoq; velocioribus **partes.**
viti.

vti. Cibis autem mollioribus, & potibus aquosioribus ac al-
bioribus, & lucta cum oleo in Sole vtendū est. In singulis au-
tem temporibus singulas diætas paulatim trāsmutare oportet,
& deambulationes detrahēre à cœna plures, matutinas
pauciores: & mazam pro pane offerre, & olera cocta exhibere,
& obsonia cocta allatis adæquare, & balneis vti, & parum
prandere, & re venerea pauca vti, & vomitibus primū quidē
quarto quoque die, deinde per longius tempus, quo &
corpus pura carne incarnatum constituas, & diætā in hoc
tempore mollem, vsque ad pleiadum exortum. Et in hoc
iam ætas adest, & ad hanc nunc diætā instituere oportet.

**Vitus æ-
statis.**

Quum itaq; pleias exorta fuerit, cibis mollioribus ac pau-
cioribus vti oportet. Deinde maza magis quā pane, atq; ea
prius subacta, & vino dulci non emollita, potibus autem mol-
libus albis aquosis, prandio modico, & somnis à prandio bre-
uibus, & repletionibus ex cibis ac potibus quā minimis.

Potu inter edendum vtendum est sufficiente, per diem ve-
rò minimè bibendum, nisi necessaria aliqua fœcitate corpus
vtatur. Vtendum est & oleribus coctis, exceptis æstuosis ac
ficcis. Vtendum etiam crudis, exceptis calfacientibus ac fic-
cis. Vomitibus nisi si qua repletio contingat, vtendum non
est. Re autem venerea minimè. Balneis autem tepidis vti
licet. At verò poma fortiora sunt quā pro humana natura.

Poma.

Meliùs est igitur à pomis abstinere. Si verò quis cum cibis

**Per æstatē
exercitatio.**

vtatur, minimè deliquerit. Laboribus quoque ac cursibus
circularibus exerceri oportet, & cursibus rectis reuertētibus
modicis multo tempore, & deambulationibus in vmbra, lu-
cta autem in puluere, quo quā minimè excalescat. Verū
volutationes in puluere meliores sunt quā cursus circula-
res. Frigefaciunt enim corpus humore euacuantes, à cœna
deambulandum non est, sed saltem surgendū. Manè verò de-
ambulationibus vtendum. Soles vitādi sunt, itēq; frigora,
tum manè, tum vespere, quæ flumina, aut stagna, aut nives
exhalant. Hanc autem diætā tolerare oportet vsq; ad sol-
stitium æstiuū, quo in hoc tempore adimas omnia quæ sicca
sunt & calida & nigra ac meraca, itēq; panes, præterquam
si parum quid voluptatis gratia concedere velis. Sequēti ve-
rò tempore vtetur mollibus & humidis & perfrigerantibus
ac albis, vsque ad arcturū exortum ac æquinoctium per dies
nonag

A nonaginta tres. Caterum ab æquinoctio sic dietā instituere oportet, per autumnum ad hyemem adducendo, ita ut mutationes frigorū ac teporis vites vestitu crasso. Utendum autem hoc tempore motu in veste, frictionēq; ac lucta in olco, ita ut sensim accessio crescat. Deambulationes quoque in tempore faciendæ sunt, & calidis lauacris utendū, & somni diurni detrahendi. Cibis autem utendum est calidioribus, ac minus humidis, & puris, & potibus nigrioribus, verum molli-
bus & non aquosis. Oleribus verò minus. Reliquam itē dietam omnem sic cōsonam adhibere oportet, ut ab æstivis detrahas, hybernis autem utaris non ad summum, quo hybernū victum quā proximē cōstituas, in diebus duodequingenta, usque ad pleiadum occasum, ab æquinoctio. Hæc

B porro multitudinis commendæ gratia ac vulgi hominum causa prodo, qui ex necessitate vitam temerē transigunt, neque licet ipsis aliorum negligentes esse, ac suam ipsorum sanitatē curare. Quibus verò iam hoc certum ac percognitum est, quod neque divitiarum, neque corporis, neque ullius alterius rei ulla utilitas est, citra sanitatem, ad hos inuenta est à me diætā, quantum possibile est, ad veritatem ac certitudinem possibilium rerum adducta. Hanc itaque in sermonis progressu declarabo. Inuentum autem hoc honestū quidem mihi repertori, utile verò discipulis, nullus adhuc priorum ne attentavit quidem cōponere, quod ad omnia alia magni æstimandum duco. Est autem præcognitio antequam ægrotent cognitio, quid corpora perpetiantur, utrum cibus superat labores, aut labores cibos, aut moderatē inter se habeat. Sine sanitate nihil iuvat.

Ut enim tandem superetur, morbi fiunt, ab æqualitate autem inter ipsa mutua, sanitas adest. Ad hæc sanè commemoranda accingor, & demonstrabo qualia fiunt hominibus qui sani sibi esse videntur, & iucundè comedunt, laborarēq; possunt, & corporis ac caloris satis habent. Nares citra causam apertam à cœna implentur, & repletæ esse videntur, emungunt autem nihil. Vbi autem deambulare mane incipiunt ac exerceri, tunc emungunt ac spuūt, & progressu temporis etiam palpebras graues habent, & pruritus frontem occupat, & à cibis abstinent, & bibere minus possunt, & color fit decolor, & aut destillationes mouentur aut febres horridæ, iuxta quodcunque tempus repletio fuerit mota. Quicquid

Quæ inuenit Hipp.

Quid præcognitio & cognitio.

plenitudi-
nis signa.

Medela.

quid autem eo tempore fecerit, in idipsum culpā ac causam D
reiiicit, quum id ipsum causa non sit. Huic enim cibi superāt
labores, & repletio paulatim collecta in morbum ipsum ad-
duxit. Sed non huc vsque differre oportet, verū vbi prima
signa cognouerit, scire quod cibi labores superant, & paula-
tim collecta repletio existit. Mucus enim & saliuā repletio-
nis indices sunt ac signa. & quiescēte quidem corpore, mea-
tus spiritus obturant, multa repletionē existente, vbi verò ca-
lesfactum est præ labore, attenuata excernuntur. Talem au-
tem sic curare oportet. Exercitatum in consuetis exercitiis
citra lassitudinem, calidāque lotum, cibus omnigenis exple-
to, ac vomere facito, à vomitu verò os & fauces colluat vino
austero, quo oscula venarum constringantur, & nihil attra- E
hant, velut à vomitu fieri solet. deinde surgens modicē de-
ambulet in tepore. Postridie verò deambulationibus qui-
dem vtēdum est, exercitiis autem paucioribus & leuioribus
quā prius, & si æstas fuerit, impransus degat, sin minus, pa-
rum comedat, & de cœna quam sumere solebat, dimidium
detrahat. Tertia autem die labores quidem obeat omnes
consuetos ac deambulationes, verū cibos sensim ingerat,
quo quinta die à vomitu consuetum cibum assumat. Et si
quidem ab hoc satis bene habuerit, de cætero cibus quidem
paucioribus, laboribus autē pluribus curetur. Si verò signa
repletionis non quieuerint, interpositis duobus diebus ab ea
qua consuetos cibos assumpsit, rursus vomat, & eodem mo-
do sensim ad consuetos cibos redeat. Quod si non succeffe- F
rit, etiam tertium eadem repete, donec à repletionē libere-
tur. Sunt autem homines qui vbi labores superantur à ci-
bis, talia patiuntur. Incipiente quidem repletionē somni lon-
gi & dulces ipsis contingunt, & interdū etiam dormiunt.
Somnus autē contingit carni, & sanguis funditur, & spiritus
diffusus trāquillus est. Quū verò non suscipiat amplius cor-
pus repletionem, secretionem iam remittit intro, præ circui-
tus violentiā, quæ sanè secretio contraria alimento à cibus,
animam perturbat. Quo tempore non amplius iucundi ipsis
sunt somni, sed necesse est hominē perturbari, & videtur sibi
cum aliquo pugnam committere. Qualiacunque enim pa-
titur corpus, talia videt anima, visu iam concluso. Quum igi-
tur ad hoc peruenerit homo, prope iam est vt egrotet. Quod
autem

Diurna dos
mitio bona
non est.
Morborū
alia causa.

A autem veniet morbus. valde manifestū est, Qualis enim secretio venerit, & quancunq; partem superauerit, eam ipsam morbo affligit. Verū non oportet ita desipientem esse & hucusque dūterre, sed statim vbi prima signa cognouit, curā contingere, & huic velut priorem curare, longiori autem tēpore, ac fame opus habet. Sunt præterea etiam talia repletionis signa. Dolet corpus aliquibus totum, aliquibus pars quædam, quæcunq; tādē. Dolor autem est velut lassitudo, & delassati esse sibi videntur, segniciēque ac repletionē curātur donec ad febrem perueniant, & adhuc nondum hoc cognoscunt, sed balneis ac cibis vtentes, ad pulmonis inflammationem, peripneumoniam Græcis dictā, morbum deducunt, & ad extremum periculum deueniunt. Verū oportet providere antequā ad morbos perueniant, & hoc modo curare, vt maxime mollibus fomētis hominē foueamus, aut si id fieri nequeat, multa calida lauemus, ac corpus dissoluamus, & à multis ingestis cibis, primū quidē acribus ac plurimis, deinde salis. probē vomere faciamus, quo facto exurgat ac modico tēpore deambulet in tepore, deinde dormiat. Ma ne verò deambulationibus sensim crescētibus vtendū est, & exercitiis leuibus, & ciborū exhibitionibus sensim crescētibus, velut prius. Attenuatione autem plurima opus habet, itēmq; deambulationibus. Si verò providētia nō adhibita ad febrem peruenerit, nihil aliud offerre oportet præter aquā per dies tres. Siquidem igitur ex hac sedetur, bene est: sin minus, ptisanæ succo curādus est, & aut quarta aut septima die decedet febris, si exsudabit. Bonū autem est & vnguentis exsudatoriis vtī, sub iudicationes, exsudare enim cogunt. Quidam verò etiā talia à repletionē perpetiūtur. Caput ipsis dollet ac grauatur, & palpebræ ipsis à cœna cōcidunt, & in somnis turbantur, & calor inesse ipsis videtur, & aluus aliquādo sistitur. Et talis vbi venere vtitur, leuior statim esse sibi videtur: postea verò magis grauatur. His caput repletionē reuellens, & aluum sistit, & ipsum grauatur. Periculum autem subest, vt quò erumpat ipsa repletio id ipsum corrumpat. Verū providere hoc modo oportet. Si curam celerem facere velit, veratro purgandus est, deinde exhibendi cibi leues ac molles ad dies decem, atque hi alium mouentes, quo venter inferior superet, & de capite reuellere valeat.

Repletio-
nis signa.

Spont.

Curatio.

Morbus a-
liis pleni-
tatis.

Curatio.

Cum portio
nes non ad
mittit.

Plenitatis
varia mala

Dysente-
ria.

Curatio.

Plenitas a-
liae.

Vtendum & cursib. tardis ac matutinis, & deambulationib. D multis. Item lucta in oleo, & prandio, & somno à prandio nō longo: à cœna verò exurgere satis est, & partim balneis, partim vñctione vtendum, balneis verò tepidis, à venere autem abstinendum. Hæc quidem velocior cura est. Si verò medicamentum bibere nolit, multa calida lotus, à cibis dulcib. ac fallis vomat, à vomitu verò satis est vt exurgat: mane autem deambulationib. adhibendus est, & exercitiis præscriptis ad dies sex, die septima repletionem corporis facta à similibus cibis vomitum faciat, & eodem modo cibi rursus sensim adiciendo exhibeantur, atq; his hoc modo ad quatuor hebdomadas vtatur. In tanto enim tempore maximè sedatur. Deinde cibi exhibendi quo corpus reficiatur, & diætā paulatim E ad consuetum morem redigenda est. Fiunt etiam talia à repletionem. Quibusdam venter quidem concoquit cibum, carnes autem non suscipiunt. Alimentum autem intus manens flatum inducit. Vbi verò pransi fuerint, sedatur. Nam à fortiore id quod leuius est expellitur, & videntur sibi libera ti esse. Verum malū multo maius postridie accedit. Quum autem quotidie augescens fortius inualuerit, id quod prius inest superingesta superat, & calfacit ac perturbat corpus, & profluuiū ventris facit. Sic enim nominatur quādiu ipsum solum alimentū putrefactū secedit. Vbi autē corpore calefacto purgatio aeris fiat, tunc & intestinū raditur ac exulceratur, & sanguinolēta egeruntur, hoc autem dysenteria, à ma- F la intestinorum affectione appellatur, morbus grauis & periculofus. Sed providere oportet, & prandium detrahēre, & cœnæ tertiā partem. Cursibus autē pluribus, & luctis ac deambulationibus vti, tum ab exercitiis, tum mane. Quū verò dies decem præterierint, dimidiū cibi detracti apponere, ac vomitu vti, atq; sic ad dies quatuor cibū exhibere: vbi autē alij decem dies præterierint, etiā reliquum cibū apponere, ac vomitum facere, atq; sic ad consuetum cibū reducēs, & talem laborib. cōfidenter præmens ac vrgēs, in hoc tēpore sanum facies. Fit etiam talis repletio. Postridie cibum eructant crudum, citra ructum acidum. Alius autem egerit, pauciora quidem quā pro ratione ciborū: attamē multū. Dolor verò nullus intus est. His ventriculus frigidus existens, cibos in nocte concoquere non potest. Quum igitur motus

- A** motus fuerit, cibum crudum eructat. Oportet itaque huic præparare ventriculi caliditatem, tum ex victu, tum ex laboribus. Primum quidem igitur vtendum est pane ex tota farina collata, fermentato, diffracto in vinum nigrum, aut in iusculum suillæ carnis piscibus verò coctis in muria acri. Vtendum etiam carnosius, velut extremitatibus percoctis, & suillis carnis coctis pluribus, & porcinis non multis, & catulorum, ac hœdorum. Exoleribus verò porro & allio cocto ac crudo, blitòque cocto & cucurbita. Potionibus verò meracioribus, somnisq; longis citra prandium prima die, itémq; somnis ab exercitiis, curibus autē curuis sensim accessione augescere, luctuq; molli in oleo, balneisq; modicis. Est & ficus cum cibus bona, & meracum vinum ab ipsa. Ex hac autem curatione aliis citius, aliis tardius repletio sedatur. Alij porrò quidam talia patiuntur. Faciem decolorem habent, & vbi comedierint, paulò post eructant acida, & acor in nares proserpit. Quibus ficus post cibum plenitatis alius morbus.
- His corpora pura non sunt, & plus est quod de carne colliquatur præ labore, quàm quod depurgatur præ circuitu. Et hoc sanè intus manens alimento contrarium est, ipsumque violat ac acidum facit. Alimētum quidem igitur eructatur, illud ipsum verò sub cutem expellitur, & hominem decolorem facit, & morbos similes aquæ inter cutem parit. Verum providere oportet hoc modo. Velocior quidem curatio est Medela potò veratro, exhibere cibos quemadmodum à me scriptum quæ.
- C** est. Verum tutior à dextra, hoc modo. Primum quidem calida lotus vomitum faciat, deinde septem à vomitu diebus cibum consuetum capiat, decima autem à vomitu die rursus vomat, & similiter cibum assumat, & tertium similiter faciat. Et cursibus quidem circularibus paucis ac velocibus vtatur & motibus, ac frictione, & mora longa in gymnasio ac exercitio. Vtatur & volutatione in puluere, & deambulationibus multis ab exercitiis, sed & à cœna. Plurimis autē matutinis in puluere vtatur. Quum autē lauare vult, calida lauetur, & eo tempore impransus degat. Et si quidē vno mense restitutum fuerit, medela vtatur. Si verò quid repletione sit. Quum igitur motum fuerit corpus ex somno densiore spiritu vsum, calidum ac acidum vnà cum spiritu

Hippocratis Liber I I I.

**Carnosa
corpora
quæ patian-
tur.**

foras expellit, & ex hoc morbi fiunt, nisi quis prouidentia D
utatur. Conducit autem etiam his facere velut priori. Verū
laboribus pluribus hos uti oportet. Quibusdam etiam talia
fiunt. In corporibus densa carne præditis, quum cibi conca-
lescunt ac diffunduntur, & à primo somno, & præ cibis car-
ne calefcente, secretio per somnum fit à carne multæ humi-
ditatis. Deinde caro densa existens alimentum non suscipit,
Id verò quod à carne secretum est alimento contrarium ac
foras protrusum hominem suffocat ac calfacit, donec euo-
muerit. Postquam autem leuior factus est, dolor nullus
in corpore manifestus inest, sed decoloratur. Progressu ve-
rò temporis, & dolores, & morbi fiunt. His cōsimilia patiun-
tur etiam qui in exercitati derepente laborauerunt, & colli- E

**Desidiofo-
rum mor-
bus.**

**Curatio.
Quæ exer-
citationes.**

**Vocis exer-
citatio.**

**Morbus
alius.**

uationem carnis violentam ac multam fecerunt. Hos au-
tem sic curare oportet. De cibo detrahenda est tertia pars.
Utendum autem cibis acribus, & siccis, & austeris, ac odo-
ratis, & urinam cientibus. Cursibus vero plurimis curuis in
vestitu, rectis autem reuertentibus & circularibus, exutis ve-
stibus, frictione & lucta modica. Micatio per summas ma-
nus commodior est quàm follis. Utendum & deambulationi-
bus ab exercitiis multis, itémque matutinis. A cœna verò
etiam vocis exercitatio valde commoda est, humiditatis
enim euacuationem faciens rarefacit carnem. Conducit &
impransum degere. His autem cibis utendum est per dies
decem, deinde dimidium ablati apponendum est ad dies sex,
& vomitus faciendus, ab vnoquoque verò vomitu, ad dies F
quatuor sensim adiiciendo exhibendus est cibus. Quum au-
tem dies decem à vomitu transierint, omnem detractum ci-
bum assumat, laboribusque ac deambulationibus deditus
sit, & sanus euadet. Talis autem natura copiosiore labore
quàm cibo opus habet. Quidam etiam talia perpetiuntur.
Secedit ipsis cibis per aluum liquidus inconcoctus, velut ex
intestinatorum leuitate, & dolorem nullum exhibet, patiuntur
autem hoc ventres maximè qui humidi ac frigidi sunt: &
propter frigiditatem quidem non concoquunt, propter hu-
miditatem verò secessus fit. Corpus igitur cōtabescit, alimē-
tum conueniens ac debitum non accipiens, Ventresque cor-
rumpuntur, & in morbos incidunt, verum prouidere opor-
tet. Confert huic de cibis tertiam partē auferre. Sint autem
cibi,

A cibi, panes non fermentati ex tota farina collata, clibano cocti, aut subcinericij calidi, in vinū austerum tincti, & pisciū partes ex dorso ac cauda. Verū capitales & sub ventre fi-
nende sunt velut humidiores. & coctos quidē pisces in mu-
ria edere oportet, affatos autem in aceto. Utendū etiā car-
nibus sale & aceto inueteratis, & caninis affatis, & de pa-
lumbe ac reliquis eiusmodi volucris, affatis ac coctis. Ole-
ribus verò minimè, Vino utendum est nigro, & deambula-
tionibus à cœna ac matutinis, à deambulatione autem dor-
miat. Cursibus verò curuis, sensim accessione augescere utar-
tur. Sit & frictio multa, & lucta tarda, & in oleo, & in pulue-
re, quo caro concalescens resiccet, & humiditatem ex ven-
tre reuellat. Vngi autem magis conducit quàm lauari, im-
pransus verò degat. **Quum** autem dies septem transierint, di-
midiū cibi apponatur, & ad quatuor dies exhibeatur, & vo-
mat. Post alios verò septem dies, omnem cibum assumat, &
vomitu rursus, facto, cibis eodem modo exhibeatur. **Qui-** Morbus
busdam verò aliis talia fiunt. Secessus non putrefactus per alius.
alium abit, & corpus contabescit cibis non fruens, hi verò
progressu temporis in morbos incidunt. His ventres frigidi
ac sicci sunt. **Quum** itaque neque conuenientibus cibis, ne-
que exercitiis vtuntur, talia perpetiuntur. Conducit autē sic
affecto, panibus puris furnaceis uti, & piscibus coctis cū in-
tritis, & carnibus coctis suillis, & extremitatibus percoctis,
& plurimis affatis, & ex acribus ac salis his quæ humectāt,
& saluginosis. Vinis autem nigris mollibus, & inter cibos
uis ac ficibus impleri cōfert. Oportet & modicū prandere, **Qui** cibis
& exercitationibus pluribus uti, cursibusq; curuis sensim cre-
scentibus, postremū autē cursibus circularibus, & post cur-
sum lucta cū oleo: deambulationibus verò nō multis ab ex-
ercitiis, à cœna verò satis est exurgere. Matutinis autē pluri-
bus deambulationibus vtatur. Lauetur calida, & vtatur la-
boribus, ac vnctionibus somnōq; lōgiori indulgeat, & molli-
ter cubet. Oportet & venere aliquo modo uti. Verū de cibis
quarta pars detrahenda est, & post dies decem rursus ad con-
fuetos cibos reducendus est. Sunt etiā quibus secessus liquidus
ac putrefactus per alium abit, & qui aliās sani sunt ac exer-
centur, nullum dolorē res exhibet. Quibusdā verò excludun-
tur ea quæ cōueniebant, progressūq; temporis venter per ca-
lidita

Curatio.

Morbus
& exercita-
tio.Morbus
alius.

Hippocratis Liber III.

Medela.

Cibus qui.

**Beta refri-
gerat.
Quæ exer-
citatio.**

**Vomitus.
Semel co-
medere his
confert.**

**Morbus
alius qui
stercoris
vomitū fa-
cit.**

liditatem carnes attrahit, & dōlorem exhibet, & cibi exclu-
duntur, & venter exulceratur, & ipsum sistere iam operosum
ac difficile est. Verū prius providere oportet, ac nosse ven-
trem calidum ac humidum magis quā debet esse, labo-
rūmq; incōmodum excessum factum esse. Per diætā igitur
frigefacere ac siccare oportet, & primū quidem exer-
citia ex dimidia parte detrahē, & de cibus tertiam partem.
Utatur autē Maza antea subacta, ac vino dulci emollita,
& piscibus siccissimis coctis, & neque pinguibus neq; salis.
Utatur & carnibus assatis volucrum, coctis quidē, palum-
bis ac columbæ, assatis autem perdicum & gallorum citra
condimenta. Leporinis vero coctis in aqua, itēque ferinis
omnibus. Ex oleribus autē quæ frigefactoria sunt, velut beta
cocta acida. Vino verò nigro austero. Gymnasti autem, cur-
sibus circularibus velocibus, verū frictio non multa adhi-
beatur, sed modica, neque lucta. Micatio per summas ma-
nus, & manuum ad rythmum motus, & follis, & Volutatio
in pulvere, commoda sunt, sed non multa. Deambulationi-
bus ab exercitiis utatur sufficientibus iuxta laborē, & à coe-
na pluribus, iuxta cibum, & mane moderatē, iuxta habitum.
Lauet autē tepida, ac quiescat. Sic ubi in hac diætā transe-
git dies decem, apponatur cibi dimidium, & laborum ter-
tia pars, & vomitum faciat à cibus siccis & acris, & in ci-
bo ne moretur, sed quā celerrimē vomat: à vomitu ad dies
quatuor & cibus, & labor partitus exhibeatur. Vbi autē dies
decem præterierint, reliquum cibi apponatur, & vinum po-
tabile, verū labores pauciores, & ubi vomitum fecit, cibus
velut scriptum est exhibeatur. Hoc verò tempore semel
tantū in die cibum capere cōducit, donec malum sedetur.
Aliis porrò quibusdam siccus & perustus secessus fit, & os
siccum, & progressu temporis etiā amarum fit, & alius sisti-
tur, itēque vrina. Quum enim non habeat intestinum hu-
miditatem circa excrementum, intumescens transitus obtu-
rat, & dolorē exhibet, & calor occupat, & quicquid biberit,
aut edirit homo, id ipsum reuomit. Postremum verò etiam
stercus vomit, atque hic nō superuiuet, quum ad hoc perue-
nerit. Verū providere oportet ac nosse, quod caliditas &
siccitas in homine prædominantur. Victum igitur ipsi con-
stituere oportet ex maza prius subacta respersa, & pane
ex

A ex tritico trimestri, succo furfurum fermentato. Oleribusque
 vtendum, exceptis acribus & siccis, atque illis coctis, & pisci-
 bus leuissimis coctis, & partibus capitalibus tum piscium,
 tum locustarum, & mitilis, & herinaceis, & cancris, & cōchy-
 liorum succis, ipsiq; liquidissimis. Carnibus autē suillis & Qui nutri-
catus.
 extremitatibus anterioribus coctis, & hœdorum & agnorū
 ac catulorum coctis. Piscium verò fluuiatilium ac in stagnis
 degentium coctis. Vino molli aquoso. Laboribus autē vten-
 dum est non multis, neque velocibus, sed omnibus quietis,
 Deambulationibus verò mane vtatur, iuxta habitum suffi-
 cientibus, & ab exercitij laboribus, moderatis. à cœna verò
 ne deambulet. Balneis vtatur & somnis mollibus, & pran-
 dio, & somno à prandio non longo. Pomis etiā humectanti-
 bus vnà cū cibis vtatur, & cicere viridi, ac sicco in aqua ma-
 cerato. De laboribus verò prioribus dimidium detrahat
 etiam hic à principio, & vomitū faciat à dulcibus & pingui-
 bus ac salis, hisque plurimis: moretur autē plurimum tem-
 pus in cibis vsq; ad vomitum. Deinde cibum exhibeat ad
 triduum, & nō maneat impransus. Quum verò dies decem
 praterierint labores sensim adiiciendo augeat. & si quidem Morbus a-
lius.
 repletio inerit à cibo, aut ventris vitio, vomat: sin minus, sic
 reliquo tempore curetur. Fiunt insuper etiā talia. Horro-
 res à deambulationibus matutinis accedunt, & caput graua-
 tur. Huic plures fiunt deambulationes quàm modus requi-
 rit. Corpus enim & caput humore euacuatū horret ac gra-
 uatur. Progressu verò temporis ad febrē perueniūt horro-
 res. Sed non hucusque differre oportet, verum prius curare Medela
quæ.
 hoc modo. Quamprimū aliqua signa apparuerint, vnctus
 ac frictus modicè prandium amplius solito faciat, & vinum
 multum bibat molle, deinde somno vtatur à prandio suffi-
 cienter. ad vespērā verò vbi exercitiis lenibus vsus est, cali-
 dāque lotus, cōsuetō more cœnet. Deambulationibus autē à
 cœna ne vtatur. verum ad tempus differat. Postridie in aqua
 lauetur, & somnis mollibus tempus transigat. Et per dies
 quinque paulatim ad consuetos cibos ac labores procedat. Morbus a-
lius.
 Sunt autem quidā qui horrent ex gymnasiis, & quum se
 exuunt donec decertent, vbi verò perfrigerati sunt, rursus
 horrent, & stridor dentiū tremulus corpus occupat, somnūq;
 talis grauatur. Vbi autem expergiscitur, sæpe oscitat, & à

Hippocratis Liber

Curatio.

cœna palpebræ ipsi graues sunt. progressu verò tēporis etiā D
febres malignæ accedunt. Verum cauere oportet, & nō huc-
usque differre, sed prius curare hoc modo. Primum quidem
ab omnibus exercitiis dimidiū auferatur. Cibis verò omni-
bus humidioribus ac frigidioribus vtatur, & potibus mollio-
ribus ac dilutioribus. Vbi verò praterierint dies quinque,
tertia pars laborum ablatorū apponatur. Cibis verò iisdem
vtatur. Post alios autē quinque dies, dimidium reliquorū la-
borum apponatur. Et rursus post alios quinq; , omnes labo-
res & leuiiores & pauciores reddito, vt ne rursus excessus fiat.

Cur hæc
fiant.

Nam his qui hæc signa perpetiuntur, labores maiores sunt
quàm cibi. Adæquare igitur hæc oportet. Quidā verò non
hæc patiuntur, sed aliqua ex his, aliqua verò non. In omni- E
bus autem his signis, labores superant cibos, & curatio ea-
dem est. Et cōfert his calida lauare, ac molliter cubare, & se-
mel atque iterum inebriari, verum non vsque ad excessum,
& venere vti, vbi excessus contigerit, & segnem esse ad la-
bores. Deambulationes autem in totum non sunt faciendæ.

H I P P O C R A T I S

C O I L I B E R, D E I N-

S O M N I I S, I A N O C O R N A-

R I O M E D I C O P H Y-

S I C O I N T E R-

P R E T E.

Quæ per
somnum fi-
unt.



QVISVIS de his, quæ in somnis obue-
niunt rectè coniectat, is magnam habere
vim ad omnia, ipsa reperiet. Anima enim
vigilat, & quum, quidē corpori inseruit, in
multas partes distributa, non sui iuris est,
sed partem aliquam singulis corporis par-
tibus siue sentibus distribuit, auditui, visui, tactui, gressui,
actioni, ac omni corporis facultati. Ipsa autē animæ cogita-
tio sui iuris nō est. Quum autem corpus quiescit, anima in
motu est, & corporis partes perreptans, domum suam gu-
bernat

A bernat & omnes corporis actiones ipsa perficit. Nam corpus dormiens non sentit, ipsa vero vigilans cognoscit, ac visibilia videt, & audibilia audit, vadit, tangit, tristatur, animaduvertit. In summa, quaecumque corporis aut animae munia, ea omnia anima ipsa in somno obit. Quicumque igitur hanc recte iudicare nouit, magnam sapientiae partem nouit. Quaecumque quidem igitur somnia diuina sunt, & quaedam euentura significant, aut urbibus, aut populo priuato, siue bona, siue mala, non ipsorum delictum, de huiusmodi sunt qui iudicant certam artem habentes. Quaecumque autem corporis affectiones sunt, & anima per ipsas repletionis aut euacuationis rerum a natura insitarum excessum, aut consuetorum mutationem permonstrat, de his quidem itidem iudicant, & partim assequuntur, partim aberrant, & de neutris recte sentiunt, curam fiat: neque sciunt quando assequuntur, neque quando aberrant, cauere admonentes ne quid mali accidat. Atque hi non docent quomodo cauere oporteat, verum diis supplicare iubent. Et supplicare quidem decorum ac valde bonum est. Oportet autem etiam ipsum opitulari, & deos inuocare. De his igitur res hoc modo se habet. Quaecumque insomnia mens homini, in noctem per somnum offert de diurnis actionibus, & reddit quo modo facta sunt, ea quae seria ac iusta in re per diem facta sunt, aut de quibus consilium initum est: haec homini bona sunt, sanitatem enim significant propterea quod anima in diurnis consiliis perseverat, neque repletionem, neque euacuationem, neque aliqua alia forinsecus allapsa re, victa. Quum autem insomnia diurnis actionibus aduersantur, & de ipsis pugna oboritur, quum sane hoc contigerit, turbationem in corpore significat. Et si quidem fortis fuerit, forte est malum: si vero leuis, debilius. De actione quidem igitur, auertenda sit, siue non, nihil decerno. Verum corpus hominis curari consulo. Repletionem enim aliqua intus facta, secretio quaedam contigit quae animam perturbauit. Si igitur fortis fuerit contrarietas, vomitum facere conducit, & cibos leues exhibere sensim adiiciendo aliquid ad dies quinque, & deambulationibus multis ac velocibus sensim augescentibus uti, & exercitiis exerceri moderatis, pro ciborum assumptorum ratione. Si vero debiliior fuerit contrarietas, detractio vomitum, tertiam sibi partem adime, atque hanc sensim rursus ad

Quantum sit somnia nouisse.

Quae coniectores non assequantur.

Somnia perspicito.

Quae bona & contra.

Curatio.

Hippocratis Liber

Sol, Luna,
stellæ quid
portendant
in somno vi-
sæ.

Quæ nutri-
catio.
Luna per
somnū pa-
ti visa quid
portendat.

Quid sol.

dies quinque adiace, & deambulationibus preme. Sed & vo-
cis exercitiis vtatur, & diis supplicet, & turbatio ipsi sedabi-
tur. At verò solē & lunā, & cælum ac stellas, pura atque agi-
lia solito more videre, singula bona sunt. Sanitatē enim cor-
pori significant ab omnibus præsentibus. Verum talem ha-
bitum præsentī diata cōseruare oportet. Si verò quid cōtra-
rium his fiat, morbum quendā corpori significat: à fortibus
quidem, fortiorē. à debilioribus verò, leuiorem. Et astrorum
quidem exterior est in corpore circuitus, solis vero medius,
lunæ autē ad cavitates, Quodcunque igitur horū astrorum
extingui, aut lædi, aut disparere, aut sisti à circuitu suo vide-
tur, iuxta illam ipsam partē morbum redundare significat:
& si quidem ab aere, aut nebula, aliquod ex ipsis astris pati
quid horum videt, debiliorem: si verò ab aqua, aut grandine
fortiorem. Significat autē secretionem in corpore humi-
dam ac pituitosā factā esse, & in externam circumferentiā
illapsā esse. Cōducit itaque huic & cursibus in omni vesti-
tu vt multis, sensim augescētibz, vt quā maximē exu-
det. Itē deambulationibus ab exercitio multis citra pran-
dium vtī, & detracta ciborum tertia parte, ad dies quinque
sensim adiiciendo rursus exhibere. Si verò fortius videatur
malum esse, etiā fomentis vtī. nā per corporis cuticulā pur-
gationem facere expedit, propterea quod in externa circun-
ferentia offensa ac læsio existit. Cibis verò vtendū est ficiis,
acribus, austeris, meracis, & laboribus maximē siccantibus.
Si verò quid horum luna patiat, reuulsionem intro facere
conducit, vtique vomitu ab acribus, & salsuginosis, ac molli-
bus cibis, cursibus autem circularibus celeribus, & deambu-
lationibus velocibus. Vtendū & vocis exercitiis, & prædium
auferendum, cibiq; detractiōe, ac rursus appositione, eodē
modo vtendum est. Ob id autē intro reuellendum est, quia
ad cavitates corporis offensa apparet. Si autem sol tale quid
pati videatur, fortius iam malum est, & difficilius exigi po-
test. Oportet autem in vtranque partem reuulsionē facere,
& rectis cursibus, & curuis, & circularibus vtī, & deambu-
lationibus, & aliis laboribus omnibus. Ciborum autē detra-
ctione, ac rursus appositione, eodem modo. deinde vomere,
& rursus sensim cibos augere, ad dies quinque. Si verò se-
renitate existente premantur hæc, & debilia esse videantur,
& præ

A & præ siccitate à circuitu suo impediri, periculum significat delabendi in morbum. Verum oportet labores detrahere, & diata humectiore ac molli uti, & balneis ac otio ampliori, & somno longo ac multo, donec malum sedetur. Si autem igneum ac calidum esse videatur quod se illis opponat, bilis secretionem significat. Si verò superata hæc dispareant ac evanescant, periculum est ad mortem perueniendi ex morbo. Si verò versa ac mutata hæc esse videantur, præsentem statum in fugam verti significant. Fugere autem ipsa celeriter, esseque qui ea persequantur, periculum denuntiant future infaniam hominis, si non curatus fuerit. Omnibus autem his conducit, ut veratro purgati, optimam victus rationem instituât. sin minus, ut victu ad B. aquam tendente utantur. vinum verò non bibant, aut omnino album, tenue, molle & aquosum. Abstineant autem ab acribus, resiccatibus, calfacientibus, ac falsuginosis. Laboribus secundum naturam plurimis utantur, & cursibus in vestitu plurimis. Frictio verò ne fiat, neque lucta, neque volutatio in pulvere. Somnis utatur mollibus, & in otio degat, exceptis laboribus naturalibus, à cæna deambulet. Bonum est & fomentis uti, à fomentis verò vomere, per triginta verò dies non repleatur. Quum autem repletus fuerit, bis in mense vomat à dulcibus & aquosis ac leuibus. Quæcunque autem ex his aliàs aliò præ nulla necessitate errant, animæ turbationem quandam præ cura significant. Confert autem huic otium, & animam conuerti ad spectacula, maxime risum mouentia: quod si fieri non possit, C. ad id ex quo ad biduum aut triduum maxime voluptatem capiat, & sedabitur. Sin minus, periculum est delabendi in morbum. Quæcunque astra ex circumferentia excidere videntur, suntque pura & splendida, & ultra ac prorsum ferri videntur, sanitatem significant. Quicquid enim in corpore parum ex circuitu excernitur secundum naturam, à vespera in auroram: id ipsum recte habet. Nam & quæ in ventre secernuntur, & quæ in carnem eructantur, omnia ex circuitu ac circumferentia excidunt. Quæcunque verò nigra & obscura sunt, & ad vespeream ac occasum ferri videtur, aut in mare, aut in terram, aut sursum, ea magis morbos significant. Et quæ quidem sursum feruntur, fluxum capitis significant. Quæ verò in mare, ventris morbos. Quæ in terram, tubercula maxime significant ex carne enascētia. His conducit tertiam cibi partem detrahere, & à vomitu, ad dies quinque.

Diuerstitū somniorum observatio.

Pura videre astra quid portendat.

Hippocratis Liber

Quid puritas
aëris.

Cum deus
qui dat.

Quid pluvia
serena.

Quibus
diis suppli-
candum.
Diuerſa
viſa.

quinque eandem rursus ſenſim adiiciendo exhibere, in aliis
autem quinque diebus cibos omnes allumere, & vomitu facto,
rursus eodem modo cibis ſenſim auctus exhibeatur. Quæ-
cunque verò ex his pura & candida in cælo hæſere videbun-
tur, ſanum eſſe ſignificant, quia quod in hominem deſcendit
ex æthere eſt. Tale autem videt anima, quale ſane deſcenderit.
Quæ autem nigra fuerint, & non pura, neque conſpicua, mor-
bum ſignificat, non propter repletionem, neque euacuationem:
ſed foriſecus inductum. Huic conſert curibus circulari-
bus velocibus uti, quo quàm minima corporis colliquatio
fiat, & ſpiritu quàm denuſſimo vtens, id quod inductum eſt ex-
cernat, à curſibus autem deambulationibus celeribus vtien-
dum eſt. Viſtus autem mollis & levis ad dies quatuor offe-

ratur. Quicquid porro à deo accipere quis ſibi videtur pu-
rum, bonum eſt ad ſanitatem. Significat enim ea quæ in cor-
pus ingeſta ſunt pura eſſe. Quicquid verò huic contrarium
videre quis putat, non eſt bonum. Morbum enim in corpus
veniſſe ſignificat. Oportet igitur velut priorem etiam hunc
curari. Si quis ſe complui putet clementi cælo, aqua molli,
& non valde madefieri, neque vehementem tempeſtatem in-
gruere, bonum eſt. ſignificat enim moderatum ac purum ſpi-
ritum ex aere ingreſſum eſſe. Si verò vice verſa, valde com-
plui quis ſibi videatur, & tempeſtatem ac turbinem eſſe, id-
que aqua non pura, morbum deſignat à ſpiritu qui in ipſo eſt.

Verum oportet etiam hunc ſimili diata uti, & omnes hos
paucis cibo ali. De ſignificationibus quidem igitur aſtro-

ſum ſic iudicare oportet, prouideréque ac diatam ſtatueré,
& diis ſupplicare, in ſecundis quidem rebus Soli, Ioui cæle-
ſti, Ioui poſſeſſori, Mineruæ opulentæ, Mercurio, Apollini. In
contrariis verò, diis malorum auerſoribus, & terræ, & heroi-
bus, quo mala ac græua omnia auertat. Cæterum & hæc
ſanitatem præſignant. Nimirum ea quæ in terra ſiunt, acutè
videre, & audire, & ſecurè iter facere, & ſecurè ac citra timo-
rem currere, & videre terram leuem ac probè cultam, & ar-
bores florentes, fructuoſasque ac ſatiuas, & flumina ſolito mo-
re fluentia, & aqua pura, neque copioſiore, neque pauciore
quàm conueniens eſt. Item fontes & puteos eodem modo.

Hæc omnia ſic viſa, ſanitatem homini deſignant, & corpus
rectè habere, omnesque circuitus, & exhibitiones ciborum,
ac ſecre

A ac secretiones, integras esse. Si verò quid his contrariū videatur, detrimentum aliquod in corpore significat. Et visus quidem ac auditus latus, morbum circa caput significat. Itaque matutinis deambulationibus, itémq; à cœna pluribus utendum est, ad superiorem diætā. Cruribus verò latis, vomitibus reuellendum est, & lucta ampliore utendū, ultra superiorem diætā. Terra autem aspera, carnem non puram significat, quare deambulationibus ab exercitiis pluribus utendum est. Arborū vero sterilitas, seminis humani corruptionem indicat. Si igitur folia arboribus decidant, ab humidis ac frigidis corpus læditur. Si verò floride sint arbores, verum infructuosæ, à calidis & siccis, hæc igitur per diætā frigefacere ac humectare oportet, illa verò siccare ac calfacere. Flumina autem non solito more fluentia, sanguinis circuitum significant, & auctiora quidem fluentia, excessum: imminuta verò, defectum. Oportet itaque per diætā hunc quidem augere, illum verò imminuere. Non pura autem fluentia, turbationem significant, quæ à cursibus circularibus & deambulationibus, corpore per densum spiritum moto, purgatur. Fontes verò & putei commoti cōspecti, flatus circa vesicam significant, quos medicamentis vrinam cientibus expurgare oportet. Mare perturbatum, ventris morbum significat, sed oportet aluum mouentibus, leuibusque ac mollibus expurgare. Terram aut domum moueri videre, sano quidem viro debilitatem significat, ægrotanti verò sanitatem, & ex præfenti statu transmotionem. Sano itaque transmutare diætā conducit, Itaque primum vomat, & rursus, vbi paulatim cibum assumpit, à præfenti enim diætā totum corpus mouetur, debili verò eadem diætā uti conducit. Nam corpus ex præfenti statu transit. Terram ab aqua aliqua aut mari inundatam videre, morbum significat, humiditate multa in corpore existente. Verum oportet vomitibus, & prandij detractione, & laboribus & sicco victu uti, deinde sensim adiiciedo, ac modico cibo renutrire. Sed neque nigram, neque combustam terram videre bonū est, sed periculum est de labendi in fortem ac lethalem morbum. Siccitatis enim excessum in carne esse significat. Verum oportet & labores detrahare, & cibos qui sicci & calidi, & acres ac vrinam cientes sunt: nutrireque; ptisanæ succo decocto, & omnibus mollibus ac leuibus.

Medela.

Cursus fluminis per somnū visus quid velit.

Fontes, putei.

Motus terræ vel domus.

Terræ inundatio.

Terræ nigrae perustaque somnium bonum non est.

Hippocratis Liber

bus modicis : & potu vti aquoso, albo, copiosiore : & balneis D
 multis calidis, sed ieiunus ne lauet, molliter cubet ac dor-
 miat, & in otio degat, frigus & Solem vitet. Supplicet autem
 terræ, & Mercurio, & Heroibus. Si verò in stagno, aut in ma-
 ri, aut in fluminibus natare quis sibi videatur, nō est bonum,
 humiditatis enim excessum significat. Confert autem huic
 & diæta sicca, & laboribus vti, febricitati verò id bonum est,
 extinguitur enim caliditas ab humoribus. Quicquid porro
 quis circa seipsum videt solito more fieri, ad naturam sui-
 ipsius, neq; maius, neq; minus, bonum est ad sanitatē. Et ve-
 stitum album indutū esse, & calciamentum pulcherrimum,
 bonum est. Quicquid verò membris maius fuerit, bonū non
 est, sed neque quodcunque tandem fuerit minus : & oportet E
 hoc quidem per diætā augere, illud verò minuere. Nigra
 autem morbosiora sunt, & periculosa. Mollire itaq; oportet
 & humectare. Noua quoque transmutationem significant.
 Mortui. Mortuos videre puros in vestibus albis, bonum est, & accipe-
 re aliquid ab ipsis purum, bonum est. Sanitatem enim signifi-
 cat corporum, & salubritatem ingestorū, à mortuis enim nu-
 trimenta, & incrementa, ac semina fiunt. Hæc autem pura in
 corpus irrepere, sanitatem significat. Si verò contra quis vi-
 deat ipsos nudos, aut nigris vestibus indutos, aut non puros,
 aut aliquid accipientes, aut ex domo portantes, non est com-
 modum. Morbum enim significat, quæ enim in corpus inge-
 runtur, nociua sunt. Verū oportet cursibus circularibus &
 deambulationibus depurgari, & alimento molli ac leui à vo F
 mitu sensum nutriri. Quæcunq; verò formæ peregrinæ cor-
 pora in somnis apparent, & hominē perterrent, ciborum in-
 consuetorum repletionē, & secretionem, & bilis supernè ac
 infernè eruptionem, & morbum periculosum significāt. Ve-
 rū oportet vomitum facere, & ad dies quinq; cibos quam-
 leuissimos non multos, neque acres, neque siccos, neque cali-
 dos sensim adiiciendo accipere, & laboribus naturalibus ma-
 ximè vti, exceptis deambulationibus à cœna. Vtendum e-
 tiam balneis accalidis lauacris, & otio, Solem verò & frigus
 vitet. Si verò quis per somnum edere aut bibere consuetos
 cibos ac potus sibi videatur, inopiam alimenti significat, &
 animæ tristitiam. Et si carnes robustissimas quis edere se pu-
 tet, maximum alimenti excessum designat. Si verò debilis-
 simas,

Natio
quid por-
tendat.

Vestis cal-
ciamentiq;
somnia.

Nigra.

Noua.

Mortui.

Corpora
formæ pe-
regrinæ.

Comestio,
potatioq;

Carnis co-
mestio.

A simas, maiorem. Quemadmodum enim id quod editur bonum est. Sic etiam id quod videtur. Cibos igitur detrudere conducit. Nam alimenti excessum hoc significat. Sed & panes ex caseo ac melle facti per somnum comesti, similiter significant. Aquam autem puram bibere bonum est, reliqua omnia nociua sunt. Quaecunque homo ex consuetis ac familiaribus se videre putat, ea animae concupiscentiam significant. Quaecunque verò fugit perterrefactus, sanguinem fissi ac prae siccitate coerceri significant. Confert itaque frigidificare ac humectare. Quum verò quis pugnat, aut pungitur, aut ab alio ligatur, secretionem circuitui contrariam corpori contigisse significat. Conducit igitur vomere, & atrenuare ac deambulare, & cibis leuibus uti, & à vomitu ad dies quinque sensim renutrire. Quin & oberrationes & ascensus in somnis visi, grauius significant. Fluminum transitiones, & hostes armati, monstra formae peregrinae, morbum aut insaniam significant. Confert itaque his qui talibus in somnis vexantur, cibis modicis uti leuibusque ac mollibus, itemque vomitibus, atque sic sensim rursus ad dies quinque cibum exhibere. Utendum & laboribus naturalibus multis, praeterquam à coena, Calida lauacra, & otium, frigusque ac Solem vitent. Qui igitur his quemadmodum conscripta sunt uteretur, vitam sanus deget, & inuenta est sanè à me haec ipsa diata, quantum possibile est humano ingenio excogitare, diis auxiliantibus.

Aqua potio.

Diuerfa somnia aspicio.

Inuentum Hippocratis.

HIPPOCRATIS

COI LIBER DE ALI-

MENTO, IANO COR-


NARIO MEDICO

PHYSICO IN-

TERPRETE.

Hunc Librum Galenus Hippocratis esse negat. Sed tamen non alicuius plebei ac vulgaris hominis esse dicit, & fortassis ipsius Thessali. Quidam Herophilum autorem putant.

ALIM



LIMENTVM & alimenti species, D
vnum & multę: vnum quidem, qua-
tenus vnum genus est. Species verò
humiditate ac siccitate finitur, & in
his formę, ac quãtitas est, & ad quę-
dam, & ad tot. Auget autem, & cor-
roborat, & incarnat, & assimilat, &
dissimilia facit quę in singulis sunt,
iuxta vniuscuiusque naturam ac fa-
cultatem quę ab initio adest. Assimilat autem pro viribus,

quum id quod superingeritur superatur, id verò quod prius
inest superat. Exile autem fit aliquando quidem prius, in
tempore dissolutum aut insuper appositum, aliquando verò
posterius, in tempore dissolutum aut appositum. Destruit
autem vtrunque in tempore & post tempus, id quod extrin-
secus assiduo superingestum est, & per multum tempus om-
nibus membris solidè implicatum est, & propriam qui-
dem formam producit, priorem verò aliquando autem &
priorēs, destruit. Facultas porrò alimenti peruenit & ad
ossa, & ad omnes partes, & in neruum, & in venam, & in ar-
teriam, & in musculum, & in pelliculam, & carnem, & pin-
guedinem, & sanguinem, & pituitam, & medullam, & cere-
brum, & medullam spinalem, & interanea, omnesque ipso-
rum partes, & sanè etiam in caliditatem, & spiritum, & hu-
miditatem. Alimenti verò & id quod hoc nutrit, alimen-
tum est, & quod velut nutrimentum est, & quod nutrimen-
tum futurum est: Principium autem omnium vnum est, &
finis omnium vnus, & idem finis est atque principium: &
quę particulatim in alimento probè & malè distribuuntur.

Ciborum
vis.

Succorum
vis.

Probè quidem, quę prædicta sunt. Malè verò, quę con-
trarium his ordinem habent. Succi varij, & coloribus, &
viribus, & in detrimentum, & in vtilitatem, & neque læden-
tes, neque commodantes, & multitudine, & excessu, & defe-
ctu, & implicatione, aliquorum quidem, aliquorū verò non.

Et omnium caliditatem lædunt ac iuuant, & frigiditatem
lædunt ac iuuant, & facultatem lædunt ac iuuant. Faculta-
tis autem varię naturę sunt. Succi corrumpentes & totum,
& partem, & forinsecus ac intrinsecus, spontanei & non spon-
tanei, Nobis quidem spontanei, causę verò non spontanei.

Rursus

A Rursus autē causæ, aliæ manifestæ, aliæ obscuræ, & aliæ
possibiles, aliæ impossibiles. Natura omnibus subuenit. Ad
hanc verò forinsecus quidem cataplasma, Illitio, Vnguentū,
Nuditas & totius & partis. Caliditas & frigiditas, iuxta ean-
dem rationem & adstrictio, & vlceratio, & morsus, & corro-
sio. Intrinsecus verò & quædam ex prædictis, & suprà hæc
causæ obscuræ, & parti & toti, & alicui & non alicui, excre-
tiones ventris secundum naturam, item vrinam, sudoris, sa-
liuæ, muci, vteri, iuxta hæmorrhoidas, verrucam, lepram, tu-
berculum, carcinoma, ex naribus, ex pulmone, ex ventre, ex
fede, ex coele, secundum naturam, & præter naturam, disci-
mina horum aliis iuxta aliam rationem, aliquando etiā ali-
ter. Vna natura sunt hæc omnia, & non vna. Multæ naturæ
sunt hæc omnia, & non vna. Medicina sursum & deorsum, &
neque sursum, neque deorsum. In alimento medicina, opti-
mum. In alimento medicina malum. Malum & optimū ad
aliquid. Vlcus, crusta, sanguis, pus, sanies, lepra, furfur, vlcera
capitis manantia, impetigo, vitiligo, lētigo, aliquando lēdit,
aliquando prodest, aliquando neque lēdit, neque prodest.
Alimentum, non alimentū. Si nutrire non potest, nomen est
alimentum, non opus. Opus & res est alimentum, nō nomē.
In pilos alimentum, & in vngues, & in extremā superficiem
intrinsecus peruenit. Forinsecus alimentum ex extrema su-
perficie, ad intima peruenit. Confluxio vna, conspiratio vna,
Consentientia omnia. Iuxta totius quidē corporis naturam
omnia, iuxta partem verò, partes in vnaquaq; parte ad opus.
Principium magnum ad extremam partē peruenit. Ex ex-
trema parte ad magnum principium peruenit. Vna natura,
esse, & non esse. Morborum differentia, in alimēto, in spi-
ritu, in calore, in sanguine, in pituita, in bile, in humoribus,
in carne, in pinguedine, in vena, in arteria, in neruo, muscu-
lo, pellicula, osse cerebro, medulla spinali, ore, lingua, stoma-
cho, siue gula, ventre, intestinis, septo transverso, peritonæo
membrana aluum ac intestina amplectente, hepate, splene,
renibus, vesica, vtero, cute. Hæc omnia & singulatim & par-
ticularim. Magnitudo ipsorum magna, & non magna. Si-
gna, titillatio, dolor, ruptura, mens, sudor, vrinarum subsidē-
tia, quies, iactatio, visus, imaginationes, morbus arquatus, sin-
gultus, morbus comitialis, sanguis integer, somnus. & ex his

Causa
riz.Causa non
semper pa-
tet.Medicina
varia.

Alimētum.

Mira & bre-
uis discus-
sio mēbro-
rum.Signa lan-
guentis.

r

&

Hippocratis Liber

**Signa ob-
seruanda.**

**Varietas
consideran-
da.**

Pulmo.

**Alimenti
principiū.
Venarū se-
des & arte-
riarum.**

Lac.

Vinum.

**Sanguis va-
riat.**

& ex aliis naturalibus, & quæcunque alia huiusmodi ad de- **D**
trimentum & vtilitatem procedunt. Labores totius & par-
tis. Et magnitudinis signa, alterius ad maius, alterius ad mi-
nus, & ab vtrisque ad maius, & ab vtrisque ad minus. Dulce
non dulce, dulce ad potetiam, velut aqua. Dulce ad gustum,
velut mel. Signa vtrorunque, vlcera, oculi, & gustus, & in his
magis & minus. Dulce ad visum, & in coloribus, & in aliis
mixturis. Dulce magis & minus. Raritas corporis ad perspi-
rationem, quibus amplius aufertur, saniores sunt. Densitas
corporis ad perspirationem, quibus minus aufertur, morbi-
diores. Qui probè perspirant, debiliores & saniores sunt, &
à morbis facile reconualescunt. Qui malè perspirant prius-
quam ægrotent, fortiores sunt. Vbi autem ægrotarunt, diffi- **E**
cilius à morbis recoualescunt. Hæc autè & toti & parti. Pul-
mo contrarium corpori alimentum trahit, reliqua verò o-
mnia idem. Principium alimenti spiritus, nares, os, guttur,
pulmo, & reliqua respiratio. Principium alimenti & humi-
di & ficci, os, gula, venter. Verùm antiquius & primordiale
alimentum, per abdomen vmbilicus. Radicatio venarū he-
par. Radicatio arteriarum cor, ex his aberrat in omnia fan-
guis & spiritus, & color per hæc meat. Vis vna & non vna,
qua omnia hæc & alia gubernantur, alia quidem ad vitam
totius & partis, alia ad sensum totius & partis. Lac nutrimē-
tum, quibus videlicet secundum naturam alimentum est, a- **F**
liis verò non. Aliis autem vinum alimētum est, & quibusdā
non alimentum. Et carnes, & aliæ multæ alimēti species, &
iuxta regionē & iuxta consuetudinem alunt, partim ad aug-
mentum, & ad esse, partim ad esse solum, velut in senibus.
Quædam verò suprâ hæc, etiam ad robur. Dispositio Athle-
tica non est à natura. Habitus sanus melior in omnibus. Ma-
gna est res quantitas ad vires solerti ratiocinatione adopta-
ta. Lac & sanguis alimenti sunt redundantia. Circuitus ad
multa consoni sunt, ad fortum eiusque alimentum. Rursus
autem sursum repit in lac, & in alimentum, & ad infan-
tem, Viuificantur non animalia, viuificantur animalia. Vi-
uificantur partes animalium. Naturæ omnium nullo docto-
re vsæ sunt. Sanguis alienus vtilis. Sanguis proprius vtilis. Sā-
guis alienus nocius Sanguis proprius nocius. Humores
proprij nociui. Humores alieni nociui. Humores alieni con-
ducibiles

A ducibiles. Humores proprii conducibiles. Consonans dissonans est. Dissonans consonans est. Lac alienum bonum. *Lac variat.*
 Lac proprium nocium. Lac alienum nocium. Lac *Digestio*
 proprium commodum. Cibus iuuenibus facile ac leuiter per *per aetates.*
 trefactus. Senibus verò ad summum transmutatus. His qui *Partus con-*
 in vigore ætatis consistunt impermutabilis, Ad figuratio- *formatio.*
 nem, soles triginta quinque. Ad Motum, septuaginta. Ad
 perfectionem, ducenti & decem. Alij tradunt. Ad formam,
 quadraginta quinque, ad motum, septuaginta sex, ad exitum,
 ducenti & decem. Alij sic. Ad formam, quinquaginta,
 ad primum saltum, centum, ad perfectionem, trecenti.
 Alij sic. Ad discriminationem, quadraginta, ad transitum,
B octoginta, ad elapsum, ducenti quadraginta. Non est, &
 est. Gignuntur autem in his & plures & pauciores, secun-
 dum totum, & secundum partes. Non multo autem plures aut
 pauciores, pauciores verò tot, & quæcunque alia his similia.
 Ossium alimentum ex confractione. Nasus *Quota of-*
 Maxilla & clauicula, & costis duplicia, cubito triplicia. Ti- *sum coals-*
 bia & brachio quadruplicia, femori quintuplicia. Et si quod *scientia.*
 in his plus aut minus potest. Sanguis humidus & sanguis *Sanguinis*
 solidus. Sanguis humidus bonus. Sanguis solidus malus. *alia varia-*
 Ad aliquid omnia mala & bona sunt. Via sursum deor- *tio.*
 sum vna. Potentia alimenti melior quam moles. Moles ali- *Cibariorū*
 menti melior quam potentia. Et in humidis & in ficcis de- *variatio.*
 trahit & apponit idem, & alteri quidem aufert, alteri verò
C apponit idem. Venarum pulsationes, & respiratio spiritus, *Pulsus spi-*
 iuxta etatem, & consonantia & dissonantia sunt, & morbi *ratio, signa*
 & sanitatis signa, & sanitatis magis quam morbi, & morbi *sanitatis &*
 magis quam sanitatis. Alimentum enim etiam spiritus est. *morbi.*
 Humidum alimentum magis facile transmutatur quam
 ficcum. Siccum alimentum facilius transmutatur quam hu-
 midum. Alimentum quod ægrè alteratur, ægrè consumi-
 tur. Quod facile apponitur, facile consumitur. Et quicunque
 veloci appositione opus habent, his humidum ad reficiendas
 vires medicamen optimum. Quicunque verò adhuc velo-
 ciori indigent, per olfactum. Qui autem tardiore appositio-
 ne opus habent, solido alimento vtantur. Musculi solidiores
 ægrè magis quam alia colliquescent, excepto osse & neruo.
 Quæ denudata sunt, ægrè transmutantur, & secundum ge-
 nus

Hippocratis Liber

nus ipsa seipsis fortiora sunt quàm pro re ipsa: propterea ip- D
sa seipsis ægrius colliquescent. Pus ex carne, purulentum ex
sanguine, & ex alia humiditate. Pus vlceris alimentum. Pus
alimētum venæ, arteriæ. Medulla alimentū ossis, propterea
callo obducuntur. Facultas & potentia omnia auget & nu-
trit, & germinare facit. Humiditas alimenti vehiculum est.

H I P P O C R A T I S

COI LIBER DE HVMIDO-

RVM SIVE LIQVIDO-

RVM VSV, IANO CORNA-

RIO MEDICO PHY-

SICO INTER-

PRETE.

*

Aqua.



QVA potabilis, saluginosa, mare. Potabi-
lis quidē in officina medica optima. Nam
& ferramentis & æramētis optima, & me-
dicamētis plurimis inueteratis cōmunissi-
ma. Verūm ad corpus nosse oportet, quod
hæc aut madefacit, aut frigefacit, aut calfa F

cit. Aliter verò nulli commodat, aut detrimento est potata.
Vbi modica potabili in spongia vteris, optimum oculis est.

Oculorum
medela.

Cutis ipsa supernè exulceratur calidæ aspersione. Fomētum
corporis totius aut partis, Cutis duræ mollitio, distente laxa-
tio, neruorum carniū, humorum sub cutem effusio, sudo-
ris secretio. Humectare prolutione, velut nares, vesicam, fla-
tus. Incarnare, attenuare, liquefacere, minuere, colorem re-
uocare, colorem dispergere. Somniferum & in caput, & in
alia, conuulsionum, tensionum, mitigatiuum dolores stupe-
facit auris, oculorum, & quæcunq; talia, frigida calfacere, ve-
lut pix vlceribus, præterquā à quibus sanguis erumpit, aut
erupturus est, tractis, luxatis, reliquis quibus linteola sunt
medicus, Capitis grauitati. Moderatio in vno quoq; ne vltra
torq

A torqueamus, velut calida corpori, ex excessu in vtranq; partem, vt ab vtraque non aberret, coniectatione ex detrimento, aut inutili facta, velut in tepida. Oportet enim detrimentis aut vtilitatibus etiam si sint vti, vsquequo inuent, aut donec lædant. Madefactio itaque & humectatio, debile quid est. Frigefactio verò & calfactio, forte: velut ex sole.

Madefactio.

Frigefactio.

Calfactio.

Verum frigida calida existens, velut potabilis aqua, debile quid est. Calida autem ne vltius pergat, vt vrat. Indicat autem de his ipse ægrotus, exceptis mutis, aut leuiter syderatis, aut stupefactis, aut velut in vulneribus perfrigeratis, aut nimio dolore vexatis. his enim hæc sensu non percipiuntur. Nam nō sentiunt hi perusti. Itēq; profundæ ac magnæ luxationes. Iam verò etiam pedes deciderūt perfrigerati, ex calidæ perfusione. Sed his corpus perfusi iudex est, similiter etiam frigidæ. Harum aut vtrarumq; paucitas, debile quid est. Multitudo verò, forte. veruntamen sinere oportet, donec fiat id cuius gratia fiunt. antea verò quàm postremū fiat, cessandum est. Harum porro vtraque lædit, & calida quidem amplius ea vtentibus has læsiones inducit, carnium effeminationem, neruorum debilitatem, mentis stuporem, sanguinis eruptiones, animi deliquia hæc ad mortem. Frigida verò conuulsiones, tensiones, nigrores, rigores febriles. Mediocritas quidem extra noxam est. Reliqua verò lædunt ac pro sunt, velut relatū est. Voluptatibus, & iucunditatibus, & doloribus ac molestiis, prout singula ex ipsis conueniunt, ita sani apparent. Corpus tegi ac velari aduetum, quicquid insuetum est, quicquid longissimè à familiari calore abest, & peregrino frigori propinquissimū, id ipsum auersatur: & propterea sanè calida gaudet, & ferre potest. Cerebrum & quæ ab hoc oriuntur, frigida quidem tristantur, calida verò gaudent, si sanè frigidius & solidius à natura fuerit. Propterea ossibus, dentibus, neruis frigida inimica, calida verò amica, quia ab illa conuulsiones, tensiones, rigores febriles, quæ sanè frigida facit, calida verò sedat. Ob id etiam à calida voluptates, & illecebræ, à frigida verò dolores & auersationes. Ideoque spina, pectus, dorsum, præcordia, magis frigida aggrauantur calida verò gaudent, & ferre ipsam possunt. propterea sanè spina, pectus, dorsum, præcordia, contraria perpeffa sunt, quia sunt cōtraria. propterea sanè in hoc loco anxietas

Calida conpriosius vtētes quid patiuntur.

Ossibus dentibus nervis frigida inimica.

Hippocratis Liber

xietatem ex calida obortam, frigida sedat. propterea sanè D
 frigida potu gaudet. propterea sanè cibus calidis delectatur.
 propterea sanè & in animi deliquiis frigida extremis parti-
 bus affundere prodest. Quòd autem posteriores partes cali-
 dam magis sufferunt quàm anteriores, quæ relata sunt in cau-
 sa sunt. Quòd verò etiam frigida, rectè habet. Nam & extre-
 mæ partes anteriores sunt, & tegi non adsueta: velut etiam
 interna pars se habet ad externam. Cogitandum autem quòd
 vtrique in vnoquoque corpore potior est externa cute, quæ
 & sibi ipsi, & neruo sanguineo cõtinaua ac cohærens, eo quod
 extrà proprium calorem, in externo frigore est, ab vtriusque
 frequenter superatur, & vtriusque frequenter opus habet, fre-
 quentius autem calida ad voluptatem. Perpetiuntur autem E
 & extremæ partes tale quid, quare citò multa percipiunt, tar-
 dè autem primùm attolluntur. Et venæ quoque aliæ prius,
 aliæ posterius. Atque sic omnia apparent, & vbi frigesunt
 extremæ partes, & vbi calefiunt, in vasorum euacuationibus,
 in animi deliquiis. Et iuxta rationem meritò etiã venas se-
 quuntur, ea quæ ab his eueniunt. Et calefacit primùm calida
 velut in manibus, internas partes. At vlcera calida gaudent
 ex confesso, quia tegi adsueta sunt. Meritò itaque altera gra-
 uatur. Meritò igitur & ipsæ venæ, quia sunt in calido. Meritò
 etiã ipse thorax, & ventriculus ipse a frigida superatus, mo-
 lestè fert, & mortem minatur, quia maximè desuetus est. Ve-
 rum plurimum abest ab eo vt patiatur: propinquissima au-
 tem inter se sunt, egere, & pati. Meritò igitur frigida potu F
 delectatur. Et sic cõsentiunt inter se omnia hæc. Quòd verò
 omnia desquamata & ambusta in superficie, non valde tegi
 adsueta, maximè frigidam molestè ferunt, par est. Citissimè
 enim superatur. Et profundissima si superetur, maximè vti-
 que grauentur. deinde etiã natura neruosa participant. Quo-
 niam imus venter calida delectari videtur, considerãdus lo-
 cus est, & postea extremæ partes, & vesica, & genitales par-
 tes, & virilis membri glans natura frigidior est, quàm quis pu-
 tat. Sursum enim non deorsum exilit caliditas: & propterea
 calida delectatur. Considerandum etiam, quòd post calidam
 frigescit corpus magis perfrigeratum, post frigidam verò re-
 calefcit magis cõtariu: velut etiã aquæ frigefaciendæ & cale-
 faciendæ sunt, propter tenuitatē. Et quod post calidā durefcit
 corpus

Corpus fri-
 gesce re ma-
 gis post.

A corpus magis reficcatum, velut oculi post frigidam. Altera enim similis est aeri ambiendi, altera non. Mare pruriginosis, & qui ab acris humoribus vellicatur prodest, ut & lauent, & foueant ex calido. Qui vero non adfueti sunt, aliquantum laeduntur. Verum ad vlcera, & ambusta, ac desquamata, & quaecumque talia, contrarium est. Aptum est autem puris. Bonum est & ad attenuandum, & ad piscatorum vlcera. Hæc enim neque suppuratur, si non vellices: & ad vlcera cuniculosa, & depascentia proserpendo sedat ac sistit, velut sal, falsugo, nitrum. Omnia autem hæc si quis parum vtatur, irritat: si excelsenter, bona sunt. Melius autem est calidum ad plurima. Acetum ad corpus & articulos, simile est mari, & potentius, ad perfundendum & ad fomentum: & ad vlcera recens vulneratis, & ad sanguinis grumos, ubi nigredines sunt in pudendis, collutio est ad aures, & ad dentes. Calido autem hæc fiunt, & alia, sed & ex tempore coniectura facere oportet. Eliquat velut sal, & ut alia quæ impetigini, lepræ ac vitiliginibus conducunt, affusum ad calidum solem. maxime vero conducit vnguibz leprosis. Superat enim post tempus verrucas formicarias attenuat, & sordes in auribus sanat. Mollit autem & corpus, & multos alios locos, si non odor offenderet, & maxime mulieres. Valuerit & ad podagram, si non corpus vulneraretur. Eadem etiam fex aceti facit. Vinum dulce ad diuturna vulnera commodum est assidue vtenti. Sed & ad medicamentorum potionem. Austerum autem & album, & nigrum vinum, frigidum ad vlcera commodum est, frigidum propter caliditatem. Lanæ quæ frigiditatis gratia, aut perfunduntur, aut induuntur, aut intinguntur, aquam frigidissimam postulant. Quæ vero adstrictionis gratia, vinum nigrum etiam lanas aspergere potest, velut etiam betarum folia, aut linteola intinguntur, in plurima quibus adstrictio inest, velut sunt hederæ albæ folia, & quæ acerbiora sunt, aut friabiliora, velut hederæ & rubus, rhus coriarius, saluia: & in ea quæ mollire oportet, velut farina cocta. Aqua frigida prodest papulis rubicundis, quales alia atque alia parate sublata erumpunt, quales per splenia attractoria emergunt: In carbois vero & tenera carne præditis subrubicundæ sunt: in nigris autem rotundæ, dothienes hoc est furunculi appellatæ, & quales in ipsis calidis lauacris oboriuntur, & mulieribus

Acetū quā
vim ha-
beat.

Vinum dul-
ce.

Aqua frigi-
da.

Tumores
articularū.

mulieribus ex mensium sub cutem recurſu fiunt, & ab irri-
tamentis cutis, aut insolita vestimentorū asperorum gesta-
tione, & ex sudoris exitu, aut vbi quis ex frigore, derepente
ad ignem, aut calida lauacra accessit. Nam si hæc posterius
fecerit, nequaquam amplius erumpunt. Alioqui quæ ex
frigore fiunt, aut quæ exasperantur instar milij, deinde exul-
cerantur, eas frigida lædit. Calida verò prodest. Tumo-
res in articulis, & dolores sine vlcere, ac podagricos, & con-
uulsa, plurima ex his frigida multa affusa leuat ac extenuat,
& dolorem torpescit. Topor autē moderatus, dolorem sol-
uit. Sed & calida aqua attenuat ac mollit. Podagricis, re-
solutis, ante ac retro distentis, conuulsis, talia accedunt, di-
stentiones, tremores, leues siderationes: Talibus laxatis, clau-
dicationes, torpores, vocis interceptiones, ad talia, excretio-
nes per infernas partes suppressæ. Cauendum autē est in fri-
gidæ vsu, ne modum excedamus. Articulos induratos, aut
ab inflammatione aliquando oborta, aut à distortionem, ope-
ræ precium est sanare, aqua calida in vtriculum infusa.

Calida.
Frigida.

Manū deligare, & oculos lachrymas lenit, ita vt ad acres,
stillamentum lene infundat quis, vt ne falsuginosa contactu
lædat. Et fossulis vlceribus oculorum elotio prodest, & re-
pletio ad naturam redicens. Calida oculis cōuenit, dolo-
ribus, suppurationibus, lachrymis mordacibus, siccis omni-
bus. Frigida doloris exortibus, valde rubicundis, & qui col-
lectiones tuberculorum iuxta venas habere solent, qualia
sunt vlcuscula capitis manātia, circa thoracem, & alia dura. F
Verūm podici & vtero non valde comoda est, neq; sangui-
nem in frigore mingentibus. Vlceribus quidē frigida mor-
dax, cutem obdurat, dolorosa non suppurari facit, liuefacit,
nigrefacit, rigores febriles facit, conuulsiones, ante ac retro
distentiones. Quandoq; verò in hac distentione, sine vlcere iu-
ueni carnosum, media ætate, multæ frigidæ aquæ effusio, ca-
loris reuocationē facit. Calor autem hæc soluit. Callida
suppuratoria est, non in omni vlcere, maximum signū ad se-
curitatem, cutem mollit, attenuat, dolorem eximit, rigores,
conuulsiones, ante ac retro distentiones lenit, capitis graui-
tatem soluit, plurimum autem conducit ossium fracturis,
magis autem denudatis, & ex his maximè his qui in capite
vlcera habent, & quæcunque præ frigore, aut moriuntur,
aut

A aut vlcerauntur: itēque in vlcerationibus voluntariis ac in-
uoluntariis, qualia sunt desquamata: herpetibus serpendo
ad dentibus, denigratis aut in gingiuis, aut in aure, aut in
sede, aut vtero. His omnibus calida amica est ac iudicatoria.
frigida verò inimica & occidēs, præterquam in quibus san-
guinem fluxurum esse timor est. Atque hoc modo vtendum
est liquidorum perfusionibus, inunctilium illitionibus, fo-
liorum impositionibus, aut linteolorum cataplasmatibus, quæ-
cunque aut frigiditate, aut caliditate profunt, aut nocent.

B **H I P P O C R A T I S**
C O I L I B E R, D E H V M O -
R I B V S I A N O C O R N A -
R I O M E D I C O P H Y -
S I C O I N T E R -
P R E T E.

*Genuinum Hippocratis librum hunc esse Galenus
dicit. Verum quedam insunt ad extremam di-
etionis breuitatem contracta: quedam rursus
ultra modum extenta.*



M P E T V S & ferocitas humorum, vbi non Difficilis
reciprocatio humorum est, velut florum, humorum
ducendus est quā repit per conuenientes ac dissertatio.
commodas regiones, exceptis his quorum
maturitas tempore contingit. Maturatio-
nes extra aut intro repunt, aut aliò quò
oportet. Cautio, infinita magnitudo, experiendi difficul-
tas, pilorum nuditas, viscerum vacuitas, infernis repletio,
supernis alimentum, mutatio sursum, mutatio deorsum. Considera-
Spontanea sursum & deorsum, quæ profunt & lædunt. Co- da medico.
gnata species, regio, mos, ætas, tempus, constitutio mor-
bi, excessus, defectus. Quibus quantum deficit, aut non, me-
dela,

Hippocratis Liber

de la, declinatio, deriuatio, in caput, in obliqua, quā maximè **D** repit, aut reuulsio in supernis deorsum, in infernis sursum, aut ficare, aut aliquibus inferna, aut aliquibus superna, aut eluitur, aut quibusdam mitigabitur. humores effusi ne intro reuellantur, sed secretiones siccentur. Turbatio, infusio per sedem, pelluium, quibus abscedit ad sedem, vnde exoluitur aut medicamentum, aut vlcus, aut humor aliquis compactus, aut eruptio pustulosa, aut flatus, aut cibus, aut animalculum, aut æstus, aut alia quædam affectio. Consideranda hæc, spontanea delinentia, aut velut ab exustione excitatæ bullæ, in quibus qualia lædunt aut profunt. Figuræ, motus, eleuatio, & rursus subsidientia, somnus, vigilia.

Quæ facienda, aut impedienda, cito assequi. Castigatio **E** per vomitum, infernè per exitum, aut sputum, mucum, tussim, ructum, singultum, flatum, vrinam, sternutationem, lachrymas, pruritus, euulsiones, contactus, sitim, famem, repletionem, somnos, labores, ocium, corpus, mentem, disciplinam, memoriam, vocem, silentium, vteri purgationem.

Quæ supernè erumpunt ac torquent, pinguis, intemperata ac meraca, spumosa, calida, mordacia, æruginosa, varia, ramentosa, fæculenta, cruenta, flatus expertia, cruda, cocta, sicca. Quæcunque circumfluunt, ferendi facilitatem cōtemplari oportet, itémque difficultatem, priusquam periculum veniat. Item quæ sedare nō oportet, maturatio, descensus eorum quæ infra sunt, redundantiæ & fluctuatio eorum quæ supra. & quæ ex vteris, & in auribus sordes, concitatio ac per- **F** mixtio, apertio, euacuatio, calfactio, perfrigeratio, intrinsecus, forinsecus. horum quidem, horum verò non. Quum infra vmbilicum fuerit id quod torquet, tardum & molle est tormen. Vice versa, contra. Quæ per aluum egeruntur quæ repunt, non spumosa, matura, cruda, frigida, fœtida, sicca, humida. Quæ olfactum malè afficiunt. Sitis quæ prius non adfuit, neque æstus, neque alia causa. Vrina, nasi humectatio, lactationem. Siccitatem. & non esse contractum ac arefactum, & spiritum turbulentum, præcordia, extremitates, oculos male affectos. coloris transmutatio. Pulsus, frigiditas, palpitationes, cutis duricies, neruorum, articulorum, vocis, mentis, figura voluntaria, pili, vngues. facile ferre, aut non, qualia oportet. Signa hæc. Odores corporis, oris, secessus, auris,

Tormētum
vmbilici.

Quanta sit
hæc obser-
uatio vide
ro.

A auris, flatus, vrinae, vlceris, sudoris, sputi, nasi. Corpus falsuginosum, aut sputum, aut nasus, aut lachryma, aut alij humores. Penitus similia, iuuantia, laedentia. Insomnia qualia videat, & in somnis qualia faciat, an acutè audiat, & obedire paratus sit animo, an magis fortia sint ac plura quae comoda sunt ac seruant, quàm alia, an sentiant omnia omnibus, sensibus, & ferant, veluti odores, sermones, vestitus, figuras, & huiusmodi patienter, quae sanè & sua sponte comparentia profunt, & quando etiam talia iudicatione inducunt. Item tot, & talia, veluti sunt flatus, vrina, qualis, & quanta, & quando. Quae verò contraria sunt, auertere, ipsisque aduersari. Quae propinqua & communia sunt affectionibus, prima & maximè affliguntur. Cōstitutionem autem ex primis incipientibus, quicquid tandem excernatur ex vrinis, qualenam fuerint, & qualis sit corporis collapsio, coloris immutatio, spiritus imminutio, & reliquae cum his victus rationes. Scire etiam oportet an similia sint quae decedunt, transit, vrinae, per vteros, sputa, per nares, oculi, sudor, ex tuberculis, ex vulneribus, ex pustulis, quae sua sponte, quae arte. Quod similia sunt inter se omnia quae iudicant, & quae profunt, & quae nocet, & quae perimunt, quo haec quidem fugiens auertat, illa verò accersat, & ducat, ac suscipiat. Sed & alia eodem modo, cutis, extremarum partium, praecordiorum, articulorum, oculorum, oris, figurarum, somniorum, qualia iudicant, & quando, talia machinari. Insuperque qui tales abscessus fiunt. Qualia profunt cibis, potibus, odoribus, visu, auditu, cogitatu, secretionibus, humoribus, calefactione, frigefactione, siccitatibus, humectando, siccando, vnguentis, illitionibus, cataplasmatibus, emplastris, insersionibus, denique & epithematis quae imponuntur. Figurae, defrictio, curatio, labor, ocium, somnus, vigiliae: spiritus supernè, infernè, communibus, propriis, arte paratis. In exacerbationibus neque praesentibus, neque futuris, neque pedum frigiditate, sed in declinante deorsum morbo. In exacerbationibus per circuitus fientibus, ciborum oblationes dandae non sunt, neque cogere oportet, sed auferre de appositionibus ante iudicationes. Quae iudicantur, & iudicata sunt integrè, in Aphorismis di-
neque mouere oportet, neque nouare, neque medicamentis, neque aliis irritamentis, sed sinere. Concocta medicamentis
aggre-
di

Quae per
exordia di
gnoscentia.

Hae eadē
in Apho-
rismis di-

Concusio-
nes & de-
cretoria quā
fiant.

aggredi oportet, & mouere non cruda, neque in principiis, D
si non turgeant. Multa verò non turgent. Quæ ducere oportet: quò maximè repunt per conuenientes locos, eò ducere oportet. Quæ prodeunt non multitudine æstimare oportet; sed quādiu prodeant qualia oportet, & facile æger ferat. Vbi verò opus est, debilitare etiam, aut animi deliquiū inducere oportet, donec hoc feceris, cuius gratia hoc fit, interim aliò vertere, aut siccare, aut humectare, aut reuellere, si sufficiat æger, id quod ex his coniectabis. Sicca quidem calida erunt, humida verò frigida. Quæ verò aluum mouent, plerunque

contraria. Hæc imparibus diebus, sursum, si & circuitus, & constitutio talis sit ex exacerbationibus. Fiunt autem plurima paribus diebus, deorsum: sic enim & sua sponte profunt: E
si non circuitus faciant exacerbationes in paribus. In talibus autem, in paribus sursum: in imparibus deorsum. Tales autem pauci sunt. Et tales constitutiones etiam difficilius iudicantur. Quin & vltius tempore progressa sic fieri necesse est, velut ad decimam tertiam, ac decimam quartam diem. Decima tertia quidem deorsum, decima quarta verò sursum, Ita enim ad iudicationem conducit. Et quæ ad vigesimam.

Cæterum quæ infrà prodeunt, multum purgare oportet, & hæc non propè iudicationem, sed longius ab ea. Raro autem in acutis, multa ducere oportet, in delassatis, totum. In febribus ad articulos, & circa maxillas maximè abscessus fiunt, propè sanè dolores vniuscuiusque ad supernam partem magis & in totum. Si verò lentus fuerit morbus & deorsum tendens, infernè etiam abscessus fiunt. Maximè autem pedes calidi, infernè significant: frigidi supernè. Qui verò ex morbis se erigentibus statim in manibus aut pedibus dolores fiunt, in his abscessus contingunt. Sed & si quid doluerit quis antea quàm ægrotet, ad eas partes firmatur. Quemadmodum

Perinthus. etiam tussientibus & anginosi in Perintho. Faciunt enim tussis abscessus, velut etiam febres. Iuxta eandem rationem contingit ab humorum aut corporis colliquatione & frigide-
Humorum
obseruatio. ditate. Proinde nosse expedit, in quibus temporibus humores florent, & quales in singulis morbos faciunt, & quales in vnoquoque morbo affectiones: & reliquum corpus ad quem morbum maximè natura repit: & quale quid splen intumescens facit. Horum sanè & natura, & fermè colores deterio-
Lienosi
quid pa-
niantur.

res

A res sunt, & corpora tument. Et si quid aliud est, in his exercere se prodest, velut est animi intemperantia circa cibos ac potus, somnum, vigilias, aut ob amores quosdam, velut transferarum, aut propter artes, aut propter necessitates: tolerantia laborum, & quorum ordinata est, aut inordinata: Mutationes ex qualibus ad qualia: ex moribus animæ industria, aut quærens, aut meditans, aut videns, aut dicens, aut aliud quid, velut tristitiæ, iracundiæ, cupiditates, quæ ex casu contingunt. Molestiæ animi aut per oculos, aut per auditum, velut etiam corporum, Molis quidem ad seipsas attritis, dentes stupefunt: Ambulanti verò circa cauum locum, crura tremunt: quum autem quis manibus ea quibus opus habet leuat, hæc tremunt: Serpens de repente conspectus pallorem cum virore inducit. Timores, pudor, mæror, voluptas, ira, aliæque huiusmodi quomodo obediunt. Vnicuique autem pars corporis ad actionem pertinens in his obedit. Sudores, cordis palpitatio, & eiusmodi potentiæ. Quæ extrinsecus profunt aut nocent, vinctio perfusio, illitio cataplasmatum vsus, deligatio lanarum & talium rerum: & internæ partes talibus obediunt, non solum externæ his quæ intro assumuntur: Sed & quæ in lanis ab ouili succidis adhibentur, & quod à rege nomen habet cuminum, videntibus & olfacientibus. Quæ de capite ducunt, turbant, sermones, vox, & huiusmodi, mamma, genitura, vterus, & quæ signa in ætatibus, & in suffocationibus, & tussi, & quæ ad testiculos. Quemadmodum arboribus terra, ita animalibus ventriculus: & nutrit, & calefacit, & frigefacit. Frigefacit, dum euacuatur, calefacit, dum impletur. Quemadmodum terra stercoreta hyeme calida est, ita etiam ventriculus. Arbores corticem tenuem siccum habent, intrinsecus autem carne sicca, sanæ, non putridæ, diuturnæ. Ita & ex animalibus testudines, & quicquid eiusmodi est. Aetatibus, temporibus, annis, similia animalia, non deteruntur si moderatè melioribus vtantur. Quemadmodum hydria quod recens est transmittit, quod inueteratum retinet. Sic & ventriculus transmittit alimentum, & fecem retinet, velut vasculum. Modi morborum hi sunt, partim quidem cognati sunt, de quibus interrogando discere oportet: partim à regione, familiares enim sunt per multas, & multi ipsos noscunt: partim ex corpore, & victus ratione,

Molæ colli
sæ dentes
molestant.
Quæ crura
tremor,
& pallorem faciunt.
Quæ foris
vel intus of-
ficiant.

Idem.
Terra sata,
vêtriculus
animalia
nutrit.
Vêtrici-
qualitas.

Quid ani-
malia tuc
tur.

Morborum
natura.

Ca

Hippocratis Liber

Morborū
quorundā
cauſa.

tionē, ac temperiei conſtitutione, aut à temporibus. At re-
giones ad tēpora malè diſpoſitæ, tales morbos pariunt, quali
tempori ſimiles fuerint, Verbi gratia. Inæqualis calor aut fri-
gus eadem die quum talia fuerint, morbos autumnales fa-
ciunt. Et in aliis temporibus ſecundum rationem, alij ab
odoribus cœnoſis aut paluſtribus: alij ab aquis, calculoſi, ſple-
nici: alij à ventis bonis & malis incipiunt. Qualia verò ſunt
tempora tales erunt etiam morbi, & conſtitutiones ex ipſis.
Si tempora tempeſtiuè, & ordinatè ſe habuerint, morbos iu-
dicatu faciles faciunt. Vernaculi autem temporū morbi iu-
dicant mutationes, & prout euariauerit tempus, ſimiles aut
diſſimiles erunt morbi, qui in hoc tempore oriuntur. Si verò
ſimiliter procedat, eiufmodi quoque fuerint morbi, & ad ta-
lem modum tracti, veluti eſt morbus regius autumnalis. Fri-

Bilis per
aſtate quid
faciat.

gora enim ex caloribus, & calor ex frigore. Et ſi æſtas bilioſa
ſit, & bilis aucta intus relinquatur, etiam aliquantum ſple-
nici ſient. Quum igitur & ver ſic proceſſerit, etiam vere ſit
morbis regius. Proximus eſt enim hic motus tempori, iuxta
hanc ſpeciem. Quum verò æſtas ſit verifimilis, ſudores in
febris, & febres faciles, & non peracutæ, neque linguis ob-
aridæ ſient. Si verò hybernū ſit ver, & poſtremum hyemis
tempus, hyberni etiam morbi, & tuſſes, & peripneumonie, &
anginæ. Et autumnus ſi non in tempore ac derepente hyber-
narit, non aſſiduè, tales morbos facit, eo quòd non in tempo-
re incepit, ſed inæqualiter ſit. Quapropter etiam tempora à
iudicatione aliena ac inconstantia ſunt: quemadmodum e-
tiam morbi, ſi præerumpant, aut præexcernantur, aut intus
relinquuntur. Recidivas enim etiam tempora faciunt, quem-
admodum & morbos ita inducunt. Itaque inſuper conſide-
randum eſt, quomodo habentia ſe corpora tempora ſuſci-
piant. Auſtri auditum grauunt, caliginem inducunt, caput
grauunt, torpidi ſunt, diſſoluunt. Quum hic præualuerit, ta-
lia in morbis patiuntur, vlcera glabra, maximè os, puden-
dum, & aliæ partes. Si verò aquilo, tuſſes, faucium affectio-
nes, ventres duriores, vrinæ difficultates, horrores, dolores la-
terum ac pectoris. Quum hic dominatur, tales morbos ma-
gis expectare oportet. Si magis redundauerit, ad ſqualores
ſequuntur febres itémque ad pluuias, ex quilibet tandem
redundantiæ tranſmutatæ fuerint, & quomodocunque ha-
bentia

Ventorum
qualitas.

Magna vē-
torum cō-
terarūmq;
rerum ob-
ſeruatio.

A bentia se corpora ex alio tempore susceperint, & quocunque tandem humore in corpore dominante. Cæterum ficcitates & austrinae sunt, & aquilonares. Differunt enim & alia hoc modo. Magnum enim, & hoc est. Nam alius in alio tempore ac regione magnus est. Veluti æstas bilem parit, ver sanguinem, reliqua prout singula. Mutationes maximè pariunt morbos, & præsertim maximæ: & in temporibus magnæ mutationes, & in aliis. Quædam sensim fiente progressu sunt. Tempora huiusmodi sunt securissima, velut etia diætæ, & frigus, & calor maximè sensim facto progressu. Et ætates ne transmutantur. Naturæ quātum ad tempora attinet, aliæ ad æstatem, aliæ ad hyemē, bene aut male dispositæ sunt. Quantum verò ad regiones, & ætates, & victus rationem, & alias morborum constitutiones, aliæ ad alias bene aut male se habent. Et ætates ad tempora, & regiones, & victus rationē, & morborum constitutiones. Et in temporibus, victus, & cibi, & potus, qualitatem suam requirunt. Nam hyems ab operibus otium habet, & quæ in corpus ingeruntur matura ac simplicia postulat. Magnum enim & hoc est. Autumnus autem laboribus deditus. Sub insolationibus potus frequentes sunt cibi inconstātes, vina, arborum fructus. Quemadmodum autem ex temporibus morbos coniectare datur, ita quādoq; etiam ex morbis aquas, & ventos, & ficcitates prænoscere licet, & aquilonares, & austrinas. Licet autem ei qui probè ac rectè didici, vnde sint hæc consideranda, velut & lepræ quædam, & circa articulos dolores. Aquæ ubi futuræ sunt, pruriginosi sunt, & alia huiusmodi. Et quæ pluviæ alternis, aut singulis diebus, aut per alios circuitus, aut assiduæ fiunt. Et venti aliqui per multos dies flant, & cōtrario inter se modo flant, alij per pauciores. Et iidem per circuitum. Hæc habent cum temporum constitutionibus similitudines. Verum brevius talia. Si verò annus diutius talis fuerit, qualem constitutionem fecerit, tales etiam morbi diutius erunt. Et si magis fortes fuerint, maximi quoque morbi sic fiunt, & communissimi, & ad plurimum tempus. Ex primis aquis, ubi post multam ficcitatem, aqua futura est, de aqua inter cutem prædicere licet: & ubi talia parua signa apparuerint in ventorum quiete, in transmutatione. Colligendi igitur sunt quæ in qualibus aquis aut ventis morbi significant, & audiendus est si quis novit,

Sicc.

Bilis per æstatem, sanguis per ver viget. Temporū mutationes quantum possint.

Posse & ex morbis & ex anni temporibus & tempestatibus omnia prævideri.

Hydropū cōiectatio.

Hippocratis Liber

nouit, quod tali hyeme prægressa, tale ver aut æstas erit. D

Colores non sunt similes in temporibus, neque in aquilonaribus, neque in austrinis, neque in ætatibus, neque in vnoquoque ad seipsum, neque in alio ad alium. Considerandum autem est ex his quæ præsentia ac quiescentia nouimus de coloribus, & quod ætates temporibus similes sunt, & colore, & mutatione. Qui hæmorrhoidas habent neque pleuritide, neque peripneumonia, neque phagedæna, neque furunculis, neque tuberculis terebinthi figuram habentibus corripuntur. Fortassis autem neque lepris, fortassis neque vitiliginibus. Multi tamen tempestiuè curati, non tardè correpti sunt, & sic perniciosæ fuerunt. Et quicumq; alij abscessus, velut fistulæ, aliorum medela sunt. Quæ vbi insuper comparent sedare solent, ea prius fientia impedimenta ab his liberant. Alterius loci morbos loca excipientia, aut dolore, aut grauitate, aut ob aliud quiddam liberant, aut quod aliis sunt communicationes. Propter inclinationem non amplius sanguis prodit, sed iuxta humoris cognationem talia spunt, conuenit quibusdam sanguinem detrahere tempestiuè in talibus, in aliis autem velut in his, non hoc conuenit. Impedimentum in spuentibus cruenta, tempus anni pleuritidis, bilis. Tubercula circa aurem quibus circa iudicationem exorta, non suppurata fuerint, his disparentibus recidiua fit, & pro ratione recidiuarum, recidiua fiente, rursus intumescunt, & permanent, quemadmodum febrium recidiuæ, in simili circuitu: in his spes est ad articulos abscedere. Vrina crassa, alba, qualis Archigenis familiari erat, in lassitudinis febribus quarta die aliquando prodit, & liberat ab abscessu. Si verò vltra hoc, etiam sanguis è naribus largè eruperit etiam valde. Cui in testinum in dextra parte dolebat, & articulari morbo correptus est, quietior erat. Postquam autem hic curatus fuit, magis dolebat.

*Temp:
t. co
molep
in fante
nars.*

*re Cant
1900.*

Vrina crassa alba qd faciat. Archigenes.

HIPP

AHIPPOCRATIS

137

COI LIBER DE MORBO

SACRO, IANO CORNARIO MEDICO PHY-

SICO INTER-

PRETE.

Non genuinum Hippocratis, sed memorabilis tamen viri, hunc librum Galenus esse dicit, tum quod ad dictionem, tum quod ad sententiam attinet. Hippocratis autem neque dicendi modum, neque sententiarum acumen in ipso esse.



DE MORBO sacro appellato sic se res habet. Comitialis morbus. Nulla re videtur mihi aliis diuinior esse morbis, neq; sacratior. Verum naturam habet quam etiam reliqui morbi, unde fit. Homines verò naturā & causam eius diuinā esse putauerunt, præ inexperientia & admiratione, propterea quòd reliquis morbis nulla re similis est, & per inopiam quidē quòd nō cognoscunt, diuinitas ipsi conservatur. Per abundantiam verò & parabilem modū sanationis medentur. Exoluuntur enim aut expiationibus aut incantamentis. Si verò propter admirationē diuinus cēsetur, multi morbi sacri erunt, & nō vnus quemadmodū ego demonstrabo etiā alios nihil minus admirabiles, neq; minus monstruosos, quos nemo sacros esse censet. Primum etenim febres quotidianæ, & tertianæ, & quartanæ, nihil minus mihi sacri esse videntur, nec minus à deo fieri quā hic morbus, etiam si nihil admirabile habeant. Deinde video insanos homines & delirantes à nulla manifesta causā, & multa & simul impotētia facere, vndique multos in somno plorare ac vociferari, alios verò suffocari, alios exilire & foras fugere, atq; ita delirare donec expergiscuntur, postea autē etiā sanos esse ac sapientes velut prius, esq; ipsos pallidos ad debiles, atq; hæc nō semel, sed sæpe, aliq; multi sunt ac omnigeni morbi, in quibus singulis recēsendis in longū sermo extēderetur. Ceterū qui

s

primi

Hippocratis Liber

Magi. primi hunc morbum sacrum esse pronunciauerunt, tales ho-
mines mihi fuisse videntur, quales etiam nunc sunt magi. &

expiatores & circulatores, & quidā arrogantes, qui se vehe-
menter pios esse simulant, & amplius quid scire. Hi itaq; cō-
filiij ac mentis inopiā obuelantes ac prætentes diuinitatē,
quum nihil haberent quod exhibitū proderet, vt ne manife-
sta fieret ipsorum ignorantia, sacrā hanc affectionē esse pro-
nunciarunt, & rationibus idoneis collectis, curationem cōsti-
tuerunt sibi ipsis securam, expiamenta offerentes & incanta-
menta, & à balneis abstinere iubētes, & à cibis multis ac ine-

Quæ veta-
rent.

ptis ad hominum ægrotorū esum, velut ex marinis quidē à
mullo, & melanuro, mugilq; ac anguilla, hi enim pisces op-
portune haberi possunt. Ex carnibus verò à caprina, ceruina E
suilla, ac carnina. Hæ enim carnes maxime aluum turbāt. Ex
volucris autē, à gallo & turturæ ac otide, insuperq; ab his
quæ robustissimæ esse censentur. Ex oleribus à mētha, allio,
ac cepa. Nihil enim acre infirmo conducit. Pallium præterea
nigrum habendū nō esse præcepere. Niger enim color mor-
talis est. Neq; in caprina pelle decubēdum esse, neque ean-
dem gestare oportere, neq; pedem supra pedem habendum
esse, neq; manum supra manum. Hæc enim omnia curatio-
nis impedimenta esse, Omnia autē hæc diuinitatis gratia ap-
ponunt, velut amplius quid scientes, & alios prætextus pro-
ferentes, quo si sanus æger euadat, ipsis gloria & dexteritas
adscribatur, sin moriatur, in tuto positæ sint ipsorū excusatio-
nes, habeantq; prætextū quod non ipsi sint in causa sed dei. F
Neque enim medicamentum aliquod edendum aut biben-
dum exhibuerunt, neq; balineis incoxerunt, vt ipsi in causa
esse videri possint. Mihi autē videtur nullū ex his qui medi-

Libes cur
non sanare
tur ab hoc
morbo.

terranea Africa inhabitāt sanum esse posse, propterea quod
caprinis pellibus ac carnibus vtuntur, quum neque stratum,
neque pallium, neq; calceamentum habeant, quod non sit ca-
prinū. Non enim alia vlla ipsis sunt pecora præter capras &
boues. Si autem hæc admota & comesta morbum augent, &
non comesta sanāt, nō est sanē Deus alicuius autor aut caus-
sa, neque profunt expiamenta, sed edulia sunt quæ & sanant
& lædunt. Numinis verò vis dissipatur. Sic igitur mihi vidē-
tur hi qui hoc modo hos morbos curare aggrediuntur, neq;
sacros ipsos putare, neq; diuinos. Vbi enim præ talibus expia-
mentis

A mentis ac tali curatione transmutantur, quid vetat etiā prae aliis artibus similibus illis, & discedere ab hominibus & accedere? Quare nō Deus autor est, sed aliquid humanū. Quis enim lustrationibus & magicis incantamentis talē affectionē abducere potens est, is etiā aliis artibus abduxerit, & ex hac ratione diuinitatis opinio penitus pessum it. Talia itaq; dicētes ac excogitātes, ampliū quid se scire simulāt, & homines decipiūt, proponētes his lustrationes ac purificationes, quum verba ipsorum magna ex parte se ad Deum ac dæmonium extendant. Atqui mihi sanē nō de pietate verba facere videntur, velut ipsi putant, sed potius de impietate, & quod Dei nō sunt, pietasq; ac diuinitas ipsorum impia est ac scelestā, velut ego docebo. Si enim & lunā abolere, & solē obscurare, tempestatēque ac serenitatē facere, pluuias item ac siccitates, & mare sterile itēmq; terram, & alia huiusce modi omnia, se scire profitētur, siue ex sacrorum mysteriis, siue ex alia quadam professione aut meditatione, hāc potentiam iactent, qui talia studio habēt, impij sanē mihi esse videntur, & deos nō esse putare, neq; si sint, aliquid posse, neque vllum aliquod etiā extremū malū prohibere. Quod quum faciant, quomodo nō ipsis infesti sint? Si enim homo incantamentis ac sacrificiis vtens, & lunam abolebit, & solem obscurabit, & tempestatem ac serenitatem faciet, non vtique ego horum aliquid diuinum esse putauerim, sed humanum, si sanē diuinitatis potentia ab humana volūtate superatur, & in seruitutē redacta est: fortassis autē hāc non hoc se modo habēt, sed homines victus indigni multa & omnigena moliuntur & euariant, tum in alia omnia, tum in hūc morbū, in singulis affectionis speciebus causam deo adscribentes. Non enim semel, sed saepius eorundē mentionem faciunt. Siquidem enim capras imitentur, & si balatum edant, & frendāt, & si dextris partibus cōuellantur, Matrem deorum causam esse aiunt. Si verō acutiorem & concitatiorem sonum emittant, equo a simulant, & Neprunum autorem esse dicunt. Si verō etiā aliquid stercoreis emittāt, quod saepe quibusdam contingit prae morbo coactis, Hecates enodia appellatio additur. Si autem tenuiorem & densiorem vocem edant, velut auiculā, Apollo Nomius, id est pastor, si verō spumā ex ore Apollo remittant, ac pedibus calcitrent, Mars causam habet. Qui-

Quare non
diuinū ma-
lū hoc sit.

Quales ve-
nifici.

Quare hec
fingantur.

Quibus
diis hāc tri-
buant.

Nomius,
cunq

Hippocratis Liber

cunque porro pauores noctu ingruunt, timoresque ac deliria. D
 & exsultationes è lecto, terrorésq; ac fugæ foras, Hecates infi-
 dias esse dicunt, & heroum insultus, expiamentisque vtun-
 tur ac incantamentis, & scelestissimum ac impiissimū, meo
 sanè iudicio, faciunt numē. Expiant enim morbo correptos
 sanguine, itēq; aliis sceleribus inquinatos, aut iniustos, aut
 ab hominibus intoxicatos, aut qui scelestū aliquod facinus
 perpetrarunt, quos contraria his facere oportebat, sacrificare
 nimirum ac precari, & ad templa progressos diis supplica-
 re. Nūc verò horum quidem nihil faciūt, verū expiāt, & alia
 expiamenta terra occultant, alia in mare proiciunt, alia ad
 montes deferunt, vbi nemo attingat, neq; conculcet. Oporte-
 bat autem ea ad templa deferre ac deo contribuere, si qui- E
 dem Deus est author, Non tamē ego puto hominis corpus à
 deo inquinari, sordidissimum scilicet à purissimo. Verū
 etiam si cōtingat ab alio inquinari, aut quid perpeti cupierit
 vtique à deo purgari ac purificari magis quā inquinari.
 Deus itaq; est qui maxima ac sceleratissima peccata purgat
 ac purificat, & liberatio nostra existit, ipsiq; terminos tēplo-
 rum ac delubrorū diis designamus, vt nullus qui non purus
 sit eos transcendat, & ingressi respergimur, nō velut qui in-
 quinemur, sed si quod etiam prius scelus habemus purifice-
 mur. Et de expiationibus quidem sic se res habere mihi vi-
 detur. Hic verò morbus nulla re diuinior reliquis mihi esse
 videtur, Sed naturā habet, quā etiā alij morbi, & causā vn-
 de singuli gignuntur. Naturā autē & causā, ab eodē Deū F
 fieri, à quo etiā alia omnia. Et sanabilis esse mihi videtur ni-
 hilo minùs quā alij, nisi iam prē tēporis lōgitudine inualue-
 rit, vt fortior sit medicamentis quæ adhibentur. Incipit autē
 velut etiā alij morbi secundum genus. Si enim ex pituitoso
 pituitosus, ex bilioso biliosus gignitur, & ex tabido tabidus,
 & ex splenico siue lienoso lienosus: quid prohibet vt cuius pa-
 ter & mater hoc morbo correpti fuerint, etiam posterorum
 ac neporū aliquis eo corripiatur? Semen enim genitale ab o-
 mnibus corporis partibus procedit, à sanis sanū, à morbidis
 morbosum. Aliud porro signū magnum est, quod nihilo, di-
 uinior reliquis sit morbis: pituitosis enim natura oboritur,
 biliosis verò nō accidit. Atqui si diuinior est reliquis, simili-
 ter omnibus morbū hunc fieri oportebat, & non discriminē fa-
 cere

Malū hoc
medicabile

Pituitosos
tan:ū comi
tialis mor-
bus vexat.

A cere inter biliosos ac pituitosos. Sed enim ipsis cerebrum auctor est & causa huius affectionis, velut etiā aliorū maximorum morborū. Quo verò modo, & ex qua causa fiat, ego manifeste docebo. Cerebrum hominis duplex est, quemadmodum etiam aliis omnibus animalibus. Medium autē ipsius diuidit membrana tenuis. Quapropter non semper eandem capitis partē dolet, sed particulatim vtrāuis, aliquando verò totū. Sed & venæ in ipsum tendunt ex vniuerso corpore, multæ & tenues, duæ verò crassæ, altera ab hepate, altera de liene. Et quæ quidem ab hepate venit, hoc modo se habet. Altera quidem venæ pars deorsum tēdit, per partes ad dextrā, iuxta ipsum rhenem ac lumbum, ad internam femoris partem, & descendit in pedem, & vocatur vena caua. Altera verò sursum tendit per venas dextras ac pulmonem, Finditur autem & in cor, & in brachium dextrum. Reliquū verò sursum fertur per clauiculam ad dextram ceruicis partem, ad ipsam cutem, vt cōspicua fiat. Iuxta aurem verò occultatur. Atq; hic finditur, & crassissima quidem ac maxima & caussima ipsius pars, in cerebrum desinit: alia verò pars in aurem dextram, quæ sanè venula tenuis est. alia autem in oculum dextrum, alia in ipsum nasum. Atque sic quidem venæ ab hepate habent. Tendit autem & à liene vena in sinistra sursum ac deorsum, velut ab hepate, verū tenuior & imbecilior. Cæterū in has venas etiam spiritus copiā inducimus, Hæ enim corporis nostri respirationes sunt, aerem in ipsas trahentes, & in reliquum corpus ac venulas deriuantes, refrigerantque ac rursus dimittunt. Non enim possibile est spiritū stare, sed procedit sursum ac deorsum. Si enim alicubi constiterit ac interceptus fuerit, impotens redditur illa pars vbi constiterit. Cuius rei signum hoc est. Quum enim desidenti aut decumbenti venulæ compressæ fuerint, vt spiritus à vena non discurrat, statim torpor occupat. Et de venis quidem reliquis sic habet. At verò morbus ipse fit in pituitosis, in biliosis verò non. Incipit autē fieri in fœtu adhuc in vtero existēte. Purgatur enim & florescit cerebrum, velut etiam aliæ partes prius quàm gignantur. In hac autem purgatione, si cerebrū in quidem probè ac moderatè purgatum fuerit, & neque plus vtero purneq; minùs quàm oportet defluerit. hic fœtus sanissimum gatur. caput habebit. Si autem amplior colliquatio à toto cerebro

Cerebrum hominis duplex.

Venæ duæ.

Vena iecoris.

Vena lienis.

X A
S

iude

Cerebrū in

Hippocratis Liber

Tinnitus facta fuerit, morbosum caput augescens fœtus habebit, & **D**
aurium vn- sonitu plenum, & neque solē, neque frigus tolerabit. Si verò
de. ab vna aliqua parte colliquatio contigerit, aut ab oculo, aut
 ab aure, aut vena aliqua simul gracilis facta fuerit, ille sic
 afficitur qualiter sanè colliquatio cōtigerit. Si verò purga-

Vlcera &
pustulae
profunt
pueris.

Tremuli gi
berosique
vnde.

Diuerſi hu
ius morbi
affectus.

Cor mute-
ſcant.

tio non contingat, sed in cerebro spissetur ac cogatur, sic ne-
 cesse est fœtus pituitosos esse. Et quibuscunq; quidem pue-
 ris existentibus erumpunt vlcera in caput, & in aures, ac in
reliquum corpus, & qui saliuosi fiunt ac mucosi, hi ipsi pro-
gressu ætatis facillimè degunt: hic enim ab it ac purgatur pi-
tuita, quam in vtero purgari oportebat, & qui sic purgati
fuerint comitali siue sacro morbo ferè non apprehendun-
tur. Qui verò mundi sunt, & neq; vlcus vllum, neque mu- **E**
 cus, neque saliuua vlla prodit, neque in vteris purgationem
 fecerunt, talibus periculum imminet, vt ab hoc morbo cor-
 ripiantur. Si porrò ad cor progressum fecerit defluxus, tre-
 mor apprehendit & anhelationes, & pectora corrumpuntur,
 aliqui verò etiam incurui fiunt. Quum enim descenderit
 pituita frigida ad pulmonem aut ad cor, perfrigeratur san-
 guis. Venæ autem violenter perfrigerata, ad pulmonem
 & cor assiliunt, & cor tremore concutitur, vt præ hac neces-
 sitate anhelationes incidant, & spiratio ceruice erecta. Non
 enim spiritum suscipere potest, donec id quod influxit à san-
 guine fuerit superatum, & calefactum in venas fuerit diffu-
 sum. Deinde & tremor & anhelatio sedatur, sedatur autem
 prout copia eius fuerit, Si enim ampliùs influxerit tardius: **F**
 sin minùs, citiùs. Et si quidem densiores ac crebriores fuerint
 defluxus, crebrius comitali morbo corripitur: sin minùs, ra-
 rius. Hæc itaque perpetitur homo si ad pulmonem ac cor
 fluxus processerit. Si verò in ventrem, profluuiâ alui apprehendunt.
 Si verò ab his viis exclusus fuerit, & in venas quas
 dixi defluxum fecerit, mutus fit & suffocatur, & spuma ex
 ore effluit, & dentes constringuntur, & manus conuellun-
 tur, & oculi distorquentur, & nihil sapiunt, aliquibus etiam
 stercus infernè secedit. Atque hæc fiunt aliquando in fini-
 stra, aliquando in dextra, aliquando vtrinque. Quomodo ve-
 rò singula hæc perpetiatur ego narrabo. Mutus quidem est,
 quum pituita derrepente in venas delapsa, aerem exclus-
 erit, & non admiserit neque in cerebrum, neque in venas ca-
 uas neque

A uas neq; in ventriculos, sed occupat respirationem. Quum enim accipit homo per os & nares spiritum, primum quidē ad cerebrū venit, deinde verò in ventriculū magna ex parte, pars etiam ad pulmonem, & pars ad venas. Ex his verò ad reliquas partes in venas dispergitur, & quantū quidem eius ad vētriculū venit, perfrigerat, & nihil aliud cōfert. Idem præstat & quod ad pulmonem venit. Qui verò ad venas peruenit aer, confert ad ventriculos ingressus & ad cerebrum. Atque sic sapientiā & motum membris exhibet. Quare vbi fuerit exclusus à venis aer præ pituita, eūque non suscep- rint, mutum ac desipientē hominē reddunt. At verò manus impotentes fiunt ac conuelluntur, sanguine quiescente &

B dum non diffunditur velut solebat. Oculi quoque distor- quentur aere à venis excluso, & cōmouentur. Spuma verò ex ore prodit ex pulmone. Quum enim spiritus nō ingredia- tur in ipsum, spumescit & ebullit velut moriens. Stercus verò subit dum violenter suffocatur. Suffocatur autē, hepa- te & vētre sursum ad septum trāuersum irruentibus, & sto- macho ventris cōcluso. Irruunt autē, quum tantum spiri- tus in os nō ingreditur quātum solebat. Calcitrant autem pe- dibus, quum aer in membris conclusus fuerit, & foras pene- trare nō poterit præ pituita, verū exiliens per sanguinem sursum ac deorsum, conuulsionem ac dolorē inducit, & pro- pterea sanē calcitrant. Porro omnia hæc perpetitur, quum pituita frigida defluerit in sanguinē calidum existentem.

C Perfrigerat enim & sistit sanguinē. Et si quidem fluxus mul- tus fuerit ac crassus, statim occidit. Dominatur enim san- guini per frigus, ipsūque cōgelat. Si verò paucior fuerit, in præsens quidem dominatur obturās respirationē. Deinde temporis progressu quum dispersus fuerit per venas & am- mixtus sanguini, multo existenti ac calido, si sic superatus fuerit, venæ aerem suscipiunt, atq; ita ægri resipiscunt. Et quicumque quidem pueri parui hoc morbo corripiuntur, vt plurimum moriuntur, si multus fluxus contingat, isque hu- midus existat. Venæ enim tenues existentes pituitam præ crassitudine ac multitudine suscipere non possunt, sed per- frigeratur ac congelatur sanguis, & sic moriuntur. Si verò modica existens pituita in vtrāsque venas defluxum fecerit, aut in alterius partis, superuiuant, nota ex morbo impressa

Cur oculi
distorquen-
tur.

Cur os spu-
mescat.

Cur oletet.

Cur præfo-
cetur.

Cur calci-
trent.

Cur infan-
tes hic mor-
bus necat.

relicta. aut enim os conuellitur, aut oculus, aut ceruix, aut manus, vbicunque sanè vena pituita repleta superata fuerit & gracilis reddita. Hâc itaque venam necesse est debiliorem esse, & hanc corporis partē læsam defectuosiorem. Verùm ad longius tempus plerunque prodest. Nō enim amplius morbo apprehenditur, si semel notā impressam susceperit. Quapropter necessario etiam reliquæ venæ affliguntur, ac partim simul gracilescent, vt aerem quidem suscipiant, pituita autem defluxus non amplius similiter illabatur. Debiliora tamen similiter membra esse verisimile est venis afflictis. Quibuscunque autē imperfectis & valde modica pituita defluerit, & ea in dexterar partes, hi citra notæ impressionem superuiuant, verùm periculum est ne morbus cōnutriatur, E ac simul augeat, si non his quæ commoda sunt curentur. Pueris quidem igitur sic fit hic morbus, aut quàm proxime huic modo. Seniores verò non occidit si accedat, neque distorquet. Nam & venæ sunt caux, & sanguine calido repletæ, quapropter neque superare potest pituita, neq; perfrigerare sanguinem vt cōgelet ipsum, sed ipsa superatur, ac sanguini cito ammiscetur. atque sic venæ aerem suscipiunt, & sapientia cōtingit, signaque prædicta minus inuadunt propter fortitudinē. At verò antiquissimis si hic morbus accedat, propterea ipsos occidit, aut leuiter sideratos facit, quia venæ ipsi sunt euacuatae, & sanguis modicus est ac tenuis & aquosus. Si igitur multum defluerit, & hyemis tempus fuerit, occidit. Suffocat enim respirationes, & sanguinem congelat, si in vtranque partem defluxus fiat. Si verò in alteram tantum, leuiter sideratum facit. Non enim potest sanguis pituitam superare, quum tenuis sit frigidusque ac modicus, sed ipse superatus congelatur, vt impotentes fiant illæ partes iuxta quas sanguis fuerit corruptus. Ad dexterar partes autem magis defluit quàm ad sinistras, quia venæ sunt cauiore & plures quàm in sinistris. Ab hepate enim tendunt & liene. Defluit autem & eliquatur pueris maximè, quibus sanè caput fuerit percalefactum, siue à sole, siue ab igne, siue etiā derepente inhorruerit cerebrum, etiam tunc pituita secernetur. Eliquatur etenim per calorē ac cerebri diffusionem, segregatur autem à frigore ac concretionem, & sic defluit. Et quibusdam quidem defluxionis causa hæc est.

Aliis

Cur ad-
tos non tol-
lit.

Cur senes
perimit vel
siderat.

Cur dex-
trā partem
potius ve-
det hic mor-
bus.

A Aliis verò etiā vbi derepente post aquilonares ventos aufer-
 flare cœperit, compactum ac debile cerebrum derepente sol-
 uit ac laxat, vt pituita redundet, & sic defluxum facit. Defluit
 insuper & ex ignoto timore, si quidem timuerint aut aliquo
 vociferante, aut inter plorandum spiritum cito reuocare non
 potuerint, id quod pueris frequenter contingere solet. Quic-
 quid sane horum ipsorum acciderit, statim horret corpus, &
 ager mutus factus spiritum non trahit, sed spiritus quiescit,
 & cerebrum compingitur, & sanguis consistit, & sic secerni-
 tur ac defluit pituita. Et pueris quidem hæ ipsæ causæ sunt,
 vt ab initio à sacro morbo corripiantur. At verò senibus
 hyems infestissima est. Quum enim ad multum ignem se-
 nex caput & cerebrum percalfecerit, deinde in frigore ver-
 satus fuerit ac inhorruerit, & ex frigore ad teporem accesserit,
 & ad ignem defecerit, idem hoc patitur, ac sic à morbo
 sacro apprehenditur iuxta prædictum modum. Periculū ve-
 rò multum est vt & Vere patiantur idem hoc, si caput fuerit
 insolatum. Minimè autem æstate, non enim fiunt repentinæ
 mutationes. Postquam verò viginti anni præterierint, non
 amplius hic morbus corripit, præterquam paucos aut nul-
 lum, nisi ex puero connutritus fuerit. Venæ enim plenæ
 sunt, & cerebrum compactum est, & acerbum ac rigidum,
 quare non defluit in venas: si verò defluxerit, sanguinem non
 superat multum ac calidum existētem. In quo vero à pue-
 ro augmentum cepit ac connutritus est, in eo per consuetu-
 dinem facit vt in mutationibus vëtorum patiatur, & vt plu-
 rimū morbo sacro corripiatur, præcipuè australi ac hu-
 mida aeris constitutione. Et liberatio difficulter contingit.
 Cerebrum enim humidius quàm ex natura fit, & præ pi-
 tuita inundat, vt defluxiones quidem frequentiores fiant. nō
 autem amplius possibile fit pituitam excerni, neque cere-
 brum resiccare, sed perrigatur & humidum existit. Cogno-
 uerit autem hoc ipsum quis maximè ex ouibus hoc morbo
 correptis, & præsertim capris. Hæ enim frequentissime cor-
 ripiuntur. Si enim caput ipsarum dissecueris, reperiēs cere-
 brum humidum esse, & sudore refertum, ac male olens. Et
 in hoc nimirum cognosces quòd non Deus corpus affligit,
 sed morbus. Sic verò se res habet etiam in homine. Quum
 enim ætatem adeptus fuerit morbus, non amplius curabilis
 est,

Cur ver pe
riculosum
sit.

Oues & ca
præ comi-
tiales.

Comitialis

Hippocratis Liber

inueteratus non sanatur. est, cerebrum enim eroditur à pituita ac colliquatur. Id ve- D
rò quod colliquatur, aqua fit, & foris cerebrum ambit ac cir-
cumalluit, & propterea frequentius ac facilius à morbo hoc

**Quid casu-
ri agant.**

corripiuntur. Propterea verò diuturnus est morbus, quia id
quod influit venis tenue est præ multitudine, & statim supe-
ratur à sanguine ac calescit. Quicunque verò iam assueti
sunt morbo, præcognoscunt se corripiendos, & ex hominum
frequentia fugiunt, si domus ipsorum in propinquo fuerit,
ad domum: sin minus, in locum desolatissimum, vbi quàm
paucissimi ipsos lapsos sint visuri, statimque se obuelant,
idque faciunt præ pudore affectionis, non præ timore, velut
multi putant, dæmonij. At verò pueri primum quidem ca-
dunt vbicunque tandè contigerit præ inassuetudine, E
autem sæpius à morbo corripiantur, postquam præsenferint
cõfugiunt ad matres, aut ad aliũ maximè notum, præ timo-
re ac formidine affectionis. verecundari enim pueri non-
dum sciunt. Cæterum in mutationibus ventorũ propterea

**Quid ven-
torum mu-
tatio pos-
sit.**

morbo sacro corripi censeo, maximè quidẽ austrinis, postea
verò etiam aquilonaribus, deinde etiã reliquis ventis, hi au-
tem sunt qui fortissimi ex ipsis existunt, & inter se tum sta-
tione, tum viribus contrariissimi. Etenim aquilo compin-
git aerem, & turbatũ ac nubilosum excernit, & illustriorem
ac pellucidum facit. Eodem modo etiã alij omnes venti ex
mari ac aliis aquis proficiscentes. Ex omnibus enim rebus,
atque adeò ex ipsis hominibus humiditatẽ ac tenebrositatẽ

**Aquilo qua-
lis, & au-
ster.**

excernunt. Quapropter saluberrimus omniũ ventorũ aqi- F
lo existit. Auster autem contraria huic operatur. primum
enim incipit aerem compactum liquare ac diffundere, qua-
propter etiã non statim magnus spirat, sed primum lentus
ac lenis est, quoniam aerem statim superare non potest, qui
prius densus est & compactus, sed temporis progressu ipsum
dissoluit. Idem porrò hoc etiã in terram operatur & in ma-
re, fluuiosque ac fontes & puteos, & quæ ex terra nascuntur,
& in quibus humor inest. Est autem in omni, in alio plus, in
alio minus. Omnia autem hæc ventum hunc sentiunt, & ex
splendidis tenebrosa fiunt, & ex frigidis calida, & ex siccis
humida. Et quæcunq; in domibus vasa iuxta terrã sunt cum
vino aut alio quopiã liquore, ea omnia austrum sentiunt, &
formam in aliã speciem transmutant. Solem verò & lunam
ac syd

A ac sydera multò hebetiora quàm ex natura sunt reddit.

Quum igitur etiam his quæ adeò magna sunt ac fortia in-
tantum dominetur, & corpus sentire faciat, vt ex horum ven-
torum alterationibus trāsmutetur, necesse est ab austris qui-
dem solui ac humectari cerebrū, & venas laxiores reddi, ab
aquilonis verò flatibus, quòd sanissimū est in cerebro com-
pingi, quòd verò morbolissimum ac humidissimū est excer-
ni, & forinsecus circumalluere, atque sic defluxus in horum
ventorum mutationibus succedere. Hoc modo hic morbus
fit & floret, tum ab accedentibus, tum à decedentibus, & nul-
latenus difficilior aut cognitu aut curatu est quàm alij, neq;
etiam diuinior aliis. Porro expedit homines nosse, quòd ex
B nulla alia nobis parte voluptates contingunt, & lætitiæ; &
risus & lusus, quàm ex cerebro. Itémque mœrores & anxie-
tates tristitiæque ac ciuilatus & querelæ. Et hoc sapimus ma-
ximè ac intelligimus, & videmus & audimus, & cognosci-
mus turpia & honesta, mala & bona, iucunda & iniucunda,
partim consuetudine discernētes, partim vtilitate percipien-
tes. Eodem voluptates & iniucunditates pro opportunitate
dinoscimus, & non eadem nobis placent. Eodem & insani-
mus & deliramus, & terrores & timores nobis accedunt, par-
tim noctu, partim interdiu, & insomnia, & errores intem-
pestiui, & curæ inanes, & vt non noscamus adstantes, & de-
suetudo, & inesperienza. Atque hæc omnia perpetimur à
cerebro, quum sanum non fuerit, sed aut calidius quàm ex
natura fiat, aut frigidius, aut humidius, aut siccius, aut aliud
C quid perpetiatur præ naturam & consuetudinem. Et in-
sanimus quidem præ humiditate. Quū enim humidius fue-
rit quàm pro natura, necesse est moueri. vbi verò mouetur af-
fectio, necesse est neque visum quiescere, neque auditum, sed
alias aliud videre & audire, & linguam talia dicere qualia
semper ac singulis vicibus viderit ac audierit. Quanto verò
tempore cerebrum quieuerit, tātò etiam homo sapit. Fit au-
tem corruptio cerebri à pituita & bile. Vtriusq; cognitio sic
contingit. Qui enim à pituita insaniunt, quieti sunt, & non
vociferantur neque tumultuantur. Qui verò à bile, vocifera-
tores sunt & mālēfici, & non quieti, semper aliquid intempe-
stium faciētes. Si quidem igitur assiduè insaniunt, hæc ipsis
sunt causæ. Si verò terrores ac timores accedant, à cerebri
transmu-

Mutatio
ventorum
quid pos-
sit.

Cerebrum
caussa o-
mnium.

Cerebrum
quando fu-
riat.

Pituitosi bi-
liosq; furo-
res quales.

Pauoris
caussa.

transmu

Hippocratis Liber

**Oblui-
o unde & vo-
ciferatio
nocturna.**

**Spūs aerve
sapientia au-
thor.**

**Cerebrum
prudētiam
præbet præ-
cordia nō.**

transmutatione id contingit, transmutatur autē dum cale- **D**
cit, calefcit autē præbile, vbi ad cerebrum impetum fecerit
ex corpore per venas hamatitidas hoc est sanguinarias ap-
pellatas, & timor adest donec rursus redierit in venas ac cor-
pus, deinde quiescit. Angitur autem homo & inquietudine
multa iactatur intempestiuē, dum cerebrum perfrigeratur,
& præter consuetudinem compingitur. Hoc verò à pituita
perpetitur, ab hac autem affectione etiam obliuiosus euadit.
Noctu verò clamat & vociferatur, quum derepente cere-
brum percalefiat. hoc autem perpetiuntur bilioli: pituitosi
enim nō percalefiunt: quum sanguis multus ad cerebrū per-
uenerit & efferbuerit, venit autē per venas prædictas: Quum
contigerit vt homo videat insomnium horrendum, & in ti- **E**
more fuerit, velut etiā si vigilet, tūc magis facies ignescit, &
oculi rubescunt, quum timuerit, & mens meditatur aliquid
mali operari, sic etiā in somno patitur. Vbi verò expergefa-
ctus fuerit, & resipuerit, atque sanguis rursus in venas prædi-
ctas dispersus fuerit, quiescit. Et propterea iudico cerebrum
vim plurimam in homine habere. Hoc enim est nobis eo-
rum quæ ab aere fiunt interpretes, si sanum fuerit. Sapientiā
autem ipsi exhibet aer. Oculi verò & aures & lingua, &
manus & pedes, qualia cerebrum statuit ac cognoscit talia
subministrant. Sapiencia enim toti corpori contingit, prout
aere participarit. Ad intelligentiā verò internuncius est ce-
rebrum. Quum enim homo spiritum in seipsum attraxerit,
primū quidē ad cerebrū peruenit, & sic ad reliquum cor- **F**
pus aer dispergitur, relinquens in cerebro suum ipsius vigo-
rem, & quicquid prudēs ac sapientia præditū fuerit. Si enim
in corpus primū perueniret, & posterius in cerebrum, re-
licta in carnibus ac venis dinotione ac iudicio, ad cerebrum
calidus iam existens perueniret, & non sincerus ac purus, sed
ammixto humore à carnibus & sanguine, vt non ampliū
exactē sincerus esset. Quapropter dico cerebrum intelligen-
tiæ ac prudentiæ internuncium ac interpretem esse. Cæ-
terū præcordia aliās fortuitum nomen apud Græcos per
consuetudinem habent, quum phrenes à sapientia dicta vi-
deantur, reuera autem non, neque ex natura. Neque ego sa-
nè noui quam vim habeant præcordia, vt sapiant & intelli-
gant, præterquā si homo ex improviso nimio gaudio per-
fundatur,

A fundatur, aut tristitia afficiatur, tunc sanè exiliunt & anxietatem exhibent prærenuitare & quòd distenta sunt maxime in corpore, & ventriculum non habent ad quem suscipiantur aut bonum, aut malum allabens, sed ab utrisque his turbantur, propter naturæ debilitatem. Nam nullo sanè prius sentiunt ex his quæ in corpore insunt, sed frustra hoc nomen & causam habent, Quemadmodum quæ ad cor sitæ sunt aures

Cor cur nō
sedes sapiē-
tiae.

Bunt, & conclusiones habet ut sentiat, si quis dolor, aut collectio homini contingat. Necesse est enim & dum angitur, inhorre corpus ac distēdi, & si quis nimio gaudio perfundatur, idem pati. Quapropter cor quidē & præcordia maxime sentiunt, sapientia tamen minimè participant, sed omnium horum cerebrū causa est, quemadmodum igitur etiam prudentiam ac aerem omnium primum ex his quæ in corpore insunt percipit cerebrū, Sic etiam si qua mutatio fortior in aere contingat, præ temporibus anni, etiam ipsum à seipso diuersum redditur in aere. Etenim cerebrum propterea primum sentit, quia etiam morbi in ipsum irruūt acutissimi, & maximi, ac præcipuè lethales, & qui difficilem iudicationem habent apud inexpertos. Hic verò morbus sacer appellatus,

Cordis
præcordio-
rumq; pro-
prietas.

Cexiusdem causis oritur, à quibus etiam reliqui, ab accedētib; nimirum ac decedentibus, velut frigore, Sole, ventis, quæ & transmutantur, & nunquàm quiescunt. Hæc autem sunt diuina. Quare nequaquam hunc morbum ab aliis discriminare oportet, neque reliquis morbis diuiniorē putare, sed omnes diuinos omnesque humanos. Naturam autem vnusquisq; habet & vim in seipso, & nullus nec auxiliij nec remedij expertus est, & pleriq; his ipsis curantur, à quibus etiam nascuntur. Alterum enim alterius nutrimentū est, alterius verò perniciēs ac afflictio. Hoc itaque Medicū nosse oportet, & temporis occasionē in singulis pernoscere, quòd alterū quidem per alimētum absoluet & augebit, alterum verò detrahet & minuet. Oportet autem tum in hoc morbo, tum in reliquis omnibus, nō augere morbos, sed festinare ut ipsos exteramus,

Morbus sa-
cer vnde.


Medicum
quæ scire
oporteat.

Hippocratis Liber I.

teramus, id quod aduersissimum est morbo exhibendo, non D
quod amicum & familiare. A familiari enim & consueto flo
ret ac augefcit, ab aduerso verò & hostili perit & dissipatur.
Quisquis autem talem mutationem in hominibus nouit, &
humidum ac siccum facere potest hominem, calidum item
ac frigidum per diætam, hic utique & hunc morbum sana
uerit, si occasionem eorum quæ conferunt pernosceret, citrà
expiamenta ac incantationes, citràque omnem aliam huius
cemodi machinamentorum absurditatem.

Comm. vid. vulgar. 29 stat. inf. aliter Hipp. **HIPPOCRATIS**
COI DE MORBIS LIBER
PRIMVS, IANO COR-
NARIO MEDICO
PHYSICO IN-
TERPRETE. *filio 7/14/10*

Quæ medi-
cus præsta-
re debeat.



QVI DE sanatione rectè inquirere
 velit, percunctantique respondere,
 & contradicere rectè, eum hæc ani-
 maduertere oportet. Primùm quidè
 à quibus omnes morbi hominibus
 fiunt. Deinde verò qui morbi neces- **F**
 sario ubi facti fuerint, aut lōgi sunt
 aut breues, aut lethales aut non le-
 thales, aut aliquā corporis partem
 mutilent, aut non mutilent, & qui postquā orti sunt dubij
 sūt, an mala ab ipsis euentura sunt, aut bona. Et à quibus
 morbis ad quales transitus fiat. Et quæ per fortuitum succes-
 sum medici ægrotos curantes faciunt. Et quæ bona aut mala
 ægrotantes in morbis perpetiuntur. Et quæ importunè aut
 dicuntur, aut fiunt à medico ad ægrotum, aut ab ægrotō ad
 medicum. Et quæ exactè fiunt ac dicuntur in arte. Et quæ
 recta in ipsa, & quæ non recta. Et quod ipsius principium, aut
 finis, aut medium, aut aliud quid eiusmodi demonstratum,
 quòd rectè habet vt in ipsa sit, aut non sit. Et quæ parua &
 magna,

A magna, & multa & pauca. Et quod omne in ipsa vnum est, & omnia quod vnum. Et quæ fieri possunt intelligereque ac dicere, & si opus sit, neque intelligere, neque dicere, neque facere.

Omne vñ est.

Et quod facilitas in ipsa sit, & quod difficultas, & quod oportunitas, & quod intempestiuitas, & quibus aliis artibus similis sit, & quibus nihil similis sit. Et de corpore, quod calidum sit aut frigidum, aut siccum aut humidum. Et quod forte aut debile, aut densum aut rarum. Et quæ multa, pauca fiunt, aut in peius, aut in melius. Et quod honestè aut turpiter, aut tarde aut citò, aut rectè aut nō rectè. Et quod malum supra malum fieri necesse est. Hæc animo versantem obseruare oportet in sermonibus, quantum quis ab his delinquat, aut in dicendo aut percunctando, aut respondendo. Et an quæ multa sunt, pauca dicat, & an quæ impossibilia sunt, possibilia esse asserat. Et quicquid sanè etiā aliud dixerit ac aberrarit, hac ratione obseruare oportet, & in contradictione aggredi & impetere. Morbi quidem igitur vniuersi fiunt ex his quidem

Quæ morbos creent.

B quæ in corpore insunt, tum à bile, tum à pituita. Ab externis verò, à laboribus & vulneribus. Sed & à calido & supercalefaciente, & à frigido ac superfrigefaciente, & sicco ac superexiccante, & ab humido ac superhumectante. Et bilis quidem ac pituita vnà cum nascentibus gignuntur, & sunt in corpore aut plus aut minus. Morbos autem exhibent, partim à cibis & potibus, partim à calido supercalefaciente, & à frigido superfrigefaciente. Necessitatem autem talia habent, vt fiat

Bilis & pituita congenita.

C hæc quum ipsa fiunt, velut verbi causa. In vulneribus eos, qui crassos nervos fauciatos habent, necesse est claudos fieri. Itēque si musculorum capita faucia sint, præsertim eorum qui sunt in femoribus. Moritur autem si quis cerebro fauciatus fuerit, aut spinali medulla, aut hepate, aut præcordiis siue septo transuerso, aut velica, aut vena sanguiflua, aut corde. Non moritur autē vulneratus in his partibus, in quibus hæc membra non insunt, sed ab his longissimè absunt.

Morbi quæ mortiferi.

Ex morbis verò tales necessitatem habent, vt ab ipsis perimantur quum fiant, Tabes, Aqua inter cutem ac subter carnem nascens, & si mulierem foetum in vtero habentem peripneumonia, id est, pulmonis inflammatio corripiat, aut febris ardens, aut pleuritis siue lateris inflammatio, aut phrenitis, id est, membranarum cerebri inflammatio, aut Erysipelas

Hippocratis Liber I.

Quæ non semper peribunt. pelas ignis sacer appellatus, in vtero fiat. Dubij autem morbi, vt & perdant, & non, tales sunt, peripneumonia, febris ardens, phrenitis, pleuritis, angina, vua, hepatitis, splenitis, nephritis, dysenteria, in muliere fluxus sanguinolentus. Tales verò non lethales sunt, nisi quid ipsis accedat, affectiones fluidæ circa articulos, atra bilis, podagra, coxendicum morbus, tinesmus qui est voluntas egerendi ineuitabilis, quartana, tertiana, strangulatus vrinæ, lippitudo, lepra, impetigo, morbus articularis. Multi autem frequenter ab his muti fiunt, sidenturq; manibus ac pedibus, & linguæ impotentes redduntur. Et ab atra bile quidam leuiter sidentur. Claudii verò à coxendicum morbo fiunt. Oculi autem & auditus

Quæ mutantur.

Longi morbi.

Qui celeriter decernant.

Qui in alia transeant.

Quæ necessario sequuntur.

Omentum quando putrescit.

Tempora, occasiones.

mutilantur à pituita obfirmata. Longos autem necesse est esse, tabem, dysenteriam, podagram, affectiones fluidas circa articulos, pituitam albam, coxendicum morbum, vrinæ strangulatum, in senioribus verò Nephrytim, Mulieribus verò fluxum sanguinolentum, hæmorrhoidas ani, fistulas. At verò febris ardens, phrenitis, peripneumonia, angina, vua, pleuritis, citò decernunt. Transitu autem fit in his, ex pleuritide in febrem ardentem, ex phrenitide in peripneumoniam. Verum ex peripneumonia febris ardens non fit, ad dysenteriam tinesmus accedit, & à dysenteria, lienteria siue leuitas intestinorum, sequitur: ex lienteria in aquam inter cutem transitus fit, & ex pituita alba in aquam inter cutem, & ex peripneumonia ac pleuritide, in pectoris suppurationem. Mala porrò supra mala fieri necesse est, velut si rigor corripuerit, ardor igneus superuenit. Et si neruus dissectus fuerit, conuulsionem facit, & vt dissectus neque coalescat, & fortiter inflammetur. Et si cerebrum concussum fuerit ac doluerit eius qui percussus sit, necesse est euestigio mutum fieri, & neque videre, neque audire. Si verò sauciatus fuerit, febrem necesse est superuenire, & bilis vomitum, & aliquam corporis partem sideratam fieri ac perire. Si verò omentum exciderit, necesse est putrescere. Et si sanguis ex vulnere, aut vena effluerit, in supernum ventriculum, necesse est ipsum in pus conuerti. Temporum autem occasiones, vt in summa dicam, multæ sunt & variæ in arte, quemadmodum etiam morbi & affectiones, & horum curationes. Maximè verò repentinae sunt, in his quibus animo defectis opitulari oportet, &

Aret, & qui neque urinam neque stercore egerere possunt, & qui suffocantur, & si mulierem parientem aut sauciatam liberare oportet, & quaecunque eiusmodi. Et hæc quidem occasiones repentinæ sunt, & paulò posterius non sufficiunt. Plerique enim paulò posterius pereunt. Occasio verò est, si horum aliquid perpetiatur homo, & qui antequam animam efflet opituletur, hoc totum ex occasione opitulatur. Est quidem igitur ferme hæc occasio etiam in omnibus aliis morbis. Semper enim in quocunque sanè quis opituletur tempore, ex occasione opitulatur. Quicunque verò morbi, aut vulnera non ad mortem tendunt, sed temporarij sunt ac periculosi, doloresque in ipsis fiunt, verum possibile est ut cessent, si quis rectè medeatur. His sanè non profunt auxilia à medico adhibita, quum adhibeantur. Nam & non præsentem medico utique cessassent. Alij verò morbi sunt, quibus occasio est ut curentur matutina diei hora, nihil autem refert an valde mane, aut paulò posterius. Alij morbi sunt quibus occasio est, ut semel in die curentur, nec refert quo tempore id fiat. Alij per tertium aut quartum diem curantur, & alij semel per mensem, & alij per tertium mensem, nec refert an id ipsum tertij augmento vel fine fiat. Tales itaque occasiones sunt, in quibus non aliam quàm hanc certitudinem habent. Intempestivitas autem hæc est, si quæ mane curari oportebat in meridie curentur. Propterea verò intempestivè curantur, quia inclinationem ad peius habent, propter curationem non in tempore factam. Quaecunque etiam citius siue in meridie, siue vespere, siue noctu curentur, intempestivè curantur. & si vere curari oporteat, curentur autem hyeme, aut si hyeme oporteat, curentur autem æstate: aut si quod iam curari oportet, id ipsum differatur, aut quod differre oportet, id ipsum iam curetur. Talia omnia intempestivè curantur. Rectè porò & non rectè in ipsa hæc fiunt. Non rectè quidem fit, si morbum alium existentem, alium esse pronuncies: & magnum existentem, parvum dicas, & vicissim parvum, magnum. & si supervicturum, non supervicturum pronuncies, & perituum non perituum. Et si suppuratum existentem non cognoscas, nec morbum magnum in corpore nutriri cognoscas. & si medicamento aut potione quis opus habeat, quo ipsi opus sit, non cognoscas. & si quæ sanari possunt, non sanantur, &

Curatio
opportuna.

Quæ ritè
fiant.

Hippocratis Liber I.

Quæ non ritè. nes, & quæ sanatu impossibilia sunt, te sanaturum recipias. D
Atque hæc quidem circa sententiam non rectè fiunt. Circa
non chirurgiam verò hæc. Pus in vlcere aut tuberculo existens
ritè. non cognoscere, & fracturas ac luxationes non cognoscere,
& specillo admoto ad caput non cognoscere an os fractum
sit, & fistulam in vesicam immissam demittere non posse, &
lapidem in vesica existentem nō cognoscere, & suppuratum
existentem ex concussione non dinoscere, & secando aut vrē
do, aut à profunditate, aut à longitudine aberrare, aut vrere
& secare quæ non oportet. Et hæc quidē non rectè. Rectè au-
tem fiunt hæc. Morbos cognoscere qui sint, & à quibus, &
qui ipsorum longi, & breues, & lethales & non lethales, &
qui transmutantur, & qui augescunt, & qui minuuntur, &
qui magni, quique parui. & dum curas possibiles quidē cu-
rare, impossibiles verò scire cur curatu sunt impossibiles. &
dum curas eos qui tales habent, per curationem quantum

**Quid ritè
fiat.**

**Perperam
medicadū
non est.**

**Quæ suo tē
pore ve-
niunt bona
sunt.**

Erysipelas

possibile est opitulari. Quæ verò offeruntur ægrotis, ea sic
obseruare oportet, rectène an secus fiant, veluti si quis quæ
ficcare oportet, humectet, aut si erassescere oporteat, non
exhibeat à quibus erassitudo inducitur. aut si quæ attenuare
oportet, non attenuet, quæ frigefacere, non frigefaciat, quæ
calfacere, non calfaciat, quæ putrefacere, non putrefaciat,
& reliqua iuxta eandem rationem. Talia autem sua
sponte accasu hominibus in morbis fiunt, tum bona, tum
mala. Febrienti ac bilioso, in tempore foras dispersa bi-
lis, bonum: diffusa verò ac dispersa sub cutē, toleratu leuior
est habēti, & curatu faciliior sananti. diffusa autem ac disper-
sa & ad vnam aliquam corporis partem allapsa, malum.

Aluus turbata in pleuritico aut peripneumonico, aut sup-
purato, malum. Febrienti aut vulnerato aluus resiccata,
malum. Subaquoso ac lienoso ab alba pituita detento, al-
uus fortiter turbata, bonum. Erysipelas si extra diffusum
intrò vertatur, malum. Si verò intra diffusum foras ver-
tatur, bonum. A profluuiio alui forti correpto, vomitus su-
perueniens, bonum. Mulieri sanguinem vomenti menses
erumpere, bonum. A fluxione verò infestata, ad nares aut
os fluxionem transire, bonum. Mulieri à conuulsione pres-
sa ex partu, febrem superuenire, bonum. Et tetano ac con-
uulsione occupante, igneum ardorem superuenire, bonum.

Talia

- A** Talia enim per nullam medicorū ignorantiam, aut scientiam, fiunt, & non fiunt, sed sua sponte ac fortuito casu fiunt, & profunt, & nocent, iuxta eandem rationem. Ceterū Medici talia per fortuitum successum bona, in curatione faciunt. Nimirum si medicamento sursum purgante dato, & sursum & deorsum probè purgāt. Et si mulieri medicamento dato, quod bilem aut pituitam deorsum purgat, menses aliās nō fluentes erumpant. Et si lienem suppuratum habenti medicamentum dederint, quod bilem ac pituitam deorsum purget, & sic pus deorsum à liene expurgēt, & à morbo liberent. Et si medicamēto exhibito calculoso, calculum in vrinarium meatum præ pharmaci violentia protrudant, Quæ bona malæ medicus faciat.
- B** ut per vrinam eiiciatur. Et si medicamētum dederint quod pituitam sursum purgat, ei qui pus in superiore ventriculo in tuberculo habet, non scientes quod habet, isque pus vomat ac sanus fiat. Et si eum qui ex medicamēto sursum purgante superpurgatur, sua spōte aluo subter erumpente, à vomitu sanum faciant. At verò Mala operantur Medici præ infortunio hæc. Si pharmaco bilis aut pituitæ sursum ducti- Quæ non bene medico succedant. uo dato, venam in pectore præ vomitu rumpāt, ei qui prius nullum manifestum dolorem in pectore habuit, atque sic fiat morbus. Et si mulieri in vtero habenti medicamentum supernè purgans exhibeant, alius autem infernè erumpēs foetum expellat. Et qui suppuratum curat, si alius profusa fiat, ipsum perdit, & qui oculos curat ac sublinat, si dolores incidant acutiores, & si ita cōtingat, rumpantur oculi & destruantur, accusant medicū quod oculos subleuit. Et si puerperæ in ventris dolore medicus aliquid det, & malè habeat aut pereat, medicus in culpa est. Fere autem quæcunque necessitatem habent ut fiant in morbis ac vulneribus mala Quibus nō iure medicus arguatur. supra mala, ea ubi fiunt, in medicū culpā reiciunt, & necessitatem talia fieri cogentem non agnoscunt. Et si ad febri- citantem aut vulnus habentem ingressus, ad motis quàm pri- mum remediis nō opituletur, sed postera die æger peius ha- beat, medicum accusant, Si verò opituletur, non æqualiter laudant. Oportere enim ipsum perpeti putant, vlcerāq; inflammari, & in morbis quibusdā dolores fieri oportere, neq; tales esse ut ne fiant. Nervus præcisus ac dissectus non co- Quæ non coeant præ- lescit, neque vesica, neque aliquod ex tenuibus intestinis, neq;

Hippocratis Liber I.

neque vena sanguiflua, neque tenuis genæ pars, neque pu- D
Principiū
artis cur
nullū est. dendi pellicula. Porro principium sanationis demonstra-
tum quidem non est, quod sane recte principium sit vniuer-
sæ artis, neque secundum aliquod, neque medium, neque fi-
nis. Sed incipimus ab ea aliquando dicentes, aliquando ope-
rantes, & desinimus eodem modo. Et neque dicentes ex
iisdem sermonibus incipimus, neque si de iisdem dicamus,
neque in iisdem desinimus & operantes iuxta eandem ra-
tionem, neque ex iisdem operibus incipimus, neque in iis-
dem desinimus. At verò facilitas ac promptitudo in his est.
Quum quis secans aut vrens, neque neruum secet, neque ve-
nam. Et si suppuratum vrat, pus consequatur. Et si secet,
eodem modo. Et fracturas recte componere. Et si qua pars E
corporis ex natura excidat, vt ipsam recte ad naturam re-
trudat. Item apprehendere fortiter ea quæ oportet, & ap-
prehendendo premere. Et apprehendere leniter ea quæ
oportet, & apprehendendo non premere. Et in obligando
tortuosa non facere ex rectis, neque premere quæ non opor-
tet. Et in contactu vbicunq; tandem contigerit, dolorem ex
superfluo nō exhibere. Hæc quidē igitur facilitatis ac prom-
ptitudinis existunt. At verò digitis decenter attingere, aut
probe, aut non probe, aut longis, aut breuibus, aut probe de-
ligare omnes deligaturas, non ad artem pertinere iudicatur
de facilitate ac promptitudine, sed seorsim. Quicunque sup-
purati fiunt pulmone, aut superiore vel inferiore ventre, aut F
purulenti
pulmonis
signa. tubercula habent, siue in superiore ventre siue inferiore, aut
in pulmone, aut vlcera intrinsecus, aut sanguinem vomūt
aut spuunt, aut dolorem aliquem habent, vel in pectore vel
in dorso: Hæc omnia habent ex his quidem quæ in corpo-
re insunt, à bile & pituita: ab externis verò ab aere insito
calori ammixto. Sed & à laboribus ac vulneribus. Et qui-
cunque quidem pulmone suppurati fiunt, ab his fiunt. Si
peripneumonia correptus in iudicatoriis diebus non purge-
tur, sed relinquatur in pulmone sputum ac pituita, suppurat-
us fit. Et si quidem statim curatus fuerit, vt plurimum effu-
git, si verò neglecta fuerint illa in pulmone corrumpitur, il-
lis & inhærentibus & putrescentibus, vlcera turq; pulmo &
suppuratus fit, & nō amplius intro ad seipsum nutrimentum
memoralile trahit, neque quicquam depurgatur ab eo sur-
sum,

A sum, sed suffocatur, & semper amplius difficulter spirat, & respirando stertit, & respirat illinc sursum ex pectore, tandem verò obturatur à sputo, & moritur. Fit autem & suppuratus, si pituita ex capite ad pulmonem destillet, & primum quidem ut plurimum latenter defuit, tussimque tenuem exhibet, & sputum paulo amarius solito, & aliquando tenuis adest calor. Temporis autem progressu, exasperatur pulmo, & intus exulceratur à pituita inhaerente ac putrescente: & grauitatem exhibet pectori & dolorem acutum ante & retro, caloresque acutiores in corpus incidunt, & pulmo à calore trahit ad se pituitam ex toto corpore: & maxime ex capite, Caput verò calefactum ex corpore, & hanc putrescentem subcrassam sput. Quanto verò magis tempus progreditur, tantò magis pus sincerum sput, & febres acutiores fiunt, & tussis frequens ac fortis, & inedia vexat, & tandem alius infèrè turbatur. Turbatur autem à pituita, pituita verò de capite descendit. Hic quum ad hoc peruenerit, perit quemadmodum dictum est in superioribus, purulento ac putrido pulmone facto, aut ventre infèrè erumpente. Fit praterea & ab his pulmo suppuratus. Quum venula videlicet aliqua in ipso fuerit rupta, rumpitur autem à laboribus: & vbi rupta fuerit, sanguinem fundit, si quidem crassior fuerit, amplius, sin tenuior, minus, & sanguinè quidem ipsum partim confestim sput, partim verò nisi venà adstringatur, in pulmonem funditur, & in ipso putrescit, & vbi putrefactus fuerit pus facit. progressu verò temporis aliquando pus sincerum, aliquando pus subcruentum, aliquando sanguinem, & si magis repleta fuerit vena, ipsam sanguinis copiam aceruatim à seipsa reuomit, sputurque pus crassum ab accessoria & intus putrescente pituita. Hic si anticipetur incipiente morbo, priusquam vena sanguinem fundat ac fortiter laxetur, & priusquam attenuetur, & in lecto decumbat, & caput corrumpi incipiat, & reliquum corpus collinqui, superstes ab hoc morbo euadit. Si verò neglectus fuerit, & hæc occuparint, ut ea perpetiatur aut omnia, aut plurima, perit. perit autem hic aut ex iisdem quæ superius dixi, aut à vomitu, sanguine multò multoties per vomitum reiecto. Si verò vena omnino quidem rupta non fuerit, verum Varix inter acutus tractus in ipsa fiat, fit autem maxime velut varix rior.

Venæ fractæ signa.

Hippocratis Liber I.

qui etiā statim vbi factus fuerit, dolorē quendā tenuem in-
ducit, ac tussim aridā. Si verò diu durauerit & neglectus fue-
rit, primū quidē sanguinem modicū ac subnigrum dimit-
tit ac reiicit, deinde verò adhuc copiosiorē & sincerissimum,
deinde pus, patiturque quācūq; in superioribus dicta sunt.

Medela.

Conducit autē talibus, si ab initio curandos suscipiat, vt &
venæ de manibus sanguinem emittant, & diætā à qua quā
siccissimus & exanguissimus fiat. Eodē porrò modo etiam
venæ in latere afficiuntur, quæ intus in superficie sitæ sunt.

**Purulentus
vnde.**

Quum igitur affectæ fuerint, varicosæque factæ, & intus
eleuatæ, & neglectæ fuerint hæc perpetiuntur. Erumpunt
& spuunt à se sanguinem, & aliquando etiā vomunt, & sup-
purati fiunt, & vt plurimum pereunt. Si verò curentur inci-
piente morbo, rursus in loco venæ confidunt ad latus, humi-
lēsque fiunt. Et pulmo ab his suppuratus redditur, & ab ipso
etiam talia perpetiuntur, & sic moriuntur. Cæterum supe-
riore ventris suppurati multipliciter fiunt. Nam quum pi-
tuita de capite copiosa & acervatim in superiorē ventrē flu-
xerit, putrescit & in pus vertitur. Putrescit autē maximē in
diebus viginti vna. Hoc igitur pus concutitur & intus fin-
ctuat ad latera allabens. Hic si vratur aut secetur priusquam

**Purulentus
ventriculus
superior
quotmodis
fiat.**

diuturnum fiat pus, sanus plerūq; euadit. Fiunt autē & su-
periore ventris suppurati ex pleuritide, quum fortis fuerit, &
in iudicatoriis diebus neq; putruit, neq; spuito reiecta est, sed
latus exulceratum fuerit à pituita affixa, & bile, & quum
vlcus factū fuerit, reddit de se pus, & ex vicinis locis præ ca-
lilitate in seipsum pituitam adducit, & hæc vbi cōputruit,
pus spuitur. Aliquādo verò etiam ex venis sanguis se in vlcus
ingerit, & putrefactus pus fit. Hic si euestigio assumatur, sa-
nus plerūque fit. si verò negligatur, perit. Fiunt præterea
suppurati etiam, si pituita de capite delapsa, ad latus adgluti-
nata fuerit & putruerit. Tunc enim latus vt plurimum in-
flammat, & patitur eadem quæ ex pleuritide suppuratus.

Fiunt & quum præ labore, aut exercitiis, aut alio quopiā
modo, vena antè aut retro fuerit rupta, & sic rupta vt nō sta-
tim spuatur sanguis, sed in carne acutus tractus siue varix
fiat: & carō tracta ac conuulsa humiditatē modicā traxerit,
& sublimida facta fuerit: & statim quidē sic affectus non ver-
cipit præ robore ac bona habitudine, aut si etiā sentit nihil
molesti

- A** molesti esse putat. Hic ubi deprehenderit, quum iam præ febribus, aut potu, aut venere, aut aliqua alia re correptus, fuerit attenuatus, caro sauciata, subresiccatur & subcalescit, & humiditatem in seipsam à vicinis tum venis, tum carnibus trahit. Vbi autē attraxerit, intumescit & inflāmatur, & dolorem exhibet tenuem, & tussim rarā & siccam primū. Deinde adhuc magis trahit in seipsam, & dolorē inducit vehementiorem, & tussim frequentiorē. Et primū quidē subpurulentum sput. Aliquando verò liuidū & subcruentū. Et quanto magis tempus, progreditur, amplius in seipsam trahit ac putrefacit, & de ipsa carne quantum ab initio liuidum erat, hoc pus fit: & dolorem acutum exhibet, & febrem, & tussim
- B** multam ac frequentē, & per sputum sincerū pus expuit. Si verò pus in ventre morā traxerit, totum corpus ab ipso calescit. Maximē verò vicinissimæ partes. Calescente autem corpore, humiditas maximē eliquatur. Et quæ quidem à supernis partibus eliquatur, in supernum ventriculū maximē confluit, & pus fit, ad hoc quod iam in ipso est. Pars verò eius etiam in infernum ventriculum fluit: & quādoque alius ab ipsa turbatur, & hominem perimit. Nā cibi ingesti secedunt inconcocti, & alimentū ab ipsis corpori non accedit. Et sputi sursum purgatio non æqualis cōtingit, aluo nimirum calefacta, & omnia deorsum trahente in seipsam. Et à sputo quidem suffocatur & stertit, dum non purgatur: à ventre verò fluente debilitatur, & plerūq; perimitur. In huiusmodi autem morbis hunc fluxū maximē exhibet caput, vtpote quod **Capitis rheuma.** cauum est, & supernē situm. Quum enim ab aluo fuerit calefactum, tenuissimā pituitam de corpore in seipsum trahit. Vbi verò hæc in ipso fuerit collecta, reddit rursus aceruatam & crassam, velut dictū est: & pars quidē ipsius in supernum ventriculū defluit, pars verò in infernum. Quum igitur caput fluere inceperit, & reliquum corpus colliquari, nō amplius æqualiter, ne vsti quidem, superstites euadunt. Superant enim supra pus influentia mala, ea quæ defluunt: & carnes liquescunt magis à malis, quā nutriuntur ab ingestis. Qui verò huiusmodi morbos habent, partim ab his breui pereunt, partim diutius tempus extrahunt. Differt enim corpus à corpore, & ætas ab ætate, & affectio ab affectione, & tempus à tempore, in quo ægrotarint: & aliqui maiorem tolerantiam

Hippocratis Liber I.

tolerantiam in morbis habent, alij omnino ad tolerandum **D**
 impotentes sunt. Proinde certitudo exacta temporis in quo
 pereunt nō est, an longum, aut breue futurum sit. Neq; enim
 hoc tempus certū est quod quidam definiunt: & plerunque
 neque hoc ipsum suppurat. Differt enim & annus ab anno, &
 tempus à tempore. At si quis de ipsis rectè cognoscere ac di-
 cere velit, is cognoscet omni tempore, & perire, & supersti-

Qui ventri- culus infe- rior puru- lentus fiat. res euadere, & pati quacunque tandē patiantur. Caterū
 inferno ventriculo suppurati fiunt, maxime quidē quum pi-
 tuita aut bilis aceruata inter carnem & cutē collecta fuerit.

Fiunt autem & à conuulsionibus, quum venula conuulsa
 rupta fuerit, sanguis effusus putrescit & suppuratur. Si verò
 caro conuulsa fuerit, aut cōtusa, sanguinem ex venis sibi ipsi **E**
 propinquis trahit, atque hic putrescit ac suppuratur. His si
 quidem foras de se significationē præbuerit & eruperit pus,
 sani fiunt. Si verò sua sponte intro proruperint, pereunt. At
 verò diffusum pus in ventriculo inferno, veluti in superno
 dictum est, generari haud quaquam poterit, sed velut à me
 dictum est in tunicis & in tuberculis innascitur. Et si qui-
 dem intro notas habuerit, cognitu difficile est. Neque enim
 ex cōcussione cognoscere licet. Cognoscitur autē maxime
 ex dolore vbi fuerit, & si terrā figulinam, aut aliud quid hu-
 iuscemodī imposueris, breui id resiccat. Erysipelas autem
 in pulmone fit, vbi pulmo fuerit nimium resiccatus, id quod
 contingit ab ardore, & à febribus, & à labore, ac intemperie.
 Et quum superresiccatus fuerit, plurimum sanguinis in se **F**
 ipsum trahit, maxime quidē & plurimum ex magnis venis.
 Hæ enim ipsi vicinissimæ sunt, ac ipsi incumbunt. Trahit
 etiam ex aliis vicinis. Et tenuissimum ac debilissimū tra-
 hit. Postquam autem traxit, febris ex ipso fit acuta, & tussis
 sicca, & repletio in pectoribus, & dolor acutus in anteriori-
 bus ac posterioribus partibus, maxime circa spinā, nimirum
 magnis venis percalefactis: Et vomunt aliquando subcruen-
 tum, aliquādo liuidum. Vomunt item pituitam & bilem, &
 frequenter animo linquntur, propter sanguinis transmuta-
 tionem derepente cōtingentem: atq; hoc maximum signum
 est Erysipelatis in pulmone generati, & si assidua febris in-
 uasio contigerit. Huic si quidem duobus aut tribus aut qua-
 tuor ad summū diebus, id quod intus est diffusum fuerit ac
 transierit

**Pulmonis
 erysipelas.**

- A** transierit foras, plerunque sanus euadit. Si verò nō diffundatur ac foras transeat, intus putrescit, & suppuratus fit ac perit. Perit autē breui, utpote pulmone toto suppurato ac putrido. Si verò foras diffusum, intus veritatur & pulmonē corripit, huic nulla vitæ spes reliqua est. Quum enim antea resiccatus pulmo, traxerit in seipsum, non amplius dimittit, sed statim ab ardore, & siccitate, nihil amplius suscipit, nec; Pulmonis vomica. quicquam sursum distribuit, sed corrumpit. Tuberculum in pulmone fit hoc modo, quum pituita aut bilis coacta putrescit. Et quādiu quidē adhuc crudius fuerit, dolor ē exilcm, ac tussim siccam inducit. Postquam autē maturum factū fuerit, dolor & ante & retro acutus fit, & calores corripiunt, ac
- B** tussis vehemens. Et si quidē quā citissimē maturuerit, & Pulmonis vomicaquā dosanescat. eruperit, & pus sursum vertatur, ac totum expuatur, & ventriculus in quo fuerat pus, contrahatur ac resiccetur, penitus sanus euadet. Si verò ruptum quidē fuerit quā celerrimē, & maturatum, ac repurgatum, verū penitus resiccari non poterit, sed ipsum tuberculum à seipso pus produxerit, & à capite sanē tunc, itēque reliquo corpore pituita ad tuberculum defluens putrescit, & pus fit, ac expuitur, per quod homo perimitur. Perimitur autem à ventre fluente, ab his quæ antea relata sunt, & loquente ipso ac intelligēte omnes res, æquē ut in priori tempore, resiccatur ac perfrigeratur, conuiuentque venæ in corpore omnes, utpote sanguine ex ipsis à febre exusto: quādōque verò etiam præ temporis longi-
- C** tudine ac morbi magnitudine, tum malorum iam præsentium, tum eorum quæ insuper accedunt. Quod si multo tempore rumpi non possit, neque sua sponte, neque à medicamentis, cōsumitur debilitatus à doloribus vehementibus, & inedia, & tussi, & febribus, & ut plurimum perimitur. Si verò iam attenuato, & in lectum reclinato, pus eruperit, neque sic valde reualescunt, sed tali modo perimuntur. At si eruperit quidem quā celerrimē, & maturuerit, maturatum autē multa sui parte ad septum transuersum effundatur, statim quidem melius habere sibi videtur. Verū progressu temporis si quidē totum per sputum reiecerit, & ventriculus in quo pus inerat, confidat ac resiccetur, sanus euadit. Si verò & tempus longius protrahatur, & ipse debilior fiat, & per sputum reiicere nequeat, sed vltus fuerit aut se-

Hippocratis Liber I.

**Costarum
vomica.**

Ruptiones.

Etus, & pus exeat, statim quidem & sic melius habere sibi vi-
detur, verum tempore procedente perimitur ab iisdem quæ
prius relata sunt. Porro in latere fiunt tubercula, & à pi-
ruita & bile eadem ratione qua in pulmone. Fiunt etiam à
laboribus, quum vena aliqua tracta rupta fuerit, non tamen
penitus rupta, sed ita ut acutus tractus in ipsa factus sit. Si
quidem igitur rupta fuerit, statim sanguis è vena effusus pu-
rescit & suppuratur. Si verò acutus tractus in vena fiat, prin-
cipio quidem dolorẽ exhibet ac pulsatur: progressu verò tem-
poris distribuit vena sanguinem in carnẽ, atque hic in car-
ne putrescens, pus fit. Eodem modo & caro, si quidem ma-
gis doluerit, & sanguinis plus in seipsam trahit ex vicinissi-
mis venis, & statim suppuratur. Si verò minus doluerit, tar-
dius & trahit, & suppuratur. Quibusdam autem quum de-
biles facti fuerint tractus in carnibus, aut venis non suppu-
ratur, sed fiunt dolores diuturni, & vocantur Ruptiones. Et
quæ quidẽ in carne fiunt, hoc modo fiunt. Quum caro affli-
cta fuerit, aut conuulsa, aut percussa aut aliud quid perpeffa,
liuida velut antea dixi fit, non sincero sanguine, sed tenui &
aquoso, eoque modico. Quum autem plus solito fuerit re-
ficcata, percalefcit & dolorem exhibet, & à venis ac carnibus
vicinis humiditatem in seipsam trahit: & ubi nimium fuerit
humectata, atque ea ipsa humiditas ubi à carne fuerit super-
calefacta, per totũ corpus dispergitur, qualis est attracta, ma-
gis tamen in venas dispergitur quàm in carnes. Venæ enim
magis trahunt quàm carnes. Trahunt tamen etiã carnes. F
Quando verò ad multam in corpore humiditatem, modica
de carne attracta fuerit, obscura iam fit, & doloris exors, &
pro morbida cum tempore sana euadit. Si verò caro magis
fuerit percalefacta, & ampliorem humiditatem traxerit, do-
lorem exhibet: & ad quamcunque corporis partem ab ipsa
processerit ac firmata fuerit, dolorem inducit acutum, & ali-
qui putant ipsis ruptionem transmutatã esse, verum hoc fieri
non potest. Propinquissima verò vlceri sunt quæcunq; ta-
lia & alia. At humiditas de carne exiliit per venas, quum au-
tem percalefacta, & crassa, & copiosa facta fuerit, dolorem
exhibet, donec similis fiat reliquæ humiditati, in tenuitate
ac frigiditate. Quæcunque verò in venis fiunt, sic habent.
Ipsa quidem vena, in quantum tracta est, in loco manet.
Quum

A Quum autem tracta fuerit (trahitur autem ac conuellitur à Ve- labore & violentia) fit veluti varix. Percalescit autem & tra- hit in seipsam, liquidam quandam humiditatem, quæ est à bile ac pituita. Et vbi mixta fuerint sanguis & humiditas de carne, crassescit sanguis, & multipliciter ipse seipso, ea parte qua vena conuulsa est, & morbosior fit, & amplius stabilior. Et quum copiosior factus fuerit, plenitudo ipsa transmigrat, *πλήρωμα*. quocunque tandem contigerit, & dolorem inducit acutum, vt aliquibus videatur ruptio locum permutasse. Et si contigerit vt ad humerum transferatur, & grauitatem in manu inducit, & torporem ac segniciem. Et si quidem ad venam proruperit, aut ad humerum & dorsum tendat, dolor plerun- que statim quiescit. Fiunt porro conuulsiones & à labo- ribus, & lapsibus, & à plaga, & si quis onus maius leuet, & à curribus & lucta, & eiusmodi omnibus. Quicunque verò à *Purulentus vulnere.* vulneribus suppurati fiunt, aut ex hasta, aut pugione, aut iaculo, intrò sauciati fuerint, quandiu quidem habuerit vlcus respirationem foras, per antiquum vulnus, & hac parte frigidum in seipsum adducit, & calidum à seipso hac parte emit- tit, & sanè facile tum pus, tum si quid est aliud, expurgatur. Et si quidem & interna & externa pars simul fuerint sanatæ, sanus penitus homo euadit. Si verò externa quidem sanata fuerit, interna verò non, suppuratus fit. Et si etiam sanatæ si- mul sint interna ac externa pars, cicatrix autem intus debilis fiat, & aspera ac liuida, reulceratur quandoque, atque sic *C* suppuratus fit. Rursus exulceratur etiam si quid amplius la- borarit, & si attenuatus fuerit, & si pituita aut bilis ad cicatri- cem affixa fuerit, & si alio morbo correptus attenuatus fue- rit. Vbi verò vlcus factum fuerit, siue hoc modo, siue vbi ex- *Cur quan- doque vul- nus non co- alescat.* terna pars priusquam interna coaluit, dolorem acutum in- ducit, & tussim, & febrem: & frigiditatem ipsum sibi ipsi vl- cus inducit, eo quòd amplius calidum existat: & ipsum à se- ipso caliditatem efflat, & pus expurgatur, & per longius tem- pus curatur, & tardius sanescit: quandoque verò neque sane- scit. Nam caro, & vlcus, ab ardore qui est in corpore coqui- tur, & nimium humectatur, vt non possit neque siccari, ne- que carnem producere, neque sanari. Sed cum temporis pro- *Purulentus* gressu moritur, patiens talia quæ etiam prius dicta sunt. At alia de caus- *sa,* si contingat vt crassarum venarum aliqua saucietur, & san- *guis*

Hippocratis Liber I.

guis intro fluat ac putrescat, suppuratus fit. Et si quidem hoc **D**
pus totum per sputum reiectum fuerit, & vena fauciata co-
aluerit, & vlcus intus ac foris sanatum fuerit, penitus sanus
euadit. Si verò neque vlcus intus coalescere poterit, neq; ve-
na constringatur, sed alias atque alias sanguinem remittat.
Et si statim vomatur & spuatur, aut etià putrescat, & pus ex-
puatur, plerunque perimitur, aut statim sanguinem vomēs,
aut posteriori tempore, dum perit ab iisdem quæ antea dicta
sunt. Sæpe verò hi quibus venarum aliqua intus fauciatur à
vulneribus, aut quibusdam laboribus, aut exercitiis, aut alia
quadam causa, quū coaluerit & sana esse videtur vena alio
tempore iterum rumpitur, idq; ab iisdem contingit causis,
à quibus etiam prius patiebatur. Vbi verò iterum rupta est, **E**
sanguinem fundit, & statim pereunt sanguinem multum ac
sæpe vomentes (aut aliàs atq; aliàs sanguinem recentem vo-
munt) pus autem spuantes per omnē diem multum ac cras-
sum, tali aut consimili modo pereunt, velut etià in aliis mor-
bis dictum est. At verò in his ac similibus morbis multam
refert, quantum ad facilem ac difficilem curationem, vir sit
an mulier qui morbum habet, iuuenis an senex, & mulier iu-
uencula an anicula. Et præterea tempus à tempore differt, in
quo ægrotant. Interest item an ex alio morbo ægrotent, aut
non ex alio. Differt etiam affectus ab affectu, maior à mino-
re, & corpus à corpore, & curatio à curatione. His autem sic
inter se differentibus, necesse est etiam tempus diuturnita-
tis differre: & aliis longius fieri, aliis breuius: & alios perire, **F**
alios non: & morbos aliis durabiles esse & maiores, aliis mi-
nores & brevis temporis: aliis permanere vsque ad senectu-
tem & commori, aliàs perire ab ipsis breui. Et qui quidem iu-
niores patiuntur eas affectiones, quæ à laboribus fieri dictæ
sunt, hi & ampliores & vehementiores ipsas patiuntur, & ma-
gis quàm alij dolent, & statim in ipsis manifestæ fiunt, vt san-
guinem aut spuant, aut vomant. Sed & quædā fientia fallunt
ipsos, præ bona corporis habitudine. Seniores autē rarò qui-
dem patiuntur, & si patiantur, debiles ipsas perpetiuntur,
vtpote ipsi debiliores existentes, & remittunt magis ipsis, &
affectionum maiorem curam gerunt. Fiunt igitur ab initio
omnino minus seniori quàm iuniori, & vbi factæ fuerint,
seniori debiliores fiunt, iuniori vehementiores. Et iuniori
quidem,

**Diuersitas
varia.**

**Morborū
affectus di-
uersi.**

**Seniorum
& iuniorū
affectus.**

- A** quidem, utpote qui habet corporis vigorem & siccitatem, & carnem densam ac robustam & ad ipsa ossa assidentem, cute circum ipsam circumtenta: quum aliquid amplius laborarit, solito magis & derepente, convulsiones vehementes fiunt, & ruptiones multæ ac omnigenæ venarum ac carniū. Et horum aliqua statim manifesta fiunt, aliqua posteriore tempore comparent. At senioribus vigor fortis non inest, & carnes circum ossa dissiunt, & cutis circum carnes: & ipsa caro rara est ac debilis, & neq; tale quid pati possit similiter senior veluti iunior. Et si quid patiat, leuiter patitur, & statim manifestum redditur. Atq; intantum quidem in affectionum principio, iuniores senioribus difficilius liberantur.
- B** Quum verò morbus conspicuus factus fuerit, & aut pus, aut sanguinem, aut vtrunq; expuerint, qui quidem iuniores sunt, quum corpus ipsorum sit robustum ac densum, non æqualiter depurari possunt ab vlcerebus, quorum pus in superno ventriculo existit. Nam & pulmo non valde trahit ad arterias, *Pulmonis varietas.* ut qui densior sit: & arteriæ quum tenues & arctæ sint, pus non suscipiunt, nisi modicum & raro. Quare necesse est pus in thorace, & in vlcerebus coaceruari & crassum fieri. At seniori & pulmo rarior ac cauior est, & arteriæ ampliores, ut *Cur iuuenes magis quam senes afficiantur.* pus non diutius in ventriculo & vlcerebus moretur, & quicquid eius insuper generatum fuerit, hoc totum necessario sursum attrahitur à pulmone ad arterias, & statim expuitur. In iuniore igitur, utpote quum sint affectiones vehementiores, & purgatio pro spuri ratione non fiat, & febres acutiores & frequentiores fiunt, & dolores acuti incidunt, tum in ipso affectionis loco, tum in reliquo corpore: nimirum quum venæ sint robustæ ac sanguine plenæ. Vbi verò hæ percalescunt, dolores ab ipsis transiliunt alias ad aliam corporis partem. Achi quidem plerumque breui perimuntur. Senioribus verò quum affectiones sint debiliores, & sputum ab ipsis purgetur, & febres mitiores, ac paucae fiunt, & dolores adsunt quidem, verum exiles. Et ab huiusmodi affectionibus ne senes quidem penitus liberantur, sed longo tempore afflicti per-eunt. Et aliquando pus spuunt, quandoque sanguinem, quandoque neutrum, tandemque cum his moriuntur. Moriuntur autem hoc modo, quum ipsos morbus aliquis huic quem antea habent consimilis apprehendit, ita ut & hunc habeant, & is quem

Hippocratis Liber I.

Morbi periculosi.

is quem prius habent vehementior fiat : & ut plurimum per-
eunt. At verò morbi qui hos morbos efficiunt, maxime sunt
pleuritis & peripneumonia. Febris porro ab his fit. Quum
bilis aut pituita calefacta fuerit, totum reliquum corpus ab
his calefcit, & vocatur hoc febris. Calefcit autem bilis & pi-
tuita, intrinsecus quidem à cibis & potibus, à quibus etiam
nutritur ac augetur. Extrinsecus autem à laboribus ac vul-
neribus, & à calido nimium calefaciente, & à frigido nimium

Morborum frigus vnde.

frigefaciente. Calefcit item à visu & auditu, Verum mini-
mum ab his. Rigor autem in morbis fit quidem & ab exter-
nis, ventis, aqua, serenitate, & aliis huiusmodi. Fit autem &
ab ingestis cibis ac potibus. Maxime verò & vehementior
fit, quum bilis & pituita sanguini fuerint permixta, aut alte-
ra ex his, aut utraque. Magis tamen si pituita sola permixta

Pituita frigida, calidus sanguis.

fuerit. Est enim pituita frigidissima ex natura. Calidissimus
autem sanguis. Frigidior est etiam aliquanto bilis sanguine.

Quum igitur hi humores ambo, aut alter solum, permixti
fuerint ad sanguinem, ipsum congelant, non tamen omnino.

Neque enim vivere posset homo, si sanguis densior & frigi-
dior seipso multis modis fieret. Frigefcente igitur sangui-
ne, necesse est & reliquum totum corpus perfrigerari, & ubi

Rigor.

huiusmodi quid factum fuerit, rigor appellatur. Et si quidem
vehemens fiat rigor, vehementior est etiam tremor. Nam
dum contrahuntur venæ, sanguine & coacto & congelato,
corpus & contrahunt & tremere faciunt. Si verò minus ali-

Horror.

quanto sanguinis coactio fiat, hoc rigor appellatur. Horror
autem dicitur debilissimus rigor. Quod autem post rigo-
rem necessario corripiat febris, aut maior, aut minor, sic ha-
bet. Quum sanguis percaluerit, & vim depulerit, ac rursus
ad suam naturam redierit, concalescit simul & pituita, & bi-

Fervor.

lis sanguini permixta. Et sanguis ipse seipso multipliciter ca-
lidior euadit. His igitur percalefactis, necesse est febrem suc-

Sudor.

cedere post rigorem, præ sanguinis caliditate. Sudor verò
fit hac de causa. Quicumque morbi in iudicatoriis diebus in-
dicantur, & febrilis ignis dimittit, in his de pituita & bile
quod tenuissimum est eliquatur & secernitur, & secedit par-
tim extra corpus, partim intus & isthic in corpore relinqui-
tur, partim præ caliditate attenuatur, & vapor fit, & cum spi-
ritu permixtum foras procedit. Atque hæc quidem huiusmodi

sunt.

A sunt, & ab his sudor generatur. Quare verò quandoque calidus, quandoque frigidus est, ita cōtingit. Calidus quidem de percalefacto malo, & exusto, & attenuato, & debili, & non valde multo secernitur, & necesse est ipsum calidiorem corpore excerni. Frigidus autē de ampliore malo secernitur, & de eo quod reliquum est & adhuc validum, & nondum putrefactum, neque attenuatum, neq; exustum, & frigidior ac crassior & graueolentior prodit. Manifestum autem hoc ex hac re fit. Qui frigidum sudorem exudant, è longis morbis plerunque ægrotant, inualeſcente malo eo quod in corpore relinquitur. Qui verò calidum sudorem excludunt, citius à morbis liberantur. **Pleuritis & peripneumonia fiunt hoc modo.** Pleuritis quidē, quum potiones aceruatę & fortes valde corripunt. Percaleſcit enim totum corpus ac humectatur à vino. Maximè autem & bilis & pituita percaleſcit ac humectatur. Et sanè his commotis ac humectatis, continget vt rigor inuadat ebrium siue ſobrium. Et cūm latus natura carne nudum ſit, præ omnibus corporis partibus: & non ſit quicquam in ipſo quod renitatur, præter ventriculi cavitatē: maximè rigorem percipit. Et cūm riguerit ac perfrigeratum fuerit, tum caro quę est in latere, tum venę, contrahuntur ac conuelluntur. Et quantum in ipſa carne ineſt bilis ac pituita, aut in venis quę in ipſa carne ſunt, id magna ex parte aut totum ſecernitur, intrōq; compellitur ad caliditatem, carne extrinſecus condensata: atq; id ad latus affigitur, & dolorem vehemētem exhibet, & percaleſcit: & per caliditatem trahit ad ſeipſum, à vicinis venis ac carnibus, pituitam ac bilē. Atq; hoc sanè modo ſit, vbi verò ad latus affixa putruerint, & per ſputum reiecta fuerint, ſani fiunt. Si verò & antiquum multum affixū fuerit ad latus, & aliud inſuper acceſſerit, ſtatim pereunt, præ ſaliuę copia expuere nequeunt: aut ſuppurati fiunt, & partim pereunt, partim euadunt. Indiciū autē hæc de ſe præbent in ſeptem diebus, aut nouem, aut vndecim, aut quatuordecim: dolorem quoq; inducunt ad humerum, & ad clauiculam, & ad alas, hæc de cauſſa. Vena quę ſplenitis appellatur, tendit à ſplene ad latus, à latere verò ad humerum & ſiniſtram manum. Hepatitis autem ad dexterās partes eodem modo: & quum huius in latere pars à rigore contracta fuerit, & ſanguis in ipſa horruerit, ad alas & clauiculā ac humerum.

Calidus frigidusve cur.

Pleuritis, peripneumonia.

Vena splenitis.

Peripneu-
monia quā
fiat.

merum concedit, & conuellit ac dolorem inducit. Eodem modo & loci circa dorsum: ab affixo ad latus humore pituitæ ac bilis percalescant: & quandoque dolorem locis infra latus exhibent. Sæpe verò si ad infernas partes cōuertatur, dolorem per venas ad vesicam distribuit, multumque ac biliosum æger mingit. Arbitrantur autem huius morbi causam ac principium rigorem esse. Peripneumonia fit quum commota ac calefacta pituita ac bile, pulmo præ caliditate traxerit in seipsum de vicinis locis, ad ea quæ iam sunt in ipso. Et percalfacit quidem totum corpus ac dolorem exhibet, maxime autem dorso, & costis, & humeris, ac spinæ, nimirum ab his in seipsum attrahens plurimam humiditatem, & superexiccantur hæ partes, & nimium calefcunt. Postquam autem E attraxit in seipsum, & tum bilis, tum pituita, sedē in pulmone occupauit, putrescit ac suppuratur. Et si quidem in diebus iudicatoriis putrefacta per sputum reiecta fuerint, æger superstes euadit. Si verò & ea quæ ab initio aduenerunt susceperit, & alia insuper accesserint, & neque spuens, neque putrefaciens superarit, præ copia eorum, quæ insuper accedunt, ut plurimum moriuntur. Si verò ad dies perueniant duos & viginti, & febris remittat, & in his per sputum purgati non fuerint, suppurati fiunt. Flunt autem maxime ex his, quibus & pleuritis & peripneumonia vehementissima existit. Fit autem & peripneumonia & pleuritis sine sputo, ambe ex eadem causa præ siccitate. Siccant autem & calida, ubi nimium calfaciunt: & frigida, ubi nimium frigefaciunt. Congelatur F autem latus, & quæ sunt in ipso venæ, & cōuellitur, & quantum in ipso inest pituitæ aut bilis, id à caliditate resiccatur, & dolorem inducit, & à dolore febrem. Huic venam secare, cōducit in manu splenitidem appellatam, aut hepatitidem, iuxta vtram sanè fuerit morbus. Atque sic dolor mollior fit, & lateris, & aliarum partium. Nam vena & quātum in ipsa inest bilis ac pituitæ, & ipsius sanguinis agrotantis vnà cum his magnam partem foras dimittit. Pars verò ex carne per medicamenta & potiones diffunditur, & à calefactoriis forinsecus adhibitis, ita ut morbus per totum corpus dispergatur. Vocatur autem hæc pleuritis sine sputo. Peripneumonia verò quum pulmo etiam ipse superexiccatus fuerit, & quantum in ipso inest bilis aut pituitæ, neque putrefacit æquali

Splenitis
• hepatitis;
vena.

Aequaliter, neque per sputum reddit: & quantum in ipso est humiditatis, aut à potu, aut à sorbitione, aut à vicinis locis, hoc totum exurit, præ nimia siccitate ac caliditate. Huic potiones bibere conducit, à quibus pulmo humectatur, ac sputum reiecit. Si enim sputum non reiecerit, & durior fit, & coarcescit, & hominem perimit. Febris ardens corripit magis *ναύσος*. biliosos, corripit item pituitosos. Corripit autem hoc modo. Quum bilis commota fuerit per corpus, & contigerit ut venæ & sanguis attrahant bilem, eamque plurimam ex carnibus ac vetriculo, ad eum qui prius inest, utpote quum etiam natura calidissimus sanguis in corpore existat. Cum itaque percaluerit ex carnibus & vetriculo, supra eum qui iam inest, adhuc magis à bile, percalfacit etiam reliquum corpus. Et quædam sanè partes præ multa humiditate, penitus resicari non possunt. Si verò resiccatae fuerint, homo moritur. Extremæ verò corporis partes, utpote natura sicca, resiccantur, & plurima humiditas ex ipsis exurit, & si ipsas continere velis, frigidas comperies ac siccas. Quapropter hi qui à febre ardente corripiuntur, internis quidem partibus à febre exuruntur, externis autem frigidi sunt. Et lingua ac fauces ab interno spiritu ac caliditate exasperantur & arescunt. Quantum autem in vetriculo & in vesica inest bilis, quod quidem in vetriculo est, aliquando, deorsum exturbatur. plerunque verò in primis diebus vomitur, aut in quatuor aut quinque. Vomitur autem hac de causa. Quum supernus ventriculus *Causa vomitionis* supercalfactus fuerit, attrahit in seipsum, & fit vomitus. Et *quæ.* ob hoc ipsum etiam ex febre ardente, & ex pleuritide, ad peripneumoniam maximè morbi trāsmutantur. Vbi enim supernus ventriculus supercalfactus fuerit, trahit in seipsum, & suscipit pulmo, & fit peripneumonia: & plerunq; pereunt, nimirum debiles iam existētes, & morbo alio nouo insuper generato, dies transigere nequeunt, donec sputum in pulmone concoquatur. Verum ut plurimum pereunt præ debilitate. Aliqui tamen euadunt. At quibus in vesicam confluit *Crassum locum cur.* quid bilis, his crassa vrina mingitur, crassa autem à pituita. Biliosa verò alui egestio prodit, eo quòd combusta sint ea quæ sunt in ventre. Phrenitis hoc modo se habet. Sanguis *Phrenitis* qui est in homine, maximam partem ad prudentiam con- *quæ fiat.* fert. quidam dicunt totum. Quum igitur bilis commota ad

v

venas

venas & ad sanguinem ingressa fuerit, sanguinem ex con- **D**
 sueta compage ac motione dimouet, & ferosum facit, ac cal-
 facit. Calefactus autem, etiam reliquum corpus totum per-
 calefacit, & desipit homo, & non sibi constat, præ febris co-
 pia, & sanguinis ad ferocitatem transmutatione, & motione
 non solita cōtingente. Assimiles autem sunt maximè hi qui
 phrenitide tenentur, his qui ab atra bile delirant. Nam & hi
 ubi sanguis ex bile & pituita corruptus fuerit, morbum ha-
 bent, & dementes fiunt. Aliqui verò etiam insaniunt. Et qui
 phrenitide correpti sunt eodè modo. Tanto autem minor
 insania ipsūque delirium sit, quāto paucior ac debilior est

Sputū sub
 cruentū &
 liuidū cur.

bilis quā pituita. Porro subcruentum & liuidum est spu- **E**
 tum in pleuritide ac peripneumonia, idque ob hāc causam.

Principiò quidem plerumque neutrum spuunt, neque liui-
 dum, neque subcruentum. vnde nosse conuenit morbum ve-
 hementem esse. Quum autem sputum subcrassum spueri
 cœperint, tunc maximè purgantur. Spuitur autem id à di-
 stictione venarum, in pleuritide quidem earum quæ sunt in
 latere, in peripneumonia verò earum quæ sunt in pulmone:
 & caliditatē ad seipsam affectio trahit. Si verò ægro abscef-
 sus fuerit ruptus, & purulentus fuerit, prima mox die sangui-

Liuidū spu-
 tū sanguis
 fit.

Peripneu-
 monia quā
 do necat.

nem, & pus subcruentum ac liuidum cum salua spuit. Liui-
 dum autē sit à sanguine, si modicus ad multam saluam am-
 mixtus fuerit, & nō statim spuatur, sed semiputrefactum &
 effœminatum in corpore manet. Moriuntur autem ex pleu- **F**
 ritide, ubi & multum pituitæ ac bilis ab initio lateri fuerit
 affixum, & multum insuper ex reliquo corpore effluxerit, &
 neque spuens, neque putrefaciens superarit, præ materiæ af-
 fluentis copia. Implentur autem arteriæ ab his quæ insunt,
 pituita ac pure. Deinde stertit, & frequenter, & illinc statim
 respirat. tandem verò omnia obturātur, & moritur. Eodem

Febris ar-
 dens quan-
 do perimat

modo ex peripneumonia pereunt. Quicunque verò ex febre
 ardente moriuntur, omnes præ siccitate moriuntur. Et resic-
 cantur primū quidem extremæ ipsorum partes, manus ac
 pedes. Deinde partes sicciore. Vbi autem humiditas ex cor-
 pore penitus fuerit exulta ac resiccata, sanguis quidem con-

Phrenetici
 quomodo
 pereunt.

gelatur penitus ac perfrigeratur. Reliquum verò corpus
 exsiccatur, ac sic homo moritur. At ex phrenitide ita pe-
 rit. Desipiunt in hoc morbo semper, nimirum sanguine cor-
 rupto,

A rupto, & ex consueta motione emoto, & quum desipiant, nihil eorum quæ ipsis exhibentur accipiunt, quod saltem memoratu dignum sit. Quum verò progressum fuerit tempus, marcescunt ac imminuti consumuntur, tum ex febre, tum quòd nihil alantur. Et primùm quidem extremæ partes cōsumuntur ac perfrigerantur. Deinde ipsis proximæ. Sed & frigiditatis, & febris, & dolorum principium hoc habet. Quum sanguis qui est in venis perfrigeratus fuerit à pituita, transmutatur & conuellitur aceruatim aliàs alia parte, & tremit. Tandem verò omnia perfrigerantur, & moritur.

H I P P O C R A T I S
B COI DE MORBIS LIBER
 SECUNDVS, IANO CORNARIO MEDICO PHY-
 SICO INTERPRETE.

*



C **M**ULTVM vrinæ emittitur vbi caput nimium. Cum quis incaluerit. Liquefcit enim in ipso pituita, multum liquefcens autem secedit partim ad nares, meit. partim ad os, partim per venas quæ ducunt ad pudendum. Quum autem ad pudendum peruenerit, mingit homo & patitur quemadmodum ab vrinæ stillicidio. Cæcutiunt autē quum ad venas in oculis peruenerit pituita, Aquosior enim fit visus & turbulentior, & splendor in oculis non similiter splendidus est, neq; in ipso cōparet si videre voluerit, similiter sicut antequum splendidus & purus esset. Hic in quadraginta diebus maximè sanatur. Si verò longo tempore postea morbus reuertatur, cutis capitis crassescit, & reliquum corpus attollitur, & crassescit, ac bonū colorem habet. Hæc pituita ad carnes conuertitur, & ab hac crassus esse videtur. Nam carnes quum sint perrigatæ & eleuatæ ac rariores, sanguinè ex venis trahunt, & propterea bene colorati esse videntur. Alius

Quis visus
hebetetur.

Hippocratis Liber I I.

**Pustulariū
capitis ori-
go.**

**Caput cur
doleret.**

**Malum ex
bono non
fit.**

**Tinnitus
auriū unde**

morbus. Caput vlcerebus impletur, & corpus intumescit, & D
color morbi regij est, & aliās alia corporis parte vlcera erū-
punt: & febris aliās atq; aliās corripit, & ex dorso aqua fluit.
Huic quum in capite pituita subbiliosa connutrita fuerit, vl-
cera fiunt vbi sinciput pituita & bile perrigatū fuerit, & vbi
pituita rara & aceruata fuerit, itēque bilis. Hæc enim con-
sistit, putrescit, & exulceratur. Attenuata verò pituita ad au-
res penetrant. At in reliquo corpore vlcera eadem ratione
qua in capite fiunt, sanguine & bile putrefactis quacunq; in
parte fuerint collecta. Hæc enim parte caro putrescit & exul-
ceratur, & accedentem pituitam ac bilem insuper putrefa-
cit, & fit pus. Alius morbus. Dolor circum circa caput vexat,
& vomit bilem, & difficulter mingit, & desipit. Hic caput E
quidem dolet, præ nimia eius calefactione. Desipit autem
quum sanguis in capite à bile aut pituita fuerit calefactus,
& plus solito commotus. Vomit autem bilem, vtpote com-
mota ipsa in corpore. Et caput præ caliditate trahit in seip-
sum, & crassissimum quidem vomit, tenuissimum verò in
seipsum trahit, Mingit autem & in hoc morbo ab iisdem, ve-
lut etiam in superiore dictum est. Alius morbus. Si circa ce-
rebrum venulæ supereuomant, nomen quidem rectum mor-
bo non est. Neq; enim fieri potest vt aliqua vena, siue parua,
siue magna supereuomat. Nominant tamē & dicunt super-
uomitum. Si verò etiam quàm maximè supereuomant mor-
bum ab hoc ipso fieri nō est verisimile. Nam à bono malum
fieri non potest, neq; à malo vtiq; bonum fiat. Neque rursus F
bonum plus iusto fieri potest. Verum supereuomere viden-
tur, quum ad venas bilis aut pituita ingressa fuerit. Eleuan-
tur enim venæ & pulsant, & dolor per totum caput dispergi-
tur, & aures sonitum percipiūt ac nihil audiunt. Et sonitum
quidem percipiunt, vtpote venis pulsantibus & palpitanti-
bus. Tunc enim sonitus est in capite. Grauius autem audiūt,
partim præ interno strepitu ac sonitu, partim quum cerebrū
& venæ circa ipsum eleuantur. Præ nimia enim caliditate,
vacuam circa aurem partem cerebrum de seipso implet: &
quum æqualis aeris copia nō insit, velut priore tempore, ne-
que æqualem sonum exhibeat, ea quæ dicuntur non æquali-
ter se imprimunt, atq; ex hoc grauem auditum habent. Hic
si quidem erumpat ipsi ad nares, aut ad os aqua & pituita, sa-
nus

A nus fit. Si verò nō erumpat, septima die maximè moritur. At si in capite venæ supereuomant, id quod ab iisdem fit quæ & prius relata sunt. Signū verò quòd tali modo supereuomat hoc est. Quum quis aut manū, aut caput, aut aliam quādam corporis partem, hoc patientem incidat, sanguis niger profluit, & turbatus ac morbosus: quanquam neque sanguis nominari iuste mereatur, nisi tūc quū rubicundus ac sincerus fluit. Quum itaq; supereuomant ab iisdem causis, dolor & vertigo, & grauitas caput occupant. Dolor quidē, præ nimia sanguinis caliditate. Vertigo verò, quū acruatus ad faciem processerit sanguis. Grauitas autem, quòd copiosior sanguis fit in capite, & turbulentior ac morbosior, quā intrinsecus.

Signū venularum cerebri id efficientium.

Vertigo, grauitas.

B

Cerebri corruptio.

SI cerebrum corruptū fuerit, dolor ex capite spinam occupat, & ad cor animi deliquium procedit, & sudor adest, & somni expers est, & ex naribus sanguis fluit. Sæpe etiam sanguinem vomit. Corruptitur autē cerebrum tali modo, quū aut nimium calefactus aut perfrigeratus, biliosus aut pituitosus plus solito factus fuerit. Vbi verò horum aliquid perpessus fuerit, etiam spinalem medullā supercalefacit. Et quum etiam hic percalefcit, dolorē spinæ inducit. Animo verò linquitur homo, quum pituita aut bilis ad cor consistit. Cōsistere autē necesse est cōmotis ac humectatis. Sudor autē fit præ dolore. Sanguinē verò vomit, quum venæ quæ sunt in capite, à cerebro fuerint calefactæ: quæ verò circa spinam sunt, à spina, spina autē à spinali medulla. Medulla verò à cerebro, vnde sanè originē trahit. Quum igitur calefactæ fuerint venæ, & sanguis in ipsis efferbuerit, quæ quidē in capite sunt, venæ, distribuūt ipsum ad nares, & ad os: quæ verò circa spinā sanguifluæ, in corpus. Hic tertia aut quinta die plerūq; perit.

Alius morbus. Derepente dolor occupat caput, & statim vox intercipitur ac sui impotens fit. Hic in septē diebus moritur, si nō febris inuaserit. Si enim hæc inuaserit, sanus euadit. Patitur autē hæc, quum atra bilis ipsi in capite commota fluxerit, maximè in partē in qua plurimæ sunt venæ, in collū in quā, ac pectus. Deinde postridie sideratus fit ac impotens, sanguine nimium perfrigerato. Et si superior euaserit, ita vt sanguis caleseat, siue ab his quæ exhibentur, siue à seipso, at-

Dolor capitis qui vocem intercipit.

Hippocratis Liber I I.

tollitur & diffunditur ac mouetur, & spirationem inducit, & D
spumescit, & à bile separatur, & sanus euadit. Si verò supe-
rior non euaserit, adhuc magis perfrigeratur: & vbi penitus
perfrigeratus fuerit, & calor ex ipso defecerit, congelatur, &
Temulētia moueri non potest, sed moritur. At si ex ebrietatibus hæc pa-
hoc & ipsa tiatur (nam & hoc contingit) itidem moritur.
facit.

Caries ossis capitis.

QUum caries facta fuerit in osse, dolor ex osse corripit.
Temporis autem progressu cutis de capite alia atque
alia parte discedit. Talia verò patitur is cui in secunda ossis
lamina, pituita superueniens resiccata fuerit. Hac enim par-
te rarum fit, & omnis humiditas ex ipso deficit, & quia ari- E
dum est, cutis ab ipso discedit. Hic morbus lethalis non est.

Capitis stu- Alius morbus. Si sideratus fiat, anteriorem capitis partem
por. dolet, & oculis non æqualiter videt, & soporatur, & venæ pul-
sant, & febris debilis tenet, & corporis impotentia. Hic pa-
titur hæc, quum venæ in capite fuerint calefactæ, & calefa-
ctæ pituitam in seipsas traxerint. Et principium quidem mor-
bi ex hoc fit. Anteriorem verò capitis partem ideo dolet, quod
venæ in hac sint crassissimæ, & cerebrum ad anteriorem ca-
pitis partem magis situm est quam ad posteriorem. Et ocu-
lis ideo non videt, procumbente eo cerebro ac inflammato.
Impotentia verò ideo corpus occupant. Postquam venæ pi-
tuitam in seipsas traxerint, necesse est præ pituitæ frigidita-
te, sanguinem magis nunc sisti ac perfrigeratum esse quam F
priori tempore. dum autem sanguis non mouetur, fieri non
potest, ut non etiam corpus quiescat ac torpeat. Et si quidem
sanguis ac reliquum corpus superarint, ita ut calescant, ho-
mo euadit. Si verò pituita præualuerit, sanguis magis perfri-
geratur ac congelatur. Et si frigiditas ac congelatio auge-
scant, penitus cōgelascit ac perfrigeratur homo, & moritur.

Angina.

ANgina siue cynanche fit, quum pituita in capite com-
mota aceruatim deorsum fluxerit, & in maxillis ac cir-
ca collum constiterit. Hic neque saliuam deglutire potest,
respirat autem violenter ac stertit, & aliquando etiam febris
ipsum corripit. Et morbus sanè ex hac causa fit, & aliquan-
do sub ipsam linguam, aliquando paululum supra pectus.

Vua

A

Una morbus.

Vva fit quum pituita de capite ad gurgulionem descenderit, & gurgulio præceps dependet, ac fit rubicundus. Temporis autem progressu, nigrescit. Nigrescit autem hoc modo. Venosus est gurgulio ac crassus, & postquam inflammatus est, calescit: & præ caliditate sanguinem ex vena adtrahit, ac ab ipso nigrescit. Quapropter si non turgentem feces, statim inflammantur. Nam vena calefacit, & præ caliditate partes circa gurgulionem sanguine replet, & breui suffocantur.

Tonsilla ac vicina partes.

B Tonsillæ, & partes sub lingua, & gingivæ, & lingua, & quæcunque huiusmodi hoc loco consistunt: hæc omnes partes ex pituita ægrotant. Pituita autem de capite descendit. Caput autem ex corpore trahit. Trahit autem ubi fuerit calefactum, percalefcit autem à cibis, & sole, & frigore, & laboribus ac febrili calore. Quum verò calefactum fuerit, tenuissimum ex corpore ad seipsum trahit, Vbi verò traxerit, rursus id ad corpus descendit.

Morbi à capite fientes.

Quum repletum fuerit caput, & ab aliquo ex relatis percalefactum, torpor caput tenet, & frequenter mingit, & alia patitur quæ ex urinæ stillicidio contingere solent. Idem per novem dies hæc patitur. Et si quidē per nares aut aures, Capitis torpor narcēve.

Caqua & mucus erumpat, à morbo liberatur, & urinæ stillicidium sedatur, mingitq; citra dolorem, urinā multā, & albā, ad vigintidies. Et dolor capitis cessat, & intuenti splendor ex oculis subtrahitur, & dimidiatas rerū facies se videre putat. Hic quadragesima die penitus sanus euadit. Multis verò quandoque morbus redit, septimo aut decimoquarto anno. Et capitis cutis ipsi crassescit, & ad tactum cedit, & de paucis cibis tener ac bene coloratus apparet, & non acutum auditum Strāguria.
habet. Quum ita habentem offenderis in principio morbi, priusquam erūpat aqua per nares & aures, & tenuerit ipsum dolor: derafo capite utrem coriaceum circum frontem deligare oportet, aqua plenum calidissima, quantum sustinere potest, atque hinc ipsum calefieri permittere, & ubi perfrigeratus fuerit, alium adhibere. Si verò hinc debilitetur, desistere: Medela quæ.

V 4

tempore

Hippocratis Liber I I.

tempore interposito eadem repetere, donec remiserit dolor. **D**
 Et si alius non egerat, infusum per clysterem immittere, &
 vrinam cientibus in potu datis, aquam mulsam aquosam in-
 super bibendā exhibere. & calore quā maximē foueatur.
 Sorbeat autem succum ptisanæ tenuem. Si verò venter non
 subeat, mercurialem in aqua coctā terito, ac succum excola-
 to, & de ipso, ac de ptisanæ succo, parem mēsuram permisce-
 ro, & modicum mellis adiiçito. Hunc succum ter in die sor-
 beat, & vinum mellei coloris, aquosum, album modicum, à
 sorbitione insuper bibat. Postquam autem eruperit ipsi per
 nares mucoſa, & vrinam crassam eiecerit, & à dolore capitis
 liberatus fuerit, vtre amplius ne vtatur, sed multa calida lo-
 tus, vrinā cientia, & aquam mulsam aquosam bibat. Et pri- **E**
 mis quidem diebus milium delingat, & cucurbitā edat, aut
 betas per triduum. Deinde cibus vtatur mollissimis ac quam
 maximē per aluum subeuntibus, ita vt semper modicum ad
 cibos priores addat. At vbi quadraginta dies præterierint (se-
 datur enim morbus maximē in tanto tempore) capite ipsius
 purgato, prius medicamento exhibito, ipsum deorsum pur-
 gato, si tempus anni hoc permittat. Deinde serum ad dies
 septem bibendum dato, aut pauciores, si debilis existat. Si ve-
 rò morbus reuertatur, fomento per totum corpus adhibito,
 postridie veratrum bibendū dato. Deinde quanto tempore
 tibi visum fuerit intermittito, & tunc capite purgato, me-
 dicamento deorsum purgante exhibito, crustas octo capiti
 inurito. duas circa aures, duas in occipitio. hinc atque hinc **F**
 ad ceruicis neruum, duas in naso circa angulos oculorū. Ve-
 næ autem circa aures vrendæ sunt, donec pulsare desinant.
 Ferramētis verò cuneoli forma paratis obliquas venas per-
 urito. Atque hæc vbi feceris, sanitas continget. Alius mor-
 bus. Vlceribus impletur caput, & crura intumescunt, ve-
 lut ab aquæ potu, & in tibiis tumor infarcitur, & si premas,
 color morbi regij apparet, & vlcera aliàs alia corporis parte
 erumpunt, maximē tamen circa tibiis, & malum aspectum
 præ se ferunt. Vbi verò inflammatione liberata sunt, cito
 sana fiunt. & febris aliàs atque aliàs corripit. Caput autem
 semper calidum est, & ex auribus aqua fluit. Quum ita ha-
 bet, medicamētum ei dandum est, à quo pituita & bilis sur-
 sum purgatur, si quidē frigus fuerit, præfoto ac calida loto.
 Deinde

Caput vl-
ceratur.

Medela
quæ.

A Deinde tribus diebus interpositis caput purgato. Postea etiā deorsum purgans medicamentum bibendum dato. Si verò tempus anni ferat, etiam serum postea bibat. Sin minus, lac asininum. Post purgationes cibis quā paucissimis, & quā maximè per aluum subeuntibus vtatur, & non lauet. Si verò caput exulceratur, fecem vini ad smegma faciendū comburito, & glandis corticem tritum leuigatum ammisceto. & pari nitro ammixto, his defricus multa calida lauetur. Inungat autem caput baccis lauri tritis, & gallis, & myrrha, & thure, & argenti flore, adipéque suillo ac oleo laurino.

His permixtis inungatur. Post hoc autem tempus vomitibus vtatur bis in mense, & exerceat se ac calida lauet. At si **B** his adhibitis, ex reliquo quidem corpore morbus fuerit exclusus, verū in capite ipsi vlcera adhuc fiant, rursus capite purgato, medicamentum deorsum purgans postea bibendum dato. Deinde raso capite, fissuras raras incutito, & vbi sanguis effluerit confricato. Postea lanas succidas vino imbutas superligato, & postquam exolueris, spongia detergito, & ne humectato. Deinde oleo sublito cupressum inspergito. Laneis autem deligamentis donec sanus fiat vtatur.

Si morbus repullulet quid agendum.

Alius morbus. Dolor caput corripit, & si paululum moueatur, bilem vomit. Quandoque etiam vrinam difficulter emittit, ac desipit, & septima die quandoque moritur: & nona quoque ac vndecima, septimam transgressus, si non eruperit per nares aut aures. Si verò eruperit, euadit. Fluit autem aqua subbiliosa. Deinde temporis progressu putrefacta pus fit. Quum igitur ita habuerit, quandiu quidem dolor tenuerit in principio, priusquam ex naribus ac auribus erumpat, spongas aqua calida imbutas cito capiti admovento. Si verò his non laxetur, vtre vtaris eodem modo velut in superiore morbo. Bibat autē aquam mulsam aquosam. Sin minus, aquam de farina crassa in ipsa macerata.

Curatio.

Sorbeat ptisanæ quoque succum, & vinum albū aquosum insuper bibat. Postquam verò per aures eruperit, & febris ac dolor remiserit, cibis vtatur per aluum subeuntibus, à modicis initio facto, semper aliquid addēdo. Et caput calida lauetur: & aures colluat aqua pura, & spongiā melle tinctam indat. Si verò neque sic resiccetur, sed diuturna fluxio fiat, collutione facta, argenti florem, sandaracham, cerusam

singula

v s

Hippocratis Liber I I.

singula æquis portionibus trita leuigatâque in aurẽ indito, D
eâmq̃ expleto, & si quid præterlabatur, de medicamento
amplius superaddito. Vbi verò resiccata fuerit auris, expur-
gato ac medicamentũ eluito. Postea (obsurdescit enim pri-
mum resiccata) lenibus fomentis aures foueto. Nã & sic vix
ac longo tempore sedabitur. Moriuntur autem etiã, si dolor
in aure fuerit, & nihil in septem diebus eruperit. Hunc mul-
ta calida lauato, & spongas aqua calida imbutas exprime,
& tepidas ad aurem appone. Si verò neque sic erumpat, auri
fomentum adhibeto. Sorbitionibus autem ac porionibus

Cerebri iisdem vtatur quibus in superioribus. Alius morbus. Si
madētis si- aqua in cerebro fuerit, dolor acutus per sinciput ac tempora
gna. emergit, aliàs alio loco: & rigor ac febris aliàs atque aliàs, & E

Medela
quæ.

regiones oculorum dolet, & cæcutit, & pupilla finditur, & ex
vno duo se videre putat, & si surrexerit, vertigo ipsum corri-
pit, & ventum nõ sustinet, neq; solem: & aures tinniũt, ac in-
ter audiendũ strepitu offenditur, & vomit saliuam ac pitui-
tam, quãdoq; etiam cibos: & capitis cutis attenuatur, & con-
tactu gaudet. Quum sic habuerit, primũ dandum est ipsi
medicamentum quod sursum pituitã educit, & postea caput
purgato. Deinde interposito tempore medicamentum deor-
sum purgans bibendum dato. Postea cibus quàm maximè
aluum subeuntibus ipsum resicito, semper modica adden-
do. Postquam verò comederit iam cibos sufficientes, vomiti-
bus ieiunus vtatur, lenticulæ decocto mel & acetum miscēs,
& olera antea comedēs: & in die illa qua vomuerit, primũ F
cyceonem bibat tenuem, postea ad vesperam cibus modicis
vtatur, & non lauet. & à cibus deambulet, itẽmq̃ mane, vi-
rans ventum ac solem, & ad ignem ne accedat. Et si quidem
taliam faciens, sanus fiat, bene est. Sin minus, vere vbi ipsum
prius purgaris primũ veratro, postea etiã in nares medi-
camentum infundito, & paucotẽpore interposito deorsum
purgato, Deinde cibus resicito. Postea inciso capite iuxta sin-
ciput, ad cerebrum vsq; perforato, & veluti sectionẽ ac per-
forationem curato. Alius morbus. Rigor, dolor, & febris
per caput, maximè ad aurem, & ad tempora, & ad sinciput, &
oculorum regiones dolet, & supercilia ipsi incumbere viden-
tur, & grauitas caput detinet, & si quis ipsum mouerit min-
get, & multum ac facilè mingit. & dentes torpent, & stupor
iplos

Capitis a-
lius mor-
bus.

- A** ipsos tenet, & venæ attolluntur ac pulsant in capite, & non potest quietus esse, sed anxius est ac desipit præ dolore. Huic si quidem per nares aut aures eruperit, aqua profuit subpurulenta, & sanus euadit. Sin minus, plerunque in septem diebus moritur. Hic morbus maximè fit ex febre lipyria, quū liberatus à febre, nondum purgatus, aut cibis se impleuerit, **Medela.** aut inebriatus fuerit, aut in sole laborarit. Quum sic habuerit, primū sanguinē de capite mittito, vndecunque tibi visum fuerit. Et post sanguinis missionem, raso capite perfrigatoria ipsi adhibeto. Et si alius nō subeat, infusum per clysterem immittito. In potu verò ptisanæ succū frigidum dato, & aquam insuper bibendā. Si verò ad perfrigatoria
- B** non remittat, transmutatione facta, vtre vitior ac calefacito, postquam autem quieuerit dolor, cibis vtatur aluum subeuntibus, & ne impleatur. Vbi verò vigesimum diem attigerit sedato dolore, fomento capiti ipsius adhibito, ad nares medicamentum apponito, & interposito triduo medicamentum deorsum purgans exhibeto. Alius morbus. Si venæ **Cerebri morbus.** circa cerebrum sanguinem supereuomuerint, ac cerebrum calefecerint, febris emergit fortis, & dolor ad tempora, & sinciput, ac posteriorem capitis partem, & aures tinniunt ac flatu implentur, & nihil audit, & anxius est, & seipsum præ dolore iactat. Hic quinta aut sexta die moritur. Cū sic habuerit, caput ipsius calefacito. Si enim per aures aut nares aqua eruperit, mortē effugit. Si verò sex dies euaserit, victum ipsi velut in superiore morbo constituto. Alius morbus. Si venæ superuomuerint in caput, dolor grauis totum **Capitis morbus.** caput tenet, & ad collum, & aliās ad alias capitis partes trāsit. Et vbi surrexerit, vertigo ipsum corripit, febris autem non inuadit. Cū igitur sic habuerit, de raso capite si non calefactoriis cesserit, frontem ea parte qua capillus desinit à capite findito: vbi verò secueris disparata ac diducta cute, cū sanguis defluerit, salē tenuissimū inspergito: & postquam effluerit sanguis fissuram cōponito, & duplici filo totam ipsam includito. Deinde splenium cera ac pice illitum, vlceri imponito, & lana sordida superimposita deligato, & ad dies septem ne soluito, si nō dolor vexet: si verò dolor adfit, exoluito. Donec autem sanus fiat, aquam de macerata in ipsa crassa farina bibendam dato, & ptisanæ succum sorbendum,

Hippocratis Liber I I.

**Cerebrum
biliosum
eum est.**

Curatio.

**Quæ ven-
trem cient.**

**Cerebri
corruptio.**

Medela.

**Quo mo-
do sanguis
sistatur.**

**Capitis su-
bitus do-
lor.**

dum, & aquam insuper bibendam. Alius morbus. Si cere- **D**
brū bile infestatur, febris emergit debilis, & rigor, & dolor
per totū caput, maximè ad tēpora, ad sinciput, & ad regiones
oculorum: & supercilia ipsi impendere videntur, & ad aures
dolor procedit, & quandoq; per nares bilis defluit: & oculos
hebetes habent, & plerisque dolor ad dimidiam capitis par-
tem extenditur, quandoq; etiam per totum caput. Quum sic
habuerit, perfrigatoria ad caput apponito, & postquā do-
lor ac fluor cessarit, apij succum in nares instillato, & ne la-
uet quandiu dolor obtinuerit. Et sorbeat milium tenue mo-
dico melle affuso, & bibat aquam. Si verò alius non subeat,
brassicas edat & succum sorbeat. Sin minus, folia sambuci
eodem modo. Et postquam tempestiuum tibi esse visum fue- **E**
rit cibos quā maxime aluum subeuntes ipsi exhibeto. Et si
depulso fluore ac dolore, grauitas ipsi supra supercilia incum-
bat, & in naso mucus crassus ac putridus fuerit, somento ex
aceto, & aqua, ac origano ipsi adhibito, deinde calida aqua lo-
to, florem æris & myrrham ad nares apponito. Atq; his factis
plerūque sanum efficies. Morbus autem non est lethalis.

Alius morbus. Si cerebrum corruptum fuerit, dolor ex
cervicis neruo ad spinam tendit, & ad cor frigus descendit, &
derepente nouus sudor adest, & per nares sanguis fluit, Vo-
munt quoque multi. Hic triduo moritur. Si verò septem dies
transgrediatur: pleriq; autem non transgrediuntur: & si san-
guinem vomat, aut è naribus fundat, neque calida ipsum la- **F**
uato, neq; calefactoria adhibeto. Verū acetum albū aquo-
sum bibendum dato, & si debilis sit, ptisanam forbendam. Si
verò plus iusto sanguinem vomere tibi videatur, aut ex na-
ribus ipsi fluat, à vomitu quidem bibat farinā trimestris tri-
tici in aquam inspersam. Si verò ex naribus fluat, venas & in
brachiis, & in temporibus, spleniis suppositis deligato. At si
neutrum horum ipsi affuerit, dolet autem cervicis neruū, &
collum, & spinam, & frigus ad cor processerit, cum eruo pe-
ctora, dorsum, & cervicis neruū, & collum calefacito. Nam
his factis maximam vtilitatem capere poterit. Verū pauci
huiusmodi morbum effugiunt. Alius morbus. Sanum de-
repente inuadit dolor circa caput, & statim vox intercipitur,
& stertit, & os hiat, & si quis ipsum vocet aut moueat, solum
suspirat, nihil autem intelligit, & multū mingit, & mingere
se non

- A** se non sentit. Hic si nō febris ipsum corripiat, in septem diebus moritur. Si verò corripiat, plerunq; sanus fit. Huiusmodi verò morbus senioribus maximè fit, & magis quàm iunioribus. Hunc ubi sic habuerit, lauare oportet multa calida, & quàm maximè calefacere, & aquā mulsam tepidam in os instillare. At si resipiscat, & morbū effugiat, ubi ipsum cibis refeceris, ita vt viribus valere tibi visus fuerit, indito in nares ipsius medicamento, & paucis diebus interpositis, pharmacū deorsum purgans bibendum dato. Si enim ipsum nō purgaues, timor est ne rursus morbus reuertatur. Effugiunt autē non ita valde ex primo. Alius morbus. Si quis ex ebrietas voce priuetur, & statim sanè ipsum etiā febris corripiat, Senū morbus.
- B** sanus fit. Si verò non corripuerit, die tertia moritur. Si itaq; in ita affectum incideris, multa calida lauato, & spongiās in aqua calida tinctas ad caput apponito, & cepas decorticas in nares indito. Hic si quidem apertis oculis, & loquutus, ad se redierit, & nō nugetur, hac die sopore pressus iacet, post tri- Medela.
- die verò sanus fit. Si verò exurgens bilem vomuerit, insanit, & moritur maximè in quinq; diebus, si non dormierit. Huic igitur hac facere oportet. Multa calida lauato, donec ipse ad seipsum redeat. Deinde multo oleo illitū, ad stragula molli- Temulentia morbus.
- ter reclinato, & vestimentis contegito: & neq; lucernā apud ipsum ardere, neq; loqui permittito. Vt plurimū enim ex balneo obdormit, & si dormierit, sanus euadit. Postquā verò ad se redierit, primis tribus aut quatuor diebus, miliū tenue
- C** sorbeat, aut ptisanæ succum, & vinum mellis speciē referens bibat. Deinde cibis vtatur mollissimis, ac paucis primū. Medela.

Cerebri corruptio.

SI corruptio cerebrum inuaserit, dolor tenet maximè anteriorem capitis partem, & paulatim etiam intumescit, & liuida fit: & febris, & rigor apprehendit. Quum ita habuerit, secare oportet qua parte intumuit, & perpurgato osse ipsum radere donec ad secundam laminam perueniat, deinde velut fracturam curare. Curatio.

Caries sine tereedo.

QUum caries facta fuerit in osse, dolor ex hoc corripit ipsum os, & progressu temporis attenuatur ac inflatur, & fit in ipso fractura. Et si hanc reseueris, comperies ipsum

Hippocratis Liber I I.

Curatio.

ipsum os eleuatum, & asperum, ac fuluū. Quibusdam verò D etiam ad cerebrū vsq; corrosū. Vbi in hoc modo affectum incideris, si quidē vltra corrosū fuerit, sinere optimū est, & vlcus quā celerrimē curare. Si verò corrosū non fuerit, sed asperū, ad secundā vsq; laminā rasum, velut p̄cedens curare. Alius morbus. Si sideratus quis fiat, & anteriorem capitis partē dolet, & oculis videre non potest, sed sopor ipsum tenet, & venæ in tēporibus pulsant, & febris debilis tenet, &

Medela.

totius corporis impotētia, & emacescit. Quum sic habuerit, multa calida ipsum lauato, & calefactoria ad caput adhibeto. A fomentis verò myrrhā & æris florem in nares infundito. Sorbeat autem ptisanæ succum, & aquam bibat. Et si quidem vbi hæc feceris meliūs habuerit, bene est. Sin minus, quæ E vna spes reliqua est, sinciput ipsius findito, & vbi sanguis defluerit, labiis compositis curato ac deligato. Si verò non fecueris, decimo octauo aut vigesimo die plerunque moritur.

Angina.

Curatio.

Febris corripit & rigor, & dolor capitis: & maxillæ intumescunt, & sputū difficulter deglutit. Expuit autē & saliuas duras ac paucas: & infrā in faucibus stertit: & si apprehēsa lingua inspexeris, gurgulio nō magnus est, sed mollis, fauces autem intrinsecus saliuæ viscosæ plenæ sunt, & non potest excreare, & decumbere non sustinet, verum si decūbat suffocatur. Hunc si ita affectū deprehenderis hæc facito. Primum quidem cucurbitas ad verticulū in collo primū affigito. Deinde in capite præraso, & iuxta aurē ab vtraq; parte apponito. Et vbi cucurbitā affixeris, ad multū tempus adhærere finito. Postea fomentū ipsi ex aceto, nitro, origano, & nasturtij semine adhibeto. Hæc terito, & cū aceto pari aqua permixta diluito, ac parum olei instillato. Deinde in ollulam infusis, operculo addito arundinē cauam immittito, & prunis imposita feruefacito: & vbi per arundinis fistulā vapor ascenderit, hianti ore vaporem intro trahat. cauens ne fauces adurat. Forinsecus autē spongas aqua calida imbutas, ad genas ac maxillas apponat. Gargarismus porro ipsi parādus est, ex origano, satureia, apio, mentha, & modico nitro, cum aqua mulsâ aquosiore, & modico aceto instillato, prædictarū herbarum folia trita, & nitrum, in aqua mulsâ diluito, reuefacito, ac sic gargariset. At si saliuæ supprimatur, myrthi ramulum com-

Gargarismus.

Saliuz purgatio.

plana

A planatū sumito, & tenera ipsius summa parte incuruata, ac molli lana obuoluta, in fauces immissa, saliuā expurgato. Et si venter non egerat, glādem subdito, aut clysterem adhibeto. Sorbeat autē ptisanā succum & aquam bibat. Si verò tumor ipsi oboriatur, & ad pectus intumescat, ac rubicundus sit, & ardeat, amplior spes salutis est. Facienda verò hæc sunt, postquam inflammatio foras conuersa fuerit. Betas in frigidam aquam tinctas apponat. Tepidas collutiones ore gargariset, & ne lauet. Hæc faciens maximè euaserit. Est autē morbus lethalis, & paucissimi euadunt. Alia angina. *Secunda angina.* Febris & dolor capitis corripit, & fauces inflammantur, itēq; maxillæ, & saliuam deglutire nō potest, sputat autem crassam ac multā, & difficulter loquitur. *Medela.* Quum ita habuerit, primū cucurbitam affigito, eodem modo veluti suprà diximus. Deinde spōgiam aqua calida imbutam, ad collum ac maxillas adhibeto. Aquam autem mulsam aquosam colluēdam dato. Et succum ptisanæ sorbere cogito. Si verò ipsi talia facienti saliuā non exierit, eodem modo velut in priore fomentū adhibeto. At si ad pectus conuertatur inflammatio, aut ad collum, betas aut cucurbitas cōcisas, in frigidam aquam tinctas superimponat, & frigidam aquam bibat, quo saliuā facilius excreetur. Cū autem ad pectus extumuerit, pleriq; euadūt. Si verò faucibus ac tumoribus sedatis, morbus ad pulmonē conuersus fuerit, febris statim corripit, & lateris dolor, & ut plurimum moritur, vbi hoc factum fuerit. Si verò quinque dies effugerit, suppuratus sit, si nō ipsum statim tussis inuasērit. Si verò inuasērit, facta excreatione depurgatus, sanus sit. Huic quā diu dolor latus tēuerit, latus calefaciēdum est, & adhibenda quæ in peripneumonia adhiberi solent. At si quinque dies effugerit, & febris remiserit, tussis autē remanserit, primis quidem diebus forbitionibus vtatur. Postquam autem cibos sumere inceperit, quā pinguisimos ac maximè salios edat. Quod si tussis non affuerit, nimirum suppuratum fieri scito, & vbi cœnauit cū dormire volet, allium edat crudum quā plurimum, & vinum insuper bibat vinosum meracius. Et si quidem ita pus eruperit, bene habet. Sin minus, postridie calida loto suffitum adhibeto, & si eruperit, velut suppuratum curato. Alia angina. *Tertia angina.* Linguae posterior pars inflammatur, itēque locus sub tonsillis ad guttur,

*in An
cu lea
exor
it qd*

Medela. tur, & neque saliuam, neq; quicquā aliud deglutire potest. Si **D**
verò coactus fuerit, per nares ipsi effluit. Quum ita habuerit
mentam viridem tritam, apium, origanū, & nitrū, & rhoem
rubrum melle diluito, & ad crassam formā redacta, intus lin
guæ qua parte tumet illinito. Postea ficus aqua coquito, & de
rhoe parum tritū, hoc ficuum decocto diluito, ac gargarisan
dum dato si id potest, sin minus colluendum. Bibendam verò
aquā de farina crassa in ipsa macerata exhibeto. Foris autem
cervicem & maxillas, farina calida in vino & oleo cocta inte
gito, & panes calidos apponito. Suppuratur enim plerunque
in loco sub tonsillis, & si quidem sua spē eruperit, sanus fit.
Si verò non rumpatur, vbi digito contigeris an molle sit, fer
ramento acuto ad digitum alligato perforato. His adhibitis **E**
multi sani fiunt. Est autem hic morbus minimè lethalis.

Vua morbus.

Medela. **S**I vua morbus in faucibus fiat, summa gurgulionis pars
aqua impletur, & rotunda fit ac pellucida, & spirationem
intercipit. Et si maxillæ ab vtraque parte inflammatae fue
rint, suffocatur. Si verò ipse morbus per se consistat, maxillis
non inflammatis, minus moritur. Quum sic habuerit, gur
gulionem digito apprehensum sursum ad palatum appri
mito, & summam ipsius partem præsecato. Postea foliorum
hortensium condimentariorum decoctum gargarisandum
dato, & farinam frigidam delingendam, aquamque insuper
bibendam: & ne lauet. **F**

Tonsillæ morbus.

Medela. **S**I tonsillæ fiant, intumescunt sub maxillis ab vtraque par
te, & ad contactum foris durum est tuberculum, & gur
gulio totus inflammatus est. Quum sic habuerit, immisso
digito tonsillas protrudito, ad gurgulionem autem florem
æris siccum illinito, & foliorum condimentariorum horten
sium decoctum, velut à Sole calidum gargarisandum dato.
Foris qua parte tumor est, ordeaceam farinam in vino & o
leo coctam calidam pro cataplasmate apponito. Postquam
verò tubercula mollia esse tibi visa fuerint intrinsecus ad
contactum, scapello ipsa pertundito. Quædam etiam sua
sponte sedantur.

Tuberculum sub lingua.

Si tuber

A SI tuberculum sub lingua, hypoglossis appellatum, fiat, Hypoglossis. lingua intumescit, & pars sub ipsa ac externa ad tactū dura est, & salinā deglutire non potest. Cū sic habuerit, spongiam aqua calida imbutā apponito, & ordeaceam farinam vino ac oleo coctam, foris ubi tumor est imponito, Gargariser ficuum decoctum, & ne lauet. Postquam autem purulentum factum fuerit, secato. Aliquando verò sua sponte erūpit, & sedatur non sectum. Si verò foras suppurauerit, perurito.

Inflammatiō consistens ad palatum.

SI inflammatiō constiterit ad palatum, intumescit & suppuratur. Quum sic habuerit, tuberculum inurito. Vbi verò exierit pus, reliquū eluito, primū nitro & aqua calida. **B** deinde vino. Postquam autem elueris, vuam passam albam exemptis vinaceis tritam, in vstura locum indito, & ubi exciderit, vino meraco tepido colluat, & ubi edere quid aut forebere valet, spongiam indat, atq; hæc faciat donec sanus fiat.

Polypus.

SI polypus fiat in naso, ex medio cartilaginum dependet, veluti gurgulio. & ubi expirationē facit, progreditur foras, & est mollis, ubi verò inspirationem facit, retrocedit: & loquitur obscure, & cū dormit, stertit. Quum sic habuerit, spongiam in rotundum concisam, & velut spiram factam, lino Aegyptio obuoluito, ac duram efficito. Sit autem eius magnitudinis, ut ad nāsum quadret. Spongiam verò quadruplici lineo filo deligato, ita ut vnumquodque longitudinem habeat cubitalem. Deinde facto vno ipsorum principio, virgam stanneam tenuem sumito, quæ ad alteram sui partem foramen habeat, & transmissio per foramen filorum principio, virgam in acutam in os transmittito, & attrahito donec filorum principium apprehendas. Postea specillo instar vngulæ bifurcato sub gurgulionem subposito, renitēs trahito, donec polypū extraxeris. Postquā verò ipsum extraxeris, & sanguis fluere desierit, siccum linamentum specillo obuolutum indito, & de cætero æris flore in melle cocto, linamentum illine, atq; sic in nāsum inde. Et ubi iam vlcus curatum fuerit, plumbū efformatum ita ut ad vlcus perueniat, melle illine, & donec sanus fiat, appone. Alius polypus. Impletur nāsus carnibus, & ad cōtactum caro dura apparet, & per nāsum

Medela.

Hippocratis Liber I I.

Medela. sum spirare non potest. Quum sic habuerit, fistula immissa, D
ferramentis tribus aut quatuor vrito, & post vstionem vera
trum nigrū triticū iniicito, & postquā cōputruerit ac excide
rit caro, linamenta melle illita cum aris flore indito, & vbi
curatū fuerit vlcus, plumbeas massas sine fistulas melle illi-
tas immittito, donec sanus fiat. Alius polypus. Intrinsicus

Medela. lis est. Cū ita habuerit, chordam nerueam accipito, & fa-
cta in ipsa parua ansula, eam tenui filo obligato, deinde alte-
rum principiū per ansulam trāsmittito, alia maiore ansa fa-
cta. Postea principium illud per virgam stanneam transmit-
tito. Deinde ansam illam maiore in nasum indito, & specil-
lo insecto ipsam circū polypum obducito ac adaptato, & vbi
circumsita fuerit, virgam in os transmittito, & a reptam ip- E
sam trahito, eodem modo specillo instar vngulæ bifurcato
supposito sub gurgulionē ac renitente. Postquā autem extra-
xeris, curato velut superiorem. Alius polypus. Intrinsicus

Medela. lut lapis. Cū sic habuerit, fīso per scalpellum naso expur-
gato, deinde inurito. Atque hoc facto nasum rursus cōsūto,
& vlcus curato, linamētum melle illitum indens, & vbi con-
putruerit, aris florem cum melle illinito. Fiat autem cura-
tio plumbeis massis itidem immisissis. Alius polypus. Nascū-
tur ex obliquo cartilaginis in summo, velut cācelli. Omnes
autem hos vrere oportet, & post vstionem veratrum in- F
spargere. Postquam autem computruerint, aris flore cū mel-
le expurgare. Curatio autem etiam plumbo immisso fiat.

Morbus regius niger.

Medela. **C**olor fit niger circa faciem, & maximè circa partes ve-
lut in vmbra occultatas: & oculi cum virore pallidi,
itēque lingua infernè, & venæ sub lingua crassæ ac nigræ:
& est homo sine febre, ac mingit vrinam crassam, biliolam.
Quum ita habuerit, primū venas sub lingua secato, dein-
de calida multa loto, asphodeli radices bibendas ieiuno da-
to, ita vt æquales quinque radices depurgatas in vino co-
quas, & apij foliorum quantum manu plena capit, addas. Af-
fundito autem vini dulcis tres heminas dimidiatas Aeginē-
ses

A ses, vt à coctura semihemina, superfit. Hoc permixtū bibendum dato. Postquā autem minxerit, cibus aluum subeuntibus vtatur, & à cibo cicer album edat, & vinum album, multum, aquosum bibat: & apium ac porrum in cibo edat, faciat autem hæc per dies septem, & si quidem in his color probè depurgatus esse tibi visus fuerit, bene est. Sin minùs, etiam alios tres hæc faciat. Postea interposita vna atque altera die, medicamentum ad nares apponito. Deinde pharmacum deorsum purgans bibendum dato, à quo bilis purgatur. Et si splenicus fuerit, asininum lac aut serum postea exhibeto. Hæc faciens, sanum efficies. Alius morbus regius. Febris corripit debilis, & grauitas caput tenet, & quibusdam sanè febres cessant, Ipse verò fit cū virore pallidus, & maximè oculi, & debilis est, & corporis impotentia adest, & vrinam crassam cū virore pallidam emittit. Hunc calida lauato, & vrinam cientia bibenda dato. Postquā autem purior esse tibi visus fuerit, & color melior apparuerit, medicamentum ad nares appone, & postea deorsum purgans bibendum præbe. Cibus autem vtatur quā mollissimis. Vinū bibat album, dulce, aquosum, Hæc faciens sanus euadet.

Febris à bile.

SI bile infestatur homo, febris ipsum corripit quotidie, ac dimittit. Detinet autem in meridie, & os amarum est, & quum sine cibo manet, offendit hoc ipsum. Vbi verò ederit, strangulatur, & à modicis quibusdam cibus impletur, & abominatur, & vomitiones ipsum inuadūt, & ad lumbos accura grauitas incumbit, & multum dormit. Hic si post febrem exudarit frigidum ac multum sudorem, & febre non libere tur, morbum diuturnum sentiet. Si verò non sudarit, citius iudicatur. Quum sic habuerit, & ad nonum diem deuen-
rit, pharmacum dato. Nam si statim à febris initio dederis postquā purgatus est, febris repetit, & rursus medicamentum opus habet. At si os non afficiatur, verū ad imum ventrem tormē irruat, pharmacum deorsum purgans bibendū dato, & postea lac asininum, aut serum, aut aliquem succum. Si verò debilis fuerit, per clysterem subtus eluito. Ante medicamenti verò potionē, si quis febriat, danda est ipsi aqua mulsā aquosa. Altera autem die qua febris detinet: aquam frigidam quantum bibere voler, dabis. Vbi verò remiser

Hippocratis Liber I I.

Continua
febris.

Curatio.

Medela.

Tertiana
febris.

Medela.

Medela.

miserit febris, ptisanæ succum, aut milium tenue sorbeat, & D
vinū album, odoratū, aquosum insuper bibat. Si verò febris
neq; noctu, neq; interdiu remittat, & ad cōtactum supernas

partes habeat calidas, venter autem & pedes frigidi sunt, &
lingua aspera: huic medicamētū ne dederis, sed molli infuso

per clysterē subluo, & ptisanæ succū bis in die frigidū sor-
bendum dato, & vinū aquosum insuper bibendum. Reliquo

verò tempore aquā frigidissimā bibat. Hic si quidē septima
die exudarit, & febris ipsum dimiserit, bene est. Sin. minus,

decimaquarta die plerūq; moritur. Alia febris. Foris ad
cōtactum febris debilis est, intrinsecus autē ardet, & lingua

ipsius aspera est, & per nares & per os spirat calidum. Quin-
ta die præcordia dura sunt, & dolor inest, & calor qualis in E

morbo regio apparet, & crassam ac biliosam vrinam eiicit.
Hūc si septima die rigor & febris vehemēs apprehenderit, &

exudarit, bene est. Sin. minus, moritur septima aut nona. Cor-
ripit autē maximē hic morbus, si nō annus squalidus fuerit.

Quū sic habuerit, quotidie calida lauato, aquāmq; mulsam
aquosam multā bibendā dato, & ptisanæ succū frigidū bis in

die sorbendū. A sorbitione verò vinū bibat aquosum, albū,
modicū. Si verò alius nō egerat, clysterē adhibeto, aut glan-
dulam subdito. Cibū autem ne exhibeas, donec febris remit-
tat. Vbi verò sedata fuerit, pharmacū deorsum purgans bi-
bat. Reuertitur enim quandoq; morbus, si impurgatus per-
manferit. Et ampliū morbus hic rursus corripit, si sanguis

nimiū biliosus fact⁹ fuerit. Alia febris. Si tertiana febris te F
nuerit, si quidem nō omisis tribus inuasionibus, quarta cor-
ripiat, pharmacū deorsum purgans bibendum dato. Si verò

pharmaco non opus habere tibi videatur, radicū quinque-
folij tritarum acetabuli mensurā, ex aqua bibēdam dato. Si

verò neq; sic cesset, multa calida loto, trifoliū, & silphij suc-
cum, in vino pari aqua ammixta, bibenda præbeto, & reclina-
to vestimenta multa integito, donec exsudet. Postquā

verò exsudarit, si sitiāt, polētā cum aqua bibat. Vesperi au-
tem milium coctum tenue sorbeat, & vinum insuper bibat,
donec febris cesset: & cibus quā mollissimis vtatur.

Febris quartana.

Q Vum febris quartana ex alio morbo non purgatum ap-
prehenderit, pharmacum deorsum purgans bibendum
dato.

A dato. Deinde caput purgato. Postea rursus infra purgato. Si verò his factis non cesset, interpolitis duabus inuasionibus post purgationem infernam, multa calida ipsum lauato, & seminis hyoscyami milij magnitudinem, & mandragoræ tantundem, & succi silphij trium fabarum magnitudinē, & trifolij tantundem, in vino meraco bibat. At si firmus & sanus se esse putans, ex lassitudine, aut profectione febre correptus, ad quartanā deueniat: fomentis ipsi adhibitis allium dato, in melle tinctum. Deinde lenticulæ decoctum bibat, melle & aceto ammixtis. Postquam autem repletus fuerit, vomat. Postea calida lotus, vbi frigidus factus fuerit, cyceonem ex aqua bibat. Vesperis cibis mollioribus & non multis vtatur. Altera vero exacerbatione, vbi multa calida laueris, & stragula ipsi intexeris, donec exsudet, statim veratri albi radices trium digitorum longitudine, & trifolij drachmam, & succi silphij duarum fabarum magnitudinē, & in vino meraco bibat. Et si vomitiones ipsum vrserint, vomat. Sin minus, post caput purgatum. Cibis autem vtatur quàm mollissimis & acerrimis. Quum verò exacerbatio ipsum inuaserit, ieiunus medicamentum ne bibat.

Pleuritis.

Pleuritis vbi corripuerit, & febris & rigor tenet, & dolor per spinam ad pectus, & erectæ cervicis spiratio, & tussis, & saliuæ alba ac subbiliosa, & non facile per tussim reiecit, & per inguina dolor est, & cruentâ vrinam mingit. Quum ita habuerit, si quidem febris septima die remiserit, sanus euadit. Si verò non remittat, deuenit morbus ad vndecimum *Medela.* aut decimū quartum diem. Et sanè multi in his diebus moriuntur. At si decimū quartum transgrediatur, euadit. Quum ita habuerit dolor, calefactoria adhibeto. Bibat autem mel, æquali aceto affuso coctum, ita vt quanta fuerit mensura cocti mellis & aceti, vnde uigesimam partē aquæ affundas. Hoc paulatim & frequenter bibendum dato: & postea quoque aquam modico aceto affuso ammisceto. Sorbeat & milij succum, melle modico adstillato frigidū, quartæ heminae partis mensura, quoties vtrunque cibum sumit, & bibat vinum album vinosum, aquosum modicum. Sit autem vinū quàm mollissimum, odorem non habens. Vbi verò febris dimiserit, per biduum miliū bis in die sorbeat, & betas iucundissime

Hippocratis Liber I I.

paratas edat. Deinde catulum aut auiculam coquat, & ius D
sorbeat, & de carnibus parum edat. Reliquo verò tempore,
maximè quandiu morbo tenetur: in prandio milium su-
mat, vesperi cibis paucissimis ac mollissimis vtatur. Alia
pleuritis. Febris tenet, & tussis, ac rigor, & dolor ad latus, &
quandoque ad clauicolum, & saliuam spuit subbiliosam ac
Medela. ac subcruentam. Quòd si agro abscessus ruptus fuerit, qua
parte dolor maximè vrget, calefactoria adhibeto, & calida
lauato, si non magna febris ipsum teneat. Sin minus, non. Bi-
bendum autem dato fauum in aqua maceratum, ita vt aqua
iam subdulcem facias, & postea quoq; aquam ammiscens.
Sorbeat ptisanæ succum bis in die, & vinum inde bibat al-
bum, aquosum. Et si quatuordecim dies effugerit, sanus eua- E
dit. Alia pleuritis. Febris detinet, & dentium stridor, & tussis
sicca, & cum virore pallida reiicit, quandoq; etiam liuida: &
dolor latus corripit, & dorsum subrubidum fit. Caput & pe-
ctus calescunt, aliquando etiam venter, & pedes, & crura. Et
quum erectus sedet, magis tussit: & aluius turbatur, & alui
egestio cum virore valde pallida est, ac graueolens. Hic in vi-
Medela. ginti diebus moritur. Si verò has effugerit, sanus fit. Huic do-
nec quatuordecim dies præterierint, aqua de farina crassa in
ipsa macerata bibendam dato, & vinum album vinosum, aquo-
sum postea bibendum. Sorbeat succum ptisanæ frigidum, bis in
die. Verum præ melle mali punici succum, ad ptisanæ succum ad-
misceto, postquam iam hic ptisanæ succus coctus fuerit, & lauet F
non multa. Vbi verò quatuordecim dies præterierint, in pran-
dio miliumumat. Ad vespertinam carnibus auicularum, cum iuseu-
lo, & paucis cibis vtatur. At talem morbum pauci effugiunt.

Peripneumonia.

Febbris detinet dies quatuordecim vt minimum, ad sum-
mum duas de viginti, & per hos dies fortiter tussit, & pri-
mum quidem excreat saliuam crassam ac puram, septima &
octaua die. Si verò febris corripuerit, nona ac decima, sub-
dulce & purulentum, donec quatuordecim dies præterierint.
Et si quidem decima quinta die pulmo resiccatus fuerit, & tuf-
fiendo reiecerit, sanus fit. Sin minus, duas de viginti obserua-
to, & si quidem in his diebus tussis sedata fuerit, euadit. Si non
sedata, interrogato ipsum, an saliuam ipsi dulcior appareat, &
si hoc confessus fuerit, morbus annum durabit. Nam pulmo sup-
puratus

A puratus fit. Huic primis diebus vinum dare conuenit dulce, album, aquosum, paulatim frequenter bibendum. Sorbeat *Medela.* etiam ptisanæ succum melle ammixto bis, in die, donec dies decem & octo præterierint, & febris desuerit. Periclitatur autem maximè in septem, aut quatuordecim. Postquam autem decem & octo dies transgressus fuerit, non amplius moritur, sed pus sput, & pectus dolet, & tussit. Quum sic habuerit, ieiunus cum salua vini illam potionem bibat, & leguminis fressi decoctum sorbeat, adipe multo ammixto, si non calor fuerit. Si verò fuerit, ne sorbeat, sed cibis vtatur salis ac pinguibus, & marinis potius quàm carnibus. Et si pro ratione purgari tibi visus fuerit, in os infundito, ac fomenta adhibeto, si quidem crassum fuerit pus, fomenta adhibeto: si verò tenue, infundito & ex cibis hæreat quàm maximè, & ab acris absterneat, & à carnibus bubulis, ouillis, ac porcinis.

Suppuratus ex peripneumonia.

Quam ex peripneumonia suppuratus factus fuerit, febris detinet, & tussis sicca, & difficultas spirandi, & pedes intumescunt, & manuum ac pedum vngues contrahuntur. Hunc ita effectum ad decimam diem à suppurationis *Medela.* initio pregressum, multa calida lauato, & ari radicem tali magnitudine tritam, & salis granum, & modicum mellis, & aquam, & olei parum, extracta lingua tepida infundito, & postea humerum concutito. Et si quidem ab his pus erumpat, bene habet. Sin minus, aliud facito. Cibos acres & cyclaminum exsuccato, sitque succi vtrorunque acetabulum paruum, deinde silphij succum fabæ magnitudine terito ac diluito, & lactis caprini aut asinini acetabulum ammisce-to. Hoc tepidum infundito. Quod si ab hoc non erumpat, raphani corticem, & æris florem, trium fabarum magnitudine terito: Sit autem raphani duplum: & oleo diluito quarta hemina parte. Hoc tepidum infundito. Et si eruperit pus, cibis quàm falsissimis ac pinguisimis vtatur. At si non prodierit pus, paulatim fomentum adhibeto in os, ex sij succo, vino Tornio, lacte bubulo, aut caprino, singulis pari mensura permixtis, ita vt sint heminae tres, in quas postea furni testas igni candefactas iniicito, atque inde vaporem per fistulam trahat, cauendo vt ne aduratur. Postquam autem purius iam sputum prodierit, vrticæ semen,

Hippocratis Liber I I.

thus, origanum in vino albo, melléque ab oleo modico, ipsi D
infundito, idque per tertium diem. postea verò butyrum, re-
finam in melle eliquatā. Et cibis non amplius vtatur falsis,
neque pinguibus. At diebus interpositis, infusionum oris vsu
cessante, saluiam, rutam, satureiam, origanum, pari portione
ieiunus ex vino bibat acetabuli mensura, omnibus illis in-
sperfis. Quòd si ab infusionibus his oris non eruperit, nihil
miri est. Sæpe enim prorumpit ad aluum, & statim melius
habere sibi videtur, vbi ex angusto ad ampliorem regionem

**Vomica in
terior qui
signatur.
Curatio
quæ.**

**Pus de vo-
mica qui
educatur.**

deuenerit. Alius morbus. Quum tēpus longius protrahi-
tur, & febris vehemens actusis corripit, & latus dolet, & ad
sanam partē decumbere non potest, sed ad dolentē, & pedes, E
& oculorū cavitates intumescunt. Hunc vbi decimus quintus
ab eruptione dies adest, multa calida lotum in sella firma
collocato, & alius quidē manus ipsius teneat, tu verò hume-
rum cōcutito, vt audias in vtrū latus affectio strepitū edat:
optandum autē esset in sinistrum. Hunc ipsum igitur locum
feces, minus enim lethalis est. Si verò præ crassitudine ac co-
pia strepitum non edat, quo ipsum cognoscere possis, (nam
hoc aliquando contingit) vtrum latus tumuerit ac magis
doluerit, hoc infime secato retro tumore magis quàm ante
ipsum, quo puris exitus facilem fluxionē habeat. Secato au-
tem inter costas per nouaculam primum cutem, deinde scal-
pello acuto, quod panniculo sit obligatū, ita vt summa ipsius
pars, ad vnguis magni digiti mensurā expedita restet, quam
intromittas. Postea emissio pure quantū visum fuerit, vul- F
nus linamento ex lino crudo, alligato foras propendēte filo,
concludito: & quotidie semel pus educito. postquam autem
decimus affuerit dies, omni pure emissio linamentum ex lin-
teo indito. Deinde vinū & oleum tepesacta per fistulam in-
fundito, ne pulmo à pure humectari solitus derepente resic-
cetur. Emittendum autem est id quod mane infusum est, ad
vesperā: quod vespera, mane. Vbi verò pus tenue velut aqua
fuerit, & ad digiti cōtactum viscosum ac modicum, penicil-
lum stanneum cauum indito. Postquam autē omnino ven-
ter resiccatus fuerit, paulatim linamentū præfectum minui-
to, donec vlcus coalescat, & ipsum penitus eximas. Signum
autē an euasurus sit habes: si pus album ac purum fuerit, &
fibræ sanguinis insint, plerunque sanus fit. Si verò prima die
profluat

- A profluat lutei oui speciem habens, aut secunda die defluat crassum, cum virore subpallidū, scetens, moriuntur vbi pus effluxit. Alius morbus. Quum quis ex pulmonis affectu tabescit, is saliuā crassam, cum virore subpallidam, dulcem, tussiendo reiicit, & stridor ac dolor ad pectus & ad dorsum fit, & in faucibus tenuis sibilus auditur, & fauces siccae sunt, & oculorum cauitates rubicundae, & vox grauis, & pedes intumescunt, & vngues contrahuntur, & supernae partes attenuantur ac imminuuntur, & saliuā abominatur vbi exscreaturus ipsam in ore habet, & tussit mane maximè & circa mediam noctem, imò etiam aliis temporibus. Et corripit magis hic morbus mulierculā iuuenulam quàm vetulam.
- B Huic si iam pili de capite defluant, & nudum sit caput, velut ex morbo: & si prunis inspuenti saliuā graueolens sit, intra breue tempus ipsum moriturū esse pronuncia, id verò quod occidet, alui profluuium fore. Vbi enim iam pus circa cor putruerit, nidorosum odorē prunis iniectum de se præbet: & cerebrum cōcalescens falsuginosum humorem effundit, qui aluum mouet. Huius autem signum est, quod capilli ex capite defluunt, Hunc vbi ita habuerit ne curato. Si verò à principio morbus obrigerit, lenticulæ decoctum bibendum dato. Deinde interposita vna die, veratrum dato temperatum, vt ne aluum infernam moueat. Et quum noctu ad os falsuginosus humor ipsi influit, medicamenta ipsi frequentiora ad nares appone. Si verò non fluit, appone quidē sed rarius, & mense semel, ita vt insuper veratrum bibendum des, quantum duobus digitis comprehendi potest, in vino dulci temperato. Statim verò lenticulæ decoctum inde bibendum dato. At medicamenta quàm paucissima bibat, si non febres acutiores ipsum corripiāt. Radicem dracontij albam, & veratri delingat, sed non ex melle. Sic enim minimè aluum mouebit. Si verò tormen in aluo inferna oboriatur, primū per clysterem illud infusum immittito, in quod coccus cni- dius ammiscetur. Quòd si neque sic sedetur, lacte asinino cocto purgato, pharmacum autem nullum deorsum purgans dato. Si verò ante medicamentum, præpotato veratro bilem vomat, ab ipso lenticulæ decocto accepto vomat. Cibis autem vtatur, si febres acutæ tenuerint, carnibus ouillis coctis, & volucrum, & cucurbita, & beta. Iusculum autem ne forsbeat,

Tabes.

Signa mor-
tis.

Medela.

Coccus cni-
dius.Cibus qua-
lis.

Hippocratis Liber I I.

forbeat, neque ad intinctus vtatur. Piscibus vtatur scorpiis, D
& cartilaginei generis coctis. Calidum verò nihil edat, neq;
lauet si febris multa teneat. Neque oleribus acribus vtatur,
præterquam satureia, aut origano. Vinum bibat album. Si
verò sine febre sit, calores autem aliàs atque aliàs corripiat,
pisces edat optimos ac pinguisimos. & pinguia, & dulcia, &
quàm maximè salsa. Et deambulationibus vtatur, neque in
vento, neque in sole. Et à cibis vomat, vbi tempestiuum vi-
sum fuerit. Et calida lauet, capite excepto. Ex cibis frumen-
taceis præstat panis, his qui non mazam edere soliti sunt,
Mazam verò edere solitis, vtraque dato.

Alius morbus appellatus Tabes.

T Vfsis vexat, & sputum multum ac liquidum, & quan- E
doque facilè tussiendo reiicitur etiam pus, veluti gran-
do. quod dum digitis conteritur, durum & male olens est. At
vox pura est & doloris exors, & febres nō corripiunt, verū
calor quādoque aliàs atq; aliàs, atque hic debilis. huic vera-
trum bibendum est, & lenticulæ decoctum, & large cibus su-
mendus, ita vt abstineat ab acribus, & carnibus bubulis ac
porcinis & ouillis. Exerceatur modicè & deambulet, & à ci-
bis vomitu vtatur. A Venere abstineat. hic morbus per an-
nos septem aut nouem durat. quòd si ab initio æger curatus
fuerit, sanus euadit. Alius morbus. Si ex feruido vlcere,
aphtha appellato, pulmonis fistula laborarit, febris debilis
tenet, & dolor mediū pectus, pruritus corporis adest, & vox
raucosa, & saliuam liquidā ac tenuem spuit: quandoq; etiam F
crassam, velut ptisanæ succum. Et in ore odor oboritur ipsi
grauis, velut à piscibus crudis, & aliàs atq; aliàs in saliuā ap-
parent dura, velut fungus ab vlcere, & supernæ partes atte-
nuantur, atque adeò homo totus: & circuli faciei rubescunt,
& progressu temporis vngues contrahuntur, & aridi ac cum
viore pallidi fiunt. Moritur autem statim, si non curatus
fuerit, sanguinem ac pus spuens. postea etiam febres vehe-
mentes accedentes ipsum perimunt. Si verò curetur, effugit
ex hac tabe. Curare porrò oportet, vt lenticulæ decocto po-
to vomat. Quòd si tempestiuum esse visum fuerit, veratrum
bibat, siquidem potens fuerit homo, per se. Sin minus, dimi-
dium potionis ad lenticulæ decoctum ammisceto, ita vt in
quinta aut sexta potione desinat. At ventrem infernum me-
dica

Medela.

Pulmonis
fistula affe-
cta quid fa-
ciat.

Medelama-
li huius.

A dicamento ne moueas, si non febres fortes corripuerint. Si non autē corripuerint, lacte asinino subtus purgato. Quod si debilis sit, vt bibere non possit, per clysterem infundito. Minus autem caput moueas, & si quidem saliuā ad os prodierit multa ac falsuginosa, ad nares apponito quid, quod bilem non ducat. Si verò fluxio ad os non fiat, nihil capiti adhibeto, vbi autem saliuā graueolens fuerit, interpositis inter lenticula decocti vsu diebus, medicamentum in pulmonem infundito, & interposita vna die suffito. Cibis vtatur carnibus ouillis & volucrum, & piscibus cartilaginei generis, & scorpiis coctis. Quarto verò quoque die falsamentum edat optimum ac pinguisimum, & in prandio mazamumat, in cena verò etiam panem ad hanc addat, & nihil forbeat, neque cyceonem bibat, si edere poterit. Porro obsonia condat ac edat sesamo pro tritico, & coriandro ac anetho. Silphio autem ne vtatur, neque alio copiam olere acris, præterquam origano, aut timo, aut ruta. Deambulationibus autem vtatur ante & post cibum, vitans ventum & solem. Ab ebrietatibus & re venerea abstineat. Lauet tepida, excepto capite, quod quam rarissimè lauari debet.

Tabes dorsalis.

Dorsalis tabes à medulla fit. Corripit autem maximè recentes sponso, & veneri deditos. Sunt autem sine febre, & bene cibum capiunt, ac consumuntur. Et si interroges ita affectum, dicet sibi supernè de capite in spinam velut formicas descendere videri, & vbi mingit, aut ventrem exonerat, prodit ipsi genitale semen multum ac liquidum, & genitalura in vtero non manet, & in somnis semen profundit, siue dormiat cum vxore siue non. Et quum iter fecerit aut currerit, tum alias, tum ad accliuem locum, anhelatio ac debilitas ipsum corripit, & capitis grauitas, & aures sonant. Hunc temporis progressu vbi febres fortes ipsum corripuerint, perdunt febres lipyria. Quum ita habuerit, si ab initio curandum suscepis, fomento per totum corpus adhibito, medicamentum sursum purgans bibendum ipsi dato, & postea caput purgato. Deinde deorsum purgans exhibeto. Optandum autem fuerit vt vere hanc curationem aggrediamur, Postea verò serum aut lac asinum bibendum dato. Cæterum bubulum lac per quadraginta dies bibendum præbeto.

Seminis
clandestina
fluxio.

Medela.

Hippocratis Liber I I.

beto. Ad vesperam verò quàm diu lac potat, alicam sorben- D
dam dato. A cibis autem abstineat. Postquàm verò lac bibe-
re cessarit, cibis mollibus ipsum reficito, ex modico initium
sumens, & quàm maximè crassum ac pinguem facere stude-
to. Per annum ab ebrietatibus, & venere, & laboribus absti-
neat, exceptis deambulationibus, in quibus vitet frigus & So-
lem. Tepida autem lauet.

Pulmonis morbus.

S Aliua crassa ac fuliginosa tussi reiicitur, & color niger, ac
subturgidus est, & dolores tenues sub pectus & sub scapu-
las fiunt: & vlcera ipsis agrè sanescunt. Minus tamen pericu-
Medela. losus est hic morbus superiore, & plures euadunt. Hunc ve- E
raturum bibere oportet, & per se, & lenticulæ decocto ammi-
xtum. Infundere etiam in pulmonem oportet ac suffitum fa-
cere. Cibis quoque largè vtatur, abstinendo à carnibus bubu-
lis, ouillis, & porcinis, & ab acribus oleribus, præterquàm
origano, aut satureia. Vtatur deambulationibus. Mane verò
ieiunus ad accliuem locum iter faciat. Deinde folia condi-
mentaria hortensia bibat in vinum temperatum inspersa.
Deinde verò cibis relatis vtatur.

Arteria vulnerata.

S I vulnerata fuerit arteria, tussis habet, & sanguinem tuf-
fiendo reiicit, & fauces sanguine latenter implentur, &
grumos eiicit, & dolor fit acutus ex pectore ad dorsum, & sa-
liua viscosa ac multa, & fauces siccae, & febris ac rigor corri- F
pit, & strident fauces velut à pinguedine, atque hæc ad quin-
decim dies patitur. Postea verò pus sputat, & velut vlceris rici-
nos, bronchia in pulmone cartilaginosa, & rursus tussit, & sa-
nè sanguis erumpit, & postea pus crassius sputat, & febris for-
tior fit, & in pulmonem desinit, & vocatur ruptio pulmonis.
Medela. At si post primum sanguinem pus non sputat, à laboribus ac
exercitiis quiescere oportet, & vehiculum inscendere absti-
neréque à cibis salis, ac pinguibus, & ab oleribus acribus, &
postquam ipse seipsum optimè corpore affectum esse putat,
pectus ac dorsum inurito, ex parte vtrunq; & postquã vlcera
sana fuerint, per annū abstineat ab ebrietate, & ne nimium
impleatur, neque manibus laboret, neq; vehiculum inscen-
dat, sed studeat vt corpus quàm maximè crassum efficiat.

Articuli

A

Articuli pulmonis conuulsi.

Qum articuli pulmonis fuerint conuulsi, sputum spuit album, quandoque verò cruenta, & desipit, & febris tenet, & dolor pectus, dorsum, ac latus: & si se vertat, tussit & sternutat. Huic qua parte dolor fuerit calefactoria apponito, & centaurei, & daucum, & saluæ folia trita, melle & aceto affuso, præforbenda dato, & aquam insuper sorbendam. Et ptisanæ succum præsorbeat, & vinum aquosum insuper bibat. Postquàm verò dolor sedatus fuerit, saluiam tusam ac cribratam, & hypericum, & irionem trita, & polentam, singula paribus portionibus, in vinum temperatum coniecta, ieiuno bibenda præbeto. At si ieiunus nō sit, leguminis fressi decoctum sine sale sorbendū dato. Si verò calor fuerit, cibis vtatur mollissimis, non salis, & minimè nidorosis, vbi iam probè se habuerit corpus, & in pectore, & in dorso. At si ambo conuulsa fuerint, tussis emergit, & saliuæ crassa ac alba apparet, & dolor acutus adest ad pectus, & sub scapulas, ac latus: & ardor detinet, & rubicūdis in tibiis circulis impletur, & pruritus habet, & non sustinet neque sedere, neque iacere, neque stare, sed ægrè afficitur, ac viribus deficit. Hic quarta die maximè moritur. Si verò hanc effugerit, spes neq; sic multa superest, Verum periclitatur & in septima. Quòd si & hanc effugiat, sanus euadit. Hunc vbi sic habuerit, multa calida bis in die lauato. Et quū dolor habuerit, calefactoria adhibeto, & mel, & acetum bibendum dato, & ptisanæ succum sorbendum, & vinum album vinosum insuper bibendum. Si verò ad balneum & calefactoria affligatur, ipsaque non sustineat, crassi lintei panniculos ipsi adhibeto, quos aqua tinctos in pectus ac dorsum imponas. Et fauum mellis aqua frigidissima macerato, aquamque bibendam dato, & frigidum ptisanæ succum, & aquam insuper bibat, & ad frigus decumbat. Hæc facienda sunt. Verum morbus lethalis est.

Curatio.

C

Erysipelas in pulmone.

Si erysipelas in pulmone fiat, tussis habet, & saliuam expuit multam ac liquidam, velut de gutture, non est autē cruenta: & dolor tenet dorsum, & vacuas partes ventris, ac laterum mollitudinem, & viscera fugunt, & vomit pituitam ac velut acetum, & dentes stupefcunt, & febris, ac rigor, & sitis corri

corripit, & vbi quid ederit, in visceribus fugit, & acidum erudat, & vter stridet, & corpus torpescit, & vbi vomuerit, melius se habere putat. Quum autem non vomuerit, digressa die tormen & dolor in ventre oboritur, & excrementum alui liquidum procedit, hic morbus maximè fit ex ebrietatibus, & carniū esu, & ex aquæ mutatione. Sed & ex aliis causis emergit. Huic pharmacum deorsum purgans bibendum dato, & lac asininum insuper bibendum, si non natura fuerit splenicus. Si verò splenicus fuerit, ne purges, neque succis, neque lacte, neque sero, sed eo quod modicum ingestum multum educet. Per clysteres quoque infusio in aluum fiat, & glandulæ subdantur in omnibus morbis, si aluus non egerat. Adhibendum est & frigida lauacrum in hoc morbo, & exercitium, E vbi febres remiserint, & corpus leuiter se habere visum fuerit. Et vere & autumnio vomitus inducatur. At verò alij capita, & origani pugillum, quantum tribus digitis apprehendi potest, duabus heminis vini dulcis affusis, & aceti acerri mi hemina vna, & mellis quarta hemina parte, coquito donec tertia pars reliqua fiat. Deinde vbi hominem exercueris, & aqua tepida laueris, calidum hoc bibendum præbeto. Dato etiam lenticulæ decoctum, melle & aceto ammixtis, donec impleatur. Deinde vomat, & ea die pota polenta & aqua, ita ieiunus permaneat. Ad vesperam verò betam edat, & parum de maza, & vinum aquosum bibat. Reliquo verò tempore, à lenticulæ decocto, & à cibis vomat. Et si discesserit dolor sub scapulas, cucurbitā affigito, & venas in manibus per F rundito. Cibis porrò vtatur non salis, neque pinguibus. Acris autem & acida edat, & frigida omnia, Vtatur & deambulationibus. Hæc si fecerit, optima victus ratione vsus fuerit, & per plurimum tempus morbus prorogari poterit. Est autem non lethalis, sed consenescentes relinquit. Si verò iuniorem aliquem citius à morbo liberare voles, vbi ipsum purgaris, pectus & dorsum inurito.

Morbus dorsalis.

Rigor & febris, & tussis, & spirandi difficultas corripit, & saliuam spuit cum virore pallidam, quandoque etiam subcruentam: & dolet maximè dorsum & inguinæ: & tertia aut quarta die cruentam vrinam mingit, & moritur septima die. Si verò quatuordecim dies effugerit, sanus euadit: effugit

Agit autem non ita valde. Huic aquam mulsam bibendam Medela. dato, in olla noua feruefactam ac perfrigeratam, & apij aut fœniculi radicis cortice in ipsa macerato. Dato & ptisanæ succum bis in die, & vinum album aquosum insuper bibendum. Qua verò parte dolor constitit, calefactoria adhibe. to, & calida lauato, si non febris multa vexet. Postquàm autem quatuordecim dies præterierint, in prandio quidem summat milium, ad vespertinam verò carnes catalinas, aut volucrum, coctas edat: & de iusculo sorbeat. Cibis autem quàm paucissimis primis diebus vtatur.

Tuberculum in pulmone.

B **Q**Uum tuberculum in pulmone natū fuerit, tussis tenet, & erectæ ceruicis spiratio, & dolor ad pectus acutus, & ad lacera, & vsq; ad quatuordecim dies ita afficitur. Nam ple risq; per tot dies tuberculi affectio inflammatur. Sed & caput dolet & palpebras, & videre non potest: & corpus subfuluum fit, ac venis impletur. Hūc multa calida lauato, & aquā Medela. mulsam aquosam bibendam dato, & ptisanæ succum sorbendum, & vinum aquosum insuper bibendum. Si verò dolor vrgeat, calefactoria adhibeto. Vbi autem sedatus fuerit, cibis mollissimis vtatur. Quòd si liberatū à morbo, spirandi difficultas corripiat, dum ad accliuem locū recta pergit, aut aliàs festinat, pharmacū dato, à quo inferna alius non moueatur. Et si vnā cum vomitu pus sequatur, si quidē pus fuerit albū, & fibræ in ipso subcruentæ fuerint, effugit. Si verò liuidum, & cum virore pallidum, ac graueolens, moritur. Purgantur autem in quadraginta diebus ab ea qua erupit. Multis etiam annus fit morbus. Hunc velut suppuratum curare oportet. Quòd si non erūpat (multis enim progressu temporis abscedit ad latus, & extumescit) hunc si hoc fiat secato aut vrito.

Pulmo repletus.

SI pulmo repletus fuerit, tussis tenet, & erectæ ceruicis spiratio, ac anhelatio, & linguam exurit, rubicundis circulis in tibiis repletur, & pruritus vexat, & dolor acutus emergit ad pectus & scapulas, & non potest sedere, neque iacere, neq; stare, sed agris viribus est. Hic quarta die maximè moritur. Curatio. Si verò hanc euaserit, spes plerunque est, periclitatur tamen etiam in septima. Si verò hanc effugerit, sanus euadit. hunc
vbi

Hippocratis Liber I I.

vbi ita habuerit, multa calida bis in die lauato, & vbi dolor **D** habuerit, calefactoria adhibeto. Et mel & acetū cocta bibenda dato, & ptisanæ succū sorbendum, ac vinū insuper bibendum. Si verò ad balneū & calefactoria affligatur, & ipsa non sustineat, perfrigeratoriū ipsi adhibeto: & fauū mellis aqua frigidissima macerato, aquāmq; bibendā dato. Et decumbat ad frigus. Hæc faciat. Morbus autem grauis est & lethalis.

Pulmo ad latus prolapsus.

Si pulmo ad latus prolapsus fuerit, tussis tenet, & erectæ ceruicis spiratio, & saliuam tussiendo reicit albam & dolor ad pectus & dorsum emergit, & incumbēs pulmo impellit, & graue quiddam in pectore incumbere videtur, & dolores acuti pungunt, & sanguis stridet velut pellis, & spirationem cohibet, & ad affectum quidem latus decubitū sustinet, non autem ad sanū: verū veluti graue quiddā ipsi de latere **E** pendere videtur, & per pectus transpirare se putat. Hunc calida multa bis in die lauato, & aquā mulsam ipsi bibendam dato. Post balneum, vinum album, cum modico melle misceto, & dauci ac centaurij semina trita his diluito, & tepida hæc sorbenda præbeto. Et infusam aquam calidam in vtriculo aut vesicam bubulam, ad latus apponito, & fascia pectori alligato. Decumbat in latus sanum. Ptisanæ succum tepidum præbeto, & vinum aquosum insuper bibendum. At si ex vulnere hoc fiat, aut suppurato secto (fieri enim in his solet) huic vesicam ad fistulam alligatam flatu impleto, ac intro **F** mittito, & penicillum solidum stanneum indito, ac vterius propellito. Sic curationem instituens, maximè profeceris.

Lateris tuberculum.

Qum in latere tuberculum fit, tussis emergit dura, & dolor, & febris, & grauitas in latere incumbit, & dolor acutus in eodem semper loco vrget, & sitis vehemens, & calidum potum auersatur, & in dolens latus decumbere non potest, sed in sanum. At vbi decumbit, velut lapis impendere ipsi videtur, & intumescit, & rubescit, & pedes intumescunt, hunc secato aut vrito. Postea pus emittito, vsque ad decimum diem, linamento ex lino crudo indito. Decima autem die pure omni emissio, vinum & oleum tepida immittito, vt ne derepentè resiccet, & linamento, ex linteolo vritor,

Curatio.

A tor, vbi verò id quod infusum est emisericis, aliud infundito, atque hæc per dies quinque facito. postquam autē pus tenue effluerit, velut ptisanæ succus ac modicum, ad manus contactum, stanneum penicillum indito, & vbi penitus resiccatum fuerit, linamento semper modicè præfecto, vlcus ad linamentum coalescere finito.

Hydrops pulmonis.

SI hydrops in pulmone fiat, febris & tussis tenet, & acervatim respirat, & pedes tument, & vngues contrahuntur omnes, & patitur talia, qualia is qui suppuratus sit, sed debilius ac diuturnius. Et si quid infundas, aut fomentū aut suffitum adhibeas, pus nō sequitur, atq; ex hoc sanè cognoveris, nō pus, sed aquam intus esse. Et si multo tempore aure ad latera adhibita audire tentaveris, ebullit intrinsecus velut acetum: & hæc quidem aliquandiu patitur, postea erumpit ad aluum, & statim quidem sanus esse sibi videtur, ac à morbo liberatus. Verum progressu temporis aluus incenditur, eademque illa patitur, & adhuc amplius. Aliqui etiam intumescunt ventre, scroto, ac facie. Et quidam ab inferna aluo id esse putant, quum videant ventrem magnum, & pedes tumentes. Intumescunt enim hæc, si sectionis tempus transgrediaris. Hūc si quidem extra intumuerit, inter costas sectum curare oportet. Si verò non intumuerit, multa calida lotum velut suppuratos collocato, & qua parte strepitum perceperis, ea secato quā potes infimo loco, quo effluxio facilis contingat. Postquam secueris, linamentum ex lino crudo indito, ita vt crassum & acutum linamentum facias, & sanguinem paucissimum parcè emittas. Et si quidem in linamento pus adhæserit quinta die, plerunque euadit. Sin minus, vbi aqua exhauseris, sitis corripit & tussis, & moritur.

Curatio
qua.

Pectus aut dorsum ruptum.

SI pectus aut dorsum fuerit ruptum, dolores tenet pectus ac dorsum perpetuò, & calor aliàs atque aliàs corripit, & salivam subcruentam tussiendo reiecit, & velut pilus cruentus per salivam transcurrit. Atque hæc maximè patitur, si manibus quid laborarit, aut in currū aut equum inscēderit. Hunc ante & retrò vritò ex partibus utroq; loco, & sic sanus euadit. Cæterum per annū à labore se contineat, & ab vstura

Curatio.

y

pingue

pinguefaciendo corpori studeat.

Febris ardens.

Febris tenet, & sitis vehemens, & lingua aspera, & nigra, & cum virore pallida, & sicca, & vehementer rubicunda: & oculi cum virore pallidi sunt, & excrementum egerit rubicundum & cum virore pallidum, taleni quoque urinam mingit, & multum sputat. Saepe etiam transmutatur velut ad peripneumonia, & delirat. Ex qua recognoueris quod peripneumonia sit. Hic si quidem peripneumonicus fiat, & quatuordecim dies transgrediatur, sanus fit. Si vero in decem & octo diebus peripneumonicus fiat, si non impurgatus permanens suppuratus fiat, aquam de crassa farina in ipsa macerata bibat, & acetum album quam odoratissimum postea bibat, & ptisanam succum sorbeat bis in die, si vero debilis fuerit, ter. & vinum vinosum, album, aquosum insuper bibat, & quam minimum lauet. At si suppuratus fiat, velut suppuratum curato.

peripneumonicus.

Medela.

Febris singultiens.

Febris detinet vehemens, & rigor, & tussis, & singultus, & una cum saluta grumos sanguinis tussiendo reiecit, & septima die moritur. Si vero decem dies effugerit, melius habet. Verum vigesima suppuratur, & primis diebus pus modicum tussiendo reiecit, deinde amplius. Purgatur autem in quadraginta diebus. Huic primis in diebus acetum & mel cocta bibenda dato, & postea acetum & aquam ammisceto, quo aquosior potio fiat. Et ptisanam succum modico melle ammixto sorbeat, & vinum album vinosum insuper bibat. Postquam autem decem dies praterierint, si febris sedetur, & sputum purum sit, ptisanam integram sorbeat, aut milium. At si vigesima die pus sputat, saluam, & rutam, & satyriam, & organum, ac hypericum, singula equis portionibus cotusa ac cribrata permisceat, ita ut omnium citius parui siue cochlearis marinis sit mensura, & polentae tantum. Hanc ieiunus in vino dulci temperato bibat. Et si hyems sit, aut autumnus, aut ver, sorbitionibus utatur. Si vero aestas, minimè. Verum amygdalas, & cucumeris semine torrefactum, & sesamum, singula aequis partibus, ut in totum sit cochlearis marinae mensura terat, & aquae heminam Aegineam affundat, & farinam ac fauam inspergat. Hanc post potum sorbeat. Cibis utatur pinguibus & salis, & marinis magis quam carnibus.

Ptisana integra.

Potio quæ.

Calida

A Calida lauet, minimè verò caput. Hæc faciens à morbo liberatur.

Morbus lethargus dictus.

T Vfsis oboritur, & saliuam spuit multā ac liquidam, & nugas garrit, & vbi nugari defierit, dormit: & recremētum malè olens egerit: huic aquam de macerata in ipsa farina crassa bibendam dato, & vinum album vinosum postea bibendum, & prisanæ succum sorbendum Verū huic mali punici succum ammisceto: & vinum vinosum album insuper bibat, & ne lauet. Hic in septem diebus moritur, Si verò has effugerit, sanus euadit.

Curatio.

Morbus siccatorius appellatus.

N Eque sine cibo esse neque cibum acceptū tolerare potest. Verū vbi quidem sine cibo manet, viscera sugūt, & os ventriculi dolet, & aliās alia vomit, & bilem, & saliuā, & pituitam, & acria: & postquā vomuit, aliquantisper melius habere sibi videtur. At vbi cibū accepit, ructus adsunt, & cum rubore exardescit, & semper multum se cacaturū esse putat. Vbi verò ea gratia defederit, flatus prodit: dolor caput habet, & totū corpus velut aciculis pungi videtur, aliās alia parte, & crura grauiā sunt ac debilia, & consumitur, ac debilis fit. Huic medicamentum bibendum dato, primū deorsum purgans, postea supernè: & caput purgato, & à cibis abstineat dulcibus, & oleosis ac pinguibus, & ab ebrietatibus.

Medela.

C Vomat autē à succis, & à cibis, & pro anni tēpore, lac aut serum asininū bibendū præbēs, pharmacū insuper bibendum dato, vtro tandem magis opus esse tibi visum fuerit. Aestate & vere frigida lauet. Autumno autē & hyeme vnguēto vtatur, & deambulet, & modicè se exerceat. Si verò debilior sit quā vt exerceri possit iter, faciat. Et cibis frigidis ac aluū subeuntibus vtatur. Et si vēter nō egerat, molle infusum per clysterem iniicito. Morbus hic diurnus est, & cōsenescens, si ita futurum est, relinquit. Sin minùs, commoritur.

Febris interficiens appellata.

F Ebris tenet, & rigor, & supereilia impendere vidētur, & caput dolet, & vomit saliuam calidam, & bilem multā, quandoque etiam infra egerit, & loci oculos non capiunt, & dolor ad ceruicem & ad inguina emergit, & affectis viribus

y 2

bus

Hippocratis Liber I I.

bus est, & nugas garrit. Hic septima die aut etiam prius mor-
bitur. Si verò hanc effugerit, plerunque sanus fit. Morbus est
Medela. lethalis. Huic perfrigatoria adhibere oportet ad viscera,
& ad caput, & ordeum torrefactū vnā cū paleis fractū aqua
macerare, & de excolata aqua, mulsam facere, atq; hanc aquo-
sam bibendam dare. Cibum autē non offerre, neq; sorbitio-
nem, vsq; ad septimum diē, si non debilis esse visus fuerit. Si
verò sit, ptisanæ succum frigidum ac tenuē modicum, bis in
die exhibere, & aquā insuper bibendam. Postquā verò se-
ptem dies præterierint, & febris dimiserit, miliū lingat, Ad
vesperā cucurbitam, aut betas paucas sumat, & vinum albū
aquosum inde bibat, donec ad nonū perueniat diem. Postea
cibo quā paucissimo vtatur, miliū in prandio sumens. Bal-
neo donec dolor & febris affuerint, ne vtatur. Vbi verò cessa-
uerint, multa lauet. Quod si venter non egerat, molle infu-
sum per clysterem immittito, aut glandulas subdito. Quum
verò validus factus fuerit, molli pharmaco ad nares apposi-
to, aluum infrā purgato, postea lac asininum bibendū dato.

Morbus liuidus.

Febbris detinet sicca, & horror aliās atque aliās, & caput
dolet, & dolor viscera tenet, & bilem vomit, & quū do-
lor tenet, suspicere nō potest, sed grauatur, & venter durus
fit, & color liuidus, & labia, ac albæ oculorū partes liuescūt,
& aspectū præ se fert velut qui stangulatur. Quandoq; etiā
colorem transmutat, & ex liuido, cum virore subpallidus fit. **F**
Medela. Huic medicamentum & deorsum, & sursum purgans biben-
dum dato, & clysterem adhibeto, & à capite purgato. Et ca-
lida quā minimè lauet, sed & vbi lauerit, ad solem aprice-
tur. Serum etiam & lac asininum pro anni tempore bibat, &
cibis quā mollissimis vtatur & frigidis, abstīnēs ab acri-
bus & salsis: verū dulcioribus ac pinguioribus vtatur. Cæ-
terū hic morbus vt plurimum cū agro commoritur.

Morbus ructuosus.

Dolor corripit acutus, & dolitat vehementer, & ipse se-
ipsum iactat, & vociferatur, & frequenter eructat, &
vbi eructauit, meliūs habere sibi videtur. Sæpe etiam bilem
reuomit modicā, poculi parui mensura: & dolor corripit à
visceribus ad imum ventrem, & laterum mollitudinem, &
vbi

- A** vbi hoc factum fuerit, melius habere sibi videtur: & venter inflatur, ac durus fit, & strepit, & flatus non egreditur, neque stercus. Hunc si dolor habuerit, multa calida lauato, & *Medela.* calefactoria ipsi adhibeto. Vbi verò in ventre dolor ac flatus fuerit, clysterem adhibeto, & mercurialis coctæ succum, ad ptisanæ succum ammisceto, ac sorbendum dato, & vinum dulce, aquosum, insuper sorbendum. Cibus autem ne exhibeas, donec dolor remiserit, & vuarum expressarum retributa dulcia, per noctem in aqua maceret, & hanc aquam per sex dies bibat. Si verò vuarum expressarum retributa non habeat, mel & acetum cocta bibat. Postquam autem dolorem emouerit, medicamento deorsum aluum purgato.
- B** Cibis vtatur inde mollibus & aluum subeuntibus, & marinis magis quàm carnibus, carnibus autem volucrum & ouillis coctis: edat etiam betas & cucurbitam: ab aliis verò abstineat. Morbus hic si iuuenem corripit, tempore decedit: si senioremm commoritur.

Morbus pituitosus.

- C**orripit quidem morbus pituitosus etiam virum, sed magis mulierem, & est hæc quidem crassa & bene colorata, verum iter faciens debilitatur, & maximè si ad accliuè locum iter faciat. Corripit ipsam etiam febris tenuis, quandoq; etiam suffocatio: & euomit vbi ieiuna est, bilem & saliuas multas, sæpe etiam vbi cibum accepit, de cibo tamen nihil: & quum laborarit, dolet pectus & dorsum, aliàs alia parte, & rubicundis cutis eminentiis impletur, velut ab vrtica inustis. Huic medicamentum bibendum dato, & serum *Medela.* ac asininum bibat. Si verò serum poterit, medicamentum deorsum purgans ad plurimos dies præbibendum dato. Et si serum bibere desierit, lac asininum postea bibat, & dum hoc potarit, à cibis quidem abstineat, vinum verò quàm iucundissimum bibat, donec purgari desinat. At vbi à potione cessauerit, milium in prandio sumat. Vesperis cibo mollissimo vtatur ac paucissimo. Abstineat à pinguibus & dulcibus ac oleosis. Et aliàs atque aliàs, maximè tamen hyeme, à lenticulæ decocto vomat, oleribus præsumptis. Et calida quàm minimum lauet, sed & ad solem apriceretur. Morbus autem commoritur.

Hippocratis Liber I I.

Pituita alba.

D

INtumesceat totum corpus albo tumore, & venter ad cōtactum crassus est, & pedes ac femora tumēt, Tibiæ item ac scrotum, & acervatim respirant, & facies rubicunda est, & os siccum, & sitis tenet, & ubi cibū accepit, spiritus frequens incumbit. Hic eadē die quandoq; melius habet, quādoq; peius.

Curatio.

Huic si quidē venter sua sponte turbatus fuerit in principio morbi, proximus sanitati est. Si verò non turbetur, medicamentum deorsum purgans dato, à quo aqua purgetur. Et calida nō lauet, & sub dio exponatur, & scrotum ubi impletum fuerit secato. Cibis vtatur pane puro frigido, & beta, & piscibus scorpiis coctis, iusculo autem quā paucissimo. Et frigida omnia edat, & nō dulcia, neque pingua: sed trita & acida, & acria, excepto allio, cepa, & porro. Origanū verò & fatureiam multam edat, & vinū inde vinosum bibat, & ante cibum iter faciat. At si à medicamēto tumeat, clysterē adhibeto, & cibo, deambulationibus, & illuue præmito. Medicamenta verò quā paucissima exhibeto Verum sursum purgans nō prius dederis, quam tumores ad infernas partes descenderint. Quòd si extenuato iam ipso suffocatio in pectore oborietur, veratrū bibendū dato, & caput purgato, & postea deorsum purgās bibat. Morbus hic maximè à nullo discedit.

Cura, morbus difficilis.

IN visceribus veluti spina esse videtur, & pungere, & anxietas ipsum corripit, & lucē ac homines fugit, & tenebras amat, & timor inuadit, & septum trāuersum foris tumet, & ad contactū dolet, & expauescit, & terriculamēta ac somnia horrenda videt, & quandoque etiā mortuos. Et morbus hic ferè plurimos vere corripit. Huic veratrum bibendū dato, & caput purgato, & post capitis purgationē pharmacum deorsum purgans bibat, postea verò lac asininum bibat. Cibis vtatur quā paucissimis, si non debilis fuerit, & frigidis, & aluum subeuntibus, & nō acribus, neque falsis, neque pinguibus neque dulcibus. Et calida non lauet, neque vinum bibat, sed aquam maximè, aut saltem vinū aquosum. Neque exercitiis vtatur, neque deambulet. Hæc si fecerit, à morbo liberabitur temporis progressu. Si verò neglexerit, cōmoriatur.

Morbus niger.

NIgrum vomit veluti fecem, quandoque cruentū, quandoque

Adoque velut vinum secundarium, quandoque velut polypi atramentum, quandoque acre velut acetum, quandoq; salivam & pituitā, quandoq; bilem cum virore pallidam. Et vbi quidem nigrum cruentū vomuerit, cadaueris foetorem refert: & fauces & os à vomitu adurūtur, & dentes stupefcunt, & id quod vomitu reiectum est, terram eleuat. Et post quā vomuit, paululum melius se habere putat. Et neque sine cibo esse, neq; ampliozem cibum ferre potest. Verū vbi sine cibo manet, viscera fugunt, & salivę acidę sunt. Quum verò cibum accepit, grauitas in visceribus est, & pectus ac dorsum velut stilis pungi videntur, & dolor tenet latera, & febris debilis est, & caput dolet, & oculis non videt, & crura grauantur, & color niger est, & consumitur. Huic pharmacum bi-

Medela.

Btur, & color niger est, & consumitur. Huic pharmacum bibendum dato frequenter, & pro anni tempore & serū, & lac. Et à cibis abstineat dulcibus, & oleosis ac pinguibus, & frigidissimis ac maximè per aluum subeuntibus vtatur. Et caput purgato, & post medicamentorū portiones sursum purgantes, de manibus sanguinē detrahito, si non fuerit debilis. At si aluus nō egerat, molle infusum per clysterem immittito. Et abstineat ab ebrietatibus & venere. Si verò coierit, ieiunus fomentis vtatur. Et à sole abstineat, neque multum se exerceat, neque deambulet, neque calida lauet, neque acria edat, neque salsa. Hęc facienda sunt. Et vnā cū ætate aufugit etiam morbus, & cum corpore senescit. Si verò denigratus, fuerit commoritur. Alius morbus niger. Subfuluus & gracilis, & oculis cum virore pallidis fit, & tenuem cutē habet, ac debilis est. Quanto autem tempus amplius progreditur, tanto morbus amplius affigit. Et vomit omni tempore velut stillamentū modicum, ad duorum poculorum paruorū mensuram, & frequenter etiam cibum, ac vnā cum cibo bilem & pituitam: & post vomitum dolet totum corpus, aliquando etiam antea quā vomat. Et horrores tenues ac febris tenet, & ad dulcia ac oleosa maximè vomit. Hunc medicamentis sursum ac deorsum purgare oportet, & lac asinum postea bibendū præbere. Cibis autē vtatur mollissimis ac frigidis, piscibus littoralibus, & cartilaginei generis, & betis, & cucurbitis, & carnibus tritis. Vinum bibat album, vinosum, aquosius. Labore & deambulationibus vtatur, & calida ne lauet, & à sole abstineat. Atq; hęc sanè facienda sunt.

Medela.

Hippocratis Liber III.

Verum morbus lethalis quidem est, non autem consenescit. D
Morbus corruptorius.

Alia quidem omnia eodem modo patitur. Verum grum-
mos bilis concretos vomit, & deorsum similiter egerit,
postquam cibos excreuit. Caterum eadem facere oportet,
quæ in priore morbo relata sunt, & clysterem adhibere.

H I P P O C R A T I S

COI DE MORBIS LIBER

TERTIVS, IANO CORNA-

RIO MEDICO PHY-

SICO INTER-

PRETE.



E febris vniuersis à me dictum est, de
reliquis iam dicam.

Cerebri tumor.

Qum cerebrum ab inflammatione tu-
muerit, dolor totum caput occupat,
maximè qua parte constiterit inflamma-
tio: Coniistit autè in tēporibus: & aures sonitu implentur, &
auditus hebescit, & venæ extentæ sunt, ac pulsant. & febris
ac rigor aliquando corripunt, & dolor nunquam deficit, sed
quandoque remittit, quandoque magis premit, & vocifera-
tur ac exilit præ dolore. Et vbi surrexit, rursus ad lectū de-
cumbere festinat, & iactat seipsum. Hic lethaliter quidem
affectus est, in quot verò diebus morietur, non habet iudica-
tionem. Nam alij aliter pereunt. Plerunque tamen in se-
ptem diebus moriuntur. Si verò vigesimum primum effu-
gerint, sani fiunt. Quum itaque dolor vexarit, frigefacere
caput oportet maximè quidem per rasuram, aut frigefacto-
rio aliquo, velut est solani succus, & terra figularis, in vesti-
cam aut folliculum immisso, ita vt vicissim modo apponas,
modo auferas, priusquam tepescant. Sed & sanguinem de-
trahere oportet, & caput purgare, ad apij succos odoratis
ammixtis. A vino autem in totum abstinere. Prisanæ suc-
cum

Medela.

A cum sorbere, & infernam aluum soluere.

Cerebri repletio dolorosa.

QUum doluerit caput præ cerebri repletionem, vitiosorum humorum purgationem non factam esse significat, & dolores totum caput tenent, & delirat, & moritur septima die, & euadere non poterit, si non eruperit humor septima die per aures. Sic enim & dolor sedatur, & resipiscit. effluit autem multus & inodorus. Huius aures priusquam pus erupisse videris, potius ne curato. Si verò supernam ac infernam *Medela.* aluum purgare voles, seorsum utramque soluito. Postea capiti maximè quidem vniuerso, sed, & per aures, & per nares, fomentum adhibeto. Sorbeat autem prisanæ succum, & à vino abstineat in totum. Postquam verò eruperit pus, continuo te donec multa fluxio sedetur, postea aures colluito vino dulci, aut lacte muliebri, aut oleo veteri, atque hæc tepida infunduntur. Caput verò frequenter mollibus ac odoratis fomentis foueto, quo citius cerebrum purgetur, hic primùm quidem non audit, progressu verò temporis & fluxio minor fit, & auditus vnà cum fluxione penitus quiescente contingit, & maximè sibi ipsi similis redit. Cauere autem oportet solem, ventos, ignem, fumum, acrium odores, & alia huiusmodi: & quiescere, ac molli victus ratione uti. Sit autē aluus inferna præ vasorum vacuatione solutu facilis.

Syderati.

CVI isti ac syderati esse dicuntur, quum cerebrum multa immundicia vitiosorum humorum repletum fuerit. anterior capitis pars primùm dolorē ipsis exhibet & suspicere non possunt, aliqui ambobus oculis, aliqui altero, & sopor ipsos tenet, & desipiunt, & tempora saluunt, & febris tenuis habet, & corporis impotentia. Hic tertia aut quinta die moritur, & ad septem non deuenit. Si verò deuenierit, à morbo *Medela.* liber euadit. Hunc si curare voles, capiti fomenta adhibeto, & sectione facta transpirationem effcito. Si verò dolor tenuerit, etiam sternutationes inducere oportet, & caput purgare leuibus ac odoratis, infernam item aluum purgare. A vino autem penitus abstineat, & prisanæ succo utatur.

Cerebri corruptio.

SI cerebrum corruptum fuerit, dolor caput tenet, & per collum procedit ad spinam, & æger non audit, & frigus

y s

ad

Hippocratis Liber I I I.

ad caput deuenit, & totus intumescit, & derepente priuatur D
voce, & ex naribus sanguis fluit, & liuidus fit. Quod si mor-
bus leuiter corripiat, ubi sanguis discessit, melius habet. Si
Medela. verò vehementer correptus fuerit, cito perit. Huic sternuta-
tiones per odorata inducito, & aluum vtranque, aut alteram
saltem purgato. & odorata quæ leues odores habent, naribus
ad moueto. & sorbitionem tenuem ac tepidam exhibeto. Ab-
stineat autem penitus à vino.

Lethargus.

MOrbi lethargi appellati status idem est, qui & peri-
pneumoniæ. Verum difficilior, & non omnino liber
ac remotus est ab humida peripneumonia. Sed multo tar- E
dior est morbus. Patitur autem æger hæc, Tussis & sopor
ipsum tenet, & saliuam liquidam ac multam educit, & vehe-
menter impotens est: & quum moriturus est, multum arque
Medela. id liquidum infraegerit. Huic valde exigua vitæ spes est.
Attamen hoc curandum est vt plurimum spuatur, & calefiat, &
à vino abstineat. Si verò effugerit, suppuratus fit.

Morbus siue febris ardens.

IN morbo febris ardente appellato, sitis tenet multa, & lin-
gua horret. At color eius primo quidem tempore est velu-
ti solet, verum sicca est. Progressu verò temporis induratur,
exasperatur, crassescit ac nigrescit. Si verò in principio hæc
patiantur, citiores iudicationes fiunt, Si posterius tardiores.

Caterum remissionis eadem omnia signa lingua exhibet, F
quæ in peripneumonia: & vrinæ biliosæ aut cruentæ, dolore
ampliorem: flauæ verò, minorem significant. & sputum præ
caliditate ac ficcitate, combustum ac crassum est. Sape verò
etiam in peripneumoniâ transit, quod si cõtigerit, breui mo-
Medela. ritur. Hunc hoc modo curare oportet, Calida bis aut ter sin-
gulis diebus lauato, capite excepto. At in iudicationibus la-
uare non oportet. Et primis quidem diebus deorsum purga-
to, & aquam bibedam dato. Nam plerunque vomitum aqua
ciere solet. Posterioribus verò post purgationem humecta-
to, & sorbitionibus vtatur, ac vinis dulcibus. Quod si non ab
initio ægrum curandum susceperis, sed signis iam in lin-
gua existentibus, finire oportet donec iudicationes præ-
terierint, & linguæ signa mitiora facta fuerint: & neque
medica

A medicamentum dederis, neque ad purgationem faciendam clysterem adhibueris priusquam iudicationes prætereant.

Pulmo tumens præ calore.

Q Vum pulmo tumuerit præ nimio calore repletus, tussis tenet fortis & dura, & erectæ cervicis spiratio, & acuatim respirat, & frequenter anhelat, & intumescit, & nares expandit, velut equus ex cursu, & linguâ frequenter exierit, & pectus ipsi canere videtur, & grauitas in ipso inesse. Quapropter hanc capere pectus non potest, sed dirūpitur & impotēs fit, & dolor acutus emergit, & dorsum, & pectus, & lātēra velut acubus punguntur: & ardēt hæ partes velut eius qui sedeat ad ignem & rubores exoriuntur ad pectus & dorsum, velut
B à flamma, & morsus fortis incidit, & angustia, vt neq; stare, neq; sedere, neq; decūbere possit. Verūm ita velut desperatis rebus anxius iactat seipsum, & iam mori videtur. Moritur autem maximè quarta aut septima die, quas si effugerit, non valde perit. Hunc si cures infernā aluum quā citissimè clysteri adhibito, probe purgare oportet, & de cubitis, & naso, & lingua, ac de omni corporis parte sanguinem mittere. Potiones item frigefacientes exhibere & sorbitiones idē præstantes. Danda sunt & vrinam cientia sæpe, sed quæ non calefaciant. Et ad ipsos quidem dolores quum irruūt, calefactoria leuia ac humida adhibendo, locum calefacere ac humectare oportet, vbicunq; dolor fuerit: ad reliquas verò partes, frigefactoria adhibere, vicissim ea apponendo ac tollendo, & vbicunque arserit frigus facere. A vino autē penitus abstinere.

Medela.

Capitis dolor.

Q Vum à capite initio sumpto, dolor acutus statim vocē interceperit, tum aliàs, tum si ex ebrietate hoc contingat, ita affectus septima die moritur. Minus tamen moriuntur qui ex ebrietate tale quid perpessi sunt, & voce priuati permanserunt. Nam si eadem die, aut postera, aut tertia vocem edant, sani euadunt. faciunt autem hoc aliqui ex ebrietate, & neutri moriuntur. His sternutationes fortes inducere oportet, & infusum per clysterem iniicere, quod bilem vehementer ducat. Quòd si sensum æger receperit, Thapsiæ succū in multa calida aqua dato, quo quā citissimè reuomat. Postea attenuato, & à vino prohibeto per septem dies. Detrahendus est & à lingua sanguis, si venā cōprehendere possis.

Medela.

Phreni

Phrenitides fiunt etiam ex aliis morbis. Patiuntur autem ægri hæc: septū transuersum dolēt, vt ne cōtingere quidē permittāt, & febris accedit, & mente mouētur, & intēris oculis vidēt, & alia similia faciūt his qui peripneumonia affecti sunt, vbi sanē in peripneumonia mente mouētur. Hoc modo affectū calefacere oportet calefactoriis humidis & potionibus, excepto vino. Et si quidē fieri poterit, sursum purgare, & per tussim ac spuitionē educere oportet, quēadmodum in peripneumonia. Sin minus, inferna aluus præparāda est, vt egerat. Humectato autē potionibus, hoc enim cōducit. Morbus autē lethalis est. Moriūtur eīm tertia, aut quinta, aut septima die. Si verò leniter corripiat, iudicat velut peripneumonia.

Medela.

E

Angina.

AB angina appellata suffocatur homo, & in faucibus magis ipsi inhaerere videtur, & neque saliuam, neque quicquam aliud detrahit, & oculi affecti sunt ac prominent, velut strangulatis, & intentē per ipsos videt, & ipsos conuertere non potest, & anxius est, & exilit frequenter, & facies & fauces ardent, imo etiam collum. At videntibus nihil mali habere videtur, & videt ac audit obtusius, & præ suffocatione non intelligit, neque quid dicat, neque quid audiat, aut faciat. Verū hians decumbit saliuam fundens, ac talia faciens. Hic quinta, aut septima, aut nona die moritur.

F

Leuis angina paracynanche appellata.

AT vbi horum signorum quid abfuerit, laxiorem morbum significat, quem paracynanchen vocant. Huic venam secare oportet, maximē sub mamma. Concomitatur enim hac parte ex pulmone spiritus calidus. Oportet quoque deorsum purgare medicamento, aut per clysterem. Fistulas item detrudere conuenit in fauces iuxta maxillas, quo spiritus ad pulmonem trahatur. Et faciendum vti quā citissimē spuat, & pulmo gracilis fiat. Et suffitus fiat per hyssopum Cilicium, sulphur, & bitumen: & attrahat & per fistulas, & per nares, vt exeat pituita. Fauces & lingua cōfricentur his quæ pituitam ducunt. Et venæ sub lingua secantur. Sed & à cubitis sanguis dimittatur, si vires validæ fuerint. A vino abstinere, & pitisanæ succū tenuem sorbeat. Postquā verò remiserit

Medela.

A ferit morbus. & iam cibos gustarit, elaterio recenti purgato, ut ne in aliud malum incidat.

Morbus regius.

Morbus regius huiusmodi acutus est, & citò occidit. Color totus mali corium valde refert, & cum virore pallidus est, quales sunt lacerti cum virore pallicates. Confinile est etiam corpus: & in vrina subsidet velut eruum fuluum, & febris ac horror debilis habet. Quandoque etiam vestimenta ferre non potest, sed mordetur ac raditur. Et mane quum cibum non accepit, viscera plerumque lancinantur. Et quum quis ipsum excitat, aut alloquitur, non patitur. Hic plerumque in quatuordecim diebus moritur. Has si effugerit, sanus euadit. Oportet autem ipsum calida lauare, & aquam mulsam bibendam dare, ita ut de nucibus Thais decorticatis, & absinthij coma, æquis portionibus acceptis, & de aniso cribrato dimidia parte ammixta, obolos tres ieiunus ex illa bibat, & rursus dum cubitum it, hanc aquam mulsamumat. Bibat etiam vinum vetus tenue, & sorbitionibus utatur. Nec à cibis abstineat.

Medela.

Tetanus.

Quam distentiones Tetani appellati, corripuerint, maxillæ rigent velut ligna, & os aperire non possunt, & oculi lachrymantur ac distorquentur, & dorsum riget, & crura contrahere non possunt, similiter neque manus, & facies rubicunda est, & valde dolet, & ubi moriturus est, & potum, & sorbitionem, & pituitam per nares reuomit. Hic tertia die, aut quinta, aut septima, aut decima quarta perit. Vbi verò has effugerit, sanus euadit. Huic catapotia ex pipere & veratro nigro deuoranda dato: & iusculum volucrum pingue calidum. Inducenda sunt etiam fortes ac multæ sternutationes, & fomenta adhibenda. Quum autem fomentis non utitur, calefactoria humida ac pingua vndequaque in vesicis ac vtriculis apponantur, maximè tamen ad partes dolentes, & calido oleo multo ac sæpe illinatur.

Medela.

Opisthotonos.

Quam autem distentio in posteriores partes, opisthotonos appellata tenuerit, reliqua quidem plerumque eadem sunt. Verum in posteriores partes conuellitur, & vociferatur aliquando, & dolores emergunt vehemētes, & crura inter

Hippocratis Liber I I I.

interdum contrahere non permittit, neq; manus extendere. **D**
Sunt enim cubiti incuruati, & digiti in pugnum cōtracti, &
pollicē plerunq; aliis digitis cōtinet, & clamat, & nugas gar-
rit quandoq;, & non potest seipsum continere, sed aliquando
exilit, vbi dolor premit, quum verò dolor remittit, quietem
habet. Aliquando etiā vox intercipitur simul vt morbo corri-
piuntur, aut insani & atra bile perciti fiunt. Hi tertia die mo-
riuntur voce soluta, & reuomūt per nares. Si verò effugerint
decimumquartum diem, sani fiunt. Curādus hic est velut su-
Medela. perior. Quòd si voles, etiam sic facies. Aquam frigidam plu-
rimam superfundito, & postea vestimenta tenuia, pura, ac ca-
lida superintegito. Ignem autem tunc non adhibeto. Hoc au-
xilium & ad tetanos, & ad opisthotonos adhibere oportet. **E**

Voluuli.

Voluuli fiunt quum supernus ventriculus calescit, infer-
nus verò frigescit. Resiccatur enim simul intestinum,
& prae inflammationis caliditate obturatur, vt neque flatus,
neque cibi pertranseant, sed venter durus sit, & quandoq; vo-
mat, primum pituitosa, deinde biliosa, postremū stercus. Et
ager sitim habet ac dolorem, maximè circa prae cordia. Ve-
rū & totum ventrem dolet, & inflatus est, & anxius est, & fe-
Medela. bres corripunt, & fiunt maximè septima die. Hos sic curare
~~oportet~~. Supernum ventriculum quā citissimè purgato, &
sanguinē de capite ac cubitis detrahito, vt superna aliū ca-
lescere desinat, & ~~partes~~ supra septum transuersum frigefa-
cito, excepto corde. Infernas autem calefacito, homine in so-
lio aquae calidae collocato, ac semper oleo illito. Calefactoria
quoque humida apponito. Et glandulam de melle solum de-
cem digitorum longitudinis facito, & ex summa anteriori
parte fel taurinum oblitito, atque sic bis ac ter subdito, quo
omnia combusta stercora circa rectū ac princeps intestinum
contenta educas. Et si quidem sic obdierit, postea clysterem
adhibeto. Sin minus, follem fabrilē indito, & in ventrē fla-
tum immittito, à quo & ventrem, & intestini contractionem
distendas. Deinde extracto folle, clysterem adhibeto. Sit au-
tem infusum per clysterem iniiciendum paratū non ex val-
de calefactoriis, sed ex his quae stercora dissoluunt ac colli-
quant. Postea obturata per spongiam fede, in aqua calida de-
sineat

A fideat continens clysteris infusum. Et si hoc infusum susceperit, & rursus dimiserit, sanus euadit. Caterum priore tempore mel optimū delingat, & vinum splēdidum vernaculū bibat. Quod si voluulo amoto, febris ipsum corripit, desperatus est. Fortassis enim & inferna alius soluta ipsum occiderit.

Desperatio
huius mor-
bi quando.

Peripneumonia.

Peripneumonia talia facit. Febris acuta tenet, & spiritum frequentem ac calidum respirat, & anxietas adest, & impotentia, & iactatio, & dolor sub scapulas, & ad clauiculam, & ad mammam, & grauitas in pectore, quādoque etiam delirium. Quidam dolorem non sentiunt, donec tussire inceperint, Verum hic morbus diuturnior ac difficilior illo est. Saliuam tenuem, ac spumofam primū spuit. Lingua flaua est. Verum progressu temporis nigrescit. Si igitur in principio nigrescat, citius morbus finitur. Sin posterius, tardius. Tandem verò etiam rumpitur lingua, & si digitum apponas in heret. At liberationem à morbo significat lingua, similiter velut in pleuritide. Hæc autem patitur homo, minimū diebus quatuordecim, ad summū vna & viginti, & per hoc tempus tussit vehemētē, & vnā cum tussi purgatur, primū saliuam multa & spumosa. Septima verò & octaua die vbi febris in vigore fuerit, si humida sit peripneumonia, crassior prodierit: sin minus, non. Nona verò & decima, cum virore pallida ac subcruenta. Duodecima autem vsque decimam quartam, multa & purulenta. Atque hoc in his contigit, quorum naturæ & corporis affectiones humidæ sunt, & morbus fortis est. Quorum verò & natura, & morbi cōstitutio sicca est, in his minus. Si quidem igitur decima quarta die resiccatus fuerit, & non amplius purulentum tussiendo reiecerit, sanus est. Sin minus, ad duodeuigesimam, & vigesimam primam animum aduerte, & si quidem tunc sputum illud quieuerit, euadit. Sin minus, interroga ipsum, an dulcior sit saliuam, & si affirmauerit hoc, scito pulmonem ipsi suppuratum esse, & morbus annū durabit, si non in quadraginta diebus pus eduxerit. Si verò insuauem saliuam esse dixerit, status morbi lethalis est. Verū in primis diebus hi maximè manifesti fiunt. Si enim putrefactum ac purulētum expuerit in diebus duobus ac viginti, & non exulceratus fuerit, euadit. Si minus, non.

Purulenti
pulmonis
signa.

non. Hæc peripneumonia nihil abest ab affectionibus quæ in D pulmone sunt. Si igitur aliquid harum affectionum abfuerit, cognoscere oportet & quæ ægrotus mala habeat, & quæ medicus aggredi debeat. Si verò pauca horum signorum habuerit, ne decipiatur. Nam perniciofa non est peripneumonia, sed mollis. Cæterum peripneumoniam hoc modo curare oportet.

Curatio.

Non tamen peccabit, si quis etiam pleuritidem & phrenitidem ita curare aggrediatur. Primum caput leuius facere incipe, quo nihil influat ad pectus. Primis autem diebus sorbitiones sint dulciores. Sic enim id quod confedit ac compactum est potissimum elueris ac commoueris. Quarta die & quinta ac sexta, non amplius dulces, sed pingues. Nam ad sputum sursum excreandum conducunt. Si verò pro ratione spuere non possit, ex pharmacis sursum educentibus dato. Aluum autē in primis quatuor aut quinque diebus subducere oportet, & hoc paulò amplius, quo & febres obtusiores sint, & dolores leuiores. Quum autē euacuatus fuerit, & corpore debilis, infernam aluum tertio quoque die deorsum commoueto, quo & corpus potens sit, & supernæ regiones humoris exortes. Nam si multus humor infra secedat, à quinta die, mortem inducit. Infra enim humore secedente, supernæ partes resiccantur, & sputi purgatio sursum non prodit. Oportet igitur & infernam aluum, neque valde suppressam esse, ut ne febres sint acutæ: neque valde egerere, quo salua sursum educi possit, & æger viribus valeat. At medicamenta sursum educentia, sexta & septima ac nona die, & morbo adhuc ulte rius progresso, magis exhibeto. Sit autem medicamentum veratrum albū, thapsia, elaterium recens, singula æquis portionibus. Quod si salua non probè purgetur, & spiritus fuerit frequens, & purgatio non præualeat, prædicendū est nullam spem vitæ reliquā esse, si purgatione nihil efficere possit. Sed & alia facienda sunt quæ in peripneumonia fieri solent, si inferna alui ministerium suum probè obierit. Quin & aliter facere curationem oportet. A prima die initio sumpto, ari magni conchulam maiorem dato, dauci & vrticæ vtriusque itidem vnam, sinapis & rutæ quātum tribus digitis comprehendere potes, & succum silphij magnitudine fabæ. Hæc in aceto dulci & aqua permixta & diluta ac excolata, ieiuno tepida bibenda dato. Postquam verò purum expuere cœperit

Venter nimis solutus quinto die necat.

Curatio altera.

A cœperit, ari cōchulam maiore, & fefamū, & amygdalas purgatas, in aceto dulci aqua diluto bibēda præbeto. Si verò magis ducere voles, radicis Capparis corticem his ammisceto.

Pleuritis.

QUum pleuritis apprehēderit: hæc patitur. Dolor latus, & febris & horror tenet, & frequentē spiritum habet, & erectæ cervicis spiratio vrget, & tussiendo reiicit subbiliosa, velut à mali punici corio, si non ruptiones habuerit. Si verò habuerit, etiam sanguinem à ruptionibus. Est autem & sanguinea pleuritis, in qua subcruenta reiicit. Et est quidem biliosa mitior, si non ruptiones æger habeat: sin minus, dolorosior quidem est, sed non lethalior. At sanguinea fortis, & **B** dolorosa, & lethalis est. Quum igitur affuerit simul singultus, simulque cum saliva sanguinis grumos nigros tussiendo reiecerit, septima die moritur. Si verò dies decem transgressus fuerit, à pleuritide quidem sanus fit, verum vigesima suppuratur, & pus tussiendo reiicit, demum verò reuomit, & non adeò facilis curatu est.

Pleuritides sicca.

SUNT & sicca pleuritides sine spūto, Verum hæc difficiles sunt. Iudicationes autem similes aliis sunt, sed ampliore in potu humectatione opus habent quàm aliæ. Biliosæ verò & sanguineæ, nona & vndecima die iudicant, atque hi magis sani fiunt. At si à principio quidem molles quidam tenuerint dolores, à quinta verò ac sexta die acuti, hi vsq; ad duodecimum perueniunt, & non valde effugiunt. Periculum autem maximè est, vsque ad septimum. Imò etiam vsque ad duodecimum. Post has verò sanantur. Quæ verò ab initio molles sunt, à septima autem & octaua acutæ, ad decimum-quartum iudicant, & sani fiunt.

Pleuritis ex dorso.

PLEURITIS ad dorsum intantū ab aliis differt, dorsum dolet velut ex plaga, & suspirat, & aceruatim respirat. statim autem sput pauca, & corpus delassatur. Tertia aut quarta die saniem mingit subcruetam. Moritur autem maximè quinta die: sin min⁹, septima. Has si effugerit, vixerit, Et morbus lenis est ac minus lethalis. Custodire tamē oportet vsque ad decimumquartum. Postea verò sanus euadit. Caterum

z quib

Hippocratis Liber III.

quibusdam pleuriticis salua quidē pura est, mīctio autem **D**
 cruenta, velut serosa à carnibus affatis sanies, dolores verò
 acuti per spinam ad pectus, & ad inguem tendunt. Hic si se-
 ptimū diem effugerit, sanus fit. At si alicui in his pleuritidi-
 bus cōtingat dorsum rubesceri, & humeros calefacere, & in-
 ter desidendum grauari, & vēter exturbetur egestione cum
 virore pallida ac valde graueolenti, hic propter ventris ege-
 stionem, vigesima prima die moritur. Has si effugerit, sanus
 fit. Quibus autem statim sputa varia sunt, & dolores valde
 acuti, hi tertia die moriuntur. Hanc autem transgressi, sane-
 scunt. Qui verò sanus non fit septima, aut nona, aut decima,
 hic suppurari incipit. Melius est autē suppuratum fieri, etiā si
 dolorosum sit, Minus enim lethale est. Porro supra omnia re **E**
 lata signa, in vnaquaque pleuritide considerare oportet lin-
 guam. Si enim bulla subliuida fiat in lingua, velut ferro in
 oleum tincto, si quidē in principio fiat aspera, difficilior est
 morbi emotio, & necesse est sanguinem tussiendo reiicere,
 in diebus quibus id fieri oportet. Si verò facta morbi pro-
 gressu fiat. iudicationes quidem contingent ad decimum-
 quartum diem, Verū necesse est sanguinem spueri. **Medela.** **F**
 autē se res de liberatione ab hoc morbo, hoc modo. Si quidē
 tertia die inceperit maturari ac expui, citius liberabitur. Si
 verò posterius mature scat, posterius iudicationes fiunt, quē-
 admodum in capitis signis. Dolores porro in omni pleuriti-
 de, plerunque magis interdiu quā noctu leuiore sunt. Cu
 rare verò pleuritidas hoc modo oportet, vt plurimum velut
 phrenitidem & peripneumoniam, præterquam quòd hic bal-
 neis calidis & vino dulci vtendum est. Si igitur prima aut se-
 cunda die postquam inuasit agrum, accesseris, si sterus pro-
 diit purum, aut leuiter biliosum & modicum, infusum ex
 Thapsia per clysterem iniicito. Si verò aliud commota, no-
 ctu quidem egerat, postridie verò dolor & tormen vexet, rur-
 sus clysterem adhibeto. At si æger biliosus sit natura, & non
 purgatus correptus fuerit à morbo, priusquam saluam bi-
 liosam expuat, etiam medicamento bilem probè purgato.
 Si verò iam expuat biliosa, medicamentum ne dederis. Si e-
 nim dederis, sputum sursum prodire nō poterit, sed septima
 aut nona die suffocabitur, maxime si præcordia doleant.
 Quod si ad dolores in lateribus etiam præcordia doleant,
 clyster

A clysterem adhibere oportet, & in potu ieiuno bibendam dare, Aristolochiam, hyssopum, cuminum. silphium, peplum, mecona appellatum album, florem æris, mel, acetum, & aquam. Et per medicamenta quidem ita primas curationes facere oportet. Reliqua verò sic se habent. Multa calida pro viribus ægri lauato, capite excepto, & quum iudicationes sunt, dolentes locos humidis fomentis tepefacito, & oleo illinito. Quum verò impetu fertur morbus, & ægrum & medicum à curationibus quiescere conuenit, ne quid mali inducatur. Dandus autem est ptisanæ succus coctus, aliquanto crassior spissitudine mellis. Post balnea etiam vinum dulce & aquosum bibendum est, non frigidum, modicum, ex angustiori pocillo, & ubi tussis inuaserint, amplius bibendum & quam maximè exscreandum, & putu humectandū, quo pulmo humidior factus, facilius ac citius sputum reddat, & tussis minùs affligat. Sed & mali punici dulcis vinosi succum, lacte caprino modico, & melle ammixto, paulatim sæpe dato, & noctu & interdiu, & somnum quam maximè prohibeto, quæ purgatio & citius & copiosior fiat. At verò sanguineam pleuritidem sic curare oportet. Post iudicationes cibis leuibus reficito, & quietem agat, & nimium caueat solem, ventros, repletiones, acida, salsa, pingua, fumum, flatum in aluo, laborem, venerem. Si enim morbus recidiuarit, mors sequetur. In expuitionibus autem si dolor habeat, & expuere non possit, ieiuno æris florem dato, magnitudine oliuæ, & succi silphij dimidium eius, & trifolij seminis modicum. Hæc ex melle delingat. Aut piperis grana quinq;, & succi silphij magnitudinem fabæ, mel, acetum, & aquam, ieiuno tepida bibenda præbeto. Hoc etiam dolores sedat. Quod si pro ratione spuere non possit, sed moretur sputum hærens in ipso, & stertat in pectore, ari magni radice conchulam maiorem, & oleum ac acetum mixta dato, & acetum aqua dilutum infer bibat. Aliud forte. Florem æris magnitudine fabæ, & nitrum assatum dupla portione, & hyssopi quantum tribus digitis comprehendi potest, molli misceto, & aquam ac oleum modicum adstillato, & tepefacta in conchula maiore infundito, vt ne suffocetur. Hoc etiam in peripneumonia facere oportet, si non purgetur. Si verò neque stertat, neque velut oportet, spuat, capparis fructus quantum tribus digitis

Pleuritis
hæmato-
des.

Hippocratis Liber I I I.

comprehendi potest, & piper, & nitrum modicum, & mel, & D
 acetum, & aquam misceto, atque hac tepida sorbenda præ-
 beto. Altera die eadem in aceto, melle, & aqua feruefacta sor-
 beat. Hoc etiam stertentibus dato, & his qui purgari non pos-
 sunt. At si fortius facere voles, hyssopi & sinapis, & nasturtij
 concham maiorem, melle & aqua terito, & feruefacta ac ex-
 colata, tepida sorbenda dato. Atque hoc modo hi morbi cu-
 rati sanantur, si non quid sputi in pulmone relictum pus fiat,
 à quo arida tussis sequitur, & febris ac horror emergunt, &
 erecta ceruice spiratio tenet, & frequentem & aceruatam
 respirationem ager habet, & vox paulò grauior fit, & color
 cum calore faciem occupat. Progressu verò temporis, mor-
 bus magis manifestus redditur. Hunc si intra decem dies su- E
 sceperis, ubi victu & balneo calido calefeceris, medicamen-
 tum quod pus ducat, in pulmonem infundito, aliisque pus
 ducentibus vtor, atq; sic velut suppurato victus rationem
 præscribas. Caput quoque resiccato, vt ne quid influat. Si ve-
 rò ex eo quod in pulmonem infusum est, pus non educatur,
 rumpitur hoc ipsum ex pulmone in thoracem, & post ruptio-
 nem sanus esse videtur, quoniam ex angustia ad amplam ca-
 pacitatem pus peruenit, & spiritus quem respirando trahi-
 mus in pulmone locum ac sedem habet. Verum progredien-
 te tempore pectus pure impletur, & russes, & febres, & alij
 dolores omnes magis ipsum premunt, & morbus inclarescit.
 Hunc post eruptionem per quindecim dies sinere oportet,
 quo pus rursus maturescat. Nam ex eo quod pus ad amplio F
 rem locum deuenit, perfrigeratum est, & id quod in thorace
 humidi erat ad seipsum attraxit, ita vt ipsum sit semiputre-
 factum. Si quidem igitur sua sponte expui incipiat in hoc
 tempore, bene est. Sin minus, medicamentis aut potionibus
 opem ferre oportet, in vltimis ex quindecim illis diebus, fe-
 stinando ad corporis excitationem antea quàm magis affli-
 gatur, ita vt caput purum custodias, influxionum gratia. Si
 verò non spuatur, sed sui significationem ad latera præbeat,
 secato aut vrito. At si neque spuatur, neque ad latera de se si-
 gnificationem præbeat, ubi multa calida ieiunum lauasti, &
 neque potu vsum in firma sella locasti, alter ex humeris ip-
 sum apprehendat, tu verò concute ipsum, aure ad latera ad-
 mota, quo percipias ex vtra parte significationem sui præ-
 beat.

- A** beat. Optandum autem esset ex sinistra. Nam dextras vrere aut secare lethalius est. Quanto enim robustiores sunt dextræ partes, tanto etiã fortiores morbi in ipsis fiunt. Quod si præ crassitudine, humor non fluctuet, neque strepitus sit in pectore: verum spiritum frequentem trahat, & pedes intumescant, & tussicula aliqua adsit, ne te decipiãt, hæc, sed thoracem pure plenum esse probe noris. Proinde in terra eretriade liquida, & valde trita acetepida, linteum tenue tingito, eoque thoracem circūcirca integito, & qua parte primū resiccatum fuerit, ea secato aut vrito, quā proximè ad septū trāsuersum, cauendo tamen ne hoc ipsum lædas. Si verò volēs, ipsam terram eretriadē illinito, & similiter velut in linteo considerato. Multi simul illinunt, ne quæ primū illinuntur resiccentur. Post sectionem aut vstionem, linamento ex lino crudo vttere, & paulatim pus emitte. Cæterum vbi secare vel vrere volēs, corpori in eadem figura, in qua inter secandum aut vrendū futurum est, notam imprimito, vt ne cutis te decipiat, si in figuræ trāsmutatione sursum aut deorsum magis cedat. Sed & tusses vitare oportet ex victu, vt ne rursus pus reuellant ad pulmonem. Malū enim hoc est: quare permittendum est vt ad sectionem quā citissimè resicet. Postquam verò duodecima affuerit dies, reliquū pus totum emittito, & ex linteo linamentum indito, & bis in die pus emittito, & ventrem supernum ex victu quam maximè resiccato. Atq; hoc modo oportet etiã suppurationes ex vlnis, & ex peripneumonia: & ex magnis destillationibus, & pulmone ad lateres prolapsa, considerare ac curare.

Frigeſactoria potiones in febre ardenti.

Frigeſactorias potiones in febribus ardentibus quando volēs bibēdas dato. Sunt autem multarum operationū. aliæ enim mictionem inducunt, aliæ alui egestionem, aliæ vtrunque præstant, aliæ neutrum, aliæ solū frigeſaciūt, velut si quis in vas aquæ feruentis frigidam aquam infundat. aut ipsum vas ad frigidum ventum exponat. Dabit itaque alias aliis. Neque enim dulces omnibus conducunt, neque acerbæ: neque eadem omnes bibere possunt. 1 Fautorum siccorum heminarum duarum mensurā aqua macerato, & conterens gustato donec subdulcis aqua fiat, deinde exco

2 3 lato

Hippocratis Liber I I I.

lato, & iniectis apiis bibendam dato. D II. Seminis lini ace-
tabulum, aquæ heminis decem affusis, in noua olla prunis
imposita coquito ac feruere finito vt transpirent, donec suc-
cus ad tactum pinguis fiat. III. Aquam mulsam aquo-
sam ad dimidias coquito, deinde apio iniecto frigidam pau-
latim exhibeto. IIII. Ordeum Achilleum magnum ac-
plenum heminae mēsurā siccato, & acutis spicis ablatis, vbi
probè laueris, aquæ cogio affuso coquito ad dimidias, frige-
facito ac bibendum dato. V. Cumini Aethiopici heminae
decimae parti, tres aquæ semicongios affunde, & olla luto pi-
loso oblita, donec tertia pars restet feruere sine, & frigidam
hanc ad omnem ardentem aliāque febrem exhibe.

VI. Aquam celestem ipsam per seipsam præbe. E

VII. Ptisanæ heminae congio aquæ affuso, ad dimidias co-
quito, deinde excolato, & apiis iniectis frigidam dato.

VIII. Profunt & vina alba aquosa ex vuīs passis.

IX. Profunt & vuarū passarū expressarū retrimēta aquosa.

X. Vuarum passerarum albarum exēptis vinaceis heminae,
radicum quinquifolij manipulum, tundito, & affusis aquæ
heminis viginti, ad dimidias coquito, & frigidam hanc pau-
latim bibendā dato. XI. Ad farinae ordeī pleni crassæ chœ-
nicæ dimidiam, aquæ congium affundas, & quum iam in-
tumescent crassæ farinae partes, manibus teras, donec aqua
alba fiat, & adianti pugillo iniecto, sub dio per noctem expo-
nito, ac exhibeto. XII. Quorum trium aut quatuor candi-
dum, in aquæ congio concussū bibat. Hoc valde frigefacit, F

& ægrum ad aluum exonerandam conturbat.

XIII. Ordeī torrefacti probè loti chœnicæ dimidiā, in a-
quæ cōgio bis aut ter feruere finito, & frigidā hanc exhibeto.

XIIII. Ptisanæ succum coctum tenuem, & vinum dulce
dato. Hoc vrinam inducit. XV. Cucumeris peponis corio

nudati pollinem ex aqua præbeto. Hæc potio vrinā ciet, fri-
gefacit, & sitim sedat. XVI. Eruum in aqua præcoquito,

deinde ollam nouam, in maiore ollam aqua plenā ponito, &
alia aqua eruo affusa, ad modicum tempus coquito. Postea

vbi coctum fuerit eruum, tertiam aquæ partem reliquam
excolatam bibendā dato, ita vt ad singulos cyathos, & cucu-
meris, & erui pollinē inspergas. Hoc constanter sitim sedat.

XVII. Vinū Thasiū vetus parte vna, cū viginti quinq; aquæ
partib

A partibus dato. xviii. Trifolium, cucumeris pollinem, & crassam ordeï farinam in aqua macerato, & hanc bibendam dato. xix. Apij manipulos tres, pulegij pugillos duos, in aceti heminis decem ad tertias coquito. Hoc melle & aqua dilutum, aquosum bibat, adianti pugillo iniecto. Hoc vrinā ducit, & aluum soluit. xx. Mala odorata dulcia cōtundito, & aqua macerato, & aquam bibendā dato. xxi. Mala cydonea eodem modo, si aluus soluta fuerit in febre ardente.

xxii. Quòd si morbus regius insuper corripiat, vix passæ albæ exemptis vinaceis, & cicerum alborū, vtrorūque dimidiam heminā, & ordeï Achillei magni ac pleni tantundem, cnici tantundem, aquæ heminas decem, & apium, & B mentam, & coriādrum, de singulis parū, terito donec placide aqua dulcescat, & adianti pugillo postea iniecto, vbi sub dio per noctē exposuisti, exhibeto. Potes etiā alia his similia imitari. Omnia verò per noctem sub dio exposita dabis febrienti, exceptis his quibus alui plus quàm conuenit fluunt. xxiii. Pulegij pugillos tres, apij duplum, in vino diluto coquito ac exhibeto: hoc vrinā ciet, & bilem per aluum trahit.

HIPPOCRATIS

COI DE MORBIS LIBER

C
QUARTVS, IANO CORNARIO MEDICO PHY-

SICO INTER-

PRETE.



D hominis generationem de omnibus & membris partibus semen progressum, & in vterum muliebrem illapsum cōdensatur, temporēque veniente natura hominis formam referens ex ipso producit. Habet autem & mulier, & vir, quatuor species humoris in corpore, à quibus morbi fiunt, qui non à violentia aliqua fiunt. Sunt autem species hæ, Pituita, Sanguis, Bilis,

Membra
omnia ge-
nerationi
conferunt.

Hippocratis Liber I I I I.

Pituita, sanguis, bilis.

Bilis, & Hydrops siue aqua: & de his non minima, neque debilissima, in semen procedit portio. Et quia animal secundum parentes nascitur, tot humorum species, & sanorum & morbosorum in seipso habet. Ostendam autem quae in vnaquaque harum specierum & plura & pauciora in corpore fiunt, & à quo agrotant. Et quod morbi imparibus diebus iudicantur. Et quae sint morborum principia. Et qualia singula ex ipsis in corpore efficiant, ut morbum inducant, & à quo rigor febrilis fiat, & cur post ipsum febris irruit. Primum autem demonstrare volo, quomodo bilis, & sanguis, & hydrops, & pituita, copiosiora & pauciora fiant à cibis & potibus, hoc modo. Ventriculus dum plenus est, omnium horum corpori fons est. Verum ubi vacuus est, corpore fruitur colliquefcente. Sunt autem & alij fontes quatuor, à quibus vnusquisque horum humorum in corpus procedit, postquam sanè ipsi à ventriculo acceperunt: & hi quoque fontes ubi euacuantur, de corpore fruuntur. Sed & ipsum corpus attrahit, ubi ventriculus in seipso quid habuerit. Et sanè sanguinis fons est cor, pituitae caput, Aquae splen, Bili locus folliculi in hepate. hi sunt quatuor humoribus his fontes, ventriculo excepto. Ex his autem maximè caui sunt, Caput & Splen, Nam in hoc ipso maxima amplitudo est. Verum de hoc paulo postea clarius dicam. Quin & haec sic se habent. In omnibus cibis ac potibus & biliosi quid est, & aquosi. & sanguinei, & pituitosi: in alio plus, in alio minus. Quapropter & quae eduntur ac bibuntur, alia aliis praestant ad sanitatem. Atque haec mihi de hoc dicta sunt. Postquam verò comedit aut bibit homo, corpus in seipsum humorem relatum ex ventriculo, & fontes trahunt per venas de ventriculo, similis humor similem, & corpori distribuunt. Quemadmodum etiam in plantis similis humor simile trahit de terra. Habet enim eodem modo terra omnigenas in seipsa ac innumeras facultates. Quaecunque enim in ipsa nascuntur, his omnibus exhibet humorem similem unicuique, qualem & hoc ipsum quod nascitur sibi similem, iuxta cognationem habet. & trahit vnumquodque de terra alimentum, quale etiam ipsum existit. Nam & rosa de terra trahit talem humorem, qualis ipsa in potentia est: & allium de terra humorem eiusmodi trahit, quale ipsum in potentia est. Et alia omnia terra

Quatuor corporis fontes.

Cor sanguinis fons, caput pituitae, lien aquae, fel bilis.

Quo pacto haec corpus hauriat. Terrae vires.

Quid sit aqua à rosa & allio.

- A terræ nascētia, ex terra trahunt, singula iuxta seipsa. Si enim hæc res non ita se haberet, non nascerentur plantæ similes feminibus. Cui porro plantæ in terra cognatus humor multo vberior est quàm conuenit, ea planta agrotat. Cui verò paucior quàm opportunum est, ea reficcatur. At si ab initio non insit terræ humor, quem planta iuxta cognationem trahat, ne germinare quidem poterit. Intelligentiā autem huius rei, quòd si non habeat planta humorem secundū naturam, ne ab initio quidē germinet, inde nobis suppeditatur. Ionia enim regio & Peloponesus pro temporibus anni à sole non minimè calet ac illustratur, vt sol nascentibus è terra sufficere possit, attamen fieri nō potest, multis frustra iam id tentantibus, vt in Ionia aut Peloponeso Silphium nascatur. **Silphium.** At in Libya sua sponte nascitur. Non enim est neque in Ionia, neque in Peloponeso, eiusmodi humor qui ipsum alere possit. Quum autem sint & aliæ multæ medicinae, quas sole sufficiente, regiones alere non possunt, aliæ verò sua sponte producant, hoc ipsum eius quod nunc dicturus sum considerandi occasionem exhibet, quantū videlicet locus alteri loco etiam valde vicinus præstet ad iucundi vini productionem, sole æqualiter sufficiente. Hic etenim in terra humor est, qui vinum suaue exhibere potest, illic non est. Sunt etiam syluestria non pauca in loco nascentia, quæ ad orgyæ seu cubitorum quatuor spatium translata, nasci minimè comperias. Non enim habet terra talem humorem translato, qualem illa syluestribus plantis exhibebat. Sunt enim ex ipsis quædam venenosiores, aliæ humidiores, aliæ dulciores, aliæ ficciores, aliæ asperiores, & innumeræ aliæ aliter se habent. **Diuerſi terræ humores.** Innumeræ enim sunt in ipsa terra facultates. Et propter hæc genera primum nihil alteri simile ex terra productum est, quod non esset cognatum. Et mihi sanè videntur hæc omnes plantæ syluestres fuisse. Verum homines ipsas māsuefecerunt, fructum ferre efficientes vnāquāque iuxta suum **Prius syluatica omnia fuerunt.** semen. Trahit enim similis humor similem ex terra, & ex hoc augeſcit ac nutritur. & nullum ex terræ nascētibz alteri simile est, quòd non æqualem, neque similem humorem ex terra trahat. Et omnia quæ nascuntur in cibi ac potus **Cibus potusq; quid secum habet.** vsum venientia, multas facultates de terra ad se trahunt, & in omnibus est aliquid pituitosi ac sanguinei. Et ex hoc beatus.

Caput cu-
curbitulae
instar.

adeo ad hanc demonstrationis necessitatem deueni, quod à D
cibus ac potibus in ventriculum procedentibus trahit cor-
pus, secundum fontes quos nominavi, similis humor similem
per venas. Referam quoque aliud argumentum, quod singu-
la prout relatum est trahant, & simul dicam unde pituita in
corpore gignatur. Vbi quis caseum comedit, aut aliquid
acre, aut aliud quid edit aut bibit, quod pituitosum est, sta-
tim ipsi ad os acnares accurrit, atque hoc ita fieri partim o-
mnes videmus, partim ita esse credere oportet, ex his quae
ego referam. Affero itaque, quod quantum in cibo aut potu
pituita inest, illud ubi ad ventriculum peruenit, partim cor-
pus ad seipsum trahit, partim caput, ut quod cauum sit, & ve-
lut cucurbita corpori incumbat, ad se trahit, ut pote viscosa E
existente pituita, ita ut hanc alia per aliam sequatur ad ca-
put: & quae quidem recens ex cibo generatur pituita, in ca-
pite manet. Vetus autem, prout copiosior est recens, ab ipsa
violente extrahitur. Quapropter ubi quis edit aut bibit ali-
quid pituitosi, excreat pituitam. Habet autem & haec res se
hoc modo. Si ubi edit aut bibit quid pituitosi homo, non
rursus exeat quod redundat, neque per os, neque per nares,
necesse est ipsum manere in capite, aut ad corpus descende-
re de capite, & ad ventriculum peruenire. Ac optimum qui-
dem fuerit, si ad ventriculum perueniat. Exire enim poterit
una cum stercore, & si quidem multum fuerit ac humidum,
Pituita sterco humectare poterit. Si vero modicum, non hoc effe-
quid agat. rit. At si in capite maneat, multum dolorem capiti exhibue- F
rit, quum in venis est. Si vero modicum, non hoc fecerit. Si-
gnificationem autem de se praebet copiosum ne sit an modi-
cum. Quod si ad corpus deueniat, atque illic alio humori
ammixtum fuerit, si quidem multa fuerit pituita, statim cor-
pus laeserit: si vero pauca, non adeo laedere poterit. quum ma-
gnum sit corpus, si non & aliud quoddam principium ipsi re-
liquum sit. Verum temporis progressu, si alia pituita super-
accedat, laedi utique possit. At si corpus vesicae ac ventriculo
deleget, atque haec foras perferant, nihil mali ex ipsa habue-
rit. In hoc igitur sermone demonstratum est, quomodo ca-
put pituitam ex ventriculo trahit, & simile ad simile perue-
niat, & simul a me dictum est, quomodo & quare copiosior
pituita homini à cibus ac potibus fiat. Nunc vero dicam de
bile

A bile, quomodo & cur copiosior in corpore fiat, & quomodo Bilis.

locus folliculi in hepate ipsam trahat. Habet se res hoc modo. Postquam comedit & bibit homo aliquid amari, quodq; aliàs biliosum ac leue est, copiosior etiam bilis fit in hepate, & statim dolet hepar, quod pueri cor vocant, atq; hoc ita fieri videmus, & clarum nobis est quod à cibo aut potu factū est. Trahit etenim corpus in seipsum de cibis omnē prædictum humorem. Trahit etiā folliculus in hepate, quicquid isthic biliosi inest. Et si derepente multa bilis fiat, homo hepar dolet, & de ventre copiosior fit. Hoc enim contingente, procedit de veteri bile propter multitudinem ad ventriculū, & ex hoc tormen ventriculo oboritur, & pars ipsius per vesicam,

B pars per aluum egreditur, atque sic minima pars in homine manet, & dolores cessant. Si verò neutrum horum cōtingat, procedit primū de veteri bile ad corpus, distribuitur enim ad ipsum: & si multa fuerit, statim significationem sui præbet aliij humori ammixta. Si verò modica, non adeo læserit, quum magnum sit corpus, si nō & aliud quoddā principium suboriat, Verum tēporis progressu, si alia bilis superaccedat copiosior, hominem vtrique læserit. Si verò nō superaccedat, excolare illam poterit corpus, vt & bilis, & quæcunque biliosa sunt, prodeant. Nam quæ in cibo ac potu sumuntur, alia aliorum medicamenta sunt. Sic sanè etiam alia quæcunque lædentia sunt medicamēta, vbi aliud ab alio in ventriculum incidit, sua ipsius potestate caussam habēs, id, quod superatum est expellit, ac ipsum ledit. At si superaccedat alia bilis in corpore, ab his quæ in ventriculum incidunt. morbus huic oboritur. Atque in hoc sermone iam ego declaravi, quomodo bilis, & cur copiosior fiat in corpore, à cibis & potibus: & quod trahit in seipsum folliculus in hepar, iuxta similitudinem id quod biliosum est à cibis ac potibus.

Nunc verò dicam de aqua, quomodo, & cur copiosior fiat in corpore, & quomodo splen trahat in seipsum. Affero autem vbi homo bibit amplius, & corpus, & splenem, aquam in seipsa trahere ex ventriculo. Et si plus traxerint quam oportet, statim hominem affligi, atque hoc ita fieri intelligunt quicunq; homines splenici existunt. Postquam autem traxit splen, optimum est, si vetus aqua quæ in splene inerat, ad vesicam aut vētriculum excoletur, & per hæc expellatur.

Nam

Hippocratis Liber I I I I.

Splen tur-
gens quid
agat.

Cor cur nō
laboret.
Venæ iu-
gulares.

Nam per supernas regiones nō purgatur aqua de splene, nisi **D**
quantum eius in vasis inest, quæ de liene procedunt: verum
ad ventriculum & vesicā depurgatio fieri potest. Si verò hæc
ad fluxionem apta non fuerint, neque aqua per ea foras exco-
letur, de splene ad infernas partes aqua procedit, atque isthic
alij humori miscetur. Et si quidem pauca fuerit, non sanè læ-
serit. sed de corpore ad vesicam, & ad ventriculum, per venas
excolari poterit. Sunt enim multæ ex hoc tendētes deorsum,
quæ ex infernis partibus ad seipsas trahūt, vbi sicciore fuer-
runt quàm prius erant. At si alia aqua generetur, & ventricu-
lus ac vesica foras non expellant, splen eleuatur, & infernæ
corporis partes dolore afficiuntur. Atq; hæc à me dicta sunt,
quomodo & cur aqua copiosior generetur in corpore à potu: **E**
& quomodo splen trahit. Nunc autem de sanguine dicam,
quomodo & cur amplior in corpore generetur. Postquàm bi-
bit aut comedit homo aliquid quod sanguineum est, trahit
quidem & totum corpus in seipsum, trahit autem & cor san-
guineum ad seipsum. Et vbi plus attraxit, nō oboritur cordi
dolor. Est enim cor res solida ac densa, & propterea dolore
nō affligitur. Et ex ipso procedunt venæ crassæ iugulares ap-
pellatæ, ad quas statim si copiosius accedat, sanguineum il-
lud distribuitur, & illæ impletæ breuī ad caput & corpus de-
legāt. Et quum edierit aut biberit homo quid sanguinei, sta-
tim venæ iugulares attolluntur, & facies rubet. Accedēte ve-
rò ad cor & corpus sanguine quā satis est vberiore, à cibis ac
potibus, & ad alium humorē ammixto, si non ab ipso egres- **F**
sus fuerit, per aluum aut vesicā, reliquo humori ammixtus,
dolorem corpori inducit. Si verò modicus accedat, non sanè
læserit corpus. Verum tēporis progressu distribuitur ab ipso
ad ventriculū, aut ad nares, quæ ipsum foras excolant, & nul-
la læsio contingit. Si verò paulatim copiosior fiat, morbosus
efficitur. Atque ita quomodo copiosior sanguis generetur, à
me declaratum est. Quum autem sint quatuor, Sanguis,
Bilis, Pituita, & Aqua, omnia hæc à me demonstrata sunt, &
quomodo, & cur copiosiora fiant, à cibis ac potibus. Quòd au-
tem ex his fiant ac generentur, hoc argumento constat. Si ho-
mo parū edit, & parum bibit, nullum morbum hoc ipsi indu-
cit. Et hæc quidem de hoc mihi dicta sunt. Attrigi etiam obi-
ter ostendere intelligenti, quomodo hæc pauciora fiant. Ve-
rūm

A rùm de hoc paulò post melius tractabo. Cæterùm fontes hi quatuor quos nominaui, quum pleni fuerint, semper corpori distribuunt: quum verò vacui, vice versa trahunt ab ipso, Sic etiã ventriculus facit. Et habet se res hoc modo, veluti si quis tria aut plura anea vasa in planissimo loco componat, & coaptata quàm optimè disponat, fistulis ad foramina insertis, atq; ita placide in vnum vas aquam infundat, donec omnia ab aqua fuerint expleta. Ab vno enim diffluet in reliqua vasa, donec etiam alia fuerint expleta. Postquàm autem plèna facta fuerint vasa, si quis de vno aquã effundat, retribuet se retro fluens aqua ad vnũ vas, & vacua fient reliqua vasa rursus, quemadmodum etiam susceperunt. Sic sanè & in corpore res se habet. Postquàm enim cibi ac potus in ventriculum inciderint, fruitur corpus de ventre, & vnà cùm fontibus impletur. Vbi verò aliud vacuatur, rursus retro humor ab ipso redditur, quemadmodũ susceperat, veluti ex aliis ad vnum vasculum. Venæ enim sunt per totum corpus tendentes, aliæ tenuiores, aliæ crassiores, multæ ac frequētes. Hæ autem donec viuit homo, apertæ sunt, & suscipiunt & dimittunt nouũ humorem. Vbi verò mortuus fuerit, clauduntur & extenuantur. Quandiu igitur viuit homo, fruitur corpus de vētriculo, vbi quid in seipso habuerit: fruũtur etiam fontes, & impleti corpori distribuunt. Si enim corpus non traheret de ventriculi humore, sed soli fontes, & hi ad corpus distribuerēt, non sanè haberet corpus sufficiens alimentum, sed paucius. Non enim amplius haberent alimentũ fontes, quod corpori subministrarēt. At verò si fontes isti non essent, dum edimus ac bibimus, verè non cognosceremus, neq; quid iucundũ, neque quid iniucundum esset, propter hanc quam referam necessitatem. Hi loci quum minores sint, & intra reliquum corpus, semper etiam antea quàm attrahat vnusquisque iuxta suam facultatem, reliquo corpori denũtiat de cibis ac potibus, qui biliosus sit, & qui pituitosus, & qui sanguineus, & qui aquosus. Quicquid enim horum humorũ plus quàm opportunũ est, in cibis ac potibus nobis obuenerit, neq; cibos illos iucundos facit. Quæ verò maximè appetimus, pro eorum ratione etiam illi iucundi sunt. Si verò cibis ac potibus opus habuerit fons quidam, pro hac ratione etiam corpus trahet ab ipsis fontibus, donec humor paucior quàm oportet fiat, & tũc sanè appe

Fōtes corpori subministrāt, non soli.

Quo pacto sua quisque trahat.

Cur cum
multum
sumpsimus
plus appe-
timus.

Locus bilis
fel.

Caput pi-
tuitæ locus,
cor sangui-
nis, lien a-
quæ.
Venæ iu-
gulares.

Cur cor nō
afficitur,
caput & liē
multum.

Quo pacto
humores in
corpore mi-
nuantur.

nē appetit homo aut edere, aut bibere tale quid, quod por-
tionem illam expleat, ac reliquis adæquet. Et propterea vbi
multum cibi sumpsimus aut bibimus, quandoq; adhuc cibū
aut potum appetimus, & nihil aliud libenter edimus, quā
quod appetimus. Postquā autē comedimus, & adæquatus
fuerit humor, his perfectis & in fontibus, & in corpore, tunc
cessat appetentia. Atque hæc de hoc à me dicta sunt. Quin &
hoc se ita habet, quod ad folliculum in hepate, sola bilis à ci-
bis ac potibus secernitur. Venulæ enim quum debiles & te-
nues sunt, alium humorē trahere non possunt, qui grauior &
crassior existit: & simul non est ea loci capacitas, vt alius hu-
mor in hoc folliculo consistat: & est hic locus maximè fami-
liaris bilis secundum naturam, & ob id in ipso nullus alius fit
morbus, quā is quem homines Cardiognū, hoc est, cordis
morsum vocant. At caput, & cor, & splen, de omnibus humo-
ribus participant. Vnumquodq; tamen si non ægrotet, pluri-
mum de relatis participat, iuxta suam ipsius naturā, caput pi-
tuita, cor sanguine, splen aqua. Trahūt autē & de alio humo-
re venæ in seipsas amplæ & crassæ, & instar pampini retortæ
existentes, ita vt vbi trahant, alius humor alium sequatur. Et
cordi quidē propinquant venæ iugulares crassæ, ad quas citò
distribuitur, vbi illi amplior quā cōmodus est humor acce-
dat. Hæc verò ad reliquum corpus delegāt: & simul ipsum cor
solidū est ac densum, vt ab humore non ægrotet, & propterea
nullus morbus in corde oboritur. Caput autē & splen maxi-
mè sunt morbis obnoxia. Aegrotant enim & ab his quæ à na-
tura insunt, quum plura quā opportunum est, accesserint,
Aegrotant itē ab aliis humoribus. Venæ enim in ipsis crassæ
ac multæ sunt, & ipsa quoque venosa sunt ac caua, vt & aliis
humoribus recipiendis capacitas in ipsis sit, paulatim nimi-
rū accedentibus, & ad eum humorem qui à natura inest, se
ammiscētibus. Quemadmodū in vase magno amplior capa-
citas est quā in paruo. Sic sanè & in capite, aut in splene, res
se habet. Magna enim capacitas maximè in ipsis est. Si verò
repletæ fuerint isthic humore venæ, ab ipso sanè in illis mor-
bus oboritur. Atque hæc mihi de hoc nunc dicta sunt. Volo
autem melius declarare, quomodo vnusquisque horum hu-
morum in corpore paucior fiat. Quatuor equidem humores
esse demonstrari hominem lædentes, Quatuor item ipsorum
fontes.

A fontes. Quatuor quoque esse dico locos, per quos homo de singulis his expurgatur. Sunt autem hi, os, nares, podex, vrinae locis ^{Quatuor} meatus. Et ubi humor aliquis affligens copiosior factus fuerit, si his locis homo depurgetur, nullus ipsum morbus ab illo premit. Et si venter plenus fuerit, liquecente corpore ab humore, defluit ad ipsum, & extra prodit per aliquem horum locorum, & propterea humor paucior fit in corpore. Corpus enim velut & antea dixi, ventriculo retribuit, ubi vacuus fuerit, & fruitur de ipso, ubi plenus existit. Atque hac à me dicta sunt, quomodo & cur pauciores fiant humores hominem assilientes. Quomodo verò & cur homo sanus degat, referam. ^{Sanitas quæ contingat.} Postquam comedit ac bibit, & humor ad corpus pervenit, eo

B quo dictum est modo, ammixtus alij, tum ei, qui in corpore, tum ei qui in fonte est, ea quidē die qua accesserit, in corpore manet. postridie verò alius humor ad ipsum accedit. Atque hi ^{Tertio quoque die qua sumuntur prodeunt.} quidem duo sunt dies, duo verò in corpore humores. Et alteri quidem humori duo dies sunt, alteri unus. Et qui quidem postridie accessit, manet in corpore, ut qui sit crassus. Alter autem coctus à caliditate diffunditur, & tenuis fiens, postera die ad ventriculum accedit, & per omne tempus à recto expellitur. Ubi verò ad ventriculum pervenit, cibos in hoc loco coquit, & de se sanguinem in corpore facit. Si verò permāserit, tempore graueolens fit. Tertia verò die una cum stercore, & vrina exit, copia ipse sibi ipsi æqualis, & consimilis, & æquilibris, etiam si sui ipsius pars quedam sit, quo humor maneat in corpore iuxta relatum rationē. Influit autem & tertia die humor de corpore ad ventriculum amplior & graueolentior, qui videlicet reliquus fuit à secundo, & defert cibos coctos, & quicquid est in corpore morbosum, & rursus simul exit. Indicio est autem vrina quæ fæluginosa est, quod cibi deferunt de corpore etiam id quod morbosum est. Et cibi quidē semper postridie per aluum secedunt, humor autem ad tertiam diem. Hoc modo sanitas contingere solet. Atque hac dicta sunt, quomodo, & cur homines sani degunt. At verò humor hic si particulatim foras prodiret postridie, cibi non similiter ex ventriculo graueolentes facti foras prodirent, sed veluti cocti: & vrina potui similis, & corpus semper euacuaretur, & per omne tempus homo, ubi ventrem exonerasset ac minxisset, opus haberet statim potu ac cibo, pro egestionis factæ copia,

Quid esset
si statim o-
letaretur.

Duos dies sine cibo quis daret. copia, si modo validus esse deberet, quum humor sufficiens in corpore non relinquatur, sed una cum stercore foras prodeat postridie, aut eadem die. Et si quidem comedisset, bene esset. Sin minus, & euacuatus, debilis esset, neq; humor crassus fieri posset, ut postridie foras prodiret. Non enim sufficiens in corpore relinquitur. Nunc verò alium exonerantes probè valeamus, & si per biduum nihil cibi acceperimus, & vivere, & facere quid possumus, & non penitus debilitamur ex euacuatione in hoc tempore. Humor enim in corpore manens, robur exhibet. Atq; hæc à me dicta sunt, quomodo & cur fieri non possit, ut humor qui corpori accessit, foras egrediatur eadem die, imò neque postridie. Id porro assero, si humor pluribus quàm tribus diebus in corpore permaneat, aut alius multus **E** implens accedat, venis calescentibus ac stantibus, maius malum, aut minus, homini significationem de se præbere: hyeme quidem minus, & posterius: æstate verò maius, ac prius. Atque hæc à me dicta sunt, de eo quod fieri solet, si humor in corpore maneat. At verò si corpus cibos eadem die egere-ret, non sufficienter humore uti posset, sed essent homines tenuis ac debiles. Nunc verò quum maneant cibi ac potus, quandiu permanent, corpus fruitur sensim de ventriculo tra- hens, & impletur. Hæc dixi & quomodo, & cur cibi non possint eadem die exire. Si verò cibi maneant in ventriculo, am- pliore tempore quàm opportunist, & alij ad ipsos inci-dant, corpus utique repleatur, & dum premuntur à plenitu-dine venæ, calor ac dolor corpori accesserint, æstate quidem **F** citius, hyeme verò posterius. Aestate enim calidus est aer ambiens, & calidiorem corpus in seipsum trahit. Et si calido adhuc existente ventriculo, calidior quàm opportunus est spi-ritus homini accedat, nihil miri est hominē ex tali febrile. hyeme verò cum frigidum spiritum trahat in seipsum, mul-tò magis poterit corpus repletionem ferre, hominē modicè ventrem exonerante. Et hæc à me dicta sunt de eo quod fie-ri solet, si cibi ampliore tempore in ventriculo maneant. & attigi quoque obiter ut declararim omnem humoris ac cibi, & longioris & breuioris temporis differentiā, cur homines ægrotent. Verum de hoc melius tractabo temporis progres-su. Reuertor rursus retrò de sanitate dicturus, quòd sanè cor-pus hominis humore de cibis ac potibus fruitur, & prodeunt foras

A foras in sano, tum cibi, tum humor, iuxta relatum rationē.
 Et si quidē foras prodeat plus humoris, quā de cibis ac potibus accessit, homo attenuatur. Prodit autē foris plus quā de accessit ob hanc causam. Si in quiete degat homo & non laboret, mali aliquid ipsi in corpore inest. Verū prae alia sanitate quae multa est, nō ledit valde. Malum verò illud huiusmodi est. Postquam aliquid ex his quatuor corpori accedentibus, aduenerit copiosius, non ita multò corpus calescit sensim, ut non valde latatur: & liquefit in ventriculo, & cibum homini iniucundum facit. Si verò humor alius alio copiosior fuerit, febris ex hoc homini oboritur. Verū de hoc exactius paulò post tradam. Quandoq; etiam ubi cibus iucundus est, homo attenuatur. Causa verò eadem est. His autem sentientibus, plus humoris extra prodit, quā succēturiatur. Et propterea in quiete degenti cōtingit ut attenuetur. At verò laborantibus hominibus itidem corpus coalescit. Et hoc à labore calescente, tum humor in ipso diffunditur, tum attenuatur. Quid exercitatio possit.
 tionis morbus oboritur. Quum autem inutilis fiat humor, & ad ventriculum, & ad vesicā defluit, hæ autem foras expellunt. Pars verò ipsius extra exhalat, per internā corporis raritatem. Pars autem quæ adhuc intus manet, sudor fit, & per corpus foras procedit. Eodem modo & exercitationes iuuenum idem efficiunt quod labor. Si verò etiam non paucior fuerit humor eo qui prius exiuit, accedatque insuper alius à cibis ac potibus, attenuatur propterea homo. Paucior autem accedit, si nō aliud quid edere poterit, & si neq; laboret prioris laboris aut exercitationis ratione, alij aliis pauciores fiunt. Cæterum bonus corporis habitus accedit ex esu, hac de causa. Postquam resiccatus est tēpore humor, & in priore labore prius egressus est alius alio copiosior, & vnus alius alios valde superauit, homo repletus fit. Et si quidem à multis valde superetur, febris ex hoc modo oboritur. Si verò à paucis parum superatur. Sed & corpus hoc modo sufferre ac reualescere potest, humiditate enim vberiore in ipso existente, calorem exoluit. Calet enim corpus à febre, & si quidē modicum fuerit id quod affligit, tertia die eodem modo dimittit, per duas autem cōtinuē tenet. Si verò copiosius, quinta die: per quatuor verò tenet pro ratione. Atque hoc modo morbi per dies iudicantur. At si dimiserit febris in imparibus diebus decreta.

A

diebus

Hippocratis Liber IIII.

diebus, & sanus homo fit, & moritur. Quae de causa, paulò D
 post dicam. Nunc autem referā cur febris dimittat. Sic autē
 Cur diebus nō paribus sentio, Quaecunque febris de corpore hominem corripuerit,
 hæc fiant. necesse est tertia die humorem affligentem exire de corpore,
 aut in alio quopiā impari die, iuxta rationem antea relatā.
 Non enim exit prius quā alius bonus de ventriculo ipsi ac
 cedat. Nam intermedia & postera die corpus trahit de ven-
 triculo, quicquid ipsi in seipso dimiserit priore die, nisi ven-
 triculus id expulerit, & alium humorem habuerit, quod sa-
 nè malum homini esset. Si verò dimiserit febris tertia die,
 eodem modo dimittit quo etiam eadem die, velut dictū est.
 Atque ita quidem contingit, ut febris de corpore fiens, tertia
 die remittat. Dico autē, etiam si quinta die, aut septima, aut E
 nona dimittat, eodem modo dimittere, quemadmodum &
 tertia exiit. Etenim alimentum feбри contingit, secundum
 locos quos paulò antea dixi. Vbi enim humor copiosior præ-
 valuerit, homo liberatur à febre. Dimittit autē febris in die-
 bus imparibus ea de causa. Quòd videlicet in paribus die-
 bus trahit corpus de ventriculo: in imparibus verò dimittit,
 Ventriculus autem extra propellit in homine sano, iuxta hu-
 iusmodi necessitatem morbi in imparibus diebus iudican-
 tur. Atque hac quidem ratione homo febricitans sanus eua-
 dit. Assero autem & quòd doleant maximè homines ægroti
 in imparibus diebus, propter hoc & secundum rationem fie-
 ri. Conturbatur equidem homo quum febricitat. Cuius rei
 signum est, quòd horror aliàs atq; aliàs per corpus transcur- F
 rit. Hoc verò non sanè ita cōtingeret, si nō cōturbaretur hu-
 mor, & de ipso aut plus, aut minus secerneretur, & alius aliū
 superaret. Cōturbatur autem maximè in imparibus diebus
 quum ægrotat. Sed & horror maximè tunc fit. Habet enim
 se res hoc modo, De humore affligente expellitur aliquid ex
 corpore, à recentissimo humore superatum, & procedit ad
 aluum infernam, & alius ipsa vnà cum affligente calescit, su-
 scipiēs in seipsam magis quā priore tempore. Hoc autem
 maximè fit in morbi iudicatione. Et si paulatim corpus ad
 aluum dimiserit, & non multum fuerit id quod hominē af-
 fligit, & alius, & corpus, calorem sufferre in iudicatione po-
 test, & homo sanus euadit, vbi humor affligens egressus fue-
 rit, & is qui feбри alimētū præbuit cōsumptus, & sanus præua-
 luerit

A luerit. Atque hac ratione propter relatas à me causas, homo **Salutis mor-
tisque caus-
sa.** agrotus sanus euasit. Nunc verò referam cur moriantur ho-
mines in imparibus diebus. Sic autem sentio. Si multum fue-
rit id quod affligit in corpore, magis quàm opportunum est,
& acruatim robustum, turbatur ad ventriculū, & quum nō
possit calorem sufferre corpus, eo fruitur, & graueolentiam
circa spiritum fieri necesse est, & quum nequeat corpus præ
debilitate, nimirum omni humore morboſo existente, spiri-
tum trahere, quo ea quæ in ventriculo sunt refrigerentur,
quicquid est humoris vitalis id foras exhalat, atq; ita homo
moritur. Non enim superat alius humor, sed totus à morbo
ſo qui multus est eleuatus, ac cōsumptus à febre exhalauit ac
B perspirauit. Atque hoc modo in imparibus diebus maximè
dolor affligit. Neq; est quisquam cui hoc non sit notū. At ve-
rò quòd humor turbetur in iisdē diebus, hoc signū est. Qui. **Dispari-
bus diebus
omnia lan-
guentiū di-
scernuntur.** cunque iam à febre continua correpti, pharmaco vſi sunt in
diebus paribus, hi nimium purgati nunquàm sunt. Qui verò
in diebus imparibus medicamento forti vſi sunt, nimium pur-
gati sunt. Multi verò etiam perierunt nimium purgati. Pro-
inde priores Medici in hoc maximè peccarūt. Medicamen-
ta enim exhibuerunt in diebus imparibus, & homines pere-
merunt, non ſcientes quòd hæc res ſe ita habet. Humor enim
in corpore agroti magis turbatur in imparibus diebus, ni-
mirum corpore humorem ad ventriculū trāsmittente. Et ſi
C quis iam turbatū, adhuc magis perturbet medicamento im-
miſſo, nihil miri est ex talibus hominē perire. Quin & vlce-
ra ſi curentur, maximè in his diebus inflammatur. Venit enim
humor ad omnes venas quum turbatur, eaſq; replet. Et vbi
ad vlcus peruenit, ſi quidem non curetur, & pus exitum ha-
beat, expellitur ab humore qui in turbatione acceſſit, & vl-
cus foras expurgatur. Si verò curetur, pus exitū non habens,
& iſthic vnā cum eo qui acceſſit permanens, dolorē inducit,
& carnē circa vlcus attollit: & ex illo ſi quidem in cruribus
habuerit vlcus, attolluntur venæ quæ in iuncturis crurum
exiſtūt. Si verò in manibus, quæ in manuū iuncturis ſunt, &
ex hoc glandularū tumores fiunt. Quibuſcunque verò homi-
nibus febris incidit, ſi nihil aliud malè habeat homo, à pin- **Cur febris
nulla de
cauſſa fiat,**
guiore quàm oportet exiſtente humore incidit, & venæ im-
pleta dolorem ac calorem vlceri inducunt. Hoc autem cale-
factum

Hippocratis Liber IIII.

Labor
quid fa-
ciat.

Disparia o
mnia decre-
toria.

Morborū
causae.

Signa se-
ptem mali
vnius.

Simile

factum, etiam reliquum corpus calefacit. Atque hoc modo **D**
caliditas ad vlcera peruenit. Calefcit enim corpus, & vlcera,
ab humoris commotione. Et labor talia efficit. Liberantur
autē vlcera ab inflammatione quinta die, & iuxta horum die-
rum rationem, prout etiā vlcera fuerint magna, & tertia, &
quinta, & septima, & nona, & vndecima. deinde absoluto pri-
mo circuitu, rursus secundi principium tertia sequens hinc
est, quæ à prima, decimaquarta est. Maxima verò vlcera de-
cimaquarta die ab inflammatione liberantur. Atque hæc ra-
tio docet morbos in imparibus diebus iudicari, & humore
in sano homine tertia die exire, stercus autē secunda. Et hæc
tertia die cōtingentia mutuū inter se testimoniū præbent,
quod res se ita habeat. Atq; ita mihi hic sermo vniuersus ad **E**
summū perductus est. Nunc verò exactius referre volo, cur
homines ægrotēt, simulq; cum hoc sermone dicam quæ sint
principia morborum, & qualia vnumquodque ipsorum effi-
ciat. Sic autē assero. Si cibi plures quàm opportunū est, qui-
am concocti sunt, intus maneat, & homo non purgetur, &
alij cibi superingerantur, corpus ab humore priore ac recen-
ti repletū calefcit, & febris ex hoc homini oboritur. Verū
febris hoc modo fiens, nō periculosa, neque fortis est, in qua
humor æqualis est, copia paululum vberiore nos affligens. Si
enim hoc ita se habuerit, & quis admodum validus sit, &
quæ cōmoda sunt, adhibuerit, sanus euadit. Vnus autē mor-
bus solus est ex omni humore, & septem signa habet. Nā &
tussis ipsum habet, quæ & debilis & sicca est: & venter durus **F**
fit, vtpote & stercorē intus contento: caput grauatur: & vo-
mit: & febrit: & vrina non probè prodit. Hæc septem signa
huius morbi sunt ex omni humore fientis. Si verò alui ege-
stione non prodeunte, vnus ex aliis humoribus superet, me-
lius deget homo. Et si quis febre fiente ab omni humore, non
adhibeat idonea, inualecet morbus quantum ipse humores
superauerit, hoc modo. Calefcēte sanguine exhalat maximè
per hunc humor aquosus, qui febri est infestissimus. Relin-
quitur autem pinguis ac leuis, qui est biliosus, & febri maxi-
mè nutrimentum est. Exhalat autem hoc modo, Velut si quis
aquam & oleum in vas æneum infundat, & ligna multa sub-
iecta ad multum tempus exurat. Aqua enim multo paucior
erit, ex vase enim exhalabit: oleum autem paululum immi-
nuetur

A nuetur. Nā aqua præ raritate ab igne attenuari potest, & le-
uis reddita exhalare. Oleum verò vt pote quod est coniunctū
ac densum, attenuari non potest, neque similiter vt aqua ex-
halare. Sic sanè & in homine se res habet. Aqua enim calefcē
re corpore foras exhalat. Biliosus autem humor, vt qui con-
iunctus est ac densus, non similiter attenuatus exhalare po-
test. Verū attenuatus hic biliosus humor, corpus magis ca-
lere facit. Copiosius enim & melius alimentū febri bilis sup-
peditat, & prorumpens aut firmata in corpore, morbum su-
pra priora corroborat. Atque hæc quidem dicta sunt de eo
quod afficitur homo, si non purgetur & curetur. Si verò non
ipsa copia præualuerit, siue semel multa siens, siue paulatim
B colligatur, reliquum corpus dum hoc fit, præ robore sufferre
potest, donec principium aliquod superaccedat. Atque hoc sa-
nè modo morbus fit, si homo à copiosiore fiente humore non
expurgetur. Principia ex quibus fiunt morbi, tria sunt. Et v
num quidem iam à me relatū est, qualia & quod afficiat in
corpore. demonstraui enim quomodo & cur agrotet homo,
si non purgetur. Alterum est, si contingat vt ea quæ ex cælo
obueniunt, inepta & præter victus rationē sint. Tertium est,
si violentum quid accidat. Violentum autem esse dico, & ca-
sum, & vulnus, & plagam, & laborē, & si quid aliud est huius
modi. Horum verò principiorum maximum est Violētia si
magna fuerit: si verò parua non ita maximum. Secundū est
si non purgetur homo. Tertium, si quæ ex cælo obueniūt in-
C epta fuerint ad sanitatem. Proinde diligenter ab his se custo-
dire oportet. Singula verò talia in corpore faciūt, qualia ego
dicturus sum. Equidem si vulnus fiat, manifestū est quod ca-
ro dissecta est, & vlcus factum est. hoc autē morbum esse di-
co. Si verò contusio fiat, homine percusso, aut lapso, aut aliud
quid tale perpeffo, & tumor oboriatur, sanguis statim præ
violētia calefactus, & venis hiātibus illapsus, nō habēs exitū
præ copia, quò abire possit, cōglobatur: & propterea tumor
fit, & tādū adest, donec depurgatus fuerit, eo modo quo de
locis depurgari dictum est, aut etiam per ipsum tumorē, &
siue per chirurgiā, siue sine ea, sanguini trāsitus fiat, aut per
tempus suppurato, aut nō. Sed & labor tale quid efficit. Quū
enim homines laborarint, quibus sanè maxime sanguinis af-
flictio contigerit, illic firmatur ac calefcit, & ex hoc dolor faciat.

Tria mor-
borū prin-
cipia.Tumoris
caussa.

Labor que

A

3

obo

Hippocratis Liber IIII.

oboritur. Si verò hæc quidem superarit homo, verum mul-
ta copia labor accedat, & alius ac vesica non breui copiam
expulerint, febris sanè ex hoc irruerit. Et si quidem prior
humor æqualis fuerit, nequaquam. Si verò in labore ipso-
rum plurimus in corpore permaneat, superat ille. Atque hæc
à me dicta sunt de violentia, qualia in corpore efficit. Et hæc
quidem duo sunt principia, Violentia, & plenitudo, quæ si

Cœlestis
vis quid fa-
ciat.

non purgentur homines, corpora calefaciunt. At verò quod
ex cœlo obuenit principium, si ineptum fiat in homine, su-
perat aliquid humoris, & velut ad morbum calefacit & fri-
gefacit prius si fieri contingat. Dicam autem prius de eo,
quod calefacit. Sic igitur sentio. Si in eodem homine fue-
rit aliquid morboſi, quale in priori dixi, & ea quæ ex cœlo
obueniunt, incommoda fuerint, & caleſcat homo, turbatur
humor omnis in corpore caleſcens. Hoc autem violentia
facit. Et si quidem depurgetur homo, humore illo turbato,
ſecernitur quantum eius plus quàm commodum eſt, redun-
darit. Et habet hæc res ſimilitudinem ad id quod Scythæ

Scytharum
butyrum.

faciunt ex equino lacte. Lac enim in caua vaſa lignea inſu-
ſum concutunt. Illud autem dum turbatur, ſpumefcit ac
ſecernitur, & pingue quidem, quod Butyrum vocant, quum
leue ſit, in ſuperficie conſiſtit: graue verò & craſſum, deor-
ſum ſidit, quod etiam ſecretum ſiccant. Vbi verò concre-
tum ac ſiccatum fuerit, Hippacen ipſum vocant. At ſerum
lactis medium locum tenet. Sic etiam in homine, dum tur-
batur humor, quicquid eius eſt in corpore, in principiis quæ
dixi, diſparatur. Et in ſuperficie quidem bilis conſiſtit.

Qui humo-
res febrem
creant.

Leuiſſima enim exiſtit. Secundo loco ſanguis. Tertio
pituita. Grauiſſimus autem horum humorum eſt aqua.

His verò ita ſe habentibus, quiſquis ex his in morbo plu-
rimus fuerit, in principio ſiente turbatione, deuenit ad lo-
cum, vbi plurimus eſſe poſſit. Verum in turbatione, ſpacio-
ſa capacitate ſiente, ſecretus diſtrahitur, & calefacit corpus.

Aut aliqua corporis parte firmatus, vnà cum alio humo-
re, cum quo eſt in alio loco, dolorem ac calorem exhibet.

Qui verò calefactus eſt locus, inſuper etiam reliquum
corpus concalefacit, & ex hoc febris oboritur. Et oboritur
magis à bile & pituita, & ſanguine, calidiſſimi enim hi hu-
mores exiſtunt. Et ſi quis horum in aliqua corporis parte
firmatus

A firmatus fuerit, ut plurimum morbus illinc nominatur, & cognomen habet. Cæterum ab aqua non valde fortis febris oboritur, neque diuturna. Nā igni non bonum alimentum aqua præbet. Atque hæc quidem de hoc dicta sunt. At verò ante turbationem, non habet multus humor quò procedat, sed sursum ac deorsum voluitur & distrahitur alij humori permixtus. Omnia enim plena existunt. In turbatione verò euacuatur. Verum aliud alio magis euacuatur. Et multus humor suum locum occupat, & alienus alij non ammiscetur, si firmatus fuerit priusquam ille viribus adæquetur. Potest autem ipsi adæquari is qui ab ipso postea ad morbum superaccescit, donec purgatus fuerit locus qualicunque purgatione. Si verò multus fuerit affligens humor fruitur: & consumitur ad morbum etiam alius qui prius salubris erat. Et tali modo homo moritur. fruitur autem, si morbus non amplius sufficiens alimentum habuerit, & consumitur ab humore qui in loco dolente existit. primum enim propinquum assumit, deinde longius depascitur, donec consumptum fuerit, & non amplius inest in corpore alimentum. Alimentum autem est homini humor levis. Quemadmodum igitur ut cerum est, putrefactio primum paulatim fit, si maximè calefiat: Postea ubi isthic alimentum putrefactioni non amplius sufficit, depascitur de sano, initio sumpto à proximo, ad totum corpus, donec totum quicquid carnosum est, putrefecerit, postquam verò in totum depasta est, alimentum putredine consumitur: Sic sanè etiam in morbo. Sumpto enim à loco illo initio, ubi isthic alimentum sufficiens non amplius inest, depascitur ulterius, à proximo initio facto. Postquam enim per totum grassatus fuerit, alimentum morbo consumitur, & alius salubris humor non superat. Et si hoc fiat, homo moritur. Quin & in turbatione, ubi hic salubris humor amplior locum occupat, & non firmatus fuerit, sed voluatur ac distrahatur, non amplius alij miscetur, sed ad morbum consumitur, si non depurgetur. Deinde venæ superimplentur. Valde autem impletæ, nihil ex seipsis remittunt, priusquam spaciola capacitas ipsis contingat. Quemadmodum ubi quis vehementer percussus est, sanguis sub plagâ subtercurrit, nimirum venis à plaga euacuatis. Postquam autem carnes veluti spongia fuerint repletæ, non amplius remittunt,

Hydrops
febrem le-
uem, & non
longam fa-
cit.

Qui equen-
tur super-
uenientia.

Mortis caus-
sa.

Simile.

Hippocratis Liber IIII.

sed continent in seipsis, donec in loco aliquid ab ipsis euacuatum fuerit. Quum enim collectus fuerit sanguis, præ copia viâ intercept. Quemadmodum si quis vas olearium coriaceum angusti oris oleo impletum, in osculum vertat è directo, & si hoc fecerit, oleum ex ipso prodire non poterit: viâ enim ipsum oleum intercept, utpote multum & acervatim incumbens. Si verò quis ipsum vas inclinet, libera erit via osculi intercepta, qua effluet oleum ex ipso. Idem fecerit etiam aqua in mensa. Ita sanè etiam ubi multus humor in corpore præ turbatione locum occuparit, & venas impleuerit, non amplius ab ipsis discedit, priusquam ubi locus vacuus est, alimento à morbo consumpto. Atque hæc à me dicta sunt de hoc, si in corpore quid fuerit unde morbi gignantur, redundantibus etiam aliis: & quomodo principia efficiant calorem & turbationem humorum deducunt ad morbum. Nunc verò dicam quæ efficiant ea quæ ex cælo nobis obveniunt, si ad ea quæ in corpore generata sunt, inepta fiât, & quum humorem in corpore superarint. Affero autem partem humoris in homine, ubi liquatus fuerit, conglobari ac spissari, donec morbum pepererit: partem verò dilatari, ac secerni. Habet autem & hæc affectio similitudinem ad lac. Si quis enim succum in lac immittat, frigiditas in ipso oborta, lac inspissat & conglobat. Ac circum inspissatum, serum est. Sic etiam in homine humor, frigiditate in morbo oborta, conglobatur & inspissatur. Circum ipsum verò aquosum humorem, adhuc etiam alius humor, quanto copiosior fuerit in alio corpore, ammixtus est. At si quidem ad alium deuenierit, sterminus conturbat, & tormen in alio inducit, & foras pertransit, nullo magno damno illato. Si verò non ad alium deuenierit, firmabit se aliqua corporis parte, ubi ipsi plurima capacitas erit. Volutatur itaque exquirens sibi ipsi loci capacitatem. Et quod quidem aquosi humoris de conglobatione secretum est, utpote frigidissimū ac gravissimū in corpore existens, ad infernas partes descendit, & circum ossa ac nervos volutatum, adhuc magis corpus ad inflammationem perducit, & clarum est quod circa nervos, & præsertim circa ossa, aquosus humor, qui humorem facit, existit.

Hydrops. Circa osseas enim corporis partes, homo maximè riget, & capilli erecti stant, contorta cuticula, ac sicciore siente quàm priori

Horroris causa.

A priori tempore: Nimirum aquoso humore isthic deficiente, & circa ossa obuoluto. Atque hinc sanè solus ille locus ubi primo tempore erat, humorem facere nō potest, vnde etiam rigor oboritur. At verò reliquus humor qui æqualissimè crassus est, partim quidem in toto corpore est, partim verò quantum abundauerit, si quidem alius plena non fuerit, & **Venter plenus vel vacuus quid faciat.** quod affligit modicum sit: quandoque ad aluum deuenit, & nullum magnū damnum inducit. & aliquando quidem febrem nō inducit, aliquādo verò debilem & innoxia. & quod affligit vnā cum stercore exit. Si verò alius plena multum quod affligit habeat, periculum est ex ipso morbū aliquem fieri, si alicubi se firmet id quod affligit, aut ad latus, aut ad viscus, aut alicubi aliam partem concalefaciat, quo primū illum humorem simul turbet. Qui verò non valde ex calore ab aquoso humore victi sunt, vtpote qui circa ossa, & prope medullam cōsistit: hos progressu temporis magis lædet, primū quidē in illum ipsum locum, deinde ipsi propinquum, & semper vterius depascitur, & alius ipsum assumit, vt quæ calida sit, & postea tum alius, tum lædens humor, adhuc magis calefacit. At humor crassus calescens primū diffunditur, is qui propinquus affligenti existit. diffusus autem aquoso humori affligenti miscetur: deinde in concussione corporis inanior redditur. & tam diu rigor tenet, quādiu aquosus humor alij humori ammixtus est. Quin & febris hoc modo generata oboritur. Affligentia ad locum firmata, calefcens corpus febrem in se suscipere cogunt: & ab affligente, & ab aluo calefactum, reliquum aquosum humorem superat, Atque sic febris fit post frigus, si qua corporis parte copiosior humor formatus fuerit. Si verò voluatur ac distrahatur, tali modo febris oboritur. Post frigus febris volutatur, maxime affligens circa aluum & supernam, & infernam. Isthic enim plurima loci capacitas existit. Dum autem volutatur, primū propinqua calefcunt, & viscera, & quæ in aluo sunt, Postea etiam alius humor diffusus calore fruitur, & aquoso humori miscetur. Atque febris post rigorem hic fit, ubi affligens volutatur, Imò etiam ubi firmatum fuerit reliqua corporis parte. Et hæc à me dicta sunt quomodo, & quando, rigor morbosus fiat, & quomodo, & ex quali necessitate febris post ipsum irruit. Et quæ sint principia morborum, & qualem

Hippocratis Liber IIII.

lem vnumquodque ipsorum morbum in corpore inducat, & **D**
 quomodo & cur in diebus imparibus morbi iudicantur. Et
 unde homines sani sint, & unde agrotent. & quomodo bilis,
 & pituita copiosior & paucior fiat. Itemque alia multa quæ
 in ipsa natura humana sunt, demonstraui, quæ sanè hic ser-
 mo exigebat. Atque hæc ita relata finem habent. Nunc au-
 tem de lumbricis latis dicam. Afferro enim ipsos in puero
 dum adhuc in vtero est nasci. Postquam enim semel ex vte-
 ro egressus est, non tanto tempore stercus in aluo manet, vt
 ex eius diuturnitate ac putrefactione, tantæ magnitudinis
 animal generari possit. Excernit enim semper hesternum
 stercus per omnes dies, si sanus homo esse debet. Tale verò
 animal nasci non possit, etiam si multis diebus homo stercus **E**
 non egeret. Multa enim nascuntur dum puer in vtero est,
 hoc modo, Vbi ex lacte & sanguine computrescente ac re-
 dundante, vtpote quod dulce est, pus factum fuerit feruidum,
 animal isthic generatur. Nascuntur autem & rotundi lum-
 brici isthic eodem modo. Signum verò quod hæc res ita se
 habet, hoc est. Postquam in lucem editi sunt pueri mulie-
 res ipsis in cibo offerunt medicamenta, quo stercus ex inte-
 stino exeat, & non comburatur, & simul vt intestinum dila-
 tetur. Vbi verò cibum obtulerunt, multi sanè pueri & ro-
 tundi & latis lumbricos vnà cum primo stercore excer-
 nunt. Si verò non excreuerint, fiunt etiam insuperque na-
 scuntur in ventribus. Et rotundi quidem pariunt, lati verò
 non amplius, etiam si quidam ipsos parere dicant. Nam ho- **F**
 mo qui latum lumbricum habet, velut cucumeris semē ex-
 cernit aliàs atque aliàs, vnà cum stercore ipso, & sunt homi-
 nes qui hoc lumbrici partus esse dicunt. Mihi verò non re-
 ctè dicere videntur qui talia dicunt. Neque enim ab vno
 animali tot pulli generari possunt: neque ea est loci in inte-
 stino capacitas, vt partus educare queat. Augescente autem
 puero, augescit etiam lumbricus in intestino, ab his quæ in
 ventriculum ingesta sunt, & æqualis fit intestino, quibusdam
 in pubertate, quibusdam posterius, quibusdam paulò prius.
 Et postquam intestino adæquatus est, similiter augescit, &
 quanto maior factus fuerit, vnà cum stercore excernitur de
 intestino recto, & excidit velut cucumeris semen, sape ve-
 rò etiam maior. Quibusdam verò iter facientibus, aut la-
 boran

Lumbrici
qui creen-
tur.

Lumbrici
nō gignūt.

A borantibus, & ventriculo calescente, deorsum descendit, ipsique prominet ex podice inflatus, hocque facit, & de podice refecatur, aut retrocedit. Signa vero quod non pariat, sed ita habeat velut ego dico, hæc sunt. Si quis curet hominem latum lumbricum habentem, & medicamentum dederit aut potionem, si quidem fuerit homo bene præparatus, totus rotundus factus ad pilæ figuram exit, & homo sanus euadit. Si verò ad medicinam hæreat, recta pars de lumbrico abruptitur, longitudine duorum aut trium cubitorum, aut etià longè amplior, & ubi abruptus fuerit per multum tempus signa cum stercore non prodeunt. Postea verò augescunt. Atque hæc argumenta sunt, quod lumbricus latus non parit, sed abruptitur. Est autem species ipsius, qualis alba intestini rasura. Signa habet hæc. Cacat aliàs atque aliàs velut cucumeris semen, & ubi ieiunus est homo, exilit ad hepar aliàs atque aliàs, & dolorem inducit: & quandoque sputa ori influunt ubi ad hepar assilit, quandoque non. Quibusdam etiam vocem intercipit, si fortiter ad hepar irruat, & valde multa sputa ex ore fluunt, paulo autem post sedantur, & tormen multum in ventriculo aliàs atque aliàs oboritur. Quandoque etiam ad dorsum dolor incidit. Nam & hic aliquando firmatus innititur. Hæc lumbrici lati signa sunt. Lumbrici signa. Contingit & hoc. Qui hoc animalculum habet, in toto quidem tempore valde debilis fieri non poterit. Vbi verò debilis factus fuerit, vix reualefcit. Latus enim lumbricus partis alicuius particeps fit, ex his quæ in vetriculum ingesta sunt. Si quidem igitur curatus fuerit iusto modo, sanus fieri poterit. Si verò non curetur, sua sponte non exit. Mortem tamen non inducit, sed consenescit. Atq; hæc à me dicta sunt de lumbrico lato, vnde nascitur, & quæ morbi ipsius signa sunt. Cæterum calculi morbo principium oboritur à lacte, ubi puer lac impurum fugit. Lac autem in nutrice impurum fit, si pituitosis cibis ac potibus, & alimentis impuris nutritur. Conferunt enim omnia in ventriculum illabentia in ipsa ad lac. Habet autem & hæc res se hoc modo. Si nutritrix non sana fuerit, sed biliosa, aut aquosa, aut sanguinea, aut pituitosa: Lac etiam malum puero generatur. Consentiunt enim corpus & ventriculus. Plurimum verò ipsi ad lac cedit, de eo quod ipsa plurimum in seipsa habuerit. Et puer si de nutrice lac non

Calculus
puerorum
vnde fiat.

Hippocratis Liber IIII.

lac non purum suxerit, sed biliosum velut dixi, morbosus fit D
ac debilis: & in præsens maximè affligitur, quandiu lac pra-
uum ac morbosum suxerit. At vbi suxerit lac nō purum, sed
terreum & pituitosum, & habuerit puer venas de vētriculo
ad vesicam tendentes amplas ac attrahētes: procedit autem
& quod bibit nutrix, & lac in ventriculū pueri, tale quale
trahit à vētriculo de lacte in totum similiter prout venæ ad
ventriculū detrudere possunt: si quid sanè in lacte non pu-
rum fuerit, id quod vesica fruitur lapis fit tali modo, velut in
aqua nō pura in calice aut vase rneo turbata, & rursus seda-
ta, fex aceruata fit in medio. Sic sanè & in vesica de vrina nō
pura existente. Et non per vrinam eiicitur, vt quæ in cauo sit E
loco, & maximè aceruata fiens, præ dolore per mictionem
non pertransit, & à pituita cruda cōcrefcit. Glutinum enim
fit pituita ad fecem ammixta. Et primū parua lanugo su-
perstat, deinde quod accedit arenosum fit glutino fiēte pi-
tuita, quæ est in vesica de lacte, & augetur, & quicquid hu-
moris in glutinatione accesserit, emingitur. Rursus autē fex
Solida fit, & lapidis speciem accipit. Quemadmodū ferrum
ex lapidibus ac terra dum cōburuntur fit. Et in prima quidē
in ignem immisione, cōglutinati sunt lapides cum terra ad
ferri recremētum. At vbi iterum atque iterū in ignē immis-
sa fuerint, recrementū quidem foras decedit liquefcens ex
ferro, id quod ita fieri oculis videmus. Ferrum autē in igne
relinquitur, & recremento decedēte subsidet, fitque solidum
ac densum. Sic profectò etiā fex in vesica, dum pituita gluti- F
num fit, emingitur id quod ab vrina liquefcit. Fex autem
subsidet, & densatur, ac solida fit velut ferrum. Vbi verò sub
sedit ac solida facta est, sursum ac deorsum in vesica voluta-
tur, & feriens vesicam dolorem inducit, & si vehementer fe-
riat ac vlceret, aliquid de ipsa aufert. Verū id quod insuper
affertur, adhuc magis quā id quod arenosum decessit, con-
cretionem efficit. Atque tali modo fit lapis de lacte in vesi-
ca: & si puero anxietas aliqua ab hoc oboriatur, aliās atque
aliās, vbi meiere vult, vrinae meatū apprehendit. At si puero
iam adulto lapis gignatur ex terræ esu, dolor non adest ipsi
prius quā ipse sibi ipsi cibum deligat. Et hæc à me de hoc
relata sunt. Cæterum morbus signa quinque habet. Nam
vbi meiere vult, dolore affligitur, & vrina paulatim fluit ve-
lut in

Lapis in
vesica qui
fiat.

Similitérq;
ferrum fit.

Calculi di-
uersa caus-
la.

Quinque
calculi si-
gna.

A lut in vrinae fillicidio, & est subcruenta, nimirum vesica à lapide exulcerata, & vesica inflammata est. Verum hoc signum inconspicuū est, indicat tamen summa pars præputij. Quandoq; mingit arenosa, verum à talibus, qualia ego dicam. Eicit autem aliquando lapides duos, aut etiam plures paruos, Quī duo, vel plures calculi fiāt. generatos eodem modo, velut de vno dixi. Fiunt etiam tali modo, Quum lapis fuerit concretus, & profundè subsederit in vesicam in arena separata, ita vt ipsam aduenientem lapidis non assumat in seipsum, sed grauior ac copiosior fiat, vt tamen ipsa ad seipsam non concreascit, etiam sic duo lapides fiunt. Fiunt etiam plures eodem modo. Sed & collisis inter se in agitatione aliquid disparatur, & arenosum per vrinam eiicitur. Quod etiam aliquando contingit, vbi arena ad vesicam descendit, & non coaluit. Quidam dicunt quod potus in pulmonem deuenit, ex hoc verò in reliquum corpus. Potus pulmonem nō petit. Hi autem qui hæc dicunt, redarguuntur ex hoc quod dicturus sum, quod videlicet pulmo cauus est, & in ipso fistula est. Quod si pulmo cauus non esset, & fistula non ipsi adhereret, animalia vocem non ederent. Vocem enim edimus de pulmone, quia cauus est, & fistula ipsi adest. Vocem enim articulant labia & lingua, Verum de hoc exactius in peripneumoniae tractatione egi. Cæterum hominibus quibus potus in pulmonem ferri videtur, aduersabor, habetque res se hoc modo. Procedit potus in ventrē, à ventre autem in reliquum corpus expenditur. Oportet autē his quæ dicturus sum mentem adhibere. Sermonis argumenta, quod potus non procedit in pulmonem, sed in ventrem, hæc sunt. Si enim potus procederet in pulmonem, quum pulmo expletus esset, homo non facile respiraret, neq; loqui posset. Non enim esset, pulmone pleno existente, quod resonaret. Et hoc quidem vnum argumentum est. Deinde si potus in pulmonem procederet, cibi in nobis sicci existentes non similiter concoquerentur. Atque hæc duo argumenta existunt. Sed & medicamenta alium subducentia, si in potu sumantur, extra ventrem procederent. Habet autē hæc res hoc modo. Quæcunque medicamenta purgatoria sunt aut supernè, aut infernè, ta quid agant. aut etiam vtrunque præstant, ea hæc faciunt. Omnia valde gaudent, & fortia quidem ex ipsis, si partem aliquam teneram corporis contigerint, eam exulcerant. Mitiora verò turbulentum

Libum ve-
stitus.

Cur lotium
oleat escu-
lenta.

Lactis etiā
exēplo hos
refellit.

Quid pul-
monis fistu-
lam regat
cūm quid
edimus.

lentum corporis motum faciūt, quācunque tandem partem **D**
occuparint. Si verò aliquod ex his medicamentis in pulmo-
nem perueniret, videtur mihi magnū aliquod malum indu-
cturum esse, Pituita enim de capite descendens, cum in valde
breui tēpore exulcerat. Tenera enim & rara res est pulmo,
& si exulceratus fuerit, non bene habebit homo ille, ob mul-
tas sanè causas. At verò venter à medicamento non exulce-
ratur. Nam res est valida ac robusta, nimirum velut pellis &
corium. Et plerique sanè ex Libyæ incolis pecorum pellibus
pro vestibus vtuntur, ventribus autem pro vtriculis. Robu-
sta enim res venter existit. Deinde vbi à vino nigro homines
repleti fuerint, nigra recrementa excernunt. Atq; hæc omnia
argumēta existūt. Et vbi allia comederimus, aut aliud quod **E**
dam edulium olidum, vrinam reddimus comesta odore refe-
rentem. Et hæc quidem omnia argumenta sunt. Sed & hoc
considerandum venit quòd dicturus sum. Si quis cyceonem
biberit, aut farinam coctam sorbuerit, aut aliud quid eius-
modi, & hoc ipsum in pulmonem peruenierit, certè arbitra-
mur ipsum ne minimum quidem tempus viuere posse. Vbi
enim modicum quiddam pituitæ in pulmonem peruenierit,
aut in fistulam ipsius, multa ac fortis tussis oboritur, ac con-
uulsio. Si verò vtique & vixerit homo qui cyceonem biberit,
aut farinam coctam sorbuerit, vbi sanè concocta fuerit sorbi-
tio, videtur mihi multa & fortis caliditas corpori oboritura
esse, multusque dolor, vt omnino moriatur homo hoc modo,
si illa in pulmonem perueniant. Atque hæc iam argumenta **F**
septem sunt. Præterea quomodo lac infantes pueros nutri-
re posset, si ad pulmonem descenderet? Atque hoc mihi aliud
adhuc argumentum est. Et hæc ne produxissem quidem ad
sermonis mei confirmationem, nisi multi adeò homines ef-
sent, quibus potus in pulmonem procedere videtur, & ne-
cesse est ad opiniones fortiter in hærentes multa argumenta
adducere, si quis velit auditorem à priore sententia abduce-
re ac conuertere vt suis verbis fidem habeat. Et propter hoc
etiam potus in pulmonem non procedit, sed in vētre: quia
contigua & annexa est ipsi gula hominis semper hians, & in
hæc procedit. Et simul pulmonis fistulæ velut hederæ folium
incūbit, quare neq; descendere permetteret in transglutien-
do, si in ipsum procederet. Atq; hæc mihi de hoc relata sunt.
Procedit

A Proceat nanque potus in ventriculum, & vbi expletus est, splen de ipso suscipit, & distribuit ad venas, & ad omentum, & in decliue deorsum, & in scrotum, & ad crura, & ad pedes. Et postquam morbus ex aqua multa obortus fuerit, procedit de ventriculo, & semper ad splenem venit de potu, vbi bibet homo. Contingit autem in hoc morbo, vt neq; febricitent aliàs ex ventre, quàm vbi homo sitiat, vesica autem & ventriculus non iusto modo excolunt, neque conueniente diata homo vtatur. At splen subagrotans à ventre de potu trahit. Morbus autem oboritur, & scrotum pellucidum fit, & clauiculae, & collum, & pectora attenuantur. Colliquatur enim ab hoc morbo, & humor ad ventriculum defluit, & infernae partes aqua plenae sunt, & venter cibum auersatur, & quandoq; valde adstringitur, quandoq; defluit. Nec vesica iusto modo excolat, & plerumque horror aliàs atque aliàs per corpus diffunditur, & quandoque febris corripit. Et quibusdam facies tumida fit, quibusdam non. Aliquibus etiam tibiae rumpuntur, vbi morbus diuturnus factus fuerit, & aqua illinc effluit. Incidunt & vigiliae & impotentia corporis, ac maxime lumborum. Et postquam edit aut bibit, etiam paulò amplius splen affligitur, & spiritum frequentem semper emittit. Atq; haec signa hydropis sunt. Est autem & circa ventriculum solum, siue febris corripuerit, siue non. Et venter magnus fit. Et cum ra implentur aqua. Verum supernae corporis partes attenuantur his qui ita affecti putantur. At signa omnia debiliora sunt & simul in cruribus aqua non discedit, & dolor tanto minor existit. Ceterum circa ventriculum solum hydrops & aqua hac de causa fit. Etenim vbi aceruatim aqua accessit, & via in principiis non pateat ad infernas partes, sed aceruatim in venis concludatur, nimirum vt quae respirationem non habeat, neq; seorsum, neque deorsum inniti potest, haud aliter quàm si quis magnum vas angusti osculi occludat, ac subito inuertat, deinde sensim operculum de osculo detrahat. Et si enim hoc feceris, aqua non effluet foras, neq; enim respirationem habet, sed à spiritu qui intus est, conclusa est. Nam spiritus qui intus est replet vas, & externo spiritui renititur, & excursus aquae non datur praespiritu vas implente, & simul aere incumbente. Si verò quis sensim vas inclinarit, aut fundum perforarit, spiritus de vase exhibit. Egresso autem spiritu, procedit

Quae gra-
culum ta-
beantque
in hoc mor-
bo.

Subtercu-
tanet mor-
bi signa.

Cur solus
venter tur-
geat.

Simile.

Ne de-
v

mo inge-

Hippocratis Liber

Mulieres
etiam hoc
patiuntur.

cedit etiam aqua foras. Sic sane in hydrope, si quidem per-
spiratio sursum aut deorsum contingat, in principio morbi,
transit ad crura hydrops, & ad pedes. Sin minus, isthic solum
volutatur circa ventriculum, Atque ita quidem de his à me
dictum est. Fit autem & mulieribus hydrops in vtero ipso,
& signa sanè in ventriculo, & in cruribus, & reliqua signa ea-
dem habet. Et de hoc ipso à me dictum est in morbis mulie-
ribus. Atque hæ tres sunt species morborum ab hydrope.
Fiunt autem hi morbi omnes citò difficiles, & omnes citò au-
gentur. Adhuc autem difficiliiores fiunt, si ex alio morbo cor-
pus liquefactum, ad hunc deuenerit. Si quidem igitur subito
occupauerit morbus hominem, moritur, nempe alio morbo
diutissimè iam affligente. At vbi etiam alius valde fluida E
fuerit, citissimè moritur, & sentiens, & loquens. Atque hæc
à me relata sunt de hydrope, & vnde oriatur, & quòd hæc sint
ipsius signa.

HIPPOCRATIS

COI LIBER DE AFFE-
CTIONIBVS, IANO COR-
NARIO MEDICO
PHYSICO IN-
TERPRETE.

Hunc Galenus Polybi esse dicit.



IRVM prudentem ratione apud se inita,
quòd maximi pretij res est hominibus sa-
nitas, nosse cōuenit quomodo ex sua ipsius
intelligentia, in morbis vtilitatem capiat.
Nosse autem conuenit ea quæ à medicis &
dicuntur, & adhibentur corpori suo, eaque
diiudicare posse. Atque hæc singula hactenus nosse satis
est, quatenus idiotæ contingere potest. Hæc verò nouerit
quis

A quis maximè, si harum rerū cognitione ac studio teneatur.

Morbi omnes hominibus à bile ac pituita fiunt. Bilis au- Morborū origo.
tem & pituita morbos exhibent, quum in corpore nimium
aut resiccantur, aut humectantur, aut incalescunt, aut frige-

fiunt. patiuntur autem hæc pituita & bilis, & à cibis, & à po-
ribus, & à laboribus, & à vulneribus, & olfactu, & auditu, &
visu, & coitu, & calido, & frigido. patiuntur autem quum
singula ex relatis, aut non in debito tempore corpori exhi-
bentur, aut non consueta, aut plura & fortiora, aut pauciora
& debiliora. Vniuersi igitur morbi hominibus ex his fiunt.

Oportet autem ad hæc idiotam nosse, quæ par est nosse idio-
tam. Quæ verò artifices nosse par est, ea etiam adhibere ac

B tractare. De his autem quæ dicuntur & fiunt, fieri potest vt
idiotam ex intelligentia quadam coniecturam faciat. Iam ve-
rò vnde singula hæc nosse oportet, ego referam. Sin in ca- Capitis do-
put dolores inciderint, huius caput calefacere conducit: ita lor.

vt multa calida lauemus, & sternutatione facta pituitam
ac mucos subducamus. Et si quidem ex his à dolore libere-
tur, sufficiunt hæc. Si verò non liberetur, purgandum est
caput à pituita. Victus autem sit sorbitio, & potus aqua. Vi-
num autem non exhibeatur, donec dolor sedetur. Quum
enim calidum existens caput, vinum attraxerit, dolor for-
tior euadit. Dolores incidunt à pituita, cum in capite mo-
ta cumulata fuerit. Si verò aliàs atque aliàs dolor & ver-
tigo in caput inciderit, prosunt quidem & hæc adhibita,

C prodest autem etiam, si sanguis à naribus fuerit detractus,
aut à vena in fronte. Si verò diuturnus & fortis in capite
fiat morbus, & purgato capite non decedat, huius caput aut
scarificare oportet, aut venas in circuitu inurere. Ex his
enim solū sanum fore spes est. Aegrotos considerare
oportet statim in constitutionis morborum principio, qua
re opus habeant: & quales sint vt pharmaco purgentur, aut
vt aliud quid, quodeunque tandem volueris, exhibeas. Si
verò omisso principio, ad finem iam vergente morbo exhi-
bueris, in desperato iam corpore, forte quiddam præbere
veritus, periculum est ne magis delinquas, quàm succes-
sum consequaris. Si in aures inciderit dolor, conducit mul- Auriū do-
ta calida lauare, & auribus fomentum adhibere. Et si quidē lor.
ad hæc cesserit pituita de capite attenuata, & dolor cessaue-
rit,

B

rit,

Hippocratis Liber

**Fauciū in-
flammatiō.**

Vuæ tumor

**Dentium
dolor.**

Polypus.

pleuritis.

**Peripneu-
monia.**

πνευμονία.

Phrenitis.

rit, sufficiunt hæc. Sin minus, optimum omnium pharmacū **D**
fuerit, quod in potu exhibitum, sursum pituitā purgat. Aut
purgandum est caput medicamento, quo capitis pituita pur-
gatur. Fit autem & hic dolor, quum intrinsecus ad aures pi-
tuita ex capite allapsa fuerit. Si verò fauces inflammatae fue-
rint gargarismis vti oportet. Fit autem & hoc à pituita. Si
verò gingivæ, aut aliquid sub lingua inflammatū fuerit, his
quæ commanduntur vtendum est. A pituita autem & hæc
fiunt. Si verò vuæ dependerit & suffocarit (Quidam hoc
gurgulionem vocant) statim gargarismis vtendum est, præ-
paratis velut scriptum est in medicamentis. Si verò ex his
gracilis non fiat, retrò raso capiti cucurbitæ dux adhibean-
tur, & sanguinis plurimum detrahatur, & pituitæ fluxus re- **E**
trò reuellatur. Si verò neq; ex his detumescat, scalpello inci-
dito, & aquam educito. Sectio autem facienda est, vbi sum-
mum subrubicundum factum fuerit, Nam si tale factum se-
ctum non fuerit, inflammatur, & aliquando derepente stran-
gulat. Fit autem & hoc à pituita, vbi ex calefacto capite acer-
uatim defluerit. Cæterum quod ad dentium dolores. at-
tinet, si corrosus fuerit dens, & mouetur, eximatur. Si verò,
non corrosus est, neque mouetur, dolorem autem exhibet,
per vstionem resiccatur. Prosumt etiam quæ commaducan-
tur. Dolores autem fiunt, quum pituita sub radices dentium
subierit. Exeduntur autem & corroduntur, partim à pitui-
ta, partim à cibis, si natura debiles fuerint, & cavitatem ha-
buerint, & malè in gingivis fixi fuerint. Si in nare Polypus **F**
nascatur: quæ res ex naso in obliquum per respirationē dif-
fluatur, ac intumescit: eximitur laqueo ex naso ad os distra-
ctus. Aliqui etiam pharmacis erodunt. Nascitur autem à pi-
tuita. Atque hi quidem sunt morbi qui à capite oriuntur, ex-
ceptis oculorum morbis, de quibus priuatim agemus. At
verò de morbis circa ventrem, hæc considerare oportet.

Pleuritis, peripneumonia, febris ardens, phrenitis, hi mor-
bi acuti vocantur, & fiunt maximè quidem ac fortissimi
hyeme: fiunt etiam æstate, verum minus, & molliores. Quòd
si fortè in tales incideris, hæc sanè faciens ac consulens, maxi-
mè successum senseris. Pleuritis. In pleuritide febris
detinet, & lateris dolor, & erecta ceruice spiratio, & tussis, &
sputum ab initio quidem subbiliosum sput. Postquā autem
quinta

A quinta aut sexta dies aduenerit, etiam subpurulentum. Huic Morbi lateris quidem dolorem dandum est, quod pituitam & rum curabilem à latere deducat. Sic enim dolor lenissimus fuerit. Alio-
 uis autē curanda est per clysterē subducentē ac frigefaciē-
 rem. Hoc enim vniuerso morbo cōmodissimum erit. Exhi-
 bendus est etiā potus, & sorbitio. Et potiones dandæ sunt aci-
 diiores, quo sputum de latere repurgetur. Quum autem pus
 purgari inceperit, latus calefacere cōducit, & forinsecus ma-
 turare ea quæ circa latus sunt, prius autē hoc facere non ex-
 pedit. Resiccatur enim. Fit autē hic morbus maximè ex po-
 tu, quū quis humecto corpore, aut ebrius, aut sobrius, frigie-
 rit. Fit etiā aliter. Iudicatur autē morbus breuissimus septi-
Bma die, longissimus decimaquarta. Et si quidem in hac, per
 sputum reiectū ac purgatū fuerit pus à latere, sanus fit. Si ve-
 rò per sputum nō fuerit pus reiectum, pectore suppuratus ef-
 ficitur, & morbus longus erit. Porro iudicari in morbis est,
 quum morbi augescunt, aut marcescunt, aut in aliū morbū
 transeunt, aut desinunt. Peripneumonia. In peripneumonia
 febris detinet, & tussis, & excreat primum quidem pituitam
 crassam ac puram, Sexta verò & septima, subbiliosam & sub-
 liuidam. Octaua autem & nona suppurulentam. Huic si qui-
 dem dolor adest, aut dorsi, aut laterū, dandū est medicamen-
 tum, quod in pleuritide ad lateris dolorē, in medicamenta-
 rio libro scriptū est. Per potus autem, & sorbitiones, & ven-
 tris subductionem ac frigefactionem, eadem curatio adhi-
 beat, quæ in pleuritide. Quo verò sputū & pus ex pulmone
 repurgetur, danda sunt pharmaca in potu, quibus pulmo hu-
 mectatur, & pus sursum purgatur. Fit autē hic morbus, quū
 pituita aceruatim ex capite ad pulmonem fluxerit. Aliquan-
 do etiam ex pleuritide in peripneumoniā & febrē arden-
 tem transitus fit. Iudicatur autem breuissimus quidē in die-
 bus quatuordecim, longissimus verò in duobus de viginti.
 Pauci verò hunc morbū effugiunt. Fiunt etiā pectore suppu-
 rati ex hoc morbo, si non in iudicatoriis diebus pulmo fue-
 rit purgatus. Phrenitis vbi apprehenderit, febris primum
 debilis detinet, & dolor circa præcordia, magis autem dexte-
 ra, ad hepar. Quum autem quarta aut quinta aduenerit, &
 febris fortior fit, & dolores augescunt, & color subbiliosus
 efficitur, & mens percellitur. Huic ad dolorem quidem dan-
 da sunt

Causa morbi huius.

Morborū decretoriū quid. Peripneu- monia.

Medela.

Morbus hic vnde fiat.

Phrenitis.

Medela.

B 2

da sunt

Hippocratis Liber

Quæ obser-
uatio.

- A** Ex morbis fermè maximè acuti & occidunt, & laboriosissimi sunt, & opus est ad ipsos plurima tutela, & exactissima cura ratione. Et à curante nullum malum accedere oportet, sufficienti enim quæ ab ipsis morbis adsunt. Verùm ut boni quid præstet, pro viribus conetur. Et si quidem rectè curante medico, à magnitudine morbi superetur ager, non hæc culpa medici est. Si verò non rectè curante, neque cognoscente, à morbo superetur, medici culpa est. Aestate porro hæc fiunt febris detinet fortis, & sitis. & vomunt aliqui bilem, aliis quibus verò etiam infernè secedit. His in potu dandum est, & ad sorbendum, quodcunque tandem tibi idoneum esse visum fuerit. Si verò bilis aut pituita ad cor confederit, aqua frigida, aut aqua mulsa pota, vomant. Si verò venter non secesserit, clysteri utendum est, aut subdititia glande. Morbus autem fit à bile. Liberantur autè maximè septima die, aut nona. Si verò febre detinente non purgentur, neque deorsum, neque sursum. dolor autem affuerit per totum corpus, tertia aut quarta die, pharmaco leui aut potione, deorsum purgato. facito autem sorbitionem ex milio, aut farina: & iisdem potionibus curato. Patiuntur autem & hæc à bile. Si verò externæ partes non valde feruidæ fuerint, verùm internæ, & lingua aspera ac nigra fit, huic pharmacum ne dederis, curato autem frigefacientia adhibendo, & ad aluum, & ad reliquum corpus. Vocatur autem hæc febris æstuosa. Iudicatur maximè vndecima die, & decima-quarta. Si verò febrilis calor apprehenderit ac dimiserit, grauitas autem corporis ipsum detinuerit: hunc donec quidem calor tenuerit, sorbitionibus ac potionibus curato. Quum autem non tenuerit, etiam cibos dato. purgato autè quàm celerrimè pharmaco, siue sursum siue deorsum opus habere tibi visum fuerit. Si verò febris quidem nō tenuerit, os verò amarum habuerit, & corpus grauetur, & cibū aueretur, pharmacum dādum est. Patitur autè hæc à bile, quum in venas ac articulos incubuerit & firmata fuerit. Quicumque verò alij dolores in æstate circa ventrem fiunt, si quidem ad præcordia & cor tēderint, aquam mulsam aquosam facito, & aceti tribus heminis affusis, tepidam bibendam da. & ubi modico tempore ipsam retinuerit, & igne ac vestibis concalesfactus fuerit, vomat. Si verò à vomitu rursus ac-

Morborū
acutorum
natura.

Per æstatē
quæ vexet.
Medela.

Feruo in-
teriorum.

Causodes
febris.
Curatio.

Dolores æ-
statis.

Medela.

Hippocratis Liber

cesserint ac suffocauerint, rursus vomitum faciat. Aut ipsum D multa calida lotum, per clysterē subluere, & tepefactoria adhibere, si affuerit dolor. Patiuntur autē hęc maximē à pituita, quum cōmota ad cor collapsa fuerit. Danda sunt etiā his qui talibus doloribus vexātur, pharmaca quę descripta sunt ad eiusmodi morbū, in medicamētario libro. Si verò transierit dolor aliās ad alium ventris locum, & febre caruerit, multa calida lauetur, & doloris gratia bibēda dentur, quę in pleuritide sunt descripta, aut alia prout tibi visum fuerit. Si verò à dolore nō liberetur, per pharmacum deorsum subpurgetur. A cibis autem abstineat, quousque dolor affuerit. Tales autem dolores, qui sic errāt, à bile fiunt. Quicumque verò dolores infrā vmbilicum fiunt, in his molli infusō per cly- E sterem immisso subluo. Si verò non sedentur, pharmacum deorsum purgans dato. Quicumq; verò dolores derepente in corpore fiunt citra febrem, in his lauare multa calida cōducit, & tepefacere. Nam pituita & bilis compacta quidem, fortia sunt, & praualent in quacunque corporis parte constituerint, & laborem ac dolorem fortem exhibent. Diffusa verò debiliora sunt, quacunque corporis parte manifesta fuerint. At verò morbi qui in æstate fiunt, sic fieri solent. Quum

Causa ho-
rum malo-
rum æsta-
tis.

Tertiana.

Quartana.



corpus à sole fuerit calefactū, humectatur, humectatum autem ægrotat, aut totum, aut ea parte in quam pituita & bilis incubuerint. Si quidem igitur quis ipsos incipientes curet, neque longi fiunt, neq; periculosi. Si verò non curet, aut male curet, & longiores fiunt, & sæpe quoque occidunt. Sed & F tertianæ & quartanæ febres, ex talibus fieri solēt. Hęc morborum constitutio maximē quidem æstate fit, aliquibus verò etiā hyeme. Tertianæ febris quum apprehenderit, si quidem videbitur tibi nō purgatus esse, quarta die pharmacum dato. Si verò pharmaco non videbitur opus habere, medicamenta in potu exhibetò, quibus febris aut transmutetur, aut deficiat. Exhibeto autem velut scriptum est in medicamentis. Et in apprehensione quidem, sorbitione & potu nutrito. Interposito verò tempore, cibis per aluum secedentibus. Apprehendit autem plerunque non ita sæpe. Si verò non curetur, in quartanam transire solet, & diuturna fieri. Si verò quartana apprehenderit, si quidem impurgatus fuerit, primū caput purgato, & interpositis tribus aut quatuor diebus,

A diebus, pharmacum sursum versus purgās dato in ipsa apprehensione. Et interpositis diebus rursum aliud deorsum purgās dato in ipsa apprehensione. Si verò ex his nō sedetur, rursum interpositis diebus, multa calida lauato, & pharmaca quę scripta sunt dato. potibus autem & sorbitionibus, & reliqua dixta vtendū est velut in tertiana. Apprehendit autē hęc febris plurimos multo tēpore, alios verò pauco. Et fit tum tertiana, tum quartana, à bile & pituita. Cur autem tertiana & quartana, alibi à me scriptum est. Vim porrò habēt medicamenta in his febribus, vt potis his corpus in loco sit, in cōsuetā caliditate ac frigiditate. & neq; prāter naturā calefiat neque frigeat. Dāda sunt autē velut scriptū est in medicamē-

B tario libro. Pituita alba quum tenuerit, corpus totū intumescit albo tumore. & in eadē die alia parte melius sibi videtur habere, alia deterius. Et tumor aliās in alia corporis parte maior & minor fit. Huic pharmaca danda sunt deorsum purgātia, à quibus aqua, aut pituita purgatur. Victus autem ratio constituenda est, in cibis & potibus, ac laboribus, à quibus siccissimus ac gracilimus euadat. Morbus autē hic fit à pituita, quum quis ex febribus diuturnis pituitosus existens, impurgatus māserit, & pituita ad carnes ipsius cōuersa fuerit. Et nihil quidē albidior est hęc pituita quā alia. Verū corporis color albidior apparet. Sanguis enim à pituitæ copia aquosior fit, & nō inest similiter in ipso bonus color. Quia propter albidiores apparent, & vocatur hic morbus pituita alba. Si quidem igitur curatus fuerit inchoāte morbo, sanus fiet. Sin minus, in hydropem transit morbus, & hominē corrumpit. Quicunq; splenē habent magnū, qui quidē fuerint biliosi, hi mali coloris fiunt, & malis vlceribus scatent, & ex ore graue olent, & tenues euadūt. Et splen durus est, & semper cōsimili magnitudine. & cibi non secedunt. Qui verò pituitosi sunt, hęc & minus patiuntur, & splen aliās maior, aliās minor efficitur. His conducit si quidē impurgati fuerint, & caput & reliquum corpus purgare. Si verò purgatione non egeant, victus ratio constituenda est, ita vt pituitosis corpus reliccemus ac attenuemus, cibis & potibus, & vomitibus, & exercitiis plurimis. & deambulationibus. Et in vere Yursum per veratrum purgētur. Biliosis autē conducit, vt per victum humectantē, aluum & vesicam subducamus, & vt de

Pituita alba.

Medela qua.

Morbi huius causa.

φλεγμα λευκό.

Lienosi quales sint.

Medela.

Hippocratis Liber

Hydrops.

Voluulus.

Medela.

**Morbi hu-
ius causa.**

**Aqua inter
cutem.**

vena splenitide frequenter sanguinē mittant & medicamen-
tis vrinam cientibus vtantur, quæ splenem mollire scripta
sunt, & vt pro anni tempore bilem purgent. Quidam verò
splenici à pharmacorum potu nihil vtilitatis sentiunt, neq;
à reliqua curatione quicquam gracilior splen ipforū euadit,
sed quæ adhibentur à magnitudine morbi superantur. pro-
gressu verò tēporis, aliquibus in hydropem morbus degene-
rat, & corrumpuntur. Aliquibus autem splen suppuratur, &
vsti sani fiunt. Cum quibusdā verò consenescit durus & ma-
gnus existēs. Morbus autē fit, quum ex febribus & mala cu-
ratione, bilis aut pituita, aut ambo in splenē incubuerint. Et
diuturna quidē est affectio, nō autem lethalis. Ex pharmacis
quæ splenis gratia exhibentur, alia per vesicam purgant, & **E**
ipsum molliorē faciunt. Alia verò purgant quidem, verū
neque per vesicam quicquam, quod manifestius fiat, neque
vsquam alia parte. Splenē tamē molliunt. Voluulus quum
apprehenderit, venter durus fit, & nihil secernit, & dolor in-
fernē omnem aluum tenet, & febris, & sitis. Aliquando verò
præ dolore æger etiam bilem vomit. Hunc humectare oport-
et, & intrinsecus, & extrinsecus. Et multa calida lauare. Et
bibenda dare quæ aluum mouēt, & vrinā subducunt. Et cly-
sterem adhibere, si admittat. Si verò nō admiserit clysterem,
fistulam ad vtricoli extremitatē alligato, & insufflando mul-
tum flatum immittito. Et vbi intestinum & venter eleuata
fuerint à flatu, exempta fistula, statim infusum per clysterē
immittito. Et si susceperit, secessum emittet, & sanus euadet. **F**
Si verò nō sic susceperit infusum, moritur maximē septima
die. Talis autē morbus fit quum stercore aceruatim cōbu-
sto in intestino, pituita circa hoc colligitur. Et intestinum in-
tumescit, vtpote his aceruatim induratis, & neque pharma-
ca quæ supernē bibuntur suscipit, sed reuomit. Neque infusa
infernē adhibita admittit. Est autem morbus acutus & peri-
culosus. Aqua inter cutem fit plerunq; quum quis ex longo
morbo impurgatus multo tempore manet. Corrumpuntur
enim carnes, & liquantur, & fit aqua. Fit etiā hydrops à sple-
ne, quum ægrotauerit: & ab hepate, & à pituita alba, & à dy-
senteria ac lienteria. Et si quidem ex purgatione non facta
fiat hydrops, venter aqua impletur, pedes autē & suræ attol-
luntur. humeri verò & clauiculę, & pectora & femora lique-
fiunt.

A fiunt. Hunc si à principio acceperis, priusquam aqua super- **Medela.**
excreſcat, pharmaca bibenda dato à quibus aqua aut pituita
purgatur. Bilem verò ne moueto. Cibos autē & potus & la-
bores ac deambulationes conſtituito, à quibus gracilis ac ſic-
cus euadat, & carnes quam robuſtiſſimæ fiant. Morbus autē
eſt lethalis, cū aliàs, tum ſi venter aqua repletus fuerit.

Quum verò à ſplene, aut hepate, aut pituita alba, aut dy-
ſenteria in hydropem trāſitus fit, conducit quidē per eadem
curare, effugiunt autē non valde. Nā in morbis quum alter
alteri ſuccedit, plerunq; occidit. Quum enim corpori à præ-
ſenti morbo debilitato, alius morbus acceſſerit, præ imbecil-
litate perit, priusquam alter morbus qui poſterior acceſſit,

B deſinat. Aqua porro ſic fit. Quum carnes à pituita, & tēpore, **Morbus**
& morbo, & nō purgata immunditia, & mala curatione, ac **quī fiat.**

febris corruptæ fuerint, liqueſcunt & fiunt aqua & venter **Medela an**
quidem non diſtribuit aquam in ſeipſum, verū in circuitu **ceps.**

circa ipſum conſiſtit. Siquidē igitur à pharmacis, & alia vi-
ctus ratione, æger vtilitatē percipiat, & venter ipſius euacua-
tur, bene eſt: Sin minus, ſectiōne facta, aquam emittito. Seca-
tur autē vel iuxta vmbilicum, vel retro iuxta lumbos. Effu-
giunt autē & hinc pauci. Dyſenteria quum habuerit, dolor

Dyſente-

adeſt per totū ventrem, & tormē, & egerit bilem ac pituitā,

ria.
Medela.

& ſanguinē cōbuſtum. Huius vbi purgaueris caput, phar-
maco in potu exhibito, quod ſuſum pituitā purgat, & aluū
lacte cocto elueris, reliquum corpus curato, & ſi quidem fe-

Cbre caruerit, pinguibus & dulcibus ac liquidis ſemper quæ
inſunt, ex aluo ſubducito. Et multa calida partes ſub vmbi-
lico lauato, ſi dolor affuerit. Potus autē & ſorbitiōes ac ci-
bos exhibeto, velut ſcriptum eſt in medicamentario libro.

Morbus hic fit, vbi bilis & pituita in venas ac aluum incu-

Morbus

buerint, ægrotat quidē ſanguis, & corruptus ſecedit: ægrotat **hic vnde.**

autem & inteſtinum, & raditur ac exulceratur. Fit autē hic
morbus, & longus, & laborioſus ac lethalis. Et ſi quidē robu-
ſto adhuc corpore curetur, ſpes eſt fugæ. Si verò colliquato
iam, & ventre omnino exulcerato, nulla vitæ ſpes ſupereſt.

Lienteria. In lienteria, hoc eſt inteſtinorū leuitate, cibi ſe- **Lienteria.**

cedunt nō putrefacti, liquidi, dolor autē non adeſt, & corpus
attenuatur. Hunc per eadē curato, velut à dyſenteria deten-

tus. Morbus autē fit, quum ex capite & ſuperiore ventre, pi-
tuitæ

Hippocratis Liber

tuix defluxus fit in ventrē inferiore. Quod vbi cōtingit, cibi D
ab ipso frigeant ac humectantur. Et secessus ipsorum nō pu-
trefactorū velox cōtingit. Et corpus liquefcit, dum simul ci-
bi per multum tempus in ventre nō cōcoquantur, & simul à
ventre calido, præter naturam calefcit. Profluuium ventris

**Profluuiū
ventris.**

longum quum detinuerit, secedūt primū quidē liquida, quæ
sunt ingesta: postea pituita. Et probè quidem edit, verū à
multo secessu debilis ac tenuis fit. Hunc sursum versus resic-
cato, veratro in potu dato, & capite à pituita purgato. Ven-
trem quoq; lacte cocto eluito. Deinde reliqua cibus ac poti-
bus curato, à quibus venter & totū corpus resiccet. Mor-
bus autē ab iisdem fit, à quibus etiā intestinorum leuitas. Hi
morbi, dysenteria inquā, & lienteria, ac diarrhœa siue pro- E
fluuium vētris, cōsimiles sunt. Et oportet ipsos sic sanare, ita
vt defluxum à capite & superiore vētre intercipias, aut auer-
tas. Morbi enim natura hinc est. Et nemo sententiā tuam re-
prehendet. Ferme autem & reliquos morbos sic considerare

**Malorum
observatio
Tenesmos.**

oportet, vnde vnicuique natura sit. Et si sic consideraueris ac
deprehenderis principiū morborum, minimè aberraueris,
Tenefmos vbi apprehenderit, secedit sanguis ac mucus, &
dolor fit in ventre inferiore, maximè vbi ad secessum deue-
nerit. Huic cōducit ventrē humectare, & pinguefacere, ac te-
pefacere. Et quæ insunt subducere, & calida lauare, excepto
capite. Solet autem hic morbus plures cibos expetere, Tor-
mina enim euacuato vētre à sanguine ac mucos pertrāseun-
tibus, & ad intestinum allabētibus, fiunt. Quum autē insunt F
cibi minorē mordacitatem intestino inferunt. Et fit quidem
ex iisdem à quibus & dysenteria, verū debilior, & brevis,
& nō lethalis. Quum ex vino aut à conuiuio bilis supernè

Cholera.

ac infernè fluxus, aut diarrhœa corripuerit, diarrhœa qui-
dem cōducit ieiunare. Et si sitim habeat, vinum dulce dare,
aut vuarum passarum dulcium retributa. Ad vespērā verò
danda sunt, quæ etiā his qui à pharmaco purgati sunt dan-
tur. Si verò non cesset, velis autem sedare, vomitū à cibo, aut
lenticulæ decocto facito, & confestim sursum reuelltur in-
fernus secessus, & si succo lentium aut cicerum infuso elue-
ris, etiam sic sanè sedabitur. At verò bilis fluxui conducit, si
dolor adsit, dare quæ in pharmacis scripta sunt sedantia do-
lorem. Vēter autem curetur, tum superior, tum inferior, per
potio

Medela.

A potiones humectantes, & per balnea calida corpus mollientia, capite excepto, & sic tū vomitus procliuior fit: & si liquor aliquis ingressus fuerit, ea quę aduersantur sursum reuomuntur: tum infernus secessus magis prodit. Si verò euacuaueris, violenter vomuntur, & violentius secedunt. Ad vespērā verò dato & huic ea quę dari solent ei qui pharmacū bibit. fiunt autē & hi dolores qui ex potationibus aut ex conuiuio oriuntur, quum cibi & potus plus solito in ventrem ingressi fuerint, & quę extrinsecus corpus supercalefacere solent, bilem, ac pituitam mouerint. Vrinę stillicidij modi quidem multi & omnigeni sunt. Conducit autem forinsecus quidem corpus balneis calidis mollire. Intrinsecus verò humectare **Dolores crapulæ.**

B aluum quidem per cibos, à quibus fluida fiat, Vesicam verò per potus, à quibus vrina quā plurimum diffunditur. Danda sunt & vrinam cientia medicamenta, quę scripta sunt in medicamentario libro sedantia dolorem. Morbus autem fit à pituita. Et quum quidem vesica siccata fuerit, aut perfrigerata, aut euacuata, dolorem exhibet. Quum verò humida est, & plena, aut etiam diffusa, minus. fit autem senioribus diuturnior hic morbus. Iunioribus autem breuior. Neutris verò lethalis. Coxendicum morbus quum fit, dolor corripit coxę iuncturam, & summas nates, ac coxendicem. Tandem verò etiam per totū crus dolor vagatur. Huic confert quum dolor tenuerit, mollire in quacūq; tandem cruris parte dolor hæserit, per balnea, & tepefactoria ac fomenta. Et aluum **Ischias.**

C subducere. Vbi verò quieuerit dolor, pharmacum dandū est infrā purgans. Et postea bibat lac alinum costum. Doloris autem gratia dentur quę scripta sunt in medicamentis. Morbus hic fit, quum bilis & pituita in sanguifluam venam incubuerint, aut ex alio morbo, aut aliter quantumcunque sanguinis à pituita & bile compactum agrotarit. Hic enim per crus vagatur per sanguifluam venam: & ubicunque constiterit, ibi etiam dolor manifestus fit maximē, molestus quidem, sed non lethalis. Si verò in vnum aliquem locum incubuerit dolor, & constiterit, & medicamentis non fuerit exactus, vrito quocunque loco fuerit dolor. Vrito autem lino crudo. Articularis morbus quum tenuerit, corripit calor & dolor corporis articulos. Corripit autem acutus, & in alium atque alium articulum dolores incumbunt, **Curatio.**

Articularis morbus.

Morbus hic vnde.

tum

Hippocratis Liber

Medela. tum acutiores, tum molliores. Huic conducit adhibere quæ D
parte dolor hæret, frigefactoria. Et quæ insunt ex aluo sub-
ducere, per clysteres, aut glandem subditam. Ad sorbendum
verò & bibendum dato quodcunque tibi conducibile visum
fuerit. Quum verò dolor intus fuerit, pharmacum infra pur-
gans bibendum dato, & post hoc serum coctum, & asininum.
lac. Hic morbus à bile fit & pituita, quum commota in ar-
ticulos incubuerint. Et brevis quidem fit & acutus, non au-
tem lethalis. Solet autè iunioribus magis quàm senioribus
contingere. **Podagra.** Podagra violentior est omnibus eiusmodi circa
articulos morbis, & diuturnissimus ac ægrè cedens morbus.
Et est quidè hic morbus sanguinis in venulis à bile ac pitui-
ta corrupti. Quantò autem in tenuioribus fuerit venulis, & E
in plurima corporis necessitate constitutis, & in nervis, & of-
sibus multis ac dēsis: tantò sanè durabilior est morbus, & qui
ægerimè depelli possit. Conducunt autem & huic eadem
quæ morbo articulari. Et longus quidem est & hic morbus
ac molestus, sed non lethalis. Si verò in digitis dolor relin-
quatur, venas paululum suprà articuli in digito nodum inu-
rito. Vrito autem cum lino crudo. Morbum autem regium
Regius morbus. sic curare oportet. Extrinsecus quidem corpus molliendum
est balneis calidis. Aluus verò & vesica humectanda, & urinā
cientia danda, quæ sunt præscripta. Si verò fortis fuerit, pur-
gato capite, pharmacum quoddam potandum dato quòd bi-
lem deorsum purgat. Postea verò urinam ciētibus vtendum
est. Morbus autem fit, quum bilis commota sub cutem ver- F
tatur. Quòd si hæc nouerit vir idiota, non similiter in incu-
rables morbos inciderit. Solent enim morbis ex paruis oc-
casionibus magni ac diuturni fieri. Et quicunque cibi, aut po-
tus, aut sorbitiones congruè ac consequenter se habent, &
quæcunque pharmaca doloris gratia, ea omnia sine periculo.
**Quæ me-
dicamenta
cautius dā-
da.** quæcunque pharmaca purgant bilem aut pituitam, in his
semper exhibentur, si iuxta præscriptum exhibueris. Quæ-
cunque verò pharmaca purgant bilem aut pituitam, in his
pericula fiunt, & culpæ medentibus imputantur. Quàm ma-
ximè igitur ea vitare oportet. Atque hi quidem sunt morbi
qui circa ventrem fiunt. Exceptis pectore suppuratis, & tabi-
dis, & muliebribus morbis. Hi enim seorsim describentur.
Tubercula. Tubercula quæ enascuntur omnia, à pituita aut sanguine
nascuntur, quū sanè à vulnere, aut casu fuerint collecta. Con-
ducit

A ducit autem horū aliqua cataplasmatibus integere, & per pharmacum in potu data diffundere. Aliqua vero impositis cataplasmatibus maturare, & diffundunt quidem cataplasmata, quæ quum calida sint, humectant, & non in seipsa trahunt. Maturant autem, quæ calefacientia contrahunt. Quum verò aliquod sectum fuerit, aut sua sponte ruptum, pharmaco humorem repurgare conuenit, ubi autem pus effluere desuerit, velut vlcus sanare. Lepra, & pruritus, & scabies, & impetigo, & vitiligo, & alopecia, à pituita fiunt. Sunt autem talia turpitudine magis quam morbi. Fauus, & struma, & pani, & furunculi, & carbunculus, à pituita fiunt. Quo verò hæc depurges, pharmacis sic vtendum est. Quicumque biliosi sunt, his dato ea à quibus bilis purgatur. Pituitosis verò, ea à quibus pituita. Atrabiliarij autem, ea à quibus atra bilis. Hydro-

B picis ea per quæ aqua. Quæcunque verò pharmaca in potu dantur, & non purgant neque bilem, neque pituitam, ea quum in corpus ingressa fuerint, vim exhibere oportet, aut frigefacientia, aut calefacientia, aut siccantia, aut humectantia, aut contrahentia, aut diffundentia. Quæ verò somnum faciunt, ea quietem sanguini exhibere oportet. Quum ad ægrotum deuenieris, interrogare oportet quæ patitur, & ex qua causa, & quot iam diebus: & an venter secedat, & quo victu vititur, Et primum considerare, an morbus à bile aut pituita factus sit, aut vtrisque. Et hoc probe nosse conuenit, quod necesse est, vt ab altero horum, aut vtrisque fiat. Deinde vtrum siccitate aut humiditate opus habeat. Aut aliquæ quidem partes corporis siccitate, aliqæ verò humiditate. Postea an morbum sursum purgare oportet, aut deorsum, siue per vesicam. Et an auge-

C scit morbus aut marcescit, & an soluitur, aut in aliu transit. Vulneratos fame affligito, & ex alio quæ insunt subducito, aut per clysterem, aut pharmaco infra purgante exhibitto, & in potu dato aquam, aut acetum. Aut sorbitiones præbeto. Inflammata cataplasmatibus frigefacito. Talia verò cataplasmata sint, aut betæ coctæ in aqua, aut apium, aut oleæ folia, aut fici folia, aut rubi, aut quercus, aut mali punice. Atque his coctis vtendum est. Crudis verò rhamni foliis, aut viticis, aut saluæ, aut Tithymali. Aut pulegium viride, aut porrum, aut apium, aut coriandrum, aut isatidis folia impone. Si verò nihil horum habueris, neque vllum aliud cataplasma,

Lepra, pruritus, scabies, impetigo, vitiligo, alopecia.

Fauus, struma, pani, furunculi, carbunculus.

Sauciorum curatio.

Quæ vulnus refrigerent.

Hippocratis Liber

plasma, polentam aqua aut vino subactam imposito. Tanto D
autem tempore hæc cataplasmata prosunt, quāto frigidiora
fuerint quā vlcus. Quum verò fuerint calidiora, aut simi-
liter calida, nocent. Pinguia ad inflammata non conducunt,
neque ad ea quæ non sunt purgata, neq; ad putrescentia. Sed
ad inflammata conferunt frigida. Et ad impurgata ac pu-
trescentia, acria faciunt, & quæ mordacitatem aliquam indu-

**Quæ vul-
neri cōplen-
do prosint.
Tempera-
mentum o-
mnium.**

centia purgant. Vbi verò carnem producere voles, pingui-
& calida magis conducunt. Ab his enim caro pululat. Qui-
buscunque cibis aut potibus homines sani in victu vtuntur,
ex his oportet præsentibus vt ad ægrotos, ita vt præpares ca-
lidos & frigidos, & humidos, & siccos. Ex frigidis quidem ca-
lidos, & calidos ex non calidis, & siccos ex non siccis, & reli-
quos iuxta eundem modum. Neque verò de præsentibus de-
sperare oportet, tanquam nihil possint, & absentes quærere, E
qui nullam vtilitatem ægro afferant. Comperies autem, si

**Quæ for-
beantur.**

rectè consideraueris, extra hos, paucos quibus ad ægrum vta-
ris. Sorbitiones autem in morbis omnibus dato, aut ptisa-
nam, aut milium, aut farinam, aut alicam. Et quæcunque ex
his dederis ad secessum, tenuia dato, & magis percocta, &

**Quæ ven-
trem vri-
nāq; ciūt.**

**Quæ strin-
gunt.**

dulciora potius quā saliora aut calidiora. Quæ verò ad ro-
bur aut refocillationem, crassiora, pinguiora, & moderatè
cocta. Potibus autem vtendum est, si quidem aluum & vesi-
cam subducere velis, vino dulci aut aqua mulsa. Si verò ad-
stringere, austero, albo, tenui. Si corroborare, austero, nigro. F

**Post purga-
tionē quæ
dantur.**

Qui vinum bibunt citra affectionem erga ipsum, his dandi
sunt potus qui præparantur, & in medicamentario libro scri-
pti habentur. His qui medicamentum biberunt, post pur-
gationem detur, febrientibus quidem, aut lenticula, aut mi-
lium tenue, aut ptisanæ succus. Danda est autem ptisana &
milium, velut quæ leuia sint. Alica verò velut omnium ro-
bustissima. Et farina velut his robustior. Lenticula autem
odorata præparetur, & modica secundo loco detur, vt quæ le-
uis sit sorbitio, & stomacho grata sursum versus. Ammiscea-
tur autem aut sal, aut mel, & cuminum, & oleum. Ad lenticu-
lam verò ammisceatur pulegij herba, & parū aceti. Non fe-
brientibus autem, panis puri medullam in iusculum interi-
to, aut mazam & frustum piscis dato, aut ouiculæ tenerimæ
carnem, aut volucris aut catuli coctam. Febrientibus autem
etiam

A etiam betam dato, aut cucurbitā, aut blitum. Et post cibum bibant vinum vinosum, vetus, album quā aquosissimum.

Quibus lauari non conducit, vngantur vino & oleo calido, & alternis exergeantur. Quum alium debilis, à cibis humectare volueris, mazam dato & obsonia. Et marinorū quidem piscium frustra cocta cum intrito. carnes autem ouiculæ tenerimæ, aut hœdi, aut catuli, aut volucris coctas. Et betā, aut blitum, aut rumicem, aut cucurbitam, si tempus tulerit.

Ex oleribus verò apium, & anethum acocimum, & vinum mellei coloris, vetus, album item ac aquosum. Quum verò *Quæ siccant.*

B & hæc omnia calidiora, & carniū partes carnosas: pisces, petrosos, olera, rutam, aut thymum, aut origanum. Vinum verò nigrum austerum. Præparentur autem obsonia cum sale & cumino. Aliis verò condimentis parcissimè vtendum est.

Quum autem ex morbo refocillare volueris, alia quidem eadem dato, quæ exhibes quum ventrem humectas, Verum pro lactentibus carnes fortiores, & pro catulis, volucrum, ac leporinas, & ex his aliquas assatas, tum de carnibus, tum de piscibus, & quā optimè præparatas. Quibuscunque mor- *medicaria.*

his siccitas conducit, his semel in die cibum exhibere expedit, & cibos ac potus pauciores dare, quā vt repleantur, & hos laboribus ac deambulatione perficere, & quā minimū dormire. Quibuscunque verò humiditas conducit, his expedit inedia non ferre, & cibi ac potus non indigos esse,

C neque laborare, & dormire quantum voluerint. Quoscunque *Quicquid languēs perit dato.*

que cibos, aut obsonia, aut potus ægroti concupiscunt, exhibeto, si non corpori damnum inde accessurū est. Quum aut cibos aut potus augere inceperis aut detrāhere, paulatim & additiones, & detractiones facere oportet. Quicunque cibos sufficientes perficere possint, his sorbitiones ne dederis. Excludunt enim cibum. Qui verò non possunt, his dato. Si verò quid dare volueris refectionis gratia, alicam dato, & prisanam triticeam. Hæ enim sorbitiones sunt fortiores. Den- *Sorbitiones validæ.*

tur autem post cœnam. Pharmaca quæ potantur, & quæ ad vulnera adhibentur, discere oportet: omnibus enim hoc expositum ac procliue est. Non enim ex intelligentia homines *Medicamenta casu* hæc reperiunt, sed potius ex fortuna. Neque artifices magis quā idiotæ. Quæcunque verò in arte medica, intelligentia reperta. *discun*

Hippocratis Liber

discuntur & reperiuntur, aut de cibis aut de medicamentis: De ea ab his qui dinoscere possunt quæ in arte sunt, discere oportet, si quid discere velis. Post sorbitiones cibum debilibus dato, & vinum vinosum insuper bibendum. Ante cibos vero & potus aut sorbitiones, & postea, & cibum & potum quicumque tandem tibi videbitur debilibus exhibeto, ita ut & corpus & animam inspicias. Sic enim maximè profueris.

Qui vis eorū quæ porriguntur cognoscitur.

Quam facultatem singuli cibi habeant, coniectare oportet, ex his qui vim manifestam faciunt. Quicumque flatum, aut morsum, aut repletionem, aut ructum faciunt, aut tormen, aut secedunt, aut non secedunt: hi manifesti sunt quod hæc operantur, & ex his etiam alios considerare oportet. Habent enim singula edulia, & quo prosunt, & quo lædunt. Verum alia manifestissimè operantur quæ operantur, alia vero obscurius. Cibi & obsonia præparentur ac exhibeantur debilibus, à quibus neque flatum fit, neque ructus acidus, neque tormen: & quæ neque valde per alium secedunt, neque valde reliccantur. Hæc autem sic fiunt. Quæcunque quidem venter superat & corpus ipsa suscipit, ea neque flatum exhibent, neque tormen. Si verò venter non superarit, ab his & flatum,

Leuia quæ.

& tormen, & alia huiusmodi fiunt. Leuissima sunt cibaria, & potus ac obsonia, quæ moderata in corpus ingesta, aut paulò amplius supra modum, neque repletionem exhibent, neque tormen, neque flatum, neque aliud quiddam eiusmodi, & celerimè concoquuntur, & concocta secedunt, & per omnem diem in ventrem ingesta, minimè molesta sunt, etiam si diu antea fuerint ingesta. Grauia autem sunt, quæ moderata exhibita, aut infra modum, repletionem & dolorem exhibent. & quæ neque dari, neque edi, neque bibi possunt, ut non dolorem exhibeant. Et si quis ipsa per tempus rursus bibat aut edat, etiam sic dolorem exhibent, & non pro ratione secedunt.

**Sanitati conducen-
tia.
Robur facientes.**

Ad sanitatem optima sunt, quæ modicè ingesta, sufficiunt, ut & famis & sitis sint medela. Et plurimo tempore corpus ipsa suscipit, & pro ratione secedunt. Ad robur autem optima sunt, quæ carnem plurimam ac densissimam producant, & sanguinem crassefaciunt, & pro ingestorum ratione secedunt, & corpus plurimo tempore ipsa suscipit. Pingua, & caseosa, & mellita, & ex sesamo parata, ructum acidum maximè faciunt, & bilis fluxum supernè ac infernè, & tormen, & flatum,

A flatum, & repletionem. Hoc ipsum etiam contingit, cum quis plura ederit aut biberit, quam venter concoquere potest.

Debilibus siquidem pro morbi ac corporis ratione dederis, quaecumque tandem dederis, consumit haec corpus, & neque indigum est, neque repletum. Si vero aberraris à temporis occasione, detrimentum in vtraque sequitur. Quaecumque cibaria aut potus, aut obsonia corpus suscipit, ab his maxime neque tormen fit, neque flatum, neque ructus acidus. Quum enim in ventrem ingesta fuerint, corpus ab ipsis trahit quod ipsi commodum est. Et necesse est iam quod restat debilius esse, quam ut tormen, aut flatum, aut aliud quid huiusmodi in ventre faciat. Vina dulcia, & austera, & mellei coloris Cibaria potulâq, conferentia, & contrâ. Vina.

B vetusta, ventrem subducunt, maximèque urinam cient ac nutriunt, & neque flatum exhibent, neque tormen, neque repletionem. Carnes percoctæ & exassatæ, vtræque debiles sunt Carnes.

ad robur augendum. Ad secessum verò percoctæ commodæ sunt, Assatæ verò magis sistunt. Quæ verò moderatam habent & cocturam & assaturâ, hæc & ad robur, & ad secessum moderatè se habent. At verò crudiores ad robur quidem commodæ sunt, sed non ad secessum. Ex cibis ac potibus qui commodissimi sunt corpori ac maximè sufficientes, & ad alimentum, & ad sanitatem, & ex his ipsis etiam, ubi quis ipsis non in tempore vtatur, aut pluribus quam tempestiuum est, & morbi, & ex morbis mortes fiunt. Reliqui verò cibi ac potus, qui talem vim non habent, parum utilitatis afferunt, etiam si quis semper ipsis in tempore vtatur: parum autem etiam laedunt. In vtranque enim partem debiles sunt, ut & boni aliquid faciant, & mali. Sunt autem cibi & potus qui hanc vim habent hi, panis, maza, carnes, pisces, vinum. & ex his alij magis, alij minus. Quicumque ex sicco victu viuunt, his non cum cibo potus detur, sed post cibum, multo tempore interposito. Siccus nutritus.

Et sic quidem siccus humor à siccis cibis ortus, corpus ficit. Si verò quis simul cum cibo bibat, cibus humidior factus, corpus humidius facit. Panis calidus, & carnes calidæ, ipsæ per se comedatæ, siccant. Si verò cum liquore dederis, aut statim à cibo potum præbueris, non siccant. Panis purus ex farinis, Panis differtentia. ad robur ac refectionem commodior est, quam qui non est ex tenuibus farinis paratus, & recens utilior est quam vetus, & ex farinis recentibus melior quam veteribus. Polenta ex Polenta. ordeo

ordeo non madefacto, sed circuncirca consperso ac decorti- **D**
 cato, fortior est quam ex madefacto: & recens quam vetusta.
Vinum quod debilitetur Et maza prius subacta fortior est, quam non subacta. Vinum
 diffusum, ac perfrigeratum, & excolatum, tenuius fit ac debi-
 lius. Carnes coctæ, si quidem percoctas feceris, debiliores
 sunt ac leuiiores. Assatæ verò si exallatæ fuerint, & inuetera-
 tæ ex aceto aut sale, debiliores sunt & leuiiores recentibus.
 Debiles ac leues cibi, ventrem quidem non lædunt, neq; cor-
 pus, eo quod calefacti non intumescunt, neq; replent, sed ci-
 to mollescunt, & concocti secedunt. Humiditas autem ab ipsis
 debilis corpori accedit, & neq; augment, neq; robur memora-
 bile exhibent. At fortes cibi & intumescunt ubi in ventrem
 ingesti fuerint, & replent, & difficilius quidem ac tardius con- **E**
 coquuntur, & non secedunt. Verum humor ab ipsis fortior ac
 incorruptus accedens, multum robur ac augmentum corpo-
 ri addit. Ex carnibus leuissimæ sunt in corpus, caninæ, &
Caro quæ leuissima. volucrum, & leporinæ coctæ. Graues autem sunt bubulæ. Et
Grauis. porcinae moderatiores, statum autem faciunt, & coctæ & as-
 satæ. Et sanis autem & debilibus conueniunt ouillæ. Suillæ ve-
 rò his qui laborant & exercitantur, & ad bonum habitum, &
 ad robur commodæ sunt. Debilibus autem & priuatam vitam
 degentibus fortiores. Sed & farinæ māsuetis leuiiores sunt,
 eo quod fructum non similem edunt. Differunt autem &
 pecorum carnes, & eorum quæ fructum edunt, & quæ non e-
 dunt. Et fructus non idem in omnibus facit, sed partim den- **F**
 sam ac fortem victimæ carnem efficit, partim rarā & humi-
Pisces. dam, ac debilem. Ut in summa dicam, pisces leue sunt edu-
 lium, & cocti, & assati, & ipsi per se, & cum aliis cibis. Ipsi ve-
 rò inter se ipsos sic differunt. Stagnorum pisces, & pingues, &
 fluuiatiles, grauiiores sunt. Littorales autem marini, leui-
 ores. Et percocti assatis sunt leuiiores. Ex his itaque fortes da-
 to, ubi reficere aliquem voles. Leues verò, ubi gracilem &
Balneum. tenuem facere oportuerit. Balneum calidum moderatum
 quidem, mollit, & auget corpus. Quod verò opportunū mo-
 dum excedit, siccās quidem corporis partes humectat, humidās
 verò resiccat. Et siccæ quidem humectatæ debilitatæ & ani-
Holera. mi deliquium exhibent. Humidæ verò siccate, siccitate ac si-
Allia. tim. Ex oleribus allia, & coctæ & assatæ, vrinā cient, & per
Cepæ. alium secedunt, & ad menses muliebres conducunt. Cepæ
 ad

A ad vrinas cōmodæ sunt. Succus enim acrimoniā quandā exhibet, vt secedat. Atque his quidem sic vtendum est, sed debilibus non exhibenda. Apium & coctum & crudum vrinam **Apium.** ciet, & palustre magis quā satiuū, quod etiā maiorem vim habet. Coriandrum stomacho grātū est, & per aluum secedit, tum coctum, tum crudum. **Coriandrū.** Ocimum & humidum est & **Ocimum.** frigidum, ac stomacho grātum. Porrum coctum quidē vrinam ciet, & secedit. **Porrum.** Crudum verò æstuosum est & pituitosum. **Malum punicum.** Malum punicū reficit & pituitosum est, & cū nucleo quidem, aluum sistit. Citra nucleū verò, secedit. **Cibaria.** Calidi cibi, sicci quidem sistunt, humorē enim in ventre resiccant. Si verò humidi sunt, humectantes per caliditatē, aluū subducunt.

B Acerba siccant, & contrahunt corpus. Habent & vim sistēdi. Acida attenuant, morsum inducentia. Salsa secedunt, & vrinam ciet. Pingua & dulcia, humiditatē & pituitam exhibent. Reficiunt cucurbita, & beta, & blitum, & rumex, & per humiditatē secedunt. **Brassica.** Brassica verò acrimoniā quandam habet ad secessum, & simul boni succi est. Caseus, & sesamum, & vua passa, reficiunt & pituitosa sunt. **Vinum.** Vinum dulce, & mellis speciē referens, ambo & reficiunt, & vrinā ciet, & pituitosa sunt. Austera verò, ad robur & siccitatē commoda sunt. Vrinam autem ciet etiam austera vetusta, quæ alba & tenuia existunt. **Oleum.** Oleum & quæcūq; oleosa, reficiunt & pituitosa sunt. Ex oleribus coctis secedunt, quæ ex natura humidissima aut acerrima sunt, aut caliditatē habent. Danda autē sunt hæc repidiora ac flaccidiora, Sic enim ad secessum cōmodat. Cucumis pepo, & vrinā cit, & aluo secedit, ac leuis est. Alter autē pepo, frigiditatē quandam exhibet, & sitim sedat. Alimentum verò à neutro horum contingit, nisi tenue quoddam. Sed neque malum, neque memorabile. **Mel.** Mel cū aliis quidem comestum, & nutrit, & bonū colorem exhibet. Ipsum autem per seipsum ~~atenuat~~ magis quā reficit. Nam & per vrinam, & per secessum plus iusto expurgatur. Vrinam ciet in ventre & cito calesciunt, & calefacta marcescunt ac liquefcunt, & ob id citum secessum faciunt. **Cibariorū varietas.** Stabiles autem ac aluum sistentes cibi, & calesciunt, & calefacti cito resiccantur ac compinguntur, & propter ea obduri facti, non secedunt. Quæ per aluum secedunt, succosa sunt, & natura calida. Quæ per vrinam ciet, sicca & frigida.

Hippocratis Liber

Frumentum . Frumentum & vinū, differunt quidem & ipsa inter seipsa **D**
vinum. ex natura, tum robore & debilitate, tum leuitate ac grauita-

te. Differt etiam locus à loco, ex quo illa fuerint. Est enim
 alius aquosus, alius aquarū inops, & apricus, & vmbrosus, &
 bonus, & malus. Quare omnia hæc ad hoc conferunt, vt sin-
 guli cibi aut fortiores sint, aut debiliores. Quicunque sanè
 panem comedere soliti fuerunt, his dandus est & in morbis.

Quū plus . Quum quis cibos aut potus plures solito acceperit, si non
iusto come- solito more perfecerit, optimum est vt statim reuomat. Po-
ditur quid ma & fructus arborei, tum mollis, tū duri corticis, propterea
agendum. post cibū molestiora sunt, & sano, & debili, quia corpus eius
 qui cibum sumpsit, solum ab ipsis humores trahit. Si verò ie-
 iunus quis edat, plures. Quicunque cibi aut statum, aut æ-

Cibaria cū **E**
vexāt, quid stum, aut morsum, aut repletionem, aut tormen faciunt. à ta-
agas. libus liberat vinum meracum insuper potatū. Corpus enim
 à vino calefactum, per calorem amouet ea quæ insunt à ci-

Ventris di- bis & potibus ac similibus. Venter aliquando perturbatur,
uersitas, aliquando sistitur, aliquando etiam pro ratione secedit. Cur
 autem hæc sic se habent: primū quidem venter quum hu-
 midior fuerit, & quum siccior, susceptum cibum corrumpit.
 Deinde quum mutatio facta fuerit, siue ex frigore ad calidi-
 tatem, siue ex caliditate ad frigiditatem, itidem corrumpit.
 Quare necesse est ventrem, ab iisdē cibis ac potibus propter
 hæc ipsa, & molliorem fieri, & duriorē, Cibaria & potus &
 obsonia, excepto pane, & maza, & carnibus, & piscibus, & vi-
 no, & aqua, reliqua omnia tenues ac debiles vtilitates exhi-

Languen- **F**
tium nutri- bres non continenter detinent, sed intermittentes corripiūt,
catio. his cibi dandi sunt post apprehensionem, ita vt coniecturam
 facias, ne febris à recens accepto cibo irruat, sed cibis iam cō-

de sim
de vi
de sup. **coctis.** Vinum & mel optima iudicata sunt in hominibus, si
 iuxta naturam & sanis, & debilibus cū temporis opportu-
 nitate ac mediocritate exhibeantur. Et bona quidem sunt ip-
 sa per seipsa, Bona verò etiā permixta, & tum alia, tum quæ-
 cunque memorabilem vtilitatem habent. Quæcunque sanis
 commoda sunt, ea etiam agrotis exhibita fortiora sunt. Et
 oportet detracto ipsorum vigore ea dare, alioqui non feret
 ipsa corpus, sed magis lædunt, quàm prosunt.

HIPPO

AHIPPOCRATIS

203

COI LIBER DE INTER-

NIS AFFECTIONI-

BVS, IANO CORNA-


RIO MEDICO PHY-

SICO-INTER-

PRETE.

*5. Cap.
27. de
Oust. quom.
2. opus d.
lib. de pass.*

B



I PULMONIS arteria fuerit exulcerata, aut aliqua tenuis venula ex his quæ in pulmonem dependent, rupta fuerit, aut aliqua fistula ex his quæ per pulmonem distentæ sunt: & alia in aliam distracta fuerit, & sanguine fuerint impletæ: distrahūtur sanè ac

Pulmonis arteria sauciata venæve fractæ.

rumpūtur ob has maximè causas, propter laborem, propter cursum, ob casus, ob plagas, ob vomitus violentè fientes, ob febres. Hæc igitur patitur. Primum quidem tussis sicca obtinet. Deinde paulò post expuit saliuam subcruentam, aliquando autem puram. Et si quidem hic breui à morbo liberetur, satis est: Si verò non, tēporis progressu sanguis amplior prodit, aliquando purus, & aliquando etiam subputridus. Sape

du

*causa
vul. pu
et sign*

verò etiam fauces nō animaduertentibus sanguine implentur. Postea sanguinis grumos paulatim & frequenter emergentes reiciunt. Aliquando verò etiam graecolentia ab ipsis contingit, & fauces aliquando spuma quadam replentur. Et rigor ac febris apprehendit, circa initia quidem morbi, vehementer. In progressu autem debilius, & alias atq; alias corripit, & dolor quandoq; in pectoribus insitus est, & in dorso, & in lateribus. Et vbi sanguinē spuere desierit, saliuā multam liquidam expuit, quandoque verò etiam viscosam. Atq; hæc quidē sic patitur donec quatuordecim dies præterierint. Post hos verò si nō desierit morbus, squamas ab arteria tussiendo auellit, quales à pustulis decedunt. & dolor incidit in pectus, & in dorsum, & in latus, & præcordia cōtingēs velut vlcus dolet. Huic cōducit vt quàm maximè quietē intus habeat, si morbus sic se habuerit. Si enim quid laborarit, & do-

Curatio.

C

3

lor

Hippocratis Liber

lor acutior. & tussis magis quā prius premit, & rigor ac febris magis occupat. Et si sternutauerit, dolor acutus irruit. Dolet autē & in lecto, quū se circūuertit. Huic cibos quidem eosdē, quos & pectore suppurato exhibere oportet, verū hos nō multos. Ex obsoniis autē his vtatur. De piscibus quidem, squatina, aut pagro, aut galæo magno albo, aut aliis similibus, omnibus cū rhoe & origano cōditis. Carnē autē edat galinā, assatā, sine sale, aut capræ coctam, & vino austero vetustissimo ac iucundissimo nigro vtatur. De ambulationib. autē moderatis. Verūtamē hęc fiant febre nō tenente. Si verò febris tenuerit, sorbitione farinæ aut miliij vtatur. Si verò cibos assumat, paucos assumat, & obsonia per aluum secedētia. Et si pharmaco tibi vtēdū esse videbitur, cnidio cocco, aut tithymalide ipsum subpurgato. Et post purgationē, farinæ coctæ pinguis heminā absorbēdā dato. Deinde quā maximē reficito, vt quā minimū tenuis sit. Ad huiusmodi enim morbū nō cōducit tenuē esse. De ambulationes etiā primū paucas faciat, vt ne lassitudo succedat. Fomentū verò aliās atq; aliās adhibeatur. Et qua die fomentū adhibetur, sine cibo sit excepta farina cocta, cuius heminā absorbeat. Aquā autē bibat. Postera die minus quā solitus fuit edat, & bibat vinū nigrū, iucundū, austerū modicū. De cæterò verò bis aut ter in die cibi dētur. Sic autē huic paulatim dato, donec ventrē cōfirmaueris. Nā ex febribus, & inedia, si os quidē appetiuerit, venter autē suscipere noluerit, vbi acruatim suscepit, inflāmat. Quare paulatim dare oportet. Si verò acruatim dederis, & parū laborarit, deambulationibus venter nō perfrigeratur, nimirū cibis quiete cōpactis. Quare etiam febris succedere solet, & hyemē quidē minus, æstate verò periculū est ne delinquat. Hūc quā maximē reficere oportet, quo quā crassissimus fiat. & deambulationib. moderatis vtatur, & min⁹ solito luctetur, & parū laboret primū, deinde ampli⁹, nūquā aut multū. hęc si fecerit, celerrimē san⁹ erit. Si verò tenuis fiat propter laborem, remittat ac quietē agat. Hic vbi sanus fuerit, neq; ad vētū celeriter curret, neq; equū, neq; currū cōscēdat. Viter etiā vociferationē, & iracundiā. Periculū est enī ne morbus reuertat. Quare hęc oīa vitare oportet. Si verò cibū auerfetur, et iū torreto, & corticē depurgato, deinde per tridū in aqua macerato, singulis aut diebus aquā diffundito, & alia affundito. Postea

Medela
quæ.

Quæ cauenda.

- A** Postea quarta die excolato ac resiccato, deinde tenuissimè molitum cribrato. Et lini semen tostum tundito ac terito. Et sesamum tostum tundito ac terito. Et polentā nō salsam, puram, tenuē accipito. Et erui quidē ac polētā, amborū æqualis sit mēsurā, sesami verò tertia pars, lini verò dimidia vnius partis. Hæc in lacte caprino cocta quā liquidissimè absorbent. Postea verò in prandium ipsi dentur cibi puri, & obsonia fortiora. Vinū autē idem bibat. Dato autē ipsi & centaureæ radices, ad has rupturas faciētes, in vinū ipsas deradens. dato item dracontij radices in vinū derasas. Sed & tussis gratia, dracontiū derasum in melle delingendum dato: Et si decoctum in lacte asseuerarit se sorbere nō posse, lac bubulum quā plurimū bibat, tertia parte aquæ mulsæ ammixta. Atque sic celerrimè sanus erit. Morbus autem curatione multa opus habet. Est enim difficilis. Si enim curatus & sanus factus nō seipsum custodierit, plerisq; reuertens morbus interitus causa fit. hic si quidē ab hac curatione sanatus fuerit, satis est: Sin minus, ipsum lacte crassefactum, & in pectore, & in dorso vrito. Si enim successerit vstio, fugæ morbi spes est. Si verò arteria conuulsa fuerit, aut aliqua vena ex his quæ ad pulmonē tendunt, hæc patitur. Ab initio quidem morbi, tussis acuta obtinet, & rigor, & febris, & saliuam expuit multā, albam & spumofam, aliquādo verò subcruentā, & dolor caput ac collum detinet. hic morbus fortior est priore, & vsq; ad decem primos dies talia patitur. Postea pleriq; vndecima die pus crassum violenter expuunt. Decimaquarta verò die puriora expuit, si euasurus est, & dolore minus vexatur, & breui sanus fit. Si verò morbus diuturnus futurus est, tunc & pus multo amplius expuit, & reliquus dolor multo amplior in corpore inest. Calores autem debiliores habent quā prius. Hunc si à principio acceperis, infra subpurgato scammonia succo, si nō febricitarit. Post purgationem autē accipiat ea quæ prius, & alia eadē assumat, quieto quā maximè corpore & molliter cubet. & hæc quidem ab initio faciat vsq; ad decem dies. Si verò pectore suppuratus fiat, eadem quæ etiā prius faciat. Si verò sanus fiat, ab his cibis ac potibus abstinere oportet, ab acidis, & aeribus, & salis, & pinguibus. A labore itē ac iisdem à quibus prior, abstinat. Hæc si fecerit, celerrimè à morbo liberabitur. Si verò

Sorbitio
guz.

Prand

Curatio.

Arteriz lā-
cinatio.

Medela

C 4

quid

Hippocratis Liber

Pulmonis
morbus vn
de fiat.

Medela.

Pus sec-
tione vstio-
néve educi
tur.

quid horum non fecerit, rursus reuerso morbo periclitabi-
tur, & morbus peior erit. Nā multi rupto pulmone vitā de-
gunt, donec moriantur. Hunc si nō statim quis curret, recidi-
uante morbo postea non habueris quo prodesse possis, nisi
hac feceris. Lacte bubulo crassefactum, in pectore & dorso
vrito. Si enim vstio successerit, proderis. Morbus autem hic
ex iisdem delictis fit, ex quibus etiā prior. Pneumonis siue
pulmonia, ab his maximē fit. Quum pulmosanguinem in
seipsum traxerit, aut pituitā salsam, & non rursus dimiserit,
sed in ipso coacta ac compacta fuerint: ab his tubercula fieri
solent in pulmone & suppurari. Hic autem hac patitur. Ab
initio & per totum morbum tussis acuta sicca obtinet. Et ri-
gor, & febris, & dolor in pectoribus & in dorso incumbit. E
Aliquando etiā in latere, & erecta ceruice spiratio vehemens
incidit, hic vsque ad quatuordecim dies talia patitur. Sape
verò etiam plures. Deindē erumpit pus, & multū expuit. Sape
verò etiam velut araneorum tunicas expuit. Sape etiam
subcruentum. Et si quidē depurgatus fuerit & breui gracilis
factus pulmo, interitum effugit. Si verò non adhæret, & per
annum morbus tenet, & transmutatur, vt aliàs alia ager pa-
tiatur, huic in principio antequam pus erumpat, hac adhi-
bere oportet. Quum febris remiserit, multa calida lauetur,
& sorbitionibus multis vtatur. Prisanæ succum coctū, mel-
le ad coctum affuso, sorbeat. Et vinum bibat dulce album,
aut aquam mulsam coctam. Quum verò pus expuere ince-
perit, eadē bibat, quā prior suppuratus, & cibis ac potibus, & F
obsoniis iisdem vtatur, abstinens ab acidis, & acribus, & sal-
sis, ac pinguibus. Et à venere ac ebrietatibus, nisi morbo
commodum fuerit. Ex coloris autē inspectione a stimadum
est, qualibus opus habere videatur. Reliqua verò eadē fa-
ciat. Bibat etiā lac bubulum, ac caprinum pro tēpore. prius
autem subpurgetur lacte asinino cocto. Bibat etiā equinum
lac excolatum quotidie manē, poculi tres heminas continen-
tis mensura, si facere poterit. Si quidē igitur sic curatus me-
lius habebit, satis est. & si non eruperit pus in pectus, ipse se-
ipsum curret, quietē quā maximē corpori exhibens, & quæ
comoda sunt sibi ipsi exhibēs. Si verò erumpat pus in pectus,
qua parte tibi significationem de se præbere videbitur, illic
maximē sectione aut vstione facta, pus emittito modicum
primum.

A primū. Reliqua verò eadem facito, quæ & in priore suppu-
rato factò descripta sunt. Si in pulmone varix fiat, tussis sicca
corripit, & rigor, & febris in principio quidem morbi valde
vehementer, habet etiam erecta ceruice spiratio, & dolor in
capite consistit. Et supercilia impendere videntur, & tumor
in faciem descēdit, & in pectus, & in pedes. Sæpe verò etiam
in capite innititur, & præ dolore ubi is vexat, respicere non
potest, & corpus subpallidum est, & venæ per ipsum tendunt
flammeæ, aut nigræ. Huic quum sic habuerit, & dolor ma-
ximè premit, primū sanguis detrahatur. Deinde multa ca-
lida lauato. Et ubi situs habuerit, Cyceonem in vinò nigro
austerò quàm iucundissimo, æquali mēsurā aquæ mixtum,
B bibendum dato. Frigidum autem maximè bibere oportet.

Sorbtionibus autē vtatur ptisanæ succo cocto, melle bono
affuso. Hæc exhibere oportet in primis quatuordecim die-
bus. Si verò diutius morbus teneat, & dolor amplior fuerit
in corpore, & impotētia aderit, huic sic habenti eadē exhi-
beto, quæ ei qui pulmonem suppuratū habet, ubi quatuorde-
cim dies præterierint. Hic morbus fit à labore, & atra bile.

Quum venæ causæ per pulmonem tendentes, sanguine aut atra bile impletæ fuerint, venulæ aliæ in alias rumpuntur, fa.

vt quæ in angustiis sunt conclusæ, & exitum non habeant: &
dolorem exhibēt ac flatum in pulmone. Hic morbus diffici-

lis est, & multa curatione opus habet, Alioqui agrum nō re-

linquit, & plerumq; in multis simul commoritur. Si inflam-

matio in pulmone fiat, fit autē, maximè à vinolentia, & gu-

lositate, piscium capitonum, & anguillarū. Hi enim pingue-

dinem habēt naturæ hominis infestissimam. Iam verò etiā

factus est morbus à pituita, ubi sanguini mixta in pulmo-

nem influxerit. Accidit etiā ex carnis esu, & ex aquæ muta-

tione. Hæc igitur ager patitur. Tussit fortiter, & saliuam ex-

puit liquidā ac mustam. Sæpe etiā crassam & albam, velut

a raucedine, Et dolor premit acutus in pectora, & dorsum, &

laterum mollitudinem ac latera. Et acidum eructat. Et ex

pectoribus ac pulmonibus, velut venter murmurat. Et vo-

mit pituitam acidam, & si id quod vomuit in terram effun-

das, radit terram velut aceto infuso, & dentes stupefcunt,

& rigor ac febris, & sitis fortis detinet, & si quid pingue vo-

luerit edere, exugitur ad viscera, & vomitum inducit.

Hippocratis Liber

Et totum corpus torpor occupat. Quum verò reuomuerit, D paulò leuior sibi esse videtur. postea vbi vespera dici accessit, venter sonitum edit, & tormine versatur, ac murmurat. Huic quum sic habuerit, & tempestiuum esse visum fuerit, Medela. curationem sic adhibeto. Mel & lac, & acetum, & aquam, mixta in ollam infusa tepescacito, & origani capitati ramulis agitato, vbi verò tepida facta fuerint, bibenda dato, aut apprehensa lingua, sentim per fistulam infundito. Deinde conuolutum quietem habere iubeto. Postea si vomitus succedat, promptè vomat. Si verò non succedat, irritatione per pennam facta vomat, & si quid pituitæ vomuerit, per dies quinque idem faciat. hinc enim leuior euadet. Bibat autem hæc exercitatus, si fieri poterit, & multa calida lotus: Sin minus, saltem lotus. Postquam verò quinque dies præterierint, manè ieiunus bibat in aqua mulsa, aut vino mulso silphij succum, erui magnitudine, & allium comedat ac raphanidas ieiunus: & meracum vinum insuper absorbeat nigrum, aut album austerum. Bibat etiā inter cibum, & post cibum. Cibus verò siccis, & carnibus caninis vtatur coctis, si rigor & febris non apprehenderit. hic si à tali infusione per fistulā in os, purgetur, satis est. Sin minus, sursum per veratrum ipsum purgato. Post purgationem verò farinæ coctæ duas heminas absorbendas dato, melle affuso. Vinum verò idem bibat aquosum. At si nō in principio affueris morbo, lacte ipsum crassefactum in pectore ac dorso vrito, ita enim maximè à Vltio. morbo liberari poterit. Si verò non fuerit vltus permanet, F & nō valde deficit, sed ad senectam vsque adhæret. Sæpe etiā commoritur, si non in primis quadraginta diebus mortuus fuerit. Quare multa quàm maximè opus est cura. Et serum ac lac pro tempore bibat, bubulum & caprinum, & asininum ac equinum. Sic enim facilimè deget. Est autem Pulmonis morbus difficilis. Si pulmo ab erysipelate intumuerit, erysipelas. Hic autem tumor maximè à sanguine fit, quum pulmo in seipsum sanguinem attraxerit, & susceptum tenuerit. Morbus autem hic æstatis tempore maximè fit: Hæc igitur ab ipso ager patitur. Tussis incidit sicca, & rigor, & febris, & erecta ceruice spiratio, & dolor fortis in pectoribus, & nares aperit, velut equus à curtu. Et linguam exerit, velut canis æstate ab ardoris flatu vltus. Et tumor detinet pectora.

A ctora. & parum loquitur. & rubor est in facie. & pruritum fert in corpore. & præ dolore decumbere non potest. Sed ipse seipsum anxius iactat. Hic in septem diebus moritur. Veruntamen in principio quum sic habuerit, per hæc curetur. *Rub fac*
 Corpus quidem perfrigeretur, betis in aqua frigida tinctis, *Medela.*
 ac corpori impositis, in recenti maximè dolore. Aut lintea frigida aqua tincta ac expressa apponito. Et si quidè sic melius habuerit, satis est: Sin minùs, terram figuralem frigidam pro cataplasmate imponito. & sub dio decumbat. Sic enim tractatus saepe septem dies effugerit. Quum autem septem dies præterierint, & dolor adhæserit, dolentem partem intus, cum oleo illinito, & tepefactoria eadem quæ in *Curatio.*
 B pleuritide adhibeto: & potionē ad subpurgationem ipsi dato, ex peplio, & meconide, siue peplo, & grano cnidio. Et post purgationem, lenticulæ heminam absorbendam dato. Bibat autem aquam. Postera die multa calida aqua ipsum lauato, capite excepto. Postea origanum in aqua mulla macerato, & bibendam dato. Potibusque quàm calidissimis utatur. Si-
 bos autem accipiat eosdem quos & qui à pleuritide correptus est, si non febris adhæserit. Hic morbus grauis est, & *Pectoris*
 pauci effugiunt. Si pectus & dorsum dirupta fuerint: (Di- *scapulae*
 rumpuntur autè maximè à labore) æger hæc patitur. Tussis *rumve*
 obtinet acuta, & saluam expuit aliquando subcruentam, & *scissura.*
 rigor & febris plerunque corripit. & in pectore, & in dorso, dolor inest acutus. & in latere velut lapis incumbere videtur, & à dolore perpetuò pungi, velut si quis acu stimulet. *U*
 Huic quum sic habuerit, statim lacte in potu dato, pectus & dorsum inurito. Et sic celerrimè sanus erit. De cætero verò quietam maximè corpori vitam degat. Si quid enim laborarit, & aut currum, aut equum ascenderit, aut humeros oneri subdiderit, periclitabitur ne rursus morbus recidiuū faciat. Et si hoc contingat, periculum est ut corrumpatur. Morbus enim reuersus magis premit quàm ab initio. Si verò nō fuerit vltus, iisdem ipsum curato quibus & suppuratum, for-
 tionibus, & potibus, & cibis. In summa verò, quietem agat, & commodis cibis alatur, Si enim sic tractatus fuerit, celerrimè sanus erit. Morbus autem grauis est. Si in latere tuberculum nascatur, & suppuratus fiat, hæc patitur. Rigor te- *Tuberculu*
 net & febris, & tussis sicca per multos dies. Et dolet latus. & *lateris.*
 ad mam

Hippocratis Liber

ad mammam, & ad clauiculā, & ad scapulas, dolor impetum **D**
Curatio. facit. Hic quum sic habuerit, in primis decē diebus sorbitio-
 nibus vtatur, ptisanæ succo cocto melle affuso, quū sorbitio
 cocta fuerit. Vino autem vtatur albo, dulci, aut aultero, & a-
 quoso. Et vt vinū sepe sorbeat, ac expuat iubeto. Et à somno
 impedito, donec vndecim dies praterierint. Post hos dies ci-
 bis paucissimis vtatur, carnibus catulinis aut galli calidis.
 Oportet autē ipsas probe cum iusculo præparare, & iusculū
 a sorbeat. Et sorbitionibus prius quā cibo vtatur, & ne si-
 tiat, donec latus suppuratum fiat. Suppuratur autē maximē
 in quadraginta diebus, aut paulō prius. Hoc autē cognosces,
 puris emis- **E**
 sio. vbi suppuratum fiat latus. Pus enim non expuit, neque reuo-
 mit. Hunc quum sic habuerit, vbicunque tumor significatio-
 nem de se præbuerit, secato aut vrito. Et postea pus paulatim
 emittito. Et postquam exhauseris, linamentū crudi lini im-
 mittito & hoc postridie rursus exempto, paulatim pus exhau-
 rito. Deinde rursus linamentum indito, & rursus tertia die, &
 aliis deinceps, bis per diem exaurito, donec resiccatum fue-
 rit. Dato autem & cibos & obsonia, si admiserit. Et bibat mo-
 dicum non multum, siue vinum, siue aquam. Edat etiam ori-
 ganam tenellam, plurimam melle tinctā. Si verò tenellam
 non habeat, siccam tritam & melli ammixtam plurimā ex-
 hibeto. Et neq; frigeat, & balneis lauet, & molliter cubet. Et
 sic hunc morbū curans, celerrimē sanum feceris. Quum au-
 tem sanus euaserit, vitet frigus, calorem, solem. Et deambu-
 lationibus modicis vtatur post cibum, vt ne lassitudo corpus **F**
 corripiat. Hac faciens sanus erit. Ex his morbis quoscunq;
 vsseris, statim post vssionem, porrum multum tritum super
 vsturas imposito, & per diem vnam finito. Tres sunt tabis
 species. Prima quidem fit à pituita. Quum enim caput pitui-
 ta impletum agrotarit, & calor accesserit, pituita in capite
 computrescit, vt quæ moueri non potest vt decedat. Postea
 quum crassæ factæ fuerint & putrefactæ ac supereplexæ ve-
 nula, fluxio in pulmonē fit. Et pulmo vbi suscepit, statim
 agrotat, vt qui à pituita mordetur quæ salsa est ac putrida.
 Hac igitur æger patitur, febris debilis inuadere incipit, &
 rigor, & dolet pectora ac dorsum. Aliquando etiā tussis pre-
 mit acuta, & expuit saliuam, multam & liquidam ac salsam.
 Et hæc quidē in principio morbi patitur. In progressu verò
 corpus

Tabis tres
species.

A corpus attenuatur, cruribus exceptis, hæc enim intumescunt, & pedes & ungues contrahuntur, ex humeris autem tenuis & debilis est, & fauces velut lanugine implentur, & velut per arundinem sibilat: & fortiter sitit per totum morbum: & multa impotentia corpus habet. Hic quum sic habuerit, in anno corruptus male perit. Verum studium quam maximè adhibere oportet, ac reficere. Et primum quidem veratrum bibendum *Medela* dare infra autem subpurgare epithymo, aut pepilio, aut grano cnidio, aut tithimalide. Hæc quater in anno dare oportet, sursum bis, deorsum bis. Dandum est & lac asininum coctum ad subpurgationem, aut bubulum, aut caprinum. Bibat etiam crudum lac bubulum, tertia aque mulsæ parte ammixta, per

B quinque & quadraginta dies, ammixto etiã origano. Caput autem ipsius prius purgetur, pharmaco ad nares appposito. Cibariorum autem & obsonia dentur, neque pingua, neque nidiorosa, neque valde acris. Hæc autem morbum obseruando facere oportet, & deambulationibus ad cibos uti, obseruando ne frigeat. Hyeme verò iuxta ignem habitationem faciat. Vinum autem bibat austerum, nigrum, quam vetustissimum ac iucundissimum, verum modicum. Et si tibi visum fuerit, ante pharmacum fomentum adhibeto, & sic pharmacum dato. Si verò dare nolueris, facto fomento, vomitum ex cibis facere cogito, velut prius scriptum est. Huic si commodæ fuerint, deambulationibus utatur. Si verò non conducant, corpore quam maximè quiescat. Hic hoc modo tractatus, facillimè in morbo deget.

C Est autem morbus lethalis, & pauci hunc effugiunt. Secunda tabes fit à labore. Eadem autem æger patitur quæ & prior. Morbus autem hic magis priore quiescit, & æstate remittit, Saliuam verò expuit crassiorē priore, & tussis premit maximè senes, & dolor fortior est in pectoribus, & velut lapidis incumbere ipsis videtur. Dolet etiam dorsum. Et color ipsius limpidus existit, & si quid laborarit, flatus & anhelatio oboritur. Hic ex hoc morbo in tribus annis maximè moritur. Curare autem oportet iisdem, quibus etiã priorem.

Hic morbus multis adhæret usque ad tres annos, sed moriuntur. Estque morbus grauis. Tertia tabes. Ab hac hæc patitur. Medulla ipsius spinalis sanguine plena fit. Tabescit autem similiter & à cauis venis. Hæc verò pituita hydropiformi, & bile replentur. Patitur autem eadem, ab utris tandem tabescat.

Tabes secunda.

Tabes tertia.

tabescat. Et homo statim niger fit ac subtumidus. Et partes **D**
sub oculis pallidæ fiunt. Et venæ in corpore pallidæ distentæ
sunt, quædā verò valde rubicundæ. Maxime autē manifestæ
sunt, quæ sunt sub alis. Et sputit pallida, quæ ubi ipsum inua-
ferint, suffocāt: & tussire volens aliquando non pōtēst. Quan-
doque autem præ suffocatione & tussendi cupiditate, bilem
aceruatim vomit, aliquādo verò pituitam. Sæpe verò etiam
cibos quū comederit. Et ubi reuomuit, leuior sibi esse vide-
tur. Deinde modico tempore interposito, in iisdē doloribus
iācēt. **Curatio.** Hic etiam acutius loquitur quā quum sanus esset. Et
rigor ac febris interquiescens, rursus sudorosa corripit. Hūc
ubi sic habuerit, cibis & sorbitionibus, & potibus ac pharma-
cis, & reliquis omnibus curato, velut priores. Morbus autem **E**
durat maxime annos nouē. Postea durat dum corrumpitur,
pauci verò ex ipso effugiunt. Grauis enim est morbus. Si ve-
rò voles, sic ipsum curato. Primum fomentū adhibeto, & ubi
fomentum adhibueris, postridie aquæ mulsæ dimidium con-
gium ipsi bibendum dato modico aceto affuso, & hæc citra
respirationē bibere iubeto. Deinde stragulis ipsum ad mul-
tum ac quā longissimū tempus cōtegito. Si verò non susti-
neat, & euomere velit, vomat. Si verò vomitus non sequatur,
tempore iam aliquo interposito, aquæ tepidæ poculo magno
superingesto vomat, irritatione per pennā facta. Quum ve-
rò euomuerit, vt bene habeat, quietē agat per hūc diem. Ubi
autem cœnæ tempus fuerit, cœnet mazam modicā, & obso-
nium habeat, salsamentū & porrum. Hęc autem quā pluri **F**
ma edat. Vinum verò bibat dulce. Reliquo tēpore per totam
diē, exordio manē facto, multa calida lauetur, & post balneū
cauere oportet, vt ne frigescat, sed decubens plurimo tēpore
dormiat. Quum autē à somno surrexerit, viginti stadia mi-
nimum circumeat illa die. In aliis autem diebus alia quinque
stadia prioribus addens vadat, singulis diebus additione fa-
cta, donec ad centum stadia perueniat. Ventrem verò quoti-
die subpurgare oportet, succis betæ, & à brassica, ita vt vtran-
que seorsim coquas, & de vtraque congiū excoles. Deinde
adipis à rhenibus detracti minæ quadrantē ammisceas ac si-
mul coquas, in vtrisque succis diuisim facta coctura. Quum
autē bibere voluerit, ad brassicę quidem succū, salem adjici-
ro. Ad betæ verò succum, mel affundito. Licet autem seorsim
vtranque

A vtranq; bibere: Aut melle in alterum poculum affuso bibat, in alterū verò immisio sale. Ebibere autem oportet totū succum, & hæc facere per triginta dies. Secundo verò mēse edat panē, & carnes pingues suillas coctas, aliud verò nihil. Vinū autem bibat albū, austerum, & iter faciat, non minus stadiorum triginta ante cœnam. Post cœnam verò decem, & ne frigat, sed cōtegatur. Hæc si fecerit, leuius morbū feret. Tertio autem mēse cyceonem floridum bibat, apij radices, & anethum, & rutam, & mentam, & coriandrū, & papauer tenerū, & ocimum, & lentē, & mali punici dulcis & vinosi succum. Oportet autem dulcis duplam mensuram esse, ita vt vtriusq; succi simul sit hemina dimidiū, & vini nigri iucundi austeri hemina dimidiū, & aquæ hemina dimidiū. Postea flores tritici in hoc diluantur permixto, & in poculum infundantur. Et postea farina erui acetabulum adiiciatur, & polentę tantundem, & casei veteris caprini rasi tantundem, & hæc permixta ebibat. Deinde modico tēpore interposito prandeat panem, & obsoniū habeat, frustū torpedinis aut squatinæ, aut galei, aut raia. Et carnes suillas edat coctas & crasse faciat seipsum, quietē quā maximē agens. Et decimo quoq; die fomētum sibi ipsi leuiter adhibeat. Quarto autem mēse, quinto quoq; die leuiter fomento vtatur. Et edat obsonium plurimū. Sint autē obsonia, caseus, & carnes ouillæ coctæ paucæ. Et iter faciat per stadia, velut antea dictū est. Et prima quarti mēsis die, initio à decem stadiis facto eat, & quotidie addat, donec octuaginta stadia fiāt, & deambulet in die stadia octuaginta. Ante cœnā, triginta. Post cœnam, viginti. Mane triginta. Reliquo verò tēpore victu vtatur, mazam & panē vtrāq; edens. Et obsoniū habeat, chartilaginea. Sed & carnes omnes edat, exceptis bubulis ac porcinis. A piscibus autem is abstineat, à mugile, anguilla, & melanuro. Edat autem torpedinē, squatinam, raiam, galeū, pastinacā, & ranas. Ex aliis nihil. Si verò videatur innoxius esse, etiam cyceonē bibat. Postquā autē dormire voluerit, bibat de vino nigro, iucundo, veteri, poculum duarū heminarum. Et per diem eodē vino vtatur inter cibum. Et in die iter faciat per stadia centum quinquaginta. Ante cœnā nonaginta. Post cœnā, viginti. Mane, quadraginta. Hic non modo curatus, in anno sanus euadit. Resiccatur medulla spinalis maximē, quā venulæ ad medullam tendentes

Secūdi mensis curatio.

Tertij.

Quarti.

Medulla spinæ curarescat.

tes

res fuerint obturat; itémq; ex cerebro accessus. Propter corporis autem afflictionem hæc patitur, & agrotat. Reliccatur etiam à venere. Hæc igitur patitur. Dolor acutus incidit ipsi in caput, & in collum, & in lumbos, & in lumborū musculos, & in articulos crurum, vt aliquando flectere non possit. Et stercus non secedit, sed sistitur. Et vrinæ difficultate vexatur. Hic in principio quidē morbi quietius degit. Quāto autem magistēpus morbo prolongatur, tanto magis omnia dolet. Et crura velut ab aqua inter cutē tument. Et vlcera à lumbis emergunt, & alia quidē sanescunt, alia verò nascuntur. Huic quum sic habuerit, caput purgato, hippophaïs succo, aut enidio grano, corpore prius valde bene foto. Vesperī verò post purgationem, ptisanæ duas heminas sorbeat, melle affuso. E Vinum autem bibat albū molle. Postera die asinini lactis cocti, melle affuso, octo heminas ebibēdas ipsi dato. Si verò asinini non habeas, bubuli, aut caprini cocti tres semicongios, melle affuso. Et dum temporis opportunitas adest, lac bibat, sero & lacte vtens, per quinq; & quadraginta dies. Cibis autē & obsoniis vtatur quā maximē per aluum secedentibus. Vinum bibat album molle, Mendesium. Quum autem crassissimus fuerit, in lumbos ipsius ab vtrāq; vētriculorū parte crustas quatuor inurito, & in dorsum vtrinque quindecim, & in cēruicem duas, inter tendines. Si enim vstio successerit, sanum facies. Est autem morbus hic grauis. Quatuor morbi à rhenibus sūt, A primo hæc patitur. Dolor acutus incidit in rhenem, & in lumbos, & in testem secundum rhenem situm. F Et frequenter mingit, & adstringit paulatim ac supprimitur vrina, & cum vrina procedit arena. Et vbi per vrinæ meatū exit arena, dolorem fortem in meatu exhibet. Quum autem ipsam per vrinam eiecerit, dolor remittit. Postea verò rursus in iisdem doloribus iacet. Quum autē mingit, etiam colem præ dolore fricat. Vulgus autem medicorum quod non intelligit morbum, vbi videt arenam, putat vesicam è calculo laborare. At nō vesica, sed rhen lapide laborat. Hic morbus fit à pituita, quū rhen susceptam in seipsum pituitam, non rursus dimiserit, sed in ipso in totum concaluerit, & fiunt ex ea tenues lapilli, velut arena. Huic quum sic habuerit, cum scāmonix succo aut ipsa radice, fomento prius adhibito, totum corpus purgato, postera verò die duobus congiis succi ciceris albi

Medela.

Vstio quæ.
Rhenum
morbi qua
tuor.Medicorū
error.
Calculi
caussa.

Medela.

- A** albi subpurgato, quē sale iniecto bibendum dabis. Post hac potibus, & cibis, & balneis curato, & eadē quæ in vrinæ stillicidio exhibentur pharmaca dato. Quum autē dolor preferit, multa calida lauato, & tepefactoria qua parte maximē dolet, adhibeto. Cū autē intumuerit & eleuatus fuerit, sub id tempus iuxta rhenem secato, & extracto pure arenam per vrinam ciētia sanato. Si enim sectus fuerit, fugæ spes est. Sin minus, morbus homini cōmoritur. Secundus rhenum morbus. Dolores fortiter premunt, velut in priore. fit autē morbus à labore, quum ruptæ fuerint venulæ ad rhenem tendentes, & postea rhen sanguine repletus fuerit. Hic vbi hac patitur, cū vrina sanguinē mingit in principio morbi, deinde progressu temporis pus: hic si quietem corpore habuerit, celerimē sanus erit. Si enim quid laborarit, dolores multo magis obtinebunt. Quum itaq; suppuratus fuerit rhē, circa spinam intumescit. Hunc vbi sic habuerit, circa tumētē partem secato, profunda maximē sectione iuxta rhenē. Et si quidem successerit sectio, euestigio sanum facies. Si verò aberraueris, periculum, est ne vlcus linamētis curandū fiat. Si autē concreuerit vlcus, vēter intrinsecus à rhene suppuratur, & si quidem pus intus rumpatur, & ad intestinum rectum procedat, fugæ spes est. Si verò contigerit alterum rhenem, periculum est ne pereat. Curetur autē pharmacis, & iisdem omnibus, quibus & prior, & diatæ eandem habeat. Hic morbus grauis est, & multi ex ipso ad tabem rhenalem deuenerunt.
- C** Tertius rhenum morbus. Vrina prodit, velut à carnibus bubulis affatis succus. fit autem morbus ab atra bile, cū bilis in venas confluerit quæ ad rhenem tendunt, & cū confliterit, exulcerat venulas & rhenē. Ab vlceratione igitur tale quiddam cū vrina procedit, Dolores autē hærent in lumbis, & in vesica. & inter anum & pudendum, & in ipso rhene ad modicum tēpus. Deinde remittit dolor, & rursus acutus breui corripit. & in tenuem ventris partem aliquando dolor incidit. Huic quum sic habuerit, vētre subpurgato, epithymo. aut scammonia radice. Bibēda verò eadem dato, quæ & ex vrinæ stillicidio laborāti, & quum dolor habuerit, multa calida lauato, & tepefactoria ad dolentē maximē locum adhibeto, & forbitione vtatur farina cocta, melle affuso, & reliquo victu vtatur quā maximē per aluū secedente, & vinū bibat

Secundus
rhenū mor-
bus.

Morbus
hic qualis.

Curatio.

Tertius
rhenū mor-
bus.

Medela.

D

Hippocratis Liber

**Quartus
rhenū mor-
bus.**

Curatio.

**Obsonium
obseruato.**

bibat album Mendacū mellei coloris. Aut aliud albū iucun- **D**
disimum probè temperatum. Hic morbus nō valde deficit.
& pro tēporis opportunitate serum & lac bibat. Serum qui-
dem ad purgationem. Lactis autem potum faciat in tēpore
per quinq; ac quadraginta dies. Hæc si ita feceris, morbum
in melius dispones. Quartus rhenum morbus. Morbus hic
fit à bile & pituita, maximè tempore æstatis. fit etiā à vene-
re morbus. Hic æger hæc patitur. Dolores premunt ipsum in
lateris mollitudinē, & in lumbos, & in lumborū musculos:
& patitur qualia solet mulier ex partu laborans, & non susti-
net in sanam partem decumbere, sed valde dolet, & ex late-
ris mollitudine quædam pendere videtur, velut obrupta. Si **E**
verò pronus decubat, non dolet. pedes & tibiæ ipsius semper
frigent. Vrina verò vix prodit, præ pituitositate & crassitudi-
ne sua. & si siueris ipsam ad modicum tempus depositam do-
nec defederit, videbis subsidentiam crassam, velut farinam,
& si quidem bilis præualuerit, subfuluā ipsam videbis. Si ve-
rò à pituita fuerit morbus, alba & crassā erit. & primū qui-
dem in annū, aut paulò amplius aut breuius tēpus. æger ta-
lia patiens perseverat. Si verò prolongetur morbus, & magis
dolet, & suppuratur. & quum suppuratus factus intumuerit,
qua maximè parte intumuerit, in rhenē secato, & pus emitti
tō & si quidem successerit sectio, statim sanū facies. Hūc cū
sic habuerit, iisdem omnibus curato, quibus etiam priores. **F**
Et à principio morbi oportet & purgare, & ante subpurga-
tionē fomentū adhibere, & balneis frequenter lauare. Vnga-
tur item & magis calefiat, neq; frigeat, & à sole abstineat: &
neq; venere vtatur. Hæc si fecerit, & nō celerrimè sanus eua-
serit, nihil noui est. Morbus enim est grauissimus. Si verò
citra pharmaca curari velit crassum, ex dicta facere oportet,
siue ex hoc morbo ægroret, siue ex aliquo de prioribus, diui-
sis cibis quos edere solet in decem portiones, ita vt vna parte
detracta, reliquas comedat. Obsonium autē habeat, carnem
suis tritam. & ea die decē stadia deambulet. postera verò die
& tertia vsq; ad decem dies, portionem minus edat, & deam-
bulet decem stadia aut plura singulis diebus addens. Quum
autem ad vltimam cibi portionem deuenerit, etiam ad cen-
tum stadia iter faciat. & edat quidem vnā tantū portio-
nem, & ea die centum stadia deambulet. Post coenam autem
viginti

A viginti, mane verò quadraginta. Vinum autē bibat Mendacū album, austerum, atq; hæc per tres menses faciat. postea reliquo tempore deambulationes imminuat, & cibos plures comedat, eodem modo additione facta velut detrahebat. Deambulationem verò detrahat vsque ad decimū diem. & post ea quā maximē quietē habeat, & cibis puris alatur, & obsonia quā pinguisima habeat, & dulcia omnia ipsi cōmoda sunt. Ab oleribus autē, & acidis omnibus abstineat, itemque ab acribus, & quæ flatū faciūt, Multa etiā calida lauet, & ne frigeat. Hæc si fecerit, celerrimē sanus erit. A rhenū morbo corripit morbus magnus venarum cauarū, quæ à capite iuxta iugulum per spinam tendunt, ad malleolū pedis externum, & ad intermedium magni digiti locū. Morbus hic fit à pituita & bile, quū in venas cōfluxerint. Venæ autē hæ sanguine plenæ sunt. Si igitur quid alieni in ipsis præter lapsum fuerit, agrotant. Si dextram partē morbus corripit, dolorē ex coxæ acetabulo in principio exhibere incipit. Quanto autem amplius tempus progressum & prolongatū fuerit, tanto acutior dolor infra descendit. & quum ad malleolum pedis externum, & ad magni digiti intermedium locum deuenit, rursus ad caput venire incipit, & vbi in ipso vlcus cōstitit, fortiter premit, & homo caput sibi distringi putat. & oculi pituita replentur, itemq; totum corpus. huic quum sic habuerit, elaterium bibendum dato, aut thapsiæ radicē, aut veratri, aut succum scammonia. post purgationē verò eadē exhibeto quæ superioribus. Si verò ab hac curatione non desinat, lacte ipsum crassefacito, & in scapulam dextrā quatuor crustas inurito, & in acetabulū coxæ dextræ, tres: & sub nates, duas: & in medio femore, duas: & supra genu, vnā: & supra malleolum, vnā. Hic vbi sic vstus fuerit, neq; sursum neque deorsum morbū procedere permittit. Si verò alicubi dolor ruptus visus fuerit, si quidem in crus incubuerit priusquā vratur, claudus erit. Si verò in caput, surdus aut cæc^{us}. Si verò in vesicā, prodit simul cum vrina sanguis maximē, per quadraginta dies. Verū si in vesicam eruperit, eadem pharmaca quæ & in vrinæ stilliticio dato, & si alicubi dolor congregatus fuerit, vrito. Vrere autem oportet carnosa quidē, ferro: ossa verò & nervosa, fungis. Carterū ante hæc si in principio morbi accesseris, ista facere oportet. In potu exhibendum

Quam magnus morbus hinc fiat.

Medela. anceps.

Curatio.

Hippocratis Liber

est vinum album Mendacum, aquosius, plurimum per diem, D
& inebrietur donec sanguis à naribus erumpat. Quum autē
fluere inceperit, minimum tres & decem dies fuit. Vbi verò
hi dies præterierint, non ampliùs inebrietur, neq; vbi semel
fluere inceperit. Bibat tamen paulò ampliùs vinum inter ci-
bum, quo sanguis fluere possit. Iam verò quibusdam sedato
sanguine, erupit in vesicā, & prodiit sanguis ac pus. Si igitur
eruperit, eadē pharmaca quæ & ex vrinæ stillicidio laborāti
dato. Et de eodem vino plus bibendum exhibeto. Hic si ita
curetur, & cibos per aluim secedentes assumat, & obsonia
eiusdē facultatis, citissime sanus erit. Morb⁹ autē grauis est.

Vena fini-
stra læsa.

Alius morbus à sinistra vena. Hic æger alia quidem eadē E
patitur, quæ etiā prior. Verum in splenem dolor acutus in-
cumbit statim, & in principio morbi. Et si non intellexerit
priusquā incubuerit, profilit in pulmonē. Huic per fungos
crustas octo inurito, capita lienis quā celerrimē interci-
piens. Et vbicunq; alius dolor incubuerit, vrito. Sic enim sta-
tim sanus erit. Si verò nō fuerit vstus, sanus autē spontē fiat,

Medela.

plerisq; post duodecim annos, morbus rursus reuertitur, &
si splenē occuparit, multis aquam inter cutem inducit. Verū
oportet statim curare velut priorem, & si visum fuerit, vrere
velut priorē, si dolor in iisdem articulis cōstitierit. Si verò nō

Pituita.

sic curatus fuerit, de cætero colliquescens moritur. Morbus
enim grauis est. De pituita easdem sentētiās habeo, quas &
de bile, & species ipsius multas esse puto, & alia quidē popu-
laris est, quæ sanē recētissima est. Cuius etiā curatio facilima F

Curatio.

est. Vomitus enim post cibū facere oportet per duos aut tres
dies, ita vt & prandeat insuper ac quiescat, si prioribus die-
bus semel in die cibū capere, & laborare solitus fuit. Sin mi-
nus, huiusmodi diætā vtatur. Primum multa calida lauetur,

Vitæ.

quū vomitū facere voluerit, & edat mazā oleo & melle sub-
actam, & panem ex assatū vererem. Hæc enim magis pituitā
trahūt. Obsoniis autē vtatur & oleribus acribus. Sed & pin-
guia, & dulcia, & acida omnia idonea sunt, vt permixta assu-
mātur. Et oleribus omnibus viridibus vtatur. Et bibat inter
cibum frequenter modicum vinū dulce, & in fine placētā

Vomitus
qui.

insuper edat, & mel, & ficus. Et quū cœnabit, pocula largē ex-
hauriat, & vbi iam repletus fuerit, parū dormiat. Deinde ex-
perrectus vomat, magno vini poculo epoto, cum tepida aqua
temp

A temperato. Trahit enim magis pituitā & humorē ex carni-
bus, & corpus magis resiccat. Euomat autē donec ficus euo-
muerit. Hæ enim postremū euomuntur. Atq; hæc quidē hac
die faciat. postera verò contineat seipsum vsq; ad cœnā, & in
cœna sumat panē, cui nihil fursurū decessit. Obsonium autē
sit ex fortioribus. Vinum verò bibat nigrum, austerū. Atque
hæc quidē popularis pituitæ medela est. Si verò edere & bi-
bere potest, & cibis delectatur, deinde verò crura grauentur,
& color immutatus fuerit, huic ostendendū est, pituitā mo-
lestantem in ventre esse. Verū oportet quum sic habuerit,
mel & vinū dulce, & oleum, & nitrum tali ouilli magnitudi-
ne, permixta per clysterem infundere. hæc enim mitissima
B sunt in clysterem ad hominis naturā. Mensurā autē singulo-
rum esse oportet, vini quidem heminam, olei verò heminæ
dimidium, & mellis tantundē. Si verò clysterē non voluerit,
humectum hominē facere oportet, fomento humido admo-
to. Fortassis enim etiā sic sterco subeuacuari poterit. Nam à
ciborum nimia resiccatione hæc patitur. Siquidē igitur quis
edat cibos valde succosos, fortassis hæc non ita vehementer
patiatur. Si verò etiā aliquando patiatur, modica curatione
opus habuerit. Hunc ita curans, celerrimē sanum feceris.

Quæ facile
subluant.

At si antiquior fuerit pituita, appellatur autē hæc pituita
alba, hæc patitur. Grauat hominē magis, & speciem à popu-
lari alienā habere videtur pallidiorem & totū corpus laxo
tumore intumescit, & facies rubet, & os siccum est, & fitis te-
C net: & quum comederit, spiritus densus ipsi incidit. Hic eadē
die aliquādo melius habet, aliquando derepente dolet, & sibi
mori viderur. Huic si quidē venter sua sponte turbatus fue-
rit, sanitati proximus erit. Si verò non sua sponte venter tur-
betur, purgare oportet cneoro dato, aut hippophae, aut cni-
dio grano, aut lapide Magnesiæ. Et post purgationem, lenti-
culæ hemina vna aut duæ dentur ad absorbendū. Coquatur
autem allium in lenticula. Detur etiā betæ pinguis hemina
non conditæ, polenta circuminspersa. Bibat vinum nigrum,
austerum, & forte. Postera verò die mane stadia viginti de-
ambulet. A qua deambulatione reuersus, panē edat paruum
exassatum, & obsoniū habeat allium coctum. & de eodē vi-
no paulo meracius bibat. deinde stadia vadat triginta. & vbi
tempus adierit cœnet, quātum etiā prandere cōsuevit: obso-

Quæ ven-
trem mo-
ueant.

D 3

nium

certa co-
d. men

Hippocratis Liber

Quæ caro sonium autem habeat, maximè quidem pedes, & capita suil **D**
piscisve dā la. Sin minus, galli carnibus & suis tritis vtatur. Ex piscibus
 di. autē scorio, aut dracone, aut cuculo, aut callionymo, aut go

Morbi hu- ribus autē solo allio, & nullo alio vtatur. Hoc verò quàm plu
ius causa. rimū edat, & crudum, & assatū, & coctum, semper plus sin
 gulis diebus. & laboret ex modico ampliū, respectu ad cibos
 facto. hic morbus maximè sit tempore æstatis ex aqua potu.
 Insuper & à somno multo. Iudicatur autē in triginta diebus,

Medela. an lethalis sit, aut non. Atque hæc quidem faciat vbi trigin
 ta dies præterierint. In primis autem diebus, sorbitionibus
 vtatur, lenticula cocta acidiorē ab aceto, & ptisana acida. Bi
 bat aquam mulsam tepidā, polēta modica inspersa; quo cor **E**

Aqua inter cutē de pi
cutē de pi- inter cutem trāsitus sit, hoc modo. pinguedo colliquescit, & à
cutē de pi- calore qui in pituita est, sit aqua. Cognosces autē hoc an quis
fiat. sanari possit, aut non. Donec enim quis in pectine pinguedi
 nem habet, fieri nō potest vt ipsum sanes. Cognosces autem
 ex his maximè, an pinguedo insit in pectine, aut non. Si qui
 dem febres succedāt, & nō potest exurgere, & vmbilicus in
 flatus extra prominet, indicium est non ampliū inesse pin
 guedinem, & sanabilem esse. Huic conducit vētrem ficcare,
 & panem dare cui nihil fursurum decessit, antiquū calidū. **F**

Obsonium autem carnē leporinam, & canis perfecti, & oui
 culæ, & suis assatam, & galli assatā ac calidā & polypos edat
Viātus. coctos in vino nigro austero. Vinū autem bibat nigrum, au
 sterum quàm crassissimū ac acerbissimū. Piscibus autē vta
 tur, gobio, dracone, callionymo, cuculo, scorio, & aliis hu
 iusmodi, omnibus coctis, nō recētibus, & frigidis. hi enim sic
 cissimi sunt, & in iusculū ne intingat, & insulsi sint pisces. ex
 oleribus autē vtatur raphanis, & apio. Torreat autē lēticulā
 ab aceto acidiorē, & edat. Et deambulet quotidie, & post cœ
 nā, & mane. & serotino tēpore dormiat, & mane exurgat. Et
 si quidē ab his restituitur, satis est: Sin minus, cneorū, aut hip
 pophais succū, aut granū cnidiū, bibedū dato. Et post purga
 tionem, lēticulæ heminas duas sorbeat, & panē parū come
 dat.

A dat. Vinum verò bibat nigrum, acerbum modicū. Bibat autem pharmacum bis in die, donec vacuus fiat. Si verò tumor constiterit in scroto, & femoribus ac tibiis, acuto scalpello multa & frequentia vulnuscula incutito. Et si hæc feceris, cito sanum efficies. Aqua inter cutem ex his fit. Quum æstatis tempore siti vexatus aquam multam biberis: nam ex hoc maximè fieri solet: & pulmo expletus fuerit, rursus ad pectora dimittit. Et quum in pectoribus fuerit, calorē vehementem exhibet, ut pinguedo quæ in arteriis inest colliquescat. & si semel liquari pinguedo inceperit, multo amplius in brevi tempore aquam inter cutem facit. Fit etiam si tubercula in pulmone fuerint enata, & aqua repleta, & in pectora rupta. Quòd autē fiat etiā à tuberculis aqua inter cutem, testimonium habeto, & in boue, & in cane, & in sue. In his enim quadrupedibus maximè sunt tubercula in pulmone, quæ aquam habent. Si enim dissecueris, citissimè cognoueris. Fluet enim aqua. Videntur autē talia multo magis in homine fieri, quàm in pecoribus, quanto etiam morbosiore diætā vtimur. Facti sunt autē & multi pectore suppurati tuberculis obortis. Hæc igitur in principio ad morbū consequuntur.

Aquæ inter cutē vnde.

Tubercula pulmonis.

Exemplo probat.

Purulentia etiam hinc fiunt.

Tussis sicca, & fauces exasperari videntur, & rigor ac febris succedit, & erecta ceruice spiratio, & corpus intumescit, & pedes tument, & ungues contrahuntur. & donec quidē in superno ventre fuerit aqua intercus, adest dolor acutus. postquam autem ad infernum ventrem venerit, melius habere sibi videtur. Postea progressu temporis patitur qualia prius impleto ventre. Quādoque etiam ad latus intumescit, & indicat vbi secare oportet. Si verò non indicat, multa calida lauato, & humeris apprehensum concutito, & deinde in vtro latere magis fluctuet audito. Quo intellecto costam tertiam ab vltima vsq; ad os secato. Deinde cum terebra caua vltra perforato. Et vbi perforata fuerit, aquæ parū emittito, & vbi emiseric, linamentum ex crudo lino indito, & spongiā mollem superimponito. Deinde ut ne excidat linamentum deligato. Emittere autem per duodecim dies aquam oportet, semel in die. Post duodecimum autem diem sequenti decimartertia totā aquam emittere, & reliquo tempore si subnascat aqua emittere, & ventrem cibus resiccare. Post sectionem autem hæc exhibere oportet. Succī silphij drachmæ pondus

Curatio.

Hippocratis Liber

dus parato, & aristolochiam tali ceruini magnitudine dera- **D**
 dito, & lentium ac erui torrefactorum polentam, dimidia
 chœnicis mēſura vtrunque purgato, atq; hæc melle & aceto
 subigito. Deinde paſtillos ſexaginta efformato, & quotidie
 vnum tritum in vini nigri auſteri ac iucundiſſimi hemina
 dimidia diluito, & mane in potu dato. Reliquum verò viſcū
 ac laborem eundem, velut priori tēpore, habere iubeto, Et ſi
 intumuerint pudenda ac femora, cōfidenter vulnuſculis im-
 paſtis pertundito. Hunc ſi ita curaueris, celerrimè ſanum fa-

Aqua inter-
 cus ab he-
 pate.

Curatio

Aqua inter-
 cus alia.

Alia à lie-
 ne.

cies. Ab hepate fit aqua intercus, quum in hepar pituita ac-
 ceſſerit, & hepar ipſam ſuſceperit, & humectum fuerit. Sta-
 tim igitur calorem huic exhibet, & flatum inducit. Deinde **E**
 temporis progreſſu aqua impletur. Poſtea morſus in corpus
 incidit. Et tumor in tibiis ac pedibus ineſt, & hepar durum
 eſt ac intumeſcit, & clauiculæ attenuantur. Huic quum ſic
 habuerit, in principio ſi hepar doluerit, organum tritum, &
 filphij ſuccum erui magnitudine, in vini albi dimidia he-
 mina diluta, bibēda dato. & lactis caprini poculum quatuor
 heminarum, tertia aquæ muſſæ parte ammixta. A cibis autē
 per primos decem dies abſtineat. Hi enim iudicāt morbum,
 an lethalis fit, aut non. Sorbeat autē ptisanæ ſuccum coctum,
 melle affuſo. Vinum autē bibat album Mendæum, aut aliud
 iucundiſſimum aquoſum. Quum autem decem dies præ-
 terierint, cibos accipiat puros, & obſonium habeat, galli car-
 nem aſſatā calidam. Habeat & catulinam coctā. Piſce verò **F**
 vtatur galeo, & torpedine aſſatis. Vinum verò idem bibat. &
 ſi quidem ab his quieſcat, ſatis eſt: Sin minus, poſtquam ſanè
 craſſiſſimus factus fuerit, & hepar maximum, fungis vrito.
 Sic enim celerrimè ſanum feceris. Inurere autē oportet cru-
 ſtas octo. Si verò aqua intercus innascat, & rumpatur in
 ventrem, iifdem medicamētis & potibus, & cibis, ac labori-
 bus, quibus priores curato. Vinum verò bibat auſterum ni-
 grum. Si verò tibi videatur diſceſſiſſe ab hepate, per ferrum
 vbicunque apparuerit vrito, & aquam paulatim emittito, &
 velut reliquos priores curato. Si verò ab his non ſanus fiat,
 temporis progreſſu corrumpitur ac moritur. Morbus enim
 eſt grauis, & pauci hunc effugiunt. Aqua verò intercus à
 ſplene, hoc modo fit, & ab huiusmodi maximè cauſa, quum
 quis ficuum viridiū, & malorū fructus multos ederit. Multi
 verò

A verò iam etiam à cibo botrorum multorum, & à multo misto, morbum inciderunt. Si quidē igitur in morbū collabatur, statim in doloribus est. Dolores enim acuti in splene consistunt, transeunt autem & in humerū, & in claviculam, & in mammam, & ad lumbos, & febres fortes tenent. Et si parum quid ederit, venter impletur, & splen attollitur, & dolorem exhibet. Hic morbus si durauerit, reliquo quidem tempore minus dolet. Quum verò fructuum malorū tēpus fuerit, & hos ederit, magis quàm prius dolet. Hunc ubi sic habuerit, à principio curato, & sursum quidem veratrum exhibeto. Deorsum verò cneorum, aut hippophais succū aut cnidium granum, Lactis item asinini heminas octo, melle affuso: & si quidem ab his restituitur, satis est: Sin minus, quū maximus fuerit lien, & maximè intumuerit, fungis vrito, capita eius interceptiens: aut ferramentis, cū multa cautione ac observatione ne ultra peruras. hæc à morbi principio facito, & hac diata nutriatur. Si quidem febris nō affuerit, pane utatur triticeo affato, aut ex duro tritico bis cocto: obsoniū autem habeat salsamentū Gaditanum, aut saperdā. Et carnem ouillam tritā. Et acida ac salsa omnia edat. Et bibat vinum austerum Coum quàm nigerrimum. A dulcibus abstineat. Quum autē exsurgit, & potens est, luctetur summis humeris, & laboret per circuitus multos in die, & comedat ea quæ dicta sunt. Si verò aqua intercus fiat, iisdem curato quibus & priores. Alia aqua intercus ab his fit. Aestatis hora si iter faciens per viā longam, in aquam pluuialem ac stabilem inciderit, & biberit de ipsa multum affatim. Si igitur carnes absorbuerint & cōtinuerint in seipsis aquam, secessus autem nusquam fiat, hæc patitur. Si quidē fuerit in carne, calorem facit & in ventre, & in corpore, vt pinguedo ventrē ambiens colliquescat. hic quādiu quidem iter facit, nihil mali habere videtur. Postquam autem iter facere cessarit, & sol occiderit, statim dolorem multū habet. progressu verò morbi valde attenuatur. Si verò etiam cibi fastidium accedat, multo plus attenuatur. Si verò cibos edere poterit, & ad laborē impotens fuerit, etiam amplius læditur, & plerisque horum tumor in totum corpus deducitur. Et tenui quidem color corporis liuidus fit, & venter magnus, & sitis fortis tenet, & viscera ipsius à calore resiccantur. progrediente verò tempore,

Medela.

Alia aqua intercus.

D 5

ad

Hippocratis Liber

ad edendum quidem promptus fit, & edit quodcumq; quis de- D
derit, & bibit, & dolet nihil. Si verò tumor obtumuerit, color
huic fit pallidus. Et venæ nigræ frequentes per corpus disten-
duntur. Indignatur autem & tristatur ex quauis re, etiam si
nihil noui accidat. Venter verò aqua perhumescit, & ma-
gnus fit, & laternæ speciem præ se fert. Et tēporis progressu
cibos nō admittit, sed videtur ipsi cucumeris syluestris odo-
rem habere, præ abominatione. huic ubi sic habuerit, cneori

Curatio.

aut hippophais succum dato, aut cnidium granū. hæc verò
pharmaca ita dare oportet. Cneorum quidē per sextā diem,
Hippophais autē succum per octauam. Cnidium verò gra-
num per decimam. & dare ipsa oportet donec expurgetur, & E
vacuus fiat. Interpositis autē diebus alatur ex iisdem qui-
bus & prior. Maximè autem de eadem aqua bibendū dato,
ex qua morbus corripuit, plurimum, quo ventrē ipsius tur-
bet, & valde secessum faciat. Sic enim potissimum sanum fa-
cies. Si verò tibi videbitur, etiam frequēter clysterem adhi-
beto, ex cneori triti dimidia hemina, mellis tertia hemina
parte ammixta, his cum quatuor succi betæ heminis dilutis,
atque sic infusis. postea die etiā asinini lactis coctis octo he-
minæ dentur affuso melle, aut adiecto sale potandæ. Et post
purgationem, iisdem vtatur quibus prior. & interiectis die-
bus, cibis ac potibus iisdē vtatur, & deambulationibus simi-
liter, & sic curatus breui à morbo liberabitur tertio mense,
aut sexto. Si verò negligentia aliqua contigerit, & non sta-
tim curatus fuerit, breui moritur. Sed & in attenuato iisdē F
vtendum est ad sanationem. Præhumeſtare verò antea cor-
pus ipsius oportet per fomenta, quo magis pharmacis obe-
diat. At verò statim curā adhibere oportet: Sin minus, cum
multis consenescit morbus. Sed & vter tandem morbus sit,
clysterem ex his adhibere cōuenit. Vini albi heminas duas
accipito, & mellis heminam dimidiam, & olei heminam di-
midiam, Nitri Aegyptij rubri torrefacti quadrantem, fo-
liorum cucumeris syluestris tuorum ac expressorum succi
heminam. hæc omnia mixta & in ollulam infusa feruefaci-
to, & per clysterem infundito. Morbus hepaticus. Fit ab
Morbus he- atrabile, quum influxerit ad hepar. Accidit autem maxi-
paticus. mē in autumno, in mutationibus anni. Hæc igitur æger
patitur. Dolor acutus ipsi in hepar incidit, & sub vltimas
costas,

A costas, & in humerum, & in claviculam, & sub mammam.

Et suffocatio fortis tenet. Et aliquando liuidam bilem reuomit. & rigor, & febris primis diebus debilior habet, & dum attingitur, hepar dolet, & color ipsius subliuidus est, & cibi quos prius comedebat, suffocant ipsum, & ingesti vrunt ac torquent ventrem. Atque hæc quidem in principio patitur. Morbo verò progrediente, & febres remittunt, & a paucis cibis repletur. In solo autem hepate dolor restat, & ipse aliquando fortis, aliquando quietus. Quandoque verò acutus corripit, & sæpe derepente æger animam efflauit. Huic con-

Medela.

B multa calida ipsum lauato, & aquam mulsam bibendam dato, & vinum album dulce, aut austerum, vtrum tandem profuerit. Et sorbitiones easdem quas etiam à pleuritide correpto. Caterum ad dolorem hæc bibenda dato. Oui gallinacei cocti liquorem terito, & succi solani dimidiâ heminam affundito, & aquæ mulsæ dimidiam semiheminæ partem ammisceto, diluito, ac bibenda dato, & sedabunt dolorem. dato autem quotidie donec dolor quiescat. Bibat etiam silphij succum erui magnitudine, & cum eo origanum tritum in vino albo diluat, & sic ieiunus bibat. Bibat insuper & pharmaca quæ in pleuritide dantur doloris gratia. Bibat & caprinum lac, tertia parte mellis ammixta, Sin autem lactis heminæ quatuor. Hoc mane bibat, quum alia non biberit.

C A cibis autem abstineat, donec iudicetur morbus. Iudicatur autem maximè in septem diebus, in his enim manifestum fit, an lethalis sit, an non. Si verò etiam suffocatio accesserit, hæc dare oportet quo vomat. Mel, aquam, acetum, salē, permixta in ollam nouam infundito. Deinde tepefacito, & organi capitati ramulis vnâ cum semine agitato. Vbi verò tepefacta fuerint, tepida ebibenda dato. Deinde stragulis iniectis cōtectum finito, donec quàm maximè exudarit. Et vbi vomitus ipsum apprehenderit, promptè vomat irritatione per pennam facta. Si verò vomere nō possit, aquæ mulsæ tepidæ poculum duarum heminarum insuper bibat, & sic vomat. Et si quid pituitæ aut bilis euomuerit, rursus idem facere oportet ad horas quatuor. proderit enim. Post morbi verò iudicationem curato modicis cibis, iisque puris datis. & si quidem

Suffocatio
nis medela.

Hippocratis Liber

quidem panem edere cupiuerit, panem calidum maximè pu-
rum edat. Si verò mazam, eam quæ vino dulci subacta non
est, edat, ubi tamen prius aqua subegit. Obsonium autem ha-
beat carnes catuli coctas, aut columbæ, aut pulli gallinacei
carnibus omnibus coctis vtatur. Ex piscibus autem galeo,
torpedine, pastinaca, & raiis paruis, omnibus coctis. Lauetur
autem quotidie, & frigus vitet & parum deambulet antea in
securitate. Hæc si seruauerit nō est timor vt morbus reuertat-
tur. Nam huiusmodi morbus grauis est ac diuturnus. Alius

**Alius he-
paticus
morbus.**

hepaticus morbus. Dolores quidem eodem modo premunt
in hepar, & color differt à priore. Malicorij enim formam
habet. In tempore verò æstatis maximè incidit. Fit autem à
bubulæ carnis esu, & vini potu nimio. Hæc enim omnia isto
anni tempore hepatis sunt infestissima, & bilem maximè ad
hepar adducunt. hæc igitur æger patitur. Dolores acuti inci-
dunt, & non deficiunt vlla hora, sed semper magis premunt.
Aliquando etiam vomit bilem pallidam, & ubi vomuit, pau-
lo melius sibi habere videtur. Si verò non vomuerit, bilis ad
oculos peruenit, & fiunt valde pallidi. Et pedes intumescunt.
Atq; hæc patitur quandoq; valde, quandoque minus. Quum
autem dies præterierint, in quibus morbus iudicatur, dolor
minus vrget, si nihil deliquerit, & eiusmodi diætam huic con-
stitui oportet, qualem & priori. Si enim inebriatus fue-
rit intempestiuè, aut venere vsus fuerit, aut aliud quid fece-
rit quod commodum non est, hepar statim ipsi durum fit, &
intumescit ac à dolore pulsatur. Et si quid facere festinarit, de-

Medela.

repente hepar & totum corpus dolet. Huic ubi sic habuerit, &
primi dies præterierint, fomentum adhibeto: deinde scam-
monio subpurgato. Si verò venter combustus fuerit, clyste-
rem ex iisdem quibus in prioribus vsus es, adhibeto, quæ pro-
bè ducant: & post clysterem, lacte asinino cocto subpurgato,
octo heminis eius, melle affuso, in potu datis. Dato etiam ca-
prinum lac mane poculi quatuor heminas complectentis
mensura, tertia parte aquæ mulsæ ammixta. Dato item co-
cti lactis capriini heminas duas, tertia aquæ mulsæ parte
ammixta, aut ipso solo melle affuso. dandum est etiam equi-
num lac, eodem modo velut asininum, & si quidem ab his
morbis curatus cedat, satis est: Sin minus, dextri cubiti in-
ternam venam secato, & sanguinem detrahito. Si verò non
visus

A visus fuerit tibi per asininum lac subpurgandus esse, bubuli lactis crudi duas heminas dato, tertia aquæ mulsæ parte amixta, quotidie ad dies decem. Deinde ad alios duodecim dies, sexta parte aquæ mulsæ affusa, ad bibendum dato. De cætero verò ipsum lac duarum heminarum mensura, donec pinguefiat exhibeto. Si verò neque sic desinat, vrere oportet, quum maximū hepar factum fuerit, & maximè eminuerit. Vrito autem per buxeos fusos, in oleum feruens inctos. Apponito autem donec tibi bene habere, & vitionem factā esse visum fuerit. Aut per fungos octo crustas inurito. Si enim vstio successerit, sanum facies, & reliquo tempore melius deget. Si verò non successerit, de cætero ab aliis sanus non fies.

B corrumpitur ac moritur. Alius morbus hepaticus. Reliqua quidem eadem patitur hic æger velut priores. Color autem niger est. At hepatis fel, pituita & sanguine repletum, velut rationcinatur, dirumpitur, & vbi diruptum fuerit, cellerrimè insanit, & indignatur, & loquitur stulta, & latrat velut canis. Et vngues punicei fiūt, & oculis videre non potest, & pili in capite erecti stant, & febris acuta corripit. Huic eadem adhibere oportet quæ etiam prioribus. Plerique verò moriuntur in vndecim diebus, paucique effugiunt. Splenis morbus primus. Fit huiusmodi morbus, propter caliditatem Solis bile commota, quum in seipsum bilem traxerit. Hæc igitur æger patitur, febris acuta in principio accedit, progrediēte verò morbo remittit, excepto ipso splene, in quo **Splenitis.** semper calor hæret, & dolor aliàs atque aliàs incidit acutus, & in lateris mollitudinem, & in ventrem. Et cibos in principio quidem admittit, non autem valde secedunt, progressu autem temporis, & color pallidus fit, & dolor fortis irruit, & clauiculæ attenuantur, & cibos non similiter admittit, velut in principio, & à modico impletur. Lien verò aliàs magnus **Medela.** fit eadem die, & aliàs minor, huic quum sic habuerit veratrū purgans deorsum, bibendum dato, & cnidio cocco subpurgato. Ad vesperum autem post purgationem, lenticulæ acidioris heminam forbendam dato: & betarum pinguium heminam polenta inspersa, postera verò & tertia die panem paruum dato, pro obsonio autem lenticula vtatur, & carne suilla in lenticula cocta trita. Vinum bibat austerum, nigrum, paulò meracius. Et quietem his diebus habeat, nisi quod in-

Hippocratis Liber

Saperda.

tus in umbra paululum deambulet. Reliquo verò tempore **D**
hæc exhibenda sunt. Cibus sit panis cui nihil furfurum deces-
sit. Obsonium habeat carnem canis maioris, vel capræ, vel
ouiculæ tritam. & fassamentum Gaditanum, aut saperdam.
& acida ac fassa omnia assumat, & acerba. Bibat vinū Coum
subastringens quàm nigerrimum. à dulcibus autem & pin-
guibus ac nidorosis abstineat. & silphium non accipiat, ne-
que allium, neque carnem porcinam. Neque mugilem, nec
recentem, nec fassum, neque anguillam. Neque olus vllum
coctum sine aceto. Ex troximis autem, hoc est, his quæ cruda
eduntur, raphanide vtatur & apio, in aceto tinctis. & polen-
tam vino subactam edat, & vinum meracum sorbeat. Si ve-
rò velit, etiam panem in vinum interat, ac calidū edat. Den- **E**
tur etiā pisces, scorpius, draco, cuculus, gobio, callionymus.

**Quæ lienē
exenuent.**

Hos coctos & frigidos dato. Dato etiam quæ splenem atte-
nuare possunt singulis diebus, asphodeli semen, aut visci fo-
lia, aut fœnum Græcum, aut viticis semen, aut rutā, aut men-
tæ radicem. ex his quodcunque volueris tritum in vino auste-
ro dato ieiuno. Si verò adeò validus fuerit, per triginta dies
ad ligna secanda cogito. & summis humeris luctetur. & in-
terdiu deambulet. & vespere dormiat. Mane verò surgat, &
quæ relata sunt edat. Si verò ab his non melius habeat, sple-
nem fungis vrito, decem magnis crustis inustis, quum maxi-
mus fuerit splē, & maximè eleuatus. Si enim successerit vstio
facta velut oportet, sanum facies, verum non breui. Opus
enim habet morbus curatione. Grauis est enim & diutur- **F**

**Lienis se-
cūdus mor-
bus.**

nus, si non fuerit statim curatus. Alius splenis morbus fit
quidem ab iisdem à quibus & prior, patitur igitur ager ab
hoc morbo hæc. Venter inflatur. postea verò etiam splen intum-
escit, & durus est, & dolores acuti in splenē incidunt. Color
autem mutatur, & conspicitur niger, pallidus, malicorij spe-
ciem referens, & ex aure male olet, & gingiuarum malè olent, &
à dentibus discedūt. & ex tibiis vlcera erūpunt, velut pustulæ
nocturnæ. Membra verò attenuantur. & stercus non secedit.
Curatio. Hunc quum sic habuerit, iisdē pharomaticis & eduliis, & po-
tibus, & laboribus, atque aliis omnibus curato. & vbi stercus
secedere noluerit, clysterem adhibeto, ex mellis hemina di-
midia, & nitri Aegyptij magnitudine tali ouilli. Hæc trita
in quatuor heminis aquæ de betis coctis diluito, & per cly-
ste rem

Asterem infundito. Si verò morbus ab his nō sederur, splenem ipsius vrito velut prioris, & si vstio successerit, sanū efficies.

Alius splenis morbus fit, in anno, veris maximè tempore, verū à sanguine. Quum enim repletus fuerit splen sanguine, erumpit in ventrem, & dolores acuti in splenem incidūt, & in mammam, & in claviculam, & in humerum, & sub scapulam. Color autem corporis est plumbiformis, & parua vlcuscula velut lancinata in tibiis exurgunt, ex quibus vlcera magna fiunt, & quæ primū infrā secedunt, sanguinolenta sunt, & æruginosa, & venter durus subit, & splen velut lapis est, hic morbus magis lethalis est quàm priores, & ex ipso pauci effugiūt. hunc quum sic habuerit, iisdem purgato quibus & priorem, veruntamen pharmacum sursum purgās ne dederis. Deorsum verò granum cnidium exhibeto. Et postera die etiam lactis equini cocti octo heminas dato, melle affuso. Si verò hoc non adfuit, bubuli aut caprini cocti duos congios præbeto, ita vt alternatim mel in poculū ammisceatur & vicissim bibantur. Ad vesperam autem post purgationem eadem quæ priori dato. Et si visum fuerit ab interna cubiti sinistri vena sanguinem detrahito. Reliquis autem diebus quotidie ieiuno lactis bubuli quatuor heminas dato, tertia muria parte ammixta. Cibis verò & potibus, & aliis omnibus iisdem curato, quibus & priorem. Abstineat autem à venere, & ebrietate, hic velut prior. Et si videatur etiam vrito, quum crassissimus & maximus splen factus fuerit. & si oportune vsseris ac successerit, sanum facies. Si verò ab hac curatione sanus non fiat, tempore corruptus moritur. Est enim morbus valde grauis. Alius splenis morbus. Accidit & hic morbus vere maximè, quum splen pituitam assumpserit in seipsum, & statim magnus factus fuerit ac durus, & deinde rursus sedatur. Et quū quidem eleuatus fuerit, dolores incidūt acuti. Quum verò mollis fuerit, doloris exors est. Et vbi diuturnus factus fuerit morbus, obscurior esse videtur, & infurgit, & citò sedatur. Hic quū sic habuerit, in principio morbi cibos admittere non potest, & citò attenuatur: & corpus impotentiam multam habet. Morbus autem si non statim curatus fuerit, aut sua sponte quieuerit, interpositis quinque aut sex mensibus, rursus infurgit. Intermittit autem maximè per hyemem. hunc si in principio acceperis, decem cru-

Lienis tertius morbus.

Medela.

Lienis quartus morbus.

stas

Hippocratis Liber

Lienis quin-
tus mor-
bus.

Medela.

Regius
morbus pri-
mus.

Medela.

stas in splenem vrito, & statim sanū facies. Si verò non visse-
ris, iisdem pharmacis curato, quibus & priores. Et aliis item
iisdem, & potibus, ac laboribus. Sic enim celerrimè sanū fe-
ceris, huius autem color fit exalbidus, subpallidus, & squali-
dus. Alius splenis morbus. Fit autumno maximè ab atra-
bile. Fit autem ab olerum multorum quæ cruda edūtur esu,
& ab aquæ potu. Patitur itaq; æger hæc. Quum morbus cor-
ripuerit, splenem vehementer dolet, & rigor & febris appre-
hendit, & inedia ipsum habet, ac cibos auersatur, & corpus
citò cōcidit. Splen autem, magnus quidem non valde fit, ve-
rùm durus, & ad viscera allabitur, & adhærens fugit. Hunc
quum sic habuerit, iisdem pharmacis & eduliis ac laboribus
quibus priores curato. Et si se tibi exhibuerit, vrito ipsum eo **E**
modo quo etiam alios. Hic morbus in plerisque si statim cu-
ratus fuerit, breui decedit. Quatuor morbi regij, primus
quidem æstate maximè corripit, bile commota. Consistit igi-
tur bilis sub cute, & in capite, quare statim corpus in alium
colorem mutat, & fit pallidum, velut malicorium. Et oculi
pallidi fiunt, & in capite sub pilis velut cortex subest. & rigor
ac febris corripit, & pallidam vrinā mingit, & crassum sub-
pallidum in ipsa subidet. & manè quàm diu ieiunus fuerit,
ad cor & viscera exugitur. & si quis ipsum alloquatur aut in-
terroget, ægrè fert, & anxius fit, & non sustinet audire. Ster-
cus autem excretum cum pallore albicat, & malè olet. Hic
quum ita habuerit, maximè moritur in quatuordecim die- **F**
bus. Si verò has effugiat, sanatur. Curare autē oportet ipsum
sic. Quum febris remiserit multa calida lauato, & aquā mul-
sam bibendam dato. Et sorbitionibus vtatur, ptisanæ succo,
melle affuso. Mel autem non simul coquito, donec præter-
ierint quatuordecim dies. Hi enim iudicant an lethalis sit
morbus, aut non. postea verò bis in die lauato, & nutritio pri-
mū modicis quæcunque maximè admiserit. postea tamen
plura dato. Vinum bibat album plurimum per diem. & si
progressu temporis videatur tibi pallidus esse & debilis, vo-
mitum à cibis facere iubeto, velut in superioribus morbis
habetur. Et si quidem ab his morbis quiescat, satis est: Sin-
minus, veratrum bibendum dato. Post talem autem purga-
tionem, ad vesperam edat mazam mollem, aut panis medul-
lam. Obsonium verò edat, pullum gallinaceum percoctum,
probè

A probè conditum cum cepa, coriandro, caseo, sale, sesamo, & vua passa alba. Vinum autem bibat album, austerum, vetustissimum. Aluum verò infra subpurgato, postera die succo cicerum alborum, melle affuso, vtatur, & duas heminas eius modi succi ebibat. Tertia verò die initio facto, singulis diebus hanc aqua bibat, ex his rebus cocta, fœniculi radices tenues ea copia quanta tribus digitis cōprehendi potest, in duos aquæ congios mittito, ac coquito vsq; ad dimidias. Et cicerū alborum chœnicen, in duobus aquæ congiis ad dimidias itē coquito, & quod superest excolatum sub dio per integrā noctem exponito, & ambo hæc decocta misceto. Cum hac aqua & vinum temperatum bibat, & ipsam aquam solam si velit, quā plurimam bibat: & aliam aquam non bibat. Si verò hanc potionem non admiserit, aliam sic præparatam dato.

B Caricarum albarum chœnicen in duobus aquæ congiis coquito, excolato, & sub dio per integram noctē exponito. postea hanc aquam bibat, siue nudam ipsam voluerit, siue cum vino mixtam. Bibat autem non aceruatim multam, sed pro vna vice dimidiam heminam, vt ne alui profluuium ipsi succedat, & modico tempore interposito rursus bibat. Commoda autem sunt & hæc in potu data ieiuno singulis diebus, trita & in vini veteris albi hemina diluta, apij semē, cucumeris semen, fœniculi semen, cuminum Aethiopicum, adiantum, coriandrum herba, vua passæ albæ. His & illis in potu acceptis vtilitatem percipies, & celerrimè sanus fiet.

C Alius morbus regius siue arcuatus. Hic corripit tempore hyemis, & ex ebrietate & rigore. Incipit autem primū rigor inuadere, postea etiam febris detinet. Et humor qui est in corpore, cōgelatur in cute. Quod autem sic habeat, ex his ostenditur. Liuidum est ipsius corpus & subdum. Et venæ per corpus distentæ sunt pallidæ. maiores autem & crassiores sunt quā prius. Et aliæ venæ subnigriores distentæ sunt. Quales in Et si quis aliquam ipsarum secet, sanguis effluet pallidus, si hoc morbo pallidæ sunt venæ. Si verò nigrae fuerint, niger sanguis effluet. Et vestem interiorem corpori adiacentē, præ pruritu non sustinet. Hic promptus est ad iter faciendū & ambulandum, sed præ debilitate crura labascunt, ac ipsum non sufferūt, & sitit vehementer. Hic morbus non minus priore lethalis est. Procedit autem ad amplius tempus, si non in primis diebus

E

sanus

Hippocratis Liber

sanus fiat. Si verò morbus prolongetur, & ad octauum aut **D**
nonum diem duret, in morbum incidit, & morbus, & dolor
Medela. magis premit, & exurgere non potest. Et plerique in hoc tē-
quæ. pore statim pereunt. Huic ubi sic habuerit, si quidem prin-
cipio morbi accesseris, quum iam septem dies praterierint,
veratrum bibendum dato. Ventrem verò infra subpurgato
per succum, velut priori. Et alia eadem pharmaca dato. Ex-

Cātharidæ

hibeto & cantharidas, sine alis & capite, quatuor tritas, & in
vini albi hemina dimidia dilutas, modico etiam melle affu-
so. Atque has bis aut ter in die bibat. Progrediente verò mor-
bo, balneis & fomentis curato. Edat autem quæcunque ad-
mittit. Vinum bibat album, austerum, & alia eadem assu-
mat quæ prior. Hic morbus diuturnus est & grauis, si non ab
initio probè fuerit curatus. Alius morbus regius. Popu- **E**

Tertius.
Morbi cau-
sa.

laris appellatur hic, eo quod omni tempore corripit. Fit au-
tem à repletionem maxima ac ebrietate. & postquam rigue-
rit, statim sanè corpus immutatur, & pallidum fit, & oculi
pallidi valde sunt. Et sub pilos & sub ungues morbus proce-
dit. Et rigor ac febris debilis tenet. Et debile est corpus, &
in capite dolor adest. Et pallidū ac crassum mingit, hic mor-
bus minus lethalis est prioribus, & curatus breui sanatur.

Curatio. Huic quum sic habuerit, cubiti venam secato, & sanguinem
detrahito, Deinde fomento adhibito, elaterium bibendum
dato. Tertia verò die rursus infra subpurgato, cum lacte asi-
nino. Reliquas verò sorbitiones, & potus, ac edulia, eadem
dato quæ priori. Et caput ipsius frequenter purgato. & de **F**
succo bibendum dato. Et multa calida ipsum lauato, ac car-
nem defricato, & defricatas sordes in vino albo bibendas da-
to. & ad alia omnia iisdem vtatur. & breui sanus euadet.

Quartus.

Alius morbus regius, fit quidem à pituita, hyeme autem
maximè corripit. & color ipsius agri est albus, & pectora ip-
sius pituita plena fiunt, & spuit saliuam: & quem excreat, sin-
gultus ipsi oboritur. Et album lotium ac crassum mingit &
in vrina subsidet, velut farina. Hic morbus non est lethalis,

Medela.

& breui sanatur. Huic quum sic habuerit, cnidium granum
bibendum dato. Et post purgationem, succi ptisanæ qua-
tuor heminas, melle affuso, exorbendas dato. Superio-
rem verò ventrem vomitu inducto, velut in prioribus pur-
gato. Sic enim facilimè pituitam à pulmone & arteriis ab-
duxer

A duxeris. Sed & gargarismum ipsi frequenter præparato. Hic aliquando etiam febricit debili febre, & horror tenuis succedit. De cætero verò iisdem quibus priores curato, & pharmacis, & fomentis, & balneis, & eduliis, & potibus, & sorbitionibus. Sic enim maximè sanum facies. Morbus Typhos. Typhos vocatus. Typhos quidem appellatur hic morbus, hoc est stupor attonitus, corripit autem tempore æstatis, quum canis sydydus oritur, bile per corpus commota. Statim igitur ipsum febres fortes tenent, & calor acutus, & à gravitate debilitas, & crurum ac manuum impotentia: maximè enim inutilia ipsi fiunt hæc membra, & venter turbatur, & quæ sedcunt grauè olent. Et tormen forte succedit. Sed & hæc

B patitur, si quis ipsum erigere velit, erigi non potest, neque oculis videre potest præ calore. Et si quis ipsum interrogat, præ dolore respondere non potest. Quum autem moriturus est, acutius videt, & loquitur confidenter, & bibere ac edere cupit, & si quis det quod edat, breui etiam animam emittit, si non euomuerit. Huic morbus hic iudicatur in septem, aut quatuordecim diebus. Multi verò perueniunt etiam ad viginti quatuor. Si igitur hos transierit, sanus erit. Nam in his diebus iudicatur, an lethalis sit morbus, aut non. Hunc quum ita habuerit, sic curato. In primis quidem diebus à balneo Medela. absteineat. Vngatur autem vino & oleo tepido, in lecto, & à cibis absteineat. Sorbitiones autem tenues frigidæ dato. Vinum autem bibat nigrum, austerum, si ipsi conducat: Sin

C minùs, album, aquosum, austerum. Si verò sitis fortis premat propter calorem, potu aceruatim dato, euomere iubeto, bis aut ter hoc repetito. Et quum calor habuerit, lintea Quæ æstus leniatur. aqua frigida tincta apponito, qua parte se maximè ardere dixerit. Si verò horrorem habuerit corpus, frigefactoria remittito. Hic quum doluerit, ab huiusmodi maximè dolore periclitatur, ne repente animam relinquat. Verum exhibere oportet ipsi doloris causa festinanter, eadem pharmaca quæ ei qui à pleuritide tenetur. Quum autem exsurrexerit, cibo & potu, & balneis quæ celerrimè refocillato. Morbus enim est difficilis, & pauci effugiunt. Alius typhos. Corripit Typhos: alter. quidem hic morbus omni tempore, fit autem propter corporis humiditatē, quum cibos humidos, & potum multum, carnes combibunt, & fluidæ fiunt, ab his maximè fit morbus.

Hippocratis Liber

Incipit igitur febris, tertiana aut quartana, in principio fiēs. **D**
Et dolor fortis in capite consistit, Aliquando etiam in corpo-
re intermittens. Et vomit saliuam, & frequenter eructat, &
oculorum regiones dolet, & facies albescit, & tumor in pe-
des descendit. Quandoq; verò etiam totum corpus intume-
scit. Et ad pectora, & ad dorsum aliquando dolor currit, &
venter turbatus est, & oculis fortiter tuetur, & saliuam mul-
tam & spumofam expuit, & in faucibus detineri videtur, &
exasperat ipsas. Sape verò etiam inflāmātur fauces. Hic ubi
sic habuerit, & dolor ita presserit, & erectæ ceruicis spiratio
fortis inciderit, quandoque derepente præ dolore animam
emittit, in septem diebus, aut quatuordecim. Multi verò vī
que ad viginti quatuor dies durant. Sape verò etiam dere-

E
Medela. pente morbus remittit, & ager sanus esse sibi videtur. Ve-
potio quæ. rùm obseruare oportet donec quatuor & viginti dies præ-
terierint. Si enim has effugerit, non ita valde moritur. Huic
quum ita habuerit, in primis diebus sorbitiones dare oportet,
farinam coctam, tenui melle affuso. Vinum verò dan-
dum est nigrum, paulatim, prout voluerit temperatum. Cibi
autem ne exhibeantur priusquàm hi dies præterierint. Po-
lypi verò in vino cocti edendi dentur, & iusculum sorben-
dum. Et raphanidas multas edat, & nasturtij semen torrefa-
ctum, molitū ac cribratū, vino nigro acerbo affuso bibat. Et
polenta tenuis modica manē bibēda detur. A balneo autem
abstineat, donec hi dies præterierint. Vino verò & oleo tepe-
factis in lecto illinatur, & extergatur. Et fructus pæoniæ gra-
F
na decem in vino nigro cocta bidenda dato, & rapi probè
percocti succum sorbeat, caseo insulso conditum, & papaue-
re, & sale, & oleo, & filphio, & aceto. Si verò etiam pharma-
cum bibēdum dare volueris, cnidium granum dato. Et post
purgationem, farinæ coctæ & pinguis duas heminas exsor-
bendas dato. Vinum autem bibat idem. Et ex pharmacis &
sorbitionibus ac potibus quicquid dederis profuerit, siue sin-
gulatim, siue plura simul exhibueris. Atque sic celerrimè sa-
num feceris. Morbus autem est grauis, & pauci effugiunt. A-
lius typhos. hic quidem propter hoc fit. Quum bilis putrefa-
Typhos
tertius. cta ammixta fuerit sanguini, per venas & articulos, quum
sanguis steterit, consistit quidem maximè in articulis. In-
cumbit autem quandoque etiam in reliquum totum cor-
pus

Apus & dolores acutos exhibet. & multi ex huiusmodi morbo claudi fiunt, quum bilis in articulis conclusa in totum callescit. Dolor autem intermittens, corripit per tres & quatuor dies. Hunc ubi sic habuerit, hoc modo curato. Dolore in corpore prævalente, tepefactoria facere & adhibere oportet, oleo prius illito. Quum autem remiserit, veratrum ipsi dato, toti corpori antea fomento adhibito. Postera die serum caprinum coctum bibendum dato, duorum cōgiorum mensura, ita ut in alterum cōgium mel affundas, & in alterum sal adicias, deinde poculis vicissim permutatis bibat, donec totū ebiberit. Ad vesperam verò post purgationem, lenticulæ hæminam forbeat. & betarum pinguium heminam, polëta inspersa ebibat. Et pulli gallinacei carnem, aut columbæ, aut turturis, aut ouiculæ, aut suis pinguem edat. Veratrum autē per sextum diem dato. & si alicubi in articulis tumor fiat, & discessus fieri nolit, cucurbita affixa sanguinem detrahito, punctura per acum triangularem facta in genua, si in genibus tumor fuerit. Verum nullum ex aliis articulis perpunxeris. Interpositis autem diebus cibum accipiat, panem maxime assatum. Mazam verò maximè oleo & melle subactam. Obsonia verò habeat, maximè quidem assatas carnes volucrum, non salsas: Sin minus, etiam coctas, conditas, verum sine caseo, & sesamo, & sale. Piscibus autem utatur carnosissimis, assatis eodem modo velut carnes: & coctis origano conspersis, ac oleo ipsis affuso. Vinum autem bibat album, si conducat: aut si hoc non commodet, nigrum. & in deambulationibus se exerceat per diem, & post cœnā, & mane. Serum autem & lac pro tempore semper bibat. Si verò tibi visum fuerit, etiam asininum lac decoctum dato. Et si sanus fiat, in custodia ipsum esse oportet, ut ne à frigore & æstu lædatur. & cibis nō valde expleatur. Periculum est enim ne morbus reuertatur. hic itaque morbus si sic curetur, in sex mensibus sanatur. In tot enim mensium spatio iudicatur an mortalis sit, aut non, etiam si statim curetur. Nam morbus est grauis, & plerisque commoritur. Alius typhos. Fit quidem hic morbus in tempore pomorum, quū quis se fructibus mollis corticis, & foris nō lignosi, omnis generis repleuerit. Plerisque verò etiam ab his factus est talis morbus, ubi videlicet plantarum, & liborum sesaminorū, & aliorū dulciorū ex ius causa.

Medela.

Potio quæ.

Typhos
quartus.

Morbi hu-

E 3

melle

Hippocratis Liber

melle paratorum, esu se insatiabiliter expleuerūt. Mel enim **D** coctū æstuosum est, & vētri adhæret: postea quū cōcoctū fuerit in ventre, efferuescit: & vēter derepēte attollitur, & ardet ac dirumpi videtur. Deinde repēte ventris profluuiū succedit. & quum semel secedere inceperit, per multos dies purgatur. & multi post hanc purgationē sani fiunt. Quū igitur sua

Medela. spōte purgari cessauerit, lenticū succi tres semicōgios ipsum ebibere cogito, sale adiecto. post purgationem verò succi, ad vesperā, lenticulæ frigidæ nō salis heminā sorbeat: Multum autē silphij in ipsam deradat: & betæ pinguis nō conditæ heminam, polēta inspersa. Vinum autē bibat nigrū, austerum, paulatim. Reliquo verò tempore eadē faciat. Et cibos accipiat panē exassiatum, & Mazā oleo & melle quāmaximē **E** subactam. Primis autē diebus farinā edat coctā frigefactā, melle affuso. Vinum autem bibat nigrū, acerbum, & donec quieuerit morbus hæc assumat. At qui ex fructibus morbo arreptus est, flatum sentit, & tormē, & dolorē: & cibi secedere non volunt, & venter ipsius magnus ac durus est, & rigor ac febris habet. huic si quidē sponte turbatus fuerit vēter, in viginti diebus vt minimū purgatur. Et quum purgari cessauerit, sanus statim erit. Si verò non fuerit purgatus, purgato ipsum hippophais succo, aut enidio grano. Ad vesperā autem eadē exhibeto, quæ ei qui sponte purgatur. Postera die si febris habuerit, quietē habeat. Et de eodem vino in aqua frigidissima ipsi bibendū dato. Si verò febris nō habuerit, victū vtatur non humido, sed fortiore. Et deambulet cōiectura iuxta cibos facta. Ab hoc morbo multis iam aqua intercus facta est. Et si tibi clysterem adhibere visum fuerit, eadem quæ etiam hydropico per clysterem infundito. Si verò volueris, hæc infundere potes. In aqua mulsæ hemina, herbam thapsiæ coquito, & sic infundito. hic hoc modo curatus

Typhos. celerrimē sanus erit. Alius typhos. Fit hic morbus quum **Quintus.** humor qui est in corpore, putrefactus fuerit, & magis quā oportunitum est resiccatus. Fit igitur ager hoc morbo correptus, specie limpidus ac humectus, subpallidus, pellucidus, & vesicæ vrinæ similis, verū nō intumescit, sed tenuis & aridus est, ac debilis. Attenuantur autē in corpore maximē clauiculæ, & facie fortiter gracilescit, & oculi valde sunt excavati. & hæc quidem à morbo patitur. Color autem corporis niger

A niger est, causa verò hæc est. Quum bilis atra in venas, & ad cutem subierit, & postea calor successerit, necesse est à calore venas comburi ac resiccare, Quare sanguis è venis excedit. hæc igitur patitur. Hic tenuis fit, & fortiter gracilis. & oculis raro nictat, & muscas à stragulis venatur. Et grauitas ciborum maior est quàm quum sanus esset. & lucernæ extinctæ odore delectatur, & frequenter semen per somnum effundit. Sæpe verò etiã inter eundem genitura ipsi exit. huic quum **Medela.** sic habuerit, ventrem nigro veratro purgato, supernum videlicet: infernum verò scammonia succo. Post purgationem verò eadem quæ & aliis dato. & serum ac lac bubulum, aut caprinum pro tempore exhibeto. dato & lac asininum decoctum, ad purgationem. **B** hic ita curatus in duobus maximè annis sanus fit. Cibos autem quos vult assumat, & quàm maximè nutriatur, & deambulet coniectura ad cibos facta. hic morbus corripit maiorem viginti annis. Vbi verò corripuit, si non à principio morbi quis curatus fuerit, non desinit, nisi viginti anni præterierint, sed adhæret. postea ab aliquibus dum curantur decedit. Morbus autem grauis est. Voluuli porro vocatur **Voluuli.** hi morbi. sunt autem maximè ab his, Si hyemis tempore quis calido & humido victu vitur, & non deambulationibus se exerceat, respectu ad cibos facto. Verum repletus semper dormit, & deinde longum iter perficere cogatur, frigore sauiiente. Deinde riguerit sub ossa. hæc igitur patitur. Flatus in toto corpore oboritur. & color ipsius fit plumbiformis, & riget semper, ut etiã calida ipsi affusa, calida esse non videatur. **C** Corpus autem ipsius dum lauatur, à calida desquamatur, maximè scrotum, & si digito corpus compresseris, impressionem facies, & notæ tibi apparebunt, velut in farina aqua subacta. Maximè autem in potibus impressionem perfert. Crura verò ipsius graua sunt. & si obambulet, tremit, & si ad accliuem locum iter faciat, vehementer anhelat, & vlnæ depedere videntur, & sitis urget noctu, cibi verò crudi secedunt quoscunque ingessit. Huic quum sic habuerit, fomero prius adhibito, eneorum bibendum dato, aut hippophais succum, aut cniidium granum. post purgationem verò, eadem dato quæ prioribus. Postera die lactis asinini cocti cõgium dato bis ebibendum. sale adiecto. Ad vesperam cœnet panem. Obsonium autem habeat, ouiculæ carnes coctas, & polypos coctos in vino **Curatio.**

Hippocratis Liber

nigro, & iusculum sorbeat, & lenticulā habeat sic præparatā: **D**
 heminā lentis coctā probè terito, deinde farinā ammisceto,
 & silphium deraſum addito, & ſalem adiecitō, & acetū affun-
 dito, & allium ad hæc ſimul coquito, & affuſa aquā bis aut
 ter feruefacito, & cum rudicula vndiquaque expaſſa brachia
 habente, ſimul ipſa agitato: deinde ablata frigeſacito. Sit au-
 tem nō valde craſſa, & odoris gratia etiā pulegium vt ſimul
 coquatur, adieciatur. Intermediis verò diebus vomitus faci-
 at per ſextū diem. Verū aliàs atq; aliàs ante vomitum, &
 pharmaci potum, fomentū adhibere oportet. Et per tertiam
 diem lauetur, ſi cōducatur: Sin minus, vngatur. Et deambulet ſi
 ita potens fuerit, cōiectura ad cibos factā. & ſambuci, ac co-
 nyzæ ſemper teneræ. folia cocta edenda dato. Sic enim cura- **E**
 tus, facilimè deget, & morbus annum deſinet. Multis verò
 iam ſanis factis, poſt duos annos morbus reuerſus eſt. Sed ſi
 hoc contingat, eodē modo curetur. Si verò tertiu reuertatur,
 tumor quidē nō ſuccedit. Tenuis autē fit & gracilis, incipitq;
 à facie attenuari, & colore exalbescit magis quā prius. huic
 quandoq; aqua intercuſ fit in vētre. Si igitur facta fuerit, ſe-
 care ipſum nō oportet, moritur enim, ſed iisdem curare qui-
 bus eum qui à ſplene aqua inter cutē laboret. hunc maximè
 in principio curare velis, & ſic cito ſanū facies. Opus autem
 Voluulus **secundus.** habet morbus multa curatione. Eſt enim grauis. Alius volu-
 ulus arcuatus. Hic maximè æſtatis tempore in paluſtribus
 regionibus corripit. Magis autem ab aquæ potu. Multi verò
 iam à tali morbo correpti ſunt, ex volutatione ad ſolē capi- **F**
 tis dolore affecti. Verū ſimilia prioribus patiūtur, excepto
 Curatio. colore. Nā pallidus fit æger, velut malicorium. Et oculi ali-
 quando morbo arcuato implētur. hūc vbi ſic habuerit, iisdē
 curare oportet quibus priorē. Danda etiā in potu aqua à ci-
 cere albo cocta, & cum vino eadē permixta danda eſt. Et ca-
 put eius tetragono medicamento purgetur. hic minus quā
 Voluulus **hæmatites.** prior lethalis eſt, & vocatur voluulus arcuatus. Voluulus hæ-
 matites. Reliqua quidē eadē patitur cum prioribus. Incipit
 autē morbus autumnō fieri. Hæc verò in morbo accedūt. Ex
 ore male olet à dentibus, & gingiuz diſcedunt, & à naribus
 ſanguis fluit. Aliquando etiā ex cruribus vlcera pullulant, &
 alia fanescunt, alia emergunt. Et color niger fit, & cutis te-
 nuis. Eſt autem ad deambulādum ac laborādum promptus.
 Hunc

- A** Hunc ubi sic habuerit, iisdem curato quibus priores, & hæc per Medela-
clysterem infundito. Cucumeris sylvestris folia quinq; te-
rito, & mellis dimidiū heminae ammisceto, itēque olei he-
minā dimidiā, & salis quantū vna manu cōprehēdere potes,
& succi betarum heminas quatuor. Ad subpurgationē verò
lactis asinini cocti heminas octo exhibeto, melle affuso. Bi-
bat etiā bubulum lac pro tempore, per quadraginta dies. Bi-
bat itē mane bubuli lactis duas heminas, tertia aquæ mulæ
parte ammixta, per intermedios dies. Hic morbus multa
medela opus habet. Sin minus, non exit, sed cū homine mori-
tur. Vocatur autē voluulus hæmatites. Morbi crassi appel-
lati. Ex crassis appellatis morbis, hi maximè fiunt. Quū pi- **Morbi cras**
B tuita & bilis mixta fuerint in corpore, fluunt in vētrem, & si.
quum cōgregata fuerint in ventre, attolluntur, & sursum ac
deorsum discurrūt, velut vnda. Et rigor ac febris corripit. Et
dolor in capite cōsistit, & quū dolor circa viscera constiterit,
suffocationē inducit. Aliquādo verò vomit pituitā acidam,
quādoq; etiā salsam & postquam euomuit, os amarū ipsi esse
videtur. In lateribus autē rubores detinentur. Nā quum pi-
tuita in ventre sit, sanguis à caliditate congregatus in latere
allapsus est, & rubores in lateribus excitat. Et calor maximè
latera occupat, ac costas. Et dorsum ipsius incuruū fit. Et quū
maximè doleat, corporis contactum nō sustinet. Nā velut ex
ulcere dolet. Et carnes præ dolore vibrantur, & testes cōtra-
huntur. & in sedē, & in vesicā calor quidā ac dolor irruit, Et
mingit crassum velut in aqua inter cutem. Et ex capite de-
C fluunt capilli, & pedes semper frigidi sunt. & dolor premit
maximè latera, & dorsum, & collum, & ad cutē aliquid ipsi
proserpere videtur. Morbus verò quandoq; vrget, quādoque
remittit. In progressu autē magis assiduè premit, & cutis ca-
pitis crassa ac rubicunda est. Hic vsq; ad sex annos talia pati
perseuerat. Postea & sudor multus diffunditur, & male olet.
Sæpe verò etiā per somnum semen effundit. Quod verò per
coitum emittit, subcruentū ac subliuidū prodit. Hic morbus **Medela.**
fit propter calorē solis, & aquæ potū. proinde hunc quum sic
habuerit, cneoro aut hippophae, aut cnidio grano dato, sub-
purgato. dato etiā lactis asinini cocti heminas octo bibēdas,
melle affuso. postera die post purgationem, eadem quæ aliis
exhibeto. Primis autē diebus ex iisdem nutriatur. ex quibus
E § etiam

Hippocratis Liber

Morbus
crassus se-
cundus.

etiam is qui ab aqua inter cutē correptus est, & deambula-
tionibus se exerceat, si ita potens fuerit. Si verò præ febribus
impotens fuerit, & cibos edere nō poterit, lenticulæ sorbitio
ne vtatur. potu verò vino nigro quam maximè austero. Hic
morbus maximè corripit autumno, & tēpore fructuū pomo-
rum. hic si quidē curatus fuerit in sex annis, satis est: Sin mi-
nus, adharet vsq; ad decē annos. Cū multis verò simul mo-
ritur, si nō statim curatus fuerit. Alius crassus morbus. Ta-
les crassi morbi à bile fiunt, quum bilis in hepar influxerit,
& in capite constiterit. hæc igitur ager patitur. hepar intum-
escit, & præ tumore ad septū transuersum expāditur. & do-
lor statim in caput irruit, maximè verò in tēpora. & auribus
non acutè audit. Sæpe verò etiā oculis nō videt, & horror ac
febris corripit. Atq; hæc quidē in principio morbi ipsi fiunt,
intermittentia quādoq; valde, quādoq; minus. Quāto autem
magis morbus progressus fuerit, tātō amplior dolor in cor-
pore existit, & pupillæ oculorū disperguntur ac habetantur,
& si digitum oculis admoueris, nō sentit, eo quòd non videt.
Quòd autem nō videt ex hoc cognoueris, quòd admoto di-
gito nō niſtat, & floccos de stragulis tollit, si quos viderit, pe-
diculos ipsos esse putās: & quum hepar magis ad septū trās-
uersum expassum fuerit, delirat. & ob oculos ipsi obuersari
videntur reptilia, & omnis generis peregrinæ feræ, & mili-
tes armati pugnātes. & ipse sibi inter ipsos pugnare videtur,
& talia loquitur velut qui videat pugnas & bella geri, & in-
uadit, & minatur, si quis ipsum exire vetet, & si surrexerit, F
crura eleuare non potest, sed concidit, & pedes ipsius frigidi
sunt. Et quū dormit, exilit à somno, & timer quum insomnia
viderit horrēda. Cognoscimus autē hoc, quòd ab insomniis
exilit ac timet, postquam resipiscit. Nā insomnia denarrat,
& ea quæ corpore fecit, & quæ lingua loquutus est. Atq; hæc
quidē sic patitur. Quādoq; verò etiā per totā diē ad noctem
voce priuatus iacet respirās spiritū multū acervatū. Quum
autem delirare cessauit, statim euestigio resipiscit, & si quis
ipsum interroget, rectè respondet, & cognoscit ac intelligit
omnia quæ dicūtur. deinde rursus post modicū tēpus, in iisdē
afflictionibus iacet. hic morbus accidit maximè in peregri-
natione. Et si quis alicubi per desertā viā iter faciat, & timor
Medela. ipsum ex spectro corripiat. Fit etiā aliter. huic quū sic habue-
rit,

Arit, veratri nigri obolorū quinq; pondus, in vino dulci bibendum dato. Aut hęc per clysterē infundito. Nitri Aegyptij magnitudinem tali ouilli terito, & mellis optimi cocti dimidiā heminā, & olei dimidiā heminā, in mortario ammisceto, & aquæ à betis coctis heminas quatuor per noctē sub dio expositas addito: aut si volueris, pro beta lac asininū coctū ammisceto. & hęc mixta per clysterē immittito, siue febris habeat, siue nō. Sorbitionibus autē vtatur, ptisana cocta, melle affuso. Bibat etiā mel & aquā & acetū, simul permixta, donec iudicatus fuerit morbus. Iudicatur autē in quatuordecim diebus ad summū, siue lethalis est, siue non. Multis autē iam huiusmodi morbus sedatus, rursus rediit. Si igitur redierit, periculū est ne æger pereat. Iudicatur autē morbus in septē diebus, an lethalis sit, aut nō. Si verò has effugerit, nō valde moritur, sed morbus in plerisq; curatus decedit. Quū autē desierit morbus, diætā bona vtatur, quiete ingerens quæ venter suscipiat, & non cōburantur, neq; ventris profluuiū succedat. Ambo enim hęc periculosa esse vidētur. Lauetur autē quotidie, & deābulet post cibos modicē. Veste verò induatur leui ac molli. & pro tempore anni lac & serū bibat, per quinq; ac quadraginta dies. Hęc si fecerit, celerrimē sanus erit. Morbus autē grauis est, & multa cura opus habet. Alius morbus **Tertius** crassus. Fit à pituita putrefacta. Quod autē putrida est vnde **crassus morbus vnde.** fit, ex hoc manifestū est. Eructat ab hac quod odorem habet, velut si quis raphanides edisset. Incipit autem fieri talis morbus à cruribus, deinde ab his ascēdit ad ventrē. Et quū in ventre cōstitit, rursus decurrit ad viscera. Et quū in his cōstitit, fugit & vomitū facit, pituitā acidā subputridā educens, & vbi euomuit, nō habet seipsum neq; sibi cōstat æger. Deinde angustia fit circa viscera. Quandoq; etiā in caput dērepente dolor incūbit acutus. Et auribus acute audire nō potest, neq; oculis videre, præ grauitate. & sudor multis diffunditur male olens, & maximē quū dolor habuerit, & morbū leuat. Color autē ipsius arcuatus apparet. hic morbus priore paulò minūs lethalis est. Huic quū ita habuerit, ventrē purgato, deorsum quidem, per hippophaes. sursum autē, per veratrum. & caput tetragono purgato. & quū à veratro purgatus fuerit, postera die lacte asinino cocto subpurgato. Tertia deinde caprino cocto, & similiter quarta ac quinta. Reliquis verò viginti

Hippocratis Liber

viginti diebus, lac bubulum crudum, aut etiam caprinū da- **D**
 to, tertia aquę mulsę parte ammixta. Bibat autem lactis con-
 gium. Post purgationem verò deorsum versus, eadem phar-
 maca exhibeantur, quę hydropicis. Reliquo tempore quum
 lac bibit, cœnet panem exassatū. Obsonium autem habeat,
 ex piscibus scorpium, aut callionymum, aut cuculū, aut squa-
 tinę frustum cum condimentis coctum. ex carnibus, ouillas,
 aut gallinacei pulli coctas. Vinum bibat album, si conducatur:
 Sin minus, nigrum austerū. deinde post cibum deambulet,
 vt ne frigeat. Si quidem igitur cōducant, cibos huic dato qui
 dicti sunt. Si verò non conducunt, sorbitiones dato ptisanę
 aut milij. In hoc morbo si æger triginta dies trāsgressus fue-
 rit, sanus fit. hi enim iudicant an lethalis sit, aut non. Est au- **E**
 tem morbus grauis. Alius morbus crassus. Fit hic morbus
 à pituita alba. Congregatur autem in ventre, quum febres
 diuturnę corpus occuparint, Initium hic morbus à facie su-
 mit, & intumescit facies. deinde descendit in ventrem, & vbi
 in ipso constiterit, ventrem magnum attollit, & corpus velut
 à labore lassatur, & in ventre grauitas inest, & dolor fortis,
 & pedes tument, & si pluuia in terram effundatur, pulueris
 odorem non sustinet. Si verò in pluuia steterit, & terram odo-
 ret, derepente cadit. Hic morbus interquiescens, longiore
 tempore quàm prior occupat, & tardius decedit. Curare ve-
 rò ipsum oportet iisdem quibus hydropicum, fomētis vide-
 licet & pharmacis, & eduliis ac laboribus. Hic morbus per
 sex annos maximè obtinet. Deinde decedit tēporis progres- **F**
 su, si probè curetur, etiam si non in principio fuerit curatus.
 Est autem morbus difficilis, & multa cura opus habet. Co-
 xendicum morbus ex his maximè causis fit plerisq; Si quis
 diutius in Sole versetur, & coxendices fuerint calefacti, & hu-
 mor qui est in articulis, à calore fuerit resiccatus. Quòd autē
 id quod resiccatur, condensatur, ac constringitur, hoc mihi
 signum est. Aeger enim articulos vertere aut mouere non po-
 test, præ dolore qui est in ipsis, & eo quod verticula sunt com-
 pacta. Dolet autem maximè lumbos, & verticula ex obliquo
 iuxta coxendices, & genua. consistit autem dolor multò tem-
 pore in inguinibus simulque coxendicibus, acutus & æstuo-
 sus, & si quis ipsum erigat, aut transmoueatur, præ dolore eiul-
 lat quàm maximè potest. Aliquando etiam conuulsio succe-
 dit,

Quintus
 crassus mor-
 bus vnde.

Curatio
 quæ.

Coxendicis
 dolor.

- A** dit, & rigor ac febris, fit autem & à bile, & pituita, fit item à sanguine, dolor cōsimilis velut ab omnibus morbis, & rigor ac febris aliquādo corripit debilis. Cæterum eum qui à Sole hoc morbo correptus est, sic curare oportet. Corpus ipsius fo-
mento humectetur, & cibi ac potus, & alia quæ exhibentur, tepida ac humida præbeantur. Atque hæc omnia cocta, cibo vtatur maza molli, vino dulci non subacta. Vinum bibat album, aquosum, & corpore quietem habeat, & quamuis impotens fuerit vt exsurgat, tamen modicè singulis diebus deambulet, & ne frigeat, & non multa aqua lauetur, & quum tibi bene habere visus fuerit, & corpore humidus esse, leni fomento vehementer foueto. Magis enim remittit, & condensationem ex articulis humectat ac relaxat. Deinde postera die cnidium granum bibendum dato. Si verò non profuerit, hæc per clysterem infundito, cumini heminā dimidiam terito, & colocynthidem integram paruum ac rotundam in mortario tundito ac cribrato, & nitri rubri Aegyptij minæ quadrantem torreto, ac terito. Atq; hæc in ollam conuicito, & olei heminam, mellis heminam dimidiam, vini albi heminam, & succi betæ quantum videbitur affundito, & donec bonā crassitudinem habere visa fuerint coquito. Deinde per linteum excolato, & si mel non simul coquere velis, mellis Attici heminam ipsis ammisceto. Si verò Atticum nō habeas, optimi aliàs cocti heminā in mortario ammisceto. Si verò crassius fuerit hoc infusum, de eodem vino affundito, iustæ crassitudinis respectu habito, & per clysterem infundito, deinde usque ad dies tres purgari sinere oportet. Si verò pluribus diebus purgetur, bubuli aut caprini lactis heminas tres ebibendas dato. deinde betas pingues non salsas, condimentis conspersas, edendas exhibeto. Ex hoc morbo multi claudi facti sunt. Si verò à bile morbus fiat, veratrum deorsum purgans ipsi bibendum dato, aut scammoniæ succum, post huiusmodi verò purgationem, succi ptisanæ melle affuso, heminas duas exorbendas dato, postera verò aut tertia die adhibito fomento, lacte asinino cocto subpurgato. At vesperam autem pinguis betæ heminas duas edat, polenta inspersa. Vinum bibat album, aquosum dulce, & nunc, & post pharmaci purgationem. Si verò à pituita ægrotet, cnidium granum, aut hippophaes, adhibito prius fomento, bibendum ipsi dato, post purgationem

Medela.

Biliosus morbus.

Pituitosus.

Hippocratis Liber

**Sanguis-
neus.**

**Tetani
tres.**

Curatio.

gationem verò, easdem sorbitiones ac potus exhibeto. Itém- **D**
que lactis potionem. Inter mediis autem diebus, diæta quàm
leuissima vtatur. Et si quidem ab his vtilitatem sentit, bene
est: Sin minus, ipsum vrito multis ac profundis crustis inu-
stis, in osseis quidem partibus, per fungos. In carnosus autem,
per ferramenta. Si verò à sanguine ægrotarit, fomentum ad-
hibeto, & cucurbitam affigito, & venas in poplitibus secato.
Si autē tibi visum fuerit, etiam cnidium granum ipsi biben-
dum dato. Diæta verò quàm siccissima vtatur. Vinū autem
ne bibat. Si verò bibere velit, quàm minimum & aquosissi-
mum dato, & modice deambulare iubeto, aut si potens fue-
rit, plurimum. Conducit autem & à pituita ægrotanti talia
facere. Si verò stare non possit, in lecto ipsum quàm frequen **E**
tissime circumferre oportet, à quacunq; causâ ægrotarit, per
omnia similiter, vt ne intus chartilago concre scat. Si verò
concreuerit, & articuli conglutinati fuerint, omnino necesse
est hominem claudum fieri. Et si clysterē adhibere volueris
ei qui à sanguine ægrotat, quo sanguinem ac pituitam à co-
xendicibus abducas, hæc infundere oportet. Salis pugillo tri-
to, olei heminam, & de ordeï decocto duas heminas ammi-
sceto, atque sic infundito. Si enim sic curationem feceris, ce-
lerrimè sanum facies. Morbus autē grauis valde est ac diu-
turnus. Tetani tres. Si ob vulnus tetanus siue distentio fiat,
æger hæc patitur. Maxillæ conglutinantur, & rigent, & os
aperire non potest, & oculi lachrymantur ac detrahuntur, &
dorsum conglutinatum riget, & crura flectere nequit, neque **F**
manus, neq; spinam. Quum autem lethalis fuerit, potum &
cibos quos prius accepit, aliquando per nares reddit. Hunc
quum sic habuerit, fouere oportet, & pinguius vntum, ad
ignem nō ita prope calefacere, & tepesfactoria illito corpori
adhibere. Et absinthiū, aut lauri folia, aut hyosciami semen,
& thus terito, deinde vino albo diluta in ollam nouam infun-
dito, & oleum pari cum vino mensura affundito, & cum his
calefactis largè calidis corpus ac caput illinito. Postea super
pellicem indumētum reclinatum, ita vt pars ad quam fuit
animalis caro sursum vergat, mollibus ac puris stragulis ac
vestimentis contegito, quo vehemēter exsudare possit. Aquā
verò mulsam tepidam, si quidem hanc bibere poterit, per os
exhibeto. Si verò non poterit, per nares infundito. Vinum
autem

A autem album quàm iucundissimū ac plurimum bibendum dato. Hoc quotidie facere oportet, donec sanus fiat. Est autem morbus grauis, & statim curatione opus habet. **Opi-**
sthotonos. In distentione retrorsum fiēte (opisthotonum **tonos.** vocant) alia quidem eadem æger patitur. Fit autem, quum tendines qui sunt retrò in ceruice ægrotarint. Aegrotat autē, aut ab angina, aut ab vna, aut locis circa tonsillas suppuratis. Aliquando etiam à capite febribus succedentibus, conuulsio succedit. Iam verò etiam à vulneribus. Hic trahitur in posteriorem partē, & præ dolore circa dorsum ac pectora, eiulat. Hic conuellitur vehementer, vt vix detinere possint ipsum præsentēs, ne e lecto excidat. Hic sæpe in die dolore affligitur, sæpe etiam leuius degit. Huic sic habenti eadem exhibere oportet, quæ priori. Morbus autem adhæret ad summum diebus quadraginta. Si verò hos euaserit, sanus fit. **Curatio.**
B Alius tetanus. Hic tetanus minus lethalis est quàm priores. Fit autem ab iisdem. Multi verò etiam ex casu in partes posteriores, à morbo correpti sunt. patitur igitur æger hæc. Totum corpus conuellitur. Aliquando verò quacunq; corporis parte id contigerit conuellitur, & primum quidem obambulat. **Tetanus**
tertius. Postea temporis progressu in lectum cadit. & rursus remittit & dolor, & conuulsio. & si surrexerit, & fortassis ad paucos dies obambularit, postea rursus in iisdem afflictionibus iacet. Atque hæc patitur ac transmutat, per multum tempus, & si quid comedit, non secedit infrà, nisi difficulter, atque hoc combustum. At in pectoribus hæret cibus, & suffocatio-
C nem inducit. Hunc si iisdem curaueris quibus priores, celerimè sanum facies. clysterem verò ex ptisana cocta tenui, ac melle adhibero. **Medela.**

HIPPOCRATIS

COT LIBER DE VIRGI-

NUM MORBIS, IANO

CORNARIO MEDI-

CO PHYSICO IN-

TERPRETE,

PRIN



PRINCIPIUM fit mihi cōpositio-
nis eorum, quæ perpetua sunt in ar-
te medica: Non enim possibile est
morborum naturam cognoscere (si
quidem artis est inuenire) nisi quis
nouerit naturam in indiuisibili, ex
qua in principio discreti sunt: pri-
mum de morbo sacro appellato, &
de attonitis siue syderatis, & de ti-

moribus. ex quibus adeò fortiter pauet homines, vt delyrēt.
& dæmones quosdam videre putent, ipsis infestos, quandoq;
nocte, quandoque interdiu, aliquando verò vtroq; tempore.
Postea ab huiusmodi spectris multi iam se strangulauerunt. **E**
plures autē mulieres quàm viri. Est enim muliebris natura
animi magis deiectioni ac imminuti. Caterum virgines nubi-
les & maturæ viro, hoc magis patiuntur, vnā cū mensium
descēsu, antea non valde hinc afflicte. Postea enim sanguis in
vteros confluit, velut effluxurus. Quum igitur osculum exi-
tus non fuerit apertum, sanguis autem amplius influxerit,
propter cibos & corporis augmentum, tunc sanguis non ha-
bens effluxum, præ multitudine resilit ad cor, & ad septum
transuersum. Quum igitur hæc repleta fuerint, cor fatuum
fit, deinde ex fatuitate torpedo, postea ex torpedine delyriū
apprehendit. Quemadmodum quum aliquo longo tempore
desidente, sanguis ex coxis ac femoribus depressus, in tibias
ac pedes torporem inducit. A torpore autem, pedes ad iter fa-
ciendum impotentes fiunt, donec sanguis ad seipsum reuer-
tatur. Reuertitur autem celerrimè, quum steterit in aqua fri-
gida, quæ vltra malleolos madefaciat. Atque hic quidem tor-
por facile cedit. Citò enim propter venarum rectitudinem
refluit. Et locus corporis non est periculosus. At ex corde &
septo transuerso tardè refluit. Venæ enim oblique sunt, & lo-
cus periculosus, & ad delyrium ac insaniam paratus. Quum
enim hæ partes repletae fuerint, & horror cum febre ingruit,
erroneas febres appellant. his autem sic habentibus præ acu-
ta quidem inflammatione, insanit: præ putredine verò, cla-
mat: præ caliginositate autem, timet ac formidat: præ com-
pressionē verò circa cor, stragulationes parat: præ sanguinis
autem malitia, animus mœrens ac anxius malum attrahit.
Sed

Virgines
quæ percel-
lantur.

Quid pedes
torporem
discutiat.

Causa fu-
roris.

Planetes
febres.

A Sed & alium horribiliter compellat, & in puteos proflire ac incidere iubet, & strangulari, tanquam meliora sint hæc, & omnem vitæ utilitatem excedentia. Aliquando verò sine spe & tris ac phantasmatis, voluptas quædam adest, ex qua mortem, velut bonum aliquod, amat. Postquam autem resipuit homo, mulieres tum alia multa, tum pretiosissimas muliebres vestes Dianæ consecrant, à vatibus id iubentibus deceptæ. Cæterum curatio ut hinc liberentur, est sanguinis detra-
ctio, si nihil fuerit quod impediatur. Ego verò iubeo virgines quum huiusmodi patiuntur, quàm citissimè viris cohabitare. Si enim conceperint, sanæ fiunt. Si verò huiusmodi non affuerint ipsis, simul cum pubertate, aut paulò post corripiuntur, si non viro nupserint. At verò ex mulieribus viro iunctis, steriles magis hæc patiuntur.

Quæ Dianæ darent. Furoris me dela.

HIPPOCRATIS

COI LIBER DE NATURA

MULIEBRI, IANO CORNARIO

MEDICO PHY-

SICO INTER-

PRETE.

*



C DE MULIEBRI natura ac morbis hæc dico. Maximè quidem numen in hominibus causam esse. postea verò naturas mulierum, & colores. Nam quæ superalbidæ sunt, humidiores sunt & fluidiores. Nigræ verò duriores acerbioresque ac adstrictiores. Quæ verò vini colorem referunt, medium quid inter utrasque habent. Sic autem & in ætatibus contingit. Iuenculæ enim humidiores sunt, & multo sanguine plerunque refertæ. Aniculæ verò sicciore, & modicum sanguinem habentes. Mediæ autem, medium quiddam inter utrasque habent. Oportet autem eum qui hæc rectè tractare velit, primum quidem ex diis ordiri. Deinde mulierum naturas discernere, itémque ætates, & tempora, & locos, in quibus-
cunque

Deus potissimus author & causa rerum humanarum.

Medici minus.

Hippocratis Liber

Humoris a
quatici co-
gnitio &
medela.
Primus lo-
cellorum
morbus.

Stercus bu-
bulum.

Cum vteri
hepar pe-
tunt.

eunq; degunt. Frigidi enim loci, fluidi sunt. Calidi verò, sicci **D**
& stabiles. Initium autem faciam ab humido secundum na-
turam. Si aqua intercus in vteris oboriatur, menses paucio-
res ac deteriores fiunt. Deinde repente deficiunt, & venter
intumescit, & mammae siccae fiunt, & reliqua male habet. Et
in ventre sibi habere videtur. & ex his cognoscet, quod aqua
inter cutem laborat. Sed & in ore vterorum significationem
de se præbet. Tangentibus enim gracile apparet: & calor &
aqua ipsam corripit. Quum autem tempus amplius proces-
serit, dolor in venterem, & lumbos, ac laterum mollitu-
dinem occupat. Hic morbus maxime fit ex abortu. Accidit
item ex aliis. Quum sic habuerit, calida lauare oportet, & te-
pefactoria adhibere, donec dolor sedetur. pharmacum autē **E**
deorsum purgans bibendum dare oportet. post pharmacum
verò, vteros bubuli stercoreis fomento fouere, & postea medi-
camentum cum cantharide preparatum apponere. Et inter-
positis tribus diebus, id quod cum felle paratur. Vna ve-
rò die interposita, per triduum aceto infuso colluatur, & si
quidem venter mollis & vacuus fiat, & febres sedate fuerint,
& menses prodeant, viro condormiat. Sin minus, rursus ea-
dem facito, donec menses prodeant. & aliquibus subdititiis
vtatur. Intermediis autem diebus crethmi corticem bibat,
& pæoniæ grana nigra, & sambuci fructum, ieiuna in vino.
& Mercurialem quam plurimam edat, & allium coctum &
crudum. & cibus mollibus, & polypis, ac aliis mollibus vtatur.
Si verò pepererit sana erit. Si vteri ad hepar accesserint, **F**
muta de repente fit, & dentes conserit, & color niger fit. pati-
tur autem hæc derepente dum sana est. Est autem huiusmo-
di affectio virginibus maxime antiquis, & viduis, quæ iuue-
culæ sunt & pepererunt, ac viduæ manent. Quum sic habue-
rit, depulsione per manum infra facta, sub hepate aut sub
præcordiis, fascia deligato, & aperto ore vinum odoratissi-
mum infundito. Et graueolentia naribus adhibeto ac suffi-
to. Sub vtero verò bene olentia. Postquam autem resipuerit.
pharmacum infra purgans bibendum dato. & lac asininum post-
ea bibendum exhibeto. Deinde vteros odoratis foueto, &
medicamenta cum buprestis præparata apponito. Postridie ve-
ro Netopon vnguentum. Intermisis autem duobus diebus,
vteros cum odoratis colluito. Et postridie pulegium apponi-

Ato, die verò vna interposita, aromata suffito. Atque hæc quidem viduæ facito. Virginē autem vt viro cohabitaret persuadeto, ad vteros verò nihil adhibeto, neque pharmacum bibendum dato, verum conyzam & castoreum in vino ieiunæ exhibeto, & caput odoratis ne vngat, neq; odorata olfaciat.

Si vteri prociderint, & foras egressi fuerint, calor habet **Cum vteri**
maximè pudenda, & sedem. Et vrina paulatim destillat, ac **procide-**
mordet, hæc patitur si ex partu progressa viro cōdormierit. **rint.**

Quā autē sic habuerit, myrti baccas & loti ramēta, in aqua coquito, & aquā per noctē sub dio exponito, & pudenda cum eo decocto quā frigidissimo perfundito, & eadē trita pro cataplasmate adhibeto, postea bibens aquā lentium, & mel, **B** & acetū, donec vteri fuerint eleuati, vomat. Et lectum à pedibus altiore facito, & graueolentia sub pudenda suffito, odorata verò sub nares. Cibis verò vtatur mollissimis ac frigidis. Et vinū aquosum album bibat, Ne lauetur autē, neq; cum viro dormiat. Si verò penitus ex pudendis exciderint, **Cum exci-**
dependent velut scrotum. Et dolor corripit imum ventrem, **derint.**
& lumbos, & quum tempus processerit, ad locum redire nō volunt. Morbus autē corripit, quum ex partu progressa vteros doluerit, aut cum viro in puerperij purgatione cōcubuerit. **Q**uum verò sic habuerit, frigefactoria ad pudenda ap- **Medela.**
ponere oportet, & quod foris est depurgatū, & cum vino nigro, in quo malum punicum coctum est, ablutum, intro de-
trudere. Deinde mel & resinā mixta infundere. Decumbat
C autem supina pedes sursum extentos habens, postea spōgias imponito, & ex lumbis deligato. Quum autē sic habuerit, à cibis quidem abstineat, potu verò, quā paucissimo vtatur, donec septem dies præterierint, & si quidem sic ingredi voluerit, bene habet: Sin minus, summas vteri oras deradito, calefacito, abluito, ac cerato picato illinito, & alligata ad scalam muliere, scalam iuxta caput pulsato, & vteros cū manu intrudito, postea crura ipsius alternatim colligato, & sic per diem ac noctem finito, & modicum ptisanæ succum frigidū dato, aliud verò nihil. Postera die decubenti cucurbitā quā maximam ad coxendicem affigito, & multo tempore trahere finito, postquam verò detraxeris, ne scarificato, sed reclinatam finito, & nihil aliud quā succū exhibeto, donec septem dies præterierint. Si verò sitiat, aquam dato frigidam
F 2 quā

Hippocratis Liber

quàm paucissimam. Vbi verò septem dies præterierint, cibis D
mollissimis ac paucissimis vtatur. Si verò ventrem exonerare
re velit, decumbens exoneret, donec quadraginta dies præ-
tereant, postea surgat, & parcissime obambulet, & ne laue-
tur, sed intra pudendum graueolentium suffitum admittat,
Cum locel & modica edat. Si vteri adglutinati fuerint, incumbunt. &
li hæserint. si contigeris, videbis locum durum sub lateris mollitie, & do-
lor corripit imum ventrem, & laterum mollitudinē, & lum-
bos, & in crure dolor irruit, eaque extendere non potest. Sæ-
pe verò etiam suppurantur, & linamentis inditis curatæ ac
Medela. fluentes moriuntur, si nō vsseris, aut secueris. Quum autem
sic habuerit, pharmacū infra purgans bibendum dare oportet,
& multa calida lauare ac fouere, & quum recens lota aut E
fota fuerit, iubere vt admota manu, cum digito os vterorum
abstrahat, & myrrham caloniam suffiat, rosaceo affuso. Bi-
bat autem pæoniæ grana nigra quinque, castorio ammixto,
in vino odorato, & in coxam sanam decumbat, & apponat
Baccarim vnguentum, aut oleum album ad coxam sanā, &
edat allium plurimum, & crudum, & coctum, & succum sor-
beat, & cibis mollibus vtatur, postquam autem dolor quie-
uerit, abduces euntem super sanam coxam, postea verò fo-
mentum ex vrina adhibeto, lauro inspersa, & à fomento cy-
claminū apponito, postera die lotæ suffitus ex aromatis ad-
hibeatur. Cæterum ex hoc morbo maximè steriles fiunt. Si
Si os vtero complicatum fue- rit. Si
Curatio. rit. Si
Cum vteri coxæ dicem petunt.

complicatum fuerit os vterorum, menses non prodeunt. Si
verò prodeant, pauci ac prauis sunt. Et vbi cum viro coit, do- F
let, & dolor imum ventrem tenet ac lumbos. Et si contingat
digitis & os requirat, non est manifestum. Quum sic habue-
rit, vrina humana foueatur, & post fomentum lenticulæ de-
cocto lauetur, & postquam lota fuerit, vteri vnguento Aegy-
ptio foueantur. Et si odor ad nares ascenderit, spes est ipsam
sanam fore. Et quum dormire voluerit, Aegyptium oleum
in lana subdat. Postera verò die consideret an magis corre-
cti sint vteri, postea odoratis foueto, & purgatoria quæ non
mordeant subdito. & post subdititiā medicamēta, pari men-
sura aceti ad aquam ammixta eluito. Quum autem menses
prodierint, ieiuna & illota, & suffita, cū viro coeat. Maximè
verò ex hoc morbo steriles fiunt. Si vteri ad coxam decur-
rerint, & menses non procedunt, & dolor ad imum ventrem
accedit,

A accedit, & ad lateris molliciem. & si digito cōtigeris, deprehendes os in coxa. **Curatio.** Quum ita habuerit, calida lauato, & allia plurima edēda dato. Et lac ouillum purum bibat, & postquā

lac purum exhaust, fomento adhibito, postea pharmacū infrā purgans exhibeto. Quum autem purgata fuerit, rursus vteros foueto, ex fœniculo & absinthio permixtis. Vbi verò recens fota fuerit, os cum digito abstrahito, & scillam apponito, & interposita die postea id quod præparatur cum narcissi no adhibeto. Si verò tibi purgata esse visa fuerit, Netopon apponito. Et postridie rosaceum vnguentum. Cæterum prima mensium decurrentium die ab apponendo cessato. postera verò incipito vbi defecerint. At in mēsis si quidem **B** sanguis eruperit, satis est: Sin minus, cantharides quatuor bibat, pedibus & alis ac capite reiectis, & pæoniæ grana nigra quinque, & sepia oua, & apij semen, cum vino. Et si dolor habuerit, & vrinæ stillicidium vexarit, in aqua calida desideat. & aquam mulsam bibat aquosam. Si verò à primo non fuerit purgata, rursus bibat donec fiat. postquam autem purgatio decurrit, ieiuna cum viro coeat. In purgatione verò mercurialem edat, & polypos coctos. & cibus mollibus vtatur. Liberabitur autem à morbo, si in vētre habuerit. Si ex partu non fuerit purgata, tumet venter & crura, & rigor ac dolor inum ventrem, ac lumbos tenet. Quandoque etiam ad viscera ascendit, & animo linquitur. Atque hæc patitur incipiente morbo. progressu verò temporis, cauæ faciei partes rubescunt. Quum igitur sic habuerit, fomento vteris adhibi-

Cum puerpera non purgatur.

Cto, cyclaminum apponito. Bibat autem medicamentū cum

Curatio.

træda præparatum, donec fluxus fuerit commotus. Ad os verò vterorum, adipem anserinum illinito, & myrrham, & resinam tepidam. & quàm maximè deambulet. & ante cibum Mercurialem coctam edat, & allium ac porrum. & brassicæ succum sorbeat. & cibus mollibus vtatur, & magis marinis. & calida lauetur. A pinguibus autem & dulcibus abstineat. donec sana fiat. Si vteri pituita impleti fuerint, flatus ob-

Cum vteri pituita opplentur, quid accidat.

oritur, & menses albi pituitosi superueniunt. Aliquando etiā sanguis tenuis pelliculis plenus. & præ humiditate cum viro coire non vult, & pallida ac tenuis fit. Interrogare igitur ipsam oportet, an quod fluit mordeat & exulceret, & si non mordeat, pronunciare à cerebro fluxū esse. Si verò mordeat, **Curatio.**

Hippocratis Liber

à ventre. Si quidem igitur à ventre fuerit, à lenticulæ deco-
cto vomat. Deinde veratro purgato. postea idem in nares
immittito. Postquam autem superior venter tibi purgatus
esse videbitur, pharmacum infra purgans bibendum da-
to. A cibis autem pinguibus ac dulcibus abstineat. Acres
autem exhibeantur, velut commodi, nisi pudenda fuerint
exulcerata, præstant autem frigidi. Et modicè lauatur,
non tamen calida, neque caput. Ieiuna verò bibat hyperi-

Cum vteri
penitus in-
flāmantur.
quid agen-
dum.

cum, semen apij, saluiam in vino aquoso. Quum autem
cessauerit fluxus, cum succo grossorum eluito, & postea acer-
bis colluito, Est autem morbus grauis. Si vteri inflam-
mati fuerint menses omnino non prodeunt, aut prauī & pau-
ci. Et quum ieiuna est, vomitus ipsam corripit. Vbi verò
quid ederit, vomit cibos, & dolor inum ventrem ac lumbos
habet, & animi deliquium inuadit. Venter autem aliquādo
durus, aliquando mollis est, & inflatur ac magnus fit. & pu-
tat se in ventre habere. Si verò contigerit, plenitudo illa va-
cua fit. Huic vsque ad decimū mensem tumor paulatim au-
gescit, velut in ventre habenti. Vbi verò decem menses præ-
terierint, venter aqua impletur, & vmbilicus eminet. Et si di-
gitum admoueris, os vteri gracile & collapsum comperies.
Et vbi menses apparuerint, pauci sunt & prauī. Et clauiculæ
ac collum attenuantur. Et pedes intumescunt. Quum igitur
sic habuerit pharmacum infra purgans bibendum dato. &
ad vteros quæ purgant & non mordent apponito. Et post ap-
positionem vteros eluito, pari mensura aceti acerrimi ad a-

Vteri cry-
pelas.

culosus. Si ignis sacer erysipelas dictus in vteris oboriatur,
tumor fit à pedibus exorsus, & ad crura & ad lumbos proce-
dens. Quum autem tempus amplius processerit, intumescit
etiam venter, & rigor ac febris corripit, itémque debilitas.
Præ dolore verò, quiescere nō potest, sed iactat seipsam. Do-
lor autem ex imo ventre ascendit ad lumbos. Postea sursum
vergit ad præcordia, & pectora, & caput. Et mori sibi vide-
tur. Quum autē remiserit, torpor occupat manus. Aliquādo
etiā inguina & crura, & poplites, & liuida fit, & modico quā-
doq; tempore sibi melius habere videtur. Deinde rursus ea-
dē patitur. & corpus pustulis impletur. & facies rubescit, &
fitis fort

A fitis fortis tenet, & fauces siccae sunt. Hic morbus si pragnati fiat, moritur. Sin minus curata sanatur. Quum igitur sic habuerit, adhibere oportet, si dolor habeat, frigefactoria, & ventrem turbare. Et si quidem in ventre habeat, cibis ac potibus vtatur, à quibus foetus non corrumpitur. Si verò non secedat, clysterem adhibeto. Si autem in ventre non habuerit, pharmacum bibendum dato, & cibis paucissimis vtatur mollissimis ac frigidis, & Mercurialem edat, & sambucum, & neque falsa, neque pingua, neque acria, velut est origanum, aut thymus, aut ruta. Postquam autem calor & strangulatio remiserit, & tumor non fuerit sedatus, medicamentum fortius infra purgans postea bibendum dato. Morbum autem hunc paucae

Curatio.

B effugiunt. Si vteri prater naturam hient, & menses plus quam oportet prodeunt, viscosioresque ac frequentiores, & genitura non manet intus. Et si digito contigeris, os hians comperies, & febris ac rigor & dolor, inum ventrem & lumbos corripit. Hic morbus à fluxu sanguinolento corripit. fit autem quum menses suppressi derepente eruperint. Huic quum dolor maximè habuerit, tepefactoria apponito. Et cum remiserit, vteros foueto, & pharmacum infra purgans bibendum dato. Et quae non mordent subdito, & post subditicia medicamentum, cum acerbis colluito, & quam minimum lauato. Cibis autem siccissimis vtatur. Si verò his factis sana non fiat, pharmacum bibendum dato, à quo sursum ac deorsum purgetur. Et quum menses moti fuerint, & quum quieuerint, eiusdem modi victum exhibeto. Morbus autem lethalis est.

Cum vteri prater naturam hiant.

Curatio.

C Si vteri ad medium lumborum processerint, dolor inum ventrem habet, & crura contrahuntur, & quum aluum exonerat, dolores acutiores fiunt, & stercus cum vi prodit, & vrina destillat, & animo linquitur. Quum sic habuerit, fistula ad vesicam alligata vteros sufflato, & fomentum adhibeto. Aut multo calido lauato, & male olentia sub pudenda sufflato. Sub nares autem odorata. Quum autem dolor cessarit, lenticulae decocto praeputato, pharmacum sursum purgans bibendum dato, à quo venter moueatur. postquam autem vteri ad locum suum redierint, medicamentum infra purgans bibendum exhibeto, & postea lac bibendum dato. Postea fomento ad vteros adhibito ex vino, medicamenta cum lauro preparata immittito, & apponito quae non mordent, ammixto aceto.

Cum vteri lumbos percutiunt.
Medela.

F 4

Postea

Hippocratis Liber

profluuiū hoc morbo. **album.** Quum fluxus albus obortus fuerit, velut vrina alinina apparet. Et dolor inum ventrem habet, & lumbos, & lateris mollitudinē, & tumores sunt crurum ac manuum, & caua eleuantur, & oculi humidi sunt, & color arcuatus ac albus fit. Et quum iter facit, anhelat. Morbus autem fit, si vbi natura pituitosa est, febricitarit, & bilis commota purgata non fuerit. Si quidem igitur venter acuerit, ventris profluuiū fiunt. Si verò ad vteros vertatur, fluxus fit. Postquam igitur vētris profluuium habuerit, papaueris albi ac rubri cor-

Medela. ticem pari pondere, & spinæ fiuctum in vino diluto terito, & polenta recenti inspersa bibat. Si verò velis, malicorium calido cinere torrefactum ac tritum ex vino bibat, pari polenta ac farina inspersa. Minimum verò lauetur. Cibis autem vtatur quàm siccissimis ac frigidis. Vbi verò fluxus quieuerit, pharmacum bibendū dato, à quo superna purgentur, & lac asininum bibat. Postquam autē infra purgata fuerit, bubulum lac bibat, ad dies quadraginta, si poterit meracum, sub dio per noctem expositum, quarta aquæ parte amixta. Vesperī verò vbi ebibit, alicam sorbeat. Quum autem decem dies fuerint transacti, lactis & aquæ decimā partem detrahito. Quātum autem detraxeris, tantam tepidi recens mulcti portionem additam bibat. postridie verò duas portiones, vt in decē portionibus pro modico diluto sit meracum, & ad quatuor dies bibat. Dum autem decimā partem detrahit, etiā de sorbitione amplius addat. Postquam autem quatuordecim dies transegerit decimam lactis partem bibens, postea tertiā aquæ partem affundens, ad dies decem bibat, & cibis vtatur, & sic fiant omnes dies quadraginta.

profluuiū aliud.

Quum conceperit & vterum ac partus gestarit, ea quæ natura sterilis est, primū quidem menses deficiunt, & pauciores fiunt, & tempus in quo prius fiebant, transmittunt. Postea derepente multi fiunt, & puri ac fortes, & si quidē semel facti fuerint, de cætero secundum rationem in ventre habet. Sin minus, & primū fiunt & iterum atque iterū in mense, postea ex seipso desinet fluxus, pallidāque ac tenuis fit. Pharmacum igitur & sursum & deorsum purgās bibendum dare oportet. Et lac asininum postea bibendum aut serum. Postea adhibito fomento, vteros medicamēto quod nō mordeat

A mordeat purgato. Deinde cum aceto colluito. Postea aromata suffito. Hæc autem facito ut prima mēsum die facta sint. Et ne sit illota & impasta, cyceonem insulsum crassum bibens, & aromatis suffiatur, netopo affuso & vnguento rosa-
 ceo. Postea cum viro coeat. Si acetabula pituita plena fuerint, menses quidē bene succedunt, & in ventre habet. Cor-
 rumpit autē fœtum vbi fortior factus fuerit. Non enim retinere potest, sed abrupitur. Cognoueris autem hoc modo. Humida sit, & mucosum ac viscosum defluit, & nō mordet, & in mētribus vbi à fluxu purgari cessauerit, per duos ac tres dies muci ab uteris prodeunt. Hanc grossorum succo eluito, & collutione per acerba postea bis aut ter facta. de cætero
B apponito id à quo pituita purgatur, & mollia fomenta adhibeto. Et post subdititia appolita, pari mēsurā aceti ad aquam ammixa eluito, & in mētribus aromata suffito. Postea im-
 pasta & illota cum viro dormiat. Quum menses occultati fuerint dolor imum ventrē tenet, & onus incumbere ipsi videtur, & lumbos dolet, ac laterum mollitudinē. Quum verò ad præcordia uteri allapsi fuerint, suffocant, & vbi frequēter acida euomit, admodicū tēpus melius habet. Dolor autem & ad caput & ad collum procedit. Postquam igitur allapsum parant, aut allapsi sunt, tepefactoria adhibeto, & graueolentia suffito, infra autem odorata, & castorium bibendū dato, & conyzam. Vbi verò deorsum prociderint, infra graueolentia suffito. sub nares autem odorata. Sedatis autē doloribus, pharmacum bibendū dato. Et lac asininum postea bibendum. Deinde succum à quo vomat dato, & ad nares apponito. Postquam autē purgaueris, fomento uteris adhibito ex his quæ cum lauro præparatur, id quod ex narcisso præparatur apponito. Et tribus interpositis diebus, fomento adhibito, id quod ex cantharide præparatur apponito, & postera die adipem anserinū. postea intermissis tribus diebus, collutione cum aceto parata eluito. In purgationibus autē mercuriale ante cibos edat, & cibis mollissimis utatur, & acria edat. Et bis in die calida lauetur. Si verò menses non fiant, vbi hæc opportuno tempore feceris, cantharides bibendas dato, & postquam prodierint, ieiuna & illota, ac suffita, cum vino dormiat. Quum in ventre habēs, fœtum menstruum aut bimestrem corruerit, & ad perfectionem gestare non
 F s poterit,

Cum acetabula pituita implentur.

Medela.

Menses cum non decurrunt.

Medela.

Cum prægnans parit menstruum perdit.

Medela. poterit, & tenuis præter naturam fiat. Huius vteros purgare oportet ac corpus pinguefacere. Nō enim prius fœtum perferre poterit, quā vteri ipsius crassi fiant, & robusti euadant. Si verò crassifac̃ta fuerit mulier præter naturam non concipit in ventre. Nā omentum multū ac crassum incumbens vteros deprimit, & genituram non suscipit. Hanc attenuare oportet, & pharmacum infra purgans bibendū dare, & ad vteros apponere quod purget ipsos, & flatus inducat.

Crassa cur non concipiant. Si verò os vterorum durum fiat, aut ceruix, digito intro-misso id cognosces. Itēmq; si ad coxā fuerint auersi. Quum sic habuerint, nihil acre adhibeto. Si enim os exulceraueris, vbi inflammatum fuerit, periculū est ne penitus sterilis fiat. Verū apponito quæ non mordent, à quibus purgetur. Si mulierem parere non potentem purgare velis, & fuerit biliosa aut pituitosa. Cognosces autē vtrum horum sit, si arena substrata quum menses fiunt, in sole sanguinem superfundas, ac siccare sinas. Si enim biliosa fuerit, supra arenam sanguis pallidus erit. Si verò pituitosa, velut mucus erit. Et sanē vtrum horum fuerit, infra purgato, & ad vteros subditia apponito. Si menses omnino non fiant, si quidem præ dolore id cōtingat, primum ventrem infra purgato, deinde medicamentum à quo sanguis ex vteris purgatur apponito. postea intermissa die vna aut altera, rursus id à quo sanguis purgatur apponito. Reliquo verò tēpore corticem crethmi in vino tritum bibat. Si humidius fuerit os vterorū quā oportet, acria apponito, quo morsum perreptet, & inflammatum valde durum fiat. Si verò induratū fuerit, acria adhibeto. Mordentia enim saniem diffundunt. Deinde mollia apponito. Sed & ad alios morbos non minus apponito. Si puerperæ vteri in coxam incubuerint, aut ad lateris molli-tudinem, ad sanam coxam oleum Aegyptium album, aut baccarim vnguentū apponere oportet, & in sanam coxā decumbat, & pæoniæ grana nigra quinq; bibat, & fructus sambuci, conchæ testam maiorem, & castorij magnitudinem fabæ in vino. postea lota suffiatur, & potibus ac cibis mollibus vtatur, & mercuriali, & acribus omnibus, excepto raphano ac cepis. Quum suffocarint vteri, graueolentia omnia suffire oportet, bitumen videlicet, sulphur, cornu, lucernarium

Strangulatio vuluæ. funiculum, phocæ adipem, castorium. Odorata verò subter puden

Apudenda. Si verò puerperæ inflammati fuerint vteri, ar-
det, & suffocatio habet. Quum autem sic habuerit, muscum
marinum tenuem tritum super linteolo extentum pro cata-
plasmate adhibeto. postea crudam ordeaceam farinam, &
cinerem sarmentitium, ac lini semen, oleo & aceto affuso co-
quito, donec velut farinæ subactæ massa fiat. Deinde quàm
calidissima ferre potest imo ventri imponito. Si verò fixi
fuerint vteri, lentem & mentam multam in aceto coquito,
vt vaporem inde in os trahat, & nares adhibeat. & graueolē-
tia suffuso. & mercurialem edat, & in succo eius farinam co-
ctam sorbeat. Quam celerrimè autem & priusquam dolor
occupet, exhibere oportet pharmaca, quæ vteros à dolore le-
uant. & cibos per aluum secedentes assumat. Si verò venter
calefiat, clysterem adhibeto. Si ex partu inflammati fuerint
vteri, solani succum in pudenda infundito. & vbi hic calidus
factus est, alium infundito, Si verò hic nō fuerit, lentisci aut
rhamni, aut betæ, aut cucurbitæ succum expressum infunde.
& quod in medio huius est tenerimum, deraſum longa for-
ma inde. postea cerusam aqua tritam & lana exceptam ap-
pone. Si verò horruerit, tolle. Si mulier ab vtero debilis sit,
& bilis ipsam suffocet, & opus sit ipsam leuiter purgare, &
dolorem sedare, peucedani succū trium cyathorū mēſura bi-
bendū dato. Si in lumbis aut lateris mollitudine fuerint vte-
ri, & trāsmouere velis, sulphur & bitumē terito, & melle co-
cto affuso, glandulā crassam facito, & in sedē indito. & vteri
si ficci fiant, hæc quàm celerrimè apponito. Mulieri si vteri
ficci fiant, & ad pudenda promineant, & inguina dura fiāt, &
calor in pudēdis insit, cancerari incipit. Quū sic habuerit, cu-
cumeris syluestris internā partem aridam terere oportet, &
aquæ hemina affusa, in sedē immittere, & purgari sinere do-
nec purgetur. Quum autē mulieri pharmacum dederis, am-
misce ad pharmacū ea quæ vteros purgant, & quæ expellūt.

Cum vteri
inflammā-
tur.
Medela.

Cum vteri
compacti
fuerint.

A partu
inflamma-
tio vuluæ.

Debilitas
à partu.

Cum lum-
bi & ilia ve-
xantur.

Cū vulua
dureſcit.

*Potiones, & subdititia medicamenta quæ se-
cundas educere, & menses detra-
here possunt.*

CAntharides quinq; auulsis alis & pedibus ac capite, de-
inde tribulos ad mare nascentes vnā cū radice mēſurā
quanta est cōchæ testa terito. & anthemi pallidā siue luteam
internā

Hippocratis Liber

internam partem siccam tritam, conchę testam addito, & se-
 minis apij tantundem, & sepię oua quindecim & in vino dul-
 ci diluto bibenda dato. & quum dolor habuerit, in aqua cali-
 da desideat, & aquam mullam aquosam bibat. Aliud. Ra-
 nunculi foliorum & floris triti Aegini stateris pōdus, in vi-
 no dulci bibat. Quum autem dolor habuerit, cicer album
 & vuas passas in aqua coquito, & perfrigeratam bibendā da-
 to, & vbi vrinę stillicidium vexarit, in aqua tepida desideat.
 Aliud. Adianti staterē Aeginæum, in vino albo pari aqua
 ammixta, bibendū dato. Aliud. Violę albę semē quan-
 tum tribus digitis apprehendi potest, in vino albo eodē mo-
 do temperato, bibendum dato. Aliud. Leucoij nigri ra-
 dicem, in vino eodem modo sumat. Aliud. Crinanthemū E
 quod in domibus nascitur, eodem modo misceto ac bibendū
 dato. Aliud. Anchusę foliorum pugillos duos, in vino al-
 bo æquali aqua ammixta, bibendos dato. Aliud. Chamę
 leonis radicem, velut veratri potionē, deraſam in vino albo,
 aqua pari mensura ammixta, bibendā dato. Aliud. Bras-
 sicę & porri succū, ad vtrunq; succi filphij obolis tribus am-
 mixtis, & vino albo cum pari aqua bibendum dato. Aliud.
 Oliuas albas priusquam oleum insit compunctas siccato,
 postea tufas & cribratas ac in vinum iniectas bibēdas dato.
 Hoc & menses detrahit, & secundam expellit. Aliud. Di-
 ctamni Cretici obolū in aqua bibendū dato. Et si hoc in po-
 tu dato, secundam eiicere non potes, sambuci succo cocto im-
 misso foueto, & cantharidē apponito. Hoc etiam fœtum ex- F
 pellit. Quum autē morsum intulerit, auferat, & rosaceo vn-
 guento tinctum apponat donec elapsa fuerit. Aliud. Po-
 puli nigre creticę grana nouem trita, in vino bibenda dato,
 Cum hoc etiam abluatur: si difficulter pariat. Aliud. Co-
 nyzę testam conchę maiorē cum porri succo diluito, & ne-
 topi testam conchę maiorem ammisceto, & hæc in vino bi-
 benda dato. Aliud quod menses detrahit. Peucedanum
 & panaces, & pręnię radicē, in vino bibenda dato. Aliud
 quod fœtum mortuum & secundas eiicit. Violę & portu-
 lacę semen contundito ac misceto, & in vino albo veteri ex-
 hibeto. Aliud quod menses detrahit. Seminis violę albę
 quantum tribus digitis apprehendi potest, & stercoris capri-
 ni pillulas quinq; aut sex, in vino odoratissimo permisceto,
 & biben

A & bibenda dato, vbi prius fomentum ex aqua & oleo immiseris. Adhibeto autē fomentū in fella, & vbi hæc bibit, quā celerrimē lotam reclinato. Brasicam verò edēdam exhibeto, & succum eius sorbendum. Aliud. Seminis violæ albae quantum tribus digitis apprehendi potest, in vino bibendum dato, & in aqua calida desideat. Si verò id non habeat, fœniculi radices contusas, in aqua mulsā tepida macerato, & exhibeto. Aliud. Fraxini grana decem, in vino bibenda dato. Hoc in omni vterorum morbo commodū est, & valde ciet vrinam. Aliud. Succum silphij magnitudine erui, & nasturtij semē terito ac ammisceto, & in vino aut lacte canino bibenda exhibeto. Hoc etiam fœtum expellit. Aliud fœtum eiiciens. Ranūculum herbam, & parum elaterij, in aceto temperato mixta bibenda dato. Aliud ad idem.

Brasicæ caulem tenerū, extremitate ex netopo illita, affricato. Aliud si menses non fiant. Terebinthi fructum tritum, in vino & aqua dilutum ac excolatum, ieiunæ bibendum dato, & calida lauetur. Aliud menses ciens. Rubra pæoniæ grana, in vino ieiunæ bibēda dato. Aliud ad puerperij purgamenta purganda. Fœniculi semen, & crethmi corticem, & thus, in vino bibenda dato, Aliud. Tædam quā pinguisimam in vino coquito, & pæoniæ grana quinque in vino terito, & heminae quadrantem bibendam dato.

Aliud. Mercurialis semen & folia, in vino bibenda præbeto. Aliud. Pæoniæ grana nigra quinque, & sepia oua in vino bibenda dato. Ad omnē puerperam. Ad irionem & polentam, oleum affunde, & coctū sorbeat, & cibis quā mollissimis vtatur. Aliud. Scammoniam in lacte muliebri tritam, lana exceptam appone. Aliud. Mercurialis folia trita in linteo subde. Aliud. Herbam artemisiā tritam, & vnguēto rosaceo imbutam appone. Aliud. Albam radicē tritam ac rosaceo vnguento subactā appone. Aliud. Pæoniæ radicē melle, vnguento rosaceo & Aegyptio subactam, in lana subde. Aliud. Farinam non lotam eodem appone. Aliud. Lolij & tritici farinam, simul melle subactas, in lana subde. Aliud quod menses & puerperij purgamenta purgat & aquā ducit. Radicis struthij tusi triti quantum tribus digitis apprehendi potest, melle subactum appone. Nascitur autem in Andro in littoribus. Aliud ad vteros depurg

Hippocratis Liber

depurgandos. Mercurialis contusæ, & cucumeris syluestris modicū, in vino tere, & melle subacta appone. Aliud. Pilos leporis cōbustos, ac tritos in vino, & melle cocto & aqua subactos, bibēdos dato, & aqua calida lauatur. Aliud partus purgatoriū. Polentā crassius fresam dimidij hemichœnicis mēfura, in aquæ heminis quatuor coquito, & vbi efferbuerit, bis aut ter sorbendā dato. Aliud purgās puerperij purgamenta. Sambuci folia coquito, & oleo affuso bibenda dato. Edat & brassicas coctas, & porrū. Aliud purgās vteros. Rhœis folia & irionē terito, & in vino, polēta inspersa, bibēda dato. Aliud. Misys obolos duos tritos & vino subactos apponito. Aliud.

Lini semē tritū, vino subactū apponito. Aliud. Trifolij semē in vino bibēdū dato. Si verò ad lūbos vteri incubuerint, **E** polypos coctos edat, itēmq; assatos, & vinū bibat nigrū, odoratum, meracū quā plurimū. Aliæ potiones, medicamēta subdititia ac purgatoria. Rhœ rubrū, & vinacea, in aqua coquito, & farina tritici recētis in aquā inspersa, bibendā dato.

Aliud. Farinā in aquā iniectā bibēdā dato. Aliud. Mora rubi ficcato ac terito, & polēta recēti ammixta, amborū acetabuli mēsurā, in vino odorato & aquoso, bibat. Aliud. Terram nigrā famiā in aqua tritā, tali magnitudine bibēdā præbeto. Aliud. Hypocistidē in vino bibendā dato. Aliud. Mala punica vinosa exsuccato, & polētā cum succo, subactā siccat. Postea tritā in vino bibendā dato. Aliud. Baccas myrti nigras tritas in aqua diluito, & polēta inspersa, bibendas exhibeto. Aliud. Mali punici dulcis assati drachmā, in vino **F** tritā bibendā dato. Aliud. Triticū & ordeū torrefacta, trita, & ad farinā redacta, in vino nigro bibenda dato. Aliud. Mali punici dulcis internā partē, pari aqua ammixta bibendam dato. Aliud. Cicutæ quantū tribus digitis apprehēdi potest, cū aqua bibendū dato. Aliud. Farinæ tritici recētis, & gypsī, æquales partes mixtas in aqua bibēdas dato. Aliud. Mali punici dulcis corticē ac coriū, in vino bibēdū dato. Aliud, si sanguis ex vteris fluat. Viticis folia in vino nigro bibenda dato. Aliud, ad fluxū ac dolorē. Rosmarini radicē in vino bibendā dato. Alias itē potiones ad vteros habes. Cedri fructus, seseli, cuminum Aethiopicum, cassiæ fructū, iuniperi baccas, miliū lentisci fructū, nigellā, dauci radicē ac semen. Aromata verò, thymū, thymbrā, ericē, hypericum, papauer album

A album crethmi radices ac semē, malux radices mercurialis semen, & folia, vrticæ semē, saluiam, populū nigrā, dictamnū, pseudodictamnū, amomum, cardamomū, heleniū, aristolochiā, castorium, adiantū, dracontiū, peucedanū, rutæ folia ac semē, apiij semē, fœniculi semen, hippofelini semen & radices, hippomarathri semē & radices, struthij semen & radices, hyslopum cilicium, irionē, pæoniam, panaces. Quodcunq; horū volueris, & cū altero permixtū, & per se in vino aut aqua prout volueris coctū, exhibeto bibendū. Cōmoda sunt & purgatoria, & quæ dolores sedant. Malux radicem in aqua dato. Aliud. Pæoniæ semen modico cedrino oleo ammixto, in vino bibendū dato. Et vterorū dolores sedabis.

B Aliud, quum vteri suffocarint. Castoriū & conyzam in vino albo bibenda dato. Si verò ad nares accesserint, enidij internam partē albā, melle ammixto, naribus illinito. Aliud sedans dolores. Malux radicē, & fœniculi ac crethmi corticem, ex aqua bibenda dato. Aliud. Stellas marinas nigras, & brassicam misceto, & in vino odorato bibenda præbeto.

Aliud. Myrrhæ obolos tres, coriandri parum, resinam, pæoniæ radicē, cuminum Aethiopicū, hæc trita in vino albo diluta, leuiter tepefacta bibenda dato. Aliud, quod secundas expellit. Ricini radicem bibendam dato. Aliud, si ad cor allapsi vteri strangularint. Viticis & pæoniæ semen, in vino bibendum dato. Apposititia acria sanguinē ducentia. Cantharidas quinque thuri ac myrrhæ ammisceto, & glādulam

C longam magnitudine gallæ formato, & lana obuolutā linteo albo circumdato, & vnguento Aegyptio albo aut rosaceo madefactam apponito. Aliud. Buprestim si parua fuerit, totam, si magna, dimidiā, ad prædicta ammisceto, & eodem modo apponito. Si verò mollioribus vti velint, buprestidas in vinum mitte, & cuminū Aethiopicum, & feseli, ac anisum addito ac feruefacito. ad decem verò buprestidas, acetabulum olei ammisceto, reliquis omnibus æquali portione acceptis. Ammisceto etiā myrrhæ, ac thuris parum. Ex hoc pugillum accipito. & velut priorem glādulā subdito. Aliud. Nigellam terito cū melle, & vino subactā in glandulam redigito, ac vtere velut superiore. Aliud. Philistium eodem modo præparatum apponito. Aliud. Telephium eodē modo præparatū subdito. Aliud. Anemonæ folia trita linteo excipito

Hippocratis Liber

excipito, & myrrhæ parū ammisceto, & eodē modo vtor. D

Aliud, quod sanguinem ducit. Glandem Aegyptiam terito, & fufinum vnguentum quod est in terra Aegyptia addito, & aqua diluta, ac lana inuoluta apponito. Aliud bilē purgans. Cucumeris syluestris medullā tritam, ac melle subactam, & ad glandis formam redactam apponito. Aliud. Colocynthis syluestris internam partem terito, & melle subactam eodem modo subdito. Aliud. Elaterij potiones quatuor, adipe anserino & caprino, & misy ammixto, in glādulam formato, & in linteo apponito. Aliud Thlaspi tritum, & melle imbutū apponito. Aliud. Foliorū fici sanie deradito, & elaterij potiones duas ammisceto, & nitri tantūdem, mellēque subacta apponito. Aliud, si vteri inflamma- Eti fuerint. Nitrum rubrum, ficus pinguedinem internam, ytriusque pares portiones tritas, & ad gallæ magnitudinem efformatas subdito. Aliud. Cumini folia cum vino trita, in linteo subdito. Aliud. Radicē albā terito, & melle affuso feruefacito, & glādulā inde factā subdito. Aliud. Succū filphij, & ficū, mixta in glādē formata apponito. Aliud. Cucumeris syluestris semen tritū eodē modo. Aliud. Fel tauri, nitrū rubrum, netopō, cyclaminū terito, & de singulis gallæ magnitudinē, de cyclaminoverò plurimū, melli ammisceto & apponito. Aliud. Cyclamini caput purgatū in aqua tritum ac linteo illigatum apponito. Aliud. Myrrham, salem, cuminum, fel tauri, hæc melle subacta ac linteo excepta subdito. Aliud. Grana cnidia triginta deligito, & tria FIndici pharmaci oculorum, quod piper vocatur, & alia tria de rotūdis. Hæc tria in vino veteri trita, & oleo dulci diluta ac subacta, lanāq; excepta subdat, & vrina eluatur. Aliud. Tithymali succum melle subactum, ac linteo exceptū apponito. Aliud. Scillæ radicem longitudine digitorum sex sumito, & duobus digitis lana obuolutis subdito. Alia mollientia, à quibus aqua purgatur, & sanguis ac menses ducuntur, si non diuturni fuerint, & os vteri mollietur. Narcissinum, cuminum Aethiopicum, thus, absinthium, cyperum, aliorum quidem singulorum æquales portiones sumito, narcissini verò partes quatuor. Hæc trita & in glādulā efformata, linteoque crudi lini excepta apponito. Aliud. Cyclaminum magnitudine tali, & florem aris magnitudine fabæ terito,

A terito, melle subigito, & efformatam hinc glandulā subdito.

Aliud. Pulegium, mirram, thus, fel suillum, melle subigito, & in glandulam efformata subdito. Alia acerba. Rhoem vino nigro subactum apponito. Aliud. Cnicum eodem modo praparatum subdito. Aliud. Loti ramenta eodem modo apponito. Aliud. Rhoem melle ammixto subdito.

Alia mollientia. Sulphur, adipem, vitellum oui, farinam, melle subige, & tepesacta in lana subde. Aliud. Pinguetudinem anseris, adipem ouillum, ceram albam, resinam vnguentum rosaceum, tenui linteo excepta appone. Aliud.

Medullam cerui & adipē liquefacito, & in lana apponito.

Aliud. Adipem ouillum aut caprinum, & oui candidum B rosaceo vnguento subactum, ac lana exceptum apponito.

Quæ ad eluendos vteros infunduntur. Grossos hybernos in aquam missos ad lentum ignem coquito, & oleo ad decoctum affuso eluito. Deinde verò malicorium, & gallam, & loti ramenta, in vino acerbo coquito, & hoc excolatum infundito. Aliud. Fecem vini combustam in aquam mitte, & postea cum aqua collue. deinde malicorio, myrthi baccis, foliis rhois in vino coctis, vinum excolatum infunde. Aliud.

Lentisci, saluix, hyperici folia, in vino nigro coquito, ac infundito. Aliud. Si quid in vteris fuerit exulceratum. Butyrum, thus, myrrham, resinæ parum, infunde. Aliud. Porrum in aqua coquito, & excolatam aquam ad vinū ammixtam infundito. Aliud. Sambuci fructum, anisum, thus, myrrham, vinum sumito & horum succum infundito. Aliud.

C Brassicam in aqua coquito, & in brassicæ succo, mercuriale coquito, modico lini semine adiecto, & postea excolatū infundito. Aliud. Myrrhæ acetabulum, thus, seseli, anisum, semen lini, netopum, resinā, mel, pinguedinē anseris, acetū album Aegyptium, horum singulorum æquales portiones terito, & in vini albi heminis duabus diluito, & postea tepida infundito. Aliud. Mercurialem in aqua coquito, ac excolato, & myrrhæ acetabulum, thuris, netopi, singulorum æquas portiones ammisceto, ac tepida infundito. Aliud. Saluiam & hypericum in aquam coquito, ac infundito. Aliud. Sambuci fructum, & lauri baccas, æquis portionibus in vino coquito, deinde vinum infundito. Aliud. Pulegium in aqua coquito, & oleo ad aquam affuso immittito. Aliud. Pinguetudinem

G

dinem

Hippocratis Liber

dinem auferis, & resinam, colliquefacta infundito. Aliud. **D**

Butyrum, oleum cedrinum modicum, cum melle liquefacto, & tepida infundito. Aliud. Cyperum, iuncum rotundum odoratum, calamū aromaticū, pari portione myrrhæ ammisceto, & cum his Sisymbrium in vino coquito, ac infundito. Aliud. Semen apij, anisi, fœfelis, nigellam, in vino coquito ac infundito. Aliud. Cedrum creticam in vino coctam infunde. Aliud. Bryoniam albam & myrrham, in aqua diluta infunde. Aliud. Argenti florem cum vino & aqua infunde. Aliud. Elaterij potiones duas aqua dilutas infunde. Aliud. Cucurbitas siue colocynthidas syluestres duas, in vini aut lactis cocti heminis quatuor madefacito, excolato, ac infundito. Aliud. Cucumeris syluestris medullam palmi parui magnitudine, in aquæ heminis quatuor coquito, & melle ac oleo affuso infundito. Aliud. Radicis thapliæ duas potiones, & mel ac oleū, in duabus aquæ heminis diluito ac infundito. Aliud. Veratri duas potiones in duabus aquæ heminis tepidæ infundito. Aliud. Thlaspiæ acetabulum melle admixto, in duabus aquæ heminis diluito, ac tepidè infundito. Aliud. Cucumeris syluestris magnitudinem palmi parui, in aquæ heminis quinque coquito, & melle affuso infundito. Aliud. Grana cnidia sexaginta, oleo & melle diluta infundito. Aliud. Si natura pituitosa fuerit. Cneorū potionē tritam in aquæ mulsæ hemina Aeginea diluito, ac infundito. Aliud. Si biliosa fuerit, Daphnes potionem odoratæ illius drachmæ pondus, scammoniaæ **P** potionē, terito & in aquæ mulsæ, aut aquæ vix passæ hemina Attica diluito. Aliud. Daphnoidis potionem eodē modo, & si biliosa fuerit, hæc infunde: Si verò pituitosa, grana cnidia electa, & succi tithymali potionem infundito. Similiter etiam cneoro, & peplo, vtrisque his vti oportet. Immitto autem cum infuso non ampliore quàm duarum heminarum. Suffitus porro sunt hæc contusa. Gallam suffito.

Aliud. Ramenta loti ad oleæ folia sicca cōtusa misceto, & oleo subacta suffito. Aliud. Prunas subiicito, & ordeï paleis humidis inspersis suffitum facito. Aliud. Super amphoræ oleariæ operculo stœben incendito. Aliud. Cupressi ramenta suffito. Aliud. Scammoniam, myrrham, thus, vnguento affuso suffito. Aliud. Bitumen, & ordeï paleas
misce

A misceto, ac addita pinguedine phocæ suffito. Aliud. Fraxinum, cupressi ramenta, cyperi radicem, vnguento rosaceo subacta suffito. Aliud. Calamum, cyperum, bryoniam, muscum, arboreum, anij semen, anisum, simul mixta & vnguento rosaceo subacta suffito. Aliud. Resinam siccam cineri feruido inspersam suffito. Aliud. Cinamomū, myrrham, casiam, paribus singula portionibus suffito. Aliud.

Crocum ammixta myrrha, & musco, æquali cum croco portione suffito. Aliud. Calamum, cneorum, crocum, folia rosarum rubra suæqueolentia trita & siccata ad crocum ammisceto, & styracem dimidia croci portione addito. Hæc trita mixta & siccata, melle cocto modico subigito. Horum

B verò omnium suffitus sit oboli Attici pondus. Suffiantur autem super stercore bubulo. Formetur autem stercois velut acetabulum olearium, habeatque fundum tenue, & sit ficcum. Ignis autem sit sarmentitius, in quo stercois iaceat, & ex illo mulier insidens contacta suffiatur. Aliud. Galbanum, resinam, mannam, vnguento rosaceo subacta suffito.

Aliud. Panacis & cupressi ramenta, vnguento Aegyptio albo subacta suffito. Aliud. Cinamomum, nardum & myrrham vnguento rosaceo imbuta suffito. Aliud. Violæ albæ semen, cedri ramenta, & galbanum, melle subacta suffito. Aliud. Stercoris caprini pilulas, & leporis pilos, pinguedine phocæ subacta suffito. Aliud. Coaguli phocæ pelliculam contusam ac tritam, & spongiam, & muscum

C arboreum, trita simul mixta, atque phocæ pinguedine excepta suffito. Aliud. Stercus caprinum, & pulmonem phocæ, ac cedri ramenta suffito. Aliud. Stercus bubulum, cedri ramenta, & bitumen suffito. Aliud. Spinæ Aegyptiæ fructum, & cedri ramenta, & myrti sicca folia. Hæc trita & vnguento molli subacta suffito. Multa verò aromata in vnguentum iniicito. Aliud. Vinacea tusa trita, & cedri baccas, & resinā pinus, simul mixta & passio cocto subacta suffito. Fomenta. Stercus bubulum contusum ac cribratum, aceti dimidia mensura, & decocti erui dimidia adiecta, leniter pro fomento adhibeto. Postquàm autem fomentum adhibueris, lenticulæ decoctum bibendum dato ac reuomendum. Et farinam sorbendam, ac vinum insuper bibendum. Postridie verò granum cnidium deuorandum exhibeto. Se-

Hippocratis Liber

quenti die quod yrinam ciet, hoc scilicet. Ciceris albi partes **D**
duas tritas, vix passæ tertiam partem, affusa aqua ad dimi-
dias coquito, deinde excolatam aquam per noctem sub dio
exponito, & postridie bibendam dato. Et de cætero saluiam
ac lini semen, polenta ad ambo hæc ammixta, bis per diem
in vini diluti heminis quatuor dato. Aliud. Olei heminas
dimidias tres, foliorum sambuci manû plenæ mensuram.
Hæc cocta in craterem calidum fundito, & per testas calidas
immissas fomentum facito, muliere in sella collocata, ac ve-
stimentis cooperta. Aliud. Foliorum sambuci manû ple-
næ mensuram, & myrti tantundem in aquam missa coqui-
to, & ad excolatam aquam, ordeï paleas iniicito, coquito, &
lintheo excipito, ac cum hoc fomētum facito, prout maximè **E**
calorem ferre poterit. Aliud. Acetum, oleum, aquam, mel,
hæc mixta valde feruefacito, deinde accepta vesica capiente
congium, aut vtriculo ex tenui corio facto, infundito, & pan-
niculo laneo obuoluto, foueto. Quum autem tepidus factus
fuerit panniculus, alium obuoluto. Aliud. Pini corticem,
& rhois folia in aquam coniecta fortiter coquito; & in exco-
lata aqua ordeï paleas coquito, oleo affuso, vbi verò simul cu-
xeris lintheo excipito, ac foueto. Aliud. Loti ramenta & co-
pressi, aqua & oleo affuso coquito. Deinde simul cocta lin-
theo excipito, ac foueto. Aliud. Aromata in aqua chœnicem
coniecta coquito, & in excolata aqua furfures triticeos co-
quito, & foueto. Aliud. Eodem modo gallam contusam, &
rhamni corticem in aqua coquito, & cum aqua furfures tri- **F**
ticeos subigito, ac oleum ammisceto. Postea semiaslatum pa-
nem duos chœnices habentem facito: lintheoque excipito, ac
foueto. Aliud. Brassicam & porrum decoquito, & cum
succo eodem modo fomentum facito. Aliud. Ordeï paleas
coquito, oleo affuso, & lintheo excipito, ac foueto. Aliud.

Solanum & oleæ folia coquito, & eodem modo fomen-
tum facito. Atque hæc sanè, si quidem humidis vti volue-
ris, pro fomento velut scripta sunt adhibe. Si verò siccis,
panes parato & exallatos, & semiaslatos, & cum his foue-
to. Sed & testis calidis lintheo inuolutis foueto, itémque
cum ipsis linteis calefactis, & cum lenticulis vasis testaceis,
feruente aqua infusa, Apponito autem ad pedes. Aliud.

Iridis radicem tundito ac coquito, & eodem modo foue-
to

A to. Si aqua in vteris gignatur, menses pauciores fiunt, & de- Menses quā
do paucio-
res.
Medela.
teriorēs, & per longius tempus, & pręgnans est semper per
duos menses, aut paulo amplius. Quum autē hoc tēpus ad-
uēnerit, & corrumpit, & aqua multa in ipsa gignitur. huic
autem lac bibendū dare oportet, & peplum, mecona dictū,
donec fœtus moueri inceperit. Plerunque verò ante hoc cor-
rumpitur, & per abortum extruditur, & vteri sanguine ma-
nant. Hęc autem patitur nihilo magis ex labore, quā ali-
ter. Hoc autem cognoscere poteris quod hydrops inest, ex
digiti cōtactu. Comperies enim osculum ipforum gracile, &
obscuratum ac plenum humiditate. Si verò non circa initia,
sed dum iam mouetur, fœtus ipsi corrumpatur ac suffocet-
B tur, tunc & venter imus intumescit, & ad cōtactum dolet, ve-
lut vlcere pręsente. & febris ipsam ac dentiū fremitus cor-
ripit. Et dolorem habet acutum & vehementē, circa puden-
da, imum ventrem, & lumbos, & laterum mollitudinem ac
coxendices. Quum sic habuerit, calida ipsam lauare oportet.
Et qua parte dolor haferit tepefactoria adhibere, experimē-
to facto de eo quod maximē admittat. & pharmacum deor-
sum purgans bibendū dato. Interposito verò tempore quan-
tum tibi sufficiens esse videbitur, & collutione facta, & fo-
mento adhibito, cyclaminū apponito, ita vt melle subactā,
& linteo exceptam deliges, & ad os vterorum apponas. Cu-
pressi etiā ramenta in aqua madefacta, eodem modo appo-
nit. Verū hęc breuiore tempore, & per longius temporis
C interuallum, quāto magis mordent & exulcerant. Et specil-
lum stanneum paratum immittito, & digitum eodem mo-
do. Potiones quoque bibendas dato, experimentum faciens
quas libet admittat. & cum viro dormiat, maximē oppor-
tuno tempore pręsente. Si enim genituram conceperit, &
pręgnans facta fuerit, ac pepererit, subexpurgantur & quę
prius in ipsa fuerant, cum ipso puerperij purgamento. Atque Vteri dari
ties.
sic maximē sana fieri poterit. Si indurati fuerint vteri, & os
ipforum asperum sit, & menses occultantur. Quum verò
apparuerint, velut arena sunt. & genitura hoc tempore non
fit. Si verò etiam digito contigeris, asperum comperies os
vterorum. Quum sic habuerit, cyclaminum terere opor- Curatio.
tet. & salem ac ficum crudā ammiscere, & cum melle effor-
mata apponere. & fomento adhibito, purgatoria infundere.

Hippocratis Liber

Edat autem mercurialem, & brassicas coctas, & succum sor-
 beat, & calida lauetur. Si indurati fuerint uteri, & menses
 occultantur, & os ipsorum conuiet: & non concipit. Quum
 sic habuerit, si digito contigeris, comperies os asperum, & di-
 gitum non intromittit. & febris ipsam corripit, ac dentium
 fremitus. Et dolor habet inum ventrem, & laterum molli-
 tudinem, & lumbos. Patitur autem hæc, si foetus in ipsa cor-
 ruptus fuerit putrefactus. Quibusdam verò etiam ex partu
 contingit. Sape etiã aliter. Quum sic habuerit, multa calida
 ipsam lauare oportet, & fomentum adhibere. Quum autem
 recens lota aut fota fuerit, immisso specillo os aperito ac di-
 latato, & per digitum eodem modo, & velut in priore scri-
 ptum est apponito. Et potiones similiter bibendas dato. & eo
 dem modo curato velut priorem. Si uteri ad latus allap-
 si fuerint, tussis detinet, & dolor sublatus, & uterus durus velut
 pila infidet. & ad contactum dolet velut ab ulcere. Et conta-
 bescit, & videtur peripneumonia esse, & conuellitur, & gib-
 bosa fit. Et menses omnino non apparent. Quibusdam verò
 prius conspecti, euanescent. Tunc autem fientes, debiles sunt
 ac pauci, aut deteriores quàm antea & genitura non fit hoc
 tempore. Quum sic habuerit, pharmacum deorsum purgãs
 bibendum dato, & eo epoto, multa calida ipsum lauato. &
 ex tepefactoriis quod maximè admittit adhibeto. & à quib⁹
 sanguis purgatur ea apponito. & lini semen tostum, tustum
 ac cribratum, & peplum album, & saluiam cum polenta te-
 nui, & caseum caprinum, sordibus & salis muria derasis: hæc
 misceto, vt casei sint partes duæ, reliquorum verò vna: po-
 lenta autem sit antiqua non falsa, & ieiunæ in vino bibenda
 dato. Vesperis verò cyceonem crassum melle affuso exhibe-
 to, & ex potibus quemcunque libenter admiserit bibendum
 dato. Et frequenter fomentum adhibeto. Calidam verò as-
 pergito, & per ceratum leniter mollito, ac à latere detru-
 dit. & latus fascia lata deligato, & lac bubulum quàm pluri-
 mum ad dies quadraginta bibendum præbeto. Cibis autem
 vtatur quàm mollissimis. Morbus hic vehemens est & leth-
 lis. & paucae etiam si curentur ipsam effugiunt. Si os vtero-
 rum cõcludatur, forte fit velut grossus ficus. Et si digito con-
 tingeris, comperies durum ac contractum. & digitum non in-
 tromittit. & menses occultantur. & geniturã nõ suscipit hoc
 tempo

Cum os v-
 terorum cõ-
 cluditur.

- A** tempore, & dolor habet in venterē, & lumbos, & laterum mollitudinem. Quādoq; etiam sūtsum procedit, & suffocet. Quum sic habuerit, pharmacum deorsum purgās bibēdum **Medela.** præbeto, & multa calida lauato, & quæ os molliunt apponito, & specillum immittito ac aperito, & digitum similiter, & calidam aspergito. Quum autē molle factum fuerit, ea quæ sanguinem purgant apponito, & ex potionibus dato, experimento facto quam libenter admittat, & brassicam edat, & succum eius sorbeat. Si vteri obliqui fiant, etiam os ipsorum obliquum fit, & menses ipsi nunc occultantur, nūc prius **Vterorum obliquitas.** apparentes euanescent, & non similes fiunt, sed deteriores & pauciores quā antea, & genitura nō fit hoc tempore, & dolor habet in venterē, & lumbos, & coxam, & attrahit ipsam. Quum sic habuerit, pharmacum infra purgās bibendum dare oportet, & calida lauare, ac fouere. Vbi verò recens fota aut lota fuerit, digito immisso os vterorum corrigat ac dirigat, & odoratorum suffitum admittat, & ex potionibus dato, iuxta experimentum quam libenter suscipit. Cibus autē vtatur mollibus, & allia edat cocta ac cruda. & cum viro dormiat, & in sanam coxam decumbat. Alteri verò fomentum adhibeat. Morbus autē difficulter cedit. Si inflati **Vterorum inflatio.** fuerint vteri, & venter attollitur ac inflatur, & pedes intumescunt, & tauræ faciei partes. Color verò iniucundus fit, & menses nō fiunt, & genitura hoc tempore non fit, & anhelat, & anxia mœret, & quum surrexerit, aut progressa fuerit,
- C** erectæ cervicis spiratio ipsam tenet, & quicquid ederit aut biberit, ipsam molestat, & gemit, & magis agram tristatur quā priusquam ederet. Sape verò etiā suffocatur. Quum sic habuerit, pharmacum deorsum purgās bibendum dato, **Medela.** & calida lauato, ac fomentū adhibeto. Interposito verò tempore quodam, apponito ea à quibus purgetur, ac nō mordeatur. Frequentissimè verò totum corpus foueto. Tunc autem & sub pudenda odorata suffiantur. Sub nares autem graueolentia, & potiones dato quæ vteros purgāt, & ad locum compellunt. Et Mercurialem edat, & lac bibat, velut de latere dictum est. Morbus autem non est diuturnus. Si sanguinis grumi in vtero coierint, os ipsorum velut eruo plenum fit, **Grumi sanguinis in vtero.** & si attigeris, ita habere deprehendes, & menses non fiunt. Quum igitur

Hippocratis Liber

Medela. igitur ita habuerit, cyclamini corticem detrahito, & allium **D**

& salem, & ficum, & mellis parum terito ac permiscero, & glandulam hinc formatam ad vterorum os apponito, & alia vteris cōuenientia medicamēta subdito, quæ videlicet acria sunt ac corrodunt, & à quibus sanguis purgatur, & de potio-

**Vteriobtor-
ti.**

Curatio.

nibus dato eas quæ vteros purgāt, & omnia circumradito, & vesicæ pellicula siue cuticula digitis obuoluta, os vterorum deradito. Si obtorti fuerint vteri, & menses non fiunt, & genitura non manet intus, & dolor habet imum ventrem, & lumbos, & laterū mollitudines, & si digito cōtigeris, os vterorum attingere nō poteris, nam fortiter secessit. Quum sic habuerit, pharmacum bibendū dare oportet, à quo sursum ac deorsum purgetur, magis tamen deorsum. & os ipsum ac **E**

**Cum vteri
non consi-
stunt.**

Si vteri commoti in loco non manserint, quo prolapsi fuerint dolores exhibent, & inconspicui fiunt. Quandoque verò eminent, velut sedes prolapsa. Et quum quidē supina decubuerit, in loco manent. Quū autē surrexerit, aut se inclinauerit, aut aliàs se commouerit, exeunt. Saepē verò etiam

Medela.

quietem habent. Hanc quā maximē quiescere oportet, & non moueri, & lectum ad pedes altiorē statui, & iisdem vti, velut in superioribus, & cum acerbis infusis conspergere, & graueolentia suffire. Sub nares autem odorata, & malum punicum in medio per vmbilicum perforato, & in ipso picem quæ maximē cōgruat cum vino tepefacito, & nō valde premens quā penitissimē apponito. Quum autem quid apposueris, lata fascia exceptum ex lumbis deligato, vt ne dilabatur, sed maneat & faciat quod expetitur, & peplū cum caseo, & polenta, bibēdum dato, velut in allapsu ad latus dictum est, & ex potionibus quā maximē admiserit bibendam præbeto. Cibis autem mollissimis vtatur. & cum viro quā maximē dormiat. Si hiauerit os vterorum magis quā solet, menses plures fiunt, & deteriores, & humidiores, & per longius tempus. & genitura ipsam non contingit, neq; intus manet, sed rursus foras effunditur, & si digito contigeris, os vterorum hians comperies. & impotentia ipsam corripit præ mēsis, & febris ac rigor, & dolor tenet imum

ventrē.

A ventrem, & lumbos, ac lateris mollitudinem. patitur autem hæc maximè, si quid in ipsa fufum fuerit, & corruptum com-
 putruerit. patiuntur etiam ex partu, & aliæ aliter. Quum sic **Medela.**
 habuerit, pharmacum bibendum dare oportet, à quo sursum
 purgatur, & quum dolor habuerit, tepefactoria apponere, &
 calida lauare, & interposito tempore, per infusa colluere, ve-
 lut scriptum est in priore, & de potionibus dare quam liben-
 tissimè susceperit, & suffire quæ siccant. Edat autem polypos **Cum vteri**
 & mercurialem. Si leuigati fuerint vteri, & menses plures **leuigati fue-**
 fiunt, & deteriores, & humidiores, ac frequentiores, & genitu-
 ra intus non manet, sed rursus exit, & si digito cõtigeris, com-
 peries os leue. Et impotentia ipsam corripit præ mensibus,
B & febris ac rigor, & dolor inum ventrem, & lumbos, ac la-
 teris mollitudinē, maximè si quid in ipsa corruptum cõpu-
 truerit, & ex partu, & aliàs. Quum sic habuerit, curare opor-
 tet vbi dolor habuerit, velut scriptum est in priore. Si vteri **Medela.**
 ad ventrem nutauerint, dolor acutus & vehemens coxendi-
 ces, & lumbos, ac laterum mollitudinē habet. Et crus clau-
 dicat. Quum sic habuerit, pharmacum infra purgans biben-
 dum dare oportet, postridie verò suffire hoc modo. Ordei
 chœnices duas, & oleæ folia probè contusa, & gallam contu-
 sam ac cribratam, & hyoscyami tertiā chœnices partē. Hæc
 mixta, & olei hemina dimidia affusa, efformata, in olla per
 dies quatuor, ter in die suffito. Noctu verò lac bubulum, &
 mel, & aquam bibat, & calida lauetur. Si ad caput conuersi **Cum vteri**
 fuerint vteri, signum hoc est. Venas in naso & sub oculis do-
 lere videtur. Hanc calida multa lauare oportet, etiam in ca-
 pite, lauro & myrto in aqua incoctis, & caput vnguento ro-
 faceo illinatur, & odorata subter suffiantur, & brasicā edat, **caput ve-**
 & succum absorbeat. Si ad crura & pedes conuersi fuerint, **xant.**
 ex hoc cognosces. Magnis pedum digitis conuellitur sub **Medela.**
 vngues. Et dolor crura ac femora tenet, Quum sic habuerit, **Cum vteri**
 multa calida ipsam lauare oportet, & fomentum adhibere **crura & pe-**
 quod maximè libèter admiserit, & subter suffire graucolen-
 tia. Et vnguento rosaceo vngere. Si mulier cibum auer-
 sans vteros doleat, & febris ipsam ac rigor corripit, pep-
 pli albi quintā dimidiæ chœnices partem, & seminis vrticæ tan-
 tundem, & casei caprini rasi dimidiā chœnicem, simul cum **fastidium**
 vino vetere mollito, deinde cocta sorbenda dato. Si ex repit. **ob vuluæ**
 partu **dolorē ob**

Hippocratis Liber

partu fluxus corripit, & cibi in ventre non maneant, vuam **D**
 passam nigrā, & mali punici dulcis grana trita, & coagulum
 hœdi, vino nigro diluito ac vtitur, ita vt caseum caprinum
 deraſum, & polentā tritici torrefactam adiicias, & bene tem
 perata bibēda præbeas. Si ex partu sanguinem vomat, he
 patis fistula ſauciata eſt, & dolor ad viſcera procedit, & cor
 conuellitur. Hanc multa calida lauare oportet, & tepeſa
 ctoria quæ maximè admiserit adhibere, & aſininum lac bi
 bendum ad dies quinque dare. Poſtea verò vaccæ nigræ lac
 bibendū præbere, ita vt ſine cibo degat, ad dies quadraginta.
 Ad veſperā verò ſeſamum tritū bibat. Morbus hic eſt peri
 culofus. Si mulier diu nō concepit, menſibus apparentibus **E**
 tertia aut quarta die, alumen tritum vnguento dilutū, lana
 exceptum apponito, & per tres dies appolitū habeat. Tertia
 verò die fel bouis radito, & ramētum oleo dilutum ac ſuba
 ctum, linteo exceptum apponito. Et tres dies appositum ha
 beat. Sequenti verò cū viro coeat. Ad vterorū morbum
 ſedandum, lini ſciſſi vnā cum ſtipula pugillum tenuiter tu
 ſum, in vino albo quā iucundiſſimo per noctem madefa
 cito, deinde excolatum in ollula tepeſacito, & in eo lanā mol
 liſſimam tinctā apponito, & viciffim priore detracta aliam
 ſubdito. Si vteros purgare voles, primum quidem ordeum
 oleo imbutum in prunis ſuffire oportet. Poſtridie verò car
 nem ouillam coquere, cum ordeï decocto ſub diō per no
 ctē expoſito. Sit autem decoctum ordeï congiꝝ menſura, & **F**
 valde ipſas coquito. Vbi verò coctæ fuerint, leuiter tepidas
 edat, & iuſculum ſorbeat. Poſtridie autē thus & pulegium
 tritum, melle ſubactum & lana exceptum ad triduum ſub
 dito. Si vteri ad ſedem conuerſi fuerint, & ſecellus ſecedere
 prohibuerint, dolores habent & lumbos, & imum ventrem,
 & ilia. Quum ſic habuerit, calida ipſam lauare oportet, &
 lumbos fouere, & graueolentia ſuffire, & apponere quæ pur
 gant & impellunt ipſos vteros, & bibenda dare ea quæ ma
 ximè admittit. Si vlceratum fuerit os vterorum aut inflam
 matum, myrrham & adipem anſerinum, & ceram albam, &
 thus, in leporis pilis qui ſub ventre ſunt miſceto ac verito, &
 in lana molliſſima apponito. Si ſecundæ decedere nō poſ
 ſint, ſtatim quidem à cibo abſtinere oportet. Viticis autem
 folia trita in vino & melle, oleo affuſo tepeſacito, & hemina
 menſuram

Cum fluor
post partū
vexat.

Medela.

Sanguinis
vomitus.

Medela.

Cum diu
turno tem
pore non
conciat.

Morborū
vterorū re
medium.

Purgamēta
vterorum.

Cum vteri
ſedem pe
runt.

Cū os vte
rorum vlce
atur.

Cum ſecun
dæ decede
re non poſ
ſunt.

- A** mensuram bibendam dato. Si inflammati fuerint vteri, Cum vteri sambuci folia tenerrima in tritici recentis crassiore farina flānescunt. coquito, & leuiter tepida sorbenda dato. Si vteri transmo-
ti fuerint, hederam siccissimam tritam, & linteolo tenui illi- Cum vteri
gatam subdito, & pingue aliud nihil adhibeto. Bibendum mouentur.
verò dato triticum recens, & peplum tostum, & saluiam, & Cum men-
cyperum, & anisum. Hæc trita vino diluta cum furfuri- ses stato tē-
bus ordeï bis in die dato, pro vice dimidiam heminam. Si pore non
mensures constituto tempore non fiant, brassicæ folia & ru- fiunt.
tam terito, postea paleas ordeï chcenicis mensura madefaci-
to donec saccescant, & per noctem sub dio exponito. Ma-
ne verò in hemina inde excolata brassicam ac rutam dilui-
B to, & affuso oleo conquassato, & bibenda dato. postea poly-
pum vino albo suffocatum edendum dato, & vinum ebiben-
dum. Si verò volueris, pisces odoratissimos coctos edendos Pudenda
dato, & iusculum sorbendum. Si ex feruido & superficiali vicerata.
rio vlcere pudenda fuerint exulcerata, myrti baccis in vino
coctis pudenda colluat. Et postea mali punici dulcis putami-
na in vino coquito, & myrrham ac resinam simul mixta vi-
no diluito, & intinctum in his linteum subdito. Si vrina Straguria.
stillicidium corripiat, cucumeris siue cucurbitæ os & fun-
dum refecato, & subiecta pruna cucumim circumponito,
& inspersa in ignem myrrha, mulierem super cucumim lo-
cato, ita vt summam cucumeris partem quàm penitissimè
C in pudendum indat, quo vapor plurimus in pudenda trans-
mittatur. Et ex potionibus vrinam cientibus ieiunæ ali-
quas exhibeto. Si ad cor progressi vteri suffocent, & non Cum vteri
decedant, porri semen tritum, & pulegium, in aqua cyathis corpetunt.
tribus, & aceti albi cyatho vno, & mellis tertia cyathi par-
te diluito, tepefacito, & ieiunæ sorbenda dato. Si ex par-
tu, aut abortu, rigor corripuit iuniperi fructum & saluiam Rigor &
simul trita, in aceti albi cyatho diluito, & vini albi dilu- partu.
ti poculum affundito, versato ac stare finito. Mane ve-
rò excolato, & tepesactum bibendum dato. Si vteri infla- Vterorum.
ti fuerint, & siuentus in vtero fiat & dolor, saluiam & cype- inflatio.
rum tusa madefacito per noctem, & mane excolato, & pu-
rum cremorem in ollam fundito, tritici farina crassio-
re adiecta, & aceti albi cyatho affuso, & succi silphij ma-
gnitudine fabæ addita, & cocta crudius sorbenda dato.
Si in

Hippocratis Liber

Graueolentia in pudendis. Si in pudendis graueolentia fuerit, & columella nascatur, D. & dolor habeat, dolorem quidem sedabit apij semen ieiunæ in vino datum. Graueolentiam verò, anisum eodem modo datum. Columellam verò refecare oportet. Si vlcera fiant in pudendis, & pruritus corripiat, oleæ & hederæ & rubi & mali punicæ dulcis folia trita in vino veteri dilue, & postea carnem recentem foliis intege & appone. Et habeat subditam per noctem. Mane verò eximat, & myrtū in vino decoquat, & cum vino pudenda colluat. Si genituram non suscipiat, mēlibus secundū naturam fientibus membrana ante vteri os excreuit. Contingit etiam ex aliis causis. Cognosces autem hoc, si digitum ad moueris, membranæ prætextū continges. Ad hæc medicamentum subdititium facere oportet. E
Ulcera in pudendis. Re inam itaque & aris florem melle diluito, & linteum ex his tinctum penitissimè indito, filo ad extremā partem dependente illigato. Quum itaque hoc exiluerit, myrtum in vino coquito, & cum vino tepido eluatur. Si anhelationes corripuerint mulierem, sulphuris magnitudinē fabæ, & nasturtij tantundem, & rutam, & cuminum Aethiopicum, hæc trita & vino diluta, ieiunæ bibenda præbeto. Oportet autem & à cibis abstinere, & non frequenter edere. Si pariens inflata fuerit, hepar ouillum aut caprinum calido cinere obrutum, edendum dato meracius ad dies quatuor. & vinum bibat vetus. Si lumbos doleat, anisum & cuminum Aethiopicum bibat, & calida lauatur, & subcalidam bibat. Si menses non fiant, testam crassam exurito ac terito, & origanum F
Genituram cum non suscipit mulieri. in pinguedine anseris coctam terito, & ad testam in linteū ammisceto, ac tepida apponito. Si vteri conclusi fuerint, & menses nō apparuerint, colocynthidem syluestrem, & filphij semē, cuminum Aethiopicum, nitrum, salem thebaicū adipem rhenalem, farinam, myrrhā & resinam. Omnia hæc feruefacito: simulque mixta ac trita in glandulam efformato, & apponito. Si vteri ad viscera conuersi strangularint, vinum cedrinum, & cuminum Aethiopicum bibat, & calida lauatur, & subcalidam bibat. Si menses non fiant, adipem anseris, & netopum, & resinam, mulier lana excepta subdat. Si verò magis quàm conuenit prodeant susinum, & raix linguam, in lana apponat. Si transmoti vteri aliquò allapsi fuerint, ordeum decorticatum tritum vnā cum paleis sume, & cum

Anhelationes.

Inflatio in partu.

Lumbi dolitantes.

Menses cum non fiant.

Vteri conclusi.

Vteri cum viscera petunt.

Cum menses nō fiunt.

Vteri transmoti.

A & cum cornu ceruino vino subige, & hinc vteros suffito.

Si secundæ decedere non possint, fœniculum vino & oleo ac melle feruefactum bibendum dato. Si menses non appareant, & velis ipsos detrahare, crassiolem tritici farinam & ordeum coquito, & oleo affuso edenda dato. Si inflammati fuerint vteri, cotyledonis folia, & porrum, in crassiore tritici farina coquito, & affuso oleo edenda dato. Si moti vteri aliquò allapsi fuerint, & dolorem exhibuerint, oleæ scabiam, & lauri ac cupressi ramenta, in aqua coquito, & linteis excepta apponito.

Si vterus doleat, & ad vesicam fuerit dolor, porri semen in aqua tritum ieiunæ bibendum præbe. & tepesfactoria adhibe. Si vteri prominuerint, lotos ipsos cum aqua tepida, & vino ac oleo illitos, rursus intrudito, & ex lumbis deligato, & graueolentia suffito, & si urinam emittere non poterit, calida lauato ac foueto, & cupressi ramenta suffito. Et portiones urinam cientes bibendas dato. Si fluxus fiat, acerba suffito, & sterces asini derafum, lanæ illigatum subdito. Sit autem sterces siccum. Si in pudendis vlcera fiât, adipem bubulum illinito, & apponito, & cum vino in quo myrtus cocta est colluito. Si ex partu os vterorum fuerit exulceratum, florem rosarum tritum & vino imbutum in pilis leporinis apponito, & acerbis colluito. Si vterus doleat, allij caput integrum, & nitrum tostum, & cuminum terito, & melle subacta subdito, & calida lauatur, & subcalidam bibat. Si ex feruido ac superficiali vlcere pudenda fuerint ulcerata, adipem bubulum, & butyrum, & anseris adipem, ac fusinum vnguentum misceto, & ex his pudenda illinito, & aqua tepida colluito. Si vteri ascendentes suffocant, funiculum lucernarium accensum extinguito, & naribus admovento, quo fumum attrahat, postea myrrham vnguento dilutam, & lana excepta apponito. Et resinam oleo dilutam bibendam dato. Si secunda non secedat, conyzam tritam lana exceptam apponito, & ignem in vino tritam bibendam dato. Si caput doleat, & inum venter, & lumbos, bilis in vteris est. Huic itaque pharmacum dare oportet, quod sursum ac deorsum purgare potest, & calida lauare, & apponere quæ bilem purgant. Et anisum ac nigellam vino diluito, & bibenda dato. Si fluxus oboriat, cancrios fluuias in vino suffocato, & vinum bibendum dato, & quæ siccant suffito.

Cum secundæ non decedunt.

Vteri inflammati.

Vteri moti.

Vterus dolitans.

Vteri prominentes.

Fluxus.

Pudenda.

ulcerosa.

Os vteri ulceratum.

Vteri dolor.

Vteri ascendentes.

Secunda non secedens.

Capitis dolor.

Medicamentum aduersus fluxum.

Hippocratis Liber

fuffito & apponito. Si fluxus oboriatur, porri pugillum in D
vino tritum bibendum dato, & ficcis & acerbis vtatur. Si
fluxus oboriatur, muli sterco combustum, tusumque ac cri-
bratum, vino dilutum bibat. Reliquis autem eodem modo
vtatur. Si fluxus oboriatur, & iam diuturnus fuerit, spon-
giam combustam ac tritam, vino odorato dilutâ, bibendam
dato, & per fuffitus reficca, & quæ restringunt appone. Si
vteros purgare velis, nitrum, cuminû, allium, & ficus terito,
& melle subacta apponito, & calida lauetur, & subcalidâ bi-
bat. Si vteros doleat, cyclamini radicē in vino ieiunæ bi-
bendam dato, & calida lauetur, & subcalidam bibat. Si lac
extinctum fuerit, reliqua quidem eodem modo curato, fœni-
culi verò semen bibendum dato, & radices fœniculi decorti- E
catas, ac butyrû simul coquito. Quum autem cocta fuerint,
frigefacito ac bibenda dato. Commodum est etiam hyppo-
marathrum & hipposelinû simul coctum. Si lac extinctum
fuerit, porrum tritum aqua dilutum bibendum præbe, & ca-
lida lauetur, & porrum ac brasicâ edat, simul coctis Cytisi
foliis, & succum sorbeat. Si lac extinctum fuerit, saluiam,
cedri aut iuniperi baccis adiectis coquat, & ad diffusum, vi-
num affundat, ac bibat, & ad cætera farina inspersa additô-
que bulbo, & modico oleo affuso, edat. Et acria, & acida, &
falsa, ac cruda olera omnia vitet. Nasturtiû verò in vino po-
tum commodû est. Nam lac purgat, & calida lauetur, & sub-
calidam bibat. Si velis mulierem prægnantem fieri, ipsam
& vteros purgato, postea farinam ieiunæ edendam dato, & F
vinum meracum insuper bibendum, & nitrum rubrû, cumi-
num, ac resinam, melle subacta in linteo subdito, & vbi aqua
defluerit, nigros pessos mollitorios apponat, & cû viro dor-
miat. Si prægnantem facere voles mulierem, ipsam & vte-
ros purgato. Deinde lintheum tenuissimum reficcatum, ac
melle imbutum in glandes efformato, & in fici succo tin-
ctos apponito, donec fuerint aperti. Postea verò magis
intrudito. Vbi autem defluerit aqua, vino & oleo colluta
cum viro dormiat. Bibat autem & pulegium in vino cedri
no, quum viro condormire volet. Medicamentum fœtum
ex vteris pellens. Cucumeris syluestris succum potionis
mensura, in mazam conspersum apponito, vbi ad duos dies
antea ieiunauit. Aliud. Staphidis syluestris pugillos
duos

Vteri pur-
gatio.

Vteri do-
lor.

Lactis ex-
incti reme-
dia.

Vt mulier
prægnans
fiat.

Vt fœtus
ex vtero ex-
pellatur.

A duos, in aqua mulsa dilutos, bibendos dato. Experimentum fœcūditatis. Caput allij integrum deraſum vteris apponito. Poſtridie vero digitum immittat, ac cōtingens conſideret. & ſi quidem oluerit inde os, bene habet: Sin minus, rurfum apponat. Aliud experimentum. Netopum modicum in lana inuolutū apponat, & conſideret an per os oleat. Alia ſubditicia medicamenta. Scorpij marini fel, in lana inuolutum, & in vmbra ſiccatum apponito. Pulegium ſiccum tritum, melle imbutum in lana apponito. Cucumeris ſylueſtris ſemen, & teſtam combuſtam, vino ſubactam, cum pilis leporinis, in lana ſubdito. Alumen Aegyptium, lana inuolutum apponito. Cantharidas vino ſubactas, in lana ſubdito. **B** Herbā artemiſiam vino ſubactam apponito. Nigellam in vino tritam, in lana ſubdito. Aliud ad recens enixam. Vnguentum roſaceum & ceram, in lana apponito.

Bulbion ex tritico, tritum & vino ſubactum in lana ſubdito. Vini albi veteris fecem combuſtam, & in vino albo extinctam ac tritam, in lana apponito. Galbanum, netopum, & miſy, cum vngueto roſaceo, in linteo apponito. Elaterij portiones duas, & fauum cum vino, in linteo apponito. Butyrū & alumen melle ſubactum, in linteo ſubdito. Scammonia ſuccum, & adipē, cum maza miſceto, & vino imbuta, & linteo apponito. Si concipere nolit, miſyos fabæ magnitudinem aqua dilutam bibendam dato, & per annum non concipiet. Si periculum facere velis in muliere, an prægnans ſit aut nō, rubro lapide ſive terra erythrea oculos ſublinito. Et ſi quidem ingrediatur pharmacum, prægnans eſt, ſin minus, non. Si prægnati pudenda feruido & ſuperficiario vlcere fuerint exulcerata, amygdala trita, & medullā bubulā in aqua coquito, & modica farina adieſta, pudenda illinito. & baccarum myrti decocto colluito. Si virgo ex lapide laborarit, ſemen radicis Aethiopicae, in vino veteri ad dies decem dato. Deinde in aqua ad dies viginti, & bis in die multa calida lauato. Cataplaſmata. Allium, portulacum, apium, loti & cedri ramenta, trita ſimul mixta aqua mulſa diluito, & cataplaſma hinc factū imponito. Rubi folia, myrti folia, ſimul trita aqua mulſa diluito, & polenta ammixta ſubacta imponito. Sābuci folia, myrti folia, terebinthi folia tenerriſima, eodē modo apponito. Loti ramenta, mori folia, ſimul

Ne concipiat mulier
An conceperit experimentum.
Pudenda ſi vlceroſa ſint.

Hippocratis Liber

simul trita mixta, aqua diluta cum vua passa imponito. Suf- **D**
 fitus. Ouiculæ aut capræ cornu tusum, & ordeum tostum
 ac fresum, oleo subigito ac suffito. Cerui cornu, & oliuas
 nondum habētes oleum, simul trita mixta suffito. Rhoem
 rubrum, & polentam tostam, oleo subigito ac suffito. Po-
 lentam, & stercus bubulum, & paleas, oleo subigito ac suffi-
 to. Loti ramenta, & rhois folia, & cupressi siccæ ramēta,
 vino nigro austero subacta suffito. Galbanum, mannam, &
 resinam vnguento subacta suffito. Capræ cornu, & gallā,
 & adipem suillum, & cedriam suffito. Terram ex asinorū
 pedibus deradito, ac stercus asininum, cum vino nigro subi-
 gito ac suffito. Collutiones. Folia myrti, & lauri, ac he-
 deræ in aqua coquito, & cum hac tepida colluito. Rhois, **E**
 & mali punicæ, ac rubi folia, in aqua mulsa coquito, & cum
 ea excolata colluito. Sambuci & lentisci folia in aqua co-
 quito, & excolatam leuiter tepidam infundito. Fœniculi,
 & brassicæ radices tufas in aqua coquito, oleo affuso, & post-
 ea cum excolata colluito. Oenanthen, & cyperum, & vuas
 passas, in aqua mulsa coquito, ac colluito. Malagmata.

Maluam & fœnogræcum in aqua feruefacito, & cum ex-
 colata aqua leuiter tepida colluito. Cupressi ramenta &
 amaracū, in passo aqua temperato coquito, ac colluito. Ser-
 pillum & violæ albæ radicem, in aqua mulsa coquito, ac col-
 luito. Hypericū, & lentiscum, & baccas cedri in aqua co-
 quito, & cum leuiter tepida colluito. Fauum, & butyrū, &
 resinam, & adipem anserinum, in aqua coquito, & colluito. **F**

Fomenta. Lolium tostum ac molitum, in posca meracio-
 re coquito. Postquam autem coxeris, linteo illigato, & foue-
 to. Lentem tostam, decorticatam, & in farinam crassiorē
 alicæ similem redactam, in aqua coquito, & linteo illigato,
 ac foueto. Eruum eodem modo parato, ac foueto. Com-
 moda est & saluia eodem modo parata. Saluiam & hype-
 ricum in aqua coquito, & ordeï paleis in decocto coctis, &
 linteo exceptis foueto. Loti & cupressi ramenta in vuæ pas-
 sæ cremore coquito, linteoque ipsa illigato ac foueto. Olea,
 & myrti, & hederæ, & lauri folia, in aqua coquito, & in deco-
 cto, ordeï paleas coquito, deinde linteo illigato, ac foueto.

Cupressi ramenta & cedri, & ordeï fursures, simul misce-
 to, & in vuæ passæ cremore subigito, ac panem formato, &
 cum

A cum hoc affato, calido in linteum alligato, foueto. Violæ albæ semen, aut radices, in aqua coquito, & cum aqua furfures tritici subigito, ac panē formato, cum quo calido in linteum inuoluto, foueto. Serpillum in aqua coquito, & furfure triticeo in aquam coniecto, eodem modo foueto. Spōgias calefacito & adhibeto. & cum mollibus lanis, & panniculis laneis, & vasis testaceis aqua infusa, & vtriculis eodem modo, & decoctionibus in vtres infusis foueto. Purgatorium.

Si mulierem parere non potentem, facere velis vt prægnans fiat, considerare oportet in mensibus, an biliosa aut pituitosa sit: cognosces autem hoc, arena tenui sicca ad solem conspersa, & quum menses prodierint, sanguine super arenā in sole effuso, ita vt ipsum siccari sinas. Si enim biliosa fuerit, sanguis super arenam siccatus, pallidus fit. Si verò pituitosa, velut mucus existit. horum igitur vtrum tandem fuerit, ventre purgato, siue sursum siue deorsum purgatione opus habere visa tibi fuerit, postea paucis diebus interpositis, vteros purgato. Vterorum fomenta. Si duri fuerint vteri, & non Vteri cum
duri fue-
runt. concipiat, Vinum quā iucūdisimum cum pari aqua temperatum, trium semicongiarum Atticorum mensura, & fœniculi radices, & seminis fœniculi quartam partem, & vnguenti rosacei semiheminam. Hæc in vas nouum fundito, & vinum affundito. Vasis autem operculum perforato, & imposita arundine foueto. Arundinem verò cum operculo tollito. Si enim sine operculo abstuleris, exuretur. Postquam autem fota fuerit, scillam apponito, velut infra scriptum est.

C Apponito autem donec dixerit molle & amplum esse vterorum osculū, & si quidem exulcerata fuerit, & pustulæ in purgatione fuerint, si summa labia vlcerata fuerint, anisum, & adipem anserinum, in rosaceo oleo terito, & in lana inuoluto & accepta carne bubula, magno pedis digito crassiore, sed digitorum longitudine, ipsam pharmaco illinito. & lana exceptam inuoluto. & ad extremā carnis partē quæ foras spectat filium alligato, & reliquā in vteros indito, vbi est vlcus. Mensium purgatoria. Si non procedat mēstrua purgatio, cucumeris syluestris internā partem pondere trium obolorū, & artemisiā herbam, & thuris obolum terito, & ammixto melle in lana inuoluto, & ad os vteri opponito, quinquies in die hoc faciens. Aliud. Vitem viridem terito, & melle am-

H

mixto

Hippocratis Liber

mixto lana excipito, & eodem modo apponito. Aliud. D

Cupressi fructum, & cucumeris sylvestris internam partem, & thus, terito & melle ammixto lana excipito, & eodem modo subdito. Aliud. Cupressi fructum & thus terito, & melle ammixto lana excipito, ac subdito. Aliud. Abrotani obolos tres, cum melle lana excipe, ac subde. Aliud. Elatherij obolum, & myrrhæ obolum terito, & cum melle lanæ inuoluto, ac subdito. Purgatorium si mulier non concipiat.

Cū mulier
nō cōcipit.

Tauri urinam collige trium heminarum mensura. Deinde artemisiam herbam, aut parthenium, aut adiantum & laurum viridem, & cedri ramenta simul contunde. Deinde in effusa serobe carbones accēde, & imposita olla urinam tauri infunde, & contusa in mortario adice. postea fellā cirtauri impone, & muliere super hæc collocata, donec sudet foue. Vbi verò sudarit, laua cum calida. & in lauacrum artemisiam & laurum immitte. Deinde subdititium medicamentum adhibe. Aut artemisiam, aut bulbium in vino albo tritum lanæ inuolutum subdat. Hæc ad tres dies faciat, & deinde cum viro dormiat. Subdititium pharmacum ad conceptum faciens. Ex nitro & thure, cum melle glandem formato, & apponito. Aliud purgatorium molliens. Caricam coquito donec granula abiiciat, & hæc expressam leuissimè tritam in lana cum rosaceo vnguento apponat. Aliud acrius. Brasicæ, rutæ, pares portiones tere ac vtere eodem modo.

Aliud molle & purgatorium. Medullam anseris, aut bouis, aut cerui, magnitudine fabæ, affuso vnguento rosaceo & lacte muliebri terito, velut molle pharmacum teri solet. Deinde ex hoc os vteri illinito. Aliud tepidum purgatorium. Anseris medullam magnitudine nucis, resinæ lētissimæ aut terebinthinæ magnitudine nucis. Hæc in vnguento rosaceo ad lentum ignem liquefacito, & velut ceratum facito. & deinde ex hoc tepido os vteri illinito, & pectinem madefacito.

Aliud detrahens purgationem & sistens. Pæoniæ grana nigra aut rubra, tria aut quatuor in vino trita bibenda dato. Si verò magis detrahere voles, grana nigra eodem modo trita bibenda præbeto. Aliud purgans ac detrahens.

Lauri baccas ad summum viginti, & seselis dimidium acetabulum, cum vino trita bibat. Aliud. Tauri fel trium dimid

Adimidiorum obolorum Atticorum pondere, in vino ieiuna bibendum dato. Et efformata quoque ex ipso catapotia deuoranda dato. Aliud. Farinam recentem, myrrhae obolos tres, croci tantundem, castorij obolum, Hæc cum vi. gueto rosaceo trita apponat. Aliud purgatorium. Semen vriticæ, & maluæ succum, cum adipe anserino tritum subdat.

Aliud. Si non purgata fuerit ex partu, floris farinae quantum tribus digitis comprehendi potest coquito, & melle affuso, ventri velut cataplasma imposito, & bibendum dato.

Aliud quod vteros aperit & purgat. Cantharidas quinque aceto albo affuso terito, & non valde liquidum pharmaceum facito, sed vt digitis effingi possit, & de ficu alba pingui, sine granulis & pelle, duplam cantharidum partem amisceto, **B** & efformatam glandulam tenui lana inuolutam subdito.

Aliud. Si ex partu non fuerit purgata, trifolium in vino albo bibendum dato, hoc etiam menses educit, & fœtus expellit. Aliud purgans vteros. Quum puero immortuo sanguis intus manserit, colocynthidem syluestrem in melle tritam delingat, aut subdat. Aliud sanguinem purgans.

Sanguinem ex vteris expelles, si violæ albae semē tritum, vino dilutum bibendum dederis. Aliud quod similiter sanguinem ex vteris expellit. Rhœis seminis quum rubrum fuerit, grana viridia triginta terito, & rosas caninas, rubras rubicundo ex ipsis delecto, in vino bibenda dato, quum sanguis eruperit. Aliud purgatorium. Si menses non apparuerint, styracem & organum terito, commisceto, & adipe anserino affuso apponito. Aliud quod subditum vteros purgat ac euacuat. Absinthij radicem tritam cum melle, cum oleo apponito. Subdititia vteros purgantia, aperientia, & aquam ducentia. Scillæ frustum longitudine sex digitorum, & digiti parui crassitudine accipito, & de hoc duos digitos circunderadito ac leuigato, & reliquum lana sordida inuoluito, eam verò partem quæ circumrasa est ad os vterorum subditā, per diem ac noctem appositā finito. Postquam autem lauit & abstulit, aqua odorata colluatur. Aliud purgatorium molle, quod aquā & pituitam ducit, & pallidos ac horū medicamentum **C** subcruentos menses detrahit, si non diuturni fuerint, & os emollit. Vnguentum narcissinum, cuminum quod edimus, myrrham, thus, absinthiū, cupressum, salem, rosaceū oleum

Hippocratis Liber I.

sumito. Et de aliis quidem singulis congiuntum accipito, narcis^D fini verò partem quartam, & omnia in glandem efformata, ac crudi lini linteo excepta subdito, aut linteum tenue pen-
næ circumdato ac deligato, & in oleo albo Aegyptio tinctum
apponito, & tota die appositum finito. Deinde ubi lauit & ab-
stulit, aqua odorata colluatur.

H I P P O C R A T I S

COI DE MORBIS M V-

LIEBRI BV S LIBER PRI-

M V S, I A N O C O R N A.

R I O M E D I C O P H Y-

S I C O I N T E R-

P R E T E.

Cur mulie-
res crebrius
laborant,



Quæ puer-
peria facile
decurrant.

Cur steri-
les magis
afficiantur.

E muliebribus morbis sic sentio. Mulierem
quæ non peperit grauius & citius è mē-
sibus agrotare, quàm eam quæ peperit. Quum
enim peperit venulæ fluidiores sunt ad mē-
ses. Fluidas autem ipsas facit purgatio illa
quæ fit à partu. Et ubi hæc erumpit, vicina
maximè ventri ac mammis corporis partes discinduntur.
Discinditur item reliquum corpus, à quo verò hoc fiat, dictū
est à me in natura pueri in partu. Discisso autem corpore ne-
cesse est venas magis aperiri, & ampliores ac fluidiores ad
menses fieri: itēque vteros magis aperiri, nimirum puero
per ipsos egresso, qui & vim & dolorem induxit, & quū hæc
sic se habeant, mulier purgationem à partu experta, minus
laboriosè mē-
sibus decurrentibus purgatur. Si verò etiam
affectio aliqua mulieri quæ iam peperit accadat, vt menses
venientes probè purgari non possint, facilius dolorem feret,
quàm si nō peperisset. Assueti enim sunt vteri, & corpus ido-
neum vt impleatur, vtpote in ventre habenti, & simul multa
amplitudo in corpore est. Maior autem fit etiam amplitudo
ubi peperit, nimirum corpore discisso, & corpus in amplitu-
dine

A dine existens minus dolore affigitur, si non venæ superim-
plentur, & nimium doleant. At verò ei quæ non peperit,
quum corpus non assuetum sit, si impleta fuerit, & fortius ac
solidius & densius sit, si purgationem à partu experiatur: &
quum vteri ægrius aperiatur, menses laboriosè prodeunt,
& affectiones plures accidunt: vt propterea menses obturen-
tur, si prius non peperit. Habet autem res se hoc modo, velut
etiam prius à me dictum est. Dico mulierem rariore car-
ne præditam & teneriorem esse quàm virum. & hæc res sic
se habet. à ventre trahit humiditatem, & citius, & magis,
corpus mulieris quàm viri. Etenim si quis super aqua, & per **Exemplo**
regionem aquosam, duobus diebus ac duabus noctibus, mol **cōprobat.**
les lanas ponat, & vestem puram & contextam æquali ad la-
B nas pondere, sublatis vtriusque apponderatione facta, multo
graviore lanas comperiet quàm vestem. Fit autem hoc ex
eo quod semper ab aqua sursum decedit in vasa ampliora of-
cula habentia. & lanæ quidem tanquam raræ & molles, ex
decedente amplius suscipiunt. Vestis autem vt quæ plena
est & ex contextu obturata, explebitur, non multum ex dece-
dente aqua suscipiens. Sic sanè etiam mulier, velut quæ ra-
rior est, ampliorem à ventre humiditatem corpori attrahit,
& citius quàm vir. & tanquam teneriori carne prædita mu-
lieri, vbi corpus sanguine repletum fuerit, si non ab ipso se-
cesserit, carnibus impletis ac calefactis, dolor oboritur. Ha-
bet enim mulier sanguinem calidiorem, & propterea cali- **Cur mu-**
dior est quàm vir. Si verò amplior accedens sanguis recene- **lier cali-**
rit, dolor non fit à sanguine, neque calor. Vir autem vt qui so- **dior sic**
lidior carne præditus est quàm mulier, neque in superna **quàm vir.**
ventris parte adeò sanguine superimpletur, vt nisi aliquid
sanguinis singulis mensibus secedat, dolorem fieri necesse
fit: & sanguinis quantum satis est ad nutrimentum trahit: &
quum corpus ipsi non sit tenerum, non dolore affigitur, ne-
que superincalescit à plenitudine, velut mulieri. Multum
autem confert ad hoc viro, quòd magis laborat quàm mulier.
Nam labor aliquid humoris abducit. Postquàm igitur mu-
lieri quæ nō peperit, occultati fuerint menses, & viam foras
reperire nō potuerint, morbus fit. Hoc autem cōtingit, si vte **Vteri inue-**
rorum os cōclusum fuerit, aut distortum, aut aliqua pudēdi **sio.**
pars cōtracta. Si enim horum quid fuerit, menses exitum inue-

Hippocratis Liber I.

nire non poterūt, priusquā vteri ad sanā naturā redierint. **D**
 Fit autem hic morbus his maximē, quā angustos vteros ha-
 bent, aut cervicem vltra pudendū sitā. Si enim horū alterū
 fuerit, & mulier viro non milceatur, & venter magis quā
 oportet euacuetur, ab hac affectione vteri obtorquentur.
 Neq; enim humidi in seipsis sunt, vtpote muliere nō coeun-
 te: & amplitudo ipsis spatiosa est, vtpote quū venter magis
vacuus existat. Quare obtorquetur, dum sicciior & leuior est
 venter quā cōuenit, & aliquādo dum ipsi obtorquetur, etiā
 os ipforum distorqueri cōtingit, nimirum cervice vltra pu-
dendum sita. Si enim humidi fuerint vteri, à coitu, & venter
 non euacuetur, non facile distorquentur. Hæc igitur causa
 est vt ipsi sint conclusi, nimirum à venere abstinēte muliere. **E**
 In tertiis porrò mensibus optime afficietur, si quæ prius in-
 sunt progressa fuerint educta. Sin minùs, mulier hæc patie-
 tur. Suffocatio aliàs atque aliàs in ipsa irruet, & febris aliàs
 atq; aliàs corripiet, ac horror, & lumborum dolor, hæc patie-
 tur in tertiis mensibus, si ipsi non prodierint. In quartis verò
 si non egressi prioribus exitū fecerint, etiā tunc tertij mensis
 afflictionibus omnibus magis affligetur, & maximē tēpore
mensium. Deinde minùs. Sæpè verò etiā à dolore libera sibi
 esse videbitur. Erunt autem in quartis etiā hæc signa. Vri-
 nam multam ac crassam eiiciet, aliàs atque aliàs. Et venter
 ipsius durus erit, & maior quā prius, & dentibus fremet, &
cibū auersabitur, & vigilabit. Hæc patietur in quartis men-
 sibus. Si verò curetur, etiam in his sana euadit. Et in quintis **F**
 si non multi menses descenderint, dolor adhuc fortior acci-
 dit. In sextis verò iam incurabilis est. & iuxta priora quidem
 signa magis dolebit. Deinde ad ea etiam hæc aderunt. Anxia
 erit, & aliàs atq; aliàs seipsam iactabit, & animo deficiet, &
 pituitam vomet, & sitis fortis ipsam corripiet. Nimirū dum
 exurit venter ab vteris sanguine plenis, & ad contactum
 dolebit, maximē pectinem. Et aliàs atque aliàs acutè fe-
 briet, & vteri aliàs atque aliàs murmurabunt, dum videlicet
 sanguis in ipsis commouetur ac discurret, & venter consueto
 modo non secedet. Neque vesica urinam excolabit, maximē
 quū vteri ad stomachum qui neruosus est, mulieri allapsi
 fuerint, & ad ventrem irruerint, dolet spinam, & totum dor-
 sum, & lingua ipsius refrenatur, & hanc nō claram habet, &
 animi

Menses din-
 tius remo-
 rati quid
 agant.

Menses sex
 mēibus re-
 tenti nō ha-
 bent mede-
 lam.

A animi deliquium adest. Aliquibus etiā vocis priuatio, & stomachus mordetur, & flaua bilis exit, & spiritus offendens, & anxia est, & iactat seipsam, & ardet. Postquam autē transmutati fuerint, & vesica tenuem sanguinē ab uteris trahet, tunc vrina mingitur rubra, Et dolet quidē reliquū corpus, maximē verò collum, & spinam, & lumbos, ac inguina. Et ipsi ad hoc progressi, & venter attollitur, & crura supra modum intumescunt, & tibiæ ac pedes, & mors succedit. Et circa hāc quidem sic finiunt menstruæ purgationes ad sex menses occultatæ. fiunt item hęc. Quibusdam mulieribus menses bimestres in uteris existentes multi ad pulmonem procedunt, & vbi recepti fuerint, omnia patiuntur quæ in tabe dicta

B sunt, & non est possibile ipsam superesse. fiunt & hęc. Quibusdam suppurati fiunt menses, vbi per duos aut tres menses moram traxerint. Hoc autem maximē fit, si à febre fuerint combusti. Signa verò sunt si suppurati fuerint, dolores enim incidunt in pectinem, & pulsationes fortes, & contactum nō sustinet, & si melius habitura est, menses ipsi erumpunt in pudendum, & procedit pus ac sanguis, & procedit graueolens, ad septem, aut octo, aut nouem dies. In priore verò tempore dolet velut dictum est antea. Postquam autem depurgata fuerit, optimum quidem est si non fiant vlcera. Si verò relinquantur vlcera, ampliore curatione opus habebit, quo vlcera non putrescant, & graueolentia fiant. Sterilis autem euadet, etiam si melius habebit, vbi magna vlce-

Mensium varius affectus.

C ra fuerint quæ in uteris facta sunt. Si verò non contingeret, non in pudendo menses ipsi in pudendum procedant suppurati facti, ad partes supra inguen, iuxta lateris mollitudinem erumpent, circa tuberculum, vt pote pure rupto, & illa parte purulenta graueolentia procedent, & si hoc fiat, mulier non superstes manet. Si verò etiam superstes maneat, semper sterilis erit. Hac enim parte de cætero via fit mēlibus vt foras prodeant. Nam os uterorum ad hunc locum allapsum est. fit & hoc.

Menses cum in pudendo procedunt.

Quibusdam vbi bimestres aut trimestres aut diuturniores fuerint menses, & ad lateris mollitudinem allapsi fuerint, quum non suppurati sint menses, velut tuberculum fit supra inguen, sine capite, magnum, rubrum, & vulgus medicorum ignarum quid hoc esset, iam sepe secuerunt, & sic in periculum induxerunt. Cæterum id quod velut tuberculum

Cum vterus extuberet.

lum fit, tali modo fit. Fruitur sanguine caro ipsa, utpote osculo vterorum lateris mollitudini adiacente, & impletur caro ab ipso, & insurgit ac eminet, velut sanguine repleta. Et aliquando si transmotum fuerit os vterorum, & ad pudendum conuersum, & menses processerint per pudendum, id quod circa lateris mollitudinem eminuuit sedatur. In vteros enim distribuitur, hi verò foras laxantur. Si verò non conuersum fuerit os vterorum ad pudendum, circa lateris mollitudinem suppuratur, & hac parte transitus fit mensibus, & eadē pericula sunt, quæ prius sunt relata. Sed & ad vomitum conuertitur, & quibusdam in sedem, velut in virginum morbis à me dictum est, & signa & dolores eosdē ostendit, quos isthic retulimus. Ad hanc viam minus faciunt menses mulieribus

Signa mensium non defluentium.

Medela.

Vterorum
vulnera.
Vterorum
vuln morbi.

quàm virginibus. Quum menses fuerint occultati, dolor habebit in vtero, & onus quoddam incumbere videtur, & lumbos & laterum mollitudinem mirum in modum dolet. Si verò omnino non procedunt, præ morbo aut crassi & viscosi, aut glutinosi fiunt. Primum igitur venter purgare oportet sursum ac deorsum. Deinde vteros subditio medicamento, à quo sanguis purgatur. Atque ita quiescere, & potandum dare pharmacum, à quo sanguis prodeat. Bibat etiā Crethmon in vino tædaceo. Si verò fluxus ipsi non fiat, continget ut prægnans esse videatur, & dum cum viro coit doleat, ut putet quid incumbere, & grauitas sit in ventre, & venter prominet, & desiderijs similibus afficitur, velut in ventre habeat, & stomachi dolore afficitur, maximè ubi quinquaginta dies præterierint, Et dolor aliàs atque aliàs habet venter, & partem circa umbilicum, & collum, & inguina, & lumbos. Et postquam menses duo aut tres præterierint, quandoque menses aceruatim ipsi in pudendum erumpunt, & quæ prodeunt velut carnem esse putat, quemadmodum ex fœtus corruptione & nigra. Quibusdam etiā vulnera fiunt in vteris, & opus habent diligenti animaduersione. Multis verò contingit ut putent se sex mensibus in vtero habere, aut etiā paulo breuiore tempore, & venter prominet, & alia sibi fieri putat, velut in ventre habenti. Postea sunt & quibus suppurati eruperunt supra inguen, simul cum quinto aut sexto mense, & viam ea parte patefecerunt. Quibusdam autem vulnera fiunt in vteris etiam infra sub inguine, & periclitatur mulier

Alier de vita. Si verò etiam superstes maneat, sterilis erit. Quibusdam etiam in pudendum erumpunt, & prodeunt ipsi putrefacti ac purulenti. Et ab his vlcera fiunt in vteris, & periclitatur. Et oportet vt ne antiqua fiant vlcera, cum attentione mederi. Sterilis autem & hæc fit, etiam si fuerit curata. Si verò nō eruperint menses sex mensibus intus cōclusi, omnia patietur velut ea quæ non peperit, in qua menses viā inuenire non possunt. Et si quidem curata fuerit, sana erit. Sin minus, etiam ad octo menses durans moritur. Multis verò contingit, vt menses pituitosi ad multum tempus prodeuntes, etiā pauciores sanis sint, sana autem talis fit, si cōuenienti cura fuerit sanata. Si verò menses mulieri prodeant quidem, verum pauciores quàm conuenit, vtpote osculo vterorum paululum à pudendo emoto, aut nuper cōcluso ad hoc, vt prodeant quidē, verum obturentur ab ipsis etiā transitus, per quos penetrant vbi ad vteros descendunt: moderati sanè paulatim prodeunt, sanguine semper perfectè osculo incumbente. Et postquam dies præterierint quibus purgari solet, & conclusus fuerit sanguis in vteris relictus, & alij menses subdescendentes non expulerint conclusum sanguinem, sed semper paulatim grauant, & primis mensibus duobus aut tribus non valde prodeunt. Postquam autem plures menses præterierint, adhuc magis dolebit, & non habet in ventre, quàm diu sanè sic habuerit, & febris corripit ipsam debilis, maximè in diebus quibus purgari solet. Verisimile est autem & in intermedio tempore ipsam febrere, & horrere, & stomachi dolore vexari, & ad multitudinem addere singulis diebus. Et dolet aliàs atque aliàs corpus, & maximè lumbos, & spinā, & inguina, & articulos manuum ac pedum. Verum his locis non simul dolet, sed aliàs atque aliàs, qua parte sanguis discretus, & in vteris esse non potens impetu suo grauaret, & qua sanè corporis parte incubuerit, tumor, est fitq; etiā conuulsio fortis articularū corporis. Et aliàs aliud ex relatis antea signis ipsi apparet. Hæc siquidem iuxta debitū modum curata fuerit, sana euadet. Sin minus, morbus septimestris aut diuturnior factus, lethalis fuerit, aut claudā faciet, aut partes aliquas impotētes efficiet, si præ rigore & cibi fastidio, sanguis circa neruos compactus fuerit, quencunq; neruos cōtandem locum occupauerit. Hic autem morbus magis fit

Cur sanguis circa neruos cō-

H 5

his

Hippocratis Liber I.

his quæ virum non habent. Si verò hi morbi iam relati, aut D
 quicunque postea referentur, incidant in eam quæ partum
 non sit experta diuturniores erunt, & minus dolorosi. Verùm
 signa eadem, & iidem fines, tum ei quæ non peperit, tum ei
 quæ puerperia experta est, contingunt, si nō curentur. Opor-
 tet autem statim curationem facere. Sin minus statim com-
 parent morbi. Si verò menses plures quàm oporteat pro-
 deant, & crassiores: Nimirum corpore natura fluido exi-
 stente, & osculo vterorum prope pudendum sito, & ad hæc
 multo cum viro coitu vtatur, & conuiuetur, semel aliquan-
 do multi descendentes, & cumulatè prodeunt, os vterorum
 & impetu suo magis dilatant. & si ad hæc non incidat vasorum
 euacuatio, sed rursus multus accesserit calor, & os amplum E
 faciunt, & corpus: vt pote dum conuiuante & voluptatem ac
 consuetudinem viri consecretante muliere, facili fluxu ad vte-
 ros etiam calor defertur, & decolor erit quàm diu sic habue-
 rit. & si postea morbus aliquis aut affectio inciderit, vt cor-
 pus affligatur, & vteri similiter iuxta solitum morem ampli
 sunt, & corpus facili fluxu in ipsos præditum est. Et post hæc
 febris habet, & cibum auersatur, & anxia est, & tenuis ac de-
 bilis. & lumbos ex mensibus dolebit. & progressu temporis
 si non curata fuerit, omnia ipsam magis affligent in inter-
 medio tempore. & periculum ipsi imminet, ne sterilis fiat,
 aut à tempore & morbo vexata, si alius morbus coincadat,
 ex hoc moriatur. prodeunt autem menses crassiores & plu-
 rimi, in intermediis diebus. Incipientes autem & desinen- F
 tes, pauciores & tenuiores. Moderati verò sunt menses
 prodeunt in omni muliere si sana sit, vt duarum hemina-
 rum Atticarum mensura secedant, aut paulo plures, vel pau-
 ciores. atque hoc ad duos aut tres dies. Longius autē tem-
 pus aut breuius, morbosum & sterile est. Coniectare por-
 rō oportet mulieris corpus inspiciendo, & interrogare col-
 latione ad priora facta, an semper morbosa viuat, aut non.
 Si enim pauciores aut plures dies quàm solent prodeant, aut
 ipsi pauciores aut plures fuerint, morbofi sunt: Nisi natu-
 ra ipsa morbosa & sterilis fuerit. Si verò hoc fuerit, & ad sa-
 lubriorem statum transmutatur, melius est. procedit autem
 sanguis velut à victima, & cito congelatur si sana fuerit mu-
 lier. Quibus verò in natura est, vt plures quàm quatuor dies
 purgen

Cur mul-
 tz purga-
 tiones men-
 struæ &
 crassæ de-
 fluant.

Mensium
 modus &
 qualitas.

- A** purgentur, & menses valde multi prodeunt, hæc tenues sunt, & foetus ipsarum tenues, & emarcescunt. Quibus autem purgatio infra tres dies fit, aut pauci menses secedunt, hæc crassæ sunt, & bene coloratæ, virilèsq; ac partus immemores, & neque concipiunt. Si suffocatio derrepente accesserit: fit autem maximè his quæ cum viris nõ coeunt, & senioribus magis quàm iunioribus. Leuiiores enim vteri ipsarum sunt: fit autem potissimùm tunc, vbi mulieri vasa euacuata fuerint, aut plus solito laborarit: resiccati à labore vteri cõuertuntur, vt qui vacui sint ac leues. Est enim ipsis locus spaciosus vt conuertantur, vtpote vêtre vacuo existente. Dum autem cõuertuntur, impetunt hepar, & iuxta consistunt, & ad præcordia irruunt. Currunt enim & progrediuntur sursum ad humiditatē, tanquā à labore magis quàm opportunū est resiccati. Hepar autē humidum est. Postquā autē impetierint hepar, suffocationē faciunt, derépente perspirationē circa ventrē intercipientes, & aliquādo simul incipiunt hepar impetere, & à capite pituita defluit ad præcordia, velut ab eo quod suffocatur, & aliquando simul cū pituitæ defluxu, descendunt ab hepate ad locum suū, & cessat suffocatio. Descendunt autē detrahentes humiditatē, & grauati. Stridor autē ab ipsis fit, dum ad suā ipsorum sedem procedunt, postquā autem eò deuenerint, aliquando venter post illa humidior fit quàm superiori tēpore. Laxatenim iam caput pituitam in ventrem. Vbi verò apud hepar & præcordia fuerint vteri, & strangularint, mulier albas oculorum partes subuertit, & frigida fit. Sunt autē & quæ liuidæ fiunt.
- C** Quædam etiam dentibus frēdunt, & saliuæ ad os fluunt, & similes sunt his qui ab Herculeo morbo detinentur. Si verò diutius moram traxerint vteri apud hepar & præcordia, mulier strāgulatur. Quādoq; verò vbi mulier vasa euacuata habuerit, & insuper laborarit, vteri cõuersi ad vesicæ stomachū allabuntur, & vrinæ stillicidium inducunt. Aliud autē nihil mali habet, & curata citò sanescit, quandoq; etiam sponte. Quibusdam verò ex labore aut inedia, ad lumbos aut ad coxas allapsi, dolores exhibent. Si mulier corpore male habuerit, & menses biliosi prodierint, ex hoc probè cognosci liosi possunt. Nigri sunt valde, quandoque verò nigri aut splendidi, & paucissimi prodeunt, & citissimè congelantur, & semen amborum, & maris & foeminæ euanescit, & non habet

Suffocatio
nis vuluæ
caussa quæ-

Menses bi-

Hippocratis Liber I.

Febres erraticæ.

Cum femina corpus male habet menses minores defluunt.

Profluviorum consuetudo.

Vterorum vlcera.

habet in ventre, & incipiente quidem morbo, purgatur diebus quibus solita fuit, non pluribus, progredientibus autem mensibus, pluribus diebus purgatur, & menses pauciores singulis diebus apparent. Et febres succedunt erroneæ acutæ, cum horrore & cibi fastidio aliàs atque aliàs, & stomachi dolor, & dolebit maximè ubi menses ipsi appropinquarent. Postquam autè purgata fuerit, & ad modicum tempus, superiorum respectu melius habuerit, postea rursus ad idem pertinet. Dum autè curatur, citò sana fit. Si verò non curetur, & tempus procedat, omnia prius relata valde ipsam affligent, & dolor corripiet, nunc venter partem infra umbilicum, nunc inguina, nunc lumbos & coxendicum ad sedem iuncturam, nunc collum. aliquando verò stragulatio fortis accidet, & caligo ante oculos obuersabitur, & vertigo, utpote purgatione sursum vergente ac ascendente. Si enim corpus male habuerit mulieri menses pauciores fiunt, & quibus corpus plenum fuerit, his menses plures prodeunt. At verò biliosæ si menses prodeant, pusillanimitas incidit, & cibi fastidium aliàs atque aliàs, & anxietas, ac vigilia, & eructat frequenter, & non vult deambulare, & tristis est, & non videre sibi videtur, & timet. Et si curetur, ex his sana erit. Si verò tempus processerit, adhuc magis dolebit. Optimè autè cum hac agatur, si vomitus biliosus succedat, aut venter turbetur, non fortiter, & subeant biliosa. & si fluxus succedat ipsi non fortis. Si enim quid ex his fortè inciderit in corpus afflictum, periclitabitur. Si verò leniter depurgetur aliquid biliosi aut totum id quod molestum est, sana fiet. Si verò neque curetur, neque quicquid horum fiat, moritur mulier, plerumque; tamen contingit ut fluxus incidat biliosus ex hoc morbo, & si fluxus fiat, primum quidem pauca sunt quæ comparant: per omnes autè dies omnino plura contingunt. Temporis autem progressu plerumque etiam morbus acutus fit: & vteri à purgatione biliosa prodeunte mordentur, ac exulcerantur. Sed & in hoc adhuc sana fit, si curetur, & fluxus compescatur. Si verò vteri ab vlcere fuerint inflammati, adhuc acutior morbus erit, & multa graueolentia ac purulenta prodibunt, ab ipsis vteris iam egressa, & semper velut aqua de carnibus, & prius relata omnia ipsam magis affligent, & vlcera adhuc magis efferatiora erunt, donec ipsam vincant. Si verò etiam sanata fuerit, sterilis erit à cicatricibus. Si mulier corpore

- A** corpore malè habuerit, & pituitosi menses prodierint, cognosci autem possunt si pituitosi prodeant. Pelliculosi enim apparent, & velut araneorum casses distenduntur, & subalbidi sunt. Hoc autem contingit, si corpus & caput ipsi pituita repleta fuerint, & hæc non subpurgetur, neq; per nares, neque per sedem, neque per urinæ meatum. Sed in mensibus, & in turbatione sanguinis, vnà cū purgatione foras exit. Et si hæc sic habuerint, ad duos quidem aut tres menses nihil egrotat. Pituitosi menses.
- postquam autem amplius tempus progressum fuerit, & non curetur, magis dolebit, & febris erronea corripiet, & cibum aliàs atque aliàs fastidiet, & stomachum dolebit, & maxime dolebit vbi menses appropinquant. Quñ verò purgata fuerit, ad modicum tempus, superiorum respectu melius habebit, postea ad idem relabitur, & si non curetur, sed tēpus procedat, fient ipsi omnia quæ ei cui biliosi menses prodibant, donec fluxus sistatur. Consequitur etiam vt hæc fluxum pituitosum habeat, aut alia quæ ego dicam paulò postea. Et si Qualis vexatio in his.
- quidē fluxus succedat, semper procedūt per omnes dies, nunc Fluxus pituitosus. acervata, nunc pauca, & quandoque velut à carnibus aqua prodit, quandoque velut sanies, & in hoc ipso multi sanguinis grumi insunt, & radit terram velut acetū, & mordet vbiunque mulierem contigerit, & vteros exulcerat. Et vbi ad hoc peruenit, reliqua quidem similiter patitur, velut prior. Minus verò quàm illa caput dolebit, & vlcera neque deformia, neque magna, neque purulenta, neque graueolentia, similiter velut illi fiunt, sed minùs huic. Si verò curetur, sana euadit, etiam vbi morbus progressum fecit, & non valde moritur. Verùm prægnaus esse non potest quæ sic habet. Quæcunque viro cohabitantes in ventre habere non possunt, interrogandæ sunt, an ipsis menses prodeant, aut non: & an purulenti sint, aut frigidi. Si quidem igitur responderit, interrogetur an statim exeat genitura, an postera die, aut tertia, aut sexta, aut septima. Si igitur dixerit statim exire vbi coiuit, vteri osculum rectum non est, sed distortum, & geniturā nō capit. Si verò dixerit, postera die, aut tertia, vterus perhumectus est, & semen eluitur. Si verò sexta aut septima, semen computrescit, putrefactum verò exit. Si igitur ab initio nō suscipiat semen, os vteri primū curandum est, vt rectum sit. Si verò eluatur postera, aut tertia die, vterus & caput. Si
- B**
- C**
- Quid in his agendum, quæ nō concipiunt.

Mensium
cognitio.

Medela.

Medela.

put. Si verò computrescat & exeat, & uterus, & totū corpus **D**
curetur. Atque hac singula sic cognoscere oportet, Quali ve-
rò purgatione opus habeat, hoc modo cognoscit. Quum
menses prodeunt, linteum complicatum palmi magnitudi-
ne super tenuem cinerem expandito, deinde ut quæ exeunt
super hoc defluant curato. Præstat autem duo esse lintea,
vtrunque seorsim, alterum diurnum, alterum nocturnum, &
diurnum quidem, postera die lauare oportet. Nocturnū ve-
rò, ubi per diem ac noctem super cinere situm fuit. In lo-
tura verò considerare oportet, qualiānam fiant lintea lota,
ubi in sole fuerint siccata. Optimum tamen est in tenebri-
coso loco ea resiccare. Si quidē igitur pituita fuerit quæ con-
ceptionem impedit, mucosa lintea erunt. Si verò propter sal- **E**
suginē & bilē impeditur, fulua & subliuida. His igitur con-
sideratis, & diligenti animaduersione expensis, totum etiam
corpus inspicito, an multa purgatione opus habeat, aut se-
cus, ita ut & ad colorem, & atatē, & robur, & anni tempus, &
qua diata vtantur respicias. Curatio verò & totius corporis
est, & uteros ac osculum ipsorū sanare, & si hoc conclusum
fuerit, aperire. Si verò illi distorti fuerint, dirigere oportet.
Si autem humidi fuerint, resiccare, & alia quoq; facere con-
traria. Fere autem omnibus multa curatio eadem est, ex-
cepta mensiū detractiōe. Nam quibus nihil prodiit, his de-
trahere oportet. Imò quicquid in mensibus mali inest, hac
auferre oportet: quum videlicet pituitosi sunt, & pelliculosi,
& saniosi, & tenues, aut albi, & grumosi: & quum nigri sunt, **F**
& carbūculosi, aut caliginosi, aut acres, falsi, turbati, purulen-
ti. Hæ omnes causæ tollendæ. Prohibēt enim in ventre con-
ceptum. Quibuscūque igitur menses pituitosi ac pelliculosi
sunt, hæ carnosæ sunt, & his os humectum est, & saliuā multa
ac viscosa. Et si acidum aut acre quid gustarint, sputū in ore
liquidius erit, & insulsum, & ad omnia quæ ederint aut bibe-
rint, turbatio sequitur, & supprimitur ipsis ac attollitur ven-
ter, & nausea adest, & anxietas ac iactatio multa. Et à capite
fluxus defluit, & omnia obducit, & multā humiditatem in-
ducit, & partes sub oculis liuidæ sunt ac inflatæ. Has totas
fouere oportet & frequenter vomere, & à cibis, & ieiunas.
Infernum autem vētrem mollire, sed pharmacis omnino le-
uibus, quæ minimē bilem ducunt, & semel in die cibum ca-
pere

A pere, & frequenter exerceri. Et cibo siccissimo vti, & potu paucissimo meraciore. Melius autem est vt venter facile solibilis conseruetur. Verum vteros si ad hanc diætā non parauerint, pharmacis subdititiis nō mordacibus purgare oportet. Fomentum tamen semper purgationibus præmittendum est prius id quod ex fœniculo paratur. Deinde quod ex suffimentis. Fomenta verò & subditiones medicamentorum facito coniectura facta vt omnia fiant, & pro ratione adhibeantur, quo tempore menses prodeunt. Si quidem igitur puri & sinceri & cruenti fiant, ita ad virum accedat incipientibus mensibus. Optimum autem, desinētibus, & adhuc euntibus magis quā vbi disparuerūt. Quum autem ad virum itura

B est suffimentum quoddam ex adstringentibus suffiat. Atque hoc per canistrum, & arūdinem, pharmaco calido cineri insperso. Quum verò insperferis, & canistrum, sine operculū circumponito, & per arundinem insidenti fomentum adhibeto. Vbi verò opus fuerit ipsam suffiri, plumbea fistula vtere, vt aperto osculo suffiatur. Deinde cū surrexit, rursus in lecto plumbeam fistulam apponat, Deinde ea subtracta cum viro coeat. Et si ea quæ à viro prodeunt, non fuerint ei manifesta, extentis & alternatim politis cruribus quiescat. Ieiunium autem vtile est in hac die, præterquam si cyceonem velit non falsum in aqua. Hunc autē tunc bibat quum vult suffiri. Si verò vbi cum viro coiuit, postridie detineat geniturā, & neq; altera die exeat: à cibis quidem & balneis prohibeatur.

C tur. Bibat autem polentam in aqua non falsam, bis ac ter in die. Atque hæc diætā sit per sex dies, aut quod melius est, septem, si non exierint ea quæ à viro suscepit dum cum ipsa coiuit. Illota verò maneat per omne tempus, & det operam vt motus vitet. Si verò deambulare velit, deambulet in loco plano & leui, nequaquam accliui, neq; decliui. Desideat etiā super mollia, si conceperit. Reliquam verò diætā eandē faciat vsque ad dies triginta. Illota autem sit, aut si lauari opus habeat, pauca & non valde calida lauetur. Caput verò ne mafaciat. Cibis autem vtatur & panibus, & maza si velit. Ex carnibus autē, palūbe, & similibus. ex marinis, his quæ aluū sistūt. prohibeatur ab oleribus acribus. Vino verò nigro vtatur. Carnibus autem assatis potius quā coctis, tum mansue ris, tum ferinis. Et hæc quidem si conceperit, hoc modo facere

Vterorum
purgatio.Post viri
cōgressum
quid agat.

Hippocratis Liber I.

Quæ semen cere oportet. Si verò non conceperit, sed secunda aut tertia die exeunt ea quæ à viro immissa sunt, fluentia cum multa humiditate: manifestum est quòd vteri sunt humidiores. Curare itaque oportet iuxta relatum modum, donec sicci fiant.

Quum virum adeat hæc mulier.

Quum autem sicci esse videbuntur, sic curato. Optimum est pharmacum mollitorium, & retro, & anteriori parte ipsi adhibendum, donec vteri ad naturam suam redeant, & rursus ad virum accedat, quum menses non amplius multi, sed pauci & bene colorati fuerint, & ad libidinem concitatur. Sed & in aliis diebus cum viro consuetudinem habere oportet, si optime habuerint vteri. Quum autem in relatis diebus consuetudinem habuerit cum viro, si probè parati fuerint vteri, & si geniturâ ad decem aut duodecim dies detinuerit, ne adeat

Cur non concipiat sanguis.

virum Si verò non concipiat, vteri autem sani sint: contingit enim & hoc plerisque, quum debiles existentes vteri, ab affectione macilenti fiunt: aut præ medicamentis & fomento multo, genituram ferre non possunt, priusquam assueti fiant & conualescant. Hoc autem sic cognosci potest. Quum ab ipsa exierint, secunda aut tertia die exeunt, aut adhuc prius, crassa & compacta velut mucus: nisi mali quid sit, & propter alium vterorum morbum genitura discedat. Quum igitur talia apparuerint, curatione quidem vterorum non est opus, verum reliqui corporis cura habenda est, quo huiusmodi bonus habitus sit ipsi, ut contractum simul sit corpus, & iusta mole præditum, ex paucorum balneorum, plurium verò & leuium laborum usu, Ab acribus autem & salis prohibeatur. Vomibus vtatur ante dies quibus menses fieri solent, & rursus fame maceretur, & alia perficiat quæ dicta sunt. Atque hæc quidem harum curatio est.

Quum statim post coitum genitura exit.

Medela.

Quum os vteri est distortum.

Medela.

Quibus autem statim ubi coierint diffuunt ea quæ à viro sunt immissa, his os vterorum causa est. Curare verò sic oportet. Si quidem valde conclusum fuerit, tædis & plûbeis fistulis immissis aperito, & molli fomento ex foeniculo foueto, & subdititiis, quæ vteros attenuant, & in directum redigunt, purgato. Post purgationes autem & fomenta, ea infundito quæ causæ sunt contraria. Quibus verò os distortum est, & ad coxam allapsum: sunt enim etiã talia prohibentia ne vterus semen suscipiat: Quum igitur tale quid acciderit, odoratis fomentis fouere oportet, post fomentum autem per digitum auulsum à coxa detrahito. Quum autem

A autem discesserit, tædis & plumbéis fistulis immisis iuxta priorem rationem in rectitudinem dirigit. ubi, verò rectificari ac aperti fuerint vteri, medicamentis subdititiis purgato, & alia facito iuxta relata rationem. Quum autem ma- Cum vteri nimis hiāt.
gis quàm oportet aperti fuerint vteri, purgatione opus habent. post purgationes autem, collutionibus & suffimentis. Si verò propiores sint quàm oportet, vomitibus vteri opus habent, & fomento foetido, donec ad suum locum redeant. Diæta verò vtendum est relata. Si verò os pingue fuerit & crassum, & propterea non concipiat, sinapi coctum ieiuna edat, & meracum insuper bibat. Apponat autem nitrum rubrum. & cuminum, ac resinam. Optimum autem fuerit nitrum vino ammiscere & resinæ, vnà cum cumino & vnguento albo. Aut cornu cerui vrito, & duplum crudæ ordeacæ farinæ cum vino ammisceto. Si verò non melius habeat, porrum coquito, & ipsam insidere facito. Aut phagum id est glâdem tritam apponat. Et allio recenti vescatur, & aqua mulsa insuper pota vomat. Quibus porro intus manet viri semen & computrescit, & turbationem facit, his attriplicis semen aut succum, cum melle aut cum cumino delingendum Quum semen intus putrescat.
dato. Quum autem à viro immissa graueolentia fuerint, nō concipit. Portulacā igitur & adipem anserinum misceto & apponito. Quibus verò sexta aut septima die, à viro immissa prodeunt putrefacta his verisimile est ab vtrisque fieri, & bilis, & fæculis influxu. Curare autem sic oportet. per Curatio.
Cyeratrum, aut scammoniam, aut peplium. Hæc enim sursum ac deorsum pituitam & bilem purgant, & flatu educūt. Ante purgationes autem fomentis vtendum est, ex suffimentis. Vbi verò fomentū adhibueris, per subdititia purgato, eodē modo velut in prioribus. Et post subdititiarum ac purgationum vsum, mollitoriis vtere, & subdititio medimameto ex mercuriali & artemisia herba, & anemona, & veratro albo & nigro. Atque hæc quidem medicationes hoc modo his conducunt. Diætā verò respectu, ad totum hominis corpus facto constituere oportet, siue siccior, siue carnosior mulier esse videatur. Et si quidem siccior fuerit, balneis pluribus, & obsoniis omnibus coctis, tum marinis, tum carnibus Vterorū huius mescetium
vtatur. Vino verò aquoso, & oleribus coctis, & pinguibus omnibus ac dulcibus. Hæc enim plerunque faciunt vt humi- curatio.
ditas

ditas sit, tum in reliquo corpore, tum in vteris. Si verò humidior fuerit, tales vteri nullo ex his opus habent, sed vice versa neque contrectare, neque lauare recenti motu facto oportet, neque suffire. Nam ad periculum hæc procedere solent. Et si magis quàm pro natura fuerint humectæ, siccare sanè, ac suffire oportet. Si verò biliosa in ipsos confluant, medicamentum dare quod bilem purgat. Si verò falsuginosa, lac alinum, & vinum, & alia auxiliaria. Morborum porro vires considerare oportet, & causas ex quibus morbi fiunt exquirere, atque sic ad alia procedere, & morbos circa locos curare, & quæ quidem ob causam osculorum hiantium prohibentur, vt ne detineant in ventre, horum oscula præparare, vt probè diducta sint. Quum verò humiditas prohibe-
rit, hanc inspicere vt ne impediat, totis mulierum negotiis expensis, siue ex toto corpore, quid moueri videatur, siue ex ipsis vteris, siue ex vtrisque. Vteros autem sic curare oportet, vt neque humidi sint, neque valde sicci. Imò sicciores quidem, tanto magis bono succo, quanto sunt sicciores, eiusmodi humiditate vt pingues magis fiant quàm graciles. Humectos verò & madidos siccare, ita vt relinquantur quo humidi sint, & non valde resiccentur. Excessus enim in his valde sunt vitandi. Concipit autem in ventre, neque ea quæ humiditatem habet, neque quæ resiccata est, nisi quid horum in vteri natura fuerit. Cæterum virum adire ipsam oportet, post

adhibitam curationem, desinentibus aut inchoantibus mensibus. Optimum est etiã vbi quieuerint. Maxime verò in his diebus experiendũ est, an prægnans fieri possit. hi enim sunt
Tẽpus con-
cubitus.

opportunitissimi. Si verò nõ statim concipiat, & reliqua bene habeant, nihil prohibet etiam aliis diebus cum viro coire. Nam hæc exercitatio alacritatem ipsi inducit, & venulæ hinc laxantur: & si ea quæ à viro prodeunt concurrerint secundum reſtitutionem cum eo quod à muliere, citius concipiet. Hæc enim causa est his, quibus siue statim, siue posteriore tempore exeunt. Atque hæc quidem de his dicta sunt.

Quæ duri-
tiam vul-
uarum tol-
lant.

Si verò humidius fuerit os vterorum, genituram attrahere non possunt. Utendum autem est medicamenti subditiis acribus. Commorsus enim & inflammatus stomachus solidus ac firmus quandoq; fit, & aliquo modo accommodatur. Sed & si in callum indurati fuerint, præstat acria apponere quæ

A quæ mordeant. Quæ enim tenuia & feruida sunt, calli duritiam diffundunt. Si verò mollitus fuerit callus, mollibus curato, & his quæ non mordent. Quod si diu non concipiat, mē Medela nō concipientis. libus non apparentibus, quum tertia aut quarta dies aderit, alumē tritū, vnguento dilutū, & lana exceptū apponito, & habeat per triduū. Quarta verò die fel bubulum siccū in oleo feruefacito, & lanā tenerā eo imbutā subdito, & habeat per triduum. Postridie autem eximat, & cum viro coeat. Si genituram non suscipiat mulier, mensibus secundum naturam prodeuntibus, mēbrana præposita est, sit etiam ex aliis causis, cognosces autē vbi digito obicem cōtigeris, facito autem medicamentum subdititium, resinam & æris florem cū melle subacta in linteo apponito quā penitissimē, filo ad extremitatem alligato, vbi verò hoc extraxerit, myrtum in vino coquat, & vino tepido perluatur, præstat autē membranā auferre. Sunt autem mulieres quæ facile quidem in ventre concipiunt, gestare verò non possunt, sed fœtus ipsis cor rumpuntur, aut tertio, aut quarto mense, nulla causa accedente, neque cibo incommodo ingesto, & hæc est causa quæ relata est, & maximē quum vteri augmentum fœtus dimiserint. aut venter ipsis turbetur. Debilitas autē, & febris vehemēs, & cibi fastidiū incidit eo tempore quo fœtus corrumpunt. Est autem & hæc causa, si vteri fuerint leues, aut natura, aut vlceribus in ipsis innatis. Si enim leues fuerint, quandoque continentem ipsum pelliculæ, minùs quā oportet coharēt: vtpote quū vteri ipsi pleni existant, cognouerit autem quis hæc singula, si de his exactē interroget. De leuitate verò cognouerit, si alia mulier cōtigerit, dum vteri vacui sint. Non enim hoc tempore manifestum fit. Si verò menses prodierint his aceruatim prodeunt. Quibusdam tamen ipsarū contingit vt fœtus edant. Et si qua curetur, spes partus adest, & de his quidem sic habet. Si mulierem puerperam facere velis, aliàs concipere nequeuntem, menses cōsiderare oportet, an pituitosi sunt aut biliosi. Cognosces autē sic. Arenā tenuē ac siccā subiicito, & quum menses prodeunt, in sole sanguinem superfundito, ac siccari finito. Et si quidem biliosa fuerit, sanguis in arena siccatus pallidus erit. Si verò pituitosa fuerit, velut mucus. Vtrum igitur horum fuerit, ventrē purgato, siue supra opus habuerit, siue infra, postea vteros purgato

Partus retinendi curatio.

Leuitas vterorum vti dignoscatur.

Quæ fœcū gato. Si verò concipere voles, hederæ grana septem, aut fo-
ditatem pa- lia, singulis mensibus in vino veteri, cessantibus mensibus
r. nt. bibenda dato. Et malicorium in vino odorato meraco coqui
to, & glandem ex hoc factam in meridie subdito. Aut alumē
Aegyptium tritum lanæ illigatum apponito. Quum autem
sol occiderit, eo detracto, vino odorato perluatur. Hæc autē
cessantibus mensibus facere oportet. Sed & hoc sic habet.

Conceptus
tempus.

Quum purgatæ fuerint mulieres, maximè in ventre con-
cipiunt cum viro consuetudinem habentes, & genitura ipsis
corroboratur, si quando oportet coierint. Et semen viri fa-
cilè ammiscetur, & si præualuerit, illi accommodatur ac ap-
propriatur. Tunc enim maximè os vterorum hiât, & disten-
tum est post purgationes. Et venæ genituram attrahunt. At
in priore tempore, & os vterorum cōclusum est, & venæ ma-
gis sanguine plenæ existentes, nō similiter genituram attra-
hunt. Si verò genitura iugi cursu defluat, mulier viro mi-
sceri non cupit, & si misceatur, non concipit; & lumbi ac co-
xendices doloribus vexantur, & febris debilis corripit, & im-
potentia ac animi deliquium succedit, & aliquando vteri in
suo loco non sunt. Si quidem igitur præ plenitudine defluat,
sinere ipsam optimum est. Si verò vterus latus fiat, diata sit
alica, caro suilla, aut palumbis, & vinum nigrū, poriones ve-
rò, quæ ad fluxū describentur. Nunc porro dicam de mor-
bis earum quæ in ventre habent. Pronūcio autem de mulie-
re in ventre habente duos aut tres menses & ultra, si menses
statim prodeant singulis mētibz, necesse est tenuem ipsam
fieri ac debilem. Quandoq; etiam febris ipsam corripit his
diebus, quàm diu menses prodierint. Et dum prodeunt, &
postquàm prodierint, pallida fit. Sed & pauci prodeunt. His
vteri magis quàm opportunum est, hiant, & augmētum fœ-
tus dimittunt. Descēdit enim quum mulier in ventre habet,
sanguis paulatim in vteros à toto corpore, & in orbem circa
id quod in vteris est circumstans, illud auget. Si verò hiarint
vteri magis quàm oportet, sanguinē singulis mensibus, ve-
lut procedere solet, dimittunt. Et quod in vteris est, tenue ac
debile fit. Si verò curetur mulier, melior & fœtus, & mulier
euadit. Si verò non curetur, fœtus corrūpitur. Sed & ipsa pe-
riclitatur, ne diuturnum habeat morbum, si purgatio plus
quàm oportet prodeat. Quia & post corruptionem pericu-
lum

Quādo nō
concepit.

Vicius ra-
tio.

Prægnatiū
mala.

Alum imminebit, nimirum vteris magis apertis, Si verò mulieri in vtero habenti caput pituitosum fuerit, & pituita- ^{Causa va-} ^{ria abor-} acris in ventrem descenderit, & à capite ventrem perfrun- ^{-tus.} pit, & febris debilis ipsam corripit, & palpitationes quibusdam debiles subexolutæ, augescentes acutæ. Si verò etiam cibi fastidium, & impotentia corripiat, periculum est ne breui fœtus corrumpatur. Sed & ipsa in periculum adducetur, si non curetur. vbi verò effugerit, vt pote ventre fluido existente, statim concludere ac constringere oportet. Multa verò etiam alia sunt pericula, in quibus fœtus corrumpuntur. Nam si mulier in ventre habens agrotarit, aut debilis fuerit, aut onus leuarit, aut percussa fuerit, aut saltarit, aut cibum fastidierit, aut animi deliquio correpta fuerit, aut amplius aut minus nutrimentum accipiat, aut timeat, & consterneretur, aut vociferetur, aut intemperanter viuat, fœtum corrumpet. Nam & cibus corruptionis causa est, & potus multus. Sed & ipsi vteri naturas habent, quibus abortum faciunt, quum sunt flatuosi, densi, magni, parui, & alia his similia. Si mulier in vtero habens, ventrem aut lumbos doleat, formidare oportet ne fœtum per abortum ^{Quam fa-} ^{cile abor-} edat, pelliculis qui ipsum continent ruptis. Sunt etiam quæ ^{-tus fiat.} fœtus corrumpunt, si acre quid, aut amarum ederint, aut biberint præter consuetudinem, dum adhuc paruus intus est puerulus. Si enim puero quid accidat præter consuetudinem, & si paruulus adhuc fuerit, moritur. Et si eiusmodi edat aut bibat, velut diximus, vt necesse sit ipsi turbari ventrem, dum adhuc paruus est puer. Percipiunt enim & concitantur ipsi vteri, fluxione ex ventre secedente. Et si laborauit mulier plus quam oportet, & ventet ipsius concludatur, aut magnus fiat, etiam sic puer corrumpitur, velut à labore calefactus, & à ventre pressus. Plerumque enim dum parui sunt, debiles sunt. Quidam verò etiam magni corrumpuntur, Quare mirari non oportet mulieres, quod ^{Pregnan-} ^{tium varij} inuitæ corrumpunt. Nam custodia & scientia multa opus ^{-tus.} est, vt in vteris gestent puerum & enutrient, & vt euadant affectus. ab ipso in partu. Si verò mulier in ventre habens corpore male habeat, & fuerit biliosa & doloribus vexata, & aliàs atque aliàs febricitet, & os examarescat, & lingua cum virore pallida fiat, oculi velut morbo regio affecti, ungues bili-

Hippocratis Liber I.

liosi, vrina acris: hæc tum aliàs, tum si febricitet, aliàs at- D
que aliàs ipsi accident: postquam verò etiam purgationem
contigerit biliosam esse, planè timendum est etiam pueros
debiles fore: hæc si biliosa per secessum egerat (id quod val-
de contingit) melius deget. Et si biliola aut valde nigra
sunt partus purgamenta, etiam vt plurimum pinguedo suc-
cedit, & prodeunt paulatim, & non cito congelantur. &
primo quidem tempore leuius fert, postea verò grauius, &
minus purgatur quàm oportet. Si enim corpus malè habue-
rit, etiam partus purgamenta pauciora ac deteriora ipsi pro-
cedent. Patietur autem & hæc omnia, etiam si menses pro-
deant biliosi. Verùm breuiori tempore ægrotabit. Et mor-
bus ad eadem pericula, & signa, & transmutationes deue- E
niet. Aut enim ipsi vomitus biliosus, aut purgatio per ven-
trem, in hoc morbo fit, & vteri exulcerantur. Multa verò cu-
stodia mulier opus habet. Quum igitur tale quid factū fue-
rit, vt ne moriatur, sterilis erit. Si verò nihil horum fiat, &
non curetur, sed partus purgamenta fuerint ipsi occultata, in
Medela. triginta & vna diebus vt plurimum moritur. Huic pharma-
cum in potu exhibendum est quod bilem ducat. Prodest &
anisum, & quæ ad vrinam ciendam dantur. Vomat autem
& sudores eliciantur, & alius succo ptisanæ, & melle, & ouis,
& maluæ aqua infusa eluatur. Quibus in ventre habenti-
bus circa septimum aut octauum mensem, derepente man-
marum & vëtris plenitudo collabitur, & vbera gracilescunt,
& lac non apparet. his dicendum est, puerum aut mortuum F
esse, aut viuere & debilem esse. Si enim in ventre habuerint,
& apparuerint menses: aut abortus fiunt, si plures fuerint &
male olentes, aut foetus morbofi fiunt. Si mulier in ventre
habens pituitosa fuerit, & caput dolet, & aliàs atque aliàs fe-
brit, & in capite obuoluitur pituita. Et grauitatem exhibet
ac frigus, & in corpus procedit, & in venas, quum caput fue-
rit repletum. Fit etiam colore plumbo similis, & vomit pi-
tuitam, lingua alba est, & vrina communiter exalbescit, fri-
gida est, turbatio adest, & ager motus. Vbi verò pepererit,
procedet ipsi purgatio pituitosa, & apparebit pelliculosa, &
velut araneorū casses in hac distēti erūt. & patietur quidē ea
de omnia etiā ea cui menses pituitosi prodeunt. verū breui-
ore tēpore ægrotabit. & eadē pericula, & signa, & transmuta-
tiones

★ Quid signi-
ficet partū
periisse.

A tiones morbus habebit. Cōtinget enim ipsi vomitū pituitosum fieri, & affectiones similes velut illi accident. Dependent enim eodē modo partus purgamenta, & menses pituitosi, verū purgamenta partus breviorē tempore quā menses, & nisi eruperit ipsa purgatio quæ diu moram traxit, moritur in quinque & quadraginta diebus, etiam si pituitosum partus purgamentū ipsi prodierit. Curata autem mulier, sana fit, & inhabitur ab initio si sanata fuerit, grauis enim erit hic morbus. Huic dare oportet phar̄macum quod pituitam ducit, & lac caprinum coctum cum melle miscere. Si verò sepe nō obediat, nasturtiū, aut cnicum, aut cneorū, aut poly-

Periculum
mortis in
prægnante.

Medela.

B hibeto, & quæcunque pituitam laxant, ac educunt. Si verò mulier in vtero habens, lienosa sit à relatis affectionibus, in hoc morbo menses hydropi similes & pituitosos demittit, & partus purgamenta procedent hydropi similia, & prodibunt modò multa, modò pauca, & fiunt quemadmodum aqua à carnibus, velut si quis carnes cruentas abluat. Aliquando verò paulò crassiora, & non cōgelantur. Et patietur eadem omnia etiā ea cui menses aquosi procedunt, & pericula eadem ac trāsmutationes morbus habebit. Continget enim ipsi fluxum aquosum fieri, aut purgationem occultari, & ad ventrem conuerti, & ad crura, aut ad pectus, aut aliquam harum partium, & pericula erunt eadē quæ prius sunt relata.

Prægnas
lienosa quid
patiat.

C Si prægnans intumescat, vrticæ semen plurimum, & mel, & vinum dilutum odoratum potandum dato, bis in die. Si prægnatē bilis vexet, ptisanæ succum dato, rhoe rubro insperso, aut eo qui ex moris paratur. Sorbeat autem frigidam, & sistetur. Si suffocatio derepente accidat prægnanti. Fit autem hoc maximè vbi mulier laborarit, & cibum fastidierit, vteris à labore calefactis, & pauciore humore foetui accedente. Et quum vterus ac venter inanior sit quā oportet, procedit foetus ad hepar & præcordia, ut quæ sunt humectata, & suffocationem fortem derepente inducit. Intercipit enim perspirationem circa ventrem, & mulier voce priuatur, & albas oculorum partes subuertit, & reliqua patitur omnia quæ relata sunt, si mulier non præguans ab vtero suffocetur. Quin & suffocatio fieri incipit mulieri in ventre habenti, quum à capite defluit pituita ad præcordia, utpote

Suffocatio
vulvæ cur.

corpore respirationem trahere non potente. Et si quidem **D** vnà cum pituitæ descensu, foetus redierit ad suum locum, velut qui humorem attraxit, & à pituita delatus sit, mulier sana fit. Stridor autem fit foetu locum suum occupante. Et venter mulieris ut plurimum humidus fit. Si verò non breui redeat foetus in suum locum, duo iam fiunt quæ foetum affligunt, pituita quæ à capite descendit, grauat enim & insistens frigefacit: & loci alienitas, & periclitabitur. Et si non breui quis commodiorem diatam adhibuerit, mulier suffocabitur. Et de his quidem sic habet. Si verò mulieri in ventre habenti, tempus partus iam affuerit, & dolor partus tenuerit, & ad multum tempus mulier puerum edere non poterit, omnino obliquus aut in pedes procedit. Vtile est autem in caput procedere. Et si obliquus procedat, difficilis fit affectio. Sicut enim si quis in vas olearium angustioris nucleum immittat, non proclive est extrahere ipsum obliquatum. Sic sanè etiā mulieri grauis affectio est, vbi foetus fuerit obliquatus. Difficile est enim ipsum exire. Graue autem est etiam si in pedes processerit, & sæpe aut matres pereunt, aut pueri, aut ambo. Est autem & hæc magna causa ut non facile exeat, si mortuus, aut syderatus, aut duplicatus fuerit.

Partus difficultas.

Cur grauida pallidescat.

Parturitionis signa.

Quum mulier in ventre habuerit, tota fit cum virore pallida, quoniam purus ipsius sanguinis semper quotidie ex corpore destillat, & in foetum descendit, & augmentum ipsi accedit. Et quum paucior sanguis sit in corpore, necesse est ipsam esse pallidam, & semper alienos cibos appetere, & sanguinea in ventrem intrare. Et debiliior fit, quoniam sanguis minuitur. **F** Assero porrò mulierem vbi pariet, frequentem spiritum emittere. Et si purgatio inceperit, venter plenus est, & calore pressus. Maxime verò frequenter respirat, vbi partus appropinquat. Et tunc maxime lumbos dolet. Nā & lumbi à foetu colliduntur. Dolet autem stomachum siue ventriculi osculum in intermedio tempore aliàs atq; aliàs, utpote dum venter, maxime verò vterus, circum foetum obuoluitur. Et si puerperæ vterus infletur, ouicula aut capræ hepar cinere obruito, deinde coquito, & hoc edat, ac vinum meracius vetus, si nihil prohibuerit, bibat ad dies quatuor, si longius aberit à partu. Si verò lumbos doleat, anisum & cuminum Aethiopicum bibat. Et calida lauetur. Si verò

- A** verò anhelatio corripiat, sulphuris magnitudinem fabæ, & cardamoni tantundem, & rutæ ac cumini Aethiopici tantundem. Hæc terito, & vino diluta ieiunæ bibenda præbeto. Et à cibis frequenter abstineat. Si in partu purgatio multa prodierit, vterus contrahitur, & vesica, & intestinum, & neque stercus continent, sed & urinam emittunt. Oua igitur forbenda dato, & panem cinericium edendum, & reliqua quæ scripta sunt. Si verò ea quæ in partu est, sicca fuerit, & difficulter humectetur, oleum bibat, & locos oleo calido. cum maluæ aqua irriget, & cerato liquido illinat, & anserinum adipem cum oleo infundat. Si verò parere non poterit, resinam, aut cuminum, aut pinus corticem suffito. **Quicumque** Partus difficultasquæ tollatur.
- B** verò tumores vteri in partu, aut ex partu fiunt, eos adstringere non oportet, velut medici faciunt: verum pharmaca optima exhibeto. Cuminum Aethiopicum quatum tribus digitis capi potest, & anisi, & sesellis grana quinque aut sex, præoniæ radicis aut etiam seminis testam conchæ maioris dimidiam. Hæc in vino albo odorato maxime, ieiunæ exhibeto. Aut dauci Aethiopici radicem, seselli, præoniæ radicem, eodem modo. Aut hipposelini, aut dauci Aethiopici semen, eodem modo. Aut crethmi radicem. Aut cuminum Aethiopicum quatuor obolorum Atticorum pondere. Aut piper, anisum, daucum, præoniæ Atticæ radicem, hæc in vino terito, & bibenda dato. Aut myrtidani ramulos duos aut tres, & cuminum Aethiopicum, & præoniæ radicem. Aut etiam lini semen similiter, quo etiam pueros tussientes nutriunt, cum oui assati vitello, & cum sesamo tosto. Si prægnanti pudenda superficiario ac feruido vlcere affecta sint, amygdalas tritas, & medullam bubulam in aqua coquito, & modica farina adiecta, pudenda illinito, & aqua à coctis myrti baccis perluo. **Nunc verò dicam de puerperij purgamentis,** Puerperarum purgatio. & his quæ post partum exeunt. Quum mulieri aut partus purgamenta non fuerint purgata, aut menses non prodierint, aut etiam vterus durus fuerit: dolor habet lumbos, & lateris mollitudinem, & inguina, & femora, & pedes amarè dolent, & venter attollitur, & horrores per corpus discurrunt.
- Ex talibus autem febres fiunt acutæ. Hanc ita habentem, si quidem sine febre fuerit, balneis curato. Caput autem oleo anthino inungito. Maluam autem coquito, & oleo cyprino

cyprino in aquam eius infuso, mitigandi gratia insidere iubeto. In omnibus autem morbis in quibus fomentum auxiliatur, melius est postea oleoungi. Si vero febris habeat, à balneis abstinere, fomentis autè & tepefactoriis imum ventrem & lumbos curare. In potu autem exhibere pharmacatrynerina, aut sapiæ ouis, aut castorio ammixtis. post hoc verò farinam cum ruta coctam, aut ptisanæ succum sorbendum dare. Si verò mulieri cum puero in partu non prodierit humor velut oportet, sed si quidem in capite habuerit humorem à calore attractum, in partu & ante, caput dolebit. Si verò in ventrem aceruatim descenderit, vbi concitatus fuerit, ipsum turbabit. Et nō oportet longè progredi sinere, sed auxilium ferre, vt ne ex partu ventris profluuium succedens, corpore male habente, ipsam dolore affigat. Si verò à capite delatus fluxus, ad puerperij purgationē vertatur, & multum concitetur, melius habebit. Si verò plus moderato, curam adhibeto. Si verò in ventrem, facilior utique exitus puero contigerit. Si verò purgatio modica mulieri prodierit, dolor fortis corripit lumbos, & omnem circa pudenda locum, & intumescit, & femora ardent. Et ex ore ac naribus pituita fluit fortiter aquosa, & dolet caput, & febris habet, & horror, & tumet, & dentes stridunt, & venter, & vesica constringetur, & oculus subuertit, & caliginosum visum habet. Quum mulieri puerperæ purgatio non facile procedit, velut vteris inflammatis, & osculo ipsorum concluso.

Obtorquetur enim stomachus vteri post pueri egressum.

Si enim quid horum fuerit, purgatio non procedet. Si verò non processerit purgatio, continget ipsam febrere, & horrorem habere, & ventrem magnum esse. & si ipsam attigeris, totum corpus dolore, maximè si quis ventrem attingat, & aliàs atque aliàs stomachi dolore vexatur, & lumbos dolet, & cibi fastidium, & vigiliæ, & punctura adest. postea quinto aut septimo die quandoque venter turbatur. & secedunt nigra, & valde graueolentia aliàs atque aliàs, & vrina velut asinina. Et si secesserint, videtur sibi melius habere, & curata, breui sana fit: sin minus, periclitabitur profluuium ventris forti ipsi illapso. Et puerperij purgamenta ipsi occultabuntur. Si verò venter ipsi nō turbetur, neque purgatio prodeat sua sponte, neque ea quæ cōmoda sunt breui exhibeantur,

Quid si nō
curetur euacuat.
niat.

A tur, tempus autem progrediatur, multò magis ex prædictis affligetur. Et insuper periclitabitur, ne liuida fiat velut plumbum, & aquam intercutem incidat. & vmbilicus extabit ipsi, ab vteris eleuatus. Et circumcirca nigrior erit. & vbi hæc facta fuerint, fieri non potest vt mulier superstes maneat. Pereunt autē aliæ alio tempore, pro corporis & affectionis ratione. Verum vnā & vicestimā diem non excedunt, id quod plerunque sic cōtingit. Si verò purgatio ipsi eruperit, siue à pharmacis, siue sua spōte: fit enim & hoc si vteri os laxarint, à sanguine aceruatim derepente delato coacti: & si eruperit, graueolentia purulenta depurgātur, Quādoque etiā nigra: & melius habebit, & curata sanescit. Fiunt autem & vlcera

B in vteris, vtpote puerperij purgamentis putrefactis. Si verò fiant, maiore cura opus erit, vt ne ipsi vlcera magna & putredinosa fiant: periculum est autem ne aut moriatur, aut sterilis fiat. Signa verò hæc fiunt, si vlcera intus fuerint. Quum purgatio ipsi prodierit, velut spina per vteros transire videtur, & calor ipsam corripit, ac maximè ventrē inuadit. Et si attingatur, partem infrā vmbilicum dolet, velut si purum neruosum vlcus contingat. Post dolores fortes aliās atque aliās in vteros incidunt. Et febris aliquando ad contactum manus debilis & aliās atque aliās puerperij purgamēta procedunt, maligna, purulenta, graueolentia. Hæc sunt signa, si vlcera in vteris fuerint, & multa cura opus habent. Atq; hu-

Signa vlcerum in vuluis.

C perij primis tribus aut quatuor diebus processerit, verum postea derepente euanescit: ealdē affectiones cōsimiles priori patitur, sed minus. & si transmutetur morbus, id idem transmutabitur. Diuturnus autem & debilior priore erit. Si verò curetur mulier, superstes erit, si cito curetur. & de hoc morbo sic habet. Si verò ex partu non fuerit purgata, venter intumescit, & splen, & crura. Et febris habet, & rigor corripit, & dolores profiliunt ad lumbos. Aliquando etiam ad viscera. Et perfrigeratur, & febris habet. pulsus debiles sunt, & aliquando acuti, & aliās attolluntur, aliās deficiunt. Hæc patitur incipiēte morbo, & sic habet. Temporis autem progressu, caux faciei partes rubescūt. Quum sic habuerit, leues cibos exhibeto. Et si turget, pharmacū infrā purgans bibendum dato, si biliosa fuerit, quod bilem purgat: Si pituitosa, quod

Cur puerpera purgatio subsistit.

Cur post partum nō purgatur.

Medela.

quod pituitam. Postea verò vteros odoratis foueto, & molli- **D**
torium in die apponito. Si verò osculum solidum fuerit, tota
die foueto, & mollitoria apponito. Deinde calida aqua laua-
to, & plumbeas fistulas indito. postea salis grana, & myrrhā
in lintheū illigato, & picem coctā ammixtis aromatis lana
excipito, & singulorum pares portiones ad gallæ paruæ figu-
ram efformato, & per diem ac noctem apponito. Deinde ve-
rò intermissis tribus diebus, iisdem foueto. Et grana cnidia
decorticata duarum potionum mensura, & piperis grana tri-
ta, oleo Aegyptio albo, & melle optimo ammixto, in lanā in-
farcito. & pennæ obuoluta tota die ac nocte apponito. Et si ti-
bi purgata esse videatur, melius est sinere: Si verò purgatio-
ne opus habere videatur, duobus diebus interpositis, rursus **E**
id quod ex cucumere syluestri paratur, per diem ac noctem
subdito. Deinde Netopon, & oleū rosaceum odoratissimum,
& adipē cerui liquefacito, & die vna in lana subdito, & mul-
ta calida, quantum eius fieri potest, leniter lauato. Statim au-
tem vbi purgatoriis, & calida, fuerint purgata loca affecta,
adipe anserino, & myrrha, & resina tepida os vterorum illi-
nat, & foueat, vteros verò postridie vino & oleo narcissino
eluat, Aut si narcissinum non sit, vino solo. Atque hæc die
vno ante menses faciat. Postquam autem menses prodierint
primis diebus attramētum, hoc est spodium cyprium terat
& salis granum addat, & hæc lana excepta paululum in cor-
pore habeat. Et ieiuna vinum meracum odoratū absorbeat,
Vbi verò quieuerint menses, per diem id quod ex pulegio pa- **F**
ratur apponat, & virum accedat. Et si in ventre coceperit, sa-
na euadit. Cibis autem in purgatione vtatur. Ad hæc cōmo-
dat, mercurialem coquere, & porrū, allium, brassicam, & gra-
na mali punici ammiscere, & succum sorbere. Aliis autē ob-
soniis marinis potius quàm carnibus vtatur. A dulcib⁹ verò
& oleosis prohibeatur. Bibat autē semper ieiuna id quod ex
tæda paratur, donec purgetur. Et mēlibus prodeuntibus idē
valde bibat. Si verò paulo pauciore quàm oportet prodie-
rint mulieri puerperij purgamenta, velut vteris angusto ore
præditis ac distortis, Aut aliqua pudēdi pars valde fuerit con-
clusa ab inflammatione. Mulier acutè febrit, & stomachi do-
lore vexatur, & dolor totum corpus, & molestè fert, & ad ar-
ticulos manuum ac crurum & lumborum dolor procedit. &
locum

Puerperæ
mala pur-
gatio quid
apporret.

Vteroruna
vlcera.

Cum utero
rum os an-
gustū fue-
rit.

Purgatio
cum nō exit
perimit.

Cur magis
purgēt quā
expediat.

Cū pueri
da obturan
tur.

gentia purgationē relictam. Si verò prodiret purgatio, vlce-
ra non cōclusa essent. Nunc autē influit, & aliena carne cras-
fescunt. Proinde ea sanare oportet, velut in reliquo corpore,
& ad cicatrices perducere. Locus autē levis & concolor red-
datur. Mulier quādam patiebatur eadem quæ patiuntur
uteri dum à puerperij purgamentis non purgantur, & ad hæc
dolebat pudendum. Et ex cōtactu cognouit, quòd obturata
esset, & narrauit, & curata depurgata est, & sana euasit ac fœ-
cunda. Si verò curata non fuisset, neque purgatio ipsi sponte
erupisset, vlcus maius fecisset, & malo non remittente, peri-

Cum pur-
gatio caput
petit.

clitata fuisset ne vlcera cancerosa fierent, Si verò processe-
rit mulieri puerperij purgatio ad caput, thoracemque ac pul-
monem: fit enim & hoc: moriuntur sæpe statim, si detineatur **E**
ac firmetur. Si verò probè exeat per os aut nares, sana euadit.
Si verò morbus paulo diuturnior fiat, patietur sanè mulier
ea quæ dicta sunt de virgine, cui mēses primū cōparentes
sursum impetum fecerunt. Verū mulier lōgiore tempore
superstes erit quā virgo, & affectiones debiliores erunt, do-
nec pulmo purulentus fiat. Si verò puerperij purgatio nō ex-
eat per os, sed sursum tamen impetum fecerit, occultabitur,
& non procedat iusto modo. Et tussis corripiet, & anhelatio-
nes. Et impleto pulmone à sanguine, valde dolebit latus &
dorsum. Et quum tussiet, siccè tussiet. Aliquādo verò spumo-
sum expuet. Temporis autem progressu spurū apparet sub-
nigrum & turbatū. Et calor pectora tenet, magis quā reli-
quum corpus, nimirū sanguine ipsa calefaciente. Et febrit **F**
mulier, & venter ipsi coarctatur, & cibū fastidit, & vigilabit,
& abominabitur, & nō superstes manet, sed moritur plerun-
que vicesima septima die. Si verò purgatio sursum progressa,
per os non exeat, neque in pulmonem vertatur: conuertetur
ipsi ad faciē, & erit hæc valde rubicūda, & caput graue, quòd
neque mouere potest absque doloribus, & oculi valde rubi-
cundi erunt, & ex ipsis sanguis tenuis fluet. Et quibusdam ex
naribus sanguis manat. Et si his exierit, diuturnior morbus
fit. Et aures nō acutè audiunt in hoc morbo, & stomachi do-
lore vexatur, & eructat, & mente alienatur, & deliria fiunt
furiosa. Quibusdam autem adest oculorū distortorū feroci-
tas. Et reliqua omnia perpetietur, velut si purgatio ad pulmo-
nem vertatur. Verū nō tussiet, neq; expuet eiusmodi, neq;
dorsum

Cum pur-
gatio faciē
petit.

- A** dorsum similiter dolebit. Curata verò sana fit. Nō multa verò spes est de vita ipsius. Et si etiam superstes maneat, surditas aut cecitas omnino ipsi accedet. Atque hic est huius morbi finis. Si ex partu fluxus corripit, & cibi in ventre nō maneant, uā pāssam nigram, & mali punici dulcis grana terito, & vino nigro dilutis vtitor, ita vt caseum caprinum derafum, & polentam tritici torrefactam inspergas, & bene temperata bibenda præbeas. Si ex partu sanguinem vomat, hepatis fistula fauciata est: & dolor ad viscera procedit, & cor cōuellitur. Hāc multa calida lauare oportet: & tepefactoria quæ maximè admiserit adhibere: & lac asininū in dies septē vel quinque bibendum dare: postea verò vaccæ nigræ lac bibendū præbere, ita vt sine cibo degat, si fieri poterit, ad dies quadraginta. Ad vesperam verò sesamum tritū bibat. Morbus hic est periculosus. Quomodo autem lac fiat, dictū à me est in pueri in partu natiuitate, & alia similiter. Si lac fuerit extinctum, porrum tritum & aqua dilutum bibendum dato. Et calida lauetur, & in cibo porrū ac brassicam edat. Sed & cytisi folia simul coquat, & succum sorbeat. Bibat etiā fœniculi succum, & de radicibus fœniculi. Et ordeum molitū ac butyrum simul coquito, frigefacito, ac bibenda præbeto. Bonum est & hippomarathrū, & hipposelinum, & cytissus. Hæc omnia simul multum lac faciūt & augment. Capræ item Scyriæ, casei autē maximè commodi sunt. Sed & saluiā coquat: Aut à iuniperi baccis, aut cedri fructu, succum diffundat, & vino affuso bibat: & reliqua oleo affuso edat, & ab acribus, & salis, & acidis, & crudis oleribus omnibus prohibeatur. Nasturtium verò in vino potum commodum est. Nam lac purgat: & calida lauetur, & subcalidam bibat. Viticis itē fructū in vino bibendum dato: & betæ succus potatus multū lac facit. Sesamum quoq; recens, & ordeum trimestre, in mortarium coniecta terito, & succum per linteū exprimito. & mel aut amamelidas ammisceto: deinde in vino nigro bibenda dato. Quū mulier peperit, & à secunda non fuerit liberata, præstat dare ea à quibus maximè purgātur puerperij purgamenta: allia cocta aut affata in vino & oleo cū polypis ac sepiolis super prunis tostis, quicquid tandē ex his voluerit. Castorium verò aut nardum bibat. Bibat etiā rutam in vino nigro dulci ieiuna, aut sine vino. Si verò vinum non fuerit dulce,

Profluuiū
post partū.

Quæ lac
reparent.

Quæ post
partū eueniunt.

Hippocratis Liber I.

ce, melius est mel ammiscere. Edat etiam brassicam coctam cum ruta & mercuriali, & semen aliquod vtero commodū bibat. Si verò puerperij purgamenta in grumos fuerint coacta, & dolor in imo ventre fiat, porrum coctum, & quæcunq; sylvestria ac hortensia olera dato, verum omnia pingua facito: & per tertium quenq; diem sub clementi cælo lauetur. Frigus enim his inimicum est, & post balneū inungere melius est, & non multa calida vti. Quum secunda non statim exierit post partum, imi ventris dolores fiunt, in laterū molitudine, & rigore ac febres. Et si discesserit secunda, sanatur etiam mulier. Sæpe verò putrescit, & discedit sexta aut septima die, aut etiam prius. Huic autem dare oportet pharmaca quæ ego describam, & spiritum continere iubere. Omnium verò optimum noui artemisiā herbam, & dictamnū, & violæ albæ florem. Et silphij succus optimus est fabæ græcæ magnitudine in aqua potus. Et si secūdas excludere non poterit, a cibo absteineat, Et postea viticis folia trita in vino & melle oleo affuso tepefacito, & hemina mensuram bibendam dato.

Cur secūda remanet.

& exhibunt. Si mulieri secunda in vteris relicta fuerit, hoc sic cōtingit. Si per vim ruptus fuerit vmbilicus, aut ab obste trice vmbilico seca per imperitiā resectus, quæ videlicet vmbilicum pueri prius incidit, antequā secunda ex vteris exiisset, & vteri sursum retrahunt secundam, vtpote lubricam & diffusam, & in seipsis detinēt. Nam secunda ex vmbilico pueri hæret, & vmbilicus postremus ex vteris exit. Si enim prior

Cūm partus minor non exit.

exiret, non accederet per ipsum puero nutrimentū, quoniam ex ipso dependet. Quum in ventre habens fœtum corru perit, menstruum, aut bimestrem, & secundæ exire non poterint, fuerit autem tenuis: huius corpus tunc purgare oportet ac pinguefacere. Non enim prius exeunt fœtus putrefacti,

Cū secunda nō exit.

nisi fortes fuerint vteri, & probè compacti. Si mulieri secunda relicta fuerit, si non ampli fuerint vteri, purgatio ipsi minus quā oportet procedit, & venter durus fit ac magnus. Et frigus detinet, & febris acuta, & dolor per totum corpus, & ventris maximè partem eam quæ est infra vmbilicū: & grauitas fit in vteris, & tormen, velut fœtus insit. Et curata secūdam breui eiicit putrefactam, & sana euadit. Si ex partu

Cūm post partū vterus vlceratur.

vterus vlceratus fuerit, rosarum floribus curato. Sed & acerbis infusis colluatur. Si verò os eius vlceratū fuerit ac inflam matum,

A matum, myrrham, & adipem anserinum, & cerā albam, & thus, pilis leporinis sub ventre enatis misceto, & simul trita in lana apponito. Si ex partu vteri fuerint inflammati, febris debilis corpus tenet, & caligo adest. Ex ventre verò nunquā deficit calor, & sitit, & coxas dolet, & venter imus fortiter intumescit, & aluus turbatur. Secessus autem est malus & olidus, & calor vehemens corripit, & cibum auersatur, & dolor iuxta sinciput est, & ventris stomachus non potest trahere cibos ac potus, & cōcoquere nequit. & nisi curentur statim, plurimæ moriuntur. Venter autē est in causa. Sambuci igitur *Medela* folia tenerima, in crassiore tritici recentis farina cocta, leuiter tepida sorbeat. Dato & aquam mulsam, & vinum aquosum. Et pectinem cataplasmati frigefactoriis integito. Cibus autem quā minimū edat, & venter sistatur, & caput curetur. præcordiis verò & vterorū loco, cataplasmata adhibeto. Quum doluerit sedem, aut aliud quid, iuniperi baccas, *Quum sedes post partum doluit.* aut apij & vrticæ semen terito, ac bibendum dato. Si ex partu doleat, resinam terebinthinam, & mel, & vinum tepidū, sorbenda dato. Et si inflammati fuerint vteri, inde sedantur. Si verò non doleat vterorum locum, amygdalas amaras tritas, & oleæ folia tenera, & anisum, & irionem, & origanum, & nitrum. Hæc misceto, terito & vterorū collyria efformato. *Medela vterorum inflammatorum.* Si verò inflammati fuerint, & dolor habuerit, rosarum folia, cinamomū, & cassiam simul terito, & netopo affuso, plantaginis ac pastillos drachmales formato, easque in ollam nouam fistilem igne candentem mittito, circumlocatāque muliere ac vestibis contestā, in vteros suffito. Hoc dolores sedat. Si verò ex partu vteri doluerint, calor debilis habet. *Quum post partum vteri dolent.* verūm venter imus intus igne ardet, & ad coxendicem aliquando intumescit: & dolor habet imum ventrē, & laterum mollitudinem. Et secessus biliosi sunt, & graueolentes. & si non sistatur venter, derepentē moritur. Quum igitur sic habuerint, ventrem frigefacere oportet, cauendo ne horrescat. *Medela.* Bibat autem si non sistatur, aquam de crassiore tritici farina in ipsa macerata, & panis farinam edat. Sorbeat autem mali punici vinosi succum aqua dilutum, farina lentium inspersa. Et hoc coquito, misce lentem, & cuminum, & salem, & oleū, & acetum, atque hanc sorbitionem frigidam exhibeto. Lenticulam item acidam dato, & vinum vinosum pramniū in-

K

super

super sorbendum. Ab aliis autē cibis abstinere oportet donec **D**
 febris solvatur. Si verò visum fuerit, etiā lauetur. Si verò de-
 bilis fuerit, polentā bibēdā dato. Et si imbecillior sit, ex aqua
 frigida. Cibus autē exhibeto leuem, qui nō euacuet, vbi ca-
 lor remiserit. Morbus hic acutus est & lethalis. Si inflāmati
 fuerint puerperæ vteri, venter ardet, & magnus fit: & ad præ-
 cordia suffocatio habet. Quum sic habuerit, muscum mari-
 num quē super pisces iniiciunt, pro cataplasmate adhibeto.
 Verū in mortario misceto ac tundito, crudā ordeaceā fari-
 nam, & cinerē sarmentitiū, & lini semen tostum, & hęc oleo,
 & aceto subigito, & velut cyceonē crassum facito, deinde co-
 quito donec velut farinā subactæ massa fiat, atq; ita quā cali-
 dissima imposito: & si opus fuerit, etiam incidere facito. Si **E**
 puerperæ inflāmati fuerint vteri, intumescunt, & vbi puer-
 peri, purgamenta intus manserint, occultē distenduntur: di-
 stenduntur autem vbi cōdensati fuerint à frigore. His si qui-
 dem perfrigerentur, calefacere conducit. Si verò indamina-
 ti fuerint, & frigus discesserit, medicamentum subditiū fa-
 cere quod inflāmati aduersatur, & simul lauare, ac foue-
 re, & pharmaca adhibere, quæ ego describam, & vaporem in
 os ac nares attrahere. Si verò suffocet, lentes in aceto, & sale,
 & origano multo coquere, & attractionem facere. Et mer-
 curiale edat. & in succo eius tenuem farinā sorbeat: & quā ce-
 lerrimē ac prius quā dolor corripiat, pharmaca dato quæ
 vterorum dolores sedant: & cibos per aluum secedētes assu-
 mat. & si vter sit inflāmat, clystere adhibito quā citissi- **F**
 mē subluatur. Si vteri pituita fuerint impleti, status in vte-
 ris fiunt, & menses procedūt pauciores, albi pituitosi. Quan-
 doq; etiam sanguis tenuis sincerus, pelliculis plenus. Quibus
 dam etiā conturbatur, & ter in mense comparet: & præ hu-
 miditate cum viro cōmisceri non vult, neq; libidine ad hoc
 faciendum concitatur, & tenuis fit. Dolet autem imum ven-
 trem, & lumbos & inguina, & si mordeat id quod effluit, &
 exulceret osculi vteri circumferentiam summam, fluxionem
 diuturnam fore pronuntiatio. Et si nō multa fuerit fluxio, lē-
 ticulæ decoctum cum veratro exhibeto ad vomendum. De-
 inde in nares infundito: & pharmacum deorsum purgans bi-
 bendum dato. A cibis autem acribus prohibeatur. Si verò
 grauetur, & frigeat, & torpedo habeat, lac præbeto, & vinum
 odorat

Quum in-
flamantur.
Medela.

Quū puer-
peræ le-
choeue in-
flamman-
tur.

Medela.

Quū stran-
gulatio tol-
latur.

Quū vteri
pituita im-
plentur.

profluuij
longi signa

Medela vl-
cerum vte-
rorum.

A odoratum. Bibat autē ieiuna hypericū, apij semen, saluiam, in vino odorato aquoso, & vteros medicamento ex vini face colluat, & si vlcerati fuerint, interpositis diebus duobus aut tribus, pharmaco ex grano cnidio eluat, & postea cum acerbis lauet. myrti ac lauri decocto, & medicamento ex flore argenti illinat. Morbus autem est grauis & pauca effugiunt.

Si verò acetabula pituita plena fuerint, menses fiunt pauciores, & si in ventre habuerit, corrumpit vbi foetus fortior factus fuerit. Non enim corroboratur, sed defluit. Cognoueris autem hinc. Humida sit, & quod defluit mucosum & viscosum velut à ventre defertur, & non mordet, & in mensibus postquam sanguine purgari desierit, per duos aut tres dies, muci ex vteris prodēunt, & horror tenet, & calor non acutus, verū non deficit. Hanc succo grossorum colluito, à

Cum acetabula vultu pituita plena sunt.

B quibus omnis aqua purgatur, & hoc iterū atq; iterum. Postquam autem purgata fuerit, de cetero acerbis vtatur. Apponat autē mollia, à quibus pituita purgatur, & foueat vteros medicamento ex lauro, & colluat pharmaco ex aceto, & aromatis suffitum faciat, postquam menses cessarint, postea verò à cibis & balneis abstinere oportet. Coeat autem cum viro, & cibos ac vinum parca sumat, & calidè degat, & tegumenta cruribus circūdet, & oleo illinat. Si aqua intercus in vteris nascatur, menses pauciores & prauī fiunt, & ante tempus deficiunt, & imus venter intumescit, & mammae solidae, molles fiunt, & lac malum. Et putat se in ventre habere, & ex his cognosces quod aqua intercus est. Sed & in vterorum osculo significationem de se præbet. Ad tactum enim gracile & humidum apparet, & rigor ac febris corripit. Quanto verò magis tempus processerit, tanto magis dolor habet imum ventrem, & lumbos, & laterum molliitudinem, ac inguina. Hic morbus ex abortu fit. Sed & ex aliis causis, & quum menses fuerint occultati. Hanc multa calida lauare oportet, & tepefactoria adhibere si dolor habuerit, Postquā autem sedatus fuerit, pharmacum infra purgans bibendum dare oportet, & vteros medicamento ex bubulo stercore fouere. Deinde id quod ex cantharide paratur apponere, & biduum aut triduum intermittere. Et si robur affuerit, ne topo colluere, & si venter mollis fiat, & febres cessent, & menses secundum rationem prodeant cum viro dormiat, &

Medela.

Aqua intercus vteri.

Medela huius quæ.

in medicamentis subdititiis perseveret, & interposita die D
crethmi corticem bibat, & pæonia grana nigra quinque, &
sambuci fructum in vino ieiuna. Et mercurialem quàm plu-
rimam edat, & allium crudū ac coctū, & mollibus ad som-
num vtatur, & multa potione, & aliis mollibus, & obsoniis
marinis potius quàm carnibus, & si peperit, sana euadit.

Hydrops
vulvæ.

Si hydrops in vteris fiat, menses pauciores fiunt ac dete-
riores, & per longius tempus, & pauciores quàm oportet, aut
paulò plures, & venter intumescit, & locus supra pectinem,
& tibi, & lumbi. Vbi verò multum temporis processerit, &
in ventre habuerit, corrumpit ac eiicit, & aqua cum ipso fœ-
tu effunditur, & mulier plerunque moritur. Sanguis autem
corrumpitur, & aquosus redditur. Huic lac bibendum dato, E
& peplum album potandum, donec fœtus moveri poterit.
Quin & ante hoc vt plurimum fœtus corrumpitur, & per
abortum eiicitur, & vteri sanguine & aqua manant. Hac au-
tem patitur nihilo magis ex labore, quàm aliter. Cognosce-
re verò poteris quòd hydropss est, ex digiti contactu. Depre-
hendes enim osculum ipsorum gracile & plenum humidi-
tate. Si verò fœtus in ipsa non circa initia, sed iam bimestris
corrumpitur ac suffocatur, tunc & venter imus intumescit,
& ad contactū dolet, velut vlcere præsentē, & febris magna
ipsam ac dentium fremitus corripit, & dolor acutus & vehe-
mens pudenda, & imum ventrem, & lumbos, & laterum
mollitudinem, & coxas. Quum sic habuerit, calida ip-
sam lauato, & si dolor habuerit, tepefactoria adhibeto, ex F
perimento facto de eo quod maximè admittat, & pharma-
cum deorsum purgans bibendum dato. intermissione verò
facta per tempus quantum tibi satis esse videbitur, & collui-
to, & foneto, & cyclaminum melle subactum, ac linteo ex-
ceptum, ad os vterorum apponito. Et cupressi ramenta in
aqua madefacta, eodem modo apponito. Verum hæc breui-
ore tempore, & per longius temporis interuallum, quàm ma-
gis mordent & lancinant. Et specillum stanneum paratum
immittito, & digitum eodem modo. Portiones quoq; biben-
das dato, quascunq; maximè libenter admiserit, & cum viro
dormiat, maximè opportuno tempore præsentē. Si enim ge-
nituram cōceperit, & prægnās facta fuerit, ac pepererit, sub-
purgantur, & ea quæ prius in ipsa fuerunt, vnà cū ipsis puer-
perij

Aperij purgamentis subeuntia. Atq; sic maximè sana fieri poterit. Si mulier aqua intercute laborarit, splene ipsius magno & aquoso existente. Fit autè splen aquosus ab hac affectione, quum febris habuerit, & nō dimiserit hominē, & sitis ipsum corripuerit fortis, & biberit, ac non reuomuerit. Nā quod in vesicam penetrat, per vrinam eiicitur. Reliquum verò splen capit, abstrahēs à ventre ad seipsum, vt qui rarus est & spongiformis, & secundum ventrem situs. Et si his sic habentibus non exudari, neque aliud laxetur, ab hoc splen attollitur, & hoc magis si aqua fuerit potus. & si quis ipsum contingat, mollis est velut mollissima pluma siue lana: quandoq; verò etiam renititur. Eleuatus autè & impletus, distribuit per ve-

Causa hydropis in foemina.

Bnas corpori, & maximè in omentum, & locos circa ventrem, & crura. Altera enim pars ad alterā delegat in corpore, vbi singulis plus quàm oportet effluerit, & continere nō poterint. Succedit autem ex hoc semper hydrops, vbi splen ad seipsum trahere consueuerit, quum natura rarus sit ac mollis.

Lienis natura.

Quibusdā verò hoc morbi principium fit sine febre, si calor quidē in ventre cōstituerit, velut pituita in ipsum collapsa. & si homo sitim nō cōtinuerit, neque vesica, neq; venter, vrinā & stercus iusto modo excolarint: neque commoda diætā homo vtatur. Si verò hydropica fuerit, prodeunt menses multi derepēte quādoque verò pauci. Et fiunt aliquādo velut aqua à carnibus, sicut si quis cruentas carnes abluisset, aliquando vero paulo spissiores, & non cōgelantur. & anhelatio ipsam corripit priusquam menses prodeunt. & dolor in splene, & magis si quid dulce ederit. & venter attollitur ac magnus fit. Et vbi plura quàm solita est ederit, dolet ventrē, & lumbos aliās atque aliās dolor vexat. & febris ipsam paulatim corripit. postquam autem depurgata fuerit, meliùs sibi habere videtur superiorum respectu. postea ad idē relabitur. & si cureretur velut conuenit, sana euadet. Sin minus, & fluxus cōparet, & per omne tempus semper fluet paulatim velut serosa sanies, & ampliore curatione opus habet. Si verò fluxus nō succedat, sed vteri à prioribus menses non laxarint: tunc & venter ipsi magnus erit, & grauitas intus erit, velut in ventre habenti. & velut puer in ventre ipsius moueri videbitur, nimirum dum vteri aqua pleni sunt, & aqua mouetur. Aliis enim atque aliās fluctuat in ipsis aqua, velut in ventre pars

Hydropides mulier quæ patiatur.

Signa huius mali.

Hippocratis Liber I.

Languen-
tis & medi-
ci error.

infra vmbilicum ad cōtactum dolet. & clauiculæ, & thorax, & facies, & oculi attenuantur, & mammæ attolluntur. Quibusdam verò & venter, & crura aqua implentur. Quibusdā autem alterum horū, & si quidē ambo impleta fuerint, nulla spes est de hominis vita. Si verò etiam alterum horum, modica spes est si curetur, & non valde fuerit attenuata. Diuturnus est autem hic morbus. Et fiunt omnia magis his quæ non pepererunt, fiunt autem sæpe etiam his quæ pepererūt. Periculosa verò sunt velut dictū est, & plerunq; acuta & magna, & intellectu difficilia, eo quòd mulieres participāt morbis, & aliquando neq; ipsæ sciunt quòd agrotant, priusquam morbos experiātur à melibus, & seniores factæ fuerint. Tūc autem & necessitas, & tēpus, ipsas morborū causam docet. Et & quandoque non cognoscentibus ex quo morbo agrotent, morbi incurabiles fiunt, antequam doceatur rectē medicus ab agrotante ex quo morbo agrotet. Verentur enim narrare, etiam si sciant: & præ imperitia ac ignorantia, turpe sibi id esse putant. Sed & medici simul peccāt non exactē causam morbi percunctantes, sed velut viriles morbos sanātes, & multas noui iam ab huiusmodi affectionibus corruptas.

Vterorum
vulceratorū
signa.

Quare statim causam exactē interrogare oportet. Multum enim differt muliebrium morborum ac virilium curatio.

Morbi
caussa.

Si vteri fuerint vlcera, sanguis & pus purgatur, & fœtor grauis oboritur: & dolor acutus corripit lumbos, & inguina, & in imum ventrem. & dolor sursum procedit ad laterum mollitudinem, & ad costas, & ad scapulas. Aliquando etiam ad clauiculas peruenit, & mordetur, & caput vehementer dolet, & delirat. Progressu verò temporis tota intumescit. & debilitas ipsam corripit, & animi deliquium, & febris tenuis, & perfrigeratio. Intumescunt autem maximè crura. Morbus autem corripit ex abortu, si qua corrupto ac putrefacto intus puero, non fuerit expurgata. & calor totum corpus tenet. Corripit etiam ex fluxibus, & si in

Medela.

ipsis acria fuerint, & biliosa mordeant. Si in hoc modo habentem incideris, vbi quidem dolores habuerint, multa calida lauato. & tepesfactoria adhibeto qua parte fuerit dolor. & si quidem supernè fuerint dolores, & mulier fortis est, totam fomentato, & pharmacum deorsum purgans bibendum dato. & vbi tempus anni fuerit, serum coctum insuper bibend

Abibendum præbetò, per dies quinque, si id facere poterit. Si verò non fuerit serum, lac asinum coquito, & per dies tres aut quatuor bibendum dato. Post lactis autè potum, cū aquis ipsam reficito, & cum cibis cōmodis, carnibus ouillis tene ris recentibus, & volucrum: & beta, & cucurbita. Abstineat autem à salis & acris, & marinis omnibus. Et à carnibus porcinis, & bubulis, ac caprinis. Edat autè panes. Si verò ani mi deliquia teneant, & non valida sit, & perfrigeretur, sorbi tionem accipiat. Sunt autè quidam qui his caput dolentibus lac bibendum præbēt, quia caput dolent. Alij aquam, quia animo linquantur. Ego verò vice versa, si caput dolent, & mente percellantur, aquam commodā puto. **Quæ refi- ciant.**

Bmordentur, & acris sunt quæ pungunt, lac his lenitatem in- ducit. Vbi verò tibi valida esse videbitur, vteros colluito, pri- mū medicamentò ex vini fece postea interpositis diebus tribus aut quatuor, eo quod cum brassicæ decocto tepido pa- ratur. Et rursus intermissis diebus tribus eo quod cum bu- tyro paratur eluito. Et si vbi hæc feceris sanescant vteri, eo quod cum malicorio paratur colluito. Super vlcera verò ar- genti florem, & gallam, & myrrham, & thus, & spinæ Aegy- pticæ fructū, & cenanthen sylvestrem, & chrysocollā, & squa- mam æris, & loti ramēta, & crocum, & alumen Aegyptium combustum illinito. Horum singulorū vnā aqualis sit por- tio. Alumen verò & gallam, & crocum, vna omnium portio ne sumito. Hæc omnia trita ac permixta in vino albo dolci **Quid capi tis dolorem sedet.**

Cdiluito, deinde coquito donec mellis crassitudo fiat, & dato ut cum hoc pharmaco bis in die vlcera inungat, vbi aqua te- pida prius lauit. Coquantur autem in aqua, & hederā, & sal- uia. Et vbi tibi hæc facienti melius habere visa fuerit, lac ca- prinum coctum præbibendum vna die dato. Postea verò lac bubulum præbetò eodē modo velut in prioribus. post lactis autem potum, per cibos quā maximè crassifacito, & ut in ventre habeat facito. Sana enim fiet. Plerunque vero ex hoc morbo euadunt, & steriles fiunt. Senioribus autem nō val- de quid horum accidit. postea verò bibenda sunt pharmaca, lini semen torrefactum, & sesamum, & vrticæ semē, & pao- **Signa vte- rorū ylce- ratorum.**

niæ radix amara, hæc in vino nigro odorato trita bibat. Si vteri vlcera- ti fuerint, & sanguis, & pus, & serosa sanies fuit: putrescentibus enim vteris, morbus ab ipsis fit, & venter

**Merbi cau-
sa.**

Medela.

imus eleuatur, & attenuatur, & ad contactum dolet, velut D
 vlcere praesente. Et febris ac fremitus ipsam occupat, & do-
 lor acutus ac vehemens inuadit pudenda, & pubem, & imum
 ventrem, & lateris mollitudinem, & lumbos. Morbus au-
 tem maxime corripit ex partu, si quid in ipsis diuulsum co-
 putruerit. Itemque ex abortu, & alias sua sponte. In has si in-
 cideris, aqua multa calida lauato, & qua parte dolor habue-
 rit, tepefactoria adhibeto & spongiā ex aqua calida expres-
 sam, & colluito acribus & acerbis vitatis. mollioribus vero
 ammixtis, prout tibi tempestiuum esse videbitur, & lini se-
 men ac sambuci fructum tundito, & ammixto melle phar-
 macum facito, atque hoc vtitor. calida vero aqua lauato. Et
 acceptam spongiā, aut mollem lanam, in aqua calida tingi-
 to, & pudenda ac vlcera expurgato. Deinde in vino meraco, E
 rursus spongiā aut lanam tingens, eodem modo vttere. Et
 postea pharmaco hoc inunge, quoties tibi tempestiuum esse
 visum fuerit. Postea resina & adipe suillo mixtis simul illi-
 nito saepe interdiu ac noctu. postea vero lini semen torreto,
 tundito, ac cribrato: & peplum album in polenta tundito ac
 cribrato: & caseum caprinum affato, & sordes ac falguginem
 deradito, & pinguitudinē eius, & polentae pollinem ammis-
 ceto. Sit autem vna pharmaci mensura, & casei, & polen-
 tae. Haec bibenda dato mane ieiunae, in vino austero dilu-
 to. Ad vesperam autem misceto, & crassum cyceonem pra-
 beto, & quicquid muliercula maxime libenter admiserit bi-
 bendum dato. Et donec quidem sanguis multus fluxerit, & F
 dolores acuti habuerint, & modico tempore intermiserint,
 haec facito. Postquam autem vlcus minus fuerit, & dolo-
 res debiles apprehenderint, & per longius tempus, phar-
 ma bibenda dato a quibus purgetur deorsum magis quam
 sursum, & intermisso tempore quantum opportunum esse vi-
 sum fuerit, lenibus fomentis foueto, muliere in alto colloca-
 ta, prout tempestiuum esse videbitur. Haec si fecerit, sana
 euadet. Morbus autem est lenior & lethalis, & paucae ipsum
 cum valde effugiunt. Si vero vehementer exulcerati fuerint, sanguis
 vlceraeque & pus purgatur, & odor fit grauis. Et quum dolor appre-
 hendit vteri. henderit, velut a partus dolore fiunt ea quae circa fluxum co-
 tingere solent. Et quum tempus affuerit, crura & pedes in-
 tumescunt. Et curant medici hunc morbum velut hydro-
 pem

A pem, verum hictalis non est. Hanc si curandam acceperis, primum calida lauato, & calefacito. Et acribus ac mollibus & acerbis, & aqua & vino colluito. Et polycarpon, & polycnemon, ac mel simul coquito, deinde lanam in his tingito, & pudenda illinito. Et resinam, ac mel, & pinguedine suillam illinito. Et bibendum dato semen lini ac sesamum torrefactum, & butyrum, & caseum caprinum, & polenta in omnibus. Bibat autem in vino ieiuna. Ad vesperam vero plurimum mellis affundito. Et donec quidem sanguis purgetur, & dolores acuti habuerint, & modico tempore intermiserint, hoc facito. Quum autem ipsi minus prodierit, & dolores debiliores per longius tempus tenuerint, pharmacum deorsum purgans bibendum dato, ac finito. Hac si fecerit, sana euadet. Sobolis autem spes non adest. Quacunque ulcerationes in vteris sunt, ex abortu, aut alia quadam causa, eas omnes respectu ad totum corpus facto curare oportet, quacunque curatione opus habere visum fuerint, siue ex vniuerso corpore hominem curandam esse putaueris, siue ex ipsis vteris. Cognosces autem an ab ipsis vteris sint, hoc modo. Quae enim ulcerationes ab ipsis vteris sunt, purgatione exhibent purulentam & compactam: quae vero non ab ipsis, tenuem & saniosam. Quum igitur tenues sunt fluxiones, cum pharmaco eas curare oportet, & dare quod & sursum, & deorsum purget. Primum autem sursum. Et si quidem post pharmaci portionem, fluxiones pauciores sunt ac faciliores, intermissione facta rursus eodem modo medicari oportet. Post pharmaci portionem, talem victum praescribito, ex quo homo ipsa quam siccissima fiat. Id autem continget, si toti ipsius corpori, per tertiam aut quartam diem, fomentum adhibueris, & a fomentis statim vomitus feceris. post vomitus autem & fomenta, dietam constituito ex illuue, & aquae potu, & panis cibo, nullo vero obsonio, quam vino nigro meraco. Nullo item olere. Quum vero vomitum praeparas, multis & acerbis oleribus opus habes, quibus ipsam impleas, multis etiam cibis, & obsonio quodcunque voluerit. Et ut impleas ipsam multo vino aquoso, & ut a fomentis ipsam laues multa calida. Atque haec quidem curatio est huiusmodi fluxionum. Melius tamen est ut utrasque pharmacis cures, & vomitum procures, & sursum trahas. Dieta vero siccatoria melior est,

Medicina
post dolores.

Causa ulcerum.

Cognitio.

Nutricatio
post portiones.

Quis vomitus
prouocetur.

& illuuijs. Cæterum vteros hoc modo curare oportet. Pri-
Smegma. mum quidem fouere sambuci folijs in aqua coctis. Deinde
 post fomētum smegmate ex vini fece colluere. Et si quidem
 putredo in vlceribus fuerit, & quæ exeunt graueolētia, sme-
 gmate meraciore. Si vero nihil tale, aquosiore. post fecem
 autem, cū aqua in qua cocta est myrtus & salvia. Postea verò
 cum vino colluere, meraco, albo, tepido. Quum autē mor-
 detur iam à collutionibus, tunc iam pura sunt vlcera. collue-
 re igitur oportet fece aquosiore, & vino nigro. post vinū ve-
 rò, adipem suillum recentē liquato, & pinguedinem anseris
 si affuerit, sin minus, aliam, maximè gallinaccam, aut ex vo-
 lucrum gente. Si vero neq; hæc adsit, oleum vetus ex oliuis
 ammiscero, atque hoc tepido colluito post vinum, per alium **E**
 clysterem in os vteri infuso. Et si fuerit vlceratum, linamen-
 ta ex mollitorijs facta apponito. Et si hæc subdita ardorem
 induxerint, his ademptis mulierē aqua tepida lauari iube-
 to: tali quali colluebatur. Si verò ad hanc diætā fluxiones
 non discedant, pauciores tamen fiant, & vehementer mor-
 deant, & ea quæ effluunt bilis fuerint ac salsugo: & nō solum
 internas partes, sed etiam externas exulcerent, diætā trans-
 mutare oportet, & totam humectare, quò fluxiones quàm
Medela. aquosissimæ fiant, & minimè mordaces, balneis multis cali-
 dis, maza, oleribus coctis omnibus pinguibus piscibus car-
 tilagineis, cum cepis & coriandro, in muria dulci coctis: eo-
 quantur autē pingui modo: carnibus coctis omnibus, exce-
Cibus. pta bubula & caprina: His enim percoctis cū anetho & fœ- **F**
 niculo: vino mellei coloris, fuluo, aquoso, vberiore lactis po-
 tu cum vino dulci. Reliqua verò de collutionibus iuxta re-
 latum modum facito. Atque hæc quidē est eiusmodi fluxio-
 num curatio. Quum verò purulenta & compacta exierint,
 harum quidem totum corpus non mouere oportet. Verū
 colluere, & per collutiones totā curationem facere. Colluere
 autem oportet cū iisdem infusis, quæ prius dicta sunt eodem
 modo. Conscribentur tamen etiam aliæ collutiones. Vlcē-
 rum curatio. Ceruinum adipem recentem ac viridem sub-
 dito. Omnia verò statim vino siræo siue sapa colluere opor-
 ter. Optimum autē est cerussa, si vlcera fuerint, & oleo nar-
 cissino. Cibus autem mollissimis vtatur, non acribus. Si ve-
 rò sordida fuerint, & proserpant, ac proximum locum mor-
 deant,

A deant, purgato, & nouam carnē producito, & carnem ad cicatricem perducito. facile enim resoluuntur, & maligna fiunt. & frequenter lauato. Si verò mulier ex abortu vultus accipiat, aut ex medicamentis subdititiis vteros exulceretur: Qualia multa semper mulieres faciunt ac medicando excitant, & foetus corruptus fuerit, & mulier nō purgetur, sed vteri inflammati fuerint vehementer ac conclusi, & purgationem emittere non poterint, nisi primum emittāt sanguinem qui est in foetu. hæc si quidem curetur, breui sana euadet, verum sterilis. Si verò puerperij purgamenta ipsi sua sponte eruperint, & vlcerata sanata fuerint, etiam sic sterilis erit. Si verò purgatio quidem ipsi fiat, vlcerata autē non purgentur, **B** periculum est ea putredinosa esse. Si verò purgatio prodierit ipsi iam afflictae ac extenuatae, moritur. Quin & si in partu vteri valde fuerint exulcerati, foetu non secundum naturam exeunte, eadē patientur quæ patitur ea quæ ex corruptione foetus vteros vlceratos habet. Et trāsmutationes ac fines eodem morbus habet, siue ex foetus corruptione: siue ex partu vteri fuerint vlcerati. & si puerperij purgamenta omnia prodierint, minus dolēbit, nisi magna vlcerata fuerint. Et si curetur, breui sanescit. Oportet autem curā cito adhibere, si vlcerata in vtero fuerint. Nam vt quæ in tenero loco sunt, cito augescunt, & breui putrescunt. Curare verò oportet vlcerata, **Cum vteri partu vel abortu vlcerantur.** **Curatio.** vel etiam ea quæ in reliquo corpore sunt, Nimirum vt inflammationem arceas, & repurges, & repleas, & ad cicatricē perducas. Danda est autem aqua in potum, vinum minimè. cibos item paucos, ac minimè multos exhibeto. Quicunque abortus facti discedere non possunt, dum aut toti, aut partes foetuum sunt maiores, aut minores & obliqui ac impotētes, tales siquidem secundum naturam siti fuerint, pharmaco aliquo dato ex his quæ ego referam expellito, vbi multa calida praelaueris. Et si prodire volentes, nō facile exeant, quum siti sint secundum naturam, talibus sternutatorium admo- uero. Apprehendito autem nasum, & os comprimito, ac sic sternutet, quo sternutatio quā maxime efficax sit. Utatur item concussionibus. Sic autem cōcussionem facito. Lectum altum robustum ac instratū sumito, & mulierem supinā reclinato. pectus verò & axillas ac manus, fascia aut molli lato loro ad lectū alligato ac cingito, & crura incuruato, & mal- leolis

leolis apprehensam detineto. Quum autē sic disposueris, sar-
 mentorū molliū fascē, aut aliquid huic simile parato, tantū
 quantus sufficit, vt lectū nō negligat excipiendo ipsum, dum
 in terrā proiicitur, quo nō pedibus iuxta caput, terrā contin-
 gat. Postea verò ipsam manibus lectū apprehēdere iubeto, &
 lectū ad caput sublimem habere, vt decliuis sit in pedes, ani-
 maduersione habita ne prona sit homo ipsa. vbi vero hęc fa-
 cta fuerint, & lect' sublimis fuerit, retro sarmēta supponito
 maximē autē dirigit, quo pedes terrā non contingant dum
 lectus proiicitur, & vt sint intra sarmenta. Eleuent autē duo
 viri ex utroq; pede hinc atq; illinc, quo in directū lectus ca-
 dat, planē ac æqualiter, & cōuulsiō ne fiat. Concutiendum est
 autē maximē vnā cū partus dolore. Et si quidē discedant, sta-
 tim quiescendū. Sin minus, interstitio factō rursus cōcutito,
 & in lecto gestatam attollito, ac agitato. Atque hęc quidē sic
 facienda sunt, vbi rectē & secundū naturam discedant. Opor-
 tet autem cerato liquido præillinare, quod in omnibus hu-
 iusmodi circa vterū affectionibus optimū est: & malux aquā
 affundere, & fœnigraci, aut potius ptisanæ triticeæ succum.

Quum par-
 tus nō rite
 procedunt,
 quid agen-
 dum.

Oportet autem vsq; ad inguina, sedem & pudendum fovere,
 & insidere, vbi partus dolores maximē infestarint, & nihil
 aliud mēte versare. eā verò quæ medicatur, oscula mollibus
 aperire oportet, & leniter hoc facere. Umbilicū verò vnā cū
fœtu attrahere. Quicumque verò duplicati cōplicantur, & in
 osculo vterorū incumbunt, eos siue viui fuerint, siue mortui,
 rursus retro protrusos vertere oportet, quo secundū naturā in
 caput exeāt. Quum autē retrudere voles aut vertere, supinæ
 ipsi reclinatæ molle quiddā sub coxas substernere oportet, &
 sub lecti pedes, quo altiores sint hi à pedibus, semper aliquid
 supponere. Sed & coxæ altiores capite sint, & vt nullū cerui-
 cal sub capite sit prouideto. Quū verò retrusus fuerit fœtus
 & hinc atq; illinc obuoluitur, vt secundum naturā constitua-
 tur, & quicquid sub lecti pedes supposuisti ac lapides, & quic-
 quid sub coxas subdidisti, subtrahito. Capiti verò puluinar
 subiicito. Atque talia hoc modo curato. Quicumque verò
 fœtus viui, manū aut crus foras præmittunt, aut etiā ambo:
 eas oportet quā celerrimē vbi exitum significarint, prædicto
 modo intro retrudere, & in caput vertere, & ad viā reducere.

Cum par-
 tus viuis
 manū vel
 crus emit-
 tit, & cum
 mortuus,
 quid agas.

Et quicūq; fœtus cōplicatur, ad lateris mollitudinē, aut coxā
 in par

A in partu collapsū, eos dirigere ac vertere oportet, & in aquam calidā delidere facere, donec mulier refocilletur. Quicunq; verò fœtus mortui, aut crus, aut manū, foras proteudunt, eos optimū quidē fuerit, si id fieri posset, intro retrudere, & ambas has partes in caput vertere. Si verò hoc fieri non poterit, verū intumescit, secare hoc modo. Dissectū per scalpellū caput, cū cōtusorio instrumēto, vt ne in ramēta findatur cōtundito, & ossa per osiū volsellā, aut tractoriū instrumētū, iuxta clauiculā immissum, prout habuerint extrahito, non multis simul, sed paulatim exēptis, ac rursus ablatis. Quū verò hæc foras extraxeris, & in ipsis humeris fueris, ambas manus in articulis cū ipsis humeris secato. Et vbi hæc extraxeris, si quidem fieri poterit vt exeāt, etiā reliqua facile extrahito. Si verò nō obediāt, totū pectus vsq; ad iugulū findito. Verū caueo ne in ventrem feces, & aliquid de intestino denudes. Exit enim vēter, & intestina, & stercus. Si verò horū quid excidat, maioris negotij iam res fit. Contundito autē costas, & scapulas contrahito. Et facile postea reliquum fœtus procedet, nisi iam vētrē tumidū habuerit. Si enim tale quid fuerit, melius est vētrē fœtus leniter perforare. Flatus enim solū à ventre exit, & sic facile prodibit. Si verò exciderit manus, aut crus, in mortui fœtus, si quidē fieri poterit, ambas partes retrudito, & fœtū rite dirigit. Hoc enim optimū fuerit. Si verò fieri nō poterit vt hoc facias, quicquid sanè foris fuerit quātum potes penitissime resecato, & reliquū profunditate intus explorata protrudito, & fœtū in caput vertito. Quū autē vertere ac secare puerū voles, vngues de manibus tuis resecato. Scalpellū verò quo dissecas, incuruū potius sit quā rectū, & huius caput occultato per indicē digitū eodēmq; interna explorato ac deducito, ita vt caueas ne vterū cōtingas. Caterū molæ cōceptus hæc causa est. Quū multi mēses, modicū & morbosum semen cōceperint, neq; cōceptus rectus sit, & venter plenus est velut pręgnātis. Nihil autē in vētre mouetur, neq; lac in māmīs generatur. Mammæ autē turgidæ sunt. Hęc igitur ad duos annos, sæpe etiā trēs, sic habet, & si quidem vna caro fiat, mulier perit. Neq; enim fieri potest vt superstes maneat. Si verò plures, erūpit ipsi per pudēdū sanguis carnosus plurimus, & si hoc moderatē fiat, seruatur. Sin minus, à fluxu correpta perit, & morbus quidē talis est. Iudicāre verò oportet.

ex

Partus quo ex plenitudinis mole, & quod in vētre nō mouetur. Nā mas **D**
tus in vtero trimestris, fœmina quadrimestris motū habet. Postquā igitur
moueat. tur tēpore hoc prætergresso nō mouetur, nimirū hic morbus

Curatio
molæ.

Puerperia
purgatio-
nis mensu-
ra, & color.

Magis læ-
dit abortus
quā par-
tus.

Lactis pro-
creatio.

est, est autē hoc magnū signū, quod lac in māmis nō genera-
 tur. Hāc igitur maximē quidē ne curato. Aut certē cū prædi-
 ctione. Et primū quidē totū corpus foueto. Deinde per sedē
 clysterē adhibeto, quo sanguis multus erūpat. Fortassis enim
 quod cōpactū est cōmoueris, id quod fœtus esse putatur, mu-
 liere à pharmaco cōcalefacta. Sed & vteros colluito, quo san-
 guinē educas. Sin minūs, subdititiis vtatur fortissimis ē bu-
 presti. Et dictānū creticū in vino bibat, sin minus, castoris te-
 stem. Et retro cucurbitā ipsi ad laterū mollitudinē affigito,
 & plurimū sanguinē detrahito. Atq; hoc maximē rerū ac vi- **E**
 rium ipsarū coniectura facta facito. Et hactenus quidē dictū
 est de morbis à puerperij purgamētis fiētibus. Sunt autē pe-
 ricula in ipsis nō parua. Acuti enim sunt, & citō trāsmutātur,
 & magis affliguntur primipatæ, quā quæ sunt partuū ex-
 pertæ. Prodeūt autē puerperij purgamēta sanæ mulieri suffi-
 cienter, primū sesquiheminē mēsurā, aut paulo plura, postea
 adhuc pauciora iuxta hāc rationē, donec cessent. Prodeūt au-
 tem velut sanguis à victima, si sana velut dixi, mulier fuerit.
 & sana futura est, & cito cōgelātur ac purgātur, & post partū
 plerūq; sanæ mulieri cōtingit vt post puellæ partū, in qua-
 draginta duobus diebus diuturnissima purgatio fiat, extra
 periculū autē est etiā si vigintiquinque diebus purgetur, post
 masculi verò partū, purgatio diuturnior fit in triginta die- **F**
 bus, extra periculū est etiā quæ in viginti diebus cōtingit, &
 in his quæ fœtus corruerūt secūdū horū dierū rationē pur-
 gatio cōtingit, & in iunioribus quæ corruerūt paucioribus
 diebus. In senioribus autē, pluribus. Exdē verò sunt affectio-
 nes ex puerperij purgamētis, & ei quæ corruit fœtus, & ei
 quæ peperit, si menstruū corruerit fœtū, & quæ corruerūt
 magis periclitātur. Corruptiones enim grauiorē sunt quā
partus. Nō enim fieri potest vt citra violētiā fœtus corrūpa-
 tur, aut pharmaco, aut potu, aut cibo, aut subdititiis medica-
 mentis, aut aliquā alia re. Violētiā verò malū est. In huiusmo-
 di enim periculū est ne vteri exulcerentur, aut inflāmentur.
 Hoc autē est periculosum. At verò lac quomodo fiat, dictū est
 à me in natura pueri in partu. Postquā autē pręgnans fuerit
 mulier,

A mulier, menses nō valde prodeūt, prater quā quibusdā pauci.

Dulcissim⁹ enim humor ex cibis ac potib⁹ ad mamas vertitur ac exsugitur. Et necesse est etiā reliquū corp⁹ magis euacuari & minus sanguine plenū fieri. Atq; hoc ita contingit. Sunt autē quæ natura sine lacte sunt, & quibus lac deficit ante tempus. Hæ verò natura solidæ sunt. & densæ carnis. & ppter ea sufficiens humor nō penetrat à ventre in mamas, quum via sit densa. Ad menses detrahendos. Elaterij portiones duas sumito, & adipē ouillū de rhenibus, pari elaterij portione amisceto, & non cōterito, verū duas glādulas subdititias facito. Aut melāthium ex tritico terito, & aqua subigito, & duas glādulas formato, atq; has ante dies quibus affuturi sunt apponito. Si enim nō prodeūt, rigores ac febres inducūt. Mollitoria, à quibus aqua & arena purgatur, ducunt etiā menses, si nō fuerint diuturni, & osculum emolliunt. Narcissum, myrrhā, cuminum, thus, absinthium, cyperum, singula æqualib⁹ portionibus sumito, narcissi verò solum quatuor portiones: & puluillū stupæ dum pectinatur crudū linū ammisceto, & hæc cū aqua origani cocti terito, ac glandē formato & subdito. Aut cyclaminū magnitudine tali, & aris florē magnitudine fabæ terito, & cum melle glandē formato, ac apponito. Aut pulegiū, myrrhā, thus, fel suis ac bouis, cum melle subigito, & glandē efformato. Si menses non prodeant, adipem anseris, & netopum, ac resinā permixta ac lana excepta apponito. Medicamētum subdititium, purgatoriū, mollitorium, Caricam percoctā ac expressam leuissimè terito, & in lana

C subdito cū rosaceo vngueto. Aut acris brassicæ & rutæ, vtriq; dimidium terito, ac vtror eodē modo. Purgatoriū. Medullam anseris aut cerui magnitudine fabæ affuso vngueto rosaceo & lacte muliebri terito velut pharmacū teri solet, & cum hoc os vteri illinito. Aliud subdititium molle. Medullam anseris magnitudine nucis, cerā magnitudine fabæ, resinæ lētiscinæ aut terebinthinæ magnitudine fabæ. Hæc cum rosaceo vnguento ad lentum ignē liquefacito, & velut ceratum efficito, deinde ex hoc tepido os vteri illinito, & pectinem irrigato. Aliud purgatorium. Farinā recentē, myrrhæ obol. iij. croci tantundē, castorij obolum, hæc trita cum vnguento irino apponat. Aut vrticæ semen, & malux succum, ac anseris adipē simul permixta subdat. Aliud subdititium purgato

Cur quædā lac non habeāt aut ab eo deserantur. Mensium prouocatio.

Diuerſa de hac re medicamēta.

Hippocratis Liber 1.

purgatorium. si menses non compareant. Syracē & origanū terito, & permixtis adipem anserinum affundito ac apponito. D

Aliud quod vteros expurgat, ac sanguinē euacuat. Absinthij radicem tritā, melle ac adipe anserino ammixtis apponito. Aliud purgatoriū. De buprestis caput & pedes, & alas tollito, & reliquū ipsius terito, ac ficus internā partē ammisceto. Sit autē pinguitudinis ficus portio dupla. Hoc vteros inflat. Hoc etiā desperatis optimū est. Aut mercurialis folia trita subdito. Hoc tenuē biliosam purgationem ducit. Sed & artemisia facit velut mercurialis, & melius purgat. Veratrū quoq; nigrū cum aqua tritū, velut aquā à carnibus ducit. Sed

& alumen ac resina idē facit cyperū, absinthiū, aristolochiā, cuminū, salem, mel. Hæc oīa simul terito ac apponito. Et ver- E

ratrum cū vino dulci, & farina lolij ac tritici, melle subacta in lana subdatur. Subdititia si catapotia nō purgarint. Mercurialē, myrrham, violam albam, cepam, acerrimā, & melanthium ac mentā, si sufferat, permixta apponito. Subdititia acria sanguinē ducentia. Cātharidas quinque, demptis pedibus ac capitib. & myrrhā ac thus simul misceto, & mel addito. Deinde in oleū rosaceum aut Aegyptium tinctū per diē subdat, & vbi mordet, tollat. & rursus in lac muliebre ac vnguētum Aegyptiū tingat, & hoc per noctē apponat. & aqua odorata perluat. & apidē subdat. Conduxerit & buprestis, si quidem parua fuerit, sine alis & pedib. ac capite. Si verò magna fuerit, non cōmisceto eadē quæ cātharidibus, sed solā sumito ac similiter apponito. Si verò molliore opus habuerit F

ad buprestim vinum & cuminū Aethiopicū immisceto, vūā item passam & pollinem seselis ac anisi. & vinū feruefacito, eōq; affuso reliqua terito, & pastillos drachmales efformato eōsq; apponito myrrha ac thure ammixtis: facito autē eodē modo velut cū cantharidibus. Aut melanthium ex tritico, tritum ac melle subactū apponito. Aut hoc ipsum melanthiū cum melle tritum velut glandem effacito, circum pennam autem obducito. Subdititium efficax. Succum mandragoræ & cucurbitæ syluestris, cū lacte muliebri apponito. Aut fecē siccā ex vino veteri albo vrito, & vino extinguito ac subdito.

Cucurbitā item syluestre, mercurialē, nitrum & irionem. Citius detrahit & madragoræ radix, cātharis, serpyllū, lauri fructus, vnguentum irinum, laurinum. Tichymali succū permi

A permisceto ac agitato, & detracto visco, erui magnitudine exhibeto. Optimū est & glādē subdititiā ex eo facere. Si verò amplius prodierit, vino proluatur. Aut æs vstū dissoluito, & tepidū lana excipito ac apponito. Medicamentū ad cōceptū. Conceptoria. Cedriæ acerabulū, adipis bubuli drach. iiii. simul terito, & talorū figuras efformato, quas ieiuna apponat, & dū appositas habet per diem ieiunet. Apponat autē bis, mane & vesperi, post mēses post cœnā verò lauetur: & cū viro dormiat. Aut melanthiū contūdito, & in linteū illigato, & adipe anserino addito, subdendū dato. Aliud ad cōceptū. Quo cures mulierem vt in ventrē cōcipiat, vrinā sumito veterem, & ferri recrementuum tantū, vt in fragmenta resolvere possis. postea

B mulierē in sella collocato, & corpore & capite velato, peluīque ad pedes supposita, ignita recremēti ferri fragmēta tria pro vna vice iniicito. Sit autē vetus hæc vrina cōgij mensura, & cum his triginta fomētis ipsam foueto. Dum autem fomentū adhibes, caput lauato, ita vt donec fota fuerit rursus lapides illos recremēti ferri in vrina extinguas, & fomētum rursus calefacias. Postea verò caput lauato plurimū, polio & viticis foliis quā plurimis in aqua coctis. Hæc autē facito ad dies septē. Ter verò per singula hæc fomēta suffito, antequā laues. A balneo verò oleo laurino inungatur. post cœnā autē, vbi cepas melle tinctas comedit, & aquā mulsam tepidā quatuor heminarū mensura bibit, & paululū continuit, vomat. & supina reclinata, rutā habeat auribus & narib. inditā. Et

C panem fermentatum sexta chœnicis parte, in iusculū volucris confringat, habeat autē hoc iusculum apiij chemā, & sic assumat: & rursus tātundem in cœna dato. Et hoc per dies septem facito; postea verò veteri per dies septem clysterē adhibeto, Sit autem infusum clysteris, resinæ drach. iiii. mellis acetabulum, olei plataënsium tantundem, fursurum recentium succus, spuma nitri, oua tenuia. Sit autem infusum heminx octo, & ex his tres succi ptisanæ. Obliquæ verò clysterem adhibeto, & parum lauato. Apponat etiā glandes septē in die, & detineat donec fuerint liquefactæ. Sint autē ex thure, nitro, galbano, melle cocto. Cibo verò eodem vtatur. Suffito autē asini albi pilos, & lupi stercus. De his plurimū prunis iniice, ipsamq; circumlocatā ac cōtectā suffito, cauendo ne cōburas. Si verò mulier parere nequeat quæ prius peperit,

L

rit,

Quā conce-
ptus pare-
tur.

Conceptus
reparatio.

rit, nitrum & resinā, & myrrhā, & cuminum Aethiopicū, & D
unguentum simul terat, & apponat. Aut pulegiū ficcū in lin-
teo subdat. Bibat autē pulegium vbi dormire volet. Aliud
ad conceptum. Victus rationem mulieri cōstituere oportet,
quæ prægnans fieri cupit, & ad edendum ac bibendum exhi-
bere ipsi, quæ libēter admittit. Viro autem mulieris reliqua
dato, præter alliū, & cepā, & legumina fresa cocta, & silphij
succum, & quæ inflant. Ab his sanē absteineat. Medicamētum
quod similiter infunditur si nō concipiat. Lac mulieris ma-
sculum alentis, grana mali punici recētis terito ac succum
exprimito, & testudinis marinæ partē inter anum & puden-
dum cōburito ac terito, & hæc in pudēdum muliebri infun-
dito. Aliud quod similiter infunditur nō cōcipiēti. Lac & re- E
sinam, & mali punici dulcis succum, Hæc omnia melle am-
mixto infundito. Aliud ad cōceptum. Bulbi albi semē aut flo-
rem cum melle terito, & lanæ inuolutum per triduū ad vte-
rum apponat. Quarta verò die, maluā syluestrē latifoliā te-
rat lacte muliebri ammixto, & lanæ inuolutā apponat. dein-
de cum viro dormiat: præforbeat autē pulegium in farina
coctum, & bibat pulegiū tenue in vino. Si verò huic nō obe-
diat, conyzā odoratā cōtundat, & expressum succū vino mix-
tum ieiuna bibat. Aliud. Asparagi semen similiter in vino
bibat. Aliud. Secundā mulieris, & vermium carniū capi-
ta, & alumē Aegyptium, cum adipe anserino diluito, & in la-
na ad os vteri apponat. Aliud. Aeruginē, florem æris, vtrun- F
que oboli dimidij pondere, thuris masculi, aluminis scissi,
fructus vitis syluestris, gallæ, myrrhæ, malicorij, resinæ, polij,
singulorum obolum, in melle tritum, per triduum bis in die
apponat. Si verò fortassis acrius fuerit, anseris adipem ac ni-
trum tostum ammisceto. Vinū autem exhibeto, fortitudinē
in ipso vitans. Aliud ad conceptum. Vermem carniū qui
caudam habet accipito, & de ipso tres aut quatuor partes su-
mito: & origanum tenuem simul cum rosaceo vnguento te-
rito, & hoc ad vteri os apponat. Aliud. Portulacā cum adipe
anserino, & myrrha, & porri semine, & felle bubulo teri-
to, & lanæ inuoluta ad os vteri apponito. Si menses quidem
siant multi, non cōcipit autem, floris æris obolos duos, & alu-
minis scissi tantundem, cum melle terito, & lana excipito.
Illiget autem mulier lanā in linteū cum filo, & sibi ipsi sub-
dat,

Cucumeris sylvestris quicumq; albus fuerit semē ceræ infarcito, deinde lanæ rubræ inuolutum lumbis alligato. Si verò pregnans multo tēpore cohibeatur, & parere nō possit, sed diebus pluribus ex partus doloribus laboret: Sit autem

Cōceptum
impediētia
Partum ac
celerantia.

L 2 iunen

Hippocratis Liber I.

iuuenis, in vigore, & multo sanguine referta, secare oportet **D**
 venas in malleolis, & sanguinē detrahē, viriū respectu ha-
 bito, & postea calida lauri corticibus incoctis lauato. Viticis
 autem semen, & dictānum creticā, vtrunq; pari portione, in
 Quæ puer- vino albo aut aqua bibendū dato. Subdititium autem medi-
 peria pur- camentum facito galbano, & baccis lauri, & oleo rosaceo, in
 gent. lana inuolytis ac subditis. Aliud. Filicis quercinæ radicem
 tritam in vino bibendam dato, & adiantū tritum in oleo di-
 lutum illinendum, & in vino meraco bibendū dato. Aliud,
 quod puerperæ puerperij purgamēta melius purgat. Testu-
 dinis marinæ hepar viride adhuc viuētis, in lacte muliebri
 terito, & cum vnguento irino ac vino subigito, & apponito.
 Aut mercurialem tritam in lana apponito, Aut artemisiā tri- **E**
 tam similiter in lana subdito. Aut mercurialis & cucumeris
 syluestris parum terito, & vino ac melle subactū apponito.

Purgatoriū puerperij purgamentorum ex partu. Triticū
 trimestre fractū ac fresum, dimidię chenicis mēsurā, in aquę
 heminis quatuor coquito. Quū autē efferbuerit ter aut qua-
 ter, sorbendū dato. Aliud. Sambuci folia in aqua coquito, &
 aquā bibendam dato. Edat autē & brassicas coctas, & por-
 rum, & sceniculum, & anethū, & polypos, & locustas piscicu-
 los. Aut rhois folia & erysimū ex vino, aut polentæ pollinem
 bibendū dato. Aut misy duorū obolorū pōdere tritū ac vino
 subactum apponito. Purgatorium mēsiū & puerperij pur-
 gamentorum. Ducit etiā aquā & alia. Radicis struthij tusi
 triti quantum tribus digitis apprehendi potest, melle sub- **F**
 actū apponito. Nascitur autē in Andro in littoribus. Aliud
 similiter purgans. Erysimū in aqua coquito, & vbi ebulliit
 oleū affundito, ac bibendum dato. Commodum est etiā suc-
 cum pro fomēto adhibere per suffitum, & cibis molliorū vti.

Aliud quod puerperij purgamēta purgat. Erysimum pla-
 cide terito, & corticē diffiato. Quum autem purum feceris,
 leuiter terito, & aquā adstillato, salēmq; ac oleum ammisce-
 to, & vbi polentam insperferis coquito, ac sorbendum dato.

Aliud. Si non descenderit purgatio, aut puerperij purga-
 menta nō prodierint. Cucumeris syluestris internā partem,
 trium obolorum pōdere sume, & artemisiā herbā, & thus
 oboli pōdere, & hæc trita, & melle ammixto, lanæ inuoluta,
 ad vteri os appone. Et hoc semper noctu ac interdiu per dies
 quinque

A quinque facito. Aut viris pampinos aut folia viridia terito, & melle ammixto lana excipito, & eodē modo subdito. Aut cupressi fructū & thus simul trita, rosaceoq; ac melle diluta, & lana excepta apponat. Aut abrotoni drachmā, & cucumeris sylvestris medullæ obolum, & thus cū melle terito, & in lana inuoluta apponito. Aut elaterij obolū, & myrrhā, cum melle terito, & lana excepta apponat. Aut cupressi fructum, & cucumeris sylvestris internam partem, & thus, melle ammixto, in lana subdat. Purgatoriū si ex partu nō purgetur. Puerperæ purgatio diuersa. Trifolium in vino bibendū dato. Idē etiā appositum menses erumpere facit, & fœtum eiicit. Purgatorium vterorū, quū puero mortuo sanguis in hoc māserit. Cucurbitā sylvestrem tritā cum melle delingat, aut apponat. Ad omnia puerperij purgamenta si nō probē prodeant. Erysimum coquito cum polenta, & oleo affuso vbi coctū fuerit sorbeat: & cibis molissimis vtatur. Aut scāmoniā cū lacte muliebri tritam, ac lana exceptā apponito. Aut radicem dulcem melle, & rosaceo aut Aegyptio vnguento subactam, in lana subdat. Aut farinam lotā similiter apponat. Bibat autē crethmi: & seselis, & rutæ, & silphij semen, ita vt de singulis obolos duos simul terras, & in vino meraco, si non febricitarit, præbeas. Subditium quod secundam relictam eiicit. Ex sambuci foliorum decocto prius fomentum adhibeto, & id quod ex cantharide fit apponito. Hoc & ea quæ debilia sunt sanat. Si verò lancinet ac mordeat, statim tollito, & lanam rosaceo tinctā subdat. Secundam quæ educant. Potiones quæ secundam educere possunt, & menses detrahē, itēque fœtum euectum. Cantharidas quinque, alis & cruribus ac capite auulsis, & tribulum ad mare natum cum radice ac foliis tritum conchæ mensura, & euanthemi, ac seminis api j tantundem, & sepiæ oua quindecim, in vino dulci temperato bibenda dato. Et vbi dolor habuerit in aqua calida desideat, & aquam mulsam aquosam bibat, & vinum dulce. Alia. Ranunculi foliorum ac florū triti, stateris Aeginæ pondus, in vino dulci bibat. Si verò dolor habuerit, cicer album & vuas passas, in aqua coquito, perfrigerato, ac bibendum dato. & vbi vrinæ scilicidium vexarit, in aqua tepida desideat. Aliud quod eiicit secundas. Cucumeris sylvestris succum in mazam conspersum apponat, vbi prius ad biduum ieiunarit. Hoc nullum aliud præstantius

Hippocratis Liber I.

Fœcundita inueneris. Fœcunditatis experimentũ. Caput allij integrum **D**
 tis experien deraſum appone,& vide an per os oleat. Aliud experimẽtũ.
 tia.

Netopon modicũ lana inuolutũ apponito,ac videto an per
 os oleat. Alia ſubdititia. Scorpij marini fel,lana exceptũ &
 in vmbra ſiccatur appone. Aut pulegiũ ſiccatur & tritum ac
 melle ſubactũ,in lana apponito. Aut florẽ æris cũ melle lin-
 teolo illigatur ſubdito. Aut cucumeris ſylueſtris ſemen,& te-
 ſtam cõbuſtã,cũ vino ſubigito,& leporinis pilis ac lana exce-
 pta ſubdito. Aliud ſubdititiũ. Alumen Aegyptiũ lana inuo-
 lutum apponito. Aut cãtharidas tritas vinõq; ſubactas ſubdi-
 to. Aut artemiſiã herbã vino ſubactã apponito. Aut melan-
 thium cũ vino tritũ in lana ſubdito. Aut bulbion ex tritico
 tritum & vino ſubactũ apponito. Aut vini veteris albi facẽ **E**
 comburito,& vino albo extinguito,teritõq; ac in linteo ap-
 ponito. Aut galbanũ,& netopon,& miſy cũ roſaceo vnguen-
 to in linteo ſubdito. Aliud. Elaterij potiones duas,& fauum
 cum vino in linteo apponito. Aut butyrũ & alumen melle
 ſubacta ſimiliter. Aut ſcammoniaẽ ſuccũ & adipẽ cum maza
 miſceto,& vino imbuta in linteo apponito. Potiones quæ
 poſſunt ſecundã in vtero detentã educere. Colocynthidis ſyl-
 ueſtris internã partẽ cum lacte muliebris tritã,in linteo appo-
 nat. Ad idẽ. Silphium magnitudine fabæ in vino bibendũ
 dato. Aliud quod fœtũ expellit. Mulierẽ ſub alis apprehen-
 ſam fortiter cõcutito. In potu verò dato,viticis folia in vino,
 Aut dictãnum creticũ oboli pondere in aqua terito ac exhi-
 beto. Aut conyzæ graueolẽtis manus plenã mẽſurã cũ porri **F**
 ſucco diluito,& netopũ chemæ plenã menſurã addito,atque
 hæc trita in vino bibẽda dato. Aut tadã pinguiſſimã cũ vino
 dulci coquito, trium cyathorũ mẽſura vini affuſa,& galbani
 obolos tres & myrrhã adiucito,& vbi cocta craſſa facta fue-
 rint, tepida bibenda dato. Aut porri ſuccũ,& myrrhã,& vinũ
 dulce ſimul exhibeto. Aut portulacæ ſemen terito,& in vino
 albo veteri dato. Aut populi nigræ creticæ grana nouẽ in vi-
 nõ trita bibat. Aut ranunculi herbæ foliorum ac floris triti,
 drachmæ æginæ pondus, in vino dulci bibat. Si verò adhuc
 ſecunda intus detineatur, Senectæ anguiũ obolũ in vino teri-
 to,ac bibendũ dato. Aut apij radicẽ,& myrti baccas coquat,
 & per dies quatuor bibat. Aut cuminũ Aethiopicũ,& caſtorij
 obolum,& cãtharidis parũ hæc in vino bibẽda dato. Aut fœ-
 niculi

Quæ fœtũ
 expellant.

A niculi radicē, & in vino & oleo ac melle feruefactā bibat. Si secunda nō prodierit, conyzam tritā in lana subdito. Melius autē est vt bibat. Aut conyzæ quātum manus capit, & porri succum, & netopū chemæ mēſura miſceat, & hæc in vino bibat. Aliud quod ſecūdā eiicit. Holoconitidis dulcis radicē, eſt autē velut bulbus, & parua velut oliua: Hæc in vino terito, ac bibendā dato. Et ſi quidē parua fuerit duas dato. Si verò maior, vna ſufficit. Ammiſceto autē ex ſeminibus cuminiū Aethiopicum, & ſefeli maſſiliēſe. Aut ſilphij libyci ſemē ſicum chœnicis dimidiæ menſura, in vini heminis tribus coquat, & ad dimidias redigat, & de hoc bibat. Aliud. Viticis ſemen, & ſefelis, pari portione ſimul cū myrrha terito, & cū

B aqua bibēda dato. Alia ſecundas expellētia. Viticis albæ recentis acetabulum, in vino albo odorato tritū bibendū dato. Aliud. Caſtorij aut ſagapeni obolū, bituminis drach. j. nitrī drach. ij. Hæc omnia terito, & in vino dulci, ac olei hemina dimidia obolos duos ieiunæ bibēdos dato. Et calida probe lauato. Aliud ſimiliter habens. Herinaceos marinos tres totos tenuiter tritos, in vino odorato bibendos dato. Aliud. Mentæ fasciculū paruum, & rutæ & cōriandri, & cedri aut cupreſſi ſemē, in vino odorato bibēdum dato. Et de herinaceis ſi habuerit, plurimū ſorbeat. Poſtea verò ſimiliter calida lauato. Aliud. Aniſum, cedri baccas, ſemen apij, cuminum Aethiopicum, ſefeli, ſingulorū dimidiū acetabulū, tenuiter tritum, ex vino albo bibendū dato. Aliud. Diſtamni fasciculū,

C & dauci ſeminis drach. ij. & melanthij tantundē, tenuiter terito & in vino albo bibenda exhibeto, & multa calida lauato. Dato autē iuxta corporis robur. Aliud. Galbanū oliuæ magnitudine, in oleo cedrino tritum apponat. hoc corrūpere & eiicere morātes ſecūdas poteſt. Aliud ſecundarū expulſorium quod vteris infunditur. Quum ſecūda à frigore mortificata cōputruerit, vbi ventus frigidus fuerit, crocum leuiter tritum drachmæ pondere, cū adipe anſerino infundito, & ad plurimum tēpus ſinito. Potus ad idē probe cōferens. Conyzā ſuaue olentē, & mel, & reſinā terito, inq; vino odorato, aut in ſyrmæa portione moderate purgāte bibenda dato, & calida lauato. Alius ſimilis potus ad puerū & mala intus exiſtentia. Aeruginē tritā cum melle, & ſyrmæa portione, bibendā dato. Aliud ſubdititiū, ad eiiciendū ſœtum immortuū. Aeris

ramenta in molle linteū indita, ad os vteri apponito, & pro-
 fueris. Aliud. Testā recentē, & adipē anserinū terat ac appo-
 nat. Aliud. Nitrū cū resina coctū, & in glandē efformatum,
 gallinaceo adipe tinctū appone. Aliud. Charien appellatur
 herba, huius radicē non multo adeo tēpore ad vmbilicū ap-
 ponito. Aliud. Cucurbitā syluestrē, & murium stercus, leui-
 ter trita apponito. Aliud quod alligatur. Resinā & adipem
 gallinaceum, trita ac simul mixta, super vmbilicū ac ventrē
 deliget. Aliud subditiū. Hedera alba semen, & cedri ra-
 menta terat, & glādes hinc factas subdat. Aliud. Testudinis
 marinae cerebrū, & crocum Aegyptiū, & salē Aegyptiū teri-
 to, misceto, glandes formato, ac subdito. Suffimentū expulso-
 rium quod & sanguinē ventris expellere potest. Salicis folia
 in ignē posita suffito, & mulierē circumlocatā finito donec
 fumus in vterū intrauerit. Abortus sanatio. Quum mulier
 abortum fecerit, & puer nō fuerit egressus, siue putrefactus
 fuerit, & intumuerit, aut aliud quid eiusmodi passus fuerit.

Abortus.
sanatio.

Porri & apiij succum per linteū expressum, de vtriusq; colli-
 gito, & olei rosacei heminā, & adipis anserini quadrantem
 adiicito, resināq; obolos tres in oleo liquefacito, & vbi mu-
 lierē ad pedes altiorē feceris, in vteros infundito, ac decum-
 bens ad plurimū tēpus cōtineat. deinde ad dies quatuor desi-
 dere iubeto, & egreditur puer putrefactus. Sin minus, salem
 Aegyptium & cucurbitā syluestrē viridē accipito, & melle
 ammixto trita edēda dato. Et postquam ederit, hinc & hinc
 moueatur. Aliud. Salē Aegyptiū, & murium stercus, & cu-
 curbitam syluestrē sumito, & mellis semicocti quadrantem
 affundito, & resinā drach. j. in meliniicito, & cucurbitam ac
 muriū stercus, omnia probē cōterito, & in glādes efformato,
 eāsque ad vterū subdito, quā diu opportunū esse visum fue-
 rit, Aliud expulsoriū, quod puerū enectum eiicit. Helxinē in
 vino tritā bibendā dato. Aliud eiectioniū, quod puerū liuidū
 expellit. Veratri nigri radices tenues tritas. quātum tribus
 digitis apprehendere potes, & myrrhā magnitudine fabæ, in
 vino dulci bibēda præbe. Aliud expulsoriū. Coriandrū cum
 radice, & netopū apponat, ac deambulet. Aliud quod infun-
 ditur, si mortuus fuerit puer, ut ipsum eiiciat. Crocum teri-
 to, & anserinum adipē affundito, & excolata in vteros infun-
 dito, & ad plurimū tēpus relinquito. Ad fœtum immobilem
 corrumpendum

Partus im-
mortui eie-
ctio.

A corrumpendū ac expellēdū. Aluminis scissi drach.j. myrrhæ tantundē, veratri nigri obolos tres, in vino nigro leuiter trita, in glandes afformato. & apponito donec paulatim fuerit exolutus. Collutiones vteros purgātes, si ex partu aut inflammatione fuerint exulcerati. Grossos hybernos aqua affusa feruefacito, & excolato. Deinde oleo tepido affuso misce, & duas heminas ad summū infunde. Omnes autē collutiones nō ampliore quā hac mēsurā vteris infundātur. Malicorium itē & mānā thuris, in vino nigro austero coquito, & excolato vinū infundito. Alia collutio. Facē vini vstā liquefacito, & cū aqua infundito. Deinde malicoriū, myrti baccas, iuncum odoratū, lētes in vino coquito, & diffusum vinū infundito. Alia. Butyrū, thus, resinā, mel, simul liquefacito, & affuso vino, tepida infundito. Aut sambuci fructū in aqua coquito, & excolata aqua, apium myrrhā, anisum, thus, simul in ipsa terito, & vinū odoratū pari aquæ mensura affundito, excolatoq; per lintheum, & tepefactū infundito. Alia. Brassicam, & mercurialē, & lini semē, & linum viride, in aqua coquito, excolato, ac infundito. Aut foliorū myrti acetabulū, myrrhā, anisum, mel, resinā, vnguentū Aegyptiū, omnia terito ac vnito, affusisq; vini albi odoratissimi heminis duabus, excolato tepefacito, infundito. Aut lauri fructū & pulegium in aqua coquito, & vnguentū rosaceū affundito, & cū hoc tepido colluito. Aut anseris adipē resinæ ammisceto, affusq; ad hoc vino, tepefactū infundito. Alia. Butyrū & oleum cedrinum, in modico melle tepefacito ac infundito. Aut mel, butyrū, iuncū odoratū, calamum odoratū. muscū marinū sumito, & in vino coquito, excolato, ac infundito. Aut apij semen, seselli, myrrhā, anisum, melāthium, in vino coquito, & excolato vinum infundito. Aut cedrū in vino coquito, & cum vino colluito. Aut hederā in aqua coquito, & aquam infundito. Aut elaterij, aut cnestri portiones duas in aqua coquito, & duas heminas ex hac tepida infundito. Aut cucumeris syluestris interioris magnitudinē digiti in duabus aquæ heminis coquito, & melle ac oleo ad aquam affuso infundito. Aut radice thapsiæ portiones duas leuiter terito, affusq; oleo ac melle, in duabus aquæ tepidæ heminis diluito, ac infundito. Aut veratri nigri portiones duas, vino dulci & aqua dilutas infunde. Aut grana caidia sexaginta terito, mellēq; ac oleo

L 5

& aqua

Cum par-
tus nō mo-
uetur.
Lotiones
diuersæ.

& aqua affusa infundito. Collutio corroboras, si vlcera pura **D**
 fuerint. Grossos hybernos terito, & aquam affundito, & per
 totā diē macerato, & oleo affuso colluito. Aut malicoriū, &
 loti ramenta in vino nigro coquito, & infundito. Quū autē
 impura fuerint, & sordes deferuntur, facē vini vnā, cū vino
 & aqua infundito. Aut malicoriū, rhoem coriariū, myrtiq;
 ac rubi folia, in vino nigro coquito ac infundito. Collutio-
 nes quæ infunduntur ad vetera vlcera. Succo brassicæ cocto
 collue. Et mercurialē similiter ac nitrum rubrū modicum
 ammisce, & myrrhæ acetabulū, thus, seseli, anisum, apij se-
 men, netopū, resinā, mel, adipē anserinū, acetū albū, vnguen-
 tum albū Aegyptiū, Hęc omnia simul trita, & vini albi hemi-
 nis duabus diluta, tepida infunde. Aut mercurialē in aqua **E**
 coque & excola, & myrrhæ acetabulū, thus, seseli, netopū, sin-
 gulorū pares portiones adde, ac tepida infunde. Aut saluiā
 & hypericum in aqua coquito, & cū aqua colluito. Aut sam-
 buci fructū, & lauri baccas, æquis portionibus in vino coqui-
 to, & cū vino colluito. Aut pulegij aqua colluito. Aut adipē
 anseris in resina liquefacito, & similiter oleū cedrinū modi-
 cum affundito, & cū melle liquefacito, ac tepida infundito.

Aut argēti florē in vino & melle ac cera liquato, & cyperū,
 & iuncū odoratū, ac calamū (quæ sanē etiā in vnguentū am-
 miscētur) & iridē ac muscū in vino coquito & infundito. Aut
 apij semē, anisum, seseli, Myrrhā, melāthium, in vino coqui-
 to ac infundito. Aut cedrum creticā in vino coquito, aut in
 aqua, & infundito. Aut hederā creticā in aqua coquito ac in- **F**
 fundito. Atq; hæc faciēda sunt si vulnus habet, & myrrhā in
 aqua dilutā infunde. Aut elaterij portiones duas cum aqua
 infunde. Aut colocynthidas syluestres duas in vino aut in
 lacte cocto, quatuor heminarū mēsurā macerato, & excola-
 to, aut infundito. Aut cucumeris syluestris interioris, palmi
 magnitudinē in aquæ heminis quatuor coquito, & melle ac
 oleo affuso colluito. Aut radice thapsiæ duas portiones, in vi-
 no dulci dilutas, cū aquæ heminis duabus, tepidē infundito.

Aut veratri portiones duas in vini dulcis heminis duabus
 dilutas infunde. Aut thlaspios acetabulum melle ammixto
 in aquæ heminis duabus dilue, & tepido vtere. Aut cucume-
 ris syluestris magnitudinē palmi, & cneori potionē vnā, in
 aquæ heminis quinque coquito, & melle ac oleo affuso col-
 luito.

A luito. Aut grana cnidia sexaginta, in melle aut in oleo diluta, cum aqua infundito. Si ex partu alui profluuium corripiatur. Bibat uua passam nigrā, & punici dulcis malicoriū, & internū nucleū, & coagulum hœdi. Hęc vino nigro diluta, & caseo caprino, ac polenta triticea inspersis, bibenda dato.

Triticū autem modice torreto. Si verò ex partu sanguinē vomat, huic hepatis fistula sauciata est. Hęc lac asini bibat, deinde vaccæ nigræ, ad quadraginta dies. Et sesamū tritū donec probè habeat. Bibat autem lac ieiuna. Si ex partu sedem doleat, iuniperi fructū & appij radicē coquat, & ad dies quatuor habeat, & lactuce semen cum anserino adipe tritū edat. Si verò ex partu vteri inflāmati fuerint, solani succum infundito,

Sanguinis
vomitus
caussa.

B aut betæ, aut rhamni. Si ex partu crus ab vteris claudū factū fuerit, & exurgere non poterit, semen hyosciami chemæ mensura, in vino nigro ad triduū bibat. Si verò mēte percellatur ipsa bibēs, lactis asinini periculū bibendū dato. Deinde pharmacum à quo pituita purgatur, ex sandaracha aut & cerato, & pilis leporis, per triduum suffitus fiat. De inflāmatione ex partu. Si ex partu vteri inflāmati fuerint, solani succum intra pudēda infundito. Aut apij, aut rhamni, aut betæ, aut cucurbitæ succū expressum. Aut sambuci medullā ac tenerrimā partem derasam, oblōgam indito. Aut absinthiū in aqua terito, & lana exceptū subdito. Si verò horruerit tollito. Aut cotyledonis folia, & porrū, in crassiore tritici farina corquito, & oleo ipsis affuso præbeto. Bilem ex vtero purgantia.

Contravert
rorum in-
flammati-
nem.

C Cucumeris sylvestris internā partem tritā ac melle subactā. in glandē efformato ac apponito. Pharmacū autē dare oportet, qđ sursum ac deorsum purget, & calida lauare apponere vero anisum, aut melanthiū: aut colocynthidis sylvestris internā partē terito, & melle subactā apponito. Aut elaterij portiones quatuor, ammixto adipe anserino aut caprino, in oblongiorē glandem redactas apponito. Aut nitrū, & cuminū, & allium, & ficū oīa leuiter trita & melle subacta apponito. Calidaverò lauet, & à balneo bibat. Aut thlaspi leuiter tritū & melle subactū apponito. Aut ficus veteris pinguitudinē derasam elaterij portionib⁹ duab⁹ ammixtis, & nitro tm̄ quantum est elateriū, cum melle subigito ac apponito. Aut peucedani tres cyathos bibēdos dato. Et anisum ac melanthiū vino diluta bibenda dato. Aut elaterij portiones quatuor, adipe ouil

Diuersæ
medelæ.

**Collutiões
variz.**

**Pituitosa
& biliosa
lauatio.**

pe ouillo ammixto apponat. Et hoc ablato aqua odorata la-
uet, quæ leniter adstringat. Aut elaterij potiones tres cū ouil-
lo adipe, in glandē circū pennā efformato, & vbi amouerit,
sufficienti aqua probe eluatur. Aut thlaspi potione cū melle
dato. Collutio si biliosa fuerit. Elaterij potiones duas
aqua dilue, & oleū narcissinū affunde, & cum tepido collue.
Aut colocynthides syluestres duas in lactis asinini cocti he-
minis quatuor macerato, & vnā excolato, ac oleū narcissinū
ammisceto, & infundito. Alia collutio biliosa & pituitosa.
Cucumeris syluestris internā partē palmi magnitudine, in
aquæ potabilis heminis quatuor coque, & melle ac oleo anthi-
no ammixto infundito. Alia pituitā & bilē purgans. Gra-
na cnidia sexaginta, melle ac oleo anthino ammixto, cū aqua
infundito. Aut cnestrū in aquæ potabilis heminis quinque co-
quito, & duabus excolatis, mel & oleū anthinū cum narcissi-
no ammisceto, ac colluito. Collutiones purgatoriæ. Grossi
hyberni vsti in aqua macerantur, & ad aquā excolatā oleum
ammiscetur, ac infunditur. Postea verò collutio fiat ex mali-
corio, galla, lori ramētis. Hæc autē in vino nigro coquere o-
portet. Aut facie vini vsta vtere cū aqua. Et postea hæc infun-
dito, myrti folia & rhoem coriarium. Coquātur autē in vino
nigro odorato. Et postea lētisci folia, & hypericum, & saluiā,
cum vino nigro odorato cocta infundito. Aut cum brassicæ
aqua, in qua mercurialis cocta sit, modico nitro adiecto, col-
luito. Aut elaterij potione, cū oleo narcissino aut anthino, te-
pidam infundito. Si verò biliosa fuerit, colocynthidas duas,
in lactis asinini cocti quatuor heminis macerato, & cū exco-
lato colluito, oleo narcissino aut anthino ammixto. Aut cu-
cumeris syluestris internā partē palmi magnitudine, in aque
potabilis heminis quatuor coquito, & melle ac oleo anthino
addito, colluito. Hæc collutio pituitosæ ac biliosæ conducit.
Collutio pituitā trahēs. Granum cnidium, & mādregoræ li-
quorē terito cum aqua. Nā purgatio multa & oīs generis ex
hac collutione contingit. Aut allij caput integrū, nitrū, ficus
internam pingue partē, æquis portionibus trita ad gallæ ma-
gnitudinē efformato, ac apponito. Aut cumini folia cū vino
trita, in lana subdito. Aut radicē albā terito, & melle affuso
feruefactā in glandē redigito, ac apponito. Aut silphij liquo-
rē cum ficis emollito, & glandē efformato. Bonū est & cucu-
meris

A meris syluestris semē similiter tritum ac præparatū. Aut fel tauri, & nitrū rubrum, & netopū, ac cyclaminū, illorū quidē gallē magnitudinē, cyclamini verò ampliorē portionē, melle ammixto mulier quæ curatur apponat. Aliud subdititiū. Cyclamini caput purgatum aqua terito, & lana tenera exceptū apponito. Aut myrrhā, salē, cuminū, fel tauri, cum melle eodem modo. Aut grana cnidia triginta, & indici pharmaci oculorum, quod vocat piper grana tria, decorticato: & rotundi itē tria. Hęc autē terito, & vino veteri tepido diluta, instar glādis circū volucris pennā efformato, & sic adhibeto. Aut tithymali succum melle subactū. Aut scillæ radicē lōgitudine digitorum sex, duobus digitis lana obuolutis subdito. Aut

B ipsam scillā absq; radice terito, & similiter lana obuolutā apponito. Collutio si pituitosa fuerit mulier. Veratri potiones duas in vini dulcis heminis duabus diluito, & p̄mixta infundito. Si purgatione opus habuerit, porrum coquere oportet, aut sambuci fructum, anisum thus, myrrhā, vinum. Hęc omnia terito, & cū succo horū colluito. Aut brassicā in aqua coquito, & in huius succo mercurialē coquito, & nitri parū, & excolatum infundito. Aut cnestri portionē in melle dilutā immitto. Verū mēses cōsiderare oportet, an biliosi sint, aut pituitosi. Ad hoc arenā siccā tenuē in solē subiicito, & quū mēses prodierint, sanguinem superfundito, ac siccari finito. Et si quidē biliosi fuerint, sanguis in arena siccatus viridis euadit. Si verò pituitosi, velut mucus conspicitur. Si igitur pituitosi

C fuerint, cnestri portionē cum aquæ mulsæ hemina infundito. Purgatorium molle, aquā ducit & pelliculas, ac saniem subcruentā. Detrahāt & mēses, nisi diuturni fuerint, & vterorum os molliat. Vnguētū narcissinū, & cuminū quod editur, myrrhā, thus, absinthium, cyperū, vnguētum rosaceū. Horū singulorū pares portiones, narcissini verò quatuor partes sumito, & crudi lini puluillo dum à stupa depectinatur ammixto, omnia terito, & glandē circū pennā efformato, & linteo tenui circumdato deligato, & in oleum album Aegyptiū tingito, ac apponito, & per totā diem finito. Et vbi lauit & amouit, aqua odorata perluat. Aliud purgatorium. Ducit aquā & pelliculas, & mucus, & saniē subcruentā. Myrrhā, salē, cuminum, fel tauri, melle subacta & linteo indita apponito, & totū diē infusa finito. Deinde vbi lauit & amouit, aqua odorata perluatur.

Mensium
cognitio.

Purgamen-
tū ad mul-
ta.

rur. Aliud. Salē, cuminum, fel tauri, melle subigito ac subdi- D
 to. Et silphium ficui ammisceto ac apponito, Deinde vnguen-
 to rosaceo illinito. Aut grana cnidia decorticato portio-
 nēq; ipsorum terito, ac in glandē efformato. Aut allium &
 nitrū rubrū, & ficū, paribus portionib⁹ melle ammixto sub-
 denda dato. Et vbi amouerit, cerui adipē apponat in vino li-
 quefactum. Aut piperis grana quinq; cum modico elaterio,
 muliebri lacte instillato, in lana vngueto tincta apponat, ac
 amoueatur eodem modo. Aut pinguisimā ficus partē cum ela-
 terij portione, & nitri rubri ac mellis æquali portione, eodem
 modo. Aut fel tauri, nitrū rubrum, netopum, cyclaminū, pa-
 ribus portionibus, eodē modo cū melle in glandē efformato.

Aut fel tauri oleo Aegyptio tinctum apponat. Et eo amoto E
 rosaceum illinat. Aut cucumeris syluestris longi internā par-
 tem, exēpto semine, cū lacte mulieris masculū alētis, & myr-
 rhā purā, & modicum mel, & vnguentum Aegyptium, terito
 & apponito. Aut cucumeris syluestris partē internā siccato, &
 sine semine tundito, & adiecto melle feruefacito, & glādem
 oblongā efformato, atq; oleo albo tinctum subdito. Aut syl-
 uestrē cucurbitā eodē modo. Aut elaterij portiones tres cum
 farinæ massa terito, & glādē formato. Aliud similiter faciēs.

Grana cnidia decorticata triū potionū mēsurā coquito, &
 melle affuso apponito. Deinde rosaceum illinito. Quacūq;
 verò glandē subdunt, eas prius lanā in glandē infigere dein-
 de linteum tenue circumdare oportet, atq; sic oleo Aegyptio
 tinctam apponere. Ducunt autem hęc maximē, & pelliculas F
 auferunt, Subditiua purgatoria fortia, quæ aquā ducere pos-
 sunt, & mucos, & pelliculas, magis quàm priora. Piperis gra-
 na quatuor maxima, aut etiā parua, si opus fuerit, ad elaterij
 potionē ammixta terito, & muliebri lacte instillato, cū mo-
 dico melle subigito. Atq; hęc in lanā mollē circū pēnā obuol-
 uito, & linteo circumdato apponito, vbi prius in oleū Aegy-
 ptium tinxeris. Maneāt aut subdita per diē, & vbi amouerit,
 adipē cerui apponat. Portiones, similiter purgatoriæ, quæ se-
 cundas eiicere possunt, & mēses detrahē, & foetum enectū
 educere. Cantharides quinq;, alis & cruribus ac capite auul-
 sis: & tribulū ad mare natū cum radicibus ac foliis tritū con-
 chæ mēsurā: & euanthemi viridē siue luteā internā partem,
 & seminis appij tātundē, & sepię oua quindecim, in vino dul-
 ci temp

Purgatio-
 nes diuer-
 se.

- A** ci tēperato bibenda dato. Et vbi dolor habuerit, in aqua calida desideat, & aquā mulsam aquosam bibat, & vinū dulce. Alia. Ranunculi foliorum ac floris triti, eginei stateris pondus in vino dulci bibat. Cū autē dolor habuerit, cicer albū & vuas passas in aqua coquito, & perfrigeratam bibendam dato. Et vbi vrinæ stillicidiū vexarit, in aqua tepida desideat & vinum dulce bibat. Subdititia purgatoria si potiones non purgarint. Mercurialē tritam, ac myrrhā apponito. Aliud ad omnem morbum, & aperire, & purgare potens. Myrrham modicā & saluiam, & anisum terito ac vtitor. Purgatorium quod sterilem purgare potest. Si os vteri non rectē habuerit, stercus bubulū siccū tusum ac cribratū quatuor chœnicum mēsurā, & aceti heminas decē, & vrinæ bubulæ tantundē, & falsuginis marinæ heminas viginti, pro fomēto adhibeto, & ad multum tēpus hoc leniter facito. Deinde lota vbi lēticulę decoctum, & mel ac acetum mixta bibit, vomat. Et farinam forbendā dato: & vinum odoratū vetus sub dio per noctē expositum, insuper bibendū. Cibum autē ea die ne gustet. Sequenti verò granum cnidium deuorādum dato. Tertia verò pharmacū vrinā ciens exhibeto, ita vt vuas passas & cicer album, duarum chœnicum mēsurā sumas, & aquę semicōgios tres affundas. Deinde factā coctura excoles, & sub dio per noctem exponas, & postera die bibēdum prębeas: & subdititiis pharmacis vtatur. Aliud purgatorium mensium. Stercus bubulum velut cōchæ testā efformato, & cupressi ramenta amisceto ac subigito, & in sole siccato: & in hoc suffimēta iniicito, ac suffito. Aliud quod infunditur ad similem affectionem, si mēses non prodeant. Spinæ albæ folia trita, & excolata ac tepefacta infundito. Illitio purgatoria, quæ vteros purgat. Porri & nasturtij semen tritum, & vino ac lacte cocto dilutum, imo ventri illinito. Illitio mollitoria. Ducit aquā, & mucos, & pelliculas. Et puerperij purgamēta detrahit, & nō exulcerat. Myrrhæ optimæ dimidiā partē, & salis granum, & picem aromatibus conditā, cōtundito ac trita misceto. Sit autē myrrhæ dimidia pars, ad salē ac picē cōtusam. Hæc in linteum ad gallæ magnæ magnitudinem efformata immit-tito. Sint autem duo linteā, vt alterum in die, alterum nocte habeat, donec colliquescāt. Lauetur autem calida. Et deinde **Vt cōcipiat** vbi amouit, aqua odorata perluatur. Si voles mulierem con- **mulier.**
cipere

Hippocratis Liber I.

cipere, ipsam & vteros purgato. Deinde ieiunæ farinā eden- **D**
dā dato, & vinum meracū insuper bibendum, & nitrū rubrū
aut cuminū, & resinā, melle subigito, & in linteo subdito: &
vbi aqua defluerit, nigros subdititios talos ad emolliēdum
apponito, & cum viro concumbat. Si verò os cōclusum fue-
rit, etiā fici succum apponat, donec fuerit apertum, & statim
aqua eluat. Cæterum accipitris sterus in vino dulci terat, &
ieiuna bibat, & tunc viro condormiat. Aut vbi menses desie-
rint, anseris aut vulpis sterus, in rosaceo vnguento terat, &
pudendum illinat, ac condormiat. Si vlcera fuerint acria &
inflāmata, hac collutione vtere. Adipē anseris & resinam mi-
sce, & aqua tepida diluta infunde. Aut butyrū melle ammix-
tum liquefacito ac infunde. Aut bryoniæ albæ conchæ testā **E**
paruā deradito, & myrrhā ac mel similiter. Hæc in vino ni-
gro odorato diluito, ac tepidum infundito. Si vlcera aut
pustulis plena fuerint summa labra, carnē bubulā sumito, &
butyrum siue adipē anserinum, & anisum aut crocū, aut spo-
dium cyprium. Hæc omnia terito, & carni oblita apponito.

Si vlcera fiant ac mordeant, Bubulā carnē adipe illinito, &
carnē subdito. Et si sordida fuerint, eluito, & fomētum ex fici
radice adhibeto. Et postea etiā de pinguedine in vino dulci
bibat. Si in pudendis fiant vlcera, bubulum adipem illinito.
Et myrtum in vino coquito, & cum vino perluat. Aut oleæ
folia, & rubi, & mali punice, eodē modo. Sit autē vinū pram-
nium. Atq; hæc quidē sic faciendū sunt. Et perseæ arboris vi-
delicet folia terito, & ad pudenda apponito. Aut Anethi & **F**
appij semen tritum illinito. Si feruido ac superficiario vlcere
pudenda laborēt, sic curare oportet. Carnē bubulā longi-
tudine duorum palmorum paruorū, crassitudine verò ligni
quod in foramen bipennis immittitur, pudendi videlicet vi-
rilis forma, vsq; ad vesperam apponat. Noctu verò auferat.
Postera die autem rursus apponat vsque ad meridiem, & bi-
bat vinum dulce, melle ad vinum ammixto. Collutio si vl-
cerati fuerint vteri, & si vrinæ stillicidium vexarit. Porrum,
sambuci fructum, seseli, anisum, thus, myrrhā, & vinum equa-
li mensura ad horum succum. Hæc mixta & feruefacta frige-
facito, & moderatē colluito. Aut mel, butyrum, medullam, &
ceram immittito, ac illinito. Ad vlcera quæ in pudendo sunt
ac enascuntur. Folia oleæ, & rubi, & hederæ, & mali punice
dulcis

Medela o-
mniū quæ
in pudēdis
nascuntur.

A dulcis terito, & vino veteri diluta, noctu in lana pudendis apponito, & pro cataplasmate adhibeto. Quū autē dies venerit, detrahito. & myrti baccas in vino coquito, ac colluito. Aut anseris adipē, & resinā liquefacito ac infundito. Aut butyrū & oleū cedrinū, modico melle ammixto infundito, Ad vlcera in vtero resiccanda. Argenti florem in vino terito ac infundito. Aut butyrū cum melle infundito. Aut bryoniā albam, & myrrhā, & mel, vino diluta infundito. Postridie verò vino nigro tepido eluito. Aut lentisci folia in aqua coquito, & cum hac postea colluito. Si vlceratū fuerit os vterorū, Butyrum, thus, myrrhā resinā, medullā ceruinā infundito. Aut lenticulā in aqua coquito, & cū excolata aqua colluito. Quum verò

B aqua ex vteris fluxerit, & vlcera fuerint, & lancinarint, anseris adipem & ouum illinito. Aut ouillū aut suillū adipē: & lētem in vino coquito & hoc pari aqua tēperatum infundito.

Quæ verò in pudēdo sunt vlcera, cū hoc perfundito, & man- Fœtus im-
nam thuris, rubum, pini corticem inspergito. & cum aqua mortui in-
horū lauentur. Expulsiuū si mortuus fuerit fœtus. iectio.
Galbanū

oliuæ magnitudine linteo inuolutū, ac oleo cedrino tinctū, ad os vteri apponat. Aliud. Calamū odoratū, & cucumeris sylvestris medullā, cum adipe anserino terito. Deliget autē vmbilicum & pectinem, & de hoc modicū lanæ instillatum ad os vteri apponat. Et ab hoc paulatim extrahitur. Aliud. Rubiā & cedri ramēta cōtundito, & aqua affusa sub dio per noctem exponito, Deinde mane ad dolores partus exhibeto.

C Aliud. Silphij drach. j. & porri succi acetabulū, cedrini olei dimidio cyatho paruo ammixto, bibēda dato. Aliud. Tauri fel oboli vnius aut semioboli pōdere, in vino terito ac exhibeto. Aut fermento oblitū, torrefactum deuorandum dato. Aliud. Cancros fluuiatiles quinq; & rumicis ac rutæ radicē, & fuliginē de furno, omnia simul trita, & cū aqua mulsā vni-
ta, sub dio per noctē exponat, & ieiunia ter bibat. Aliud. Cucumeris sylvestris medullā tritā, in cedrina pice lanæ inuoluito, & cum filo ad pennam deligato, apponat autē intro, ita vt penne dura pars paululum foras promineat ex lana. Quū autem sanguis apparuerit, amoueatur. Aliud. Veratri nigri virgulā lōgitudine sex digitorū lana obuoluito, extremā verò ipsius partē nudā finito. Deinde quā maximē intrò apponat, & vbi extrema pars cruētata fuerit, amoueatur. Aliud.

M Vera

Veratrum nigrum, & cantharidas, & conyzam in aqua teri-
to, & glandulam mollem sex digitorum lōgitudine efforma-
to, siccato, & vbi dura facta fuerit, lana inuolutā apponat. Sū-
mam autē partē cedria illinat, sitq; ipsa nuda. Cūm verò san-
guis apparuerit, amoueatur. Aliud expulforiū. Si fœtus mor-
tuus aut syderatus intus fuerit, ranunculū & elaterij parum
in aceto meraco misceto ac bibendum dato. Aut brassicæ te-
ner coliculus. in summa parte netopo illinitus immittatur.

H I P P O C R A T I S
C O I D E M O R B I S M V-
L I E B R I B V S L I B E R S E-
C V N D V S, I A N O C O R N A-
R I O M E D I C O P H Y-
S I C O I N T E R-
P R E T E.

Diuersiflu-
xus.



L V X V S albus in senioribus mulieribus ma-
gis fit quā in iuniorib. Fluxus fuluus in v-
trifq;. Fluxus ruber ex iunioribus. Et ruber
quidē fluxus fit in febre. Magis autem ex
abortu. fit & ex mensū interceptione, quū
cōclusi derepentē eruperint. Fit etiā ex par-
tu & febribus, & sanguis profluit valde multus, & grumi ex-
cidunt. Et dolor fit clauicularū ac tēdinū, & corporis torpor,
& crurū perfrigeratio. Aliquando verò etiam nasus effundit
ad dētes, si amplior sanguis discesserit. & sudor multus dif-
funditur. Ad hęc & stomachi morsus fiunt, & perfrigeratio-
nes, & febris bilis meracæ ac pruriginosæ: & eadem die sæpe
rigent, & rursus sudant. & aliquando à supernis locis conuul-
siones ipsis fiunt, aliquādo ab infernis. & ad inguina dolores
acuti ac fortes irruūt, procedētes velut dolores partus. Quan-
doq; etiā vrinx stillicidiū adest, & os siccū est, & sitis premit:
& lingua aspera est: & digiti pedum magni cōtrahuntur, &
ad suras semper cū femore distenduntur. Et lūbi dolores ve-
xantur

Axantur: & manus impotentes fiūt. Quum autem huiusmodi fiunt, tunc etiā neruorū antrorsum ac retrorsum distētionēs fieri solent, à clauiculis iuxta iugulū, ad maxillas & linguā. A talibus verò paulo post retrorsum, à tēdinibus iuxta spinā ad lūbos, atq; sic per violentiā pereunt, prēdicere igitur oportet fluxibus inchoatibus, & diētā cōstituere hoc modo. Mane quidem dandū est pharmacū ad fluxiones, ex his quæ ego describā. quocūq; maximè opus habere visæ fuerint. Dandū autē & ter & quater, si multus sanguis discesserit. Dieta igitur cōstituatur, si quidē sine febre fuerint, ex cibis. Si verò febricitarint ex sorbitionibus. Sunt autē ex sorbitionibus hæc cōmodissime, panicū, lenticula, farina horni ac recētis tritici cocta, alica cocta sorbilis, zea cocta. Ex potionibus verò polentæ pollen in aqua, & ramenta à panibus derafa cōtusa. Et polentæ recentes tenues in aqua madefactæ, quas etiā insulas delingere prodest. Ex cibis verò panis exallatus in cinere. Obsoniū autē sit leporis caro, & colūbæ, ac palumbis, & cocta, & assata. Et hœdi caro assata, nullo ascititio cōdimento addito, sed vt in acetū salem intingant. Hepar item capræ aut bouis in cinere assatum. Oui tenue, aut ipsum luteū. Caseus insulsus. Ex oleribus autē nullū gustent, neq; coctū, neq; crudū. Et à balneis abstineāt. Et manus ipsis deligato, ita vt lana sordida ipsas circundes, & laqueū inmittas supra cubitos, & ad poplites, supra genua. Et cum cucurbitis sub māmas affixis, ipsas eleuato, modo ad dextrā, modo ad sinistram partē trāslatis. Si verò spirandi difficultas oriatur ad cucurbitæ admotionē, cucurbitā amoueto, sanguinē autem ne detrahitō. Verūm subdititiis vtēre, quæ ego describā, & ad sistendum sanguinem in talibus sunt apta. Et si quidem ex fluxionibus mulier euaserit, vbi multus sanguis discessit: & color est exalbidus, & facies eleuata, & sub oculis tumores laxi, & crura turgida, & vterus humidus, ac semper præter rationē hians. Et quæ discedunt aquosa sunt, velut à crudis carnibus succus. Talibus si robustæ fuerint, vomitus ciere oportet ieiunis, & post vomitus prandium exhibere. Hīs cōducit modicus cibus. Vinum nigrum meracius. Illuies, aut frigidæ lotio. Deambulationes. Semel in die cibū capere, omnis resiccatio. Si verò ad hæc non sedentur, neque confidant vtēri, neque à fluxionibus liberentur, respectu virium corporis

Medela.

Sorbitio-
nes.

Potiones.

Cibus.

M 2

habito

Quæ in his
consideren
tur.

Morbi
caussa.
Medela.

Qualis
fluor.

habito, si quidē robusta fuerit, veratrū dare oportet. Si verò **D**
non obediat, caput purgare, facta autē purgatione, per diætā
reliqua curare eodem modo velut circa steriles. Cōsiderare
porrō oportet etiā naturas mulierū, & colores, & etates, &
tempora, & locos, & ventos. Aliæ enim frigida, aliæ humida
ac fluida, aliæ calida quidem, sicciore autē & stabiles sunt.
Nam quæ superalbida sunt, humidiores sunt ac fluidiores.
Nigra verò, sicciore & acerbiores ac adstrictiores. Quæ ve-
rò vini colorē referunt, medium quiddā inter vtrāq; habēt,
Sic autē & in ætatibus cōtingit. Iuenculæ enim humidiores
sunt, & multo sanguine plerūq; refertæ. Aniculæ verò sic-
ciores, & modicum sanguinē habentes. Mediæ verò medium
quiddam inter vtrāque habēt, vt quæ nunc æquales existūt. **E**
Oportet autē eum qui rectē hæc tractare volet, semper mu-
lierū naturas discernere, & temporū occasiones, & ætates,
& tēpora, & locos, & ventos. Si fluxus in vteris obortus fue-
rit, sanguis multus fluit, & grumi cōpacti excidunt, & dolor
occupat lumbos, & laterū mollitudinem, ac imum ventrē, &
durus est venter, & ad cōtactum dolet, & rigor ac febris acu-
ta corripit, & debilitas oboritur, & omnia præter humeros
ac scapulas dolet, & calor inuadit, & rubeſcit, & venæ duræ
fiunt ac renitentes. Morbus hic maximē fit ex abortu. Fit &
quū menses multo tēpore retenti derepente eruperint. Huic
vbi sic habuerit, grossum siccum cōtusum ac cribratū in lin-
teū alligato, ac apponito, & imo vētri perfrigerātia imponi-
to, cauēs ne horreat. Postquā autē fluxus steterit, oleæ sylue- **F**
stris folia in acerrimo aceto coquat, eoque pudenda perluat.
Bibat autē vinacea, & rhoē rubrū in aceti acerrimi hemina
dimidia coquat, & eo pudenda perluat. Aut mora rubi rubra
siccata ac trita, cum farina recenti, pari portione mixta, ieiunæ
bibenda dato, Si verò fortius facere voles, duabus farinæ
partibus ammixtis, bibendum dato. Et ne lauetur. Cibis au-
tem vtatur siccis, & vino nigro vinoso. Si verò intumuerit,
fluxu iam sedato, pharmacū deorsum purgans bibendū da-
to, post pharmacū autē vteros grossorū decocto colluito, &
postea acerbā infundito. Si verò his factis, humecta fuerit,
suffitum faciat donec resiccet. Ruber fluxus fluit talis, qua-
lis sanguis victimæ recens mactatæ, & grumi pellucetes.
Aliquando verò etiā fluxum rubrum emittit, & venter imus
attollitur

A attollitur, & attenuatur, & impotēs fit, & indurefcit, & ad cō-
 tactum dolet, velut vlcere prefente. & febris habet: & dentiū
 fremitus. & dolor ad ipfa pudenda, & pubem, & lateris mol-
 litudinē, & lumbos, & tēdinem, & ventrem, & pectus, & fca-
 pulas irruit. Et alias omnes partes dolet, & impotentia ac pu-
 fillanimitas occupat. & color mutatur. In principio quidem
 morbi hac corripunt. Si verò hac omnia morā trahant, ad-
 huc magis debilitatur. & manifestus eft morbus. & cauae par-
 tes attolluntur, & pedes intumefcūt. Morbus hic ex partu ma-
 ximē corripit, fi quid in ipfa dilaniatum nō prodierit, fed in-
 tus cōputruerit, & foetus exasperatus fuerit. Hanc fi in princi- *Medela.*
 pio cōtigeris, spōgiā humectā ipfi adhibeto, quum fuerit do-
 lor. Aut linteū tenue molle rafum, aqua frigida madefactū
B ventri imposito, & aqua perfundito. & lectum à pedibus al-
 tiorem facito, atq; fic infternito. & ad mēfes ciendos medi-
 camentum quodcunq; magis admiserit, bibendum prēbeto.
 Apij femen torreto, tundito, ac cribrato, & eryfimum simili-
 ter, & peplij femen cum polēta cribratum, & vr ticæ femē fi-
 militer, & fcabiem oleæ fylueftris, & gallā, & rutā, & origa-
 num, & pulegium cum polenta cribrato ac misceto: polentā
 verò crāffam torreto, & triticeam polentam cōmolito, & ca-
 feum caprinum fordibus derafis, & de alliis quidem fingulo-
 rum æquales portiones misceto. Origani verò & rutæ, & fca-
 bieii, & gallæ dimidium. Hac ieiunx ante motū bibenda da-
 to. Miscere verò etiā oportet ad vsum, fi acriora prodierint,
C & cyceonem exhibere. Et de pharmaco quidem pars vna fit,
 & cafei vna, & vna polēta. Ad vespērā autem melle ammix-
 to bibenda dato. & donec quidem principium morbi fuerit,
 & fanguis multus prodierit, & modico tempore intermife-
 rit, & dolores acuti tenuerint, hac facere oportet. Si verò fan-
 guis paucior fluxerit, & per breuius tēpus, ea quæ deorfum
 aut furfum ducunt bibenda dato. & pudenda lenibus fomen-
 tis foueto, prout femper oportunum vifum fuerit, & zeam
 vnā cum cortice fractam, & groffos ficcatos, tuſos ac cribra-
 tos, & oleæ folia fimiliter, fingulorum pares portiones in ca-
 taplafmate adhibeto. & lac bubulum coctum, aut crudū bi-
 bendum dato, refpectu ad id quod rectē habet factu, & pro- *Profluuiū*
 ut opportunum eſſe vifum fuerit. & videtur morbus hic de- *ex abortu*
 bilis ac lethalis eſſe, & pauca ex ipſo effugiunt. Quum mu- *vel labore,*
 lieri

Hippocratis Liber I I.

Medela.

lieri sanguis ab articulis fluxerit, à partu aut à labore corru D
ptæ, quidam putant ex medicis hoc fluxum esse. Est autem
aliud. Nam hoc quod ex articulis, & ex lumbis, ac coxendice
aliud est, glutinosum est simul cū sanguine. Illud verò quod
ab uteris & cauis venis fuit, sanguis purus est. Hæc suffire o-
portet hoc modo, Zeæ fractæ semodium aceto modico subi-
gito, vt ne per totum uteros humectes : & sulphuris viui se-
miobolū ad zeas tritas ammisceto, & aceto subacta per no-
ctem finito. Mane verò multo igne accenso, obturamenta de
doliis oleariis imposito, & sordes officinæ fullonum, & ser-
pentis semē ammisceto. Mox autem multum ignem tollito,
& non vrito, sed maximè suffumigare facito. Oportet autem
fellam perforatam adesse, & mulierem vestibis contactam E
insidere, vt ne quid præterspiret. In ignem verò medicamen-
tum cum aceto præparatum inspergito, itēque de semine
serpentis. Sed & myrrha ammixta efficax est, vt suffita, pūde-
dorum cruentationem sedet. Si verò satis habuerit, erysini
semea torrefactū terito, & in vino exhibeto. Fluxus fuluus
fuit velut ex quo vitioso multus & graueolens. & uteri in-
flammanur. & dolor ex lumbis & inguinibus emergit. &
prodeuntia multa sunt, & si non liberetur, celeriter fluentia.
At etiam si tempus accedat, quæ restāt putrefacit, quā ma-
ximè id fieri potest. Riget enim, & velut à carnis assatis
humor defluit. & cum his simul febres fortes ac rigores
sunt. Ex huiusmodi verò fluxibus multa pereunt, pauca ef-
fugiant. & si quidem in principio accesseris, sic curare opor- F
tet. Si sine febre fuerint ac robustæ, veratrum ipsis dato. &
intermissis tribus aut quatuor diebus, pharmacum deor-
sum purgans exhibeto. Post purgationem verò sic diatam
constituere debes, quo fluxiones aquosæ sint ac tenues. Ma-
ne quidem ieiunæ pharmacum aliquod ex his quæ ego de-
scribam ad fluxum, ebibendum dato in vinum inspersum.
Post pharmacum autem, alia diata curato. Uteros verò
sic curato. Si quidem inflammati fuerint ac conclusi, fo-
menta adhibere oportet mollia, donec os uterorum molle
fiat. Post fomenta, infusis qualibus opus habere visæ fuerint
colluito, siue magis purgantibus, siue mollioribus. Post col-
lutiones, mollitoria apponito. Si verò non facile solubile sit
osculum, foueto & subdititiis mollito, quæ ego describam,
donec

Curatio.

A donec apertū fuerit. Quod si ad hæc fluxiones non sedentur, caput purgato, & sic victus rationē constituito. Si quidē sine febre fuerit, alinum lac bibat. & oleribus coctis hortēlibus **Cibaria.** ac syluestribus vtatur, excepto allio, porro, brassica & raphano longo. Ex marinis autē, raia leui, scorpio, cōgro, torpedine, anguilla, passere, gobio: coquere verò oportet cū cepis & coriandro, in muria dulci ac pingui, ita vt probe percoquantur. Ex carnibus autē, maximē suilla, deinde agnina, aut ouilla, coctis potius quā aſſatis, & ipsarum iusculis. Vino verò albo mellei coloris, aut aquoso. Balneis autem nō valde calidis, neq; multis, excepto capite. Si verò ex hac diata, ab vlceratione & inflammatione liberētur, humidi verò sint vteri, **Nutricatus mutatio.**

B pro balneis quidē, illuue. pro fuluis autē vinis nigris. & pro aquosioribus meracioribus. & pro polēta panibus, & pro piscibus carnibus aſſatis, & omnibus cibis siccātibus, quibus sanē in alui profluuiis vtimur. à collutionibus autē omnibus abstineat, excepto vino & aqua. Suffitus autē fiat per adstringentia. Optimū autē esset si cōciperet. Si verò iuencula fuerit, frequēter ieiuna vomat, & postea parum prandeat. Atq; hæc harū fluxionum diata est. Fluxus albus fuit velut alba asini vrina, & in facie sunt tumores albi, & partes ambæ sub oculis tument. & hydropiformes ac non valde bona specie præditi sunt oculi, & splendor abest. & lacrymosi sunt oculi ac hebetes. & color corporis exalbidus ac pustulosus. & vter imus tumidus. & in maxillis pustulæ paulatim rubētes, parua, aquosæ ac malignæ. & in ciuribus tumores laxi, & si presseris digito, notæ imprimuntur velut in fermēto, & os saliuā impletur. & stomachi morlus percipiunt quū ieiune fuerint, aut etiā vomuerint velut acidā aquam, & si ad accliuē locū procedūt, anhelatio citius corripit, & strāgulatio, & crurum perfrigeratio, & genuum impotētia. & in ore vlcera feruida ac superficiaria. & vterus præter rationē aperitur, & ad osculum procidit grauis, veluti plumbū. Et dolores per femora tendunt. & omnia inferna perfrigerantur, ab imo ventre inchoantia vsque ad pedes. & plātæ torpent, ac ingredi nō possunt. Tales difficile est à morbis liberare. Nā & ætate prouectæ sunt, & afflictiones cōsenescunt. Nūcatus aliquis spontaneus forte fortuna allapsus ipsas soluat. Has exhaurire oportet quum redundarint, per pharmaca quæ bilē flauā nō purgant.

Profluuiū
albū quale.

Curatio.

Hippocratis Liber I I.

Profluuiū
aliud albū.

Curatio.

Profluuiū
aliud.

Medela.

gant. Sed vrinā ciente his pota cōferunt, & capitis purgatio-
nes, & illuies. & epithymi albi potus, & deambulationes. &
omnis resiccatio in victu, Hæc vbi fecerint, sanæ quidē peni-
tus nō fiunt, facilius autē degunt. Fluxus albi alterius cura-
tio. Purgatur album subluteū, & quū mingit, morsum perci-
pit, & lancinatur, & vterus vlceratur. & febris corripit acu-
ta, & calor multus, sitis, vigiliæ, & mente mouetur. Et quum
aliquid festinanter egerit, anhelatio ipsam inuadit, & mēbra
exoluuntur. Hæc mecona, hoc est peplum albū bibere oportet,
& vrticæ semē, & quod præstat, mali punicæ dulcis radi-
cem, & rhoem, ac gallā. Hæc in vino acerbo bibenda dato, &
mali punici succum, aut caseum caprinū ammisceto. Subter
autē suffito zeam, & grossos hybernos, & oleæ folia, & scabiē
eiusdem, & cucumeris syluestris cortices ex tertia parte, reli-
qua paribus portionibus. Sorbeat etiā olera cocta, & sorbi-
tiones ex amygdalis & sesamo. & gestetur ac curru vehatur,
& nō quiescat. Alius fluxus. Defluit multū velut vrina ouil-
la. color est albus, & tota intumescit, & in tibiis eminetiæ la-
xæ & rubicundæ emergunt. & si digito attingas, notæ foueas
præ se ferētes tibiis ac pedibus imprimuntur. & si quid edat,
impletur ac inflammatur. & vbi iter fecerit, & opus aliquod
obierit, anhelatio & dolor ipsam corripit, & color albus, quā-
doq; subluteus. huic si robusta & iuuecula fuerit, & alia appa-
ruerint, ab initio pharmacū sursum ac deorsum purgans bi-
bendū dato. & caput purgato, si pituitosa est per ea quæ pitui-
tam purgāt. Si verò biliosa, per ea quæ bilē. & si tempus anni
fuerit, & à natura nō est lienosa, & si quid ex relatis fuerit, se-
rū dato. Decoquat autē hoc & bibat quàm plurimo tēpore.
& ad vespērā vinū dulce aquosum, si opus habuerit. Cibū ve-
rò ne cōtingat. Si verò debilis fuerit, sorbitione modica uta-
tur. & nō lauet. Postquā autē tēpestiuum esse tibi videbitur,
à potu cesset. & post purgationē cibis vtatur, ita vt abstineat
à pinguibus & acribus, & dulcibus ac salis. & ab olerib. acri-
bus. Vtatur autē piscibus petrosis, & carnibus ouillis, aut vo-
lucriū, aut leporinis, pane frumentaceo, aut ex ordeo fresco. &
oleribus coctis vtatur, & syluestribus quæ cruda eduntur, itē
hortensibus acribus exceptis. & deambulet mane & à cibo.
Vbi verò his factis sicciior esse visa fuerit, vteros face vini col-
luito. & tribus aut quatuor diebus interpositis, postea acerba
infundito.

- A** infundito. & intermissione facta, si quidē sicca fuerit, quiesci-
ro. Et si à natura fuerit biliosa aut pituitosa, à victu verò &
pharmacorum potione attenuata, & se recolligere nō pote-
rit, lac bubulū bibat per xl. dies, calidū de vacca. Præstat ta-
men pituitosam cibis quàm paucissimis vti, quādiu lac bibe-
rit. Sit autē mēsurā sex heminarū Atticarū. Incipiātq; à dua-
bus, & singulis diebus vnā apponat, donec sex fiant. & inde
paulatim ad duas rursus descendat. & post lactis potū, cibis
reficito & per victus rationē & post lactis potum, mane ieiū-
na adiantū bibat, hoc siccātū, tūsum, & exacte cribratum, in
vino nigro odorato diluto exhibeto. Si verò reuertatur mor-
bus, totā ipsam foueto, & rursus pharmacis infra purgato, &
B postea vteros colluito, si quidem natura fuerit pituitosa, per
cnidium granū, aut thapsiæ radicē. Si verò biliosa, scammo-
niæ succo, aut colocynthide sylvestri. hāc enim coniectā, dua-
bus aquæ heminis affusis, coquere ad dimidias oportet, &
huic mel, & oleum narcissinum aut anthinū ammiscere. Sit
autē mellis quadrās heminae. olei verò hemioliū mellis, hoc
est mensura ipsius tota, insupérque dimidia. Postea verò col-
luendū est melle, & vino, & oleo solo. & suffitus adhibendi. &
tribus aut quatuor diebus quiescendū. Bibat autē adiantū. &
si in ventre nō cōceperit, morbus reuertitur. & si morbus re-
uertitur, perit. Quum verò seniores morbus hic corripuerit,
etiā vteri cōputrescunt. Valde verò pauca euadūt. Alius fu-
xus. Purgatur velut ex ovo crudo luteum subalbidū, & vlce-
C rat pudendū. & tument pedes ac tibiæ. & causæ oculorū par-
tes intumescunt. & oculi humidi ac lachrymosi sunt. & si
iter faciat, anhelatio ipsam corripit & debilitas oboritur. Si
verò euaserit, morbus pituitosus fuerit, & si nō purgata fue-
rit, febricitat, bile vehementer cōmota. Seniores autem hic
morbus magis inuadit quàm iuniores. Quū sic habuerit, si
quidem vehemēter intumuerit, pharmacū deorsum purgās
bibendū dato, quod pituitā & bilē purgat. Si verò nō fortiter
tumuerit, & pituitā ipsam presserit, pharmacū sursum pur-
gans dato. & si quidē potēs fuerit, veratro purgetur. Sin mi-
nus, pharmaco quod bilē & pituitā ducit. Post pharmaca ve-
rò serum coctū bibendū dato, per plurimos dies, cū modico
sale. Edat autē insuper mentā. Ad vespērā cibū ne attingat,
sed modicum sorbeat, & vinū dulce insuper bibat, si opus ha-
buerit.

Profluuiū
aliud.

Medela.

Lac asini- buerit. Si verò nō affuerit serum, lac asininū coquito, & exhi- **D**
num pro beto per quatuor dies. Ad vespērā verò eadē faciat, nisi febris
sero. noctu corripiat. Si verò natura fuerit lienosa, aut flatuosa, &
 exanguis, neq; serum neq; lac bibat. Sed purgātibus internē
 purgato. & vbi tibi tempestiuū visum fuerit, vteros colluito,
 primum quidem medicamēto ex vini face, bis aut ter. Post
 hoc scammoniae succo. Affundito autē ad hūc, vinū dulce, he-
 minae Atticae mensura, & olei narcissini maximē, quartā he-
 minae partē. Postridie verò cū vini hemina colluito, & mellis
 quarta heminae parte, & resinae tertia mellis parte. Oleum
 autē sit melli æquale. Si verò ea quae ab infusa collutione suc-
 cedunt prodierint pituitosa, etiā rursus colluito, interpositis **E**
 iij. aut iiij. diebus. postea grani cnidij duas portiones decorti-
 cato, & ipsas infundito. Si verò nō affuerit cnidiū granū, ra-
 dicis thapsiae potionē vnā infundito. & postea iisdē colluito.
 postquam autē purgata fuerint ea quae scedūt ad has collu-
 tiones, & si prodierit aliquid cruentum, velut ab vlcere, per
 acerba postea colluito. & si post hāc ipsa interrogata, dixerit
 os vterorū durum esse, & dolorē habere, eodē modo eo quod
 paratur cum butyro colluito donec vteri fuerint resiccati, &
 sana esse videbitur. diebus verò inter collutiones interme-
 diis, sambuci fructū bibat, & leporis coagulū, & pepli corti-
 cem, & vrticae semē, & mali puuici dulcis corticem, ita vt de
 singulis pares portiones terat, & polentā ac adiantū ammif-
 ceat, & in vino nigro odorato ieiuna bibat. cibis autē vtatur
Caro quae mollibus nō salsis, neq; acribus. Carnes autem praestāiores **F**
his danda. sunt pisciū, aut volucriū, aut leporinae. & lauetur calida non
 multa. Si verò nō quiescat fluxus, sed relinquatur, & vteri hu-
 mescāt, medicamentū ex malicorio suffito. & postea virū ac-
 cedat. & si in ventre cōceperit, sana euadit. At seniores à mor-
Profluuiū bo leuari non possunt, sed pereunt prae debilitate. Fluxus
aliud. alius. Fluit subluteum velut ex ovo, & viscosum, & venter
 imus intumescit, ac durus fit. & si cōtingas dolet, & dentibus
 stridet, & febris occupat. & dolor ad pubem, & ad pudēda, &
 ad imū ventrē, & ad lūbos irruit. & animi deliquiū. & anxio-
 tates, & perfrigerationes, & sudor multus, & pulsus ad manū
medela nul tates, & perfrigerationes, & sudor multus, & pulsus ad manū
la bis da- accelerātes, debiles, deficientes, & statim pereunt. Si verò lu-
ent tāquam perites manserit, & color ipsi mutatur, & fit velut fauis aut
desperatis. cera. & si corpus digito prematur, mollescit, & notae velut in
 massa

A massa farinae subacta fermento imprimuntur: & pedes intumescunt ac crura. Hic autē morbus fit maximē, si in ipsis aliquid dilaniatū fuerit, aut intus cōputruerit in partu. Seniores autē magis afficiūtur. & huiusmodi morbus nō est valde **Profluuiū aliud.** leuis. Alius fluxus. Purgatur velut à carnibus affatis, humor, & pudendū exulceratur, & ad quācūq; aliā corporis partē destillarit. Et rigor, & febris acuta: dēsa, magna, & simul horror corripit. Dolores autē quales in omnibus fluxibus. Hæc tota intumescit, & infra vmbilicum & cruribus. & color fit morbi arcuati. Talis autē fluxus ex hoc fit. Postquam sanguis exhaustus, subbiliosus factus fuerit, & non fuerit purgatus. Quū sic habuerit, pharmacū bibere oportet, Si quidē fortis **Curatio.** fuerit, ex veratro. Si verò debilis, radicē & elateriū. & posteriore tēpore lac caprinum. Aut pharmacū deorsum purgans dato, quod bilē & pituitā ducit. Vteros autē medicamēto cū brasiæ decocto parato colluito. Bibat autē saluiā, hypericum, apij semē, singula in vino nigro austero. Ieiunæ autem hæc bibēda dato. Si verò vlceratū fuerit pudendū, postea butyro colluito. Deinde pharmacū bibendū dato. & vlcera butyro, resina, myrrha, flore argenti illinito. Perluantur autem myrti ac saluiæ ex aqua decocto tepido. Cibis vtatur neque falsis, neq; acribus. vt ne mordax vrina fiat. & à marinis prohibeatur, & carnibus bubulis, & ouillis ac porcinis. Aliis autem carnibus vtatur coctis. Edat etiā panē, & vinū vetus odoratum nigrū bibat. Si verò hæc fecerit, & sana nō fiat, totam **C**oueto, & postridie pharmacū sursum purgans dato. Deinde intermissione facta, rursus quod infra purget. & si quidē māsferit fluxus post pharmaca, decoctū serum quotidie bibendū præbeto. Vesperī verò sorbitionibus, & vino dulci albo vtatur. Si verò nō affuerit serum, lac asininū coctū per dies quatuor bibat. Ad vesperā autem iisdem vtatur. Postea per dies quadraginta lac bubulū calidū bibat. & per diē nihil edat. vt ita dicā. Optimum enim hoc est. Nā & purgatur & nutritur, & fluxus obtūditur ab huiusmodi lacte. Vesperī verò cōner **Nutricus.** carnem volucris modicā affatā, & panem modicū subcineritium. Bibatq; insuper vinū nigrū vetus vinosum quandiū lac biberit, si multa prodierint, & acrimonia vexatū. & si his factis in vētre cōceperit, sana fit. Quæcūq; verò seniores sunt, in his morbus quādoq; reuertitur, & pereunt. Iuueculis autē non

Hippocratis Liber I I.

non est lethalis. Diuturna porrò est saniosi fluxus curatio, D
fluit autē talis subcruētus, velut à carnibus afflatis humor, &
mordet velut muria, & corrodit ac exulcerat pudenda, & vte-
rus exulcerat circūcirca, & fœmora, & aliæ partes, & vbi su-
per vestes distillarit, tinguntur & agrè elui possunt, & vter
attollitur ac durus fit, & ad cōtactum dolet, & calor corripit.
& dolor ad pudenda, & sedē, & imum ventrē, & laterū molli-
tudinem, & coxas, & lumbos irruiat. & impotētia adest, & co-
lor mutat, velut morbi arcuati. Si verò tēpus & morbus pro-
ducatur, hæc omnia amplius corripiunt, & cauæ partes attol-
luntur, & pedes tumēt, & crura à lumbis. At hic morbus cor-
ripit vbi quid de fœtu dilaniatū fuerit, aut in abortu, aut in
partu. Oportet autē fomenta adhibere, & suffire, & bibenda E
præbere omnia ea quæ fluxū sistunt, & lac asininū & alia ex-
hibere, & vomere si opus fuerit. Si verò sine febre fuerit, &
debilis febris habuerit, siccum fomentū adhibere melius est.

**Causa hu-
ius morbi.
Medela.**

**Strangula-
tio varia.**

Quum ad caput conuersi fuerint vteri, & hac parte suffo-
catio definit, caput grauat. Verū aliis alicubi aliās finis ha-
betur. Signū autem hoc est. Venas in naso, & partes sub ocu-
lis dolere dicūt, & sopor altior tenet, & spumat, vbi leuius ha-
buerit. Hæc multa calida lauare oportet. Si verò nō obediat,
frigida etiā circa caput, ita vt laurum & myrrhā in aqua co-
quas, sic frigefacias. Vnguēto autē rosaceo caput illinatur, &
odorata subter suffiātur, graueolētia verò sub nares, & bras-
sicam edat, & succum sorbeat. Si verò ad cor progressi vteri-
suffocent, & aēr impeditus violenter attrahatur, anxia est & F
vomit, & quibsdā statim tractus deorsum cedit, & flatus exit.
& aliqua quidem vomit spumosa. alicui verò quies cōtingit.
Quibus autē non decedunt, his porri semen, & peplum, trita
& tribus aquæ cyathis diluta, bibenda dato. Auxiliatur &
aceti albi cyathus potatus. Aut iuniperi fructū & saluiā dato,
aceto aut vino ad has species ammixto. Oportet aut ipsam ca-
lesceri. Aut adipē sumere anserinū, & ceratum resinatū ac pi-
cem, & in ipso liquefacere, & subdititias glādulas efformare.
Quum autē ad præcordia allapsi strāgularint, vbi hic fuerit
affectionis soliditas, & vomitus feruid⁹ acris corripit, & mo-
dico tempore mitior fit, & dolor ad caput & ad collum pene
trans. Tepefactoria igitur apponito, si sursum strangularint.
Sub nares verò graueolentia suffito, sensim progrediēdo; Si
enim

- A** enim aceruatim vteri infra decedunt, turba oboritur: Odo-
rata verò infernè, & castoriū ac conyzā bibēda dato. Quum
verò deorsum tracti fuerint, abominanda subter suffito, sub
nares aut odorata. Si verò dolores q̄uerint, pharmacū deor-
sum purgās bibendū dato, & postea lac asininū aut serum bi-
bendum præbeto, si nō lienosa fuerit à natiuitate, aut exan-
guis, aut decolor, aut auriū sonitus habuerit, velut hæ quib⁹
propter cognationē morbi à iuuetute sunt familiares. At su-
pernū ventrem ne moueto, cæcutient enim, aut circa fauces
turbationes, & alia infestabūt. Verū ptisanā succū dato. Si
verò etiā valde facilis sit ad vomitū, vomat. Collutio autem
optima est ex narcisso. Subditiū verò id quod ex canthari-
B dibus præparatur. Quum vteri apud præcordia constiterint.
suffocatur velut à veratio, & recta ceruice spirat, & stoma-
chus fortiter vellicatur. Quādā etiā vomunt quādoq; saliuā
acidā, & os aqua impletur, & crura perfrigerātur. Tales si nō
breui à præcordiis vteri discedant, loqui nō possunt, & par-
tes circa caput ac linguam topor occupat. Proinde ad vt eros
quidē lanā quāmaximè fieri potest ad foramen apponito,
ita vt pennæ obuolutā, vngueto albo aut Aegyptio, aut Bac-
chario, aut amaracino tingas. In nares verò, de pharmaco ni-
gro ad caput præparato, specillo exceptum infarcias. Si verò
hoc nō fuerit, silphij succo nares illinas. Aut pennā aceto tin-
ginto, & immittito, narēsq; illinito. Aut sternutatoriū appo-
nito. Quū autē conclusum fuerit osculū & internus trames,
C castoriū in vino bibendū dato. Nares verò phocæ adipe illi-
nito. Lanā autem appositā finito, donec cōlidant. Quum autē
quieuerint, auferre oportet. Si verò ea ablata rursus recur-
sant, lanā rursus eodē modo apponere. Sub nares verò cornu
capræ nigrū, aut ceruinū suffire, scalptū & in cinerem calidū
inspersum, quo maximè suffumigetur, & nidorē sursum per
nares quāmaximè potest trahat. Suffito etiā phocæ adipē,
prunis testæ impositis, ipsaq; obuelata, & capite imminēte,
quo odor maximè ingrediatur, ita vt de adipe instilles, &
ipsa odorē sursum trahat, os verò clausum habeat. Et si qdē
sursum allapsi fuerint vteri, hæc facere oportet. Si verò ad he-
par cōuersi fuerint vteri, mulier derepēte voce destituit, &
dentes cōserti sunt, & color liuidus fit. Derepēte verò hæc pa-
tit̄ sana existēs. Cōtingit autem maximè virginib. antiquis,
& viduis

Cur supe-
rior ventri-
culus non
vexandus.

Cum vteri
superiora
petunt.

Curatio
quæ.

Cum vteri
iecur ve-
xant.

Medela.

Vterorum
inflamatio
diuersique
eorum affe-
ctus.

Medela.

Curatio.

& viduis que pepererunt aliquādo, & viduitatē agunt. Maximē D
verō cōtingit omnino nō ferentibus vterum, & sterilibus, ex
partu. Nō enim prodit puerperij purgamentū, & nō intume-
scit vterus, neq; mollitur, neq; vomunt. Quū sic habuerit, tu
morē ab hepate cū manu infra leniter detrudito, & præcor-
dia cū fascia deligato, & os aperito. Vinū verō odoratissimū
dilutū infundito, quādo sanē etiā graueolētia ad nares adhi-
bere ac suffire cōuenit, ad vteros verō odorata & suffimenta,
& postquā sic curaueris, pharmacū deorsum purgās bibendū
dare oportet, si quidē biliosa fuerit, quod bilē purgat. Si ve-
rō pituitosa, quod pituitā. Et postea lac asininū coctū bibe-
dū præbeto, & vteros odoratis foueto, & medicamentū quod E
cū buprestis præparatur apponito, postridie verō netopū. In-
terpositis autē duobus diebus rursus vteros odoratis colluito,
& postea intermisso die, aromatis suffito. Atq; hæc vidua fa-
ciat. Optimū autē in vētre habere. Virginē verō persuadeto
vt viro cohabitaret. Ad nares autem nihil adhibeto, neq; medi-
camentū ieiuna bibat. Verū castoriū & conyzā in vino odo-
ratissimo bibat per dies viginti, & caput odorato aliquo ne
vngat, neq; aliquod odoratū olfaciat. Si verō vteri inflamma-
ti fuerint circa latus, si cōtigeris durum apparet, & quum ad
præcordia allapsi fuerint, strāgulant, & vomit pituitā acidā.
& dentes stupefunt & vbi vomuerit, meliūs habere videtur,
Quum verō deorsum processerint, discedunt de ventre aliās
aliō. Maximē verō ad laterū mollitudinē quādoq; incidunt,
& ad vesicā, & vrinæ stillicidiū corripit, & ad fedē, & cacare F
sibi videtur, & menses prius aut posterius solito fiunt, aut nō
statim huic apparēt. In hoc morbo si sursum strāgularint, te-
pefactoria apponito, & graueolētia ad nares suffito, ad vte-
ros autē odorata, & conyzā fœminā, & castoriū, in vino iei-
una bibat. Postquā verō ad naturā suā cōsederint, placidē suf-
fito. Bibat autē vrinā cientia, Atq; hæc faciat quā diu dolo-
res tenuerint. Vbi verō quieuerint, totā foueto. Deinde phar-
macum deorsum purgās bibendū dato, si biliosa fuerit, quod
bilem purgat; si pituitosa, quod pituitā ducit, & lac asininum
bibendum dato, aut serum caprinū decoctum. Si verō lieno-
sa fuerit, lac ne bibat, neq; serum, & in purgationibus, cibis
vtatur mollibus, & per aluū secedentibus. pisces autē melio-
res sunt carnibus, & vteros foueto, ac subdititiis purgato,
ipsosque

- A** ipsosq; colluito, & vbi suffitū admisit, ad virum accedat. Solutio verò morbi cōtingit, vbi in vētre cōceperit. Si vteri ad latera allapsi fuerint, tussis obtinet, & dolor sub latus, & infidet vterus durus velut pila: & ad cōtactū dolet, velut ab ulcere, & cōtabescit, & videtur ipsi peripneumonia esse, & cōtrahitur, & gibbosa fit, & mēses nō apparent, Aliquibus autē quibus prius apparuerunt, etiam pereūt: & si tunc prodeant imbecilles sunt, & pauci, ac deteriores, & genitura nō fit hoc tēpore. Quum sic habuerit, pharmacū deorsum purgās bibē-
 dum dato. & multa calida lauato. & ex tepefactoriis quacū-
 que admiserit adhibeto. & à quibus sanguis purgatur ea ap-
 ponito. Et lini semen torreto, tundito, ac cribrato: & peplum
 albū & saluiā cū tenui polenta, & caseū caprinū muria dera-
 fa. Hæc misce, vt casei sint partes duæ, reliquorū vero, & po-
 lētæ nō falsæ pars vna, & ieiunæ in vino bibēda dato. Vespere
 vero cyceonē crassum melle affuso exhibeto, & ex potibus
 quencunq; admiserit bibendū dato. Et frequenter fomētum
 adhibeto. & calidā aspergito. & per ceratū leniter mollito, ac
 à latere detrudito. & latus fascia lata deligato. Et lac bubulū
 q̄ plurimū ad dies quadraginta bibendū præbeto. Cibis autē
 vtatur q̄ mollissimis. Morbus hic vehemēs est & lethalis, &
 paucae etiā sic curentur effugiunt. Si vero in lumbis fuerint
 vteri, aut in lateris mollitudine, & spiritus sublimis iuerit, &
 suffocatio habeat, & anhelatio densa ipsam corripiat & mo-
 ueri nō vult: sulphur, aut bitumē, aut cicutā, aut myrrhā teri-
 to, & melle cocto affuso, glandulā longā efformato ac cras-
 sam, eāque in sedem indito. Si vteri deuoluerint seipsas ad
 intermediā lumborum ac coxarū partem, dolor habet imū
 ventrē, & crura contrahuntur, & iuncturas coxarū ad sedem
 dolet. & quum aluū exonerat, dolores emergūt acuti, & ster-
 cus cum violentia prodit exiguū, & vrina destillat, & pusilla-
 nimitas ipsam corripit. Quum sic habuerit, fistulā ad vesicā
 alligare oportet, & oleū calidum in vteros infundere. Et fo-
 mētum adhibere, aut multa calida aqua lauare, & in oleū &
 in aquam delidere. Suffire autē subter pudenda, graueolētia.
 sub nares vero odorata. postq̄ aut dolor quieuerit, pharmacū
 sursum purgans dato. Infernū vero ventrē turbare nō opor-
 tet. Vbi verò vteri cōfederint, pharmacū deorsum purgās bi-
 bendū dato, & lac asininū, si nō fuerit lienosa. Postea fomētā
 adhibeto

Cum vteri
latera pe-
tunt.

Medela.

Curatio.

Cum vteri
lūbos mo-
lestant.
Medela.

Cūmosvte
rorum aliò
vertitur.
Curatio.

Quid mu
lieres fati
lat.

adhibeto vteròsq; aspergito. & subditiuū purgatoriū quod D
cum lauro præparatur, & nō mordet, apponito. Deinde aro
matis suffita, ad virū accedat. & si in vētre habuerit, sana fit.
Verūm pleræq; steriles & cruribus mutilatæ fiunt. Quibus-
cunq; osculum aliò inclinatur, & ad coxam allabatur. Cōtin-
gunt enim & hæc, quæ vterū purgari prohibent, & geniturā
fufcipere, & liberos gignere. Hæc odoratis fouere oportet. &
post fomentū, digito reuellere & à coxa disparare. & postea
tædulis & plumbeis fistulis immisfis dirigere. Non em̄ velo
citer cogi potest, velut dictū est. Cū autem ad naturalē situm
redierit, & vteri aperti fuerint, subditiis mollibus purgato
& alia cōuenienter facito. Quibuscunq; vteri ad coxā colla-
buntur, si nō breui discedāt, & rursus in locum suum redeāt, E
ad coxam resiccantur. Necessariū est autem osculū auersum
esse, & in supernis detineri. Quum verò auersum fuerit con-
clusum esse. Ex auersione verò ac cōclusionē, durum fieri, &
mutilatū esse, Vbi verò vteri conclusi fuerint, mēses fursum
ad māmā delegare, & ad pectus ascendere facit, & imus ven
ter attollitur, & inexpertę in ventre se habere putāt. Talia e-
nim patiūtur, qualia prægnantes, vsq; ad septē aut octo men
ses. & venter pro temporis ratione crescit. & pectora eleuan
tur, & lac innasci videtur. Quum autē hoc tempus præterie
rit, & māmæ gracilescunt ac minores fiūt, & venter idē per
petitur, & lac euanescit, venter item eo tempore in quo se pa
riturā sperabat, euanescit ac cōcidit. His verò cōtingentibus,
vteri modico tempore fortiter cōtrahuntur, & osculū ipso- F
rum reperire nō datur. adeò omnia cōtrahuntur & resiccant
tur. & in māmīs tubercula fiūt dura, partim maiora, partim
minora. Hæc autem nō fiunt suppurata, sed semper duriora.
Deinde ex ipsīs nascuntur cancri occulti. Cū autem cancri
futuri sunt, pri^{or}a amarescūt, & quicquid ederint, oīa ama
ra esse vident. & si quis plura dederit, accipere renuūt, & cō
pescenda faciūt. Mente verò percelluntur, & oculi duri fiunt,
& nō acutē vidēt. & ex māmīs dolores ad iugulū transiliunt,
& sub scapulas, & sitis tenet, & māmæ graciles, & ipsæ p to
tū corpus attenuatæ sunt, & nares siccæ ac obstruētæ sunt, &
nō leuant. Spiritus est imminutus, & nihil oīno olfaciunt, &
in auribus dolor quidem nō oboritur, verū aliquando callo
sa cōcretio. Cū igitur ad hoc temporis progressæ fuerint,
sanæ

A sanæ fieri nō possunt, sed pereunt ex his morbis si verò prius quam huc perueniāt curatæ fuerint, & mēses soluti fuerint, Cura quæ. sanæ fiunt. At verò curare tales oportet hoc modo. Primū quidem omniū si adhuc fortē assumpseris, reliqui corporis respectu habito. quacunq; tādē purgatione opus habere videtur, medicamētū exhibeto. Vbi verò corpus præparaueris sic ad vterorū medelam procedito. Si verò totū corpus minime mouēdū esse videatur, neq; morbi causæ hinc proficisci, verū vteri à seipsis morbū habeāt, curā hoc modo auspica- re. Primū quidem vteros sic foueto. Ollæ duas sextulas ca- Fomētum
pienti, operculū imposito ac adaptato, vt nihil præterspiret, aduerte.
deinde verò operculi fundum pertundito ac foramen facito.
B In foramen autem arundinem indito longitudine cubitalē. Oportet autē arundinem operculo probè adaptari, vt penitus nihil præterspiret. Cū autē hæc paraueris, operculū ollæ obdito, lutōq; oblinito. & vbi hæc feceris, fossam duorum pedum altitudine effodito, ea magnitudine quæ ollam capere possit. postea verò ligna immissa vrito, donec fossa ab igne excādescat. Quod vbi factū fuerit, ligna ac prunas quæ crassissimæ ac ignitæ fuerint, eximito. Cinerē verò ac fauillā in fossa relinquito. Quū autē olla efferbuerit, & vapor sursum processerit, si quidē valde calidus fuerit vapor, abstineat. Si verò nō, summæ arūdinis parti infideat, ipsāq; in vteri stoma- machū indat. Atq; sic fomentū admittat. Si verò perfrigere tur, prunas ignitas adiicito, cauēdo vt ne acutum fomētū facias. Si verò adiectis prunis, acutū fiat fomentū, magis quā cōuenit, prunas detrahito. At verò hoc fomentū clemētī cœlo parare oportet, vbi ventus nō afflarit, neq; perfrigeret. Ipsam autem indumentis obuelatā esse oportet. Cæterū in ollā allium siccum iniicere oportet idq; magis cōminutū quā ea quæ sunt cōtusa, & aquā affundere, quo ipsum permadescat, & aqua tribus digitis ipsum excedat. & phocæ oleum superfundere, atq; sic calefacere, ac fomentū adhibere per multū tēpus. post fomentū verò si potens fuerit, lauetur toto quidem corpore ad voluptatē, lūbis autē & partibus infrā vmbilicum, amplius. In cœnā porrò dato mazā, panem, & allium coctum. Postridie verò si quidem exoluta fuerit à fomento, eam diem intermittito. Sin minus, rursus fomētū adhibeto. A fomento verò cōsiderare hoc potest, osculum contingere
N iubeo

iubeto, num fomentū ipsum vteros flatu implet. Si enim flatu implētur, osculum ex valida auersione, & ad coxā allapsu magis dirigūt, ac aperiuntur. Tāquā igitur tale sit fomentū, & hæc facere possit, sic fouere oportet. Quū autem fomentū adhibebis, allium iniicere oportet, & phocæ adipē superfundere. Atq; hoc faciendum est. donec vteri videbuntur inflati, & osculum fortiter sursum tractū. Nam ad hoc fomentum talia cōtingent. Post fomentum verò diatā cōstituito, velut priusquā fouebatur. Cū vero cōmoti fuerint vteri, ac facile solubiles fiant, fœniculi radicibus foueto. & aliam ollam eodem modo præparato. Radices autem fœniculi elotas cōtundito, & in ollam mittito, & affusa aqua eodem modo fomentum facito. Postea verò lauato: & ad vespērā mazam cœnet. **E**

Cibus. Si vero panem voluerit, & bolbidia parui polyporū generis, & sepiolas paruas, in vino ac oleo coquito, & edenda dato. At inter fomenti adhibitionem, osculū cōtingere coneris, an fomentum vteros propinquissimè adducat. Hos fouere oportet a 1 dies quinq; vel sex, hominis consideratione habita. & si quidē exoluatur ac debilis sit, differre ad sufficiens tempus. Si verò nō exoluatur, fouere per omnē diē. Post fomēta verò subdititia apponere conare, ex albicante tæda pinguisima. Illitio autem sit oleum. facito autē hæc lōgitudine quidē digitorū sex, numero verò quinq; vel sex. figura verò in angustum abeunte. Sit autē alterū altero paulò breuius. crassitudo verò eius quod crassissimū est, sit digiti indicis, & forma **F** similis digito, summa parte tenuissima, in processu verò crassior. Hæc autē leuissima, ac rotundissima facito. cauēdo ne vlla adsit fissura. Apponat autē primū id quod tenuissimū est, & vbi apposuit quiescat, obseruās ne excidat. Apponatq; primum summā partē, deinde semper amplius, simulq; obtorqueat ac circūcirca tædā intrò trudat: & vbi parū suscepit, in hoc paruo se cōtineat, cauēdo ne excidat. postea rursus eodem modo intrò trudat, donec quatuor digitorū mēsurā intra osculū vterorū recipiatur. Cū autē hæc suscepit, alterum postea apponat simul vt prius insitū aufert, quo priusquā osculū cōniueat recipiatur. dum adhuc rectū est & apertum. Hoc autē ita cōtinget, si alterū eximatur, alterū autem indatur. Oportet autē & plūbū simile figura crassissimæ tædæ formatū intrudere, quod cauū sit, quo cōtinere quid possit.

A sit. plūbi verò amplitudo sit talis fabricata, qualis in vlcera impellitur, ita vt os ipsius leue sit, & nō sauciet, formato autem hæc velut etiā subdititia ex tædis. Quū autē factus fuerit huiusmodi plūbeus penicillus, adipe ouillo trito ipsum expleto, & vbi ita præparatus fuerit, tædā quidē subtrahito, plūbū autē indito. Si verò plūbū appositū ardorē exhibeat, plumbum quidem detrahito, tædā verò rursus apponito. Et plumbū in aquā frigidā immergito, & postea rursus apponito, ac tædam eximito. Sæper autē aliquid appositū esse oportet. & interdiu quidem melius est tædā habere, noctu autem plumbum. Si verò surgere voluerit, cū cautione hoc faciat, quo penicillus intus quiescat. Sin minus, statim rursus subdatur. Si verò ex tædis apposis nullā suscipiat, tenuiorē facito, donec suscipiat, ex his ad illa trāseundo, & odedientes vteros faciēdo. Si verò neq; osculū aperiri poterit, neq; vteri propè accesserint, rursus ad veterē medicinā redito, à prima ad secundā, donec mollescāt, & propinquissimè accedāt. Et postquā im aperti fuerint subdititia facta apponito. Sint autē magnitudine oliuæ. Horum autē alterum appositū sit donec lique scat, & deinde alterū apponito. Quum autē apponere voles, ipsum subdititiū medicamentū ex resina præparatum, in oleum rosaceū aut irinū tingito. Nam aliàs ab osculo vterorum recedit. Prius tamen plumbū appositū esse oportet, quo recto osculo, in internā osculi partē attrahatur. Postea verò mollitoria apponito, Lauet autem calida, & ante, & post subdititia medicamenta. Et in cœna exhibeto quid ex relatis marinis. Exhibeto autem duobus aut tribus diebus ab appositione, cōsideratione habita an osculū vterorū bene habeat, & purum sit. Quòd si est, ab hoc subdititio quiescito. Postea verò mollitoria apponito. Quum verò inflammatum fuerit os vterorū, rursus eodē modo pharmaca apponito, reliquāq; facito iuxta relatū modū. Vbi verò probè habuerit corpus, velut dictum est sufflato. Sed & osculum, & vteros sufflare oportet sic. Subdititiū factū cum ficu apponito, duo autem subdititia facito, & antequā subdas fomentū adhibeto ex fœniculo prius relatū, postridie verò post fomentum, apponito medicamentum, & quum apponere voles, præ omnibus subdititiis vbi prius laueris ipsam ita apponito, postera autem die mollitoria auxiliantur quādiu inflammati fuerint, post

N 2. inflam

Hippocratis Liber I I.

inflammationem verò alia facito iuxta priorem rationē, fa- D
 cito itē de hoc subditio talia, qualia de priore. Et si quidem
 in mēse semel appositū, satis videbitur inflasse vteros, quie-
 scito. Si verò aliqua opus habuerit, rursus apponito eodē mo-
 do quo prius. postea verò vbi bene habere tibi visa fuerit, &
 tempestiuum esse, fomentum ex suffimentis præparato, præ-
 paratur autem hoc modo. Cyperum tulum præparato testæ
 conchæ mensura, & calamum vnguentariū eadem mēsurā,
 & iunci vnguentarij tantundem, cardamomi tantundē. Cu-
 mini item Aethiopici, anisi, & rutæ siccæ, & hyperici ac fœni
 culi seminis. Quū autē hæc præparaueris, vini austeri albi
 odoratissimi heminas sex in ollam infundito, & de contusis
 quadrantē inspergito ac permisceto. Deinde vnguēti Aegy- E
 ptij optimi, aut amaracini, aut irini, triū obolorū pondus af-
 fundito, permisceto, & molli fomēto plurimo tempore foue-
 to. Ante fomentum verò lauato, & duos aut tres dies foueto.
 Quū autē foueri desierit, operculum quoddā fomēto impo-
 nēre oportet, vt ne transpiret, postea verò tædis & plūbis vte-
 re. Quū autē duobus aut tribus diebus fomentū adhibueris,
 alias duas aut tres intermittito. Intermediis autē diebus bis
 in die lauato. Edat autem porrū coctum & crudum, & rapha-
 nos, & nasturtiū, & allium assatū ac coctum, & potus sit me-
 racior, & marinis prædictis vtatur. Quum verò intermedij
 dies præterierint, rursus fouere oportet, ita vt modicū de sin-
 gulis cōtulis ad prius fomentū inspergas, & vinū in super af-
 fundas, si opus esse videbitur. itēmq; oleum, atq; cū hoc fo- F
 ueas. Postquā autē fomenta bene habere tibi visa fuerint, &
 osculum molle esse ac apertū, velut cōuenit, & ipsi vteri pro-
 pè: postera die à fomento, pharmacū quod cum myrrha præ-
 paratur apponito. Sunt autē apposititia duo, postridie verò
 post purgationem, mollitoria subdito, quandiu vteri fuerint
 inflāmati. Postea verò tædis ac plumbeis penicillis vtēre.
 Post hæc intermissis diebus quotquot visum fuerit respectu
 ad inflammationes vterorū habito, & viriū corporis conie-
 ctura facta rursus velut scriptū est refoueto. Si quidē prius
 fomentū adhuc sufficiēs esse videbitur cōiectis ad hoc suffi-
 mentis velut prius, & vino ac oleo affuso. Si verò inutile esse
 prius illud fomentum videatur, aliud ex integro præparato.
 Oportet autem hoc pharmacum renouare in singulis adhi-
 bition

De Morbis Muliebribus.

283

A bitionibus, quandiu subcruenta purgatur. Si verò talia purgata fuerint, quiescat. Diata porro hoc modo constituatur. Interrogato in quibus diebus menses ipsi prodierint, & ab his initio facto, hanc diatā præscribito. Primum quidē multa calida lauetur, capite excepto. Quum autē cessauerit, caseum acrem, & ruta, vino nigro pari aqua tēperato diluito, & postea polenta inspersa, statim ex balneo bibēda dato. Deinde prædium tempestiuē exhibeto. Edat autem mazam aut panem, & porrum coctum aut crudum, & de huiusmodi omnibus acribus præscriptis, & aliquando leguminis fracti decoctum: spumā autem ne detrahito, & filphium multum detrasum addito, ac multa allia incoquito. Obsoniis autem vtatur pisciū, chartilagineis omnibus coctis aceto mulso dulci, aut fauorum cremore cocto: bolbidiis, polypodiis, in vino & oleo, & filphij semen tritum bibat. & quā plurima tum in prandio, tum in cœna edat. Lauetur autem post cœnā, quum requiescere volet. Hac diata ad dies quinque vel sex vtatur. post hos dies, mane ieiunæ sambuci fructus baccas sex, in vino meraco dato, & sepiæ oua decem aut duodecim. Hæc tria simul mane ieiunæ bibenda præbeto. post hoc verò pharmacum, potionem dato. At vbi interquieuit lauetur. Sit autē potio, ruta & caseus, atque sic prandeat præscripto modo. Serius autem cœnet, & semper bis in die lauetur. Hæc autē diata ad dies tredecim aut quatuordecim procedat. Quū verò hi dies præterierint, catapotia ex succo filphij fabæ magnitudine formato, atque hæc primum dato, postea verò alia præscripta facito. Quum autē dies trāsacti fuerint viginti quinque in hac diata, reliqua quidem facito eodem modo. Ante prandiū verò vbi prandere volet, allij segmenta quatuor, & caseum acrem tali magnitudine terito, & polentam modicam ammisceto, ac massam efformato, eāmq; primum edendam dato. Ante cœnam verò meracum obsorbeat, atque ita cibum capiat. De cætero verò eadē diata vtatur. Quum autem nouem dies reliqui fuerint ad tempus mensium, primū hoc dato. Cum ouis & sambuco, cuminum Aethiopicum, & castorij obolum, Vbi verò duo dies reliqui fuerint, ab his omnibus potionibus ac catapotiis abstineat. Verū pharmacū cum tæda præparatum ieiuna vbi lauit, sumat. Post medicamento verò potum, mercurialem & brassicam simul in aqua

Vicus.

N 3

cocta

Hippocratis Liber · I I.

cocta dato, cum aceto mulso dulci, aut fauorum cremore co-
cto, sale, sulphio & oleo cocta. Atque hæc in prandio edenda
præbeto, & succos sorbendos. & potū meraciore bibat. Obso-
niis autem vtatur polypodio cocto aut sepiolis. & hæc qui-
dem in prandio. In cœna verò sumat carnem caprinam, aut
ouillam, aut agninā percoctā, & porrum, & alia acria, quæ-
cunque voluerit. A cœna verò lauetur. & hæc sit diata po-
stremis duobus diebus. Si verò ex hac diata menses nō fue-
rint detracti, sequenti mense eandē diatā ab initio repetito,
vsque ad postremos duos dies. In quorum priore appositio-
nia facta apponat, iuxta superiorē rationem, ex pharmaco in
aqua facto. Apponat autē prælota. Verū cōsiderare oportet
etiā vteros quomodo habent, quo semper omni tempore
bene habeāt, & os rectum ac apertum sit, & si ita visum fue-
rit ante appositionem fomenta adhibeto. Quod si eruperint
menses, si quidem frequentes fuerint, paucioribus lauacris
vtendum est, & reliqua diata ac curatione. Si verò paucio-
res, pluribus. Si verò significationem de se præbuerint, rur-
sus eadē diata vtendum est, ac curādum donec menses appa-
ruerint. Quum autē semel talibus prodierint, optimū fue-
rit in ventre cōcipere. Atque hæc est omnium huiusmodi
morborū curatio. Si vteri cōtingant coxam, & incumbant,

Cūm vteri dura ac solida sit coxa ad lateris mollitudinem. & dolores
coxæ dicem imi ventris, & ad ipsam lateris mollitudinem, & lumbos ac
petunt. crura dolor incidit ac extenditur, & suppuratur. & linamen-
tis opus habent, & pereunt, nisi quid feces aut vras. Quum

Medela.

si habuerint, pharmacum deorsum purgās bibendū dato, &
multa calida lauato, & vteros foueto, ita vt vrinā veterem in
peluim infundas ac feruefacias, & supra ipsius cavitatē mu-
lierem colloques vestibis contectam, vt ne præterspiret, & si
frigeat vrina ferri igniti frusta in vrinā immittas, & fomē-
tum facias donec se obscurē videre, & animo deficere dixe-
rit. Lauato autem calida aqua, & postea digito contingens
os vterorum ad sanā coxam trahat. Et noctū mollitoria ap-
ponat Postquam autē dixerit directum esse facto prius cūm
odoratis fomento, rursus mollitoria quædam apponito. Imò
& plumbeos penicillos per triduum. singulis diebus vnum
post hos verò bryoniā albam, aut scillā per triduum, postea
verò consideratis mensibus disce, an biliosi sint, aut pituitosi,
aut

A aut an sanguis sit corruptus. & si opus fuerit ipsi sanguinem purgare, quocunque maximè opus habere tibi visa fuerit, id apponito. Et postea cū eiusmodi colluito. Apponito autē subdititia medicamenta, donec sanguis purus educatur, & hoc per triduū facito. Deinde ceruinū adipem liquatū, mollidana eo imbuta apponat. postea per diem pulegium subdat. & aromatis suffita sic ad virum accedat. Si verò ex partu morbus fiat, vbi ex vrinx fomento penitus purgata est, statim ad odorata accedat, & postea lota, oleum albū Aegyptiū ad sanā coxam apponat, & super hāc decumbat. Si verò neq; ad hāc transmueatur vteri, ieiuna pæoniæ grana nigra quinq; in vino odorato bibat. Et in cibo sumat allia cruda, & assata, & cocta. Obsoniis autem vtatur paucissimis. Si verò sana non fiat, similiter ipsam purgato velut in priore dictū est. Ceterum in hoc morbo si nō statim in ventre habuerint, steriles fiunt. Si verò sic habuerint, mensesque nō fiant, neq; febrilis calor corripiat, primū pharmacis sursum maximè purgato. Si verò debilis fuerit, deorsum. Et post pharmaci potionem, si pituitosa esse visa fuerit, vomat ieiuna, & accepto cibo, & plerunq; sana fiet. Si vteri ad coxā decurrerint, menses crassiores existentes nō prodeūt. Verū dolor ad imum ventrē procedit, & ad lateris mollitudinem, & morsum percipit. Quū sic habuerit, multa calida lauato, & allia plurima edenda dato, & lac conuenienter bibendū. deinde vinū meracū. & totā foueto, & pharmacū sursum purgās exhibeto. Si verò debilior fuerit, infra. Si verò curata fuerit, vteros cū foeniculo foueto, & absinthium ammisceto. Postquam autē recēs fota fuerit, os vterorum sensim, cū digito ad sanā coxam detrahito, ita vt & ipsum os, & partes circumcirca affectas leniter mollias, & mollitorium quoddam apponas, & postea plumbeos penicillos, & mox scillā, deinde narcissinū vna die interposita. Quum verò pura esse visa fuerit, netopū apponat in lana. & postridie oleū rosaceum. At mensibus prodeuntibus, melius est nō apponere. Si verò nō prodeant, cantharidas quatuor sine alis, sine pedibus, & sine capite. & pæoniæ grana nigra quinq; & lepiæ oua, & apij semen modicū in vino bibat. Et si dolor affuerit, & vrinx stillicidiū vexarit, in aqua calida desideat. & aquam mulsam aquosam bibat. Si verò non purgetur, rursus pharmacū bibat. Si autē purgatio prodeat,

Cum morbus ex partu contrahitur.

Medela.

Cum vteri coxas decurrerint.
Curatio.

N 4

ieiuna

Hippocratis Liber I I.

ieiuna cum viro coeat. Si verò nō prodeat, dato quod detra- D
hat ipsam, respectu ad vires mulieris habito. & tunc tutum
est vt ad virū accedat. Si enim in ventre habuerit, sana eua-
dit. In purgatione verò si multa prodeat, mercurialē edat,
Cum coxē- & polypos teneros coctos. & cibis mollibus vtatur. Si puer-
dicem ve- peræ vteri in coxā incubuerint, aut ad lateris mollitudinem,
xant. ad alterā coxam oleum Aegyptiū album, aut rosaceum ap-
ponito. Sed & in sanā coxā decumbere melius est. Bibat au-
Medela. tem pæoniæ grana nigra quinq; & sambuci fructus in tadis
conchæ testā maiorē, & castorium magnitudine fabæ. Et ci-
bis vtatur mollibus. Conuenerit autem mercurialis ante ci-
bum, cocta velut brassica. Sorbeat autem & ipsam decocti E
aquam. & acria comedat, exceptis raphano & cepis ac nastur-
tio. Optima est & lactuca. Quot verò morbos ex vteris
Vterorum fieri contingit? Dico autem quum vteri ex loco moti fue-
morbi. rint, aliò aliàs allabūtur. Ad quencunq; verò locū allapsi fue-
rint, dolores ingētes incumbunt. Et si quis vesicam contin-
gat, dolorē exhibent, & urinā nō suscipiunt, neq; geniturā in
seipso trahunt, & ambo dolent. & si non celeres solutiones
fiant, vteri postea suppurantur iuxta eosdem locos, si ad ipsos
decurrerint. Cōtingit autem hoc & in laterū mollitudine, &
Curatio. in inguinibus, & super pectine. Caterū in principiis quum
dolor habuerit, sic curare oportet, & tepefactoria adhibere,
& in aqua calida sedere. Bonum enim & hoc est: aut spongiis
ex calida aqua expressis fouere. & pharmaca vteris cōmoda
bibere. Si verò ad hæc non solvatur, pharmaco sursum aut F
deorsum purgare, vtro tandē opus fuerit. cognosces autem
id hoc modo. Si enim ad inguina, & pectinē, & vesicā irrue-
rint, hæc purgatione sursum opus habent. Si verò ad laterum
mollitudinem, & præcordia, hæc pharmaco deorsum purgan-
te indigent. At verò huiusmodi morbi omnes senioribus
magis quàm iunioribus fiunt, ad mēses suppressos. fiunt etiā
iuuenculis, vbi multo tempore viduæ māserint. Si verò ad
sedem cōuertantur vteri, secessus recrementa impediuntur,
Cum vteri & dolores occupāt lumbos, & imum ventrē, & intestinū re-
sedem pe- ctum ac podicem. Quum sic habuerit, calida ipsam lauare
tunt. oportet, & lumbis fomentū adhibere, & postea graueolentia
subter suffire, & apponere quæ purgant & impellunt vteros.
& bibēda dare quæcunq; libēter admiserit ex maximè con-
ferentibus.

Aferentibus. Si verò incumbant in inguina, & vrinae meatus, dolores fiunt fortes, & torpor in cruribus, & vrinae meatus obturatur, & vrinam non emittit. Curare verò oportet hoc modo. Ad nares quidem odorata apponito, & vnguenta. Ad vteros verò graueolentia suffito. Porro omnis occasio vteros propellere potest, si quid mali habeant. Nam & à frigore pedum ac lumborū, & à saltatione, & terrore, & lignorū secretionē, & cursu ad accliuem ac decliuē locū, & ab aliis multis propelluntur. Proinde hæc considerare oportet, ad totum corpus respectu habito, quū præsentēs morbi affuerint. propter talia enim omnia necesse est plus aut minus agrotare. & postquam hæc reluxerint, maximè hac parte repentinè morbi manifesti fiunt. Quū igitur hæc aduenerint, penitus ex tota homine deprehendere oportet. Nā quæcunq; perfrige rationes crurū, aut stupefactiones ex frigore fiunt, hæc omnes etiā in vterorū morbis vteros eleuāt. In talibus itaq; aquam calidam affundere oportet vteris & circumstitis locis, & ipsos ac crura excalefacere, quum allapsi fuerint. Si circunuersi fuerint vteri ex partu ad dextrā partem, & puerperij purgamenta nō fiāt, & dolor imum ventrē habet, & lumbos, & laterum mollitudinē, & dextrū crus grauatur, & torpor occupat, & nō tremit, & osculum vterorum cōtingere non potest, sed ipsos leues ac fortiter planos deprehendet. Quum sic habuerit, pharmacum bibendū dato, à quo sursum ac deorsum purgetur, magis verò deorsum, & totū corpus foueto, & præfertim vteros leniter, & calida bis in diē lauato, & ex potibus quencunq; libēter admiserit, experimento facto præbeto, & viro frequenter cōdormiat, & brassicā edat. Si vteri ad sinistram partē, aut coxam declinauerint, dolor acutus ac vehemens habet lumbos, & laterū mollitudines, ac ipsum crus, & claudicat. Quum sic habuerit, pharmacū infra purgās bibendum dare oportet, & postera diē suffire hoc modo. Ordei chœnices duas, & oleæ folia parum cōfringito, & gallā contundito ac cribrato, & hyoscyami tertiā chœnices partē. Hęc mixta & olei hemina dimidia subacta in olla noua, per dies quatuor suffito. Nocte verò lac bubulum, & mel, & aquam bibat, & calida lauetur. Si vteri transuersim situm habeāt, & obliqui fuerint, itēmq; os ipsorū menses ipsi partim occultantur, partim prius conspicui euanescent, & non similes fiunt, quantur.

Curatio.

Quam facile vteri moruantur.

Cum post partum ad dextrā declinant.

Medela.

Sin sinistrū perant.

Medela.

Cum obli-

N 5

sed

Hippocratis Liber II.

sed deteriores & pauciores quam antea. & genitura non fit **D**
 hoc tēpore. & dolor habet imum ventrē, & lūbos, & coxā, &
Medela. ipsa attrahitur. Quū sic habuerit, phar macū infra purgās bi-
 bendū dare oportet, & calida lauare, ac fouere. Vbi verò re-
 cens fota & lota fuerit, digito immisso os vterorum corrigat
 ac dirigat. & odoratorū suffitū admittat. & ex potibus dato
 iuxta experimentū, quem libēter susceperit. Cibis autē vtat-
 tur mollibus, & allia edat cruda ac cocta. & cū viro dormiat.
 & in sanā coxam decumbat. Alteri verò fomentū adhibeat.
 Morbus autē hic agrē cedit. Si verò propinquissimi fuerint
 vteri frequēter vomat. Vteros autē graueolētibus suffiat, do-
 nec in locū suū firmati fuerint. Diēta verò ventrē nō emol-
 liente vtatur. Si vteri extra naturā progressi fuerint, feбри **E**
 lis calor habet pudendū & imum ventrē. & vrina frequenter
 ac paulatim destillat. & pudendū vehemēter mordetur. Pa-
Cum vteri
extra natu-
ram pro-
grediūtur.
 titur autē hac si recens ex partu viro cōdormierit. Quū igitur
 sic habuerit, mirti baccas, & loti ramēta, in aqua coquito,
 & aquam per noctē sub diō exponito, atq; sic frigidissimam
 pudēdo affundito, & leuiter trita hac apponito. Postea aquā
 lentium cū melle & aceto bibēs vomat, donec vteri fuerint
 retracti. Sed & lectum à pedibus altiore facere oportet. &
 pudendū graueolētibus suffire, nares autē odoratis. Cibis ve-
 rò vtatur mollissimis ac frigidis. & vinū aquosum albū bi-
 bat. & ne lauetur, neq; cum viro coeat. Si penitus ex pudēdo
Morbi hu-
ius causā.
 exciderint vteri, depēdent velut scrotū. & dolor corripit imū
 ventrē, & lumbos, & inguina, & quum tēpus processerit, non **F**
 volunt in suū locū redire. Morbus autē hic corripit, quum re-
 cens ex partu laborarit, aut fatigata fuerit, vt vteros cōtactu
 læserit: aut cū viro coiuerit in puerperiorū purgatione. Quū
Curatio
 sic habuerit, frigefactorie mitigantia apponere oportet ad
 pudendū. & quod extra propendet depurgatū, malo punico
 in vino nigro cocto abluere, & intro protrudere. Deinde mel
 & resinā pari vtriusque portione colliquare, & in pudēdum
 infundere. Et decumbat supina pedes sursum extentos ha-
 bens. Postea spongas apponat. & ad lumbos deliget. Quādiu
 verò sic habuerit, à cibis quidē abstineat, potu verò parcissi-
 mē vtatur, donec septē prāterierint dies. & si quidē sic obe-
 dire voluerint & redire, satis sit: Sin minus, summas vteri
 oras derasas & ablutas, picato cerato illinito. Deinde pedes
 ad

- A** ad scalam deligato, vt caput deorsum p̄deat, & manu intro detrudito. Postera lauato, & crura ipsius vicissim colligato, atq; sic per noctē ac diem finito. & modicū ptisanæ succū frigidū dato, aliud autē nihil. Postera verò die reclinato, & curbitā quam maximā ad coxā affigito, & multo tēpore trahere finito, & vbi ipsum detraxeris ne scarificato, sed reclinata finito, & nihil prāter succū ptisanæ exhibeto, donec septem prāterierint dies. Si verò sitis vexet, modicū aquæ bibat. Quū autē septē trāserint dies, cibis mollissimis ac paucissimis vtatur. Vbi verò ventrē exonerare voluerit, decumbens id faciat, donec quatuordecim prātereant dies. Deinde tepidis fomētis colluatur, melius autē est calida velut ex sole.
- B** le. & quam parcissimē deambulet, & ne lauetur. Ventrē autē ne solueris. Cibis verò paucissimis vtatur, neq; acribus, neq; salis. & pudēdū graueolētibus suffiatur. & postquam obambulare inceperit, subligar gestet. Si verò extra pudendū os vterorū exciderit: vtpote ceruice vterorū propē pudendum sita, & ampla existente, sit autē hoc magis sterilibus, contingitq; maximē ex fatigatione, quum mulier laborarit, & vteri calefacti fuerint ac exudarint: tūc euertitur os ipsorū per ceruicem vt quod in humidiorē ac lubriciorē & calidiorē sit loco, quā in priori tempore. & vbi hoc cōtigerit, procedūt vteri foras ad frigus, & osculū ipsorum euersum prodit. Et si quidē breui curata fuerit, sana fit. Verū sterilis penitus relinquitur. Si verò non breui, osculū durū semper ipsi extra erit,
- C** & fluet illic aliās atq; aliās saniosus humor viscosus ac graueolens. Et si mēses prodierint, si adhuc eius ætatis fuerit, in lecto decumbet. Tēporis autē progressū huiusmodi morbus incurabilis fit. & cōsenescunt vteros foris habentes. Si verò vteri extra prominuerint, ablutos ipsos aqua tepida, olēoque ac vino illitos rursus indito ac deligato, & graueolētia subter suffito. Sub nares autē odorata. Si verò multo tēpore vteri promineant, & stupidē perfrigerentur, multā calidā aquam affundito, quo refocillentur. Si verò iam insentur, etiā aceto ad aquā ammixto foueto: Sitq; hæc aqua aut lauri aut myrti decoctū, & leniter protrudito, & cerato vnguento illinito. & si paruerint, satis est: Sin minus, cum aqua abluito, & aceto modico tepesfacto profundito. Deinde illinito. Vbi verò cōsederint, ablutos velut dictū est indito, & alia prædicta facito.
- Oleum

Cum vteri
procidunt.

Medela.

Hippocratis Liber I I.

Cū os vte-
rorum tor-
quetur.

Curatio.

Vterorum
lccera.

um valde
rocidunt
& nusquā
stuntur.

sedela.

Oleū verò ne adhibeto, neq; aliud pingue, aut pinguitudinē **D**
habens. Si quid ex osculis vteri cōplicatū fuerit, menses non
fiunt, aut pauci & prauī ac dolorifici. & quū viro cōdormie-
rit, dolet. & quicquid vir immiserit ex coitu exit, & contingi
nō vult, neq; attrahit geniturā. Et dolor habet imum vētrem
ac lumbos. & os vterorū ad contactum non cōparet. Quum
igitur sic habuerit, vrina veteri foueto. deinde vomat à lētis
decocto, melle & aceto ammixto. Postea aqua calida lauetur.
Deinde oleo albo Aegyptio in phialā argenteam aut æneam
infuso, & sale addito cōtecta phialā infideat, & si quidē odor
olei per os ipsi penetrarit, ipsam pariturā esse, & postera die
sanā fore pñūcia, ac cōfidere iube. & vbi dormire volet, oleū
Aegyptiū in lana apponat. Postridie verò cōsideret an os vte- **E**
rorum magis sit directū. & si esse dixerit, per triduū odoratis
foueto, & subdititia quæ nō mordeāt apponito, purgatoq; &
cū odoratis ac mollibus postea colluito, totidē diebus velut
prius. quū autē mēses p̄dierint, ieiuna, & illota, aromatis suf-
fita, ad virū accedat, Pleraq; verò ex hoc morbo steriles sūt,
si non curatus fuerit. Si vlcerati fuerint vteri, & extremē fo-
ras processerint, oleo illitis manibus indito. & myrrhæ puræ
pilulas tres deuorādas præbe. & laurū viridem tritā bibat vi-
no dilutam. & sic sana fiet. Si in arcum cōtracta fuerint pu-
denda, subdititium apponito. Anisi videlicet semen & apij
tritum pudendis subdito. Si vteri non in loco manserint, sed
modo hūc, modo illuc transferint, vt dolores exhibeāt, & nūc
incōspicui fiant, nunc exeant velut sedes. & quū quidem supi- **F**
na fuerit, in loco maneant, quum verò surrexerit, aut ex som-
no expergiscatur, aut se inclinauerit, aut aliū quēdā motum
fecerit, exeūt. sæpe verò etiā dum quiescit. Hāc quā maximē
quiescere, & non moueri oportet. & lectū à pedibus sternere
altiore. & vomitibus vti. Oportet enim ipsos sursum reuel-
lere, & acerbis perfundere. & graueolētia subter suffire. Sub-
nares autem odorata. & ex malis punicis quodcūq; maximē
cōuenerit & nihil impedierit, in medio per vmbilicū perfo-
ratum, in vino tepefactū quā penitissimē subdito. deinde la-
ta fascia deligato ac circūdato, vt ne elabatur, sed maneat, &
quod opus est, faciat. & de peplo, cū caseo, & polenta biben-
dum dato, quemadmodū supra in allapsu scriptum est. & de
portionibus experimento facto, quācūq; maximē admiserit,
biben

- A** bibendā præbeto. Cibis autē mollissimis vtatur, & cum viro ne dormiat, donec ad locum suum redierint. Si vteri exciderint, hederā sicciſſimam tritā, ac linteo alligatā apponito, & nihil pingue adhibeto. In potu autē exhibeto triticū recens, & peplum album, & ſaluiā, & cyperum, & aniſum. Hęc trita vino diluta, cū furfuribus ordeĩ bis in die dato, pro vice heminam dimidiam. Si ad crura & pedes vteri conuertantur, cognosces ſic. Magni pedū digiti cōuelluntur sub ungues, & dolor habet crura ac femora, & incūbit ac premit neruos circa femur. Quum ſic habuerit, multa calida frequēter lauare oportet, & fomentū adhibere ſi ferre poterit, & graueolentia ſubter ſuffire. Et femora roſaceo oleo inungat. Si verò loqui nō poterit, crura derepēte frigida reperiſis, & genna, & manus, & ſi vterū cōtigeris, nō in ſuo mūdo eſt, & cor vibratur, & dentibus frendit, & ſudor eſt multus, & alia quæ à ſacro morbo correpti patiūtur, & quæ ab aure exſudāt. His frigidā aquā multā aſfundere oportet ſuper crura & manus, & alia facere velut prius dictum eſt. Si cōmoti vteri aliquò allapſi fuerint, & dolorē exhibuerint, oleæ ſcabiem, & lauri ac cupreſſi ramēta in aqua cocta, lana excepta ſubdito. Quū mulier recēs enixa, onus maius quā pro natura leuarit, aut timuerit, aut ligna ſecuerit, aut cucurrerit, aut alia quādā huiusmodi fecerit, vteri excidūt ob hęc maximè: aliquādo verò ad ſternutationē. Non enim violatur, ſi per vim ſternutās, nō apprehēderit nares. Proluere itaq; aqua tepida vteros oportet. Deinde betæ ſucco ſeruefacto ſimiliter, poſteā vino nigro meraco. Si verò non obediat, mollitoria facere oportet. Verum hęc facere oportet priuſquā perfrigerentur, & leniter intro indere. Deinde crura extēdere, ac ſubalternatim ponere, & molle quiddā ipſis ſupponere, à potu verò coērceri oportet tales quā maximè, & vētrē custodire, vt ne exturbetur. Naribus autē odorata adhibere. Huiusmodi verò poſteā ſi nō quieuerint, ſed moueātur, veratro purgare oportet. Et ſi non ſatis fuerit, etiā vomitus facere, & nō lauari, tacerēq; ac quieſcere. Si inflati fuerint vteri, venter attollitur, & inflatur, ac ſonitū edit, & pedes & cauæ faciei partes intumeſcūt, & color iniucūdus ſit. Et mēſes occultātur, & genitura hoc tēpore nō manet intus, & anhelat, ſpumātq; ac anxia eſt, & quū expurgitur è ſomno, recta ceruice ſpiratio ipſam corripit, & quicquid

Procidētia
medela.Quum vteri
crura &
pedes pe-
tunt.
Medela.Quæ repē-
te obmutes-
cunt.
Curatio.Procidentia
vulvæ.
Medela.Quum in-
flati vteri
ſint.

Hippocratis Liber I I.

Curatio.

Vterorum
duritia.

Medela.

Duritia
alia.

Morbi hu-
ius causa.
Medela.

Quum vte-
ri obdure-
sunt.

Curatio.

quicquid ederit aut biberit, ipsam molestat, & suspirat, ac tri-
statur magis quā priusquā edit, & suffocatur, & nerui cōtra-
hantur. Et vteri ac vesicæ dolēt, & manus cōtractū nō admit-
tunt. Neq; lotiū emittūt, neq; geniturā suscipiunt. Quū sic ha-
buerit pharmacū deorsum purgās bibendū dato, & calida la-
uet, ac frequēter insideat toto corpore. Quandoq; etiā vsq; ad
vmbilicū fomētū adhibeto, & interpolito tēpore ea apponi-
to à quibus purgetur, & nō mordeatur. Suffumiget autē odo-
rata subter pudenda: sub nares verò graueolētia. Et potiones
dato quæ vteros purgāt, & ad locū impellunt. Et mercuriale
edat, & postea lac bibat, velut de latere scriptum est. Morbus
autē hic non est diuturnus. Si velut in callū indurati fuerint
vteri, & osculum exasperatur, & menses occultātur. Quū au-
tem prodierint, asperi apparēt velut arena. Si verò etiā digi-
to contigerit, os vteri asperū cōperiet, & semper velut callus
accrescit. Quum sic habuerit, cyclaminū terere oportet, & sa-
lem ac ficum simul miscere, & cum melle glandulā efforma-
re ac subdere, & fomento adhibito, purgantibus eluere. Edat
autē mercurialem & brassicā coctā, & succū sorbeat. Itēq;
porrum, & calida lauetur. Si verò velut in callum indurati
fuerint, & mēses obtorquentur, & osculū ipforum clauditur,
& nō concipit, & velut aliud quid est, & si cōtigeris, velut la-
pis illic esse videtur, & est os asperū ac multis radicibus præ-
ditum, & nō leue aspectu, & qui ipsum considerat, digitū in-
tromittere nō potest, & febris circūfrigerans corripit, & fre-
mitus, & dolor vteros habet, & imum ventrē, & laterū mol-
litudinē, ac lumbos. Patitur autē hæc, si ipsi corrupti menses
cōputruerint. Quādoq; verò etiā ex partu, & frigore, aut ma-
la diætā, & aliter. Medicamentū igitur bibendū dare opor-
tet, & multa calida aqua lauare. Oleo item vtere, & fomentū
adhibe. Quum autem recēs lota aut fota fuerit, specillo im-
misso aperito, & os ipforū dilatato, idēq; cum digito simi-
liter effcito, & mollitoria velut dictū est apponito, & potio-
nes similiter bibendas dato, & eodem modo curato. Si verò
obduruerint vteri, osculum ipforū durum fit, & clauditur, &
menses nō prodeunt, sed pauciores & deteriores, & dolor in-
cidit, & febris & rigor corripit circa imū ventrē, & lumbos,
& laterum mollitudinem. Quum sic habuerit, multa calida
lauato, & tepesfactoria adhibero, si dolor habuerit, & vteros
multo

A multo tēpore cū aqua decocti cucumeris syluestris fouero. deinde mollitoria apponito. Atq; hæc per triduum facito: & si ex cōtactu osculum vterorū molle apparuerit, ex crudo lino tres peniculos suppuratorios indito, primū tenuem, secundum paulò crassiorē. Crassissimus aut sit magnitudine digiti parui, lōgitudine verò quinq; digitorū ita vt hos adipe anferino illito subdas. Sed & vbi fomentū adhibueris ex odoratis, glādem mollitoriā apponito: Aut nitrū tali magnitudine illitū, vt ne sauciet. Nō enim pungere oportet: & appositum sit ad duos dies. Decedit autē velut cortex & pellicula crassa. Intermisissis verò tribus diebus, cyclaminū, cum narcissino subdito. Si verò hæc nō purgarint, cum multa cōsideratione

B apponito id quod cū buprestis paratur, & appositum maneat per diem: & vbi fortiter momorderit, glandē extrahat, & pudendū colluat cū aqua calida, & in oleo infideat: postridie verò lota. ceruinū adipē liquatū, & molli lana exceptum apponat. & si tibi adhuc purgatione opus habere videatur, tribus interpositis diebus, id quod cum narcissino paratur subdito. postridie autē netopū. Deinde rursus tribus diebus interpositis, vteros odoratis & pinguib. colluito. postridie verò pulegium per vnū diē apponito: & sequēti die cū aromatis suffito ac foueto. Vtatur autē cibus acrib⁹, marinis, aut carnib. In mēib⁹ verò castoriū bibat: & ieiuna illita suffita, & cyceonē bibēs ad virū accedat. Si verò inter os vterorū nō suscipiat

C geniturā, sed durū fuerit, ac cōclusum, plumbeū penicillū apponat, velut dictū est per triduum, vbi calida lota est. & mollitoriis vtatur, & supina decubat: & in aquā calidā infideat: & lanā vnguento imbutā apponat. Verū noctu magis apponere oportet. Iuxta coxas verò vestes laneas aut lineas molles supponat, vt ne corpus in alterutrā partem dilabatur. Vtatur & subdititiis mollib⁹, ex myrrha pinguisima, pice, cera, & adipe anferino. Sit autē myrrhæ dimidiū, reliquorum verò duplum, & in lana subdat: duo verò sint subdititia quorū alterū lota per diē subdet, alterū per noctē, donec molle factū fuerit: & vbi hoc detraxerit, aqua odorata colluatur. Aut granacnidia decorticata quindecim, & Indici medicamēti aliquātulum, si ita visum fuerit, in lacte mulieris masculū lactātis terito & cerui medullam, & alia quæ dicta sunt, ac modicum mellis ammisceto. Sit autē lana qua hæc excipiuntur mollis

& pura

Cum semē
non admittitur.
Medela.

Hippocratis Liber I I.

& pura, & ad diem subdat. Si verò fortius facere voles, myrrhæ parū quid ammisceto. Optimū autē est oui candidum, & adeps caprinus, & mel, & oleū rosaceū: his ammiscere farinā, & reperfacere ad ignem oportet, & quod destillat lana colligere ac apponere. Aut adipē rubrum anseris aromatibus cōditum, & vnguentū rosaceū, permixta & lana excepta apponito. Præstat autem anseris adipem, & adipē ouillum, cerā albam, resinā, netopum, oleum rosac. hæc simul liquare ac miscere. Vbi verò lota est, hæc tepida intrò ad vterorum osculū apponat. Aut cerui medullam, & anseris adipem liquato, & rosaceo aut irino oleo ammixto, in valde molli lana apponito. Cū mulier i vteri duri facti fuerint, & ad pudenda exierint, dura sūt inguina, & ardor in inguinib⁹ est, & omnia cācerātur. Cū igitur sic habuerit, cucumeris syluestris internam partem, & fauum terito, & aquæ hemina affusa in sedē infundito, & purgatur. Si os vterorum durum fiat, & ceruix, præ siccitate, & morbus leuiter hæserit, ex digiti cōtactu cognosces. & si ad coxā deuoluantur, nihil acre adhibeto. Si em exulceretur aut inflāmetur, periculum est ne penitus sterilis fiat. Verū apponito ea quæ non mordent, à quibus purgetur. Quū verò duri fuerint vteri, & sic doluerint, subdititia apponito, velut est cerui medulla, aut anserinus vel suillus adeps. & vnguentū irinum cum melle: & oui luteum, ac cerā albā, velut cataplasma emollito, & ordeaceā aut triticeam farinā, cum aqua & ruta coquito. Si vteri cōclusi fuerint, oscula ipso rum dura fiunt, & geniturā nō amplius suscipiūt, sed statim F vbi cum viro cōdormierit, dum crura mouet, exit. & dolores imū ventrē, & lumbos, & inguina occupāt. & mēses omnino nō prodeūt. Si verò eant, pauci & prauī ac decolores prodeunt. Cū sic habuerit, multa calida lauato, post balneum verò castorium cum pæoniæ radice, in vino nigro odorato permixta bibenda dato. Cibis autē velut puerpera vtatur. & si manifesti fuerint mēses, diem vnā intermittito, & totā fouero, & pharmacū potādum dato, si adsueta fuerint, sursum purgīs, aut si egere visa fuerit, deorsum. Lac itaq; asininū, aut serum exhibeto, & leniter foueto, & mollitoria vtero apponito, & cyclaminū, & narcissinum. Cucumerū verò paruorū syluestrium internā partem sumito, & ex diuulsis semen eximito, ac lacte mulieris masculū lactantis affuso terito, myrrha

**Duritia v-
terorum.
Medela.**

**Cū os
vulvæ sic-
citate du-
rescit.**

Medela.

**Cū vul-
ua claudi-
tur.**

Medela.

A rha pura & melle optimo ammixtis, oleoq; Aegyptio albo. & ne liquidum facito medicamentū, sed siccū, atq; hoc in lanam mollem purā infarciat. & in oleo Aegyp. albo tingat, & loti apponat. Subligetur autē & sub tecto maneat cū purgatur. Postquā autē sufficiēter habere tibi visa fuerit, quiescat. Sin minus, rursus aliud apponat. postea verò obuolutā lanā mollem, rotūdā faciat, & netopum immittat, & diem vnam subdat. postridie verò oleum rosaceum iridē in lana. Deinde rursus cerui adipē, etiā ipsum liquatū in lana. Lauetur autē calida aqua semper ante subditiorum appositionē. Et odoratis leniter foueatur multo tempore. Postea verò vna interposita die, colluito, si quidē pituitosa fuerit, eo quod cū grano cnidio paratur. Si vero biliosa, eo quod cum scāmonia, post hęc ambo, postridie etiā narcissino, cū vino dulci colluito. Si verò narcissinū nō fuerit, cum anthino aut irino quā optimo. Sit autē olei tertia vini pars: deinde interpositis duobus diebus, id quod cum pulegio pręparatur vnū diem apponat. Si verò prodierint menses, ieiuna per triduū bibat castoriū, cum vino odorato albo: vbi verò defuerint menses, & stabiles fuerint, lauetur: & aqua frigida perluta, cyceonem bibat nō falsum. Cibum autem ne contingat: & cum viro dormiat duobus aut tribus dieb. Quāto verò tempore purgatur, mercurialem in aqua coquēs, vbi cocta fuerit exprimat, & alliū ac cuminū, & salem subterat, & oleum his ammisceat, & modico succo affuso feruefaciat. Atq; hoc edulium ante cibos edat. Allium item coctū ac assatum quā plurimū accipiat.

C Si verò mercurialis non fuerit tenera, tritā cum brassica coquere oportet, & cōdire, & lenis erit: & si in ventre cōceperit, sana euadet, & omnia ipsi iuxta ornatum procedēt. Si os vterorum cōclusum fuerit, sit fortē velut grossus, & si digito cōtigeris, deprehendes durum ac cōuolutum, & digitum non admittit: & menses occultantur, & geniturā nō suscipit hoc tempore: & dolor habet inum vētrem, & lūbos ac laterum mollitudinē. Quandoq; verò etiam sursum ascendit & suffocat. Cū sic habuerit, pharmacū deorsum purgans bibendū dare oportet, & multa calida lauare, & apponere ea quę os molliunt: & specillum immittere ac aperire, itēmq; digitū & similiter leuigare. Cū autem molle fuerit, apponere ea quę sanguinem purgāt: & potiones exhibere, & experiri vt

Pituitosa
& biliosa
purgatio.

Cū os vul-
uæ claud-
tur.

Medela.

Q

præb

Cum vteri clauduntur. præbeas quodcunque aliud libenter susceperit. Brassicā autem edat, & succum sorbeat. Si vteri cōclusi fuerint, & menses non apparuerint, colocynthidem syluestrem, & silphij semen, & cuminum Aethiopicum, & nitrum, & salem thebaicum, & adipem rhenalem, & farinam, & myrrhā, & resinam omnia simul feruefacito, & trito mixta, & in glandem efformata apponito. Si grumoli facti fuerint vteri, os ipsorum velut eruo plenum fit, & si contigeris, videbis ita habere, & menses non fiunt, neq; genitura intus manet. Quandiu sic habuerit, cyclaminum cortice detracto, & allium, & salem, & ficū, ac modicum mellis, terito, misceto, ac glandem formato, & ad os vterorum apponito. Itēq; alia subditiua, quæ acria sunt ac corrodiunt, & à quibus sanguis purgatur, & de potio-

Cum grumoli fiunt vteri. Medela.

Cum vteri hiant.

Morbi causa. Medela.

Quum per menstrua hiant.

Medela.

nibus dato eas quæ vteros purgant. Si vteri præter naturam hiarint, menses plures prodeunt & viscosi, & frequēter, & genitura intus non manet, & osculum hians est: & fieri non potest ut genituram attrahat, & febris ac rigor corripit infernum ventrem, & lumbos. Morbus autem corripit ex fluxu sanguineo, fit & quum menses suppressi derepētē eruperint. Diætæ itaque ratio prius relata est. Oportet autem subditiuis curare, in principio quidem purgatoriis simulq; molli- bus. Deinde leniter adstringentibus, & partes infra umbilicum per spongas fouere, cum myrti aut rubi aqua, aut ex oleæ aut rosarum, aut cœnanthes, aut vitis foliorum decocto.

Si os vterorū hiarit amplius quàm in mensibus solet, menses ita fiunt plures & deteriores omnes & liquidiores, & per longius tempus, & genitura nō attingit, neq; manet, sed rursus exit, & si permanserit, osculum comperies disparatum, & impotentia præ mensibus obtinet: & levis est ac debilis vterus, & vltius procedit: & vires laxantur, & febris debilis, ac rigor, & dolor habet inum ventrem, & laterum mollitudinem ac lumbos: patitur autē hæc maximè, si quid in ipsa corruptum computruerit ac compactum fuerit. Quædam verò etiam ex partu patiuntur, aliæ etiam aliter. Quum itaq; sic habuerit, pharmacum bibendum dare oportet, & facilius iudicabitur, & si dolor habuerit, tepefactoria adhibeto, & frigida lauato, ac intermissione facta colluito: & ex potionibus dato quacunque maximè libenter admiserit: & suffito ea quæ resiccant: & polypos edat ac mercurialem. Si verò

non

A non conclusi fuerint vteri velut oportet, in aqua desideat in qua cocta sit myrtus, aut lentiscus, aut vitis aut oleæ folia, aut rosarum. Diara verò sit quæ relata est in rubro fluxu. Optimum verò ipsi auxilium est fitis, frequentes vomitus, & prohibitiones balneorum. Quum vteri magis quàm conuenit, fuerint aperti, & non conclusi, & purgatione opus habent, & collutionibus, & suffimentis. Si verò menses effluerint, plures fiunt & deteriores, & liquidiores, & frequentes. Et genitura non manet intus, sed quando illi prodierint, perit. Et si os cōtingas digito, comperies ipsum leue. Et impotentia ipsam præ mensibus corripit. Et febris ac rigor obtinet, & dolor imum ventrem, & lumbos, & laterū mollitudinem corripit, maximè si quid in ipsa corruptum computruerit, itémque ex partu, & aliter. Quum igitur sic habuerit, curare oportet, vbiunque tandem dolor fuerit, velut in superioribus scriptum est. Si vteri inflammati fuerint, menses

Cum vteri non satis clauduntur vel nimis patent.

B obtorquetur, & ceruix multis tenuibus venulis, ad telarum araneæ similitudinem variegatur. Et febris est acuta, & mētem percellens, & menses prauis ac paucis ipsi comparent. Et quum ieiuna fuerit, vomitus quidam ipsi superuenit. Quum verò quid comederit, reuomit. Et dolor occupat imum ventrem & lumbos, & animo linquitur, & per totū corpus perfrigeratur. Venter autem nunc durus, nunc mollis est, & incenditur & attollitur, & putat se in vētre habere. Quandoq; verò ventris moles vacua apparet, & aluus aqua impletur, & umbilicus prominet, & osculum gracile fit, & derepente apparent menses stridentes, & pauci ac prauis & attenuatur circa clauiculas & collum, & pedes intumescunt, & præsertim pedum extremitates. Quum sic habuerit, pharmacum infra purgans bibendū dato, & subdititiis vtatur, & fomentis vteri foueantur odoratis. Per diem verò plūbeis penicillis vtatur, & ante appositionē, aqua calida nō mordēti colluito, & post appositionem hoc infuso colluito. Cnestri duas portiones in aquæ hemina coquito, & aquam excolato ac infundito, oleo narcissino aut anthino ammixto. Post hæc tres dies intermitto, deinde cū eo quod cū aceto paratū colluito, & ante cibū, mercuriale cū aliquātulo vino coquens edat velut brassicā, & succū sorbeat. Si verò permāserit, pharmaca bibēda dato à quibus aqua de vteris purgat. Cibis autē vtatur panibus,

Cum vteri inflammantur.

Medela.

O 2

& ole

Hippocratis Liber I I

& oleribus coctis, flaccidis. Marinis autē potius quā carnibus. Aut extremis partibus coctis, flaccidis, & laboret quā plurimū, & ante & post cibū & quā minimū lauetur frigida, & à dulcibus ac pinguibus omnis generis arceatur. Diebus autē purgationū intermediis, adiatū bibat ieiuna in vino diluto. At morbus hic lethalis est, & pauca effugere possunt, si nō in vētre cōceperint. In vterorū inflammatione menses obtorquentur, & quum ieiuna est, vomit. Vbi verò comedit, dolor habet imum ventrē & lumbos. Et totus vēter modo durior, modo mollis fit, & nō valde cōfidet. Alius magna fit, & non purgatur, & sibi prāgnans esse videtur, & patitur quaecunq; prāgnātes perpeti solent. Et si ventrē cōtigeris, leuem cōperies tumorem velut in vtre, & quum partus tempus esse visum fuerit, vteri cōcidunt, & menses pauci ac deteriores fiunt. Huic pharmacū deorsum purgans bibendū dare oportet, & purgatoria apponere. Purgata verò sana euadit. Si inflammatus fuerit vterus, vellicatur. Si verò quid corruptum fuerit ac vitiatū recruduerit, febris corripit acuta & magna, & horror durus, partes circa pudenda, & horribiliter afficitur, & morderetur, & cōcitur, & si quis digito contingat, rursus peius habet, & pungitur, & caput dolet ac finciētur, & caligo adest, & sudor frontis. Extremæ partes perfri-
guntur ac tremunt, & sopor profundus aliquādo occupat, & audire non potest. Neque reliquus sensus operatur, fastidium cibi est multum, & stomachus & venter omnino non continet cibum, & vociferatur, & exilit, & pectinem dolet, & inguina, & lumbos, & occultos pudendi locos, & cito moriuntur. Si verò dolores ad extremam debilitatem deduxerint, spōgiis calidis ex aqua & oleo expressis foueto, & subditicia mollia apponito, medullā cerui, apidem anserinum, & cerā albam, & oui luteum. Aut ceratum picatum cum resina subdito. Vino verò aut lacte caprino purgato, aut volucrius iusculo. Vinum autē ne bibat, & ptisanæ succū sorbeat.

Quum do-
lor vteros
molestat.
Medela.

Ad dolorem vterorum medicamentum infusile. Si dolor solū fuerit vehemens & violentus, caligo in vteris inest, & flatus non exit, sed isthic manet malum. Oportet igitur sic curare. Atriplicis sylvestris semen, & betas simul trita ac tepesacta, in vteros infundito. Aliud dolores vterorum sedans. Vini suauissimi pari aqua temperati tres semicongios Atticos

A cos sumito, & fœniculi radices ac seminis eiusdem trientem, & olei rosacei heminam dimidiam. Hæc in ollam nouam immittito, & vinum superfundito, deinde foueto. Apponito autem & scillam, donec osculum molle factum fuerit & ad lationem idoneum ac apertum. Et quum in purgatione pustulæ circa osculum vteri exortæ fuerint, sic curato. Carnem bubulam, cum butyro aut adipe anserino & aniso tritis illine, & ipsam carnem in pudendum inde. Si ignis sacer habuerit vteros, intumescunt pedes, & mammae, & corpus. & dolor ipsam corripit, & recta ceruice spiratio fit, & dolet laterum mollitudinem, & partes sub vêtre, & pectora, & caput, & tremor occupat, & torpor manus, & inguina, & poplites tremunt. Quandoque verò & in poplitibus liuidæ fiunt, & modico tempore melius habent ex hoc colore. Maxime verò mammae attolluntur iuxta gentilitatis cognationem. Attamen non valde dolet, & febris ac rigor corripit, & facies rubicunda fit, & sitis fortis est, & hepar resiccatur. Hæc si prægnanti acciderint, moritur, & non poterit effugere. Si ignis sacer in vteris fiat, tumores fiunt liuidissimi, à pedibus exorsive usque ad crura tota, & ad lumbos. Quanto verò tempus amplius progressum fuerit, etiâ pectus percipit & intumescit, & tota perfrigeratur, & febris habet magna, & rigor superuenit, & spiritus densus, & animi deliquium, & debilitas, & dolor totius corporis, & tristatur, & mente variatur. Et affectio ascendit ex inferno ventre ad lumbos, & ad dorsum, & præcordia, & pectora, & collum, & caput, & stomachum, & mortua esse videtur. Quum autem dolor solutus fuerit, torpor habet lumbos, & inguinâ, & crura, & in poplitibus liuores fiunt, & modico tempore melius habere sibi videtur, deinde rursus affligitur, & corpus pustulis cõpletur, & rubores cõspicui ac manifesti faciem occupant, & guttur siccū est, & lingua aspera. Hic morbus si prægnatē inuaserit, occidit. Sin minus, medelâ adhibere oportet, & lac asininum bibendum dare ac purgare. Si verò sic non solvatur, ventrem mollibus frigefactoriis perfrigerare, & subdititiis non molestis & leuibus paulatim purgare. Itémq; vomere. Ad hoc cõmodum est sambuci folia sumere cocta cum origano, aut thymo, aut ruta. Si verò febris dimiserit, etiâ vinū ac cibos dulces dato. Aqua inter
Veruntamē pauca curantur. Aqua intercus si in vteris fiat.

Erysipelas
vterorum.

Medela.

Hippocratis Liber I I.

Medela.

Ventus vte
torum.

Medela
quz.

menes prodeunt arenosi & aquosi, & nō valde cruenti. Intu- D
mescit & vterus, & venæ, & propinquissimæ partes. & præ-
gnans sit, deinde suffocatur. & mammae fluunt, & imus ven-
ter durus est, ac intumescit, & omnis circuncirca locus, & do-
let si quis ipsum attingat. Et febris ac stridor dentiū corri-
pit, & dolor vehemens laterū mollitudinē ac lumbos, & se-
men in somnis effundit, & peius habet. Hanc calida lauare
oportet ac tepefacere. pharmacum autē bibendū dare, & cū
debilibus fouere, & cyclamini obolos tres in linteo deliget
ac apponat. Et cupressi succum in aqua madefaciat, ac can-
tharidas eadē terat, & modico tempore apponat, & per mul-
tum tēporis interuallum. Efficax est. Subdititiū. Cuminum
chemæ mensura, vna passa alba. Aliud. Vrticæ semen, ari E
radix. Horū quodcūq; voles leuiter apponito, vbi verò ex-
purgaueris colluatur, ita vt detrahas & cum infuso pudenda
colluas. & simul cū viro dormiat. & si foetum ad partus tem-
pus gestarit, tota expurgatur, & sana fit. Alia aqua intercus
vterorum. Subcruentū quiddā fuit saniosum, & purgatur,
& mordet valde, & vlcerat pudenda velut muria, & circumsi-
tas partes. & quocūq; destillarit, vlcerat, & color est morbi
arcuati. De cætero verò purgatur copia velut in aliis fluxio-
nibus. Morbus autē hic & debiliior est, & aliquando lethalis
fit. si vteri egressi fuerint. Hāc curato velut eam quæ à fluxu
albo vexatur. & lac asininum bibendū dato, & extenuato, &
prædictis pharmacis curato. Eclegma. Quod delingitur ad
aquam intercutē. Si aqua ex vteris fluat, sulphur & anseris F
adipem delingat. Si vētus in vteris fuerit, flatus exit. & stri-
det, & tota intumescit, & febris habet & ardor, & ad hāc val-
de exilit præ dolore. & virum non admittit, & valde a grē
fert coitum, & erigi nō potest, & velut onus graue ipsi in vte-
ris iacet, & caput dolet, & anxia est, & loqui non potest. Si ve-
rò dolor accesserit, clamat, & dolet omnia, & lumbos, & pu-
bem, & sedem. & vrina supprimitur, & venter suffocatur. &
mori cupit. & præcordia distenduntur, & stomachus morde-
tur, & os amarum est. & vomit acida & pura ac meraca. &
frequenter ructat, & melius habet. Sin minus, intumescit. &
si attigeris, renititur & dolet. Proinde vterū cum aqua mul-
sa, & aceto mulso ac oleo colluere oportet. Et cuminum aut
anisum tritum sumere, & lini folia terere, & volucrinum
adipem

- A** adipem cum ovis in aqua infundere. Subdititiis verò ac portionibus vtere, quæ ego describā. Desideat autē in oleo calido, & aromata in ipsum immittito, iunci odorati florē. Aut in aqua lauri, aut marina desideat. Optimū autem est molli-
 bus infusis ventrē purgare, aut glādem apponere quē adme-
 dum puero vter soluitur, lanam illotā cū melle. Si verò an-
 tiquior fuerit, cepam in oleum aut mel tinctā apponito. Aut
 taurinum fel, aut nitrū cum melle. Aut mali punici acidi nu-
 cleum, cū melle & ordeacea farina. Si mola ipsa innascitur
 à crassa genitura intus retenta, thymbram tritā in aceto &
 aqua, liquidā bibendā præbeto. Aut hyoscyami semen tritū.
 & cum muria ac silphij succo & aceto colluito. Aut si opus
 fuerit cū aqua. Optimum verò est aquam mulsam infunde-
 re, cum aqua lentiū, aut erui, aut floris violæ. Si verò purga-
 ta fuerit à talibus quæ sunt velut igne ambusta, myrtum co-
 quito ac perluito, & myrrhā ac netopum cū lana apponito.
 Si ventus in vteris fuerit, ac momorderit, & qua trālit dolo-
 rem facit, & præ ardore intumescit, & dolet, & virū auerfa-
 tur, & coitum valde ægrè fert, & tenditur ac intumescit pe-
 cten, & erigi nō potest, nec dirigi. Quum sic inueneris, scito
 quod ventus & genitura in vteris est, & propterea nūc agro-
 tet. Accipe itaq; mel, ceram, lini folia trita, & adipē volucri-
 num, & hæc in vino odorato tepefacta per clysterē in vteros
 infunde. Apponat autem folia lini. Aut semē lini terito, & in
 lanam inuoluito, & ad os vteri apponito. Sin minus, efficacio-
 re vtere. Irinum & crocū, & lini folia, & adipem volucrinum
 terito, & lacte muliebri diluta, rasura de tenuibus linteolis
 derafa excipito ac illigato, & ad vteri osculum apponito. Et
 si pinguitudo carnosior enascatur, quod consumat indito, &
 mediocriter attenuato. Quæ enim valde attenuantur, raræ
 fiunt & abortiunt. Si verò geniturā nō suscipit vterus, sed di-
 mittit, & calorem in seipso nō habet instrumentum parare
 oportet, cui insidens vaporē intra vterū recipiat, ita vt vestes
 circumcirca ponātur. Suffire autem oportet casiam, cinamo-
 mum, myrrham, singulis pari portione vino sirao siue sapa-
 tum. subactis, & super prunas cōiectis. Modicè verò lauetur, & mo-
 dicè cibūumat. Opitulatur & subdititiū huiusmodi. Myr-
 rham mollem cum melle efformato. Sit autē ob longa velut
 glans. & sæpe hæc facito viriū respectu habito. Profunt & pe-
 lecini

Ventris fa-
cilis solu-
tio.

Mola quæ
fiat, & dis-
cutiatur.

Cum ven-
tosa sit vul-
ua.

Medela,

Cum semē
reiciit.

Suffimes-
tum.

lecinii in frumento nascentes, cū myrrha triti. Mel quoq; co- D
quito, & cum tædis agitatum permisceto, & fabæ Aegyptiæ
magnitudinem apponito. fel item taurinū, & rhoem rubrū
pari portione. Conyza herba est similis apio crispo, nascitur
autem prope mare in locis arenosis, odor verò eius agrè to-
lerari potest. Hæc cum melle & vino apponito. Aut bulbion,
conspicitur autem in tritico, maximè Aegypto, acre simile
cumino Aethiopico: hoc & allium & nitiū simul apponito.

Capitis do-
lor.

Verum antea lauetur. Quum mulier caput dolet, & sinci-
put ac collum, & vertigo præ oculis obuersatur, & timet, &
tristis fuerit, & vrinē nigræ, & similia etiā per vterū prodeūt,
& anxietas ac mœror ipsam tenuerit: atra bilis in vteris in- E

Medela.

Dolor vul-
uæ.

est. Curetur autē sic. Cucumeris syluestris anniculi internā
partē, fel tauri, florem æris, cū bacchare terito, & subdititia
formato. & pharmacū bibendū dato, ac lauato. Quum verò
mulier vteros mordetur, & dolet, lancinatūq; & bilē flauā
mingit, & vterus hiarit, & oculi fuerint velut morbo regio
affectorū: scito quod bilis in vteris est. Quapropter optimū
est expurgare totū corpus, & ipsos vteros subdititiis, quæ bi-

Vulua fri-
geiscens.

Medela.

Oris malus
odor.

lem educunt. Quū verò perfrigeratur vterus, & onus insitū
esse videtur, & color non est clarus, & compactus est vterus.
Quum sic habuerit, purgare oportet cū eo quod pituitā du-
cit, & attenuare, ac frequēter vomere. Quum mulieri male
oluerit ex ore, & gingiua nigræ fuerint ac prauæ, caput lepo-
ris, & mures tres seorsim exure, & ex duobus muribus ven-
trem exime, hepar autē & rhenes nō. & in pila lapidea mar- F
mor, aut lapidē album terē ac cribra, deinde singulorū pares
portiones miscere, ac dētes cōfricare oportet & locos in ore.
& postea lana succidissima fricet, & cum aqua colluat. Tin-
gat autē lanam succidā in melle, & cōfricet dentes ac gingi-
uas, & internas ac externas partes. Terat itē anisum, & ane-
thi semen, & myrrhā pondere duorum obolorū, atq; hæc in
vini albi meraci hemina dimidia diluat, & cum his os col-
luat, & multo tēpore in ore cōtineat. Hoc autem frequenter
faciat, & ieiunā gargarisset, & post cibum. Optimū verò est
modico cibo vti, & optima quoque ingerere oportet. Hoc
pharmacum dētes purgat, & bene olentes facit. Vocatur au-

Mammæ
asperitas.

tem Indicum medicamentū. Quum mulieri māmā aspera
facta fuerit, stœbes aut rubi fructū, cum aqua & oleo coqui-
ro, &

Ato, & cataplasmate facto mammas integito, & beta folia superponito. Deinde ex linteo velut pileum cōfuito, & magnitudine vt mammā capiat, atq; sic mammam indito. Si verò suppuretur, secato, & ex lana succida linamentū siue penicillum immittito, & eadē superponito. Postea verò ex lenticula cocta cū polenta permixta, cataplasma adhibeto. Si in pu- **Ascaridum**
dendo mulieris, aut intestino recto ascarides nascātur, viticis **exilio.**
semen aut folia, cū fellis bubuli obolo permiscantur, & oleo cedrino subiguntur, & lana succida mollissima excipiuntur. Induntur autē tertio quoq; die, per noctē ac diem. Postridie verò vbi amouit, calida lauetur. & allium coctū ac crudum edat. & Ascarides exeunt ac moriuntur. Muria verò etiam **Quæ faciē**
B colluere oportet Ad faciē ornandā. Hepar tauri terito cum **ornent.**
oleo: illinito autem cū vino meraco. Fel autē fures ex-
terit. Sed & ptisanæ succus similiter illustrat, & ouorū can-
didum, & farina lupinorū, & erui cum ficis in cataplasmate
adhibita. Et brassicæ radix ac semen. Hæc etiam lentigines
tollunt. Itēq; alcyonium. Et si puluis faciē laserit, ceratū
liquidum ex rosaceo preparatū sublinito, & aquam frigidā
affundito. Et rugas leuigat hoc. In pila lapidea plumbaginē **Quæ eru-**
terito, & menstrua ex situ aqua affusa pastillos formato, qui **gent.**
vbi resiccati fuerint, oleo dilutos rugosæ faciei illinito. At si
capilli defluant, ladanū cum rosaceo aut anthino vnguento **Quæ capil-**
terito, & cum vino illinat. Aut terrā cimoliā cum vino, aut **lum flu-**
rosaceo, aut omphacino, aut acacia. Si verò calua facta fue- **tem sistant.**
Crit, cuminum impone, aut stercus columbinū, aut raphanum
tritum. Aut cū cepa cōfricet, aut cum beta, aut vrtica. Cate-
rū solares appellatas maculas tollit, erui decoctum, beta **Quæ na-**
succus, ouorum candidū, ptisana, cucumeris sylvestris radix **uos & simi-**
sicca, cum vini fæce trita, ac illita. Aut fici folia adhibita. Itē **liter tol-**
sesamo trito fricari, aut amygdalis amaris. & vrticæ semen, **lant.**
& alij cortex superligatus, & lepidium. Impetigines omnes **Impetigi-**
extrahit. Acetum, māna thuris, pumex sulphur cum aceto, **nes quæ cu-**
masturtium sylvestre vstum & in cinerē redactū, viperæ exu- **rent.**
uium, rumicis sylvestris radix. Teratur autem cū aceto vi- **poeula ru-**
noso. Si verò pustulæ emergant, etiā spuma argēti vtere. Po- **bri proflu-**
tio ad fluxum rubrum cōmoda. Cornu cerui vstum, ad du- **nij.**
plum crudæ ordeaceæ farine ammisceto, atq; hæc in vinum
pramniū inspersa bibat, & sistitur. Alia. Adianti radicem
O s tritam,

Hippocratis Liber I I.

tritum, & cicer torrefactum, & lētiū farinā ex melle bibat, aut D
velut potum exhibeto. Aut farina tritici recentis acetabulū,
gummi albi dimidiā, mannae thuris tertiā partem, & iunci
odorati parum. Aut de pinu, vel cupressō aqua dilue, & bi-
bendum præbe. Bibat autē in die. Aut cornu cerui cōburito
ac terito, & crudā ordeaceā farinā cum cedri baccis quinq;
& vinum austerū nigrum cū tadis ammisceto. Aut mali pu-
nici dulcis affati succum, cum vino nigro bibat. Aut cupressi
baccas tres aut quatuor, & myrti baccas nigras, & simul, &
ipsas per seipsas, ad robur corporis mulieris respectu habito.
Cum vino verò potio fiat. Aut castorij obolum in vino nigro

Potio ad o-
mnia vul-
uarum ma-
la.

Sanguinis
narium se-
datio.

Coagulum
asininum.

Sanguinis
sistentia.

Quæ fluo-
res sistant
& dolores
sedent.

Emplastrum
fomentaq;

austero terat, ac bibat. Potio ad fluxum, & omnes morbos E
qui ab vteris fiunt. Pæoniæ semē & radices, cum inū Aethio-
picum, & melantium in vino albo exhibeto. Aut ferulæ rasā
acetabulum, & porri succū, in vino albo diluto. Hoc etiā ex
naribus manantē sanguinē sistit. Aut malum punicū in vino
nigro coquito, ac decorticato, & interna in vino nigro teri-
to, & cū polentæ farina exhibeto. Aut linum vel erysimū to-
stum, & oleæ folia viridis, & radicē nigrā aspalathi, & peplū
plenum, hæc trita in eodē vino diluto bibēda dato. Aut coa-
gulum asininū & mali punici dulcis radicē, & gallā omnia
æquis portionibus, & mali punici dulcis succum, cū vino bi-
bat. Aut rumicis semē, cū gallæ parte externa circumrasa. Hæc
simul terito, & postea cyceonē facito ac exhibeto. Si sanguis
largus ex vteris fluat, viticis folia cū vino nigro dato. Acerba
item omnia fluxū sistunt, vino nigro ammixto. Ad fluxū & F
dolorem. Cancryos radicē in vino nigro bibat. Si verò am-
plior fuerit, terebinthi fructus tritus prodest. Oportet autem
vino & aqua diluere ac bibere. Si fluxus fiat, caneros fluui-
ales in vino suffocato, & de tali vino cum aqua bibendū da-
to. Si verò adhuc feratur fluxus promalon siue myricā torre-
to, & tritā in vino dato. Aut porri succum. Si verò multus de-
fertur fluxus, mulli stercus cōburito, terito & cū vino dato.
Si autē diuturnus fiat fluxus, sponsia cōbusta auxiliatur. Te-
renda est autē spōgia, & cū vino odorato exhibēda. Catapla-
sma ad fluxus. Allium & portulacā, & apium, & loti ac cedri
ramēta trita simul misceto. & cū aqua mulsa diluito, & cata-
plasma facito. Aut rubi, & rhāni, & oleæ folia trita simul mi-
sceto, & in aqua mulsa diluito, & cū polenta in cataplasmate
adhibeto

A adhibeto. Aut sambuci & myrti folia in cataplasmate adhibeto. Aut loti ramēta, & mori folia, ac rosæ folia, cū vua passa ad cataplasma redigito. Fomēta ad fluxus. Loliaceā farinā torrefactā in posca meraciore coquito, & linteo illitā pro fomento. **Diuerſa fomenta.**

Aut lētes torrefactas ac decorticatas in crassiorē instar alicæ farinā redigito, & in aqua coquito, ac similiter adhibeto. Aut eruum eodē modo. cōmoda est & saluia. Aut paleas ordeī in saluiæ & hyperici decocto coquito, & imponito. Aut loti ramēta & cupressi, in vuc passæ cremore cocta, linteo inducito, ac pro fomento adhibeto. Aut oleæ folia, aut hederæ, aut myrti, in aqua coquito, & cū his etiā ordeī paleas coquito. Aut furfures triticeos in aromatū aqua coquito. Aut furfures triticeos in vuc passæ cremore coquito. Aut violæ albæ semē, vel radices coquito, & ad aquā decocti furfures triticeos iniicito, ac foueto. Aut cū eo decocto furfures triticeos subigat, & panē faciat, eōq; calido lanæ inuoluto foueatur. Aut in serpilli decoctū furfures triticeos iniicito, & eodē modo foueto. Sed & fomentū adhibendū est cū spongiis calidis, & cū mollibus lanis, si dolore vexetur. & cū vasis testaceis aqua infusa, & cū vesicis oleo calido plenis. **Collutiones.**

B ad fluxus. Myrti folia, & lauri, & hederæ in aqua coquito, & cū hac tepida colluito. Sambuci & lētisci folia in aqua coquito, & cū excolata leuiter tepida colluito. Aut cænāthen, & cyperū, & vuas passas in aqua mulsa coquito, ac colluito. Aut cū fœnogræci aqua, aut rubi decocto, aut oleę viridis, aut cupressi, aut serpilli, aut mali punicæ, aut radicis violæ albæ, aut lentisci decocto leuiter tepido colluito. Aut medicamentum ex butyro, & resina, & adipe anserino infundito. Aut id quod ex medulla & adipe suillo præparatur. **Suffitus ad fluxus.** Ordeum tostū prunis inspersum suffito. Aut cerui cornu cū olis immaturis. Aut rhoē rubrū, & polentā torrefactā, cū oleo & vino duplo. Aut paleas ordeī, & sterco bubulū similiter. Aut loti ramēta, aut rhoem, aut cupressum siccam, cum vino nigro austero suffito. Aut galbanū, aut mannam thuris, aut resinā vino subactam. Aut capræ cornu, & gallam. & sistetur fluxus. Alij suffitus. Effodere oportet scrobem, & vinaceorum vuc duarum chœnicū Atticarum mensurā torrefacere & de cinere in scrobem mittere, & vinum odoratū irrorare. **Mulier autē circuminsidēs, ac seipsam cōtegēs ac cōuoluens, suffit**

Sicca suffimenta.

Hippocratis Liber I I.

suffitum admittit. Aut sordes pilorum circa sedē capre siccas **D**
 tundito, & torreto, atque cum ordeo fracto, & oleo subactas
 suffito prunis insperfas. Aut ordeī paleas iisdē prunis iniici-
 to. Aut cupressi ramenta vnguento subacta suffito. Aut cicu-
 tā, aut myrrhā, aut thus, vnguento affuso suffito. Aut bitumē
 & ordeī paleas similiter. Aut cupressi radicem rosaceo oleo
 perfusam suffito. Aut ad calamū, iuncum odoratū, cyperum,
 apij semen, anisum, oleo rosaceo affuso suffito. Similiter autē
 & resinā, prunis iniicito. Et cinamonū, & myrrhā, cum rubi
 foliis, aut rosarū foliis aut mēta, addito modico croco & sty-
 race. Hæc omnia simul terito ac suffito, oboli Attici pōdere,
 in cinere sarmentorū vitis, aut in stercore bubulo instar ace-
 tabuli formato. Sit autē ignis ex sarmentis vitis. Mulierē ve **E**
 rò imposito prius, vt ne odorē percipiat. Nā si odorem sense-
 rit, melius est non suffire. Subdititia ad rubrū fluxū, Myr-
 rha & bulbion cū melle tritū optimū præstant subdititium.
 Aut rosæ in aqua coctæ, quas sanè cum rosaceo vnguento tri-
 tas, ac lanæ inuolutas apponito. Aut loti florē in aqua coqui-
 to, & deinde cum rosaceo vnguento terito, & in lana ad vteri
 os adhibeto. Aut cyperū, & irim, & anisum, singula pari por-
 tione, cū rosaceo vnguento trita, intro in vteri osculū detru-
 dito. Aut myrti nigræ folia in vino albo terito, & pini corti-
 cem ammisceto, & similiter facito. Aut cupressi fructum, &
 thus, pari portione simul ambo in vnguento terito, & apponi-
 to. Si resiccare fluxū opus fuerit, calaminthā in vino nigro co-
 quito, & linteo inuolutā apponito. Aut hyoscyami folia, & ci **F**
 cutā simul coquito: Similiter porrū, & maluā: & cerā ac anse-
 ris adipē ammisceto. Deinde repida ad pudenda subdito. Aut
 vinū meracū, cum resina & malicorio cocto terito, ac simili-
 ter apponito. Aut cnicum cū vino tritū subdito. Aut loti ra-
 menta similiter. Aut lentisci folia. Aut rhoē melle cocto am-
 mixto apponito. Si verò nō cesset, Susinū, aut blitum herbā,
 quæ velut lingua est, in lana ad subdititium efformato. Ad
 fluxum aquæ subdititium & infusile. Si mulieri aqua fluat ex
 pudendis, resinā siccam, & myricæ folia, & lini semen, in vino
 terito, & volucrinū adipē ammisceto, & per clysterē in pudē-
 da infundito. Aut farinæ purissimæ chemā, siue conchæ te-
 stam cauiorē, aut amylū in lana ad vteri stomachū apponat.
 Alud similiter infusile. Quum aqua ex pudendo fluxerit,
 myricæ

**Fluorem
quæ siccat.**

**Flueris a-
quosi me-
delæ.**

- A** myricæ folia, & thus, & resinā, cum anserino adipe terito, & per clysterē in pudenda infundito. Si pecten præ fluxu aquo- Pecten si
 so doleat, viticis semen cum melle terito, & in cataplasmate doleat.
 pectini probè adhibeto. Si fluxus sanguinolētus, aut albus,
 aut qualiscunq; fuerit, Sulphur & mādragorā in vino mera-
 co terito, & lana excepta apponito. Et supina dormiat, & ini-
 mota maneat. Aut malicoriū ficcū in vino pramnio terito, ac
 bibendum dato. Ad fluxū albū potus. Hederæ albæ semen, Si albus
 & pini corticē, in vino austero exhibeto, Aut cornu cerui vsti fluor de-
 partē vnā, crudæ ordeacæ farinæ partes duas, & cedri bac- fluat.
 cas quinque, aqua terat ac bibat. Quū ab vteris strāgulatur,
 castoriū & conyzā in vino, & seorsum, & simul vtrāq; bibat.
B Aut bituminis obolos tres. Aut phocæ adipis quantū duobus Vulue strā
 digitis apprehendi potest. Aut radicis pæoniæ dimidiā potio- gulationis.
 nem, in vino odorato bibendam dato. Quū verò vteri suffo-
 carint, & simul tussierit, sandaraches obolū, & sulphuris viui
 tātundē, & amygdalas amaras depurgatas tres aut quatuor,
 misceto & in vino odorato exhibeto. Si verò adhæserint vte-
 ri, ordeū terito, & vnā cū paleis, & cornu cerui, oleo subigito,
 & suffito. Quū autē sursum ascēderint, & cor ac stomachus
 prematur, & substiterint, myrrhā aut resinā, aut netopū, aut
 castoriū, aut silphij succū bibendū dato. Quum vterus stran- Vulue strā
 gularit, spiritus autem aceruatim sursum cōmotus fuerit, & gulationis
 grauitas incubuerit, & mens perculsa fuerit, & loqui non po- vexatio.
 tuerit, & perfrigeratio adest, ac spiritus offendens, & oculi Medela.
C obscurantur; caput quā citissimè radito, & per fasciā supra
 umbilicū, si opus fuerit, deligatā detrudito. Dato autē casto-
 rium, & conyzā, & rutæ aquā, cuminū Aethiopicū, raphani se-
 men, sulphur, myrrhā. Ad nares graueolentia, ad vteros bene-
 olentia adhibeto. Si verò sustinuerit, etiā grani cnidij inter-
 nam partē, albā illā, melle subactā ac mixtā, naribus illinito.
 Aut schinū scillæ speciē quæ mordeat. Quū autem dolor ha-
 buerit ac suffocatur, malue radicē, aut acetū mulsum, aut fœ-
 niculī corticē, aut crethmū in aqua bibendū dato. Optimum
 verò est eructare, & sedentē collocare, & sternutationē face-
 re, aut veratrū naribus admouere. Si verò sub septo trāsuer- Quū vteri
 so ac præcordiis vteri sedere videantur, derepente voce desti- superiora
 tuitur, & præcordia dura fiunt, & strangulatur, & dentes con- petunt.
 serit, & vocata nō audit. Oporter igitur sub nares suffiri lanā Medela.
accen

Hippocratis Liber II.

accensam, bitumen in ignem coniectum, & castorium, & sulphur, & picē. Inguina verò & femora vngueto odoratissimo intus inungere. Aut stellas marinas nigras, & brassicam vino odorato misceat, ac bibat. Aut myrrhæ obolos tres, coriandri parū, resinā, præniæ radicē, cuminū Aethiopicū, hæc in vino albo & aqua trita, aut cum aqua mulsa diluta, leuiter tepida bibat. Auxiliatur & peucedanū, aristolochia, cepæ lachryma, panaces in vino aut aqua leuiter tepida datū. Vteros ad locum suū reducit, crotonis radix pota, aut cuminū Aethiopicum, aut apiū, aut fœniculi & anisi semen, aut piper, aut myrrha, & papaueris succus potus. Si cor strangulatur, ab vtero reprimitur, & spiritus habet, & anhelatio: Viticis, & præniæ semen in vino bibere oportet. Aut abrotonum, & panaces, & ammoniacum. Aut rutā, aut somnificū papaueris succū. Rursum igitur si similiter habet, melanthiū terito, & melle subigito, & velut glandulā efformato, ac pennæ circūdato, & apponito. Aut philistion similiter subdito. Aut telephiū, aut anemones folia trita, in linteam indito, & modica myrrha ammixta apponito. Si in lumbos vteri incubuerint, suffocatio verò caput nō cōtigerit, polypos coctos edat, & vinū nigrum odoratū meracum quā plurimū bibat. Quū verò velut ad viscera cōuersi strāgularint, vinū cedrinū, & vinū Aethiopicū bibat, & calida lauetur, & odoratis fomētis vtatur. Si ventoinflati fuerint vteri, aromata omnia in vnguentū immittuntur, & laurus, & myrtus, & saluia, & cedri ac cupressi ramenta. Hæc contundito, & trita cribrato, & in vinum odoratum inspergito, & oleum rosaceū superfundito. Quum verò transmoventur. transmoti vteri presserint, ordeū vnā cum paleis, & myricā, & cerui cornu, vino subigito, ac suffito. Quū assistētes strangularint, funiculum lucernariū accendito, & præ naribus extinguito, quo fuligo & nidor ipsas ingrediatur, & picē, & castorium, & peucedanū, & myrrhā, vnguento irino diluito, & subacta apponat. Bibat autē resinam oleo dilutam. Si valde strangularint, Aut testudinis iuxta mare natæ obolos tres, in vini albi hemina, vel cyathis tribus tritos, bibēdos dato. Aut cedro in lucernā infuso, lucernā accēdito, & vbi extincta fuerit, ad nares adhibeto. Aut cœnū foetidissimū similiter. Aut lanā incēsam sub nares mulieris suffito. Aut bituminis parū triū in vino albo bibat. Aut erysimi cōchæ testā, & castoriū in vino

Cum cor
vulua ve-
zatur.

Cum lum-
bi vexan-
tur.

Si intesti-
na mole-
stant.

Cum infla-
tur vteri.

Cum tran-
smouentur.
Cum stran-
gulant.

Medela va-
ria.

A in vino albo bibenda dato, & lauato. Si verò etiā tussiat, sandarachæ obolū, sulphuris viui obolos duos, amygdalas amaras depurgatas tres aut quatuor, & castorij obolū, cū vino odorato misceto, & bibenda dato. Si verò strāgularint vteri, & strāgulatio cor cōtigerit, & os cōclusum fuerit, acetū calidū sorbendū dato, & os paxillo aut radio aperito, & vinū in odorū similiter exhibeto, & cū aceto mulso. Si verò valde strāgularint, & voce destituta fuerit, cepā in vino tepido tritā, in nares instillato & excitato. Si verò vsq; ad hepar ascēderint, & suffocatur, voce destituitur, & nihil videt, & dentes cōserit, & dura fit, & nihil sentit, & frequēter respirat, & non audit. Hāc sub præcordiis manibus cōprehensam frequenter

B inungito. Et dētibus cū paxillo diductis. vinū meracū tepidū infundito, si nihil prohibuerit. Et plerunq; statim melius habet. Si ad inguina incūbant ac innitantur, caprini stercoris pilulas, & leporis pilos phocæ adipe subigito ac suffito. Aut Medela. hederæ fructum, aut folia, aut corticē siccato, & quercus folia ac resinā ammisceto, oleoq; subigito ac suffito. Aut coaguli phocæ pellē cōterito, & spongiā ac muscū, cum phocæ adipe ammisceto ac suffito. Aut stercoris caprini pilulas, & phocæ pulmonē, ac cedri ramenta suffito. Sed & bubulū stercus suffito. Aut cornuū bouis ramenta, & biturnē. Aut spinæ Aegyptiæ fructū, & cedri ramenta, & myrti folia sicca. Hæc molli vnguento subacta suffito. Multa vero aromata in vnguentū iniicito. Aut vinacea tusa trita, & cedri baccas, & resinam pineā, simul mixta & passo cocto subacta suffito. Fomenta à

C quibus discedūt. Stercus bubulum contusum, aceti dimidia Diuersa fomenta. mēsurā, & decocti erui ex aqua marina aut dulci similiter dimidia adiecta, pro fomēto adhibeto, foueto autem leuiter & lenticulæ decoctū bibendū dato, ac reuomendū. Et farinā sorbendā, & insuper vinū. Postridie verò granū cnidiū dato. Sed & quod vrinā ciet. Ciceris partes duas tritas, vix passæ optimæ tertiā partē, affuso aquæ cōgio coquito, deinde excolatā aquā per noctē sub dio exponito, & postridie bibendā dato. & de cætero saluiā & linisemē, & polētā, bis per diem in vini diluti heminis quatuor dato. Aut olei heminas dimidias tres foliorū sambuci manus plenę mēsurā, hæc coquito, & cū calidis foueto, aut testis calidis immisis fomentū facito, muliere in sella collocata, & vestimentis cooperta. Aut sambuci folia

Hippocratis Liber II.

folia cū myrto coquito, & in excolata aqua paleas ordeī co-
quito, & fomētum facito, si calorē sufferre poterit. Aut acētū,
oleum, mel, aquā. Hæc permixta ac valde feruefacta, in veſi-
cū infundito. Aut pini corticē, & rhois folia in aquā iniicito,
& fortiter coquito, & in excolatā aquā etiā ordeī paleas im-
mittito ac coquito, & affuso oleo foueto. Aut loti & cupressi
ramēta, aqua & oleo affuso, probē coquito, ac foueto. Aut cū
aromatis vnguentū infundito, & gallam iniicito, & rhamni

Quum vte
ri proci-
dunt.

Lenimēta
varia.

corticem, & polentā triticeā cum aqua. Si verò vteri extra
prominuerint, & dependēt velut scrotū: myrti baccas, loti ra-
menta, rubi & oleæ folia, simul coquito, & leuiter tepidē fo-
ueto. Aut cū vino vnā cum illis & cū graueolentib. similiter.
Externas autem partes cum oui candido oblinito. Cū verò
perfrigerātur, & liuidæ factæ fuerint, cum aqua calida. Mol-
litoria vteri. Adipē ouil. ouorum vitellum, mel, oleum rosa-
ceum sumito, & cū his farinā subigito, & ad lentū ignē tepe-
facito, & quod destillat lana exceptum emollito ac apponito.
Aut adipem ouil. aromatis cōditum & nitrum rubrū, anseris
adipem, & oleum rosac. colliquata & lana excepta apponat.
Aut Anseris adipē, ouillum adipē, cerā albam, netopum, rosa-
ceū oleū. Hæc quā optimē permisceto, & tenuibus linteis
excipito, & statim vbi lota est, apponat tepida osculo vtero-
rum. Aut cerui medullā, & anseris adipem, in rosaceo oleo li-
quefaciat, & molli lana excepta subdat. Molliā subdititia,
quæ aquam ducunt, & mucos, & pelliculas, & non exulcerāt.
Myrrhā quā optimā, & salis granū, & picē aromatis imbu-
tam, terito & apponito. Aliud. Grana cnidia decorticata tri-
ginta. Indicum quod Persæ piper vocāt, & in hoc inest rotun-
dum, quod appellant myrtidanum, cū lacte muliebri simul
terito, & melle diluito. Deinde lana molli ac pura excepta, &
pennæ obuoluta subdito, & per diē finito. Si verò fortius fa-
cere voles modicū myrrhæ ammisceto, tertiā videlicet par-
tem siue trientē: & lanā mollē purā semisuccidā. Ex vteris
educūt, & osculū molliūt, narcissus, cuminum, myrrha, thus,
absinthiū, cyperis. Hæc ipsa per se ipsa, & cū oleo rosaceo, aut
albo, aut Aegyptio. Apponātur autē vbi lota est. Aliud quod
sanīem cruentā educere potest. Cum tædis misceto myrrhā,
salem, fel taurinum, cuminum, mel, & in lana subdito. Aut
cumini folia similiter in vino trita. Aut sulphij succū ad ficū
ammi

Dammisceto, & glandulā inde factam subdito. Idē facit & mori radix cū melle. & postea rosaceo illinito. Efficax est & allij caput integrū, & nitrum rubrū, & ficus pinguis, pari portione. misceto autē & gallā parū, & glandē facito, eāmq; liquore aliquo tinctam subdito. Et postea lota cerui adipē in lana subditum habeat. Aliud quod cruenta omnia magis prioribus ducere potest, & mollire. Piper, elateriū, & lac muliebre misceto, & cū his terito etiā mel, & oleum albū, & cerui adipem, & linteo excepta subdat. Vehemēter verò ducit omni-gena hoc. fici pingue, elaterij portiones duas, nitrum rubrum quātum elaterij, mellis parum, cū linteo aut cū lana glādem facito. Aliud. Netopum, fel tauri, nitrum, cyclaminum, gal-lam, cum melle terat. Postea verò lota adipem cerui subditū habeat. aut pulegium & fel tauri tritum pēnæ obducit, & in oleum Aegyptium tinctum subdat. Aut cyclaminum magni tudine tali cum aris flore. Aut anemones caput cum farina tritum pennæ obducito, & in oleo albo tingito. Aliud quod omnia ducit. Cucumeris sylvestris oblongi internā partem, exempto semine, cū lacte terito, & myrrham purā vna cū ip-sis, adiectoq; modico melle, & oleo Aegyptio, molli lana excipito. Aut cucumeris sylvestris internā partē siccato, & mel le affuso terito, ac glādem formato. Postquā autē lota fuerit, adipem subdat. Aut elaterij portiones tres cum aqua. Mollito ria. Oui candidum, farinam, mel, ceram albā. hęc simul tepe-facito, & quod destillat lana exceptum apponito. Aut adipem anseris, cerā albam, resinā, vnguentum rosaceum, cerui medul-lā liquefacito. Aut ouillū vel caprinū adipē, oui candidū, vnguentum rosaceū. Ex his aut glādem facito, aut lana excipito.

Fomenta per quā vteri purgantur, si duri fuerint. Vinum suauissimū pari aqua tēperare oportet, triū semicongiorum Atticorū mensura & foeniculi radices ac seminis eiusdē qua-drantē, & olei rosacei heminā dimidiam, in ollā mittere, cu-ius operculū foramē habet, & vinum superfundere, & arun-dine indita fomentum facere, & postea scillam apponere. Si dolores repētini irruerint, & animi deliquia affuerint. Rosa-rum folia, cinamomū, myrrhā purā, netopū, papaueris succū, hęc in pastillos drachmales efformato, & sup frusto ampho-ræ cādenti ponito, & pro suffimento vtitor. Aut styracis mo-dicū in oleum mittito, ac vtitor velut priore. Omnia quā in

P

vnguen

Hippocratis Liber I I.

vnguenta iniiciuntur tundito ac cribrato, & super stercus bu-
 bulum mittito, itémq; styracē, & netopum, rosaceum oleum
 quàm optimū, & Aegyptiū albū affundito, & post purgatio-
 nes suffito. Aut lauri & myrti folia tundito, & cyperi fructū,
 cū vnguento albo Aegyptio subigito, addito etiam netopo, &
 super stercore bubulo suffito. Auxiliatur & manna thuris, &
 cupressi ramenta, & cyperi radix tusa. Sed & iuncū odoratū
 aromaticum, & cardamomum, & iridē tundito ac cribrato,
 atq; hæc omnia misceto, & rosacē oleum ac netopum ipsis
 affundito, & vtor in crassiore tritici farina. Aut resinam in
 recens formato fictili suffito, castorio, aut aliquo ex aromatis
 adiecto. Caput verò oleo rosaceo tingito, in aures autem
 myrteum, aut melinū oleum infundito. Et cicer albū, & vuas
 passas coquito, ac decoctū bibendum dato, & in aqua calida
 desideat. Et oliuas albas priusquā oleum remittūt lancinato
 ac siccato, & in vino odorato terito, & acetabulum Atticum
 præbeto. Aut cātharidum ventres, aut adiantum, & nitrū ru-
 brum Aegyptium, & ferulæ radicem, & apij semen tritū, hæc
 exhibeto. Si verò vrinæ stillicidium corripiat, in aqua desi-
 deat, & vinū dulce bibat. Si maximè strangulatur in vterorū
 dolore, vinū suauissimū pari aqua tēperatū, trium semicon-
 giorum Atticorū mēsurā, & fœniculi radices, & seminis eiuf-
 dem trientem, & olei rosacei heminā dimidiā. Hæc in nouā
 ollā mittito, & vino superfuso foueto. Et scillam apponat, do-
 nec osculū molle & amplū esse dixerit, & si exulceratum fue-
 rit, ac pustulæ ubiq; in ipsis fuerint, præstat adipe anserino cū
 thure curare. Ad vterorum dolorem. Peucedanum, aristo-
 lochiā, panaces, hæc simul in vino dulci misceto, & tepesacta
 bibenda dato. Et peplum albū sorbeat, & vrticæ semē. Aliud
 fomentum siue suffimentum. Si dolor habuerit, malicorium
 punici dulcis, loti ramēta, oleæ folia sicca tusa. Hæc cum oleo
 subigere oportet, & super ignitū stercus bubulū mittere. Aut
 galbanum, myrrhā, thus, oleum album Aegyptium, super vi-
 tis sarmēta. Aliud fomentum fortius ex bitumine. Bitumē,
 radicem xanthij, pilos leporis, rutā, coriādrum siccum, hæc o-
 mnia terito, & formatas inde placētulas siue pastillos suffito.
 Aut ad picē, & sandarachā tusalē tritā, cupressi ramenta am-
 misceto, & vnguento affuso placētulas formato, & in ignē
 missas suffito. Aut cornu capræ in ramenta cōsectū oleo sub-
 igito,

Strangurie
 medela.

vterorū do-
 lor quī se-
 detur.

A igitō, & in ignem missum suffito. Aut effossa scrobe, vinacea vix torreto, & cinerem in scrobem mittito, & vino odorato insperso, mulieri circūinsidenti fomētum facito. Sint autem vinaceorum chœnices duæ, atq; hæc ipsa quàm maximè sicca. Si verò vterus doleat vsq; ad vesicam, porri semen cū aqua tritum bibat. Aut cyclamini radicem, in vino albo ieiunæ bibēdam dato, & calida lauetur, & subcalidam ieiuna bibat, & tepefactoria apponat. Aut alij caput integrum, & nitrum tostum, & cuminum, trita ac melle subacta apponito, & calida lauetur, & subcalidā bibat. Ad omnē vterorū morbum curandum. Lini scissi vnā cum stipula pugillam tenuiter tusum, in vino albo quàm suauissimo per noctem madefacito, deinde excolatum in ollula tepefacito, & in eo lanam

Morbi cuiusque vterorum sedatio.

B mollissimā tinctā apponito, & vicissim priore detracta alia subdito. Opitulatur autem & crocus, & myrrha, & ponticæ nuces, alba & pura lana excepta, & cū adipe anserino ac vnguento irino apposita. Si dolor vexarit ex subdititiis purgatam, myrrhæ acetabulum, thuris tantundē, melanthium, cyperum, seseli, anisum, apij semen, netopum, mel, resinam, adipem anserinū, oui candidum, vnguentum Aegyptium, singula paribus portionibus in vino albo dulci, duarum heminarum mensura terito, & tepidis infusis colluito. Si dolor vehemens habuerit, cantharides, cyperus, calamus, iuncus odoratus, & iris profunt. Hæc in vino nigro coquito, ac vtitor.

Doloris sedatio.

C Alia collutio. Si dolor & vrinæ stillicidium vexarit, porri succū, sambuci fructū, seselli, anisum, thus, myrrhā, vinum, in succū redigito, misceto, ac infundito. Aut myrrhæ acetabulū, thuris tantundē, melanthij & cyperi tantundē, seseli, anisum, apij semen, netopū, mel, resinā, anseris adipem, oui candidū, vnguentū Aegyptiū, singula paribus portionibus in vino albo dulci diluito, ac infundito. Aut mercurialis aquā decoctā cum myrrha, thure, netopo. Aut saluiā, & hypericū, in aqua coquito ac infundito. Aut apij semen, anisum, melanthium, seseli, myrrham, casix fructum, in vino coquito ac colluito.

Collutiones variæ.

Alia collutio. Si dolor fuerit vehemens post purgationem. Sambuci fructum, & lauri baccas, in vino nigro coquito ac colluito. Aut sambucū in aqua coquito, & aquā excolaro, & vino dulci affuso colluito. Si post collutionem infusam dolor oboriatur, aromata quæ in vnguenta iniiciuntur coqui-

Notha

**Doloris &
vicerū vte-
rorum me-
dela.**

**Stranguria
Vetus vte-
ri.**

**columella
vulvæ.**

**Tussis pue-
ri quī dis-
curiatur.
Venter quī
moueatur.**

ro, & de aqua duas heminas excolato, misceto autē adipē an- D
seris, & oleum rosaceū, & tepida infundito. Amplius autē in-
fufum nulli, vt semel dicā, cōpetit quā duarū heminarū. Aut
mercurialē in aqua coquito, ad succū, myrrhā ammisceto,
aut thus, & netopū pari mensura, & tepidū infundito. Si ve-
rò vteros doleat cyclamini radicē in vino albo ieiunæ biben-
dam dato. Et calida lauetur, & subcalidam bibat, Si ex ferui-
do & superficiali vlcere pudenda fuerint exulcerata, myr-
ti baccis in vino coctis colluat, & melilotū apponat, Et mali
punici dulcis putamina in vino coquito, & myrrhā ac resinā
simul mixta vino diluito, & intinctū in his linteum subdito.
Et si vrinę stillicidiū corripiat, fomentū adhibeto, & pectinē
illinito. Desideat autē in decocto rosarū, aut rubi, aut myrti, E
aut oleæ, aut pampinorū vitis, aut iuniperorū baccharum, aut
saluiæ. Si ventus in vtero obortus fuerit, & dolor vehemens,
& flatus nō exit, cuminū apponat. Et saluiam ac cyperū tula
mafacito per noctē, & mane excolato, & lucidū ac clarum
cremorē in vas infundito, & crassiorē tritici farinā cū vino
albo ammisceto, & silphij succū magnitudine fabæ, cum fa-
rina coquito, & crudius sorbenda dato. Si columella in pu-
dendis nascatur, dolor obtinet. Et doloris quidē medela est
apij semen. Columellam verò resecare oportet. Si vlcera
in pudendis oboriantur, & pruritus corripiat, oleæ folia, &
hederæ, & rubi, & mali punici dulcistrita, & vino veteri di-
luta, cum recenti carne apponito, ita vt folia carni oblinas. F
Et habeat subditam per totam noctem. Mane verò eximens
& myrtum in vino coquens, cum vino pudenda colluat.

Notha ad finem primi libri De morbis muliebribus adiecta.

Ad tussim pueri. Thapsiam in polenta edendā dato. Aliud.
Ex ouo aflato vitellū acceptū terito, & sesamū albū tostū.
& salem, cū melle delingenda dato. Ad aluū pueri soluēdam.
Lanam illotā melle tinctā indito. Si verò antiquior fuerit
puer, ceparum internas partes tritas cum melle indito. Si lac
nō fuerit. Recentis tritici farinam eloram, melle ac oleo am-
mixto, tepidam sorbendam dato. Ad anhelitum pueri facit.

Thus in vino dulci, & illuuies. Purgatorium. Glādulas fa-
cito ex mellis hemina, anisi acetabulo, bituminis drachmis
duabus, felle bouis, myrrhę drachmistribus, elaterij portione

Hæc

- A** Hæc in vase æneo coquito, & anseris adipē ammisceto, & vbi vti voles, glādulis anserino aut ouillo adipe illinito, lana autem vtere molli. Vomitus soluit. Ocymi succus in vino albo. Aliud. Farinæ tritici recentis exsuccatæ aqua. Aut de malis puniceis dulcibus & acidis succū exprimito, & deinde mel ammisceto. Corrosiuum sic paratur. Veratrum nigrum, sandaracham, squamā aris, singula paribus portionibus seorsim terito. Quum autē trita fuerint, ad vnā partē, duplā calcem ammisceto, & cedrinē subacta illinito. Aliud corrosiuū pharmacum sic paratur. Florem eris purē cōbustum donec ruber fiat, terito ac vtor. Pharmacū nigrum. Squamam aris, & florem aris, seorsim ambo terito. Vbi verò cōtriueris, ita misceto. Duas aut tres pharmaci species facito. Vnam fortissimam quæ habet ad squamā, tertiā floris partē. Alterā, quæ quartā. Tertiā, quæ quintam. Hoc pharmacū ad omnia cōueniēs est.
- Illitio ad anginam. Roris marini semen, staphis syluestris, absinthium, elaterium, mel. In doloribus podagricis. Abscessus nitro trito aqua diluto, cataplasmatibus modo integito, & tribus diebus non lauato. Vbi verò laueris, rursus nitrum rubrū crudū cum modico melle terito, & hoc semper vtor.
- Inflammata illine portulaca cum farinæ massa, & lactuce rubræ drachma, ex aqua dissoluta. Medicamenta oculatoria. Aes vstum, ærugo, fel capræ, mirrha, hæc dissoluuntur, & omnia simul trita vino albo diluuntur, postea in arundinem coniecta, sicca in vsum veniant. Puluillus. Misy præparatum in pila terito, & spumæ argenti chrysididis appellatæ cinerē lotū ammisceto, Sint autē cineris, partes tres, misyos vna. At misy in maza cōburito vitans ne diffuat. Nam dum torretur liquefit, vbi verò probè tostum fuerit, puniceū sit.
- Alius puluillus. Cerusa eodem modo cum misy tosto miscetur, velut chrysididis cinis. Alius puluillus fortior prior. Spodium cyprium ex fuligine lota, & cerusa, & misy torrefactum. Sunt autem duæ partes cerusæ de spodio, vna verò misyos. In hæc anemonæ folia contusa exprimito, & in æris rubri vase ad solem exponito, & vt nihil illabatur contegito. Quū verò crassa facta fuerint, pastillos formato, deinde siccatos, & siccatos quàm maximè fieri potest cōburito, & postea perfrigeratos leuiter terito, & de spodio ex fuligine loto parē portionem misceto, deinde netopon instillato, & parum terito,

Vomitionis
remedium.Anginæ &
Podagræ
medela.Inflamma-
ta.

Notha

terito, deinde melle diluito, & reficcata in vase aëreo asservato, ac utitur. Puluillus mollis. Spodium cyprium, chalcitis non lota leuiter trita, flos æris. Hæc paribus portionibus misceto ac terito. Alius. Spodium cyprium, chalcitis leuiter trita, & cinis chrysitidis illotus. Hæc inter se terito. Alius. Spodium lotum, chrysitidis, & æris flos, paribus partibus trita. Alius. Vuæ acerbæ succus, & spodium cyprium. Vuam immaturam in vigore constitutam fume, & succum per linteum, in vas æris rubri exprime, & aceti albi acerrimi tertiam partem ammisce, atque sic in sole coque, & quinquies in die agita ac conturba. Et ubi crassus factus fuerit succus, spodium cyprium tritum adice ac permisce, ita ut ubi sex aut septem dies in sole positus steterit, ad heminam succi Atticæ, spodij drach. octo immittas. Si verò acrius efficere medicamentum voles, minus de spodio: sin mollius, plus. Postea verò ficcato hæc, donec in pastillos formari possunt. Deinde domi ficcato, rursus in fumum suspensa, atque hoc tandiu, donec testacea fiant, ut inter terendum non adhareant, postea sic utere. Reponito autem in loco humiditatem nullam habente. Alius. Spodium, chalcitidem, aceto albo subigito, deinde factos inde pastillos ficcato, & ubi oculum sublinire voles, quam optimè terito, & vino veteri dulci concaléfacito. Ad argemon oculi vlcus. Populi nigrae lachrymam, lac muliebre, misce ac utere. Si oculus lachrymetur, & dolor vexet. Malipunci dulcis succum expressum in aëreo vase coquito, ut niger fiat instar picis. Si verò æstas fuerit, ad solè exponito, deinde liquidum sublinito. Si verò dulci lachryma fluat oculus, quum vuæ fuerit alba, valde matura, & gracilis in vite, decerpam exprimito ac excolato, deinde in sole ficcato, & ubi ficcus factus fuerit succus deradito, & æruginis dimidium obolum attici ponderis ammisce. Deinde hoc sublinito. Puluillus inspersilis. Plumbum & spodium, æquis partibus, myrrhæ decimam partem, succi papaueris parum, vinum vetus, arida tere ac utere. Alius. Accipitur scoria siue recrementum plumbi, & spodij tertia pars, & cerusæ tertia, & chartæ vstæ tertia, & myrrhæ pars decima. Si pilos ex corpore extirpare voles, vitis lachrymam cum oleo illinito. Si verò etiâ circa oculum tollere velis, euellito & illinito, & cum tenui cuticula discedet. & locus rubicundus ac boni coloris erit. Ad intestinorum leuitatem. Lentres ac triticum recens duarum choenicum mensura aqua macerato,


Lachryma
tio.

Deglabratio.

Licentia.

A to, & vbi mollia facta fuerint, in pila aut mortario fortiter
 cōterito, deinde aquæ heminis sex affundito, ac fortiter com-
 moueto, & vbi purgamenta discesserint, in ollâ infundito, &
 modico melle affusō coquito, & valde cocta torrefacito, ac
 edēda præbeto. Si verò sitierit, vinū vetustissimū bibat, atque
 hoc vtatur donec sanus fiat. Ad grauedinē. Si quis grauedinē **Grauedo.**
 habeat, myrrhā tritā ammixto melle: linteo excipiat, & na- **Pituitę edu-**
 res cōfricet. Infusum sedis pituitā ducēs. Thapsiæ potionē, & **ctio.**
 vuas passas quadraginta: aut grani cnidij, aut cnestri potionē
 sumito, & mellis dimidiā heminā, ac olei tātundē ammisce-
 to, & aqua marina diluito, in aqua furfures cocti sunt, aut pti-
 sana donec pinguis facta fuerit. Aut adipē betæ succo ammis-
 B ceto, & nitri drach. decē. Aut salis heminā plenā aquæ mari- **Bilis edu-**
 næ ammisceto. Si verò bilē deducere voles, succi silphij potio **ctio.**
 nē, elaterij drach. vnā & dimidiā, colocynthidis drach. terito
 & iisdem quibus prius diluito. Si autem vehemētius ducere
 velis, cucumeris syluestris internā partem quarta drach. par-
 te in dimidia aquæ hemina macerato, & per sedē infundito,
 & si in egressu mordeat, ptisanæ succum postea infundito.
 Aliud. In lacte asinino cocto, aut in betæ succi heminis tri-
 bus, internā cucumeris syluestris partē macerato, & salē, mel
 ac oleū ammisceto, & postea ptisanæ succū infundito. Aliud.
 Colocynthidis drach. terito, & in lacte asinino macerato, ea-
 dēmq; misceto. Aliud. Cucumeris syluestris interioris drac.
 C elaterij potionem, salis quantum tribus digitis apprehendi
 potest, mel, oleum, aqua marina diluito. At si stercus educere
 voles, nullum pharmacum bibito, sed aliis vtēre. Infusum ad **Dysente-**
 dysenterīā. Punici dulcis malicoriū in vino ad dimidias co- **ria.**
 quito, & olei, quartā heminæ partem ammisceto, & thuris
 quartā drach. partem. Aliud. Vnguēti rosacei dimidia hemi-
 na, ptisanæ succus, aqua marina cocta. Aliud. Veratri potio-
 nes duas tritas, in aquæ dimidia hemina diluito, & olei tan-
 tūde affundito. Potio. Mala cotonea dissecato, & in aqua ma-
 cerato, & vbi aqua odorē acceperit, bibēdam dato. Alia. Pri-
 sanæ farinā in congiū aquæ missam, coquito donec pinguis
 fiat. Alia. Mala cōcisa siccata, & fauū mellis, in aqua macera-
 to, ac simul terito, & vbi subdulcis facta fuerit excolato, & a-
 pij folia iniicito. Alia. Vuā passā albā, & calaminthē, & fauū
 mellis, in aquam mittito ac terito, donec aqua subdulcis fiat.

HIP.



AHIPPOCRATIS

COI LIBER DE STE-

RILIBVS, IANO COR-

NARIO MEDICO

PHYSICO IN-

TERPRETE.

301

B



C

E his quidem quæ accidunt mulieribus in singulis affectionibus, prius dictum est. Nunc autem ostendam ob quas causas mulieres omnino steriles fiunt, & cur non pariunt an tequam sanentur. Causam verò hanc esse dicō: si os vterorum omnino auersum fuerit à pudendo, non concipiunt. Non enim suscipiunt vteri genituram, sed statim foras exit. contigit autem hoc etiam si parū distortum fuerit os vterorum præter naturam à pudendo. Et si omnino conclusum fuerit os vterorum, neque sic suscipiunt. Neque si recens conclusum fuerit magis quàm oportet. Singula verò relata manifesta sunt. Etenim si omnino auersum fuerit, aut conclusum, menses nō prodeunt omnino, aut prodeunt violenter cum morbo, si sanguis coegerit vteros pro more conuerti. Et si purgata fuerit mulier, aliquando os vterorum ipsi à pudendo auertitur. Si verò parū distortum, aut recens cōclusum fuerit, prodeunt quidē menses, prodeunt autem violenter, & paulatim per multos dies. Hæc autem omnia manifesta fiunt, si sic habent, contingenti mulieri. & si horum aliquid fuerit, curata mulier fœcūda fit. Quandoq; verò etiam sua sponte. Hæc autem singula cur fiant, dicitur. Dictum autem est & in muliebribus morbis. Si leues fuerint vteri. Cōtingit autem hoc & ex natura quibusdam, & si vlcera innata magnas cicatrices reliquerint. Si leues igitur vteri fuerint, mulier in ventre non concipit. Nā genituram suscipiunt quidem vteri, si non alia aliqua causa obstiterit, non autem concipiunt, sed semen foras emittunt. Hoc autem maximè clarum fit contingenti, & si interrogetur an aliquādo vlcera in vteros ipsi oborta fuerint. Menses verò sano quidem modo prodeunt in hoc morbo. Verum talis

Cur quædā non ferunt cōceptum.

Cur quædā non cōcipiant.

Q

lis

Cur vlcus vuluarum cito curandum fit. D
 I I I
 Sterilitatis causa. E
 Sterilitas naturalis. F
 Cur non concipiant. G
 A. lmc

lis plerunque incurabilis est. & hæc causa est, vt in ventre ne
 concipiat. Si vlcus in vteris factum fuerit ab affectione qua-
 dam ex relatis, & non statim sanatum, sed impurum factum
 fuerit, permanet vlcus ad multum tempus, quemadmodum
 & id quod in aure existit. & malè olet mulier, & quandoque
 sanies malè olens ipsi ex pudendo fluit, & quandiu sanè vlcus
 habuerit, in ventre non concipit. Non enim concipiunt vteri
 genituram. Huic autem menses sano modo procedunt. Ve-
 rum ex contactu, & interrogatione, maximè clarum fit de
 relatis. Curata verò fœcunda fit, exigua tamen spes est. Si
 quid ex mensibus in vteris remanens scissuram ac segmen-
 tum habeat, quod circa osculū aut paulò penitrus caleseat,
 & rursus frigescat, neque sic in ventre concipit. Impedimen-
 tum enim hoc incumbens, geniturā quò oportet trāsire non
 permittit. Et si quidem in principio curetur, sanescit, & fœ-
 cunda fit. Si verò tempus accesserit, sterilis manet. Manifesta
 est autem affectio maximè ad contactum. Durū enim quid-
 dam intus est. Et si magis quàm conuenit vteri hiarint, ne-
 que sic prægnañs fit. Non enim concipiunt vteri semen geni-
 tale. Sed & hoc ad contactum clarum fiet, & menses acrua-
 tim prodeunt, & per paucos dies. Fit autem & natura hæc af-
 fectio, & a relatis morbis. Et si quidem à natura fuerit, incu-
 rabilis est morbus: Sin minus, non sani prodeunt menses, vt-
 pote muliere non existente sana, neq; sic prægnañs fit. Non
 enim compingitur semen à sanguine morbofo. Sed sanguis
 qui à corpore morbofo descendit, genituram serosam facit. E
 Serosa verò facta genitura, tempore modico aut multo, fo-
 ras progreditur vnà cum sanie. Atque hoc ex corpore mulie-
 ris, & ex mensibus manifestum fit. Prodibunt enim ipsi men-
 ses velut dictū est, siue biliosa, siue pituitosa, siue aquosa fue-
 rit. At breui curata fœcunda fit: Sin minus, non. Si verò mu-
 lieri menses non prodeant omnino, aut ab omnibus relatis,
 etiam sic non concipit. Venæ enim sanguine plenæ, geniturā
 non suscipiunt: & in vteris aliquid inueterati sanguinis inesse
 necesse est, quod geniturā nutriti prohibet. Si verò pauciores
 quàm debeant menses prodeant, neque sic prægnañs fit, cau-
 sæ verò in priore morbo relatae sunt, fit autem hoc manife-
 stum ex interrogatione, & si quidem à natura pauci menses
 prodeunt, incurabilis est, Si verò ab affectione aliqua ex re-
 latis

A latis, breui curata, fecunda erit. Et si plures quàm debent menses mulieri prodeant, neque sic in ventre concipit. Vteri enim sanguine euacuato, genituram non cōcipiunt, prae debilitate. Si verò etiam conceperint, sanguis multus derepente in vteros mulieris descendens, genituram suffocat. Manifestum autem & hoc est ex mensibus qui multi prodibūt. Et si quidem natura mulier multos menses demittit, sterilis fit. Si verò non natura, sed ab aliqua ex relatis affectione, breui curata fecunda erit. Et si os vterorum ex pudendo exciderit, neque sic concipit, Nam os durum fit, & genituram non suscipit, & intumescit, & propterea in totum infecunda fit. Manifesta est autem hæc affectio, ex eo quod contingit. Et si non prodeant menses velut debent, sed deorsum processerint in sedem, neque sic in ventre concipit. Manifestum est enim, quòd os vterorum à pudendo auersum est, aut conclusum, & si quidem ad sedem auersum fuerit osculum, aut conclusum, curata fecunda fit. Vtrunque verò ex interrogatione ac responsione manifestum fit. Si enim menses semper sic prodierint, clarum est quòd his morbus caussa est. Atque tot ac talia mulieribus contingunt, propter quæ non pariūt antequàm curètur, & propter quæ omnino steriles fiunt. Quare mirari mulieres non oportet, quando coeunt quidem non autem sæpe pariunt. Experimenta per quæ indicatur an pragnans fiet mulier. Si cognoscere voles an mulier pragnans fiet, Butyrū & lac mulieris masculum alentis bibendum dato, & si eructauerit, cōcipiet, Sin minus, non. Aliud. Netopum modicum lana exceptum subdat, & postea manē, an quod subditum est per os oleat, cōsideret, & si quidem oleat, concipiet. Sin minus, non. Aliud. Cuicunque mulieri à subititiis non valde fortibus, dolores ad articulos processerint, & stridor dētium ipsam habuerit, & vertigine affecta fuerit, & oscitarit. Huic maior spes est vt pragnans fiat, quàm ei quæ nihil horum patitur. Aliud. Caput allij integrum depurgatum ac derafum, ad vterū apponat, & postridie videat an per os oleat, & si oluerit, concipiet. Sin minus, non. Aliud. Si cognoscere voles an mulier concipiet, anisum in aqua tenuissimè tritū bibat, ac dormiat, & si quidem pruritus ipsam circa vmbilicum corripuerit, cōcipiet. **Pragnātis** Sin minus, non. **Pragnantem mulierem si non ex alio co-** **signa.**

Conceptus
signa.

Signa ma-
ris vel fœ-
mellæ.

Stomachus
vuluz.

Menses cur
inueni à na-
tura.

Medela
quæ conce-
ptum repa-
ret.

gnoscas, ex hoc cognosces. Oculi videntur distracti ac caui-
res, & candidum in oculis, albedinis naturam non habet, sed
liuidius apparet. Quæ in ventre habent, maculam solarem
in facie habent, & postquam conceperunt, vinum odio ha-
bent, & cibos auersantur, & oris ventris morfu, ac salua ple-
næ fiunt. Mel & anisum tenuissimè terito, deinde in aqua
diluito, ac exhibero, & dormire finito, & si quidem tormen-
tosi fiat circa vmbilicum, prægnans est: Sin minus, non est.
Post hæc autem omnia, farinam bibat, & mel, & origanum, in
vino & oleo. Quæcunque in vtero habentes, maculam so-
larem in facie habet, fœ mellam gestant. Quæ verò bene co-
loratæ permanent, masculum plerunque gestant. Si papillæ
sursum conuersæ fuerint, masculum gestat. Si deorsum, fœ
mellam. Accipe de lacte, & farinam misce, & pastillum for-
ma, & ad lentum ignem assa. Et si quidem comburatur, ma-
rem gestat. Si verò diffundatur, fœ mellam. Aut idē hoc lac
super folia emulctum contemplare. Et si quidem condensa-
tur, masculum gestat. Si verò diffusum fuerit, fœ mellam.

Curationes ad conceptionē experimento cognitæ. Si qua
liberorum generationem expetat, quæ sine liberis sit, & si
qua iam antea prægnans fuerit, nunc autem non pariat.

Quum stomachus yteri durus fuerit totus, aut summa
parte, & conclusus ac non rectus fuerit, sed ad alteram coxam
auersus, aut ad intestinum rectum inclinatus, aut in seipsum
contractus, aut labium stomachi sibi ipsi incubuerit. Vnde-
cunq; igitur aut asper fuerit, aut callosus, sit autem durus &
à conclusionē, & à callositate. His menses non apparent, aut
multo pauciores aut peiores quam oportet apparent, & per
longius tempus, Et menses quidem iuxta sanitatem corporis
& vterorum exitum inueniunt. Itemque iuxta naturalē ac
iustum modum, & à calore & humiditate mensium, & sto-
macho non valde læso. At genituram rursus non suscipit, pro-
pter læsionem, quæcunque tandem impedierit susceptionem

à stomacho non bene habente. Huic post fomentum toto cor-
pori adhibitum, pharmacum bibendum dare oportet, & cor-
poris purgationem primum facere, siue sursum & deorsum,
siue deorsum solum. Et si quidem sursum purgas pharmacum
dederis, ante purgationem fomentum ne adhibeto, sed po-
stea. At fomento prius facto, pharmacum deorsum purgans
biben

A bibendum dato. Si verò sursum purgante nō opus habere videatur, præmisso fomento, deorsum purgans bibendum dato. Quum autē corpus probè habere visum fuerit, postea fomentum adhibeto, ita vt vteros frequenter incidere facias, in fomento quod maximè cōferre visum fuerit. Iniicito autē in fontenta, cupressi ramenta, & lauri folia cōtusa, & multa calida sepe lauato. Quum verò recens lota & fota fuerit, vteri osculum dilatato, simulque dirigito si opus fuerit, cum specillo stanneo aut plumbeo, à tenui auspicatus. Deinde cū crassiore si admiserit, donec probè habere videtur. Tingito autem specillum in mollitorio diluto, quodcunq; liquidum factum conferre videbitur. Specilla verò retro lata facito.

B Deinde lignis longis adaptato, ac sic vtor. At verò hoc tempore, in vino albo dulci quā suauissimo, tadā pinguisimā in tenuia frustra concisam coquens bibat, & apij semen contusum, & cumini Aethiopici semē, & thus quā optimū. De hoc ieiuna bibat moderata copia, per quot dies bene habere visa fuerit, & edat catulos pingues percoctos, & polypū in vino dulcissimo coctum, & de iusculo bibat, & brasicā coctam, & vinum album insuper bibat, & ne cœnet, & bis in die lauetur. A cibis verò hoc tempore abstineat. Postea verò si processerit secundum stomachum, & purgationem aliquam foras ostenderit, de portione aliquid bibat, per vnum atque alterum diem, & à specillorū visu cesset, & conetur vteros purgare subdititiis, & medicamentis. Cuicunque verò stomacho recto, & molli & sano, & probè habente, & in debito loco sito, menses omnino nō apparuerint, aut pauciores, & per amplius tempus, & non sani: morbum perscrutatus quē vteri habent, & an corpus etiam aliquid conferat, cōperies causam à qua prægnaus non fit, & quum quidem sic habet, curationem facito adhibens id quod conuenit, si admiserit, curationem incipiens à fortibus, prout tempestiuum esse videbitur, desinens autem in molliora, donec vterus probè purgatus esse visus fuerit, & stomachus consistere rectè habēs in sufficiente loco situs. Si verò à pharmaco & à portione non processerit, neque vbi ipsum bibit moderato tempore, à portione quidem hac cesset. Quum verò probè habuerit, per vsum specillorū os stomachi mollito, & vt hiet facito, ad viā subdititio præstandam, tum à medicamentis suffumigabili-

Hippocratis Liber

bus, tum à mollitoriis, Postquam autem probè mollitum ac D
suffitū esse videbitur, appositis pharmacis vteri purgationē
facito, donec probè habere visum fuerit, incipiens à molli-
bus ad fortiora, desinēs autem rursus in mollia odorata. ple-
raque verò ex fortibus medicamentis stomachū exulcerant,

Cum mu-
lier pinguis
nō cōcipit.
Vinum ni-
grū ad con-
ceptum fa-
cit.

ut. pro
A. m
f. p. l.

x

& prohibent ne rectus consistat, & probè habeat ad genitu-
ra susceptionem, & vterum siccum faciunt. Si verò mulier
à pinguedine vteros sibi laesos esse putet ad conceptionem,
attenuato ipsam quā maximè, & ad reliqua gracilem faci-
to. Venum autem tempus optimum est ad cōceptum. At vir
non sit ebrius, neque vinum album bibat, sed fortius ac me-
racius, & cibos edat fortissimos, & calida ne lauetur, & robu-
stus sit ac sanus, & à cibis abstineat qui ad rem non condu-
cunt. Quum autē mulier purgata visa fuerit, & stomachus
vteri rectè habere, lauetur, & caput fricetur, & nihil omnino
illinatur. Postea linteo inodoro loto capillis circumdato, reti-
culo loto nihil olēte deliget, linteo primū supposito. Dein-
de vbi galbanum ad ignem aut solem calefactum, ac probe
mollitum subdidit, quiescat. Postea mane exoluto reticulo
ac linteo, caput suum alicui olfaciendum exhibeat, & si pro-
bè fuerit purgata, olet. Sin minus, non olet. Verū hāc à ci-
bis abstinens faciat. Si verò non fœcundæ apposueris, nun-
quam olet, neque purgata, neque aliās, & si prægnavi appo-
sueris, neque sic olebit. Quæ verò sæpe concipit, & fœcunda
est ac sana, ei si apposueris, etiam si nō purgaris, olebit ipsius
vertex: alibi verò nō. Quum verò cognoueris ipsam rectè ha-
bere, ad virum accedere iubeto. & mulier quidem à cibis ab-
stineat. Vir autem non sit ebrius. Verū frigida lotus, & ci-
bis paucis conducentibus pastus, & si mulier geniturā se con-
cepisse cognouerit, primo tempore non amplius ad virum
accedat, sed quiescat. Cognoscet autem si quidem vir dixe-
rit se emisisse, Mulier autem præ siccitate ignorat. Si verò v-
terus rursus reddiderit genituram eadem die, humidus erit,
& si humidus factus fuerit, rursus cū viro misceatur, donec
concipiat. Alia curatio. Vbi fomentum toti corpori ad-
hibueris, medicamentū bibendū dato sursum ac deorsum
purgans. Deinde lacte asinino postea in potu exhibito, vteros
per fistulam duobus diebus foueto, cum vrina muliebri pu-
trida, nitro iniecto. Tertia verò die, cū vrina bubula. Quarta
autem

Curatio
alia.

A autem & quinta, feniculi semen tritum, & sambuci folia ac lauri, & cupressi rameta. Hæc coquito aqua affusa. Oportet autem post fomentū, multa calida loti, apponere adipē aromatis imbutū, statim à fomento, & ad noctē. Postea verò hoc præparato. Myrrhā staten, butyrum, adipem anserinū, medullam cerui, resinā, & netopum. Horum singulorū æquales portiones permixtas ac liquefactas apponat in lana Milesia molli quàm optima. Deinde plumbeis penicillis quinq;, ad octo digitorū longitudinem fabricatis, vterum aperito. Primus ex his sit tenuis, alter crassior, & reliqui alius alio crassior sit. Aperiuntur autē per dies quinq;, & semper lota apponat, & ex lumbis deliget, vt ne excidat, & semper vltius intrudat.

B Postremum verò quam penitissimè. Postquam autē aperueris, purgatorium appone, cantharidas tritas quinq;, & colocynthidis longæ internā spongiosam partē, & myrrhā, Hæc melle cocto subacta, & in glandē efformata, lana inuoluito, excepta summa parte. Deinde in oleum suauissimum tingito ac apponito. Vtere autē & hoc purgatorio, felle tauri, & flore æris afflato, & nitro, & myrrha modico melle dilutis, ac linteo tenui deligatis, & linteo supernè pharmaco obducto apponito. Vtere & buprestis cum myrrha. & elaterio cum melle cocto. & cantharidibus cum elaterio & myrrha. Postquam autē purgata fuerit, postridie vbi lauit vterū colluito. Cuminū Aethiopicum tritum, & melanthiū, & resinā, **C** & oleum, & mel, ac vinum dulce. Hæc mixta & reperfata infundito. Postquam verò infuderis, erectā obambulare iubero, quo collutio infusa cōcutiatur. Subdito autem crocum, & myrrham, & thus, singula paribus portionibus sicca linteo illigata, ita vt anserinū adipem ammisceas ac linteo oblinas.

Atque hæc apponito per dies septē. Octauo verò suffitum facito, cū myrrhā, bitumine, & ordeo oleo odorato subactis: his lento igni iniectis, ac suffitu per fistulam facto. Postquam autem suffitum feceris, postridie castoris testem terito, vino albo affuso, & ipsum melle oblitū, & lanæ inuolutum, apponat in noctem. Mane verò eo sublato, ac emollito, ad virum accedat, & vbi condormiit, quiescat. & si nō prima vice cōceperit, eodem rursus appposito, virū adeat. Cæterū hunc medicationis ductū incipere oportet vbi menses prodierint. Desinentibus autē mensibus, cōceptorio medicamento appposito

Cum am-
plius nō cō-
cipit.

Pus si in
vulua est se-
mē perdit.
Medela.

condormire. Priore verò tēpore neq; mulier ad virum acce- D
dat, neq; vir ad mulierē. Quum autē mulier nō conceperit,
prius cōcipere solita, vteri verò viri geniturā in seipso sus-
cipiunt: penitus necesse est mulierem, terofam hanc facere.
Quandoq; enim in vteris pus innascitur. pus autē in vteris à
tuberculis fit. Et sanē ob hoc genitura viri, quādo cum viro
coit, vteros nō contingit, quo videlicet ipsa viri genitura cō-
pingatur. Nā pus ipsam dissipat, vt ne afferatur. Mortificat
enim pus, & putrefacit geniturā. proinde & pus ex vteris ex-
purgare oportet. & tuberculum in vtero sedare, quo de cāte-
ro ne impediatur geniturā cōpingi ac afferri. Festinare itaq;
oportet ad expurgandū, priusquam pus in vteris in callum
concreascit. & vteros colluere hoc modo. Lac equinum co E
ctum exactē colato, vt tenuissimū & purissimum euadat, &
hoc infundito, clysteris instrumento idoneo facto. Et summa
quidem clysteris pars leuis sit, argentea velut specilli, & sta-
tim modico intercedēte spacio foramē perforetur. Sint au-
tem & alia foramina, nō magna, sed angusta, hinc atq; hinc,
ex transuerso clysteris æquali interstitio distātia. & clysteris
quidem apex solidus sit. Reliquum verò totū cauum sit, ve-
lut fistula. Alligare autē oportet vesicam suis fœminæ, atque
hanc probē radere cōfricare. postquam autē alligaris, lac in
vesicam infundito, foramina verò tenui linteo obstruito, ne
lac effluat. Vbi verò obturaueris, vesicam deligato, & ipsi
mulieri dato, cui collutionē infundere paras. Illa verò exem-
ptis obturamentis, in vterū indat. Ipsa enim sciet vbi indere F
oportet. Postea autem tu vesicam manu premito, quādiu pus
foras effluerit. Manifestum autē hoc erit, vbi non amplius
pus simul cū lacte exierit. palām enim clarum est, quod non
amplius inest. Atq; tunc cessare oportet, & post hoc vbi pau-
lulum recreata fuerit, ad modicum tempus, cucurbitæ siccae
fundum resecato, itēmq; apicis summā partem, quo perfora-
ta sit, ita vt similē efficias in reliquis, excepto apice, velut cly-
sterem: crassitudine verò paulò tenuior sit quā virile pu-
dendum. Hāc cucurbitā sic formatā vasi circumponito, vase
vino impleto. Sit autē vinum odorū fragrantissimū & siccis-
simum ac vetustissimū, deinde lapidē nigrum pellucidum
in vinum iniicito. deinde cucurbitam ex ære albo factā cir-
cumponito, & mulier circuminsideat, pudendū circum cu-
cubitæ

A curbitæ glandē adhibens qualiter oportet, quo cucurbita vera super æream emineat, duorum digitorū intra pudendum mensura. Quum mulier geniturā suscipere non poterit, necesse est membranā super excreuisse in osculo uterorū. Oportet igitur æruginē aris, & fel tauri, & serpētis adipem, simul miscere, deinde pharmaco hoc lanā imbuere, & in byssinum linteam inuoluere, linteo melle sublito, & facere subdititiū magnitudine maximæ oliuæ, & apponere ad pudendum per totam noctem. Supina autē iaceat, & in die auferat, & calida aqua lauetur quā plurima ex myrti decocto. Apponat autem & postea singulis noctibus, & deinde cū viro coeat. Alia curatio. Marrubij foliorum manus plenæ mensurā, in vas **B**articum iniicito, & aquæ potabilis heminas Atticas quatuor affundito, & vbi per nouē dies præmacerauit, per alios nouē dies ieiuna, lota, duos cyathos de hoc bibat, pari mēsurā passī albi ammixta. Quum autē tertiā diem potādo trāsegerit, fomentum adhibeatur, cicutæ foliis in ignem missis, per nouem dies, & post fomentū lauetur. Atq; sic rursus de hoc bibat. Quum verò per tridū fomentū adhibuerit, marrubiū ipsum tritum in die apponat per tridū, & mercurialem tritam in melle Attico bis in die, præmaceretur autem in vini albi congio, hippomarathri & fœniculi radix, & tædæ pinguisimæ ramuli, & rubiæ quarta pars, & fœniculi semen, & verbenacæ radices multæ, præmacerenturq; diebus non minus quā nouē, & postea loto capite, in balneo heminā per diem de meri cremore bibat, & postea reclinata seipsam calefaciat. Atque hinc post potum, alternis diebus id quod ex felle paratur, per diem ad dies sex apponat. Quum autē iam virum accedere vult probè purgata, hyoscyami folia ac radices in aqua feruefaciat, & ex his quā calidissimis per triduum ad noctē fomentū adhibeat, & lota virū accedat. post hoc verò fomētum, etiā cerui pudendū siccum sufficit, & de hoc in vinum albū dilutum deradēs, per triduum bibēdum, & quum partus dolor institerit, bibendū dato. Nā hoc partum accelerat. Alia curatio. Fel tauri feruefacito, & alumē melium, & cornu cerui vstum terito, & permixtis ac in glandulas efformatis vtor. Aliud curatiuum. Cuminum in vino nigro coctū tritum, in glādem efformato & ad noctē apponito. post hæc verò faciem vini albi tenuissimā videlicet facis

Quum genitura non suscipitur. Medela.

Partus acceleratur.

Q 5

partem,

partem, cōburito, & combustā in penna auferas, linteóq; illi- D
gata, ad noctē subdas. & porrum coctū edat. post hoc tra-
gium terat, & melle dilutum in noctē apparet. & deinde tra-
gij fructū tritum, in vino albo dilutū, tēdē ramentis adiectis

Qui conce-
ptus pare-
tur.

Cognitio
biliosa &
pituitosa.

bibendū dato. & postea origanū alternis suffito. & sic ad virū
accedat. Alia curatio ad mulierē parere nequeuntē. Si mu-
lierem parere nequeuntē, puerpurā facere velis, in mensibus
cōsiderare oportet, an biliosa sit, siue pituitosa. cognosces au-
tem utrū horum magis sit, si vbi menses prodeunt, arenā re-
nuem & sicā in sole substraueris, & de sanguine infunderis,
& si quidē biliosa fuerit, sanguis in arena siccatus, luteus fit.
Si vero pituitosa, velut mucus. Vtrū igitur horū fuerit ven- E
trem purgabis, siue sursum siue deorsum opus habere vide-
tur. Deinde intermissis tribus diebus, vteros purgato. & si hu-
midius vterorū osculum fuerit, acria apponito, quo cōmor-

Si quæ alia
conceptum
impediant.

sum & inflammatū os vterorū durum euadat. Si verò mu-
lier internis partibus non febriat, neq; præ vteris concipiat,
neq; viro misceri queat, sed dormiat, & cibū auerfetur, vinū
melle ammixto pudendis infundatur. & myrrhā suffito. In
sedem verò glādes indat. & vinum adipe anserino ammixto,
in pudendū infundat. Deinde etiā oleum pari melle mixtū
infundat. Si mulieri vteri gracilescant, & osculum ipsorum
exasperetur, & cōcludatur, & menses ipsi nō appareant, neq;
conciat. Sed febris corripit lenta, & dolores incidunt ei in
lumbos, & imum ventrem: Morbus autem hic maximē fit, F

Medela.

quum quid in ipsa fuerit corruptū, fit autē & ex partu. Hanc
calida lauare oportet, & fouere. Quum autē lota ac fota fue-
rit, os vterorū dilatare cum specillo. & myrrhā tritā cū pari
netopo apponat. Aut vnguentū, aut oleum rosaceū in linteo,
& plumbū instar glandis formatū apponat, felle bubulo illi-
tum. Et in quatuor diebus infœcundas cognosces. & fomen-

Cum pin-
guedo con-
ceptum im-
edit.

7m
cum os vul-
uæ durum
est.

tum adhibeto, & pharmacum bibendū dato. Si verò præter
naturā mulier fuerit crassefacta, in ventre nō concipit. Nam
omentum crassum ac multū incumbēs, os vterorū deprimit,
& geniturā non suscipiunt. Hanc attenuare oportet, & phar-
macum deorsum purgas bibendū dare. & ad vteros appone-
re quod purgat, ac flatum inducit. Si os vterorū durum fiat,
aut ceruix, ex digiti contactu cognoscet. Itēmq; si ad coxam
auerfū vteri fuerint. Quum sic habuerit, nihil acre adhibeto.
Si enim

- A** Si enim os uterorum exulceraueris, quum inflāmatum fuerit, omnino periculum est ne sterilis fiat. Verū apponito quæ nō mordent, à quibus pituita purgatur. Quum mēses mulieri prodierint, & præterierint, primū quidē caput purgare oportet. Deinde veratrū exhibere, siue semel siue bis opus fuerit. Postea verò fomentum adhibere, fomentatorio ex cucurbita cōstructo, sic autē facto. Aquam marinā in vas infundito, & porro immisso, fistulam cucurbitis imponito, & cum luto quā optimo illinito, vt ne transpiret. Deinde per sellā erectam quadrangulārē, trāsmittito ipsam fistulā, quo duorum digitorū mensura emineat vltra sectionē. deinde prunas subaccendito. & in desessu caueat, & quum desidet, & quum surgit, vt ne cōburatur. Sed desideat dum adhuc frigidum est fomentatoriū, & surgat dum fistula est perfrigerata. In hoc verò fomento plurimā diei partem cōsumat, & in huiusmodi fomēti vsu ad quinq; dies perseueret. Per decem verò dies pro porro, allium in fomentū immittito, & huius fasciculum cōtusum in aquam marinā iniicito. Postea verò reliquis diebus, ipsa sola aqua marina foueatur, vt vltra ne procedat per totā curationē. Caterū postremū fomētum quum à curatione desistere voles sic facito. Catulū recentissimum refecato, & aromatum omnis generis odoratissimorum ac siccissimorum species cōtundito, & interaneis catuli exemptis, aromata indito ac expleto. Subiectis autem lignis, & catulo in vas misso vinum odoratissimū affundito, & fomentum per fistulam facito. & si vires permittunt, totā diem cum hoc fomento ipsam foueto, ac interrogato, an odor aromaticum per os olere videatur. nō enim exiguum hoc signum est ei quæ curatur, ad conceptionem. Subdititiis verò vtere, croci quantū voles, & myrrhæ magnitudinem fabarū duarum, & salem sufficientē permisce illorum respectu, & fellis taurini fabarum duarum magnitudinē. Si verò mitiore vti voles, minus fellis ammisce: Si fortiore, plus. Hæc trita melle instillato tere, donec id quod teritur, fiat tale, vt digito efformare possis. Quāto autem magis triueris, tanto siccus, & viscosus, ac melius erit. Vbi autem efformaris crassius quam glandem, & summam partem acutam, & medium, crassius, & deinde consequenter quo ad vterum apponatur, in hoc ipsum surculos origani duos leuigatos infigito. Sint autem

Cum menses plus iusto defluunt.

Hippocratis Liber

autem longitudinis sex digitorum. Deinde lana mollissima **D**
 furculos inuoluito & filo tenui superne deligato, & præmi-
 neat filum quatuor digitorum longitudine præ furculis infi-
 xis, postquam autem perfudit & puram seipsam fecit, ipsum
 ad vteri os apponat, linteum sub coxas subiiciens, & per no-
 ctē appositum sinat. Erit autē ipsi purgatio aquosa. postri-
 die ubi surrexit, lauetur & ea die super fomentū ne infideat.
 Quum autem fomentum adhibuerit, & de fomento surrexe-
 rit, ceratum sit quā optimum prima illa die factum, & in
 ipsum cerui maximē medullam cōmisceto: Sin minus, adipē
 anserinum, & quum à fomēto surrexerit, quotidie ubi se per-
 fudit, & puram circa ventrem fecit, cerato vterum inungat.
 Aut reliqua quidē omnia superioribus ammisceto, excepto **E**
 felle, origanum verō leuissimē tritū in glandem permisce,
 & apponat. Aliud. Reliqua quidem omnia ad eundē mo-
 dum facta, verū pro origano absinthium ammisceto, & eo-
 dem modo efformata apponat. Aliud. Ex tritico melan-
 thium deligito, & probē terito, mellēq; ammixto in pilæ for-
 mā redactum apponat. Verū febres inducit, & articulum
 tumefacit, & vehementer mordax hoc est. Aliud. Mel, &
 veratrum nigrum tenue non multum, coquito. Vehementer
 enim mordax euadet. Sed & hoc febrificū est. Eodem mo-
 do mel coctum, & elaterij potionem coquito, & factam inde
 glandem subdendā dato, & hoc febrificum est. Ducit autem
 & sanguinem. Quædam verō ex his etiam pelliculas. Si ve-
 rō voles, etiam dracontium derade (Est autem lene) & hoc **F**
 cum melle cocto aut crudo, in pilæ figuram velut magnam
 gallam efforma. Cæterum conare, vt physicus sis, ad hominis
habitum ac robur respiciens. Ex his enim nullus est qui non
 omnia ad amussim faciat. Proinde ex his ipsis coniecturā fa-
 ciens, totius corporis, & capitis purgationibus, medicamētis,
 & vteri fomentis, ac appolititis vti conare. Hæc autem ele-
 menta tibi sunt. Verū medela horum unicuique particula-
 ris est. Et ubi horum quid nō feceris semper in fomento per-
 seueret. Hoc enim est quod mollit, & ducit serosos ac sanio-
 sos humores. Postquam verō ab hac curatione desineris, his
 quæ secundū naturam sunt desinentibus, sanguinē de manu
 detrahē oportet, si quidem fortis fuerit, de ambobus bra-
 chiis, si verō debiliior, de altero sufficit. At verō dixta quā in
 his

A his curationibus uti oportet, alibi à me indicata est. Si verò suffire voles, lolium ex tritico deligito, & molito, factoque igne sarmeticio lentissimo, in catinum mittito, & mulierem super sellam impositā, mollibus linteis instratam, sedere iubeto, cruribus quàm maximè diductis. Atque hæc curatio si quidem sufficiens tibi fiat in quatuor mēlibus, bene est; Sin minus, ad hæc præcipe etiā ut ad virum ne accedat, eo tempore quo curatur. Inter curandum autē, tādā in aqua macerato, & ieiunā cyathū bibendum dato, & penicillum stanneum assidue subditum habeat, & cotyledonas siue umbilicos veneris, vnā cum sale & cumino, in aqua coquito, & tepidam sorbendam exhibeto. Et latæ quidem cotyledones foemellas gignere videntur: paræ verò & conclusæ, masculos.

Cotyledonis natura.

Conceptorium summum. Melanthium mulieri in vino nigro acerbo bibendum dato. Mulierem iuenculam fluxus ruber infestabat, & medicamentis datis, & capite purgato, ac vena secta, nihil melius habebat. Videbatur autem hæc causa ipsi esse, ut ne conciperet. Dabam itaque ipsi vinum album, in quo aspalathi radices efferbuerant, manē & antè coenam, & fluxus sedatus est, & non longè post concepit, & peperit masculum, Erat autem corpore coloris candicantis, & probè carnosa. De mola. Mola porro cōceptus causa hæc est, Quum multi menses, modicū & morbosum semen conceperint, neq; fœtus rectus sit, & venter plenus est velut prægrantis. Nihil autem in ventre mouetur, neque lac in mammis generatur. Mammæ autem turgidæ sunt. Hæc itaque & ad duos annos, sæpe etiam tres sic habet. Et si quidem vna caro fiat, mulier perit. Neq; enim fieri potest ut superstes maneat. Si verò plures, erumpit ipsi per pudendum sanguis multus ac carnosus. Et si hoc moderatè fiat, seruatur. Sin minus, à fluxu correpta perit, & morbus quidem talis est. Iudicare verò oportet ex plenitudinis mole, & quòd in ventre nō mouetur. Nam mas trimestris, fœmina quadrimestris motū habet. Postquam igitur tempore hoc prætergresso non mouetur, nimirum hic morbus est. Est autem hoc magnū signum, quòd lac in mammis nō generatur. Hæc igitur maximè quidem ne curato, aut certè cum prædictione. Et primū quidem totum corpus foueto. Deinde per sedem clysterem adhibeto, quo sanguis multus erumpat. Fortassis enim quod

Molæ conceptus.

Quis hoc dignoscas.

Curatio quæ.

comp

Vteri pur-
gationes.

Quæ vul-
uæ os ape-
riant.

compactum est cōmoueri, id quod fœtus esse putatur, mu- **D**
liere à pharmaco cōcalefacta. Sed & vteros colluito, quo san-
guinē educas: Sin min⁹, subdititiis vtatur è buprestī, & di-
ctamnū creticū in vino bibat: Sin minus, castoris testem,
& retro cucurbitam ipsi ad laterum mollitudinem affigito,
& plurimum sanguinem detrahito, atque hoc maximē con-
iectura virium ipsius facta. Ad vteri purgationes, quum nō
fiunt, siue ex partu, siue etiam aliās. Tædam pinguisimam
contusam in vino albo coquito, & trium cyathorum mensu-
ra vtatur. Aut pæoniæ grana quatuor, cumini Aethiopici
parum, & seselis paulò plus. Aut cedri baccas. Si verò
suffocationes affuerint, castorij parum. Si verò purgatio-
ne moderata ex partu facta, venter maneat, aut etiam flatus **E**
conclusus, & dolore vexetur, siue cum febre, siue citra febrē,
succī scammonia quintam potionis partem, aut seseli, aut
aliud quoddam ex odoratis, & rutam in vino albo bibendam
dato. Si autem bibere nolit, illitionem ad sedem facito, velut
verbi causa, ex felle taurino, & melle, ac litro. Si verò ex
purgationis corruptione dolore vexetur, & odoratis exhibi-
tis nihil cedat, & febris adsit, lactis caprini heminas duas de-
coquito, deinde eo perfrigerato pinguedinē detrahito, exco-
latoque, & aque mulsæ tertiam partem ammisceto, quo dul-
cius fiat. Bibat autē hoc ter ieiuna. Si verò dolor nō quies-
cat, neque venter subeat, ad vespērā in calidam aquam in so-
lio insideat. Quum autem perfota fuerit, vbi inde surrexit,
cum vino nigro austero aqua diluto, olei dimidia parte ad- **F**
dita, tepidè colluito, & inde dormiat. Subdititium vtero-
rum. Si conclusum fuerit, aut durum osculum vterorum,
Ficum albam expurgato, & nitrum Aegyptiū purissimum
tritum ammisceto, & subdititium facito magnitudine gallæ
non magnæ, quod in lana molli in vnguētum irinū tinctum
apponat, per tres aut quatuor dies, prout visum fuerit. Post
hoc conducit fomentum odoratum. Postea verò molli quo-
dam opus est subdititio, quod saniosa maximē ducat. Deinde
mercurialem, si tenera fuerit, cum vnguento rosaceo, in lin-
teo ad diem ac noctem subdat. Ad idem. Fel taurinum
& salem feruefacito, & sulphure trito ammixto, in oblōgam
spiram ac tractum efformato, & ad duos dies ac noctes nu-
dam, ad ipsos vteros apponito. Et deinde rursus mercurialē.
Post

- A** Post hoc myrrham puram inspergito, & rosaceo ac irino vnguento ammixto diluito, indeq; vteri osculum quàm penitissimè illinat. Ad idem. Iridem odoratam contusam ac cribratam seorsim, & cyperi tantundem, & crocomagna magnitudine massæ manum implentis, vino odorato diluito, & ad vnguenti formam redigito, & splenis palmi longitudine inducta ac illita, in paruam pixidem reconde, vt ne transpirent, & apponat. Si verò vlcerati fuerint vteri, aut osculum **Vulvæ vlcera.** exasperatum fuerit, aut ab aliquo subditio commorfi fuerint, adipem in lana illinito: & rosaceum ac cera parum inungito. Quum pragnas corruerit foetum menstruum, & ad finem perferre non poterit, & tenuis præter naturam fiat, huius **Quæ ante tempus foetus perdit.** vteros purgare oportet, & ipsam medicamentis curare, & crassescere. Non enim ad perfectionem gestare poterit, donec seipsam refecerit, & vteri robusti facti fuerint. Si verò concipiat quidem, corrumpat autem foetus bimestres, exactè eodem tempore, & neque prius neque posterius, & hoc perpessa fuerit bis aut ter eodem modo. Aut etiam ad amplius tēpus progressum corrumpat eodem modo. Huius vteri nō amplius extenduntur, foetu in ipsis augescēte, & ex bimestri aut trimestri, ad ampliorem modum excedente. Verum foetus quidem augescit. Vteri verò non crescunt, & propterea multè eodem tempore corrumpunt. Huius vterum colluere oportet, & subdititiis quàm maximè inflare, aut hisce medicamentis. Colocynthidis internam partē rusam cribrato, & **Medela.** **C** silphij parum, cum paulò ampliore melle cocto ammisceto, & hæc circum specillum obducito, ea crassitudine quantam stomachus ad vteri os suscipere potest, & semper vltra protrudito, donec ad internam vteri partem penetrarit. Quum autem pharmacū colliquerit, specillum eximito, & rursus eodem modo paratum elaterium, & colocynthidē, sylvestrem, similiter velut prius medicamentum apponito. Edat autem hoc tempore allium multū, & silphij caulem, & reliqua dia- **Contra** **46. q.** **cent.** **All.** **rata** ta vtatur, quæ flatum maximè in ventre inducere potest. Apponat autem subdititium tertio quoque die, donec bene habere visa fuerit. Quandoq; verò pluribus diebus interpositis: & in summa, prout libenter admiserit. Interiectis autē diebus, vtatur mollibus, postquam verò per emollitoria osculū vteri præparauerit, & menses apparuerint, paulum remo-

Cur quæ
semen reti-
nent non
concipiūt.

Curatio.

Cum abor-
tas non e-
mittitur.

rata, ubi iam sicca fuerit, cum viro coeat. Quum autem fla-
tum in vterū inducere voles, alij caput integrum, & silphij
succum, ad subdititia ammisceto. Quod si qua prægna-
nem perficere non possit, sed corrumpit, & hoc saepe
patitur, ex huius vtero aquam purgato, & ipsam medicamē-
tis curato, quo aqua purgetur. Si vero geniturā continens,
non prægna-
nem fiat, id quod multis contingit, stomacho vteri
præter naturam hiante: menses plures quàm conuenit, & hu-
midiores prodeunt, vt & id quod à fœmina prodit semen, ad
fœtificationem non concipiatur, & viri genitura insuper ac-
cedens corrumpatur. Contingunt autem hæc, & corpore, &
vteris ægrotantibus. Verū oportet huic medicamenta de-
orsum purgantia dare, & interposito aliquo tempore, totum
corpus fovere, & vteros cum aceto & aqua marina, specillis
ac ferramentis ignitis immisis. Coniiciantur autem in fo-
mentū cupressi ramenta, & lauri viridis folia contusa, & po-
lycnemi folia, faciendum est hoc fomentum tempore oppor-
tuno. post hoc verò lauetur, & fomentum adhibeatur ex loti
ramētis, & rosīs, ac polycnemi foliis aceto incoctis. Ad finem
autem suffitus fiat, ex verbasci foliis contusis ac loti ramen-
tis. Verū ante lotionem suffito myrrham & thus, vtraq; æ-
quis partibus trita, & myrti ac lauri folia. His permixtis &
in lentum ignē coniectis, recens adhibito fomēto suffito, bis
in die, fomentum autem adhibeatur recens lotæ. Sed & post
suffitum lauet, & vteri stomachum ad pristinam naturā re-
ducatur. Et si vires sufficiant, ante hæc omnia venam in manu
sinistra secato, atque ita reliqua facito. Si verò stomachus sic
habeat, menses autem non prodeant, aut vitiosè, aut minus,
ad reliqua omnia ampliorem purgationē adhibeto, & sic cu-
rato, subdititiis etiam vtēs si opus habeat, & ex prioribus la-
uans, & suffitum faciens, ac siccans. Si mulier inuita abor-
tum faciat, nec ita eiicere velit, triticum torrefactum & mo-
litum & vuam passam albā contusam, aqua mulsa dulci dilu-
ta, modico oleo affuso, ieiunæ bibenda dato, postea raphani
semen tritum, & acetum ac adipem anserinum, permixta bi-
bat, & lauri folia trita apponat. Deinde bibat origanum, &
pulegium, & polentā ex aqua, ita vt lauri folia tusa ac trita
ammixto gūmi, aquæ inspergat, diluat, ac bibat. Aut adipē
ouillum, & anserinū, & mel simul mixta ac trita delingenda
præb

A præbero. Aut pastinacæ semē leuissimè terito, & lacti superstantem concretionem ammisceto, & adipem anserinum eliquatum. Hæc feruefacta sorbenda dato. Aut origani folia viridia, si haberi possunt, sin minus, sicca leuissimè trita, ex aqua bibenda dato. Aut lauri baccas leuissimè terito, & suis fœminæ adipem liquatū, & mel ammisceto, & simul omnia trita delingenda præbero. Aut pastinacæ semen leuissimè tritum ex vino diluto bibendum. Si vteri genituram non contineat, plumbum, & lapidem qui ferrum ad se rapit, leuiter terito, & linteo illigato, quo in muliebri lacte tincto, subditio vtatur. Aut æris florem tritum ac melle dilutum subdar. Quum vteri genituram viri eructant tertia die, necesse est mulieris, quæ hæc patitur, vteros callo repletos esse, & nō potest viri genitura intus in vtero manere, sed excluditur, & propterea concipere non potest, quandiu callus in vtero fuerit. At calli expulsio sic fit, Pennas sumito minutissimas ac mollissimas, hisque simul colligatis vteros illinito, quemadmodum oculos illinire solent, ita vt pennas exæques, ipsarūmq; summas partes tenuissimo filo deliges, & multo rosaceo illinas. Sic autem facito. Supinā reclinato, & sub medios lumbos puluinar subiicito, & specillū immittito, ita vt cruribus mulieris extentis, & hinc atque illinc diductis, specillum sursum ac deorsum vertas donec promineat: postquam autem videris in osculo vteri callum, optimum quidem hoc fuerit, si non adhæreat in coxa, sed vltro sequatur. Si itaque in osculo vteri inhæret, vossella tenuissima præhensum extrahere conare, prouidus vt placidè hoc fiat, & nō violenter. Et postea viro condormiet. Si prægnanti menses compareat, stercus asininum siccum, & rubricam, & sepia testam terito. & linteo alligata apponito. Aut pœoniae semina nigra, in vino diluto trita bibenda dato. Si verò à coitu, imum ventrem dolet, & sanguis recens ipsi appareat, lini semen rufum & muscum mollem, & adipem anserinum, mixta ac molli lana excepta imponito. Si vteri extra naturam progressi fuerint, calor habet maximè pudenda, & sedem: & vrina paulatim destillat & pudendū mordet. patitur autē hæc si recens ex partu viro condormierit. Quum sic habuerit, myrti baccas & loti ramenta in aqua coquito. & aquam per noctē sub dio exponito, atque sic frigidissimam pudendis affundito, &

Quum semen non retinetur.

Quum vulua prociat.
Medela.

R trita

erita hæc apponito. Postea aquam lentium bibens, melle & D
aceto ammixtis, vomat donec vteri fuerint retracti. & lectus
a pedibus altior sit: & graueolentia sub pudenda suffito, odo-
rata verò sub nares. Cibus vtatur quā mollissimis, ac frigidis
& vinum aquosum album bibat, & nō lauetur, neq; cum vi-

Quum vul-
ua penitus
propendet,
Curatio.

ro dormiat. Si verò omnino ex pudendis exciderint, depen-
dent velut scrotum, & dolor corripit, Hoc autem contingit,
quum ex partu laborarit, vt vteros concusserit, & cum viro
dormierit in puerperij purgatione. Cū sic habuerit, frige-

factoria apponat, & quod foris est depurgatum, ac cum vino
nigro vinoso, in quo malum punicum coctum est ablutum,
intrò detrudat. Deinde mel & resina, pari mensura eliqua-

ta, & pudenda infundantur: & decumbat supina pedes sur- E

sum extensos habens: postea spongas apponat, & ad lumbos
deliget. Quādiu verò sic habuerit, a cibus abstinere oportet.

Potu verò quā paucissimo vti, donec septem dies præter-

eant: & si quidē sic redire voluerint, bene est: sin minus, sum-

mas vteri partes deradito, lauato, & cerato picato illinito.

Deinde pedes ad scalam deligato, scalamque iuxta caput pul-

fato, & cum manu intrudito. Postea crura ipsius alternatim

colligato, & diem ac noctem finito in quiete, & modicū pti-

sanæ succum frigidum dato, aliud autem nihil. Postera die

ipsam reclinato, & cucurbitam quā maximam ad coxam

affigito, & multo tempore trahere finito: & cū detraxeris,

reclinatam iacere finito, & nihil aliud præter ptisanæ succū

exhibeto, donec septem præterierint dies. Cibus autem tunc F
mollissimis ac paucissimis vtatur. Si verò ventrem exonera-

re voluerit, decumbens id faciat, donec quatuordecim

dies prætereant, postea surgat, & quā parcissi-

mè deambulet, & non lauetur, & cibus mo-

dicis vtatur, sub pudenda verò suffi-

tus per graueolentia fiat. Et

postquam obambula-

re inceperit, sub-

ligar ge-

stet,

HIPPO.

AHIPPOCRATIS

310

COI DE MORBIS PO-

PVLARIBVS LIBER PRI-

MVS, IANO CORNA-

RIO MEDICO PHY-

SICO INTER-

PRETI.

*

B SECTIO PRIMA.

Constitutio temporis prima.



N Thaso autumnni tempore, circa equino-
ctium & sub pleiadas, aquæ multæ, assidue,
molles, velut in austrinis, hyems austrina,
parui venti aquilonares, squalores, & omni-
no hyems quale ver fieri solet. Ver autem
austrinum, frigidum, pluiiæ paruæ. Aestas
plerunq; nubila, aquarum inopia. Etesia parû, modicè, spar-
sim spirarunt. Quum autem totus hic aëris status ad austri-
na vergeret, ac cum siccitatibus fieret, ante ver quidem ex
priori statu, subcontrario & aquilonio fiente, paucis oborta
sunt febres ardentes, atq; his omnino boni status, & paucis
sanguis erupit, neque ex his moriebantur, Tubercula verò
circa aurem alteram multis erant, plurimis ex vtrisque, ci-
tra febrem erectè obambulātibus. Quibusdam verò etiam
parum incalescebant. Extincta sunt omnibus absque nocu-
mento. Neque cuiquam suppurarunt, quemadmodû ea quæ
ex aliis causis sunt oborta. Erat autem natura ipsorum hæc,
laxa erant, magna, diffusa, non cum inflammatione, doloris
exortia, omnibus obscure euauerunt. Fiebant autem hæc
adolescentibus, iuuenibus, in vigore constitutis, & ex his plu-
rimis qui circa palæstram & gymnasia exercebantur. Mu-
lieribus verò paucis fiebant. Plurimis verò tusses siccæ, qui
sussiebat & nihil reiectabant, & voces nō longè postea rau-

Vergiliz
Thasos.
Temporū
varietates.

Causos.
Tubercula
secundum
aures.

Quibus
hæc fieret.

R 2

colæ

Hippocratis Liber I.

cosq. Quibusdam verò etiã interposito tẽpore inflãmationes **D**
cum dolore, in altero testiculo, quibusdã in vtroque. Et aliis
quidem febres, aliis non. Hęc autem plurimis laboriose fie-
bant. De cetero verò, quantũ ad ea quę in officina medica ad
chirurgiam pertinentia fiunt, sine morbo debebant. At verò
ante ætatis initiũ, & per æstatem ac hyemẽ, multi ex his qui
longo iam tempore subcorrupti erant, tabidi decubuerunt.
Nam & multis qui ambigui erant, tũc tabes confirmata est.
Quibusdã verò primũ cœpit. Et his natura ad tabem verge-
bat. Moriebantur autẽ multi, & plurimi ex his. Et de his qui
decubuerũt haud scio an quis etiã modico tẽpore superuixe-
rit. Moriebãtur autẽ citiũs quã tales morbi trãligere solent.
Nam alios & lōgiore, & cũ febribus coniunctos facile fere-
bant, & nō moriebantur. De quibus paulò post scribetur. So-
lus enim & maximus ex his qui tum vigeabant, tabidus mor-
bus multos occidit. Erãt autem plurimis ipsorũ affectiones
huiusmodi: febres horridę, continuę, acutę, in totum nō in-
termittentes. Modus autem erat semitercianus, vna die le-
uiore, altera amplius exacerbescētes, & in summa acutio-
res increbescētes. Sudores vero semper, nō per totũ, frigidi-
tas extremitatũ multa, & quę vix recalesceret. Alui turbata,
biliosa, ex paucis, puris, tenuibus, mordacibus, frequẽter ad
exonerandos se surgebant. Vrinę tenues, & crudę, & decolo-
res, & paucę: Aut crassitudinem habētes, & subsidentiã par-
uiam, non probẽ desidentes, sed cũ cruda quadã ac intẽpesti-
ua subsidentiã. Tussiebant autem, pauca, condensata, conco-
cta, paulatim vix educētes. Quibus verò violentissima acci-
dissent, his neque modicẽ concoctio aderat: sed cruda spueri
perseuerabãt. Fauces autẽ plurimis horum ab initio, & per-
petuò dolebant, ruborem habentes cum inflammatione, flu-
xiones parvę, tenues, acres. Breui colliquescebant, & affrige-
bantur. omnes cibos perpetuò fastidiētes, sitis exortes, & ple-
rique circa mortem deliri. Et circa tabidos quidem hęc. Cæ-
terũ æstate iam & autumno, febres, multę, continuę, non
violentę, diu quidem agrotãtibz, non autem alijs ita ma-
lę habētibus oboriebãtur. Plurimis alui turbata, ita vt val-
de tolerãter ferrēt, & nihil, memorabile lædebãt. Vrinę itẽ
plurimis boni quidem coloris & purę. Verũ tenues, & post
tempus circa iudicationem cōcoctę. Tussiebant autem non
valde

Hemiri-
tao.

Vrinę qua-
les.

Mala au-
tumnalia

A valde, neque ea quæ per tussim reieciuntur difficultatē exhibebant, neq; cibum fastidiebāt, sed etiam valde licebat ipsis offerre. In summa subagrotabāt tabidi, nō tabido modo. febribus horridis parum insudantes, aliās alij, vt qui erroneo modo exacerbarentur, febribus quidē in totū non intermittētib; sed quæ iuxta naturā febris tertianæ morē exacerbarentur. Iudicabantur autem quibus inter os breuissimæ essent, circa vigesimū diem plurimis circa quadragesimum. Multis circa octuagesimum. Quibusdam neque sic, sed vago modo & circa iudicationē deficiebant. horum autē plurimis febres rursus nō multū tempus intermittētes reuersæ sunt. Ex recidiuis autē in iisdem circuitibus iudicabantur. Multis

Tabes hæc
quæ.

B verò ipsorum producebātur, vt sub hyemem agrotarent. Ex omnibus porro in hac temporis constitutione descriptis, solis tabidis lethalia acciderunt. In aliis autem febribus, non.

SECTIO SECUNDA.

(Constitutio temporis secunda.

IN Thaso ante autumnū tempestates non tēpestiue, sed de-
repente in aquiloniis & austrinis multis, humidæ & præ-
erumpentes. Huiusmodi verò durabāt vsq; ad pleiada, & sub
pleiade. Hyems autē aquilonia. Aquæ multæ, laigæ, magnæ.
Niues. Plerunq; mixta aeris serenitas. & hæc quidem fiebant
omnia frigora verò non admodum intempestiua. Iam verò
post bruinale solstitium, & quando fauonius spirare incipit,
C posterior hyēs magna erat. aquilonia multa. Niues & aquæ
assidue multæ, & cælum procellosum ac nubilū. Hæc autem
durabant & nō remittebāt vsq; ad æquinoctium. Ver autem
frigidum, aquilonium, aquosum, nubilum. Aestas nō valde
æstuosa fiebat. Etesia assidue spirarunt. Mox circa arcturū
in aquiloniis, aquæ valde multæ. Quum autē annus totus
humidus & frigidus & aquilonius esset, per hyemē sano mo-
do plerunq; habebant. Ante ver autē multi quidā & plurimi
morbidē degebant. Primum igitur cœperunt lippitudines
fluidæ, dolorosæ, humidæ, crudæ. Lemæ parux & multis dif-
ficulter erumpentes, plurimis reuertebātur. defecerunt sero
ad autumnum. Aestate iam & autumnino, lenteria, & dysen-
teria, & tenesmi, & alui profluvia ex biliosis, tenuibus mul-
tis, crudis, & mordacibus: quibusdā verò etiam aquosis. Mul-

Thasus.

Solstitium
hybernū.

Ver.
Aestas.
Etesia.
Arcturus.

Ophthal-
mia.

Vētris fluo-
res diuersi.

Hippocratis Liber I.

Stranguria
Vomicio.
Sudor.

Febres di-
uersæ.
Quartana
erratica.
 tis autem & vrinæ fluxiones cum dolore biliosæ, aquosæ, ra- **D**
 mentosæ, purulentæ, cum stillicidio, nō rhinales. sed his aliā
 pro aliis. Vomitus pituitosi, biliosi, & ciborum crudorum re
 iectiones. Sudores. Omnibus vndiquaque multa humiditas.
 Fiebant autē hæc multis erectē obambulantibus, non febriē
 tibus. Multis item febrientibus, de quibus paulo pōst scribe-
 tur. In quibus autem omnia hæc præscripta apparebāt cum
 dolore, tabidi fiebant. Iam verò autumno & sub hyemem, fe-
 bres continuæ, & quibusdam ipsorum paucis ardentes, diur-
 næ, nocturnæ, semitertianæ, tertianæ, exactæ, quartanæ, erro-
 næ. Singulæ verò prædictæ febres multis fiebant. At arden-
 tes & paucissimis obortæ sunt, & ex agrotis hi minimum la-
 borauerunt. Neque enim sanguis erupit, nisi valde parum, & **E**
 paucis. Neq; delirabant, aliæque omnia tolerabilia erant. Iu-
 dicabantur autē plurimis valde bono ordine, cum intermit-
 tentibus in septem ac decem diebus. Neque mortuū aliquē
 tunc in febre ardente noui, neque phrenitim tunc cuiquam
 factam scio. At verò tertianæ plures quidem quā arden-
 tes febres erāt ac grauiores, verū ordinatē in his omnibus à
 prima accessione quatuor circuitus habebāt, in septem autē
 perfectē iudicabantur, neque vlli horū reuersæ sunt. Quar-
 tanæ verò multis quidem ab initio ex ordine quartanæ cœ-
 perunt. Quibusdam autē nō paucis, ex aliis febribus ac mor-
 bis abscessus ad quartanas fiebant, atque hos diu, quemadmo-
 dum solent, & adhuc diutius tenebant. Diurnæ verò quo-
 tidianæ, & nocturnæ, & erroneæ multæ, multis & multo tem- **F**
 pore permanebant, & erectē obambulantibus, & decumben-
 tibus. Plurimos horum sub pleiada, & vsque ad hyemem, fe-
 bres consequebantur. Multos conuulsiones, magis autē pue-
 ros ab initio, & febriebant, & in febribus conuulsiones fie-
 bant. & erant hæc plerisque diuturna, verū innocua, nisi ad
 hæc, etiam ex aliis omnibus pernicies adesset. At continuæ
 quidem in totum, & nihil intermittentes, exacerbescentes au-
 tem omnibus ad naturæ tertianæ modum, vna die subleuan-
 tes, & vnā exacerbescentes, omnium quæ tunc fiebāt violenti-
 ssimæ erant, & longissimæ, ac cū maximis doloribus, leni-
 ter auspicientes, & in totū semper augefcentes, & in iudicato-
 riis diebus exacerbescentes, & in peius procedentes, parū al-
 leuantes, & statim rursus ex intermissione violentius exacerbe-
 scentes

A scētes, in iudicatoriis plerunque diebus peiores fientes. Rigores verò omnibus quidem inordinate & erroneo modo fiebant, parcissimè autem & minimè his. Verùm in aliis febribus maiores. Sudores multi, his minimi, nihil alleuantes, sed sub cōtrario modo damna inferentes. Frigiditas extrematum his multa, & vix recalescēs. Neq; somni in totum, maximè verò hi etiā rursus soporosi. Ventres autem omnibus turbati & mali, his autē longè pessimi. Vrinæ verò plurimis horum aut tēues, & crudæ, & decolores, & post tēpus parum cōcoctæ iudicatorio modo. Aut crassitudinē quidem habentes, verū turbatæ, neque cōsistentes, neque subsidentes neque cōcoctæ. Aut paucæ, & crudæ, ac malæ, & subsidentes.

B Pessimæ autem hæ omnes. Et tussis quidem ad febres comitabantur. Verùm nō habeo quod scribam, an detrimentum aut utilitas tunc ex tussi cōtigerit. Diuturna igitur & molesta, & valde inordinate ac erroneo more, & citra iudicationem, plurima horum perseverabant, tum his qui perniciosè habebant, tum his qui non. Si enim aliquos ipsorum paululum relinquerent, statim rursus reuertebantur. Quibusdam verò paucis ipsorū iudicabātur, quibus brevissimè adessent, circa octogesiā diem & horum aliquibus reuersa sunt, ut plurimi ipsorum per hyemē adhuc agrotarint. plurimis autem citra iudicationē defecerunt. Hæc verò pariter acciderunt, & his qui superstites manserunt, & qui non. Quum autem multa & varia fieret iudicationis impeditio ex morbis,

C maximum etiam ac pessimum signum perpetuò comitabatur, quòd plerique omnes cibos fastidirēt, & ex his maximè hi, quibus etiam alia exitialia erant. Siticulosi verò nō adeo intempestivè in his febribus erāt. Quum verò tēpus prodiceretur, & dolores essent multi, ac colliquatio mala, his abscessus succedebant, aut maiores quàm ut ferre possent, aut minores quàm ut quicquam prodesse: sed statim recurrent & ad peius courgerent. Erāt autem quæ his fiebāt hæc: dysenteria, tenesmi, lienteria & alui profusio. Quibusdam etiam hydropes, partim cū his, & partim absq; his. Quicquid autem ex his violēter accedebat, statim vires deiiciebat: aut rursus nihil proderat. Papulæ parvæ, & non pro dignitate rationis excretionis morborum, & statim rursus evanescentes. Aut iuxta aures tumores, qui non soluebantur, & nullam

Tussis cum febre.

Ventris mala.

Hippocratis Liber I.

de se significationem præbebant. Quibusdam in articulos, D
maximè verò in coxendicem, paucis iudicatorio modo ces-
santes, & statim rursus ad habitum ab initio inualescentes.
Moriebantur autem ex omnibus, & plurimi ex his pueri iam
ablactati, & maiores natu, octennes ac decennes, & nondum
puberes. Fiebant autè hæc his, non sine prius scriptis. Priora
verò multis, sine his. Solum verò bonum & maximū inter
ea quæ fiebant signum, & quod plurimos in maximis pericu-
lis cōstitutos liberauit, quibus ad vrinæ stillicidium conuer-
tebantur, & ad hoc abscessus fiebant. Accidit autè plerisque
vrinæ stillicidium, maximè his ætatibus. Fiebat & aliis mul-
tis, tum erectè obambulātibus, tum in morbis. Statim verò
etiam magna quædā mutatio omnium, his fiebat. Alui enim E
etiam si humectæ essent, maligno modo mox sistebantur, ci-
bōsque omnes libenter sumebant. Et febres postea mites
erant. Verum vrinæ stillicidium his diuturnum & laborio-
sum erat. Vrinæ verò his erant multæ, crassæ, variæ, rubræ,
purulentæ cum dolore. Atq; hi omnes superstites māsērunt,
& nullum ex his mortuum noui. Quæcunque verò non pe-
riculosæ fiunt, concoctiones excrementorum omnes vndi-
quaque tempestiuas aut bonas, & iudicatorios abscessus, con-
siderare oportet. Concoctiones celeritatem iudicationis, &
securitatem sanitatis significant. Cruda verò & inconcocta,
& in malos abscessus conuersa, aut iudicationis sublationē,
aut dolores, aut diuturnitatē, aut mortem, aut eorundē reci-
diuas. Quod verò ex his potissimum futurū sit, ex aliis con- F
siderandum est. Præterita dicito, præsentia cognoscito, futu-
ra prædicito. Hæc tractato. Exerceto circa morbos duo, vt
iuues, aut non noceas. Ars ex tribus cōstat. morbo, ægroto, &
medico artis ministro. Aegrotū cum medico aduersari mor-
bo oportet. Capitis & colli dolores ac grauitates cum do-
lore, cum febribus, & sine febribus, Phreniticis quidem con-
uulsiones, Sed & virosa vomunt, & quidam ex his subito mo-
riuntur. In ardentibus autem & aliis febribus, quibus colli
dolor, & temporū grauitas, & caligo vertiginosa circa oculo-
los, aut etiā præcordiorum distentio, non cum dolore fit, his
sanguis per nares erumpit. Quibus autem grauitates quidē
totius capitis, oris autē ventriculi morsus adsunt, & nausea-
bundi sunt, hi biliosa & pituitosa vomunt. Plerunque verò
pueris

Digesta
crudaque
quid por-
tendant.

Medici mu-
nus.

Medica ars
quibus con-
stet.

A pueris in talibus afflictionibus conuulsiones fiunt. Mulieribus autem tum eadē, tum ab vteris dolores. Senioribus autem & quibus iam calor superatur, paraplegiæ vocatæ, leues fiderationes, aut insaniæ, aut oculorum priuationes.

Constitutio temporis tertia.

IN Thaso paulò ante arcturum, & sub arcturo, aquæ multæ, magnæ, in aquiloniis. Circa æquinoctium autē & vsq; ad pleiadas, austrinæ pluuiæ pauca, hyems aquilonia. siccitates, frigidi venti, magnæ niues. Circa æquinoctium hyemes maximæ. Ver aquilonium, siccitates, pluuiæ pauca frigida. Circa solstitium æstium aqua pauca, magna frigora vsque ad canem. Post canē vsq; ad arcturum, æstas calida, æstus magni non ex accessione augescentes, sed continui ac violenti. Aqua nō delapsa est. Etesiæ spirarunt. Circa arcturū pluuiæ austrinæ vsque ad æquinoctiū. In hac autē cōstitutione, per hyemem quidem receperunt resolutiones ex fideratione, & multos inuaserunt. & quidā ex ipsis subito moriebantur. Nā hic morbus satis popularis erat. Cætera incolumes degebāt.

Ante ver autē cœperunt febres ardentes, & vsque ad æquinoctium, & ad æstatem durabant. Quicumque igitur vere & æstate ineunte statim ægrotare cœperunt, plurimi seruabantur. pauci verò quidā moriebātur. In autumno iam & quum pluuiæ fierent, lethales erant, & plures peribant. Erāt autem febrium ardentium affectiones. Quibus quidem bene ac largē sanguis per nares erupit, per hoc maximē seruabantur. & nullum noui qui in hac constitutione mortuus esset, si rectē ipsi sanguis profluxisset. In Philisco enim & Epaminone ac Sileno, quarta & quinta die parum de naribus stillauit, & moriebantur. Plerique igitur ægroti circa iudicationē rigebant, maximē hi quibus sanguis non erupisset. Idem verò etiam postea insuper riguerunt, & exsudarunt. Quibusdam morbus regius accidit sexta die. Verū his purgatio per vesicā, aut alius exturbata profuit, aut larga sanguinis eruptio. Velut Heraclides qui decumbebat apud Aristocydam. nam huic & naribus sanguis erupit, & alius turbata est. & per vesicā purgatus est. Vigesima die iudicatus est. non velut Phanagoræ seruus, cui nihil tale factum est, & mortuus est. Sanguis autē plurimis erupit, maximē adolescentibus & in

Qualis tertia cōstitutio in Thaso.

Ver quale. Aestas.

Etesiæ.

Autumnus semper malus.

Philiscus. Epaminon. Silenus.

Heraclides. Aristocydes. Phanagoras.

R 5

vigore

Hippocratis Liber I.

Bion.
Silenus.

Eraton.
Mylus.

Tubercula.

Antiphon.
Critobu-
lus.

Mulieres
quæ pate-
rentur.
Telebulus.

Dæthar-
seus.

Xenopha-
nes.
Critias.
Bion.
Cratia.

Arcturus.

vigore cōstitutis, & talium pleriq; perierunt, quibus sanguis **D**
non erupit. Senioribus verò ad morbū regium res deuenit,
aut alui ipsis turbatae sunt, aut dysenterici facti sunt. Velut
Bioni apud Silenū decumbenti cōtigit. Populariter grassa-
bantur etiā dysenteriae per aetatem & quibusdā qui agrota-
runt, quibūsq; etiā sanguis erupit, ad dysenteriam transitus
factus est velut Eratonis filio & Mylo, qui multa sanguinis
eruptione facta, in dysentericum statum delapsi superstites
manferunt. Multis igitur maximè hic humor redundauit.
Nam & quibusdā circa iudicationem sanguis non erupit, sed
tubercula iuxta aures excitata euauerunt. Quæ ubi eua-
nuissent, iuxta sinistri lateris mollitudinē, & ad summā co-
xam grauitas fuit. Quum autem dolores post iudicationem **E**
fierent, & vrinae tenues prodissent, parum sanguinis profun-
dere coeperunt. Verum circa quartā & vigesimā. abscessus
ad sanguinis eruptionē fiebant Antiphonti Critobuli filio,
quæ sedata est, & perfectè iudicatus est circa quadragesimā.
Mulieres porrò multæ quidem agrotarūt, pauciores autē
quàm viri, & pauciores etiam mortuæ sunt. Plurimæ verò
grauiter ex partu laborarunt, & post partus insuper agrota-
runt, & hæ maximè perierunt. Velut Telebuli filia, quæ sex-
ta à partu die mortua est. Plurimis itaq; in febribus menses
apparebant. Quibusdam verò ex naribus sanguis erupit. &
virginibus multis id primū factū est. Quibusdā & ex na-
ribus sanguis, & menses proruperunt. Velut Dætharsei filia **F**
virgini apparuerunt tunc primū, & sanguis largus è nari-
bus fluxit. Neq; vllam mortuam noui, ex his quibus aliquid
horum probè factū esset. quibus autem prægnātibus conti-
git agrotare, omnes foetus perdiderunt, quas ego noui. Vri-
nae verò plurimis boni quidem coloris, verum tenues & sub-
sidentias modicas habentes, ex recrementis tenuibus ac bi-
liosiss. Multis autē aliis iudicatis ad dysenterias res deuenit.
Velut Xenophani & Critiæ. Vrinae aquosæ, multæ puræ, te-
nues post iudicationē, & subsidentia bona facta, & aliis pro-
bè iudicatis. Mentionē faciam eorū quibus factæ sunt, Bioni
qui apud Silenum decumbebat. Cratiæ quæ apud Xenopha-
nem. Aretonis filia vxori Mnesistrati. Postea verò omnes hi
dysenterici facti sunt. Quod vrinas minxerunt aquosas, con-
siderandum est. Circa arcturū autem multis vndecima die
iudicatio

A iudicatio facta est, & his recidiuæ non pro ratione fientes reuerſæ sunt. Erant autē soporosi circa tēpus hoc, plures autem pueri, & hi omnium minimè moriebātur. At verò circa æquinoctium, & vsq; ad pleiada, & sub hyemem, comitabantur quidē febres ardentes. Sed & phrenitici plurimi tūc fiebant, & pleriq; horum moriebantur. fiebant autem & per æstatem pauci. Quum igitur febres ardētes inciperent, significationem de se præbebāt quibus perniciēs immineret. Statim enim ab initio febris acuta, parum insuper rigeabant, vigiles erant, siticulosi, anxij, parum exudantes, circa frontem & clauiculas, nullus per totum, multum delirabāt, tumores, tristitiæ, extremitates subfrigida, pedes summi & maximè

Æquinoctium.

B manuū summæ partes. Exacerbationes in diebus partibus.

Plurimis autem quarta die dolores maximi, & sudores plerunque subfrigidi, & extremitates non amplius recalescentes, sed liuidæ, subfrigida, & neque sitiebant. Ad hæc vrina

Postrema qualia in his.

his nigra, pauca, tenues, & alui fistebantur. neque sanguis è naribus erupit vlli ex his quibus hæc accidissent, sed parum stillauit. Neque ad recidiuam vlli horum res deuenit. Sed sexta die mortui sunt cum sudore. Phreniticis autem acciderunt præscripta nō omnia. Iudicabantur autem his plerunq; die vndecima, quibusdam vigesima. Quibus non statim ab initio phrenitis cœpit circa tertiam aut quartam diem, sed moderatè habebant primo tempore, his circa septimā morbus ad acumen transiit. Magna itaque erat morborū multitud.

Ctitudo. Ex agris autem maximè moriebantur adolescentes, iuuenes, in vigore ætatis constituti, leues, subalbicante cute, rectos itēque nigros capillos habentes, & oculos nigros, &

Qui hoc morbo perirent.

qui in quiete & ocio vixerāt, & alta voce, aut gracili, aut aspera præditi, balbi, iracundi, & mulieres plurimæ ex hac specie moriebantur. At in hac constitutione ex quatuor signis maximè seruabantur. Quibus videlicet sanguis è naribus probè erupisset. Aut vrina multæ, & multā subsidētiam habentes per vesicā prodiissent. Aut per ventrē turbata, biliosa tempestiuè processissent. Aut qui dysenterici facti essent.

Quatuor hæc languentes seruabant.

Acciditq; multis vt nō ex vno præscriptorū signorum iudicarentur, sed per omnia percurrerent, & grauius quidē habere videbantur, conseruabantur autē omnes quibus hæc accidissent. Mulieribus autē & virginibus accidebāt item præscripta

scripta

Hippocratis Liber I.

**Philonis fi-
lia cur pe-
rierit.**

**Lachryma
non sponte
defluētes.**

**Tubercula
iuxta aures**

**Iudicatio-
nes variz.**

**Theatrum
Epigenis.**

Euagon.

**Aglaidæ fi-
lia.**

**Epaminō-
das.**

Silenus

Philiscus.

scripta signa omnia. Quibus autem vel horum quippiam be-
ne accideret, aut menses largè apparerent, per hæc seruaban-
tur ac iudicabantur, neque vllam interitū noui, cui ex his
aliquid accidisset. Philonis enim filix sanguis ex naribus lar-
gè fluebat. Septima autem die intempestiuus cœnauit &
morta est. Quibus in febribus acutis, magis ardentibus, la-
chrymæ inuitæ defluunt, his sanguinis à naribus eruptionē
expectare oportet, si etiam alia perniciose nō habeant. Nam
his qui male habent, nō sanguinis eruptionem, sed mortem
significant. Tubercula iuxta aures in febrientibus cum do-
lore oborta, quibusdam febre iudicatorio modo deficiente,
neque sedantur, neque suppurantur: hæc biliosum alui pro-
fluuium, aut dysenteria, aut crassarum vrinarum subfiden-
tia soluit. Velut Hermippo Clazomenio. Iudicationes au-
tem ex quibus cognoscimus, aut similes sunt, aut dissimiles.
Velut duo fratres qui simul eadem hora ægrotare cœperunt
Decumbebant autem iuxta theatrum Epigenis fratres. Ho-
rum seniori sexta die iudicatio facta est, iuniori verò septi-
ma. Recidiua facta est vtrisque simul eadem hora. Inter-
misit dies quinque. Ex recidiua iudicatio facta est vtrisque si-
mul in totū, die decima septima. Plurimis autē sexta die iudi-
catio facta est, intermisit sex. Ex recidiuis autem iudicatio fa-
cta est quinta die. Quibusdam verò septima iudicatus est
morbus, & septem diebus intermisit. Ex recidiua verò iudi-
catus est tertia. Quibusdam autem iudicatus est quinta, in-
termisit septem, rediit per tres, intermisit vnā, insuperque
vnā rursus occupauit. Aliquibus verò iudicatus est sexta,
intermisit sex, rediit per tres, intermisit vnā, & vna iudi-
catus est: Velut Euagonti Daiphantis filio. Quibusdam au-
tem iudicatus est sexta, intermisit septem: ex recidiua verò
iudicatus est quarta. Velut filix Aglaidæ, plerique igitur
ex his qui ægrotarunt in hac constitutione, hoc modo ægro-
tarunt, & nullum noui ex his qui superstites manserunt: cui
non rediissent recidiuæ secundum rationem fientes, & ser-
uati sunt omnes quos ego noui, quibus hoc genus recidiuæ
factæ sunt. Neque ægrotantium hoc modo vllum aliquem
noui, quem recidiua iterum repetiisset. Moriebantur au-
tem in morbis his plurimi sexta die: velut Epaminondas, &
Silenus, & Philiscus Antagoræ filius. Quibus autem tu-
berc

Abercula iuxta aures facta essent, his iudicatio facta est vigesima die. Restincta autē ac sedata sunt omnibus, & non suppurata sunt, sed ad velicam conuersa. Cratistonacli qui apud Heracleium habitabat, & Scymni fullonis ancillæ suppura-
uerunt, & mortui sunt. Quibus autem iudicatus est septima die, intermisit nouem, reuersus est morbus. Iudicatus est ex recidiua quarta die. Quibus autē iudicatus est septima die, intermisit sex, deinde rediit, & iudicatus est septima velut Phanocrito, qui decumbebat apud Gnathonem pictorem.

Tubercula
post aures
Cratisto-
nax.

Heracleius
Scymnus.

Phanocri-
tos.

Gnatho.

Sub hyemem circa solstitium hybernum, & vsque ad æquinoctium, perseuerabant quidem & febres ardentes, & phrenitides, & multi moriebantur. Iudicationes tamen transmutate sunt, & iudicatio facta est plurimis ab initio die quiescente, intermisit quarta, recidiua facta est, ex recidiua vero iudicatio facta est quinta die. In summa quatuordecim diebus. Sic autem facta est iudicatio pueris plurimis, imo etiam senioribus. Quibusdam verò morbus iudicabatur die vndecima. Reuertebatur decima quarta, iudicabatur perfectē vigesima. Si verò aliqui insuper riguissent circa vigesimam his iudicabatur quadragesima. Superriguerunt autem plurimi circa iudicationem ab initio. Qui verò circa iudicationem ab initio riguerunt, etiam in recidiuis vnā cum iudicatione riguerunt. Riguerunt autem paucissimi vere, æstate plures, autumno adhuc plures, hyeme longē plurimi. At sanguinis eruptiones cessabant.

SECTIO TERTIA.

Morbos dinoscimus edocti, ex communi omnium natura, & ex vniuscuiusq; propria, ex morbo, ex agroto, ex his quæ offeruntur, ex eo qui offert. Ex his enim & breuioribus, & grauioribus redduntur: ex tota ac partiali constitutione celestium, & vniuscuiusq; regionis, ex victu, ex vitæ studiis, ex ætate cuiusq; sermonibus, moribus, taciturnitate, cogitationibus, somnis, vigiliis, insomniis quibusdam & quando, vellicationibus, pruritibus, lachrymis, exacerbationibus, secessibus, vrinis, sputis, vomitibus, & quæ ex quibus, in quos, successiones morborum: & qui abscessus ad perniciem, & ad iudicationem: Sudor, rigor, frigiditas, tussis, sternutationes, singultus, spiritus, ructus, flatus silentes, strepentes, sanguinis erup

Morborū
cognitio &
obseruatio
varia.

Hippocratis Liber I.

eruptiones, hæmorrhoides, ex his autē, & quæ per hæc fiunt. **D**
Febriū spe considerandum. Febres quædam continuæ sunt, quædam in-
cies. terdiu tenent, noctu intermittunt. Aut nocte tenent, die in-
 termittunt. Semitertiana, tertiana, quartanæ, quintanæ, se-
 ptimanæ, nonanæ. Sunt autem acutissimi, & maximi ac gra-
 uissimi morbi, & maximè lethales, in continua febre. Secu-
 rissima verò omnium, & facillima ac longissima est quarta-
Quartana. na. Non enim solum ipsa à seipsa talis est, sed etiam ab aliis
Semitertia magnis morbis liberat. At in semitertiana appellata, con-
na. tingit quidem & acutos morbos fieri, & est hæc præ cæteris
 maximè lethalis. Sed & tabidi, & quicumque ex aliis longis
 morbis ægrotant, ex hac maximè ægrotant. Nocturna non
Nocturna. admodum lethalis est, verum longa. Diurna longior. Qui- **E**
Diurna. busdam autem & ad tabem vergit. Septimana longa est,
Septimana. verum non lethalis. Nonana adhuc longior, & non letha-
Nonana. lis. Tertiana exacta cito iudicatur, & non est lethalis.
Tertiana. Quintana pessima omniū est. Nam & ante tabem, & iam
Quintana. tabidis superueniens, occidit. Sunt autem modi, & consti-
Continua. tutiones, & exacerbationes singularū harum febrium, æquæ
 continuarum ac intermittentium. Velut verbi causa, Conti-
 nua quibusdam ab initio floret, & viget maximè, & ad dete-
 rius procedit. Circa iudicationem verò & vnà cum iudicatio-
Continuz ne imminuitur. Quibusdam verò molliter incipit & sub-
febris va- misse, augetur autem & exacerbatur quotidie, Circa iudica-
rietas. tionem verò & vnà cum iudicatione, acruatim elucet. Qui-
 busdam leniter auspiciata augetur & exacerbatur, & vbi ali- **F**
 quandiu in vigore fuit, rursus remittit vsq; ad iudicationem,
 & circa iudicationem. Atque hæc contingere solent in omni
 febre, & in omni morbo. Oportet autem victus rationem ex
 horum consideratione offerre. Multa verò etiam alia signa
 his sunt cognata, de quibus partim scriptum est, partim scri-
 betur. Ad quæ ratiocinari oportet, examinareque ac consi-
 derare, cui horum acutus ac lethalis sit morbus, aut à quo su-
 perstes sit futurus, & cui offerendum sit, aut non, & quando,
 & quantum, & quid offerendum erit. Quæ verò paribus
 diebus exacerbantur, paribus iudicantur. Quorū autem ex-
 acerbationes in imparibus fiunt, ea in imparibus iudicantur.
Decreto- Est autem primus iudicatorius, ex circuitibus diebus pari-
ria paria bus iudicantibus, quartus dies. Deinde sextus, decimus, de-
vel non pa- cimūsq;
ria.

A cimus quartus, decimus octauus, vigesimus, vigesimus quartus, vigesimus octauus, trigesimus, trigesimus quartus, quadragiesimus, sexagesimus, octogesimus, & centesimus vigesimus. Ex circuitibus verò in imparibus diebus iudicantibus, primus est dies tertius: deinde quintus, septimus, nonus, undecimus, decimus septimus, vigesimus primus, vigesimus septimus, & trigesimus primus. At verò nosse expedit, si aliter iudicatio fiat, extra præscriptos dies, recidiuas fore significat, & fuerit sanè perniciofa. Oportet autem animaduertere nosse, in his temporibus iudicationes futuras esse, ad salutem, aut **Iudicationes bonæ** perniciem, aut inclinationes ad melius, aut deterius. Erroneæ **vel contra,** porro febres, & quartanæ, & quintanæ, & septimanæ, & nonanæ, in quibus circuitibus iudicentur considerandum est. **quæ.**

AEGROTI QVATVORDECIM I.

Philiscus prope mauros habitabat, decubuit. Primo die febris acuta, sudauit, noctem laboriosam habuit. Secundo die omnia exacerbata sunt. Vesperis ab infuso per clysterem adhibito bene habuit, noctem quietam. Tertio mane usque ad meridiem, visus est à febre liber esse. Ad vesperam febris acuta cum sudore, siticulosus erat, lingua resiccabatur, nigra minxit, noctem molestantem habuit, non dormiuit, omnino delirauit. Quarto omnia exacerbata sunt, urina nigra, nox tolerabilior, urinae melioris coloris. Quinto circa meridiem parum de naribus stillauit non mixtum. Urinae variae, quæ habebant innatantia quædam rotunda, geniturae similia, dispersa, non subsidebant. Subdita glande, flatuosa pauca prodierunt, noctem habuit laboriosam, somni parui, sermones, deliramenta, extremitates vndique frigidae, & non amplius recalescentes, minxit nigra, dormiuit parum, ad diem voce destitutus est, frigidum sudauit, extremitates liuidæ. Circa **Philisci mors.** meridiem sexta die mortuus est. Huic spiritus ad finem usque velut reuocanti, rarus & magnus. Splen eleuatus est orbiculari gibbositate. Sudores frigidi perpetuò. Exacerbationes diebus paribus.

AEGROTVS II.

Silenus habitabat in Platamone, prope filios Eualcidis. Hunc ex lassitudinibus, & potationibus, ac exercitiis in- **Silenus.** tempestiuis febris corripuit. Cœpit autem agrotare ex lumbis, & cap

Hippocratis Liber I.

Quāta va-
rietat vide
re.

Sileni
mors.

& caput grauitas tenebat, & colli distentio erat. Ab aluo pri-
ma die biliosa, mera, spumosa, abunde colorata, multa pro-
dierunt. Urinae nigrae nigrae subsidentia habentes, siticulosus
lingua resiccata, nocte nihil dormiuit. Secunda die febris a-
cuta, secessus plures, tenuiores, spumosi, Urinae nigrae, nox mo-
lesta, parum delirauit. Tertia omnia exacerbata sunt, praecordij
distentio vtrinque oblonga, ad vmbilicum submollis. Se-
cessus tenues, subnigri. Urinae turbatae, subnigrae. Nocte
nihil dormiuit, sermones multi, risus, cantus, continere se non
potuit. Quarta per eadem. Quinta secessus meri, biliosi, le-
ues pingues. Urinae tenues, pellucidae, parum resipiscebant.
Sexta circa caput parum sudauit, extremitates frigidae, liui-
dae. Lactatio multa, ab aluo nihil prodit. Urinae suppressae
sunt, febris acuta. Septima die voce destitutus est, extremita-
tes non amplius recalescebant, nihil minxit. Octaua sudauit
frigidum per totum sudorem: papulae cum sudore rubrae, ro-
tundae, paruae, velut vari permanebant, non abscedebant. Ab
aluo vero cum parua irritatione, stercora tenuia velut incō-
cocta, multa prodibant cum dolore. Urinam reddebat cum
dolore mordacem. Extremitates parum recalescebant. Somni
tenues, soporosi. Vox intercepta. Urinae tenues, pellucidae.
Nona per eadem. Decima potum non suscipiebat, Soporosus
erat, somni autē tenues. Ab aluo similia. Minxit acervatim
subcrassum, depositum subsidens, subsidentia crassae farinae
similis, alba. Extremitates rursus frigidae. Undecima mor-
tuus est. Ab initio huic & ad finem usque spiritus magnus ra-
rus: praecordij palpitatio assidua. Aetas erat circa annos vi-
ginti.

AEGROTUS III.

Herophon.

Herophonti febris acuta. Ab aluo pauca ab initio velut
in tenesmo. Postea vero tenuia prodibant biliosa, fre-
quentiora. Somni non aderant. Urinae nigrae, tenues. Quinta
mane surditas. Exacerbata sunt omnia. Splen eleuatus est.
praecordij distentio. Ab aluo pauca, nigra prodierunt, delira-
uit. Sexta delirabat, ad noctem sudor, frigiditas, delirus per-
manebat. Septima perfrigerabatur. Siticulosus, delirabat
noctu resipiscebat, obdormiuit. Octaua febricitauit, splen
minuebatur, intelligebat omnia, doluit iuxta inguē, tumor
primum ē directo splenis. Deinde dolebat utraque tibias,
nox

Anox tolerabilis. vrinæ coloris melioris paruum subneque siti-
habebant. Nona sudauit, iudicatus est morbus, int̄ rinæ te-
Quinta reuersus est. Statim autem splen eleuatus est, rubra,
acuta, surditas rursus. post recidiuā tertia die splen miris est,
batur, surditas minor erat: crura dolebāt, noctu sudauit. Ibe-
dicatus est die septimadecima. Neque delirauit in recidiua.

AEGROTVS IIII.

IN Thaso Philini vxorem, quæ filiam pepererat, quū pur-
gatio secundum naturam facta esset, & aliàs leuiter dege-
ret, decimaquarta à partu die febris vehemēs corripuit cum
rigore. Ab initio verò cor dolebat, & circa præcordium dex-
terum: muliebrium partium dolores. purgatio cessauit. Vbi
Bverò glandem subdidisset. hæc quidem leuiora facta sunt.
Capitis autem, colli & lumborum dolores permanebant.
Somni non aderant. Extremitates frigida. Siticulosa erat.
alius combusta: pauca egerebat. Vrinæ tenues, ab initio de-
colores. Sexta die ad noctem multum delirauit, & rursus re-
sipiscebat. Septima siticulosa: secessus biliosi, abundè colora-
ti. Octaua superriguit. febris acuta: cōuulsiones multæ cum
dolore, multum delirabat. Glande subdita exurgebat, mul-
tæque cum fluxione biliosa prodibant. Somni non aderant.
Nona cōuulsiones. Decima parum resipiscebat. Vndecima
dormiuit, omnium recordata est. Statim autem rursus deli-
rauit. Vrinam autem reddebat cum cōuulsionibus, acerua-
tam, multam: illis autem parum admonentibus, crassam al-
Cbam: qualis est ex his quæ subsiderunt, vbi multo tempore
fita, fuerint conturbata: non subsidebat, color & crassitudo
talis, qualis est in vrinis iumentorum. Talia mingebat, quæ
& ego vidi. Circa decimumquartum diem palpitationes
per totum corpus, sermones multi, parum resipiscebat. Ve-
rū statim rursus delirabat. Circa decimumseptimum vo-
ce distituebatur. Vigesima mortua est.

Philini
iunx puer-
pera.
Thasus.

AEGROTVS V.

EPicratis vxorem, quæ decumbibat apud Archegetem,
partui iam propinquam, rigor fortiter corripuit: nō in-
caluit, velut dicebant. Et postridie eadem erant. Tertia die
peperit filiam, & alia omnia iuxta rationem venerunt. Po-
stridie à partu febris acuta eam inuasit, cordis dolor & mu-
liebrium partium. Vbi verò glandem subdidisset, hæc quidē
S leuio

Epicrates.
Archege-
tes.

Quarta va-
rietate vid-
te.

Lateris do-
lor.

Non perit.

Cleanasti-
des.

& caput gressiva sunt. Capitis autem & colli ac lumborum dolor. D
ma die non aderat. Ab aluo modica biliosa, tenuia, pura pro-
dierunt. Urinae tenues, subnigrae. Sexta die a quo febris ipsam
linguam puit, ad noctem deliravit. Septima omnia exacerbata
cuius, vigilas deliravit, siticulosa, secessus omnes biliosi abun-
de colorati. Octava superriguit, plus dormiuit. Nona per ea-
dem. Decima crura laboriose dolebat. Cordis dolor rursus:
capitis grauitas: non deliravit. magis dormiuit: aluus restitit.
Undecima sudauit: minxit melius colorata, multam subsidē-
tiam habentia: leuius degebat. Decimaquarta superriguit.
febris acuta. Decimaquinta vomuit biliosa, flaua, satis mul-
ta. Sudauit sine febre. Ad noctem febris acuta. Urinae crassae
subfidentiam albam habentes. Decimasexta ad noctem exa- E
cerbata est, & cum molestia non dormiuit, deliravit. Decima
octaua siticulosa, lingua combusta est: non dormiuit, multum
deliravit: crura dolebat. Circa vigesimam mane parum ri-
guit, soporosa, quiete dormiuit, vomuit biliosa, pauca, nigra.
Ad noctem surditas. Circa vigesimam primam lateris fini-
stri grauitas, per totum cum dolore, parum insuper tussit.
Urinae crassae, turbatae, subrubrae, quae depositae non subside-
bant, cetera leuiores: non sine febre. Statim ab initio fauces
dolebat, rubor aderat, columella reuulsa, fluxio acris, mor-
dax, salsa, perpetuo perseverabat. Circa vigesima septimam
febris libera, in urinis subfidentia: latus dolebat. Circa prima
& trigesima febris corripiebat, aluus ex biliosis turbata est.
Quadragesima die vomuit pauca biliosa: Iudicata est perfe- F
cte libera a febris die octogesima.

AEGROTUS VI.

Cleanastiden qui supra Heracleum decumbebat, febris
corripuit erroneo modo. Dolebat autem caput ab ini-
tios & latus sinistrum: & aliarum partium dolores aderant,
lassatorum modo: febres exacerbantur aliis aliter inordina-
te. Sudores quandoque, quandoque non. Exacerbationes ut plu-
rimum in iudicatoriis diebus magis accedebant. Circa vige-
simam quartam summas manus dolebat. Vomuit biliosa,
flaua, sitis multa. Paulò post autem aeruginosa. At omnibus
alleuatus est. Circa trigesimam sanguis ex utrisque naribus
erumpere coepit, atque hoc erroneo modo paulatim usque
ad

A ad iudicationem. Non autem fastidiebat cibum, neque siticulosus erat per totum tempus, neque insomnis. Urinae tenues, non decolores. Circa quadragesimā minxit subrubra, subsidentiam multam valde rubram habētia, alleuatus est, post hæc autem urinae variae, quandoque subsidentiam habebant, quandoque non. Sexagesima urinis subsidentia multa, & alba, & levis. Remiserunt omnia, febres intermittebant. Urinae tenues quidem, verū boni coloris. Septuagesima à febre liber permansit diebus decem. Octogesima riguit, febris acuta corripuit, multum sudavit. Urinis subsidentia rubra, levis, perfectè iudicatus est. Non moritur.

B AEGROTUS VII.

Metonem febris vehemens corripuit, lumborum graui- Meton.
tas dolorosa. Postridie ubi aquā bibisset satis multam, ab alio probè prodiit. Tertia capitis grauitas. Secessus tenues, biliosi, subrubri. Quarta omnia exacerbatum sunt. Fluebat à dextra nare bis sanguis modicus. Noctem molestè tulit. Secessus similes tertiæ diei. Urinae subnigræ, habebant quiddam in medio innatans, subnigrum, diuulsum, non subsidebant. Quinta effluxit ex sinistra nare sanguis largus, merus. Sudavit, iudicatus est. Post iudicationem insomnis, delirabat. Urinae tenues, subnigræ. Capitis lotionibus usus est, dormiuit, resipiscebatur. Huic recidiua facta non est. Sed sanguis erupit sæpe etiam post iudicationem.

C AEGROTUS VIII.

Erasinum qui habitabat circa Bootæ torrentem, febris Erasinus.
vehemens corripuit post cœnam, nocte turbatus fuit, Bootes.
diem primam quietē, noctem laboriosè transegit. Secunda omnia exacerbatum sunt, ad noctem delirauit. Tertia dolorosè, multum delirauit. Quarta molestissimè, ad noctem nihil dormiuit. Insomnia & ratiocinationes, deinde peiora, & magna, & periculosa, timor, molestia. Quinta manè resipiscebatur ac intelligebatur omnia. Verū ad meridiem multum insaniit, continere se non potuit. Extremitates frigidæ subliuidæ. Urinae inconcoctæ. Circa solis occalum mortuus est. Huic febres perpetuò cum sudore, præcordia sublimia, distentio cum dolore. Urinae nigræ habentes quædam

Hippocratis Liber I.

dam in medio suspensa innatantia rotunda, non subsidebāt. **D**
Ab aluo stercora prodibant. Sitis perpetuo non valde. Con-
uulsiones multæ cum sudore, circa mortem.

AEGROTVS IX.

**Critonis ca-
sum video**

CRitoni in Thaso erectè obumbulanti, pedis dolor for-
tis à magno digito cœpit. Decubuit eadem die, horri-
dus, anxius, parum subcalescens, nocte desipuit. Secunda die
tumor laxus per totum pedem, & circa malleolum subru-
bens cum distentione. Pustulæ nigræ, febris acuta, insaniit.

**Secundodie
hic mori-
tur.**

Ab aluo verò mera, biliosa, satis multa prodibant. Mortuus
est altera ab initio die.

AEGROTVS X.

**Clazome-
nius.**

CLazomenium qui ad Phrynichidæ puteum decumbe-
bat, febris vehemens corripuit. Dolebat autem caput,
collum, lumbos ab initio. Statim autem surditas. Somni non
aderant. Febris acuta inuasit. Præcordium eleuabatur cum
tumore, distentio non valde, lingua sicca. Quarta ad noctem
desipuit. Quinta laboriosè omnia exacerbata sunt. Circa vn-
decimam parum remiserūt. Ab aluo verò ab initio & vsque
ad decimam quartam, tenuia multa aquei coloris prodibāt.
Toleranter ea quæ ad secessum pertinent, ferebat. Postea
alius resistit. Vrinæ perpetuò tenues quidem, verum boni
coloris, & multa in medio suspensa habebant diuisa, non
subsidebant. Circa decimam sextam minxit paulò crassiora,
habebant subsidentiam parua, paululum alleuarunt, resi-
piscabat magis. Decima septima rursus tenuia. Circa vtrascq; **F**
aures tubercula extiterunt cum dolore. Somni non aderant,
delirabat. Circa crura dolebat. Vigesima à febre liber iudi-
catus est, non sudauit, omnia intelligebat. Circa vigesimam
septimam coxæ dextræ dolor fortis, cito quieuit. Tubercula
verò iuxta aures neque sedata sunt, neque suppurata, verum
dolebant. Circa trigessimam primam profuuiū alui ex mul-
tis aquosis, cum eiusmodi quæ in dysenteria prodire solent.
Vrinas crassas mingebat. Tubercula circa aures sedata sunt.
Circa quadragesimum oculum dextrum dolebat, obscurius
videbat. Restitutus est.

AEGROTVS XI.

**Dromea-
des.**

DRomeadæ vxorem quæ filiam pepererat, & aliis om-
nibus secundum rationem factis, secunda die rigor **corri**

A corripuit, febris acuta. Cœpit autem prima die dolere circa præcordia fastidiosa ac nauseabunda, horrida, anxia, & sequentibus non dormiuit, Spiritus rarus, magnus, statim reuulsus. Altera à rigore die, stercora ab aluo bene prodibant. Vrinæ crassæ, albæ, turbatæ: qualis fit ex his quæ subsiderūt, vbi multo tempore sita, fuerit conturbata: non subsidebant, nocte non dormiuit. Tertia circa meridiem superriguit. Febris acuta. Vrinæ similes, præcordij dolor, fastidiosa ac nauseabunda, nox molesta, nō dormiuit. Sudauit per totum subfrigida. Statim autē rursus recalefacta est. Quarta die circa præcordia parum alleuata est. Capitis grauitas cū dolore, in soporē incidit, parū de naribus stillauit. lingua sicca, siticulosa. Vrinæ tenues, oleosæ. parū dormiuit: Quinta siticulosa. fastidiosa. Vrinæ similes, nihil ab aluo. Circa meridiē multum delirauit, & statim rursus parum resipiscebat, exurgens in soporem incidit, frigiditas parua, nocte dormiuit, delirauit. Sexta mane superriguit. Statim autem recalefacta est. Sudauit per totum. Extremitates frigida, delirauit. Spiritus magnus, rarus. Paulo post conuulsiones à capite cœperunt. Statim mortua est. Moritur hæc.

AEGROTVS XII.

Homo quidam calefactus cœnauit, & bibit amplius. Vomuit omnia noctu, febris acuta. Præcordij dextri dolor. Inflammatio submollis ex interna parte, noctem moleste tulit. Vrinæ ab initio rubræ, crassæ, depositæ non subsidebant. Lingua sicca, non valde siticulosus. Quarta febris acuta Dolores omnium. Quinta minxit leue, oleosum, multum, febris acuta. Sexta vesperi multum delirauit. Nec nocte dormiuit. Septima omnia exacerbata sunt. Vrinæ similes, sermones multi, continere se non potuit. Ab aluo cum irritatione prodierunt liquida turbata, cum lumbricis. Nox laboriosa. Mane riguit, febris acuta. Sudauit calidum. A febre liber esse visus est, non multum dormiuit. A somno frigiditas, sputatio. Vesperī multum delirauit. Paulo post vomuit nigra, pauca, biliosa. Nona frigiditas, multum delirabat, non dormiuit. Decima crura dolebat. Omnia exacerbata sunt delira. Hic perit. Undecima mortuus est.

Hippocratis Liber I.

AEGROTVS

XIII.

D

Mulierem quæ decumbebat in littore, trimestri foetu grauidam febris vehemens corripuit, statimque lumbos dolere coepit. Tertia dolor colli, capitis, iuxta clauiculam, & manum dexteram. Statim lingua voce destituta est, dextra manus resoluta est cum conuulsione, velut his qui aliqua siderantur parte contingere solet. Delirabat penitus: noctem molestè tulit, non dormiuit. alius turbata est, ex biliosis, meris, paucis. Quarta die lingua voce soluta est. Conuulsiones eorundem. dolores omnium permanebat. Iuxta præcordia tumor cum dolore. non dormiebat penitus delirabat, alius turbata. Vrinæ tenues, non boni coloris. Quinta febris acuta. præcordij dolor. planè delirabat. secessus biliosi. E ad nocte sudauit, à febre libera. Sexta resipiscebat. Ab omnibus alleuata est. Verùm circa sinistram clauiculam dolor permanebat. siticulosa. Vrinæ tenues. non dormiuit. Septima tremor. in soporè incidit, parum delirauit. dolores iuxta clauiculam, & sinistrum brachium permanserunt. Reliqua alleuata sunt. Omnia intelligebat. Tres dies à febre libera mansit. Vndecima reuersa est, superriguit, febris vehemens corripuit. Circa decimam quartam vomit biliosa, flaua, satis multa. sudauit. A febre libera iudicata est.

Non mori-
tur hæc.

AEGROTVS

XIIII.

Melidia.
Iunonis tē-
plum.

Melidia, quæ decumbebat iuxta Iunonis templum, capitis & colli, & pectoris dolor fortis coepit. Statim autem febris acuta corripuit. Menses pauci apparebant. Dolores omnium horum cōtinui. Sexta die soporosa, anxia, horrida. rubor in maxilla. parum delirauit. Septima sudauit. febris dimisit. Dolores permanebant. Rediit. somni, pauci. Vrinæ perpetuò boni coloris, verùm tenues. Seccessus tenues, biliosi, mordaces, valde pauci, nigri, graueolentes prodibant. In vrinis subsidentia alba, leuis. Sudauit. Iudicata est perfectè vndecima die.

HIPPOCR.

320 HIPPOCRATIS

COI DE MORBIS PO.

PVLARIBVS LIBER SE-

CVNDVS, IANO CORNA-

RIO MEDICO PHY.

SICO INTER

PRETE.

*

SECTIO PRIM A.

B



ARBVNCVLI in Cranone aestiui, pluebat in ardoribus aqua larga. Contingebat hoc per totum, & maxime ab austro. & subnascebantur quidem in cute sanies. dum autem intro concipiebantur, calescebant, & pruritus inducebant. Deinde pustulae velut ab igne inusta excitabantur, & sub cutem vri sibi videbantur, in ardoribus siccitatis. Febres plerunque citra sudorem. In his verò si minutae imbris guttae deciderint, magis sudatoriae fiunt ab initio. At haec difficiliora iudicatu manent, quam aliter: Attamen minus, si non propter haec fuerint, sed propter morbi modum. Febres ardentes in aestiuis magis fiunt, & in aliis temporibus. Resiccatur autem magis aestate. Autumno maxime ferinum, & oris ventriculi dolor, quanquam & ipse minus maleficus fuerit, ipso morbo tali existente. Ascarides vesperi similiter huic, & illae tunc infestant in die plerunque, non solum ideo quod magis affligunt, sed etiam ipsae per se ipsas. In autumno acutissimi morbi & maxime lethales: & omnino similitudinem habet, eo quod vesperi exacerbantur: tanquam annus ipse habeat circuitum morborum. Quale est dies morbi, quale est vespertinum tempus ad exacerbationem. Tale est morbi, & vniuscuiusque constitutionis inter se, ubi non quid in superiori specie fuerit innouatum. Sin minus, alia sane constitutione haec imperium obtinuerint. Quare etiam annus ad seipsum hoc modo se habet. In quietis ac constantibus temporibus & annis tempestiue tempestiua praebentibus,

Carbunculus.
Cranon.

Ascarides
quando magis vexant

Perinthus. bentibus, boni status & iudicatu facillimi morbi fiunt. In **D**
 Perinthus. inconstantibus verò, inconstantes & qui difficulter iudican-
 tur: quum sanè in Perinthis defecerit aut abundauerit quid,
 ut aut venti sint, aut nō venti: aut aqua, aut siccitates, aut ar-
 dores, aut frigora. Ver autem omnino saluberrimum, ac mi-
 nimè lethale. Circa principia morborum considerandum, an
 statim florent. Clarum autè hoc fit ex incremēto. Incremen-
 ta verò ex circuitibus, & iudicationes quoque hinc manife-
 stæ fiunt, itémque ex acerbationibus in circuitibus, si citius
 accedant, aut nō: & si diutius durent, aut nō: & si magis affi-
 gant, aut non. Ex omnibus autem continuis aut intermit-
 tentibus, & diuturnis, & vulneribus, & sputis, & doloribus.

Itémque tuberculorum inflammationes, & quæcunq; alia **E**
 posterius apparent, fortassis autè & ex aliis communibus re-
 bus, quæ quidem citius fiunt, breuiora sunt. Quæ verò tar-
 dius, longiora: quum etiā in circuitibus citiorem recursum,
 ac reliquum augmentum, morbus neget. Nā & eorum qui
 statim pereunt, velociore sunt iudicationes, quoniam & do-
 lores, & continui ac fortes. Quæ verò ad melius iudicāt, non
 statim apparent. Iudicatoria nō iudicantia, partim lethalia
 sunt, partim difficilis iudicationis. Quæ præiudicata sunt, si
 crude iudicata fuerint, recidiuæ fiunt: Sin minus, iudicatio-
 nis impeditioes aut malæ iudicationes. Possunt etiam fieri
 perniciofa, ea quæ nō parua sunt. Quæcunque iudicatoria si-
 gna fiunt, eadem hæc si non fiunt, difficilis sunt iudicationis.
 Quæ verò contraria significant, malum: non solum si recur- **F**
 rant: sed etiā primariæ naturæ contraria repentia. Quem-
 admodum etiā malorū signum, ea quæ ad contraria repunt.
 Considerare verò sic oportet, in cibis, compressionibus vena-
 rum, tumoribus præcordiorum, sursum vergentibus, deor-
 sum vergentibus. Sed & multa sunt eiusmodi, velut abor-
 tientium mammæ graciles fiunt, neque enim cōtrarium est:
 Neque tussis diuturnæ, quoniā ubi testis intumuit, cessant:
 & testis tumor a tussi cessat & alleuatur: quæ res commone-
 facit nos cōmunionis pectorum, mammarū, genituræ, vocis.
 abscessus aut per venas, aut per ossa, aut nervos, aut cutē, aut
 alias emotiones. Boni autem sunt qui infra morbum fiunt,
 velut varices, lumborū grauitates ex supernis. Optimi ve-
 rò potissimum sunt inferni, & longissimè infra ventrem, &
 remotissimi

Quæ re-
deant.

Tussis fe-
dario: testiu
tumor, &
contrā.

Abscessus
boni.

A remotissimi à morbo : & qui per effluxionē fiunt, velut sanguis è naribus, pus ex aure, sputum, vrina, quæ per effluxionem fiunt. At abscessus quibus hæc non fiunt, sunt velut dentes, oculi, nasus, sudor. Sed & quæ sub cutem abscedūt foras tubercula, velut putrescentia, & quæ suppurantur, aut vlcus, aut eiusmodi pustulæ, aut squamæ, aut defluuium capillorū, vitiliginēs, lepræ, aut eiusmodi quæ abscessus sunt aceruarim fluentes, & non semirepentes, & quæcunque alia dicta sunt. & si non pro rationis excretionis morbi dignitate fiant, velut Temeni nepti, ex morbo forti ad digitū decubuit, qui quum non sufficeret ad suscipiendum morbu, recurrit. Mortua est. Abscessus aut per venas, aut per aluum, aut per nervos, aut per cutem, aut iuxta ossa, aut secundum spinalē medullam, aut secundum alias effluxiones, os, pudendum, aures, nares, ex vtero menses. Iudicationes postridie fiunt, velut ad lumbos, aut ad femur, & ad testes, Quandoque ex tussi, & testis ipse à seipso. Tussiculosi abscessus, qui supra ventrem sunt, non similiter perfectè liberant. Sanguinis eruptiones largæ ex naribus plerunque liberant, velut Heragoræ, quod medici non animaduertunt. Qui voces asperas natura habent, his etiam linguæ subasperæ sunt, & quæcunque asperitates à morbis similiter. Quæ igitur duræ sunt linguæ à natura, etiam sine morbo hoc habent. Molles verò tardiores sunt, & ad peccatum, & ad bonum, quàm prior natura. Consideranda sunt etiam longa capita, ex viuēdi ratione, & ceruices longæ, ab inclinationibus. & venarum amplitudo & crassitudo, ab eadem, & angustia, ac latitudines, & breuitates, ac tenuitates, ex cōtrariis. Quorum venæ amplæ, & ventres, & ossa ampla, hi sunt qui tenues sunt. Pingues verò his contraria habet. & in his qui fame macerantur, mediocritates. Ac his cōsideranda ea sunt quæ præpropera incrementa vnicuique detrahunt, & quæ diminutiones adaugent. & ea quæ incrementa coadungēt, & quæ corroborant. Et quæ sint communes venarum dissectiones. Pectinum ruptiones quæ quidem circa pubē fiunt, vt plurimum statim sunt innoxie. Quæ verò paululum supra vmbilicum in dextera parte, hæc dolorosæ sunt & anxiosæ & stercoris vomitum inducunt, velut etiā Pittaco accidit. Fiunt autē hæc, aut à plaga, aut vultu ra aut alterius insultu. Quibus id quod medium est inter

Temeni neptis.

Heragoras. Linguæ vocisque diuersitas. Caput oblongum & ceruix. Macri. Pingues.

Quæ in his obseruentur.

Pittacus.

S s

abdomen

Quia icter
affectu &
lien creent.

abdomen & cutem inflatur, & non sedatur. Color est velut R
qui multum pallidus est, & qui ex candicante pallet: quoniam
omne huiusmodi ab hepate est, & ex hoc sunt hepatici in his
morbi. & morbi regij ab hepate, ad subalbidum colorem
vergunt. & qui ex aqua inter cutem, & ex pituita alba labo-
rant. Qui vero à splene sunt, tum hydropes, tum morbi re-
gij, nigriores sunt. Sed & vlcera quæ agrè perfunantur ex al-
bidorum sunt, qui ferè lentis colorem referunt: & cutis dif-
fringitur ac labia, velut Antilochus habuit & Aleuas, ab hu-
moribus ex corpore sanguinoso, quod sub cute maximè, & à
capite contingit, quum à pulmone fuerit calefactum. Occa-
siones unde quis agrotare cœpit, & considerare oportet, siue
capitis sit dolor, siue auris, siue lateris. Signum autem sunt E
in quibusdam dentes, & in quibusdam inguinum tumores.

Antilochus.

u. t. y.

Milium
quid tol-
lat.

Vlcera fientia ac iudicantia febres, & tubercula. Quibus
hæc non fiunt, iudicatio sublata est. Quibus intus relinquun-
tur, certissimæ recidiuæ ac celerrimæ. Crudos ac liquidos
secessus, milium solidum in oleo coctum sistit. Exemplo est
nautæ puer, & Myriochaune.

SECTIO SECUNDA.

Cordis do-
loris mede-
la.

Mulier cor, hoc est os ventriculi dolebat, & nihil remit-
tebat dolor. Huic polentæ pollen in mali punici suc-
cum inspersus, & semel in die acceptus in cibo satis fuit, &
non reuomebat, velut Charioni contigit. Mutationes pro-
sunt, si non ad praua mutantur, velut his qui à medicamen- F

Dexippus.
Serapis.

stymargus.

tis vomunt febrium gratia. Fines in meraciore desinen-
tes, putrefactionem significant, velut Dexippo. Serapis ex
liquida alio intumuit. Pruritus autem haud scio quot die-
bus, non ultra. Habebat autem & abscessum quendam in la-
teris mollitudine, qui nigrefactus occidit. Et Stymargi
vixor ex ventris per paucos dies turbatione, ubi multum in-
sistendo laborasset, & post pueri sexus fœminei quadrime-
stris ex corruptione discessum sana facta esset, intumuit.

Moschus.

Moscho è calculo laboranti fortiter, in superna palpebra
ordeolum obortu est magis ad aurem. Deinde intro exulce-
ratum est. Quinta & sexta die ex internis pus erupit. In-
fernas affectiones soluit. Glandularum tumor ac inflam-
matio circa aurem erat, itemque infernè in collo, è directo
superni

A superni tumoris. Aristæi vxoris frater fatigatus in via in- **Aristæus**
 calefcebat. Deinde in tibia tumores fiebant terebinthi fru-
 ctui similes. Postea febris continua fiebat, & postridiè sudor
 factus est, & aliis paribus diebus semper idem fiebat. Adhuc
 autem febris tenebat. Erat autē sublienofus. Ex sinistra na-
 re sanguis erumpebat frequenter & paulatim. Iudicatus est.
 Postridiè iuxta sinistram aurem tumor. Sequenti die etiam
 circa dextram, sed hic minor, & insuper tepefcebat. Hi eua-
 nuerunt, & non suppurati sunt. Qui ab Alcibiade venit, ei ex
 febribus modicis ante iudicationem testis sinister intumuit.
 Habebat autem splenem magnum, & sanè tunc iudicata est
 febris vigesima die. Deinde aliàs atque aliàs subincalesce-
B bat, & subfloridum spuebat. Cuidam manus dextra, & crus
 sinistrum quum ex tussi parū & nihil memorabile eiecisset,
 siderationis modo resoluta sunt: alia verò nulla re alterata
 est, neque facie, neque mente: Nec verò adeò fortiter illis par-
 tibus. Cœpit ad melius procedere circa vigesimam diem.
 Factum autem hoc est illi ferè circa mensium eruptionem, **Apemantus.**
 & fortassis tunc primum apparebant. Erat enim virgo Apoc- **Nicostratus.**
 mantus & pater fabri illius qui caput fregit, & Nicostratus
 non extus fiebant quicquam. Erant autem alibi circa rhenes
 dolores. Interrogationes factæ sunt, dicebant ipsos semper
 repleti potu aut cibo. Dolores fortissimos quo modo di-
 nouerit quis conspicatus, fuga, tolerantia, experientia, &
 timiditates indicant. Aqua quæ cito calefcit, & cito fri- **Aquæ co-**
C gescit, semper leuior est. Cibi & potus experientia opus **gnitio.**
 habent, an ad æqualitatem maneant. Dicendum quòd vbi
 sanguis effluxit, excalefcunt, & quæcunque alia huiusce-
 modi. Abortus masculus sexaginta dierum, in partium
 suppressionibus salubris. Hercules intumescebat mali **Hercules.**
 ipsius die octaua. Magis ex dysenteria laborat, quisquis sa-
 nè etiam è tenesmo vexatur. Quædam lactans pustulas per **Quæ lac**
 corpus vbique habebat. Postquam autem lactare cessauit, se- **præbebat.**
 data sunt per æstatem. Coriarij illius qui coriacea præ- **Coriarij**
 parabat, vxori, quum peperisset & perfectè exoluta esset, vi- **vxor.**
 sum est de secunda membranosum quiddam remanere: dis-
 cessit autem quarta die malè. Nam vrinæ stillicidio ve-
 xabatur. Statim concipiens peperit masculum. Habebat au-
 tem iam multos annos, & postremum neque menses prodi-
 bant.

bant. Quādo autem peperisset, vrinae stillicidium paululum **D** intermittebat. Quādam priusquam conciperet, coxam dolebat. Postquam autem concepit, non amplius dolebat. Vbi verò peperit, vigesima die rursus doluit. Peperit igitur masculum. Prægnanti tibia infernè dextera, tertio aut quarto mense pustulæ, ad quas manna thuris vtimur, itémque in manu dextera iuxta magnum digitum: haud scio an peperit, reliqui enim ipsam semestrem, habitabat autē velut ego puto, in ædibus Archelai ad rupem. Antigenis vxor habitabat iuxta Nicomachum, peperit puerum carnosum quidem, verum qui haberet maximas partes discretas, magnitudine verò esset quatuor digitorum, & sine ousibus, deinde crassus ac rotundus. Hæc autem anhelosa erat ante partum. Deinde **E** simul cum partu pus reuomuit modicum, velut ex furunculo vocato tuberculo. Quæ filias peperit gemellas, & difficulter peperit, & non valde purgata est, tota intumuit. Deinde venter ipsi magnus fiebat. Reliqua verò reprimebantur, & rubicunda prodibant vsque ad sextum mensem. Deinde alba valde per omne iam tempus. Atque hæ fluxiones veneri officiebant, & mera rubicunda ipsi profluebant. In diuturnis intestinorum leuitatibus ructus acidus fiens, antea nunquam factus, signum bonum, velut Demænetæ contigit. Fortassis autem licet etiam arte parare. Nam turbationes eiusmodi alterant. Fortassis autem & ructus acidi intestinorum leuitatem soluunt. Sanata est veratri potione Lycia postremum splen magnus, & dolores & febris, & ad humerum dolores. **F** Et vena quæ in splene est, in cubito secabatur, & saliebat quidem sæpe, Aliquando verò etiam non est secta, sed vnà cum sudore sanguis penetravit, aut sua sponte. Ex quo autē prodibat, Splen dextera parte intendebatur, spiritus intus duplicabatur, non tamen magnus, mente mouebatur, contegebatur, flatus inerat, non prodibat infernè quicquam, neque mingeat. Mortua est ante partum. Quæ circa fauces ad alterutram partē repentiā processerunt, exulcerata nō sunt, ad sinistra transiuerunt, ad splenem dolor venit citra iudicationem. Hieroni iudicatio facta est decimaquinta die. Coi sorori hepar eleuatum est splenico modo. Mortua est secunda die. Bion simul multū mingeat quod non subsidebat, & sanguis ex sinistra nare manabat. Erat enim & splen **sursum**

Archelaus
Antigenis
vxor.
Nicomachus.

Partus gemellarum.

Intestinorum
leuitas.
Demænetas.

Lycia.

Hieron.

Bion.

A sursum in gibbum eleuatus, ac durus, superstes mansit, recidiua. Erant autē anginosorum affectiones hæ. Colli verticula intro vergebāt, quibusdam ampliùs, quibusdam prope. Qualis angina. Et collum forinsecus conspicuam cauitatem intro habebat, & hac parte ad cōtactum dolebat. Erat autem & cuidam infra os dentis appellatum, quod non similiter acutum est: quibusdam verò etiam valde rotundum, maiore circumferētia.

Si non cum dente appellato, fauces non inflammatae, verū iacētes. Partes sub maxilla tumida, nō inflammatis similes. Neque glandulae vlli intumuerunt. Sed magis secundum naturam, linguam non facile vertebant, ipsique & maior esse videbatur, & prominentior, & sub lingua venæ conspicua, deglutire non poterant, aut valde difficulter. Imò ad nares fugiebat, si valde cogerent, & per nares loquebantur. Spiritus autem his nō valde sublimis. Quibusdam verò venæ in temporibus, & in capitibus ac ceruice eleuatae. At recrudescētibz, ex his, parū quiddam tempora calida, etiam si aliās nō febricitarent. Non suffocabantur plurimi, nisi quū deglutire cupiebant, aut saliuam, aut aliud quiddam. Neque oculi intus desidebant. Quibus igitur tumor erat rectus, nec in alteram partem vergebat, hi neque leuiter sideratorum modo resoluebantur. An verò aliquem periisse viderim, in memoriam reuocabo. Quos autem nunc noui, superstes manserunt. Erant autē partim celerrimè alleuantia. Plurima verò ad quadraginta dies deueniebant, & in hoc pleriq; etiam sine febre. Multi verò etiā ad valde longum tempus, partem aliquam tumoris habebant. Et deglutitio, & vox indicabat, & columellæ liquecētes significationem quandam prauam exhibebant, quāuis nullum grauius malum habere videbatur. Qui verò tumores ad alteram partem vergentes habebant, hi vnde verticula inclinata fuerunt, isthic resoluebantur. Atque inde ad alteram partem distrahebantur. Erant autem hæc in facie maximè conspicua, & in ore & intersepto iuxta gurgulionem. Sed & maximè infernè pro ratione immutabantur. Cæterum resolutiones leuiter sideratorū modo, non per totum corpus fiebant veluti ex aliis, sed vsq; ad manum, ab anginosa affectione. Atque hi & matura expuebant, eaque pauca ac difficulter. Quibus autem in rectum tumor tendebat, itidem expuebant. Quibus verò etiam cum febre,

febre, hi multò magis & difficulter spirabant, & aliena lo-
quebantur, & venæ his magis eleuatæ. Et pedes omnibus
quidem frigidissimi erant, maximè autem his. Et hi ad ere-
ctè standum impotentiores erant. Et quidam nō statim mor-
iebantur. Quos autem ego noui, omnes mortui sunt.

SECTIO TERTIA.

Constitutio temporis.

Perinthus.

Etesia.

Quæ fe-
bres vige-
rent.Aspretudi-
nes culicū
morsibus
similes.

IN Perinthum circa solstitium ferè æstiuum venimus, fa-
cta autem est hyems clementi cœlo, austrina. Ver & æstas
valde sine aquis vsque ad pleiadum occasum. Nam si etiam
quid aquæ cecidisset, id erat velut minutæ roris guttæ. Et
Etesia non valde spirarunt. Et qui spirarunt, diuulse id fece-
runt. Aestate febres ardentes populariter grassatæ sunt
multæ. Erant autē sine vomitu, & alui turbatæ ex tenuibus,
aquosis, non biliosis, spumosis, multis, quæ aliquando depōsi-
ta etiam subsidentiam habebant, ex quibus sanè etiam id
quod sub dio noctu exponebatur, simile erat. Aequales specie
alui secessus semper, malum. In his multi soporosi erant, &
mente mori, hi verò ex somnis tales fiebant. Quum autem
suscitati essent, omnia intelligebant. Spiritus sublimes, non
tamen valde. Urinæ tenues quidem plurimis & paucæ, aliàs
autem non decolores. Sanguinis eruptiones è naribus non
fiebant, nisi paucis: neq; parotides iuxta aures, de quibus po-
steà scribam: neq; splenes attollebantur, neq; dextrum præ-
cordium, neque dolorosum valde, neque fortiter intentum
erat. Erat tamen quid quod iudicationem faciebat. Et maxi-
mè iudicabantur omnia plerunque circa decimam quartam
diem, pauca cum sudore, pauca cum rigore, & valde paucis
recidiuæ fiebant. At verò sub minutas velut roris guttas quæ
in æstate fiebant, apparebat sudor. In febricitantibus etiam
quidam sudores statim ab initio fiebant, non tamen mali-
gno modo, & quibusdam sub hoc tempus etiam iudicatio fa-
cta est cum sudore. Fiebant autem in febribus æstiuis, circa
septimam, octauam & nonam diem, aspretudines in cute mi-
liaceæ, culicum morsibus maximè similes, non valde pruri-
ginosæ. Hæ perseverabant vsque ad iudicationē. Nulli equi-
dem masculo tales erupisse vidi. Mulier autem nulla mor-
tua est, cui hæ fiebant. Et graui auditu præditæ & soporosæ
erant.

A erant. Prius autem non valde soporosa erant hæ, quibus illæ affuturæ essent. Non tamen in totum durabant, verum soporosa & somnolentæ erant per æstatem, & usque ad pleiadum occasum. Postea verò magis vigiliæ aderant. Sed neque in totum ab hac constitutione moriebantur. Alium igitur per cibos sistere non dabatur, imò præter rationem putasset quis mederi conducere, etiam si minus multa quibusdam prodiret, per hoc quod in frigore quis iaceret strato supposito. Nam vlcerat quidem frigidum, calefacit autem eiusmodi species sensim progrediendo adhuc magis, etiam si nulla afflictio naturæ accedat: & in quibus, & qualia signa, & plura aut pauciora sentiant, oscitatio, tussis, sternutatio, distictio cum oscitatione, eructatio, flatu: omnia talia corrumpunt. Quibus in febribus anxiosis, horridis, rubescunt facies, lassitudines, oculorum dolores, capitis grauitates, resolutiones leuiter siderantur. Quibus perit. *Quibus perit.*

B torum modo, & menses si apparuerint, maximè quibus primùm, sed & virginibus & mulieribus, quibus per tempus. Sed & quibus non in quo solet tempore, aut velut oportet apparent. Deinde pallidæ fiunt. Magnum autem in omnibus, id quod & consequenter fit, & in quo tempore, & in quibus. Valde biliosis, in febribus maximè, omnino quibusdam ad crura purgatio. Medicamentorum modos scimus, ex quibus quælibet, & quæ fiunt. Non enim omnes similiter, sed alij aliter componuntur. Et alibi citius, aut serius, in manum tractationes assumuntur, velut est aut siccare, aut tundere, aut coquere, & eiusmodi. Omitto plurima, quæ unicuique, & in quibus morbis, & quo tempore morbi, ætatem, speciem, victum, qualis hora anni, & quæ, & qualiter procedat, & huiusmodi. *Quæ obseruanda.*

C eijsmodi. Omitto plurima, quæ unicuique, & in quibus morbis, & quo tempore morbi, ætatem, speciem, victum, qualis hora anni, & quæ, & qualiter procedat, & huiusmodi. *Zoilus.*

lo iuxta murum extulsi matura, febris acuta, & faciei rubor & alius intercepta, præterquam ad necessitatem coactè, lateris sinistri dolor, & auris è directo valde dolorosa, & caput non usque adeò. Spuens semper suppuratum ægrotabat. Sed alia iudicata sunt, & iuxta aurem pus multum erupit, circa octauam aut nonam diem. Principia verò noni diei ex dolore auris. Haud scio quomodo sine rigore iudicatio facta est. Sudauit caput valde. Et hic sudor firmus erat, quod quidem ardor etiam sinistri lateris esset. Supernè vnà cum aure dolor sedatus, maximè circa scapulas. Sed & ante sputa multa, ab initio florida reiecta, & circa septimam aut octauam diem.

Deinde

Deinde laboriosa. Alius restitit vsq; ad nonam & decimam **D**
diem. Dolore extinctus est. Tumor remittebat, & sudores fie-
bant parui, non autem iudicabant. Manifesta autē erant hæc
tum ex aliis, tum ex secessu. Nam incipiente auris dolore,
etiam venter turbatus est. Erupit autem ex aure nona die, &
iudicatus est morbus decimaquarta sine rigore eadem die.

Sed & sputum largius ibat, & maturius, postquā auris eru-
pit. Sudores autem, & serpentina vlcuscula ad multum tem-
pus, in capite fiebant. Resiccata sunt tertia die. Quæcunq;
Febres ma sine signo iudicationis iudicatorio disparent, malè iudicata
la in glan- sunt, velut Erysipelas ancillæ Polemarchi. In glandularum
dularu tu- tumoribus febres, malum, exceptis diariis. Et in febribus
moribus. glandularum tumores, deteriores, qui in acutis ab initio vi- **E**
gorem remiserunt. Spiritus, præcordiis eleuatio mollis, &
intentio neutra, in ipsis supernè rotundum, in dextris velut
circumferentia suppuratoria, aliud longius magis, aliud dif-
fusum, aliud deorsum repens, & hinc atq; hinc distentio vsq;
ad vmbilicum. In omni sursum versus è directo latione, si
reuocetur, & in rotunditatem cōcludatur, quatenus quidem
spiritus fuerit, citra iudicationem calore attenuatur. Si verò
hunc effugerit, ad suppurationem procedit. Spiritus densi,
parui, magni, rari, parui, rari: extra magnus, intra paruus, a-
lius quidem extendens, alius verò vrgens, dupla intro reuo-
catio, velut superinspirantibus, calidus, frigidus. Medela
assiduarum oscitationum spiratio longa. Non potantibus
& vix, spiratio breuis. E directo etiam laterum intentio do- **F**
lorosa, & præcordiorum intentiones, & splenis eleuationes,
è naribus eruptiones. Quæ relinquuntur post iudicationem,
recidivas facere solent. Primum itaque lienis eleuationes,
si non ad articulos finierint, sanguinis è naribus eruptio fit,
aut præcordij dextri intentio, si non penetrauerint vrinæ.
Hæc enim est interceptio vtrorunque, & recidivæ horum
merito fiunt. Abscessus igitur horum facere oportet si non
fiant, eos verò qui fiunt, declinare. Eos autem excipere,
si prodierint iam, & qualia oportet, & qua parte oportet.

Qui verò non valde, eos coadiuuare. Eos verò auertere, si
omnino incommodi fuerint, maximè si hi affuturi sunt: sin-
minus, si iam veniunt. Quarta die fientes sanguinis è nari-
bus eruptiones egrè iudicabant. Febres quæ vna die inter-
mit

A mittentes, altera superrigent, vnà cum iudicatione, ad septimum circuitum durant. Scopo ex mucosis, biliosis, & faucium inflammatione, malo victu vso aluus suppressa est, & febris acuta facta, & lingua florida, & vigil sine somno. Pectinis intentio fortiter, æqualiter, paulatim ad infernam partem in dextris. Spiritus subdensus, præcordia dolebat, & respirans, & quum verteretur. Sine tussi verò exerebat subcrassa. Pepsus ipsi data, à præcordio quidem depulit, transiuit autem nihil. Postridie glandes duæ appolitæ non apparuerunt. Vrina crassa & turbata. Subsidentia leuis & plana: & restitit aluus in turbulentia, ventérque mollior erat. Et splen eleuatus, & deorsum vergēs factus est. Potu utebatur aceto mulso dulci, aut fauorum cremore cocto. Decima sanguis ex sinistra nare aquosus paucus venit; non autē valde infirmus erat ob hoc ipsum: & vrina subsidentiam habens. In subsidentia verò subalbum quiddam adhærens vasi, tenue, neque genituræ simile, neque dissimile. Defluxit hoc breui. Postridie iudicatus est, à febre liber, & subiit subuiscosum vndecima die. Hoc verò circa defluxum erat quid biliosum. Vrinæ verò purgatio multa, tum copia, tum subsidentia, & priusquam vinum bibere inciperet, ferè pituitæ similis. Penetrauit autem vndecima die, vt quæ non esset multa. Viscosa verò erāt stercora & turbata. Huiusmodi autem iudicatorio modo fiebat. Nam & Antigenis in Perintho tale erat. Quæ circa linguas eleuantur collectiones, & humiles calculi, & quæ podagricis fiunt, circa debiles illorum articulos sunt. Nam ossium natura caussa est, vt hæc & indurentur, & distendantur. Collectio Hippostrati vxori ex quartana annua ad fastigium eleuata est, quum subfrigida palam esse videretur, impetus in totum corpus factus est, & sudor: iudicata est hoc modo: & postea menses plures copia & tempore. Tunc enim suppressi fuerant. Abscessus non consistere visus est. In pulsantibus sanguinem fundentibus figura ampla, & in totum si ex omnino decliui accline fiat. Quapropter etiam deligationes in venarum sectionibus impetum faciunt: fortes verò sanguinem impediunt. Sanguineum & subbiliosum, ructum acidum facit. Fortassis autem ad atræ bilis morbum his desinet. Rigores incipiunt mulieribus quidem magis à lumbis, per dorsum ad caput. Sed & viris posteriore corporis parte magis Principiū

T
quàm

Scopus.

Antigenes.

Principiū

quàm anteriore, velut cubitis, femoribus. Sed & cutis rara. **D**
Indicat autem pilus animantium. Quibus nihil intra con-
stitutum tempus accidit, singulis partus vitales fiunt. Ap-
parentia in quibus mensibus fiunt. Labores in circuitibus.
Quicquid in septuaginta mouetur, in triplicitatibus perfici-
tur. Post menses, dextera & sinistra hiant. Humiditas per pro-
deuntia: requirit diætam siccissimam. Quod citius motum
est ac discretum, rursus augetur etiam tardius, & ad longius
tempus. Labores, circa quinquagesimum tertium diem, &
circa centesimum sextum, labores tertio, quinto, septimo, no-
no mense, & secundo ac quarto. Quæ nosse oportet ad septi-
mum mensem, aut à mensium fluxu numerandi sunt nouem
menses, aut à conceptione: & ad septuaginta ac ducetos die-
Græci menses fiunt: & si quid amplius ultra hos est, & aut ma-
sculis, aut etiam fœmellis, hæc fiunt, aut contraria. A cibis &
poribus humeri ac mammae inflantur: & impotentia, & in-
flationes in capite, incrementa faciunt, donec ossa fuerint so-
lida facta. Menstruarum purgationum circuitus est. Quæ
ante has fiunt grauitates, similes sunt laboribus octimestri-
bus. Primipararum lac, alimento quidem transmutationem
accipiente, octimestri verò perficiente. Si in vulneribus for-
tibus, tumor non appareat magnus, malum. Laxi bonum: sur-
sum pascentes, peius Menstruæ purgationes similes octime-
stribus, in tendentibus ad decimum mensem fiætes, malum.
Quibus tumores in vulneribus, non valde conuelluntur, ne-
que insaniunt, His autem derepentè dissipatis, quibus quidē **F**
ad posteriores partes, conuulsiones cum doloribus, quibus
autem ad interiores, aut insania, aut dolores lateris acuti, &
Androni- dysenteria rubra. Tumores præter rationē alleuantes, prau-
cus, uum: velut Andronici filio Erysipelas recurrit: si non ad eun-
dem locum rediens, bonum quid significet. Hoc ex natiuita-
te circa aurem, ad pubem distributum est. Alteri tertia ex
natiuitate die factum, suppuratum est nona. Hic septima die
sanus euasit. Maligniora sunt quæ derepentè disparent.

S E C T I O Q U A R T A.

De venis.

Hepatis ve **H** Hepatitis in lumbis vsque ad magnum verticulum, in-
na, fernè etiam verticulis se ingerit: hinc subleuata per
hepar

A hepar, & per septum transuersum ad cor, & quæ quidem recta est, ad clauiculas: hinc alia quidem ad collum, alia verò ad scapulas, alia deorsum deflecentes, ad verticula & costas declinant. Et ex sinistris quidem, vna propè clauiculas. Ex dextris verò ad quendam ipsarum locū. Alia verò vtrinque deflexa, Alia paulò inferius deflexa, vbi quidem illa deficit, costis se ingerit, donec ad venam ipsum cor accesserit, ad sinistras deflexa. Infra autem decurata ad vertebrae descendit donec perueniat, & inde incipit eleuari ingerens se costis reliquis omnibus, hinc atque hinc singulis ramulos præbens, quum sit vna: à corde quidem ad locū quendā à sinistris magis procedens. Deinde infra arteriam, donec consumpta fuerit, & venerit eo vnde hepatitis subleuata est. Priusquam autem eo venit, circa extremas duas costas diuisa est, & partim ab hac, partim ab illa verticulorū parte progressa consumitur. Quæ verò recta à corde ad clauiculam tendit, supra arteriam est: & ab hac, velut etiam iuxta lūbos infra arteriam, ad hepar infilit, partim in portas & pinnas, partim in reliquum deinceps procedit paulò infra septum transuersum. Septum autem transuersum adhæret hepati, neque facile est ipsum separare. Duplices porrò venæ à clauiculis, alteræ hinc alteræ isthinc, sub pectus ad pectinem procedunt: quo verò hinc, nondum scio. At Septum transuersum infra iuxta verticulum quod est infra costas, quæ rhenes ex arteria, ea parte cōsurgunt: Verum arteriæ ex ipso rhene oriūtur, hinc atque hinc ab arteria neruum habentes. Atque hac parte alibi in recurrente à corde Hepatitis desinit. Cæterum ab **Dux alia hepatitis per septum transuersum maximæ duæ, altera venæ.** hinc, altera isthinc, sublimes feruntur, multifidæque per septum sunt, & circa ipsum consistunt in superna parte, atque hæc magis sunt conspicuæ. **Duo nerui** Duo verò nerui à cerebro sub os magni verticuli, ex supernis & ad gulam magis, ab vtraque arteriæ parte descendunt, & vterque in seipsum incidēs, vni similis, vbi verticula & septum sunt, ibi desinunt. & quidam ambigui, ex hac societate ad hepar & splenē ipsos tendere putauerunt. **Neruus alius.** Alius neruus ab vtraque verticulorum parte iuxta clauiculam ad spinam procedit, ex obliquo verticulorum, & ad costas distribuitur, & quemadmodum venæ, sic hi per septum, ac mesenterium mihi tendere videntur.

T 2

Vbi

Hippocratis Liber I I.

Nervorum
discursus.
Sacrum os

Vbi autem hæ deficiunt, rursus hinc vbi septum exoritur, ab D
eo coherentes ac continui existentes, iuxta mediū infra arte-
riam, deinceps ad verticula distribuuntur, quemadmodum
venæ, donec ad sacrum os progressi consumuntur. In Aeno
ex assiduo leguminū esu, foeminae & masculi, crurum impo-
tentes facti sunt, ac vitam degerunt. Sed & his qui eruo ve-
scuntur, genua dolent. Diligentia adhibenda est vt excande-
scentia inducatur, & coloris reparandi, & sanguinis in vasa
subter cuticulam colligendi gratia: itémq; lacticia, & timor,
& huiusmodi, & si quidē reliquum corpus simul agrotarit,
simul curare: Sin minus, satis est. Stymargi famula Idumæa
erat, quæ vbi filiā peperisset, conuersum est ei vteri osculum,
& dolor ad coxam & crus. Iuxta malleolū secta vena libera- E
ta est, & quidem quum etiā tremores totū corpus detinerēt.
Verūm ad causam deuenire oportet, & ad causæ principium.

SECTIO QUINTA.

Natura indiciorum notio.

Physiognomia.

Varix testem quid possit.

Puerperæ spasmos.
Capitis os dolens fractumve.

Q Vicūque fului, naso acuto, oculis paruis, mali. Quicun-
que fului, limi, oculis magnis, boni. Hydropici
rauos oculos habent, & calui sunt. Vocis gracilitatem soluit
varix, ad sinistrum & dextrum testem, absque horum alte-
ro fieri non potest vt soluatur. Magni, calui, balbi, gracili
voce præditi, boni. Morbos autem habent, balbus, aut cal-
uus, aut gracili voce præditus, aut hirsutus, fortiter atrabi-
liarios. Qui lingua offendunt, & labiorum non sunt poten- F
tes, eos necesse est dum illa soluantur, suppuratos fieri. Do-
lorem in locis infernis fortem, surditas soluit, itémque san-
guis multus ex naribus erumpens. Insania magni morbi ex
more fientis solutio. Si puerperis conuulsio fiat, febrem
excitato: & cerato multo tepido in vesicam immisso, ac per
clysterem infuso colluito. Si capitis os fractum fuerit,
lac, & vinum ammixta aquæ pari mensura, bibenda dato.
Si verò vlcus fuerit, internas venas secato, si non febrici-
tet. Si autem desipiat, caput irrigato, si non præcordia fue-
rint eleuata. Si caput doluerit, ad pectus descendit, deinde
ad præcordia, postea ad coxam, Omnia verò vt doleant fieri
non potest. Ventositatem flatuosam venæ sectione, fluxio-
nem pharmaco illito sistito. Fluxus enim ex vena magna est. Si

gal' & ... ad ...
h' a ...

De Morbis Popularibus.

327

A Si verò sua sponte multum fluat, ieiunet: aut aquæ partes duas, lactis quatuor bibat. Infœcundas fomentis ac medicamentis curato. Quicumque derepente voce destituuntur, si sine febre fuerint, ipsis venam secato. Pituitæ fluxiones ex mammis trahunt oculi, & eructant per nares ad pulmonem. Quibus tussis sicca est, his non soluitur, nisi dolor fortis ad coxas, aut ad crura, aut ad testem irruat. Si hydropicum tussis corripiat, siquidem statim animo linquatur calidis omnibus utatur: Sin minus, inebriato, ac cibis ipsum impleto. Venas autem internas secato, dum morbus magnus in intentione est. Solutio coxarum doloris, oculorum distortionis, cæcitas: testium tumoris mammarum eleuatio. Si febre tenente, partes circa faciem graciles fuerint, in die impari, sequenti die soluetur. Hydropicus si tumorem in cruribus habens tussiat, malum. Si auris doleat, lacte utatur.

Voci reparatio.

Tussis sicca.

B Si non in die impari febris dimittat, recidiuare necesse est. Cui vena in cubito pulsarit, insanus & iracundus est: cui verò quieuerit, stupidus. Vulnus si sanguinem fundat, vlcus ne madefacito, verum caput calida rigato. Si os ventriculi doleat, panem calidum cum vino meraco exhibeto. Vomitus solutio, aquam calidam bibendam dato, & vomat.

legi C.

capit. 4.

Vulnus quando non lauandum.

Vomitio qui paratur.

Quæcunque corrupta torpescunt, euulsa vena vlcerato, ac sanato. In conuulsione digitorum manus citra febre, venam secato, si non caput doleat: Sin minus, aquam calidam affundito. Ad oculos. Spodij partem duodecimam, croci quintam, nuclei oliuæ vnâ, cerusæ vnâ, myrrhæ vnâ. Aquam frigidam super caput fundito, & allia cum maza edenda dato.

Diversæ medelæ.

C Varices caluorum si non magni fuerint, furiosi sunt. Ad vitiliginem & lepram. Calcem in aqua adhibeto, ut ne exulceres. Secundarum purgatio si non discedant. Sternutatorium ad nares apponito, ut sternutet, & sternutantis nares ac os apprehendito.

Varices.

SECTIO SEXTA.

Natura indiciorum notio.

C Aput magnum, oculi parui, balbi, iracundi sunt. Qui longæ vitæ sunt, plures dentes habent. Balbi celeri lingua præditi, atræ bilis humori obnoxij, biliisque sunt, oculis non nictantes, iracundi. Magnum caput, oculi nigri & magni

Diversa per aspectum cognatio.

T 3

Hippocratis Liber I I.

Pueri natu-
ra.

Morbi na-
tura.

Mors quo-
ta.

Medela
anginae, lip-
pitudinis-
que & per-
cussus intesti-
ni.

Mas dex-
tris hæret.

magni, nasum crassum & simum habentes, boni. Oculi rui D
magni, caput magnū, ceruix tenuis, pectora angusta, cōgrue
adaptati hominis sunt. Caput paruum habens, neque bal-
bus esse poterit, neque caluus, nisi fuerit glaucus. In con-
uulsionibus si vox in die impari soluitur, a magno morbo li-
berat. Puerperæ febricitanti & dolenti aquam affundito,
& ptisanam crassam ter in die calidam dato. Puer nutritur
septimo mense, aut nono, aut decimo, & voce firmatur, & ro-
bur sequitur, & manibus validus fit: dū vox soluitur, omnia
soluuntur. Solutio enim similis est voci. Soluitur autē in die
impari. Si venæ pulsauerint in manibus, & facies sana ac ro-
busta fuerit, & præcordia non fuerint mollia, diuturnus fit
morbis, qui sine conuulsione nō soluitur, aut sanguinis mul-
ti ex naribus eruptione, aut dolore ad coxas. In gutturis
dolore, aquam calidam super caput fundito, si non frigus fue-
rit: Sin minus, farinam quā calidissimā dato, & vinum me-
racum. in turbatione ventris, fabas coctas dato, si non super-
næ partes abundē fuerint biliosæ. Aut cuminum cum fabis
edendum dato. At interceptio morbi fieri non poterit, nisi in
die impari. Neque principium fieri poterit, nisi in die pari,
itemque mense ac anno pari. Nitrum autem Aegyptium &
coriandrum, ac cuminum cum oleo terito, & ventri illinito.
Qui moriuntur eos necesse est die impari, & mense impari,
& anno impari mori. Bonum autem fuerit prædicere mor-
tem, aut dolores fortes. Quorum oculi robusti non sunt, his
mors breui imminet. Si verō in impari anno fiat, ab vtriusque
impares fieri necesse est. Si autē in anno pari & die pari, ne-
cessariū est in impari die mori. Ex numero tertia fortissima
est. Anginam & lippitudinē soluit vene sectio. Vulnerato in-
testino, respiratio prodit infernē incōspicua iuxta vulnus, &
euacuatur pectora. Dato igitur lac & vinū, pari aquæ mēsu-
ra ammixa. Quorum pectora bilē generāt balbi, furiosi, &
calui sunt. Quicūq; horū ex natiuitate etiā strabones, hi im-
prudētes sunt, aut calculosi aut insanientes. Quibus autē nō,
alterius mali solutio fit. Circa naturā plurimam vim habet,
māma dextera, oculus dexter & quæ infrā sunt hac parte. Nā
& malculi dextris inhæret. Mulieribus mēses vt sistas, cucur-
bitam maximam ad mammam affigas. Trimestris puer om-
nia præsefert, & lac tunc habet. Si multum fluat lac, necesse
est fore

A est foetus debilem esse. Si solidiores fuerint mammae, sanior est foetus. Vena crassa est in utraque mamma: quapropter maximam habent prudentiae partem. Urinae stillicidium soluit venae sectio. Si superni loci turgent qui sunt circa caput, viceru purgatio, vomitus, hydrops. A ventris turbatione, aut a tussi, si cancer fiat, os amarescit. Dato autem elaterium bibendum bis aut ter, si non balbus fuerit. Deligare verò oportet florem aris vstum, donec fuluus euaserit, & spongiam, si non balbus fuerit. In anxietate, horrore, oscitatione, dato vinum pari aquae mensura ammixta.

B Ad auris dolorem cucurbitam affigito. Quicquid supernarum partium doluerit, dolor ad coxas, aut ad genua, & anhelatio fiens, omnia haec soluit. In voluulo molli, frigidum vinum multum meracum pro ratione dato, donec somnus, aut crurum dolor fiat. Soluit autem & febris, & dysenteria citra dolorem. Si praecordia distenta fuerint, manu comprimito ac lauato. Ad paronychiam vnguium abscessum, galla nigra cum melle. Aqua secedente, lactis heminas octo bibendas dato. Si verò vomat, & non bibat, allij aut ceparum intritum dato. Ut mulier in utero concipiat, polypos paruos super flamma calidissima affatos, & ferè semiambugtos, edendos dato. Et nitrum Aegyptium tritum, coriandrūque ac cuminum, in pastillos efformato, in pudendūque subdito. Si ex crapula caput doleat, vini meraci heminam bibat. Si verò aliter caput doleat, panem

C quàm calidissimum cum vino meraco edat. Si hominem calor corripit, non à bile, neque à pituita, sed aut à lassitudine, aut aliàs febriat, aquam multam calefacito, deinde ea superinfusa caput rigato, donec pedes sudarint: & farinam crassissimā coquito. Postquam autem pedes sudarint, farinam plurimam & calidissimam edens, ac vinum meracum insuper bibens, vestimentis coniectus facile quiescat. Aut narcissi duo aut tria capita in coena edat. Qui infania corripitur, ei hoc signum praesagit, sanguis colligitur ipsi ad

mamas.

Capitis dolor quī discutitur.

Signa furoris.

T 4

HIPP

HIPPOCRATIS^D
 COI DE MORBIS PO-
 PVLARIBVS LIBER TER-
 TIVS, IANO CORNA-
 RIO MEDICO PHY-
 SICO INTER-
 PRETE.

*

SECTIO PRIM A. E
 AEGROTVS I.

Pythion.



Pythion qui habitabat iuxta Telluris tē-
 plum. Ccepit tremor à manibus prima die,
 febris acuta, delirium. Secūda omnia exa-
 cerbata sunt. Tertia eadem. Quarta ab aluo
 pauca, mera, biliola prodierunt. Quinta o-
 mnia exacerbata sunt, tremores perseuera-
 bant, somni tenues, aluus restitit. Sexta sputa varia, subru-
 bra. Septima os distractum est. Octaua omnia exacerbata
 sunt. Tremores perseuerabant. Vrinæ ab initio quidem, &
 vsque ad octauam tenues, decolores, in medio pendens nubi-
 losum quiddam habebant. Decima sudauit. Sputa aliquan-
 tulum matura, iudicatus est. & urinae subtenues circa iudi-
 cationem. Post iudicationem verò, quadraginta diebus
 postea suppuratio circa sedem, & abscessus factus est cū vri-
 næ stillicidio. P. M. V. Q. S. hoc est, probabile multitudine
 urinae quadragesima sanatum.

AEGROTVS II.

Hermocra-
 tes perit.

Hermocraten qui ad Nouum murū decumbebat, febris
 vehemens corripuit. Ccepit autem dolere caput, lum-
 bos. Præcordij distentio molliter. Lingua ab initio adusta
 est. Surditas statim, somni non aderant. Siticulosus nō valde,
 Vrinæ crassæ rubræ, depositæ non subsidebant. Ab aluo ve-
 rò non pauca combusta prodibant. Quinta minxit urinas
 tenues, habebant quid in medio pendens, non subsidebāt. Ad
 noctem mente motus est. Sexta morbo regio correptus est.
 omnia

A omnia exacerbata sunt. non resipiscebant. Septima molesta fuit. Urinae tenues similes, similiter etiam sequentibus diebus. Circa undecimam omnia visa sunt alleuata esse. Sopor coepit. Urinae crassae subrubrae, infra tenues, non subsidebant. Placide resipiscebant. Decimaquarta à febre liber, non sudauit, dormiuit, intelligebat omnia. Urinae consimiles.

Circa decimam septimam rediit, calefactus est, sequentibus diebus febris acuta. Urinae tenues. Rursus autem vigesima die iudicatus est, à febre liber, non sudauit. Cibum fastidiebat per totum tempus. resipiscebant, loqui non poterat, lingua arida. non sitiebat. dormiebat soporosus. Circa vigesimam quartam calefactus est. aluus lubrica multis tenuibus fluens. & sequentibus diebus febris acuta. lingua combusta est. Septima & vigesima mortuus est. Huic surditas perpetuo perseverabat. Urinae crassae & rubrae non subsidentes. Aut tenues decolores, & in medio quid pendens habentes. gustare autem non poterat. P. S. S. V. S. M. hoc est probabile secessibus suppressis vigesima septima mortuum.

A E G R O T V S I I I.

Qui in Dealcis horto decumbebat, capitis grauitatem, Dealcis. & tempus dextrum dolorosum habebat multo tempore.

Cum occasione verò febris corripuit, decubuit. Secunda die ex sinistra nare modicus merus sanguis fluxit. Ab aluo stercora probè prodierunt. Urinae tenues, variae, in medio pendens quiddam habentes minutim dispersum. velut farinae crassiores, & geniturae similes. Tertia febris acuta. Seccessus nigri, tenues, spumosi, subsidentia secessibus liuida. somno grauiore aliquantulum premebatur, moleste surgebat. Urinis subsidentia liuida, subuiscosa. Quarta vomuit biliosa, flaua, pauca, paulo post æruginosa. De sinistra nare modicus merus sanguis fluxit. Seccessus similes. Urinae similes. sudauit circa caput & clauiculam, splen eleuatus est. femoris dolor è directo. Præcordij dextri distentio submollis, nocte non dormiuit. parum mente motus est. Quinta seccessus plures, nigri, spumosi, subsidentia secessibus nigra. nocte non dormiuit, mente motus est. Sexta die seccessus nigri, pingues, viscosi, graueolentes, dormiuit, intelligebat magis. Septima lingua sicca, siticulosus, non dormiuit, mente motus est. Urinae tenues, non boni coloris. Octaua seccessus nigri, pauci,

T s

compacti.

Hippocratis Liber III.

compacti. dormiuit. intelligebat. siticulosus nō valde. Nona **D**
riguit. febris acuta. sudauit. frigiditas. mente motus est. Dextro oculo distortus est. lingua arida, siticulosus, insomnis.

Decima circa eadem. Vndecima intelligebat per totum omnia, à febre liber. sudauit. vrinæ tenues circa iudicationē. Duobus diebus à febre liber fuit, decimaquarta rediit. Statim autem nocte nō dormiuit, penitus mente motus est. Decimaquinta vrina turbata, qualis ex his quæ subsiderunt fit, quum fuerint agitata. febris acuta. penitus mente motus est. non dormiuit. genua & tibiae dolorosa habebat. ab aluo subdita glande, stercora nigra prodierunt. Decimasexta vrinæ tenues, habebant quid in medio vehens nubilosum. mente **E**
motus est. Decimasextima mane extremitates frigida, contegebatur, febris acuta. sudauit per totum. alleuatus est. intelligebat magis. non à febre liber, siticulosus. vomuit biliosa, flaua, pauca. Ab aluo stercora prodierunt paulò post nigra, pauca, tenuia. vrinæ tenues, non boni coloris. Decima-octaua nō resipiscebat. soporosus. Decimanona per eadem.

Vigesima dormiuit, omnia intelligebat. sudauit. à febre liber. non sitiebat. Vigesima prima parum mente motus est. paululum sitiebat. præcordij dolor, & circa vmbilicum palpitatio perpetuò. Vigesima quarta vrinis subsidentia. intelligebat omnia. Vigesima septima coxæ dextræ dolor vrinæ tenues, & subsidentiam habebat. in reliquis commodissime habebat. Circa vigesimanonam oculi dextri dolor. vrinæ **F**
tenues. Quadragesima egegit pituitosa, alba, aliquāto plura, multum sudauit per totum. perfecte iudicatus est.

SECTIO SECUNDA.

ÆGROTVS IIIL.

Philistes ci
rō perit.

IN Thaso Philistes caput multo tempore dolebat. & quandoque etiam aliquāto grauiore somno pressus decubuit. Quum autē ex potationibus febres continuæ obortæ essent, dolor exacerbatus est. nocte excalesfactus est primū. Prima die vomuit biliosa; pauca, flaua primū. postea verò plus æruginosa. Ab aluo autem stercora prodibant. noctem habuit molestam. Secunda die surditas. febris acuta. præcordium dextrum distentum est, declinauit ad internas partes, vrinæ tenues, pellucida, habebant quiddam in medio pendens

A dens genituræ simile. Parum infaniuit circa meridiem. Tertiam diem molestam habuit. Quarta convulsiones. exacerbata sunt omnia. Quinta mane mortuus est.

A E G R O T V S V.

C Herionem qui decumbebat apud Demænetum, ex po- Cherion
non perit.
ru febris corripuit. Statim autē capitis grauitas dolorosa. nō dormiuit. alius turbata ex tenuibus biliosis. Tertia die febris acuta capitis tremor, maximè autē labij inferni. paulo post rigor, convulsiones, penitus mente motus est. Noctem molestè tulit. Quarta per quietē, parum dormiuit. parum delirauit. Quinta laboriose omnia exacerbata sunt. delirium. noctē molestè tulit. nō dormiuit. Sexta per eadem. B septima superriguit. febris acuta. sudauit per totum. iudicatus est. Huic perpetuò ab aluo secessus biliosi, pauci, meri.

Vrinæ tenues boni coloris, in medio nubilosum quiddam pendens habētes. Circa octauam minxit urinas melioris coloris, habentes subsidentia albam, paucam. resipiscebat. febris intermisit. Nona rediit. Circa decimam quartam febris acuta, sudauit. Decima sexta vomuit biliosa, flaua, satis multa. Decima septima superriguit. febris acuta. sudauit à febre liber, iudicatus est. Vrinæ post recidiuam & iudicationē, melioris coloris, subsidentiam habētes. Neque mente motus est in recidiua. Decima octaua parum calefcebat. in super sitiebat. Vrinæ tenues, quod in medio pendeat nubilosum erat. parum mente motus est. Circa decimam nonam à febre liber, collum dolorosum habebat. Vrinis subsidentia. perfectè iudicatus est vigesima. P. M. B. V. V. S. hoc est, probabile multitudinem biliosarum vrinarum vigesima sanatum.

A E G R O T V S V I.

E Vryanactis filiam virginem febris corripuit. Erat autem sine siti perpetuò, nihil ad gustandum admittebat. Ab aluo pauca prodibant. Vrinæ tenues, pauca, non boni coloris. Incipiente autem febre circa sedem dolebat. Sexta die à febre libera, non sudauit. iudicata est. Quod verò circa sedem erat, parum suppuratum est. erupit vna cum iudicatione. Post iudicationem septima die riguit, parum incaluit, sudauit. post iudicationem octaua die, riguit non multū. postea verò extremitates frigidae semper. Circa decimam post factum sudorem, mente mota est. & rursus breui resipiscebat. Euryanax.

Hippocratis Liber III.

Hæc periiit.

ſcebat. Dicebant autem ex guſtato botro ipſam hæc pati. Die D
verò vna intermiſſa, rurfus duodecima multū delirabat, al-
uus turbata eſt ex bilioſis, paucis, meris, tenuibus, mordaci-
bus, frequenter ſurgebat. Die ſeptima ab eā qua mente mota
fuit, mortua eſt. Hæc incipiente morbo fauces dolebat &
perpetuo ruborem habebat, & gurgulio reuulſus, fluxiones
multæ, parux, tenues, acres. Tuſſiebat, maturum nihil edu-
cebat. Omnes cibos per totum tempus faſtidiebat, neque vl-
lum aliquem appetiuit, ſine ſiti erat, neq; quicquam memo-
rabile bibit. Tacēs nihil loquebatur. Triftitia deſperata rur-
ſus corripiebat. Erat autem & innata quædam tabes.

AEGROTVS VII.

Biton.

A Nginofa illa quæ apud Bitonem erat, primum à lingua **E**
cœpit. Vox nō clara, lingua rubra reficcata fuit. Prima
die horrida, incaluit, tertia rigor, febris acuta, tumor ſubru-
ber, durus, colli & pectoris ex vtraq; parte, extremitates fri-
gidæ, liuidæ. Spiritus ſublimis, potus per nares fundebatur.
deglutire non poterat, alui ſeceſſus & vrinx ſuppreſſa erant.
Quarta omnia exacerbata ſunt. Mortua eſt anginoſa. P.S.S.
Q.M. hoc eſt, probabile ſeceſſibus ſuppreſſis quinta mortuā.

AEGROTVS VIII.

**Forū Men-
dadium.**

A Doleſcentem qui decumbebat in Mendacium foro, fe-
bris corripuit, ex laſſitudinibus, & laboribus, ac curſib.
inſolitis. Prima die aluus turbata ex bilioſis, tenuib. multis,
Vrinx tenues ſubnigræ, nō dormiuit, ſiticolofus. Secunda o-
mnia exacerbata ſunt. Seceſſus plures, intēpeſtiuiiores: nō dor **F**
miuit. Mens turbata, parū ſudauit. Tertia moleſte habuit, ſi-
ticuloſus, anxius, multa iactatio, deſperatio, mēte motus eſt.
Extremitates liuidæ ac frigidæ, præcordij intenſio ſub mollis
vtrinque. Quarta nō dormiuit. Malum in peius procedebat.
Septima mortuus eſt. Aetate circa vigefimū annum erat. P.
N.S.M. hoc eſt, probabile nouationibus ſeptima mortuum.

AEGROTVS IX.

Tiſamenus

Q Væ apud Tiſamenum decumbebat mulier, ei voluulo-
fa moleſtè procedebant. vomitus multi, potum conti-
nere non poterat. Dolores circa præcordia. Et in infernis
partibus iuxta ventrem dolores, tormina continua, non ſiti-
culofa, incaleſcebat. Extremitates frigidæ perpetuò, anxia,
inſomnis. Vrinx paucæ, tenues, ſeceſſus crudi, tenues, pauci,
prod

A prodesse non ampliùs quicquàm poterat. Mortua est.

AEGROTUS X.

Mulierem ex his quæ apud Pantimedem degebant, ex abortu infantis, prima die febris corripuit. Lingua arida, siticulosa, anxia, insomnis. Aluus turbata ex tenuibus, multis, crudis. Secunda die superriguit, febris acuta, ab aluo prodire multa, non dormiuit. Tertia die dolores maiores. Quarta mente mota est. Septima mortua est. Aluus semper lubrica, ex secessibus multis, tenuibus, crudis. Vrinæ paucæ, tenues, febris ardens.

Pantimedes abortu perit.

AEGROTUS XI.

B Altera ex abortu circa quintum mensem, febris corripuit. Ab initio soporosa erat, & rursus insomnis, lumborum dolor, capitis grauitas. Secunda aluus turbata est paucis, tenuibus, meracis primùm. Tertia plura, deteriora, nocte non dormiuit. Quarta mente mota est. Timores. Tristitia, dexter oculus distortus est, sudauit circa caput sudorẽ modicum, frigidum, extremitates frigida. Quinta omnia exacerbata sunt, multum delirabat, & rursus breui resipiscebat. Sitis, insomnis. Ab aluo multa, intempestiua, perpetuò prodiebant. Vrinæ paucæ, tenues, subnigræ. Extremitates frigida, subliuida. Sexta per eadem. Septima mortua est phrenitide.

Mortua est delira.

AEGROTUS XII.

C Mulierem quæ decumbebat in Mendaciũ foro, primùm tunc enixam dolorosè masculum, febris corripuit. Statim ab initio siticulosa, anxia, cor dolebat, lingua arida, venter turbatus est tenuibus, paucis, non dormiuit. Secunda die parum riguit, febris acuta, parũ circa caput sudauit frigidũ. Tertia laboriosè ab aluo cruda, tenuia, multa prodierunt. Quarta riguit. Omnia exacerbata sunt. Insomnis. Quintam laboriosè tulit. Sexta per eadem. Ab aluo verò prodierunt liquida, multa. Septima riguit, febris acuta, sitis multa, iactatio. Circa vespere frigidum sudorẽ per totũ sudauit, frigiditas, extremitates frigida, nõ ampliùs recalescebant, & rursus ad noctem riguit. Extremæ partes nõ recalescebant, non dormiuit, parum mente mota est, & rursus breui resipuit. Octaua circa meridiẽ recalesceta est. Siticulosa, soporosa, fastidiosa ac nauseabunda. Vomuit biliosa, pauca, subflaua. Noctem molestè tulit, nõ dormiuit. Vrinam minxit multã acernatam

Primipara perit.

uatam inscia. Nona remiserunt omnia, soporosa. Ad vespérā D parū riguit. Vomuit Pauca, biliosa. Decima rigor, febris exacerbata est, nihil dormiuit. Manē multam vrinam subidentiam habentem minxit, extremitates recalescētē sunt. Vndecima vomuit virosa, biliosa. Non ita longē postea supeririguit, & rursus extremitates frigidā. Ad vespérā sudor, rigor. Vomuit multum, noctem laboriosē transegit. Duodecima vomuit multa, nigra, graueolentia, singultus multus, sitis laboriosa. Decimatertia nigra, graueolentia, multa vomuit. rigor. Circa meridiē voce destituta. Decimaquarta sanguis per nares. Mortua est. Huic perpetuō alius lubrica, horrida. Aetas circa annum decimumseptimum.

S E C T I O T E R T I A.

Constitutio temporis pestilens.

Tempestat-
tis & anni
pestilentis
descriptio.

Qui mor-
bi vigerēt.

ANnus austrinus, pluuius. Venti perpetuō quiescentes, Quū squalores fuissent superioribus tēporibus ad annū, in austrinis circa arcturū aquā multā. Autūnus vmbrosus, nubilus, aquarū copia. Hyems austrina, humida, mollis. Post solstitiū longē postea, propē æquinoctiū serā hyemes. Et iam circa æquinoctiū aquilonares venti niuosi nō multo tēpore. Ver rursus austrinū, sine ventis. Aquę multę perpetuō vsq; ad canem. Aestas serena, calida, estus magni. Etesię parū dispersum spirarūt. Rursus circa arcturum in aquilonaribus aquā multā. Quum autē esset annus austrinus, humidus, & mollis, per hyemē quidem sani degebāt, exceptis tabidis, de quibus scriberetur. Ante ver autē simul cū fientibus frigoribus, sacri ignes multi, quibusdā cum occasione, quibusdā nō, atq; hi maligni multos peremerūt. Multi fauces doluerunt. Voces vitiatę, febres ardentes, phrenitici, ora vlcere feruido affecta, in pudēdis tubercula. Lippitudines. Carbunculi. Alui turbatę. Ciborū fastidia. Aliqui siticulosi, aliqui non. Vrinę turbatę, multę malę. Diu soporosi, & rursus insomnes. Multę iudicationes penitus interceptę. Quēdā agrē fientes, Hydropes, tabidi multi. Atq; hi quidē erāt populares morbi. In singulis autē relatis speciebus ægroti, & moriebātur multi. Acciderūt autē singulis horū hoc modo. Multis equidē ignis facer cum occasione ex vulgarib; & valde paruis vulnusculis; in toto corpore, maximē sexagenarij, circa caput si vel parū neglecta

A glecta essent. Multis verò etiā in ipsa curatione, inflāmatio-
nes magnæ fiebant: & sacer ignis multus, breui, vndique de-
pascebatur. Plurimis igitur ipsorum abscessus ad suppara-
tiones contigerunt: carniū & neruorum ac ossium elapsus
magni. Erat autem & fluxio collecta nō puri similis. Sed alia
quædā putredo, & fluxio multa ac varia. Quibus igitur cir-
ca caput horum quid fieri cōtigat, his glabrics totius capi-
tis ac mēti fiebat: & ossium denudationes ac elapsus: & mul-
ta fluxiones, & hæc in febribus, & sine febribus. Erant autem
hæc horrenda magis quā mala. Quibus enim ad suppuratio-
nem talium maturatio peruenit, horum pleriq; seruabātur.

Similia
hæc sunt
morbo gal-
lico qui
nūc viget.

B lem autē nullum abscessum fecit, horum multi perierūt. Si-
militer autē & si alicubi in alia corporis parte horum quid
oberraret, hæc acciderūt. Multis enim brachiū, & totus cubi-
tus defluxit. Quibusdā verò hæc affligebāt latera, aut ante-
riorem aut posteriorem aliquā partem. Quibusdam autem to-
tum femur, vel tibie denudabantur, & totus pes. Erat autem
ex talibus omnium grauissimum, vbi circa pubem & puden-
da accidisset: & circa vlcera quidem, & cum occasione, huius-
cemodi erāt. Multis autem in febribus, & ante febrem, & ex
febribus ignes sacri inciderūt: & qui quidem horum absces-
sum fecissent per supurationē, aut per aluum turbatio que-
dam tempestiua, aut vrinarū bonarum excretio contigisset,
per hæc soluebantur. Quibus autem nihil horum accidisset,
C verū obscure disparuisset, hi lethales erāt. Plerunq; igitur
plurimis accidit sacer ignis verè, consequebantur autem &
per æstatem, & sub autumnum. Multa verò turbatio quibus-
dam, & circa fauces tubercula, & linguæ inflammationes, &
abscessus circa dentes. Vocēsq; multis significationem de se
præbebant, quod essent vitiata ac impedita & inuoluta, pri-
mū quidem, tabidis incipientibus, imò etiam ardenti fe-
bre correptis & phreniticis. Cœperunt igitur febres ardētes
ante ver, itēmq; phrenitis, post facta frigora: & plurimi tunc
ægrotarunt. Acuta verò & lethalia symptomata his aderāt.

Erat autem constitutio febrium ardentium hoc modo. Ab
initio soporosi, anxij, horridi: febris acuta: nō valde siticulosi:
non deliri. De naribus parū stillauit. Exacerbationes ple-
risq; diebus paribus. Circa exacerbationes obliuio, exolutio,
& voc

Febris ar-
dentis mo-
dus.

Hippocratis Liber III.

& vocis priuatio. Extremitates manuum ac pedum semper **D**
his frigidiores, præsertim circa exacerbationes: & rursus tar-
dè ac non bene recalescebant, rursúmque; & intelligebāt & lo-
quebantur. Detinebat etiam ipsos sopor continuus, non som-
nulosus. Aut vigiliæ cum doloribus: plurimis horū alui tur-
bulentæ, secessibus crudis tenuibus, multis. Vrinæ multæ, te-
nues, nihil neque iudicatorij, neque boni habentes. Nec verò
aliud aliquod iudicarium ita habētibus fiebat. Neq; enim
sanguis bene erumpebat, neq; alius aliquis abscessus iudica-
torius fiebat. Moriebatúrque; vnusquisque; prout contigit erro-
neo modo, plerunq; circa iudicationes. Quidam verò diu vo-
ce priuati. Multi sudantes: & his quidem qui perniciosè ha-
bebant, hæc accidebant. Confimilia verò etiam phreneticis. **E**
Sine siti autem hi erant. Neq; quisquam phreneticus infani-
uit, velut ex aliis, sed alia quadā mala ac lenta in somnū de-
latione grauitè peribant. Erant insuper etiam aliæ febres,
de quibus scribetur. Ora multis vlcerè feruido affecta, vlce-
rosa. Fluxiones circa pudenda multæ, vlcerationes. Tubercu-
la foris, intus, circa inguina. Lippitudines humidæ, longæ,
diuturnæ, cum doloribus. Eruptiones palpebrarum foris, in-
tus, multorū oculos corrumpentes, quas ficus vocant. Erum-
pebant etiam in aliis vlceribus multa, & in pudendis. Car-
bunculi per æstatem multi, & aliæ quæ seps vocatur, pustulæ
magnæ. Herpetes multi magni. At verò circa aluum mul-
tis dolorosè: plurimis autē pueris, & omnibus qui erant ante **F**
pubertatem, & plurimi horum peribant. Lienterici multi,
dysenterici, neq; hi valde dolorosè. Secessus autem biliosi,
& pingues, & tenues, & aquosi. Et multis quidem ipse mor-
bus ad hoc decubuit: & sine febribus, & in febribus; cū dolo-
ribus, tormina, & voluuli maligni, multorū quæ in corpore
erant, & suppressa erāt exitus; & exeuntia progressa dolores
non soluentia, & his quæ offerebantur difficulter cedentia.
Nam purgatione plurimos amplius lædebant. Ex his autem
qui sic habebāt, multi quidem citò peribant. Multi verò lon-
gius vitam degebant: & in summa, omnes & qui longis mor-
bū hos oēs bis ægrotabant, & qui ex acutis, maximè ex his quæ per aluū
secedebant, mortui sunt. Omnes enim aluus sustulit. Cibum
autem fastidiebant omnes, ob cūctos præscriptos morbos, in
quos

Mala va-
ria.

Palpebra-
rum ficus.

vētris ma-
lū hos oēs
necabat.

A quos sanè ego incidi. Multi verò & maximè hi ipsi, & qui tales erāt, sed & alij, perniciosè habebāt: & siticulosi alij erant, alij non. Ex his qui febribus alijsq; laborabant, nullus siticulosus intempestiue. Sed licebat circa potum victus rationem constituere, prout velles. Vrinæ autem prodeuntes multæ quidem erant, nō pro potus ingesti ratione, sed multum excedentes. Verū multa quædam malitia vrinarum eiectionum erat. Neque enim crassitudinem, neque concoctiones, neque purgationes bonas habebant. Nam in multis morbis purgationes per vesicam fientes bonæ sunt. significabant autem plurimis colliquationem, & turbationem, & dolores, & nullam iudicationem. Soporosi verò maximè phrenitici, & febre ardente laborantes erant. Sed & in aliis morbis omnibus maximis, qui cum febre fiebant. In totum autem plurimos aut grauis sopor comitabatur, aut paruos ac tenues somnos habebant. Multa præterea alia febrium genera populariter grassata sunt tertianarum, quartanarum, nocturnarum, continuarum, longarum, erronearum, anxiarum, inconstantium. Omnes autem hæ cum multa turbatione fiebant. Nam alui plurimis turbata: horrores, sudores non iudicatorij: & urinæ velut præscriptum est. Atque hæc plerisque horum longa erant. Neque enim abscessus his fientes iudicabant, velut in aliis. Et omnia quidem omnibus difficulter iudicabantur, & nullæ iudicationes fiebant, & diuturnæ, maximè verò his: paucis autem horum iudicatio circa octogesimum diem fiebat. Plurimis prout contigit defecerunt. Moriebantur autem horum pauci ex hydrope erectè obambulantes. Multos verò etiam in aliis morbis tumores infestabant, maximè verò tabidos. Maxima autem & grauissima erat tabes, & plures occidit. Nam multi per hyemem incipientes, partim decumbabant, partim erectè obambulabāt. Ante ver autem plerique ex decumbentibus moriebantur. Aliorum verò tusses nihil defecerunt. Verū æstate remiserunt. Aut sub autumnum omnes decubuerunt, & multi mortui sunt, plurimi verò horum diu ægotauerunt. Cœpit igitur plurimis horum derepentè ex his afflictio, frequentes horrores erant, sæpe febres continuæ, acutæ: sudores intempestiui, multi, frigidi perpetuò. Multa frigiditas, & vix rursus recalescebant. Alui variè adstrictæ, & rursus breui humescen

Quæ febres vigerent.

Tabes grauissima fuit

Hippocratis Liber I I I.

scientes. Et quæ circa pulmonē erant omnia, infra distribue-
bantur. Multitudo vrinarum non bonarum, colliquationes
malæ. Tussēs autem aderant quidē perpetuò multæ, & mul-
ta educentes matura ac liquida, non autem valde cum dolo-
ribus. Sed etsi aliquantulum dolerent, valde tamen leniter
omnibus purgatio à pulmone fiebat: fauces non valde mor-
daces: neque falsugines quicquam infestabant. Viscosa tamē
& alba, & liquida ac spumosa multa de capite descendebāt.
Magnum autem malum & hos, & alios comitabatur cibo-
rum fastidium, velut præscriptū est. Nam neque potū cum
cibo libenter sumebant, sed valde sine siti degebant. Graui-
tas corporis. Soporosi. Plurimis ipsorum tumor, & ad hydro-
pem deueniebāt. Horridi, deliri circa mortem. Forma tabi-
dorum erat leuis, subalbida, lentis colorem referens subru-
bra, raua. Pituita alba referti. Scapulas alarum modo eminē-
tes habentes: & mulieres sic. Atræ bilis item forma, & sub-
sanguinea, febres ardentes, & phrenitides, ac dysenteria hos
tentabant. Tenesmi iuuenibus pituitosis: longa alui proflu-
uia, acrésque secessus & pingues, biliosis. Erat autem omni-
bus præscriptis grauissimū quidem ver, & multos occidit.
Aestas autem facilima, & paucissimi perierunt. Autūno ve-
rò & sub pleiada rursus multi moriebantur quartanarij.

Quæ tabi-
dis species
hos vexa-
bat.

ÆGROTI SEDECIM. PRIMVS.

Parius. **I**N Thaso Parium quendam, qui decūbebat supra Artemi-
sij ædes, febris corripuit acuta: ab initio continua, ardens,
siticulosa, principio soporosis, & rursus insomnis. Alui tur-
bata in principio. Vrinæ albæ. Sexta die minxit urinā oleo-
sam, mente motus est. Septima exacerbata sunt omnia: nihil
dormiuit. Sed & urinæ similes, & mēs turbata. Ab aluo verò
biliosa, pingua prodierūt. Deinde octaua parū de naribus
stillauit. Vomuit virosa pauca, parū dormiuit. Nona per ea-
dem. Decima omnia remiserunt. Vndecima sudauit, nō per
totum. Circumfriguit quidem, verū breui rursus incaluit.
Duodecima febris acuta. Secessus biliosi, tenues, multi. In v-
rinis quiddam in medio vehabatur: mente motus est. Deci-
ma septima laboriosè transmissa est. Neq; enim somni, neq;
febris augescebat. Vigesima sudauit per totum, insomnis: se-
cessus biliosi, cibum fastidiens, soporosis. Vigesima quarta
recidua facta est. Trigesima quarta à febre liber, alui non
suppressi

A suppressa est. Et rursus inclinavit. Quadragesima à febre liber, aluus nō multo tempore suppressa fuit. Cibū fastidians, parum rursus febricitavit, & semper erroneo modo, partim sine febre, partim non. Nam etsi reliquisset & alleuata esset, rursus reuertebatur. Eduliis quoque multis & vitiosis utebatur. Somni mali circa recidiuas, mēte motus est. Vrinæ crassitudinem quidem habentes tunc mingebat, verū turbatas & prauas. & aluus iam adstricta erat, & rursus soluta, febricula continua: secessus multi, tenues. Centesima vigesima die mortuus est. Huic aluus assidue à prima die lubrica erat, ex biliosis, liquidis, multis. Aut adstricta ex feruidis ac crudis. Vrinæ verò perpetuò malæ. Sopores plerunque cum doloribus, insomnis, cibum fastidians, febris ardens continenter.

A E G R O T V S I I.

IN Thaso decubentem apud frigidā, à partu ubi filiam peperisset, & purgatio facta non esset, febris acuta horrida, tertia die corripuit. Multo autem tempore ante partū febriculosa erat, decumbēs, cibum fastidians. Postquam autem riguisset, febres cōtinuæ, acutæ, horridæ. Octaua multū mente mora est, & sequētibz diebus, & breui rursus resipiscebatur. Aluus turbata, ex multis tenuibus, aquosis, bile permixtis: sine siti erāt. Vndecima resipiscebatur, verū soporosa erat. Vrinæ multæ, tenues, & nigræ, insomnis. Vigesima parū circumfrigit, & breui rursus incaluit, parū deliravit, insomnis. Alui secessus iisdē. Vrinæ aquosæ, multæ. Vigesima septima à febre libera, aluus adstricta est. Non multo tēpore postea coxæ dextræ dolor fortis multo tēpore. Febres rursus comitabantur, & urinae aquosæ. Quadragesima dolores circa coxam alleuati sunt. Tussis autem assiduæ, humidæ, multæ: aluus substitit. Cibum fastidians. Vrinæ in iisdem. febres autem in totum quidem non deficientes, erroneo verò modo exacerbescerent, partim ita, partim nō ita. Sexagesima tussis quidem obscure defecerunt. Neque enim aliqua sputorum cōcoctio fiebat, neque alius consuetus abscessus. Maxilla verò ex dextris diuulsa est: soporosa, rursus delirabat, & breui resipiscebatur. Cæterum à cibis auersum animum habebat, & maxilla quidem ad locum suum rediit. Aluus autem biliosa, pauca egeffit. febricitavit acutius, horrida, & sequētibz diebus voce destituta est, & rursus resipiscebatur ac loquebatur. Octogesima

Hippocratis Liber I I I.

suma mortua est. Vrinæ huic perpetuò erāt nigræ, & tenues, & aquosæ, & sopor comitabatur. Cibum auersans. Tristis insomnis: iræ, molestiæ. Mens melancholica.

A E G R O T V S I I I.

Pythion
Herculis
templum.

IN Thaso Pythionem qui supra Herculeum templum decumbebat ex laboribus, & lassitudinibus, & neglecta victus ratione, rigor magnus, & febris acuta corripuit, lingua arida, siticulosus, biliosus, non dormiuit. Vrinæ subnigræ, quod in medio ipsarum pendebat, sublime erat. Secunda die circa meridiem frigiditas extremarum partium, & magis circa manus & caput, loquela & voce destitutus. Breuispirus ad multum tempus, rursus incaluit. Sitis. Nox quieta. Sudauit parum circa caput. Tertia dies quieta. Vesperī verò sub solis occasus parum frigit. Turbatio nocte dolorosè, nihil dormiuit. Ab aluo pauca cōpacta stercora prodierunt. Quarta manè quietus, Circa vesperā omnia exacerbatā sunt, frigiditas, loquela, & voce destitutus, in deterius recalefactus est post tempus. Vrinæ minxit nigras in medio quid pendens habentes. Noctē quietē dormiuit. Quinta visus est alleuatus esse. Verū iuxta aluum grauitas cum dolore: siticulosus. Noctē laboriosè tulit. Sexta manè quietus. Vesperī dolores maiores, exacerbatus est. Vesperī clystere adhibito, ab aluo probè egeffit. Noctē dormiuit. Septima die anxius, submoles tē ferebat. Vrinam minxit oleosam, noctu turbatio multa, delirabat, nihil dormiebat. Octaua manè parum dormiuit. Mox autem frigiditas. Vocis interceptio. Spiritus tenuis imminutus. Vesperī rursus excalefactus est, mēte motus est. Iam autem ad diem parum alleuatus est. Secessus meri, pauci, biliosi. Nona soporosus, anxius, quum excitaretur, non valde siticulosus. Circa solis occasus moles tē ferebat, delirabat, noctem malā habuit. Decima manè voce destitutus, frigiditas multa, febris acuta. Sudor multus: mortuus est, dolores huic in diebus paribus.

A E G R O T V S I I I I.

Phreniticus
mori-
tur.

PHreniticus prima die decubēs vomuit æruginosa, multa tenuia, febris horrida, sudor multus, continuus per totum. Capitis & colli grauitas cum dolore. Vrinæ tenues, in medio ipsarū pendentia, parua, diuulsa: nō sudauit. Ab aluo stercora acervatim egeffit, multū mēte motus est, nihil dormiuit

De Morbis Popularibus.

335

A miuit. Secunda mane voce destitutus, febris acuta, sudauit: non intermisit. Palpitationes per totū corpus. Nocte conuulsionēs. Tertia exacerbata sunt omnia. Quarta mortuus est.

A E G R O T V S V.

IN Larissa caluus, femur dextrum doluit derepente. ex his Caluus ci-
quæ offerebantur nihil proderat. Prima die febris acuta, to moritur.
ardens, quietè tenebat. dolores autem cōsequebantur. Secun- Larissa.
da femoris quidem remiserunt dolores. febris autem acuta
est. submolestè ferebat. nō dormiebat. extremitates frigida.
Vrinarum non bonarum copia prodibat. Tertia femoris do-
lor quieuit. Mentis emotio, & turbatio, & multa iactatio.
Quarta circa meridiē mortuus est celerrimè & acutissimè.

A E G R O T V S V I.

B **I**N Abderis Periclem morbus corripuit acutus, continuus, pericles.
cum dolore. Sitis multa anxietas. potum cōtinere non po- Abdera.
terat. Erat autem sublienofus, & capite grauatus. primo die
sanguis è sinistra nare erupit, multa tamē febris augescebat.
Vrinam minxit multā, turbatam, albam, deposita nō subsi-
debat. Secunda omnia exacerbata sunt. vrinae tamen crassae
quidem erant, verū magis subsidebant. & anxietas leuata
est. dormiuit. Tertia febris emollita est. Vrinarū copia: quæ
concoctæ multā subsidentiam habebant. Nox quieta. Quar-
ta circa meridiem, multū calidum sudorem per totum ex-
cluit. A febre liber iudicatus est. non rediit. morbus acutus.

A E G R O T V S V I I.

C **I**N Abderis virginem quæ decumbebat in sacra via, febris Virgo Ab-
ardens corripuit. Erat autem siticulosa & insomnis. Men- deritana.
ses autem primū ipsi descendebant. Sexta anxietas multa.
rubor. horrida. mœsta. Septima per eadē. Vrinae tenues qui-
dem, verū boni coloris. venter non vexabat. Octaua surdi-
tas, febris acuta. insomnis. anxia. horrida. intelligebat. Vri-
nae similes. Nona per eadem, itémque sequentibus sic surdi-
tas perseuerabat. decimaquarta mēs turbata. febris remisit.
Decima septima sanguis per nares fluxit multus. Surditas
parum remisit. & sequētibus anxietas. surditas aderat. & de-
lira erat. Vigesima pedum dolor. surditas, delirium inter-
misit. sanguis, paucus per nares erupit. sudauit. à febre libe-
ra. Vigesima quarta febris rediit. surditas rursus. pedum do-
lor permanfit. mētis emotio. Vigesima septima sudauit mul-
tum

V 3

Hippocratis Liber I I I.

tum à febre libera. Surditas defecit, pedum dolor restabat. De cætero perfectè iudicata est.

AEGROTUS VIII.

Anaxion.
Thraciæ
portæ.

IN Abderis Anaxionem, qui decumbebat ad Thracias portas, febris acuta corripuit, lateris dexteri dolor assiduus. Siccam tussim habebat, neque expuebat primis diebus. Siticulosus. Insomnis. Urinæ boni coloris, multæ, tenues. Sexta delirus. Ad calefactoria nihil remisit. Septima dolorose agebat. Nam & febris augescebat, & dolores non remittebant, & tussēs vexabant, difficultérque spirabat. Octaua cubitum secui, effluebat sanguis multus. velut debebat. Remiserunt quidem dolores, tussēs tamen siccæ comitabantur. Undecima remiserunt febres, parum circa caput sudauit. Tussēs adhuc, & quæ à pulmone prodibant, liquidiora erant. Decima-septima incœpit pauca matura spuere, alleuatus est. Vigesima sudauit, à febre liber post iudicationem, alleuatus est. Erat autem siticulosus, & à pulmone prodeuntium purgationes non bonæ. Vigesima-septima febris rediit. Tussiit, eduxit matura multa. Urinis subsidentia multa, alba. Sine siti erat, bene spirans. Trigesima-quarta sudauit per totum, à febre liber, penitus iudicatus est.

AEGROTUS IX.

Heropy-
thus.

IN Abderis Heropythus erectè obambulās caput dolebat. Non multo autem tēpore postea decubuit, habitabat prope superiorem viam, febris ipsum corripuit ardēs, acuta. Vomitus ab initio multorum biliosorū, siticulosus, multa molestia. Urinæ tenues, nigrae, id quod in medio ipsarum pendebat, sublimè erat aliquando, quādoque non, noctem dolorose transegit. Febris aliàs aliter exacerbescebat, plerūque inordinatè. Circa decimam-quartam surditas, febres augescebant. Urinæ per eadem. Vigesima multum mente motus est. itémq; sequētibus. Quadragesima multus sanguis ex naribus erupit, & magis intelligebat. Surditas aderat quidē, sed minor, febres remiserunt. Sequentibus diebus sanguis erūpebat frequenter & paulatim. Circa sexagesimā sanguinis eruptiones cessarunt. Coxæ autem dextræ dolor fortis, & febres augescebāt. Non longo tempore postea dolores omniū infernarum partium. Contigitque aut febres esse maiores, & surditatē multā: aut hæc quidē remittere & leuiora fieri, infernarum

A fernarum autem partium circa coxas, dolores esse maiores. Iam verò circa octogesimam omnia remiserunt. Nihil tamen defecit. Urinæ enim boni coloris, & plures subsidentias habentes prodibant, & deliria minora erant. Circa centesimam alius multis biliosis turbata est, & tempore non modico multa talia prodibāt, & rursus dysenterica cum dolore. Reliquorum verò quies erat. In summa, & febres defecerūt, & surditas cessauit. In centesima vigesima perfectè iudicatus est. febris ardens.

A E G R O T V S X.

IN Abderis Nicodemum ex venere & potu, febris corripuit. Initio autem erat anxius, & cordis dolore vexabatur. siticulosus. lingua combusta fuit. Urinæ tenues, nigrae. Secunda febris exacerbata est. horridus. anxius. non dormiuit. Vomuit biliosa, flaua. Urinæ similes. Nox quieta. dormiuit. Tertia die remiserunt omnia & quies erat. circa solis occasus rursus molestè ferebat. noctem laboriosè tulit. Quarta rigor. febris multa. dolores omniū. Urinæ tenues, & quid in medio ipsarum pendens. Sexta mente multum motus est. Septima quies. Octaua alia remiserunt omnia. Decima & sequentibus diebus aderant quidem dolores, verum omnes minores. Exacerbationes autem & dolores huic ad finē vsq; in diebus paribus magis erant. Vigesima minxit urinam albam, quæ crassitudinem habebat, & deposita non subsidebat. Sudauit multum. visus est sibi à febre liber esse. Vespero verò rursus incaluit. & dolores iidem. horror sitis. parum mente motus est. Vigesima quarta multam urinam albam, multam subsidentiam habentem minxit. Sudorem multum calidum per totum exudauit. à febre liber. iudicatus est.

A E G R O T V S X I.

IN Thaso mulier morosa, ex mœrore cum occasione, ereptæ obambulās. insomnis facta est, & cibi fastidians. & erat siticulosa, & anxia. habitabat autem prope Pyladæ ades in Leio. Prima die sub initium noctis timores, sermones multi, tristitia febricula tenuis. Mane cōuulsiones multæ. Quum autem intermisissent cōuulsiones illæ multæ, delirabat. turpia loquebatur. Dolores multi, magni, continui. Secunda per eadem. nihil dormiebat. febris acutior. Tertia cōuulsiones defecerunt. Sopor autem & in somnum grauiorem

delatio aderat, & rursus vigiliæ. exiliit. continere se non potuit. multum delirauit. febris acuta. Ad hanc noctem multum sudorem calidum per totum corpus exclusit. à febre libera. dormiuit. Penitus resipuit. iudicata est. Circa tertiam autem diem vrinæ nigræ, tenues. quod in medio ipsarum pendebat aliquandiu rotundum, non subsidebat. Circa iudicationem menses multi prodierunt.

AEGROTVS XII.

Virgo Larissa.

IN Larissa virginem febris corripuit ardens, acuta. in somnis. siticulosa. lingua fuliginosa, arida. Vrinæ boni quidem coloris, sed tenues. Secunda die laboriosè degebat. non dormiuit. Tertia ab aluo multa prodierunt aquosa cum virore pallida. itidémque sequētibus diebus prodierunt eiusmodi tolerabiliter. Quarta vrinā egeffit tenuem, paucam: habebat in medio pendens illud sublime, non subsidebat. mente mota est ad noctem. Sexta per nares sanguis multus largè fluxit. quūque inhorruisset, sudorem multū calidum per totum effudit. à febre libera. iudicata est. In febribus autem, & iam iudicatæ, menses tunc primū prodierunt. Erat enim virgo. Perpetuò verò anxia erat. horrida. faciei rubor. oculorum dolor, capitis grauitas. Huic non rediit, sed iudicata est. Dolores diebus paribus.

AEGROTVS XIII.

Apollonius Abderitanus.

Cur hic adeo laborauit.

APollonius in Abderis erectè titubans obambulabat multo tempore. Erat autē magnis visceribus præditus. & circa hepar dolor multo tempore familiaris ipsum comitabatur. & sanè tunc etiam morbo regio tenebatur. flatuosus. coloris subalbi. Quum autē edisset ac bibisset intempestiuus carnem bubulam, incaluit parum primum. decubuit. Lacte verò vsus cocto & crudo. multo, caprino ac ouillo, & victu malo, omnium læsiones magnæ sequutæ sunt.

Nam & febres exacerbatae sunt, & aluus nihil memorabile de ingestis egeffit. Vrinæ tenues & paucae prodibāt. Somni non aderant. inflatio mala. sitis multa. soporosa. præcordij dextri eleuatio cū dolore. extremitates vndique subfrigida. parum delirabat. Obliuio omnium quæ loquebatur. mente mouebatur. Circa decimā quartā ex qua quum riguisset incaluit, decubuit, & insaniit. clamor. turbatio. sermones multi. & rursus quies. & tūc sopor accessit, postea verò aluus turbata,

A bata, multis, biliosis, meris, crudis. Vrinae nigrae, paucae, tenues. Multa molestia. Secessus variè habebant. Aut enim nigri, & pauci, ac æruginosi erant: aut pingues, crudi, & mordaces. Per tempora verò videbatur etiã lactosa egerere. Circa vigesimam quartã lenitas erat. & reliqua quidem in iisdem perseverabant, parum autem resipiscebat: ex quo verò decubuit, nullius meminit: Rursus autẽ breui desipiebat. Omnia in peius procedebant. Circa trigesimã febris acuta. Secessus multi, tenues. delirus. extremitates frigida. voce destitutus.

Trigesima quarta mortuus est. Huic perpetuò ex quo ego noui, alius turbata. Vrinae tenues, nigrae. soporosus. insomnis. extremitates frigida. delirus perpetuò. phreniticus.

B A E G R O T V S X I I I I.

I N Cyzico mulierem, quæ gemellas filias magna difficultate peperit, & non valde purgata est, primum inuasit febris horrida, acuta. Capitis & colli grauitas cum dolore. Insomnis ab initio, taciturna ac tetrica, & non obsecundans, Vrinae tenues & decolores. siticulosa. anxia plerunque. alius erroneo modo turbata. & rursus adstricta. Sexta ad noctem multum delirabat. nihil dormiuit. Circa vndecimam insanit. & rursus resipuit. vrinae nigrae tenues. Et rursus tempore interposito oleosa. Et alius multis tenuibus turbata. Decima quarta cõuulsiones multae. extremæ partes frigida. nihil amplius intelligebat. vrinae suppressae sunt. Decima sexta voce destituta est. Decima septima mortua est. phrenitis.

Puerpera
Cyzicena
gemellas
peperit, &
mortua est.

C A E G R O T V S X V.

I N Thaso Dealcis vxorem, quæ decumbebat in Leio, febris horrida, acuta, ex mœrore corripuit. Ab initio contegebatur, & ad finem perpetuò, semper tacita manibus palpat, vellebat, scalpebat, pilos legebat. Lachrymae, & rursus risus. non dormiebat. ab alio irrationes. nihil prodibat, parum commonita bibebat. vrinae paucae, tenues. Febres ad manum tenues. extremarũ partium frigiditas. Nona multum delirabat. Et rursus sedata est. tacita. Decima quarta spiritus rarus, magnus, per tempus. Et rursus breuispira. Decima septima ab alio irritatio turbulenta. postea verò ipsi potus percurrerant, neque cõsistebant. omnino nihil sentiebat. Cutis arida circumtensio. Vigesima sermones multi, & rursus sedata est. voce destituta. breuispira. Vigesima prima mortua.

Dealcis
vxo Thas-
sia.

Hippocratis Liber III.

mortua. Huic perpetuò ad finem vsque erat spiritus rarus D magnus. Omnino nihil sentiebat. semper contegebatur. Aut sermones multi, aut tacita perpetuò. phrenitis.

AEGROTVS

XVI.

Adolescens
in Meli-
bœa.

ADolescens in Melibœa, ex potationibus & venere multo tempore calefactus decubuit. Horridus autem & anxius erat. insomnis. & non siticulosus. Ab aluo prima die stercora multa prodibant, cum multa defluxione. & sequentibus multa aquosa cum virore pallida prodibant. Vrinæ tenues, paucae, decolores. Spiritus rarus, magnus, per tēpus. Præcordij intentio submollis, oblonga ex vtrisque. Cordis E palpitatio perpetuò continua. Vrinam minxit oleosam. decima sensim mēte motus est. moderatūque erat ac quietus. Cutis arida & circundistenta. Secessus multi & tenues, aut biliosi & pingues. Decimaquarta omnia exacerbata sunt. mentē motus est. multum delirauit. Vigesima insaniit. iactatio. nihil mingeat. paucos potus continebat. Vigesimaquarta mortuus est. phrenitis. Videtur porrò mihi æstas illa quæ tunc fuit. iuxta rationem commoditatem attulisse. Nā æstiuos morbos hyems succedens soluit. Et hyemales æstas succedens transmutat. Quanquam ipsa in seipsa quæ tunc erat æstas, nō stabilis erat. sed derepente calida, & austrina, & sine ventis. Attamē ad aliam tempestatem transmutata profuit. Magnam verò artis partem esse arbitror, etiam de his quæ F.

Quæ & in
anni tem-
poribus &
in morbis
obseruan-
tur.

scripta sunt recte, posse considerationem facere, ac iudicare. Qui enim hoc nouit, & his utitur, non videtur mihi in arte multum falli posse. Oportet autem exactè perdiscere vnamquamque temporum constitutionem, & ipsum morbum. Et quid boni cōmunis sit in constitutione, aut in morbo. & quid mali cōmunis sit in statu, aut morbo. & qui morbus longus sit & lethalis. & qui longus. & non perniciosus ad vitam. & qui acutus, ac lethalis. & qui acutus, & superesse sinens. Ex his enim ordinem dierum iudicatoriorum considerandi, ac prædicendi facultas datur. Et harum rerum gnaros scire contingit, quibus & quando, & quomodo victum præscribere oportet.

HIPP

A H I P P O C R A T I S

338

COI DE MORBIS PO-
PVLARIBVS LIBER QVAR-
T V S. I A N O C O R N A-
R I O M E D I C O P H Y-

S I C O I N T E R-
P R E T E.



B

Ost æquinoctium & post pleiada qualia
sunt erodētia & mucosa, quæ caput aperue-
runt, suprà aurem prodierunt. Ei qui apud
Leocydis ædes habitabat, in pede. Phano-
dico digiti in pede, in pectore. Qui tibiam
sectus est, hac parte etiam nigrefactus est.

Erat vlcus magnum in externa tibiæ parte, & retro prodi-
bat. Quum purū factū esset, lateris dolor & pectoris sinistri ē
directo, & febres. Mortuus est à febre. Biliosum restiario
abundē coloratū. Et vstoria adhibenti circa æquinoctiū, san-
guis multus deorsum prodiit. Seni valde vehemēter abscef-
sit, non vltra quatuordecim dies. Vulnerato ab Antiphilo,
vsto iudicatio facta est die septima, bilioso, stupido. Tertia
post iudicationē sanguinem sput, superstes manebat, & re-
cidiua facta est postea. Iudicatus est velut par erat, circa ple-
iadum occasum primū. Post pleiadū autē occasum, bilio-
sus ad insaniā vsque iudicatio facta est, superuixit, circa nonā
diem, absq; sudore. Circa æquinoctiū Chalcidonium à portis
delatus ad forum, ex ruptione circa mammā dextrā dolens,
spuebat aliās atq; aliās pallens subuiride. Venter egerebat.

Sudor auspicatus septima, tenuit plerunq; vsq; ad octauā.
iudicatus est decimaquarta. Circa quadragesimā tubercula
exorta ipsi circa vtrasque aures, haud immeritō putabatur
suppuratus fore, nō factū est. Pectus Aristodemo vstum est.

Philidis filio quum abscessus factus esset ex casu, & ipsi pe-
ctus vstum est. Erat autē dolor quidā etiā antea. post æquino-
ctium autūnale recidiuæ, & aliās vsq; ad solstitiū hyemale.
& cū sole æstiuo. Acheloi vxor sexta die abortiuit. quū esset
sanguinea,

Antiphilus.

Chalcido-
nius.

Aristode-
mus.

Philidis fi-
lius.

Achelous.

Hippocratis Liber IIII.

Morbus regius.

Diuersi morborum affectus.

Spongiæ.

Virginis morbus.

Meandri vxor.

Thestoris famula.

sanguinea, & horrida, & sudores. Iudicatio facta est decima-
 quarta, quot mēsum fuerit fœtus, haud scio. Masculum autē
 etiā alium ad dies viginti se abortiuisse dixit, an vera dixe-
 rit non scio. Circa solstitium hybernum aquilonares venti
 erant. Morbo regio corripiebatur abunde colorati, & par-
 tim horridi, partim nō. Linguae combustæ tertia die. Et tur-
 bationes circa sextam & septimam, atque hæ diu durantes.
 Decimaquarta ventres resistentes, & in medicationibus non
 obedientes. Pro ratione febrium etiam nulli sudores. Sple-
 nes quibusdam parui ad præcordia dextra extenti, & ad ma-
 nū submurmurantes. Sanguinis fluxiones, & vrinis purgatio
 ac iudicatio. Multo autem magis infrā nitebantur. Nam &
 hoc sub illud tempus corripiebat. Quibus nō sicerat, splenes
 verò etiam eleuati, his sanguis ex sinistra nare. Solstitium
 præterierat, hyberna hyberno modo in Aquilonaribus, pau-
 lo verò post austrina erant, ad quindecim dies. Postea verò
 niues quatuordecim diebus. Circa hanc anni constitutionē,
 morbi regij abunde colorati vigeabant, qui non sincerè iudi-
 cabantur, recidiuabant. Post niues, austrina succedebant, &
 pluuiæ, grauedines eruperunt, & cum febribus, & sine febr-
 bus. Cuidam verò etiam, ad dentes, qui antea ex medio do-
 luerat: ad dextra, supercilium, & oculos. Erant autem & rau-
 coli, & fauces inflammatae, & glandulæ isthic spongiæ appel-
 latae intumescabant, & tubercula circa aures, & maxillā mol-
 lia, & cū febre sedabantur. Incipientibus febricitare fiebant
 superne, & in vtrasq; partes pleraque horū, & Spongiæ qui-
 busdā sub autumnū & hyemem. Sed & porrigines. Et mul-
 tæ omnibus modis abortiebant, & difficulter pariebant.
 Sexta die virgini iudicata, sexta reuerterunt, iudicata verò
 sunt per sextam. Omnia in his temporibus sexta & octaua
 iudicabatur, circa pleiadum occasus. Meandri cæci vxor sta-
 tim cum pallore viride, & statim purulentū spuit circa sex-
 tam, & hepatis feruor, & deorsum secessus modicus, carno-
 purulenta sursum pauca, alba, lata expuebat, cibum fasti-
 diens. Mortua est propè vigesimam diem. Ex vicinis
 Thestoris famula, ex vstoriis: secessu bilioso, multo: præcor-
 dio intenso: Sexta die ex suppressione alui ipsi tenuia, mul-
 ta, vna vice egeffit, & statim sudauit, & iudicata est, & alui
 substitit, eadem autem hora quum riguisset febricitauit, &
 rursus

A rursus eadē hora. Therсандri vxor quum pituita alba præ- Ther-san-
dita nō valde esset, lactans acuta febre correpta est. Huic lin- dri vxor.
gua combusta est, dum alia comburerentur, sub hoc tempus:
linguāque exasperabatur, velut grandine multa. Et lumbrici per os. Circa vigesimam autem non perfectē iudicata est.

Circa pleiadum occasus Metrophanti filius, caput percus- Metrophā
sus ab alio puero, per testam: quum peruenisset ad duodeci- ti filius.
mam diem febricitauit. Occasio autem erat quod quum de-
tergeret partes circa vlcus perfricuit, & perfrigeratus est, &
labia statim sunt eleuata. Attenuata est autem cutis, multis
locis vlterius ab vlcere, quum autem sectus esset non tardē,
neque pus effluxit, neque alleuatus est. Iuxta aurem verò vi-
B debatur suppurari, in maxilla ad dextram. Hac enim parte
etiam vlcus erat. Postea & hoc non suppuratum est, & hume-
rus dexter suppuratus est cito. Mortuus est circa vigesimam
quartam. Post pleiadum occasum is qui aurem doluit, cir-
ca vigesimam diem postea voce destitutus est, & dextrarum
partium impotens, sine febre sudauit, dextra auris, dexter
oculus, consistebat non valde, & attrahebat quid ex inferna
parte. A sinistris autem distortus est oculus grauiter do-
lens, collum durum factū est, tertia hora posteaquā doluit.

Post pleiadum occasum, seruus Attici à quartana corre- Attici ser-
ptus, stupidus sedatus est. Alius eodem tempore vera stupida uus.
insania, ex phrenitide ac lethargo mixta, correptus est. Ad
coxas & crura venit dolor, quieuit, quoto die haud scio.

C Eodem tempore horridi, vomentes, & post iudicationem
cibum auersantes, & biliosi, & splenes magni, duri, dolorosi,
& sanguinis eruptiones. Quibusdam verò eodem tempore,
post pleiadum occasum, ex naribus sanguis biliosus ob sple-
nes. In Cranone vxorem Nicostrati correptā decima quar- Nicostra-
ta die, statim occupauit impotentia colli, & aliarū partium, tus.
& cibus inclusus fuit vsq; ad decimam. Spiritus densus par-
uus, impotentia, palrans digitis, delirans, sudores, distracta
sunt ad dexterā partem collum, os, oculus, nasus. Vrinarum V rinarum
subsidencia alba, eruum referēs, alia alba, alia ramentosa, cū varietas.
pallore subuiridis, farinam lentium referens. Huic quādoq;
velut adiposum quiddam superstabat, atque hoc aceruatum,
non multum dispersum, velut quod in medio ipsarū pendere
solet disparatū, velut extrinsecus ex ouicula, postea verò etiā
non

Hippocratis Liber IIII.

non subsidens mingeatur, & alia quidē talis erat, alia subsi- **D**
dens, alia talis modicē ad latitudinem dispersa, alia contur-
bata, alia talis. Quod in medio vehi solet, nubeculæ subni-
græ simile, quæ putaretur crassitudinem habere. Laxum au-
tem aliud tenue, aliud tenue tale, aliud velut equi, aliud ve-
lut sunt caliginosa. Qui primus delatus est adolescens, huic
vrina pura tenuis. Omnium secessus tenuis, multus sine bile,
lingua valde aspera. Febris adurēs, insomnis, aluus gibbosa.
Hic mente motus est octaua arbitror die, proteruum in mo-
dum, exurgebat pugnabat, turpia fortiter loquebatur, quum
talis non esset. Huic quū vrinæ multæ tenues prodissent ex
suppressione, somnus obortus est continuus, & sudor, qui iu- **E**
dicatorius esse putabatur, ex quo talis erat forte circa deci-
mam diem. Verū postea rursus insaniit, & breui mortuus
est vndecima die. Occasionē fuisse puto quod meracum mul-
tū bibisset, priusquam insaniret. Paucos habebat annos, pro-
pemodum viginti. Eumenis vxor autumno vomuit bilem
atrā. Sed & odores manifesti erant, & febres horridæ, & cor-
dis siue osculi vētris dolores, biliosa pauca vomēbat, & lum-
bricum. Secessus tenues per omne tēpus. Ante pleiadum oc-
casum delinebant statim sanguinis eruptiones, & breuiore
erant febres ac statim reuertentes breuibz recidiuis, & ci-
bum auersantes, & velut excocti, & anxij, & cor dolentes, &
ferini in iudicationibus, & rigore affecti, & biliosi. Adoles-
cens peregrinus erat, cui tertia die sanguis ex naribus mul-
tus fluxit, itēque quarta ac quinta. Sexta compositē confi- **F**
stebat, mente motus est. Septima die aluus substitit, soporo-
sus erat. Recidiua tertia die, aluus eniti cessauit. Vrinam non
vidi. Circa iudicationē velut debebat. At verò circa pleia-
dum occasum austrina, & pluuiæ erant, & tunc Adolescens
mucosa, subbiliosa, viscosa, multa recremēta egerebat, febris
vehemens continua, lingua arida. Sexta iudicatus est. Septi-
ma rursus inuasit, dimisit eadem die cum tremore, auris si-
nistre fluxio viscosa, crassa, die sexta. Puero ab vlcere pha-
gedæna eroso, dentes inferni, & ex supernis ac infernis ante-
riores, emergebant, cavitatem habebant. Quibus os ex pa-
lato discedit, his medius confidet nasus. Quibus verò super-
ni dentes anteriores, his latus est summus nasus. Qui quin-
tus dens ab anterioribus numeratur, quatuor radices habet,
sing

Eumenis
vxor.

Iuuenis al-
ter.

Puer pha-
gedænosus
quid tule-
rit.

- A** singulis paribus ad vtrunque vicinum dentem connexis, extremitatibus omnibus ad internam partem reflexis. Circa tertium dentem suppurationes plures quàm iuxta alios omnes. Et ex naribus fluxiones crassæ, & à temporibus dolores, ex hoc maximè fiunt. Corroditur hic, maximè quintus, ex medio quidem nodum habebat vnum, duos autem antè. Paruus primus intrinsecus iuxta duos corrodebatur. Septimus radicem vnâ crassam, acutam habebat. *Puer alter.* Athenadæ puero masculo doluit à sinistra parte infernus dens, à dextra supernus. Huius auris dextra suppurata est, dum non amplius doleret. Post pleiada clemens cœlum, nubilosum, & caligines: iudicationes quintanæ, & sextanæ ac septimanæ. *Quæ pate-*
- B** nam verò etiam diuturniores: febres recidivantes, & quandoque erroneæ, & cibum auersantes, & biliosæ: & dysentericæ cibum fastidientes, febriculosæ. Circa pleiadum *rentur hi.* occasum, austrina fortiter erant, sanguinis eruptiones: & febres tertianæ naturam referentes, & lenes. Qui in sutrina decumbebat, sanguinem abundè biliosum è naribus effudit. Secessus modicus: iudicatus est septima cum rigore. Seruus in extrema caupona, quarta die sanguinè è naribus effudit. multa statim nugabatur: alius renitebatur. Præcordium dolorosum, durum. Ad subditam glandem sexta die subierunt mala, cū pallore viridia. Septima mane iactatio: clamor multus: venarum pulsiones circa umbilicum. In acutissimis febribus pulsus densissimi, & maximi. Quale est ad vesperam
- C** exacerbat, tale erat in omni morbo. Caterùm ad principia, considerandæ sunt etiam exacerbationes, & an citius *Quæ consi-* deant, & continuas, & anni tempus. Post pleiadum *deranda.* occasum, austrina. Quæ quinta die iudicabantur, intermissa vna repetebant. At verò laxa, pustulosa erant, velut Acanthio *Acanthio* Lapito. Circa pleiadum occasum, subscabra, & aspera erant *Lapyto.* pruriginosa, nullas lachrymas emittentia: & magis quidem hoc tempore. Sed & impetiginosa turgentia. Hæc erant in Pythodori vxore, & Capelio, cum febre, sub cuius initium *Pythodo-* ferè Pythodori vxori coxæ impotentes. Post pleiadum *rus.* casum horrores: sanguinis è naribus eruptiones. Sutor qui *Sutor* dam septima iudicatus est, vna intermissa, altera rediit. *Glaucius,* *nomine.* Rursus quarta iudicatus est. Alius ex his qui à Leocyde *Moschus.* nerant, septima iudicatus est. Alius quarta. *Moschus.* *Largus*

Hippocratis Liber IIII.

**Tubercu-
lum auris.**

**Equo lap-
sus quid tu-
lerit.**

Tenedia.

**Terræmo-
tus.**

**Antigenis
vxor.**

**Apeman-
tus.**

Largus sanguis ex sinistra, modicus è dextra nare. Ad deci-
mam quartam ad iudicationem, si quatenus debebant ab ini-
tio exacerbarentur. Delinquentes circa edulia decima septi-
ma fiebant. Circa aurem in dextra parte tuberculum, paruum
intus durum, foris paruum laxum, dolorosum, nihil remit-
tens, decima nona noctu factum est. Valde biliosis suppuratis,
purgatio sepià atramento maximè similis. Qui cucurbitam
affixit, cum in coxa esset dolor, huic ad crus deorsum
venit, & melius habuit. Qui in ceramico ab equo lapsus est
cui non statim cucurbita affixa est: vltus est intrò, & vigesi-
ma die recrudit malum: sanguinis eruptiones faculentæ,
& erodentes. Tenedia quarta die abortiuit, masculum tri-
ginta dierum: aluus liquida, tenuia, egeffit: lingua combusta
fuit: iudicatio quarta die. Post pleiadum occasum lienosa,
vsque ad quintum diem fluebant: iudicata sunt. Cuidam se-
ptia die vrina velut erui lotura, similis ipsa sibi ipsi, postea pu-
ra recidiua. Intermisit etiam Megasis filio, verum sanguis
non fluxit. Vrina velut Antigenis alba, crassa, similis. Cir-
ca solstitium hybernum, sydus non paruum, quinta & sexta
postea terræmotus. Quæ in Perintho morabatur anhelosa,
Antigenis vxor, quæ non sciebat an prægnans esset, men-
ses comparentes rubri. Venter aliàs atque aliàs paruus, aliàs
magnus. Tusiens semper, velut si celerius iter perfecisset.
Mensis erat octauus, sedata est prius febricitans. Apeman-
ti fratris vxor, septima die abortiuit foemellam velut dixit
sexaginta dierum. Circa nonam turbata est, post iudicatio-
nem, dexterâ partes dolebat, velut à recidiua. Hæc & concipiebat
citò, & perdebat. Alia quædam in albis mensibus filiam
peperit. Alia in rubris, velut conueniebat. Horridi, anxij,
cibum auersantes, recidiuantes, biliosi, sanguine manantes,
subsplenici, doloroso modo plurimi ex sinistris affecti.

Apemanti vxori hac parte oculus distortus est dexter, ad
alteram verò partem lateris mollitudo. Aristophontis fi-
lia tertia & quinta febricitauit: sicca plerunque perseuerauit.
Venter tamen huic turbatus: agrè iudicatio fiebat, vltra
triginta dies cessauit. Pustulæ ex lassitudinibus non
valde fortibus, perueniunt ad septimam liuidæ. Rigor an-
cillæ retrò Heroum obortus est. At verò albæ magnæ, ne-
que ipsæ valde bonæ, graui sopore pressorum, & somnolen-
torum

A torum:& non confidentium,& bile renitente:& siue lubrica, siue dura fuerit aluus,non confidentes. Zoili fabri pulsus tre muli tardi. Vrina & alui secessus moderatè decolor:pectinis distentio vtrinque in directum,vsque ad vmbilicum,cum febre acuta:cibum auersans,siticulosus. Filia ædilis apud Te-comæum,quum obscurum esset ipsi quòd vterum gestaret, secundi mensis initio erupit vomitus pituitosus, aliquando verò biliosus:difficulter peperit:perfectè purgata est. Vomitus similiter vsque ad trigessimam diem perseuerauit:postea venter turbatus est,& vomitus cessauit. Lienteria, menses non prodibāt per duos annos hyeme habuit hæmorrhoidas.

Zoilus.

Tecomæus

B Duo fratres Cecropis familiares, quibus nigra ab initio prodibant,subfæculenta,edulia ex sanguine confecta calore referentia,ea ex spumosis bile abundè coloratis viridia erāt.

Cecrops.

Qui alinum ex pacto eleuauit,statim febricitauit. Tertia & quarta,& quinta,& septima,& octaua sanguis erupit:iudicatus est:aluus lubrica. Vir metallicus,præcordium dextrum intentum,splen magnus:aluus intenta,subdura,spirituosus, decolor. Huic ad genu sinistrum:recidiua,per totum iudicatus est. Temenæ filius habebat quid spiritus, vt viridantis palloris esset, ad dorsum: ad manus viridantis palloris.

Temenæ filius.

Maritus Lechus puerperæ apud Sitodochū,arquato morbo infestatus,ad quem septima die ingressus sum,octaua moriebatur,neque mingens,neque egerens. Præcordia magna & dura,& spiritus densus. Hic moriens ne frontem quidem sudore humectauit præ dolore. Huius vxor eiecit fœmellam septimestrem, septima die. Apparuit autem quarta die. Hanc à principio quidem pedum dolor tenebat. Desinēte verò febre,spiritus non est solutus,sed intus relictus: dolor ad manus & brachium. Recidiua per longissimum tempus corripuit eos quibus vrina ante iudicationem suppressa fuerant. Quæ erat apud Temenen ipsius soror,cum rigore iudicata est. Quum autem viridās pallor citò desineret, manus & humeri doluerunt:horum autem cessante dolore, caput:oculorum palpebræ supernæ eleuatae sunt,& lachrymæ profuebant:reliqua non noui. Iudicata est primū septima die. Menandri vinitor similiter,verū aluus ab initio tenuia egerebat:postea suppressa est, itēque vrina iudicata est,nō riguit,septima die:quoniam aluus antea turbata fuit.

Menander.

X

Potamo

Hippocratis Liber IIII.

**Potamonis
filius.
Hegesistratius.**

Potamonis filio alius non egerebat septima die : duobus diebus ante iudicationem riguit, quapropter neque vir-
na suppressibatur. Dens Hegesistratio, cui suppuratio
iuxta oculum, suppuratus est iuxta extremum: & rursus
sanatus est oculus: & secundum nares pus descendit cras-
sum. Iuxta gingivam carunculæ parvæ rotundæ absces-
serunt. Huic circa tertiam diem suppuratio affutura putaba-
tur: postea auerrebatur. Derepentè verò intumuit maxil-
la, & oculi. Quibus abscessus ad oculos in febribus arden-
tibus, hi maxillas rubent, & sanguinem ex naribus fun-
dunt. Sed & quibus ad aures fiunt. Fortassis autem & ab-
scessus ad articulos magis, non tamen clarè novi. Rigo-
res tremulis, præcordij intentio. Menses apparuerunt de-
cima septima, iudicatio fiebat ita perpetuò. Si tamen non
sic intus permansissent, iudicabantur tertia: quædam quinta:
quædam septima. Hegesistratio postremi duo dentes par-
te inter se contigua corrodebantur: postremus habebat su-
pra gingivam duos nodos, vnum iuxta cavernam, alterum
ex altera parte. Qua verò parte duo nodi erant, ibi radices
latæ similes singulis paribus coincidebant, ad alteram par-

**Mulierum
diuersimor-
bi:**

tem medietas vna rotunda. Mulier cui sanguis è naribus
erupit quarta & sexta. Septima iudicata est, rubicunda erat.
Mulieri ex capite fortiter grauata, iudicatio facta est circa
vigesimalam. Vigesima præcordia æstuosa. Septima die
non valde sanguis è naribus erupit. Seccessus tenues: ad ocu-
lum dextrum circa octauam. Viro eadem, verum septi-
ma iudicatus est. Sublienofus è sinistra parte. Huic octo-
gesima die, & diuturniores oculi affectiones: fortassis quo-
niam post iudicationem, & quia multæ. Vxor Temenæ
spirituosa præcordia, & intenta. Menses per tempus appa-
ruerunt. An verò etiam prægnans fuerit, haud scio, alius
primùm suppressa, & tunc vomebat: postea non amplius.
alius enim multa viscosa ac biliosa egerebat: præcordium
non impediēbat. Vndecima ad magnum dextræ digitum
inflammatio: alui egestio etiam penitus procedebat. Qui-
bus cōtingentibus, melius habebat. Nam & in somnum de-
latio minor erat, & febris: & quodammodo facilius spira-
bat, quoniam supra malum vomitum, vomuerat. Decima-
sexta sensim factus est spiritus densus, & febris: mortua est.

Hæc

**Temenæ
vxor.**

A Hæc febricitauit ante abscessum. Septima post abscessum periiit. Erat & hæc rubicunda. Filius mulieris ipsius Apemanti ^{Apemanti} manti sororis, præcordia magna & splen, spiritus, secessus ^{sororis} amaræ bilis, aliquantulo stercore ammixto, lassus ex operibus. Vigesima die ad pedes, & iudicatio certè lassis ad articulos, non ad oculum, præcordia verò erant intenta, & sanè erat etiam tussicula quædam modicè sicca. Quæ relinquuntur post iudicationem recidiuam faciunt, & in ipsis morbis quæ excernuntur, sputum præmaturum, alui secessus, intemperies, & similia. Apemantus cui dolores in sede, in ^{Apemantus} dextri lateris mollitudine, & iuxta vmbilicum paulò inferius, & è dextra parte: ante dolorem vrinam cruentam mingebant, desuit tertia die. Et faber in altera parte, ex eadem ^{Vrina cruenta.} in directum, & hic quoque vrinam cruentam eiiciebat. Quæ ubi cessasset, ambo subidentias in vrinis habebant, & hoc tertia die. Apemantus autem plurimum fouebatur, Alter verò non sentiebat, nisi in dextra parte. Et Nicoftrato ^{Nicofstratus.} accidit aliquid iuxta vltimas partes à dextris, inferius quàm quibus in sinistris, longè verò subter lateris mollitudinem, vsque ab vmbilicum vtrisque. Anicula apud Sofileum ^{Anus.} alba pituita referta: Tibiæ duris tumoribus, albis, laxis, itemque pedes, verum minus. Erant autè & in partibus infra femora, etiam si plerisque difficilis huc exitus patet: imo & in lumbis, & venter tenuis erat, præcordia submollia, spirituosaf non valde. Erat autem desinentibus plurimis, etiam alia **C** cura vbi glauci facti erant oculi. Atque oculorum quidem cura paulò moderatior erat. Coxæ verò ac cruris affectiones vterinæ erant, quum dolores esse putarentur. Apposito enim ac subditio medicamento odorato, ex farina & vnguento, contigit vt breui discuterentur ac desinerent. Tempus autem abscessus ad oculum, annus. Circumcirca durus fuit, cui etiã pustulæ non perfectè contabuerunt. Sunt autem & à disquamatis talia. Seruus in Hippolochi villa, cui in ^{Hippolochus.} præcordiis vtrinque quid collectum erat durum, & fulgorem aliquantulū habens infernè, qualis erat in fabri ferrarij vxore hydropica: Cui tenuia recrementa progressa partem aliquam euacuauerunt. Erat autem & hoc ipsum ad dextrū planum quiddam, supra ea quæ circumferentiã habent eleuatū. Huic vmbilicus ex natiuitate denigratus erat, & vlcus profundum

Hippocratis Liber I I I I.

fundum fiebat, & vmbilicus non valde cicatricem contrahe-
bat, & pudendum summa parte denudatum erat, quum non
statim tale fuisset, neq; connatū, & adhuc magis fiebat. Hic
plurimum vomebat, febris, cibi fastidiū, sanatus est. Verū
circa septimam à decubitu diem (nam & antea ægrotarat)
aquam multā bibens, & fortassis aliter contemnens, iactaba-
tur & aliquantulum conuellebatur. Desinente autē conuul-
sione, circa animaduersionem extinctus est. Antē hoc verò
vrinam aceruatam minxit, & status cum crepitu prodierūt,
& supernæ partes minimè sunt euacuatae. Quum autē mor-
tuus esset, statim etiam & illæ fortiter emollitæ sunt, & reli-
quæ rubefactæ sunt, velut à flagris per totū corpus, excepta
ea parte vbi tumor ille maximè eleuatus erat, & multū quo-
que calidus erat. Cuidam verò in Abderis deorsum eru-
pit. Cuidam autem anteriore parte intumescebat sine fe-
bre. Tumor ad contactum suppurato similis erat. Famulæ
anhelosæ, quum vasa menstruum sanguinem funderent, an-
helationes illæ cessabant: febris fiebat, mamma sinistra su-
perne suppurata est, & ab initio etiam auris. Olympiodori
famulæ sanguis ex sinistra nare, & iudicata est ad vigesimā,
quemadmodum etiam febricitantibus, & secessus quales
etiam æstate populariter grassati sunt, & quales Hippona-
tis. Hyle famula Aristidis, octaua die in pharmacorum pur-
gatione, infernè signa habuit, qualia facile ferunt, & si non
præter rationem debilitantur, & neque spumosa, neque sub-
sanguinolēta, sed qualia sunt oua, velut Heraclidæ vxor pur-
gata est multum, & facile tulit. Quæ in Bulagoræ villa de-
purgata erat, cœpit febricitare ex splene. (Qui verò dex-
trum præcordium habent, non quidem sublime, verū in-
tentum, hi etiam magis rubicundi fiunt) rubicunda quum
esset, aluum in principio turbatam habuit, expectabam ad
oculum decubitu. Huic septima die salsuginosa lachryma
mordax ex oculis prodiit, & secundum nasum, & fauces, &
aurem sinistram. Decimaquinta sudauit cum rigore, non iu-
dicabatur ante rigorem, pallida facta est valde, & faciei cir-
cumtensio ac contractio. Aures è directo splenis ac lateris
dolebat. Pueris ventres turbati, & tussis sicca: quando-
que ad humerū suppuratio fiebat in tussibus, posterioribus
diebus. Fullo collum, caput, septima manus torpida. Nona
crus

Famula an-
helosa.

Olympio-
dorus.

Hyle ancil-
la.

Heraclidæ
vxor.
Bulagoræ
villa.

Lachryma
salsa.

Puerorum
vitia.
Fullo quid
tulerit.

A crus torpidum, tussis cessauit, Cui maxilla distracta fuit, in quinto mense in ventre distracta erat ad sinistram partem.

In Cranone Lycino Grammatico, ex febre biliosa ex sple **Lycinus**
ne, capitis grauitas, stridebat secundum pulmonem, in labiis **Grammati-**
vtrisque vlcera, intus rotunda, parua, postea etiam sanguinis **cus.**
quid ex nare è directo manauit. Famulae quam recens em- **Famula**
ptam vidi, cui duricies in dextris erat magna, non valde do- **quadam.**
lorosa, & venter magnus ac circumtensus, non similis hydro-

B ptem dies etiam aluus turbata est, secessus electrum referens, subuiscosus, multus ad aliquot dies. Sanata est, & menses post ea prodierunt, & partes secundum ventrem molles fiebant. & corpus boni coloris ac crassum ipsi erat. Minois vxor **Minois y-**
ex sectione, pressa ab eam administrantibus durius, marco- **xor.**

rem ac corruptionem incidit, malo ad pulmonem deueniente, breui significationem de se dedit quotquot diebus supererat, erat & aliud quiddam intrinsecus. Quae induntur in nares si febricitarint, si quidem solutus fuerit dolor, crassa per nares effluunt. Si verò neque dolor, neque febris, tenuia:

& fortassis feruida: Veluti tenue quidem Hegesippo, quum **Hegesip-**
ad noctem quid indidisset. Crassum verò illi in Corintho eu- **pus.**
nucho simili, Celeuris filio erat. Maturi in morbis absces- **Celeuris fi-**
sus an iudicent, signum est, si dum feruida sunt mala, non fe- **lius.**

C bricitarint: & dum molesta sunt, facile portarint: Velut quae in sede acciderunt Charoni. Leambio verò quum intestinum vlcerosum esse putaretur, in dysenteria pharmacis curato, humerus & sedes vlcerata sunt in sinistra parte, citra febre. **Charon.**
Leambius.

Cui à flatibus laterum mollitudo eleuabatur, & aliquantulum dolebat, huic quum lac vberius & meracius bibisset, & insuper dormiisset, statim nausea & calor accedebat. Deinde ignem incedenti, & pro cibis farinam crassiorem in craticulam coctam comedenti, aluus substitit, & purulentum tamen quicdam egescit. Quum autem sedes esset inflammata, sine febre & sine dolore sufficienter erat, hoc assero. Senex in lapideis **Senis mor-**
vestibulis, lumbos doluit, & ambo crura, & vtrique dolores **bus.**
descendebat ad femora, & quandoque tibias, & aliquando ad

Hippocratis Liber IIII.

**Quæ obser-
uentur.**

genua. & quum diutissimè durarent, recursiones multæ fie-
bant. tumor in pedibus, lumbis, tibia. breues inguinū tumo-
res. venter durus. & totus pecten intensus ac dolorosus. Ple-
runque compertus est etiam vesicam durā habere ac doloro-
sam. & papularum eruptiones, & calores oculis, auribus, nari-
bus, manu. Iudicationes, & alia per quæ cognoscimus de ipso
ægro, an sudet, aut tangat, aut aliquid olfecerit, aut gustaue-
rit, itémque alia cognoscuntur. Pili, color, cutis, venæ, nerui,
musculi, carnes, ossa, medulla, cerebrum, & à sanguine visce-
ra, venter, bilis, alij humores, articuli, & postea an doluerit iu-
xta aurem, iuxta ipsam collectum tuberculum glandulā non
attingens, os non suppurans, & hoc disparuit, & tunc statim
febricitauit. Pulsus, tremores, cōuulsiones, singultus, circum-
spiratio, secessus, per quæ cognoscimus. Suppuratis oculis,
& dū erumpūt, vlcerata magna fiūt, & dū secantur, profunda.

Aristeas.

& utroq; modo oculi vlcerātur. Aristeas ex pago Amphilo-
chi quarta die inēte motus est. aluus subuiridia egerebat, &
somnia salubres. albicantis coloris. Quibusdā ab initio sub-
tremuli digiti, & labia vbi loquerētur, itidémq; aliæ partes:
& proteruē lingua citiore ac volubiliore præditi: his rubor
in facie maximè erat. Hi ebriosi erant, aut vomitu cōmodè
vsi intumescabant. Qui iuxta Medosadæ rēdes habitabat,
cui tenuia, nō biliosa, aquosa, multa, per secessum prodibant.
præcordium cedens & gibbosum. soporosus fiebat. Circa de-
cimam quartā ad iudicationē maximè progressio, rigor sine
tremore. dissolutio. resolutio. contractio secessus & egestio-
nes. soporosus. mēte motus. ex somno non insaniit. iudicatus
est circa decimam quartam. nihil è iudicātibus contrarium.

Alius similiter in principijs secessus subuiscosi, ex quibus
quod crassum est iudicatorium est. in somnis. postea subui-
scosi, subbiliosi, maturi, biliosi, non tenues: qui vbi compa-
cti fieri cœpissent. iudicationes celeres. Præcordium inten-
tum apparuit inflammanti, aut venarum intētarum modo.
circa sextam. Postea dormiuit septima. iudicatus est circa
nonam. albicantis colore ambo, non fului. Quum secessus
aquosi sub dio expositi essent, supernè leues, tenues, isatidi
valde similes fuerunt: infernè verò subsidentiā habebant,

Quibus in dextris distētio submollis, phrenitici sunt: si nō
soluatur febre desinente. Quibus autem à mollitudine ven-
tris in

Atris in hac ipsa febre, quiddā collectū aut durum, dolorosum fit, & valde malignum diffundi nō potest, ex talibus fortassis suppurantur. In dextris tumores eleuati, si quidē si quis plurimum ac maximē premat, submurmurant, nō valde maligni putandi sunt. Velut in dextris illi qui ex Amphilocho pago erat, & ei qui iuxta Medosadæ ædes habitabat. Hi soporosi erāt, & in somnis mente moti. Constitutiones quales in quibus tēporibus ac regionibus magis & minus fiunt. Vigores morborum, & ad iudicationē, & quotidie, & an citius fiant aut serius, tertia quarta, circuitu, & in quibus circuitibus iudicantia, tumētia, cruenta, & nō. Quibus abscessibus

B recidiuæ fiant, venæ temporū, & cōtractiones, & colorū mutationes ante iudicationes, ex rubro ad viridē ac pallidum, si nō iudicent, & cutis circuntēssiones absq; iudicatione, & oculorum cōtractio, corporis duritia sicca. Qui quidē volentes lachrymātur, nō malū est. Quibus autem inuitis lachrymæ profluunt, malum. Quibus in dentibus circuncirca viscosa fiunt, malū est subhiare ac fixis oculis intendere. Qui in tibia vlcus habebat, & Attico vsus est, huic pustulæ eleuata, rubræ magnæ, atque hoc pro tussi quæ postea accessit, prius enim nō tussit. In Aeno quicunq; capite vulnerati horridi erant, maligni & suppurati ex tenesmo, ex peregrinatione ac itinere dolor pedū, & in turbationibus lassitudines. Clinia cibum auersans, colliquescens, purulentū, aliquando parum cruentū, purulentū tumidum eiecit. Hippæ vxor hi-

C dropica, quæ etiam per tres annos vere incipiēte tussit, amplius autē suppurata est, ad hyemem aquosa facta est, ab illis autem pharmacis curata melius habuit. Mortua est ancilla.

Ex tussientibus qui manibus laborabant, velut seruus ille qui sarmenta obtorquebat, & Amyntæ filius, ambo sola dextra resoluti cessauerunt, quando quidē perpepsi sunt hoc tussientes. Qui verò aut equitarunt, aut iter fecerunt, in lumbis ac femoribus resoluti sunt. Plurimæ verò tusses sicca erāt: Sin minus violente sanē. Vxor Emmyris modo nō morbo- so, absq; febre, stupida esse videbatur, postea ad tremorē totius corporis res ipsi deuenit, & ad colliquationem, & cibi fastidium ac sitim, & frigida erat. Nyctalopes qui plurimam minxissent postea parum quiddā mingebāt. Verūm tussientes & insuper febrientes tubercula ad aures habebāt, erum-

Hippæ vxor hic.

Qui tussientes manus agitent.

Vxor Emmyris.

Nyctalopes.

Hippocratis Liber IIII.

Emmyris
filia.

pentia circa septimam aut octauā diem. Emmyris filia fe-
bricitabat, & ex aure purulētum fluebat, circa octauā, haud
pro cōperto habeo. Quibusdā verò etiā dens corrosus fuit,
tertius maximè ex supernis. Præ omnibus autē hic reperi-
tur corrosus. ad hunc dolor, & quibusdam etiā circumsuppu-
ratio. Quibus verò ad aures, hi magis tussiebant quàm illi.

Demarati
coniux.
Senex cum
uxore.

Quibus autē cum febribus ad suppurationē, septima rece-
dit. Cuidā postquam exacerbatus fuit, præcordium solutum
non est. aluo autē emollita, inerant pauca subuiscosa, cōpa-
cta, nō bona vrina cruenti coloris. spuebat autē sputum spu-
mosum. Ille ad quem Cynicus me induxit, septima exacer-
batus est. circa decimam quartā iudicatus est. Disparētia, ma-
la sunt. purus fauces. pauca, lata, matura expuens. ex naribus
parum sanguinis stillauit. capite grauatus erat. Manuum ac
pedum dissolutio. aluus soluta profuit. pedes semper calidi.
somnia aderāt ipsi, & iuxta aurem nō extuberabat, quoniam
matura spuiisset. Demarati vxor, pedes etiā in horroribus
calidi: siue ad suppurationē, siue non tendebat, periit. Senex
qui è vita decessit, ægrotabat simul cum vxore sua, furiosum
quiddam in se habebat. Postea verò vbi prodiisset, ab ipso
lumbricus subcrassus, & modicus cibus, statim sedatus, &
dormiuit, & sanus erat hic senex, & corporis cutis circunten-
sio. extremæ partes frigida, mollis, tremulus ab initio & la-
biis, & manibus, & voce, mente motus est. moderatè hiabat,
ac fixis oculis intendebat. non valde diffi- culter spirabat. die-
bus haud scio quorū vltra viginti mortuus est. Quibusdā præ-
cordia & aluus subegesserunt cōpressa, acruatim, non cum
murmuratione, velut in Abderis vermium speciem præ se
ferentia. Quicquid cōtingit priore iudicatorios dies præ-
cedente die, & mala & bona signa fiunt in diebus, quibus qui
exacerbantur diuturniores fiunt: & quibus desinentes remo-
rantur. Quædam non fideliter alleuabant, & quædā per se-
ipsa exacerbabātur. Sputa peripneumonici quibusdā bilio-
sa, quum desinere volunt. Valde flaua breuia fiunt. Si qualia
sunt quæ in principiis adsunt, talia postea appareant, hæc nō
valde cōcoqui puto: sed iudicare velut ei qui apud præcepto-
rem erat, & velut aliàs quoque vidi. Nicippus in febribus
per somnum semen effudit: & nihil ad peius processit. & hoc
ipsum sæpe ipsi factum est, & nihil læsit. Prædictū est ipsi id
desitutum,

Nicippus.

A desitutum, postquam febres iudicatæ forent. & sic factum est.

Critias in febribus ab insomniis vexabatur quæ nouimus, Critias.
& cessauit etiã ipse eadem somniare vnà cum iudicatione.

Alcippus quu haberet hæmorrhoidas, à curatione prohi- Alcippus.
bebatur. Curatus insaniit. febre acuta succedente cessauit.

In febribus acutis siticulosi, à medicis potu interdicto, aut
etiam à seipsis abstinētes, multum sibi bibere posse videtur:
his aqua frigida data vt reuomāt, prodest. Biliosa enim ade-
runt. Quod nerui ipsi in seipsos trahunt, signū est. Si quidē
enim nerui in supernis manus sauciati fuerint, manus deor-
sum nutabit. dum ab infernis neruis trahitur. Si verò cōtrā,
vice versa. Tussient siccam tussim, qui testes affectos habent.

B & ex tussi vena secta, ad testem solutio fit, & inflammati tuf-
fiunt. & in febribus ex inguinū tumoribus insuper tussiuunt.

H I P P O C R A T I S
C O I D E M O R B I S P O -
P V L A R I B V S L I B E R Q V I N -
T V S, I A N O C O R N A -
R I O M E D I C O P H Y -
S I C O I N T E R -
P R E T E .

C



N Helide Olitoris vxor, febris corripuit Olitoris v-
ipsam acuta. & medicamenta bibens nihil xor.
sentiebat opis. In ventre infra vmbilicum
erat quid durum, & altius altero, & dolores
exhibebat fortes. Huc enim manibus cum
oleo fortiter compressum ac emollitū est.
& postea sanguis frequens ipsi deorsum processit, & sanata
est, & vixit. In Helide Timocrates amplius bibit. Insaniens Timocra-
autem ab atra bile. bibit pharmacum. hic purgatus est. pur-
gatio multam pituitā ac bilem atram egerebat per diem. &
ad vespērā purgatio cessauit, & dolorem pertulit in purga-
tione multum. & quum polentā bibisset, somnus ipsum cor-
ripuit, &

X 5

Hippocratis Liber V.

ripuit, & tenuit per noctem, donec sol oriretur. In somno au- **D**
 tem præsens nihil respirare videbatur, sed mortuus esse.
 & neque quid diceretur, neque quid fieret, sentiebat. Extentū
Scomphus. autem fuit corpus & rigidum. Verum viuebat, & excitatus
 est. Scomphus in Oeniadis pleuritide correptus, mortuus
 est septima delirus. Pharmacum autē bibit infra purgans.
Phœnix. priore ante potionē die mentis compos erat, & purgatus est
 non multum. quum autem purgaretur, delirauit. Phœnici in
 Oeniadis & Andree fratribus maxilla altera intumuit, &
 labium quod est ante maxillā & oculum, & neque intrinsecus
 quicquam spectati apparebat, neque forinsecus suppurabat.
 Sed tumens arida putredine putrescebat. Et alter eadē per-
 pessus est. Mortuus est autē alter septima die, & pharmacum **E**
 bibit, & nihil profuit. Verum Phœnici circulus putridus ex-
 sectus est. & vlcus purgatum est magna ex parte priusquam
 moreretur. Mortuus est autē & hic, ubi diutius vixisset. Eu-
 ridamus in Oeniadis, in peripneumonia decima die incepit
 delirare. curatus ad mentem rediit, & sputa erant puriora, &
 morbus ad melius procedebat, & somno multo perfusus est.
 & oculi morbum regiū contrahebant. & mortuus est ad vi-
 ginti dies. In Oeniadis vir quidā morbo tenebatur, quum
 sine cibo esset, fortiter in ventre ipsius fugebat, & dolebat. &
 quum edisset ac cibi cōtriti essent, tempusque post cibi esum
 acersisset, non longē postea idē hoc patiebatur, & tabescebat
 corpus ac consumebatur. & alimentū ipsi non contingebat à **F**
 ciborum esu. & per aluum secedebat cibus prauus & cōbu-
 ftus. Quum verò recens cibū acceperet, eo ipso tēpore mini-
 mē fugebat. neque dolor aderat. Hic omnis generis pharma-
 ca bibens sursum ac deorsum purgātia, nihil opis sentiebat.
 Vbi verò vena ipsi secta esset, in vtraque manu, donec exan-
 guis redderetur, postea vtilitatem percepit, & à malo libera-
 tus est. Eupolemus in Oeniadis, dolebat coxā dexterā, & in-
 guen, & cōmissuram propinquam ad coxam, ab inguine &
 coxa in anteriore parte. Huic sanguis detractus est à talo,
 multus valde, & niger, ac crassus. & pharmacū bibit aluum
 deorsum purgās, & multū purgatus est. & melius quidē ha-
 bebat, dolores autē non remittebāt. Sed suppuratū habebat,
 & coxā, & commissurā in ipsa ad sedē, & partem circa inguē,
 quibus locis etiā amplius dolebat. Pus autē ad os magis fie-
 bat,

A bat, quā ad carnē, in profundo, & per tempus sic habens negligebat, donec valde debilis fiebat, postea crustæ ipsi inustæ sunt, valde multæ & magnæ, ac inter se propinquæ, & pus effluxit multū ac crassum, & mortuus est postea paucis diebus, tum præ magnitudine ac multitudine vlcerū, tum ex corporis debilitate. Huic si vna ampla sectio incisa fuisset, & per sectionē pus emissum esset, & si opus fuisset, etiā altera sectio facta esset: Hæc sanē in tēpore si facta fuissent, mihi quidē videretur quod sanatus esset. Lycon in Oeniadis, reliqua quidem eadem patiebatur, Verūm dolores etiā ad crus non ita valde progrediebātur, & nō factus est suppuratus, sed sanus multo tempore. Bibebat autē pharmaca, & cucurbitas adhibebat. **Lycon.**

B & venam secabat. Atque his factis melius habere videbatur.

Homo quidā Athenis prurigine toto corpore vexabatur, maximē autē testibus ac fronte, vexabatur autē valde vehementer, & cutis crassa erat per totū corpus, & velut lepra aspectu, & ex nulla parte cutē apprehendere potuisset, præ crassitudine. Huic nemo opitulari potuit. Trāsgressus autē ad Melum, vbi sunt calidæ balneæ, à pruritu quidē & cutis crassitudine liberatus est, verū hydropicus factus mortuus est. Athenis virum cholera corripuit, vomebātque & deorsum egerebat, & dolebat: & neq; vomitus, neque per aluum secessus, fieri poterat, & vox ipsum destituebat: & ex lecto moueri non poterat: & oculi caliginosi ac caui erāt, & cōuulsiones tenebāt ab aluo, & intestino, & singultus. Verū secessus multo copiosior erat quā vomitus. Hic veratrū in lentium succo bibit, & alterum lentium succū insuper bibit, quātum potuit, & postea vomuit, & coacta sunt ac adstricta ipsi ambo, frigidus autem factus est, & lauabat infernē vsque ad pudenda, calida valde multa, donec etiam supernæ partes calefactæ sunt, & viuebat, postera verò die, polentam bibit ex aqua. In Larissa vxori Gorgiæ menses suppressi erant per annos quatuor, præter valde modicos. Verū in vtero, ad quācunq; partem se inclinasset, pullum exhibebāt ac grauitatem. Hæc mulier cōcepit & peperit, & puella viua nono mense edita est, vlcus habens in coxa, & secundæ consequentes, ac sanguinis fluxus valde multus, successerūt, postridiē, & tertia die, ac quarta, etiam grumi sanguinis cōcreti, & febris tenebat vsque ad decem primos dies, & de cætero prodit ipsi sanguis ruber, & fac

Atheniēsi quidam.

Melos insula.

Atheniēsi alter.

Gorgiæ cunx.

Partus c vlcere in coxendic nono mē editus.

Hippocratis Liber V.

& facies fortiter intumescerebat, itémque tibiæ, ac pedes am- **D**
 bo, & alterum femur, & cibos non admittebat. Sitim autem
 habebat vehementem, & frigidissima aqua conferebat. Vi-
 num autem nequaquam. At venter post primum puerū mo-
 dicè emollitus est, valde autem non confidit, sed durior erat.
 dolor autem non aderat. Quadragesima verò die à prima su-
 perfoetatio excidit, caruncula quædam, & venter confidit om-
 nēq; tumores, & fluxio tenuis, ac sanguis olens prodiit, &
 sana euasit. **herz.** Mulier in Pheris caput circumcirca dolebat
 multo tempore, & nemo poterat illi quicquam opis confer-
 re neque dum caput purgaretur. Melius autē habebat, quum
 menses ipsi facilè prodibant. Hæc quū caput doleret, ex sub- **E**
 dititiis odoratis ad vterum apposis opem sentiebat, & mo-
 dicè depurgata est, & quum concepisset, dolores caput relin-
 quebāt. Mulier in Larissa prægnans erat. Huic decimo mē-
 se sanguis prodiit multus per quatuordecim dies. Plurimus
 autem tribus diebus ante pueri editionem. Decimaquarta
 excidit ex vtero puer mortuus, habens dextrum brachium
 lateri adnatum, & tertia die noctu eadē hora qua puer, pro-
 diit secunda, & purgamenta alba, deinde post hæc per tres
 dies ac noctes multa moderatè prodierūt. Postea febris cor-
 ripuit, per duos dies totidēque noctes, & dolebat omnem
 ventrem, & coxas, maximè verò pectinē. In Larissa Hip-
 posthenes peripneumonia apprehensus esse medicis videba-
 tur, erat autem nequaquam. Verū principio luctans in du- **F**
 ro loco cecidit supinus, aduersario ipsi illapso, & lauatus est
 frigida, & cœnauit, & grauior factus esse sibi videbatur. Se-
 quenti autē febricitauit, & tussis apprehendit ficior, & spi-
 ritus densus. Quinta die cruentum exscreauit, non multum.
 & delirare incipiebat. Quando tussiebat, dolebat pectus &
 dorsum. Sexta autem vbi sternutasset, sanguis fluxit è nari-
 bus, quatuor heminarum mensura. Ad vespērā neque loque-
 batur, neque sentiebat, neque quid fieret, neque quid diceret-
 tur. Vndecima mortuus est. Per quinque verò dies, modò
 sapiens erat, modò non. Erat & sine febre. Spiritum autē nul-
 lum recipiebat, neque stertorē habebat. Non enim erat spu-
 tum. **man-** Scamandrus in Larissa, & in coxa marcorem habuit;
 15. & in osse diu disparato. Ipse verò sectus est sectione magna,
 etiam ad os ipsum, & postea vltus est & tunc die duodecima
 post

- A** post sectionem cœpit conuulsio, & valde obtinuit, conuellebatur autem crus hoc vsque ad costas, & ad aliam quoq; partem conuulsio progrediebatur, flectebatur autem crus, & extendebatur: & alia membra mouebat, & maxillæ compactæ riguerunt. Hic mortuus est conuulsus octaua die post cōuulsionis inuasionem. Curabatur autem tepesfactoriis vtriculis, & fomētis erui, per totum corpus, & infusum per clysterem immisum est, & tunc modicum stercoris prodiit, & pharmacum bilem abundè purgās bibit, ac insuper catapotium deglutiuit, & secessit quidem, nihil autem à catapotio opis sensit, & somnus modicus venit, & rursus pharmacū idem fortè ad vesperam bibit, ac sole emergēte mortuus est. Videbatur autem multò tempore morbu ferre potuisse, nisi ex pharmacī vi periisset. Equiso Palamedis in Larissa vndecim annorum, percussus est in frontem supra oculum dextrum, ab equo: & videbatur os non sanū esse, & exiliebat ex ipso modicus sanguis, & sectus est sectione magna vsq; ad secundam laminam, & curabatur sic habēs ipsum os, quòd etiam antea statim os peperit. Vigesima tumor cœpit circa aurem, & febris & rigor, & in die magis intumescebat ac dolebat tumor, & ab initio febricitauit ex rigore, & oculi intumuerūt, & frōs, & tota facies. Patiebatur autem hæc in dextra magis capitis parte. Progressus est autem tumor etiā ad sinistram, nihil tamen hic læsit. Demum febris continua corripiebat. Atque hæc minora erant, vsq; ad octauam diem. Vixit autem
- C** vltus, & per catapotium purgatus, & cataplasmate tumori imposito. At verò vlcus nullius mali causa erat. In Larissa Theophorbi filius vesicam scabiosam habebat, & viscosam vrinam mingebat, & dolebat dum & inciperet mingere, & dum desineret, & confricabat pudendum. Hic quum bibisset pharmacum vrinam ciens acre, in vesicā quidem nihil processit, verū multū purulentū & bilem euomit, & deorsum alia huiusmodi egerebat, & ventrē dolebat, & intrinsecus ardebat. Reliquum verò corpus frigidum erat, & totus resolutus est, & nihil assumere volebat. Huic exulceratus est venter fortiter valde, à vi medicamēti, & mortuus est tertia post potionem die. Vxor Antimachi in Larissa, prægnans erat diebus circiter quinquaginta, & reliquo tēpore præfastidio à cibo abstinebat, & per septem dies vterum dolebat,

Palamed
equiso.

Theoph
bi filius

Antima
vxor.

& cor

Hippocratis Liber V.

& cor, & febris corripiebat, eo tempore nihil per aluum ege-
 rebat, huic datum est catapotium deorsum purgans fortius,
 quàm cōueniebat, & euomuit bilem cōbustam prae cibi ab-
 stinentia & febre. Nam neque vlllo potu vtebatur, euomuit
 autem paucā violenter, & grumosa, & vbi cōcitata fuisset, ac
 ipsam emisisset, debilis esse videbatur, & nō volebat aquam
 bibens euomere. Postea verò dolor fortis tenebat infernum
 ventrem: exulceratus enim erat à medicamento, & prodibat
 ipsi statim post stercus, subcruentū ramentosum. Semper au-
 tem amplior fiebat & debilitas, & cibi fastidiū: & purgamen-
 ti erant hemine quinque. Siscebatur autem aluus, aqua mul-
 ta super ventrē affusa, aliud autē nihil potuit admittere. Mor-
 tua est circa mediam noctem. Videbatur viuere potuisse, si
 aquā bibere potuisset, ac statim vomere priusquam degluti-

Oneside-
 ni famula.

uisset. Famula Onesidemi in Larissa, vlcera est aluum &
 intestinum, à bile sponte cōmota, & prodibat sursum ac de-
 orsum bilis & sanguis, & febris tenebat. Huic debili datum
 est pharmacū deorsum purgans in potu, debile, aquosum, ac
 modicū, & vomuit ab ipso multum, & infrā ampliū subiit,
 & vesperi rediit. Postridie febris erat, sed debilis. Aluus autē
 vlcerebatur, & adhuc eadem egerebat. Tertia die ad vespérā
 mortua est, quā febris valde fortis ipsam corripuisset. Qua-
 propter omnino moritura esse videbatur. Minime verò ideo
 quod aquam frigidam biberat, donec vomitus tenebat. Post-
 quā autem perfrigeratus est supernus venter, depurgatus
 per aquam, succo frigido postea poto, sic postea infusum per
 clysterem immissum est.

ademus.

Eudemus in Larissa, hæmorrhoi-
 das habēs fortes, ac diurnas, quum exanguis esset, bilis cō-
 mota est, sed leniter in corpore, & aluus turbata deorsum bi-
 liosa egerebat, & hæmorrhoides intumescebant. Pharmaco
 deorsum purgante poto, probè depurgatus est, & rursus bibit
 succum, & ampliū aluus turbata est, & dolor ad præcordia
 consistebat. Huic quum venter non probè haberet, sed adhuc
 curatione indigeret, manus hæmorrhoidibus admotæ sunt.
 & vomuit. Postea quum cancer successisset, febris irruit, &
 non dimisit antequam occideret. Quandoque etiam quum
 rigor subrepēs dimisisset, febris venit: & prodiit ipsis bilis &
 flatus, & partim prodibat, partim intus erat, & dolor in ven-
 tre. Hæmorrhoides autem extra intestinū rectum erant, re-
 liquo

- A** liquo tempore à purgationibus auspicate : & flatus per ipsas prodibat, & ad sternutationem principium fiebat. In Larissa vir quidam sauciatus est cominus ex manu per hastam latam à tergo, & summum eius penetrauit infra vmbilicum per multū spatium, quod liuidum erat & tumidum : postquā autem vulneratus fuit, dolor obtinebat primū fortis, & venter intumescerebat. Huic postridie datum est pharmacum dorsum purgās, & egeffit modicum cruētum, & mortuus est. Videbantur intestina huius non esse sana, & venter sanguine plenus esse. Apellæus Larissæus ætatem habebat annorum circiter triginta, aut parum aberat. Corripiebatur autem morbo, à quo vexabatur noctu magis in somno, quàm interdiu. Aegrotabat autem ad duos annos ante mortem. Vomebat bilem fuluam aliquando vbi excitatus esset. Vomebat etiam nigrā. Hic purgatione à capite forti valde ad multum tempus purgabatur : & cum pharmacum bis bibisset, sex menses ipsum penetrauit. Erat valde vorax multi cibi : & cū corpus haberet biliosum, multum luctatus, valde riguit : & febris corripuit, ac morbus ad noctē : postridie sanus esse sibi videbatur, & rursus altera die. Sequenti verò nocte morbus inuasit cœnatum à primo somno, & per noctē ac diem, & vsque ad cœnam tenebat. Mortuus est priusquam resipisceret.
- Conuellebatur primū circa dextras partes, faciemq; ac reliquum corpus : postea in sinistris : & quum videretur quietus esse, soporem habebat ac stertebat : & rursus succedebat morbus. Eumelus Larissæus rigida habuit crura, & manus, & maxillas, & non poterat neque extendere, neque flectere, si non alius flecteret ac extenderet. Et neque maxillas diducere poterat, si non alius diduceret. Aliud verò nihil neque dolebat, neque edebat, nisi mazam, & aquam mulsam bibebat. Vigesima die sedens caput supinus, & caput ad lapidem vehementer offendit, & vertigo ipsi caliginosa offusa est, & paulò post surgens, sanus erat : & soluta erant omnia, præterquam post somnum vbi excitaretur, articuli modicè ligati erant. Erat autem duodecim aut tredecim iam annorum, & ægrotauit mēlibus tribus aut quatuor. In Larissa virgo quæ sanguinem vomuit non multum, suppurata facta, febribus corripientibus, non liberabatur priusquam moreretur. Morua est tertio mense. Ante mortem verò obsurduerunt ei aures,

Percussus
hasta mori
tur.

Apellæus.

Eumelus.

Virgo La-
rissa.

Hippocratis Liber V.

**Dyseridis
serua.**

**Maliensis
quidā cal-
catus cur-
ru.**

**Autono-
mus capi-
tis vulnere
moritur.**

**Famula si
militer.**

res & non audiebat, nisi quis valde exclamasset. Verum ante **D**
sanguinis vomitum debilis erat. Famula Dyseridis in La-
rissa, quum iuencula esset, vbi venere vteretur, fortiter cir-
cumcirca dolebat. Aliàs autem sine dolore erat. Concepit au-
tem nunquam. Et quum sexaginta esset annorum dolebat à
meridie, velut ex partu vehementer laboraret. Hæc cū ante
meridiem porrum edisset multum, postquā dolor ipsam cor-
ripuit vehemētissimus: & priores omnes excedens, exurgens
asperum quiddam in ore vteri deprehendit: postea cū ipsa
animi deliquium incideret, alia mulier immissa manu, ex-
pressit lapidem asperū, magnitudine verticilli fusi: Et sana
tunc statim, & postea erat. **E** Maliensi currus onustus indu-
ctus est supra costas, & costas confregit: & per tempus substi-
tit ipsi pus infra costas. Vstus sub splenem penicillis ac lina-
mentis vtebatur, & peruenit ad decem menses. Resecta verò
cute, cauerna apparuit ad tenue intestinum vtrinque proce-
dens, & ad rhenem, & ad ossa procedebat putrida. In hoc non
animaduersum est, quod & corporis habitus biliosus erat, &
in corpore putredo sicca tenuis intestini multa: & aliarum
carnium, quas statim eiicere oportebat, si quis potuisset. sic-
co pharmaco, dum robur aliquod homo habebat. Nā ab hu-
midis nihil remittebant, sed putrescebant. A linamentis ve-
rò inditis quū humor sisteretur, rigor corripiebat & febris,
& magis putrescebat: affluebat autem isthic putridum quid-
dam, subnigrum, graueolens. Priusquam verò curationis ag-
gressio fieret, quotidie multum foras penetrabat. **F** Erat autē
nō probè fluidum. Cognitum est naturam morbi esse magis
remotam, quàm subter cutem. Quòd si verò etiam omnia re-
ctè facta essent, tamen non videbatur seruari posse, etiamsi
ventris profluuium ipsum corripuisset. Autonomus in O-
milo, ex capitis vulnere mortuus est die decima sexta, in me-
dia æstate lapide ex manu ictus, in futuras in medio sincipi-
te. Quare non animaduerti ipsum secari opus habere: dece-
perunt enim me futuræ habentes in seipsis iaculi læsionem,
postea enim conspicuum id fiebat. Primū quidem ad clau-
culam, postea ad latus dolor fortis valde: & euulsio ad ambas
manus venit. In medio enim capitis ac sincipitis vlcus habe-
bat. Sectus est autē die decima quinta, & pus prodiit nō mul-
tum. Membrana verò cerebri imputrefacta apparebat. Fa-
mula

A mula in Omilo ex capitis vulnere, duodecim annos nata, moritur in media æstate, decima quarta die. Ianuā quidam ipsi impegerat, & os contuderat ac ruperat. Suturae verò in vlcere erant. Quare cognitū est rectè sectione opus habere. Secta est autem non velut oportebat, sed quantum relictū est, pus in ipso factum est. Octaua, rigor, febris inuasit: habebat autem non velut oportebat, sed quantum etiam prioribus diebus quando febris non tenebat. Nona verò die reliquum resectum est: & valde modicum pus cum sanguine subtus apparuit: & mēbrana cerebri pura erat: & somnus quidem occupabat: febris autem non dimittebat. Cōuulsio verò manū sinistram inuadebat. Nam in dextris magis vlcus habebat.

B Cyrenius in Omilo suppuratus factus, infernum ventrem vltus est, triginta diebus serius quā oportebat: & mansuete se habebat: & resiccatum est pus in ventre. Verū in calidissimo tempore cedens fructus pomorum, & alios cibos non conferētes, à febre correptus est, & à vētris profluuiio: & mortuus est. Hecafon in Omilo, velut etiā alter serius vltus est, attamen resiccatus est venter, modico excepto. Dysenteria verò arripiebat ipsum, quā vbi effugisset, omnia edebat donec totus intumuit, & erupit ipsi pus deorsum, & vētris profluuiio mortuus est. Hecafon in Omilo, ab immunditia nō purgata, & à praua purgatione, dolorem acutum in coxa habebat: & hic quidem discessit, successerunt autē ipsi febres, & multo tempore in lecto decumbebat, neque bibens quicquam, neque sitiens: & debilis, & horridus. Huic commodē quidem ablatus est morbus velut conueniebat. Opem autē percipiebat ex his quæ offerebantur. Tandem verò erupit morbus deorsum, & totus secessit præ multa bile: & mente motus est, & mortuus. Videbatur autē morbū euasurus esse.

C Qui in Salamine in anchoram incidit, in ventrem fauciatus est, & circumcirca dolebat. Bibit autem pharmacum, & non egeffit deorsum, neque remouit. Mulier quæ iugulauit seipsam, suffocabatur: & datum est ipsi longè postea pharmacum deorsum purgans, & per secessum ipsi exiit. Qui ex Eubœa venit adolescens, quum multum esset deorsum purgatus, intermissione facta quietus febricitauit. Deinde quum putaret se purgatione sursum versus opus habere, non validam radicem veratri bibit, & post potionem quarta die

Cyrenius
purulentus

Hecafon.

Salami-
nius ancho-
ra vulnera-
tus.
Mulier per
se iugulata
Adolescens
moritur.

Y

mortuus

Hippocratis Liber V.

mortuus est, nihil expurgatus. Verū somnus ipsum tenebat, D
 & sitis sedari non poterat. Serua illa cui à catapodio sursum
 quidem pauca prodibant, ac suffocabant: deorsum verò mul-
 ta, nocte mortua est. Erat autem barbara. Quidam homo
 Eubæus poto pharmaco deorsum purgāte, per tres dies pur-
 gabatur, & mortuus est. Habebat autem manum suppura-
 tam vsque ad cubitum. Symmachi filius à bile suffocaba-
 tur, noctu quum dormiret, & febris eum tenebat. Pharmacū
 autem vbi bibisset, non continuit, neque purgatus est diebus
 sex antequam moreretur. Qui iuxta curriculum habitabat
 quum noctu sanguinē vomuisset, postridie mortuus est, san-
 guinem vomens multum, & strangulatus. Ad splenem verò,
 & deorsum multus sanguis ipsi prodibat. Puer à mulo per-
 cussus ventrem & hepar, mortuus est quarta die. Spiritū au-
 tem densum habebat, & non intelligebat quicquā: & febris
 tenebat. Hermophili filius agrotabat diebus vndecim. Fe-
 bris autem tenebat, & cibi non deorsum prodibant: & pri-
 mum quidem delirauit, nocte verò cessauit. Sequenti autem
 die voce destitutus iacebat stertens, distortos habens oculos,
 febricitans. Penna verò immissa vomuit bilem atram, &
 quum infusum per clysterem immisissum esset, stercus pro-
 diit multum. Seruæ Aristionis pes sua sponte marcore cor-
 ruptus obtorpuuit, iuxta medium pedis intrinsecus ex obli-
 quo: & ossa putrida fracta abscesserunt: & prodibant paula-
 tim fistulosa: & ventris profuuium succedebat, & mortua
 est. Mulier sana, crassa, à catapodio conceptus gratia acce-
 pto, dolorem habebat ventris, & tormen in intestino, & in-
 rumuit. Spiritus autem sistebatur: & desperatio erat cum do-
 lore: & sanguinem vomuit nō multum: & emortua est quin-
 quies, vt vita decessisse putaretur: & neque vomitu facto
 ab aqua frigida laxabatur, neque dolor præsens, neque spi-
 ratio. Superfusæ verò sunt ipsi aquæ frigidae amphoræ circi-
 ter triginta super corpus: & sanè hoc solum prodesse videba-
 tur: & postea deorsum processit bilis multa. Quum autem
 dolor obtineret, nihil poterat succedere: & vixit. Antander
 à catapodio accepto, cætera sanus erat. Verū circa ve-
 sicam dolorem habere videbatur: purgauit ipsam celeriter
 multo purgamento: & à meridie dolor tenebat fortis val-
 de: & in posteram diem strangulatio, & desperatio, & ia-
 ctatio

A statio, & vomebat, & nihil per secessum egerebat, & noctu
 patiebatur, & somnus non accedebat, postridie verò egere
 bat multum, & postea sanguinem & mortuus est. Athenadæ
 da puero masculo à Phagedæna vlcere corroso, doluit à si-
 nistra parte dens infernus, à dextra supernus. Huius auris
 dextera suppurata est, dum non amplius doleret. Sutor in-
 Pityo dum soleas veteramentarias fueret pupugit seipsum
 supra genu in femur, & ferme longum digitum immerfit.
 Huic sanguis quidem nullus effluxit. Vulnus autem cito
 clausum est, femur autem totum in tumorem eleuabatur, &
 procedebat hic tumor vsque ad inguen & lateris mollitudi-
 nem. Hic tertia die mortuus est. Quidam iuxta inguen

Athenadæ
 puer.

Sutor subu-
 la latus pe-
 riiit.

B sagitta percussus, quem nos vidimus, maximè præter om-
 nem opinionem seruatus est. Neque enim cuspis exempta
 est, erat enim valde in profundo: neque sanguinis eruptio
 vlla memorabilis fiebat: neque inflammatio: neque clau-
 dicauit. Cæterum cuspidem inuenimus nos, ipsamq; exemi-
 mus, quum sex iam essent anni, ex quo sauciatus erat. Suspi-
 cio autem erat hæc, inter medios nervos cuspidem occulta-
 tam fuisse, nullamque venam aut arteriam disiectam esse.

Sagitta per-
 cussus eua-
 sit.

Qui percussus est spiculo acuto retrorsum paulò infra col-
 lum, vulnus quidem habebat non memorabile aspectu, ne-

Contrà al-
 ter.

que enim in altum ferebatur, verum nō multo tēpore post-
 eā exempto spiculo, distendebatur in posteriorem partem
 tractus, velut opisthotonici, & maxillæ ligatæ erant, & si li-
 quorem aliquem in os sumeret, eūmq; deglutire conaretur,
 C rursus relidebatur ad nares. Cæteraque statim peiora fiebāt,
 & secunda die mortuus est. Adolescens per asperam viam

Calce sub-
 atrato cur-
 su hic perit

Calce sub-
 cursu facto, dolebat pernam, maximè inferna parte. Absces-
 sum autem locus accepit nullum, velut qui colligeret humo-
 rem. Verum tertia die totus locus nigrescebat, vsque ad ta-
 lum, astragalum appellatum, & vsque ad cauitatem quæ est
 ad pectus pedis, & quod denigratum erat, non diffringeba-
 tur, sed prius moriebatur. Viginti verò dies ex toto cursu
 vixit. Qui ad oculum percussus est, percussus quidem est in
 palpebram, descenderat autem cuspis altè satis, barbæ verò
 summum supereminebat. Secta palpebra, sublata sunt om-
 nia. Nihil erat mali. Oculus enim permanfit, & compendio
 sanus factus est. Sanguis autē effluxit largè, & multa copia.

Supercilio
 percussus
 sine oculi
 læsione sa-
 natur.

Hippocratis Liber V.

Virgo ma-
nu aperta
verticē per-
cussa pe-
riit.

Virgo illa pulchra Nerij filia, erat quidem annorum vigin-
ti, verū à muliercula amica ludente, lata manu percussa est
in sinciput, & tunc quidē vertigine capta est, & sine spiritu
erat. & quum ad domū venisset, statim febris vehemens cor-
ripiebat, & caput dolebat, & rubor circa faciem erat. Septi-
ma die circa aurem dextram pus processit graueolens, sub-
rubrum, ampliū cyatho & videbatur sibi meliū habere, &
alleuata est. Rursus augebatur febris, & in soporē defereba-
tur, & loqui non poterat, & faciei pars dextera trahebatur, &
difficulter spirabat, & conuulsio ac tremor aderat, & lingua
detinebatur, & oculus stupidus erat. Nona mortua est.

Cleomenis
filius.
Cocus gib-
berosus.

Cleomenis filius hyeme initio facto cibum auersabatur,
& eius fastidio citra febrem vexabatur, & vomebat cibos ac
pituitam, & per duos menses cibi fastidium durabat. Coco
in spina gibbositas facta est ex phrenitide. Huic nulla medi-
camenti potio conferebat. Verū vinum nigrum, & panis
esus, & balneorū abstinencia, & frictio, & lenis fots nō cum
multo fomento, sed placidē. Cuidam quæ circa vigesimum
ætatis annum, biberat pharmacum ad foetum perdendum,
accidit dolor, vomitus biliosorum, multorū, pallidorum ac
prasınorum. Quum bibisset, cōuulsio tenebat, linguam com-
mādebat. Ad quartam diem ad ipsam ingressus sum, & erat
ei lingua magna, nigra. Oculorum autem alba, erant rubra,
insomnis. Quarta mortua est ad noctem. Origanum po-

Cur hæc
mortua sit
videto.

Quæ ex al-
to decide-
rat non pe-
rit.

tum, oculis, & dentibus malum est. Puella quæ de rupe ce-
cidit, voce destituta, iactatio aderat, & vomuit ad noctē san-
guinem multum, quum ad sinistram aurem impegisset, am-
pliū inde fluebat. Aquam mulsam difficulter deglutiebat,
stertor, spiritus densus, velut morientium. Venæ circa faciē
distentæ, decubitus supinus, pedes tepidi. febris debilis, vocis
interceptio. Septima vocem rupit, calores tenuiores tene-
bant, superstes mansit. Pythocles ægrotantibus aquam, &
lac multa aqua ammixta dabat. Perniones pertundendi,
& calefaciendi sunt pedes sic vt maximē excalefacias igne
& aqua. Oculis incommoda sunt, lenticula, fructus pomorū
dulces, & olera. Doloribus circa lumbos, & crura, &
coxam, ex laboribus obortis, aquæ marinæ, acetiq; calidum
fomentum confert, ita vt vel aspergas, vel spongiam his im-
butam adhibeas. Deligare verò oportet lanis succidis, & pel-
libus

Pythoclis
medela.

De Morbis Popularibus.

351

A libus agnitis. Fullonibus inguina extuberabant dura, & sine dolore, & circa pubem, & in collo, similia erant tubercula magna, febris ante decimum diem. Tussi vexabantur à ruptionibus. Tertio mense autem quarto venter colliquiuit. Calores successerunt, lingua sicca, sitis, egestionis deorsum malignæ, mortui sunt. Qui lapide in caput percussus est à Macedone, & corruit. Tertia die voce destitutus erat, anxietas, febris tenuis, pulsus non valde in temporibus.

Fullo cur
moritur-

Caput la-
pide per-
cussus pe-
riit.

Nihil omnino audiebat, neque sapiebat, non quietus, sed quarta mouebatur, humiditas circa frontem, & sub nasum, & vsque ad mentum, & mortuus est. Eniates in Delo iaculo ictus retro in latus, in sinistra parte, vlcus quidem sine dolore habuit. Tertia verò ventris dolor vehemens, non egerebat. Infuso verò per clysterem immisso, stercus prodiit ad noctem, afflictio intermittebat. Sedes ad scrotum extabat. Quarta & ad puberem, & ventrem, dolor irruibat, quiescere non poterat, biliosa vomuit abundè colorata.

Eniates.

Oculi quales animi deliquium incidentium. Post quintum diem mortuus est. Calor quidam tenuis inerat. Et qui hepar percussus est iaculo, statim calor qualis est mortuorum per corpus diffusus est, oculi caui, anxietas, molestia. Mortuus est priusquam concio solueretur, quum sub diei exordium percussus fuisset. Polemarchi vxori hyeme anginosæ, tumor sub guttur, febris multa, vena secta est, cessauit suffocatio ex faucibus, febris comitabatur. Cir-

Quidā he-
par iaculo
percussus
statim mo-
ritur.
Polemar-
chus.

Cca quintam genu dolor ac tumor sinistri, & circa cor videbatur ipsi aliquid colligi, & respirabat velut hi qui submersi fuerunt, respirant, & ex pectore substrepebat, velut qui concluso ore loquuntur, Engastrimythi quasi ex ventre loquentes Græcis appellati. Tale quiddam contingebat. Circa septimam aut nonam ad noctem aluus deorsum prorupit, & multa liquida quæ mala putantur egressit. Ipsa verò voce intercepta mortua est. Ventres subpurgare oportet in morbis, quum matura fuerint, infra quidem, vbi confidisse videris. Signum habes, si neque anxij, aut capite grauati fuerint: & quum calores mitissimi fuerint, aut quum post exacerbationes cessarint. Sursum verò, in exacerbationibus. Tunc enim etiam sua sponte eleuantur, quum anxij, & capite grauati fuerint, ac se iactarint. Ex casu vulnerato cu-

Cubiti la-
pio.

Y 3

bito

Hippocratis Liber V.

bito, ob corruptionem cubitus suppuratur. Quum autem D
 Cleogeni- iam maturus est, viscosa sanies exprimitur. Velut etiā Cleo-
 scus. genisco, & Demarcho Aglaorelis filio. Similiter autem
 Demar- & valde ex iisdem pus nullum. Velut Aeschylli filio conti-
 chus. git. Suppuratis autem plurimis horror & febris succede-
 Aglaotelis bat. Parmenisci filio surditas accidit. Contulit clyste-
 filius. rem auricularium non adhibere. Verum lana solum indi-
 Parmeni- ta perpurgare, & oleum infundere, aut netopum. Præci-
 scus. pere verò ut deambulet, mane surgeret, & vinum bibe-
 Aspasius. ret album. Aspasij uxori dolor dentis vehemens, & ma-
 Callime- xillæ in tumorem eleuatae sunt. Quum verò castorium &
 don. piper collueret, opem sentiebat. Callimedontis puero
 contulit ad tuberculum, quod habebat in collo durum, & E
 magnum, & crudum ac dolorosum, sectio venæ brachij:
 & lini torrefacti cataplasma imponere subactum vino albo,
 & oleo imbutum, ita ut deligetur neque calidum, neque
 valde coctum. Aut cum aqua mulsa coquatur fœnigræci,
 Melissan- aut ordeï, aut tritici farina. Melissandro quum gingiua
 der. dolore corriperetur, & vehementer intumesceret, sectio ve-
 næ brachij, & alumen Aegyptium in principio sedabat.
 Hydrops edere calidum, in oleo bibere, non multum lauari, & cap-
 Medela. put tepidè. Vinum autem album & tenue, & somnus au-
 xiliatur. Bianti pugili quum natura vorax esset, contigit
 ut in affectiones cholericas, bilis sursum ac deorsum exeun- F
 tis, delaberetur, ex carnis esu. Maximè verò ex porcinis
 Bias pugil. carnibus crudioribus, & ex ebrietate vini odorati, & pla-
 centis ac dulciariis ex melle, & cucumere, pepone, & lacte,
 & polenta recenti. In æstate verò affectiones cholericæ,
 Timocha- & febres intermittentes. Timochari hyeme destillatio,
 res. maximè in nares, quum venere usus esset, resiccata sunt om-
 nia, lassitudo, calor successit, caput graue, sudor à capite mul-
 tus, defluebat autem & per totum corpus. Erat autem etiam
 Canis sy- sanus sudare aduetus. Tertia die euasit sanus. Post canem
 dus. febres fiebant sudorose: & nō perfrigerabantur omnino post
 sudorē, sed rursus ampliùs incalescebant: & longæ, & leniter
 sine iudicatione, & non valde siticulosæ, paucis in septem &
 nouem diebus cessabant. Vndecima & decimaquarta, &
 Polycrates. decima septima, & vigesima iudicabantur. Polycratem fe-
 bris

Abris inuadebat, & sudor qualis præscriptus est. Purgatio à pharmaco deorsum facta est. & febris erat lenis. Rursus in temporibus sudores parui, & circa collum, ad vesperam. Deinde in totum. & rursus incaluit. Circa duodecimā & decimam quartam diem febris augescebat, & secessus pauci. post purgationem sorbitionibus vsus est. Circa decimam quintam ventris dolor circa splenem, & lateris mollitudinem sinistram. Calidorum adhibitiones minus profuerunt, quàm frigidorum. Quum autē leni ac molli per clysterem infuso vsus esset, dolor cessauit. Magnæ nauis gubernatori anchora digitum indicem, & infernum os dextræ manus confregit. inflammatio successit, & marcor, & febris, Subpurgatus est moderatè. Calores lenes, & dolores. de digito quid decedit. Post septimum diem, sanies exibat lenis. postea per linguam dixit se non omnia posse enunciare. Prædictum est opisthotonum aduentare. Ad hoc conferebant maxillæ consertæ, & ad collum rigidæ. Tertia verò die totus conuellebatur in posteriorem partem cum sudore. Sexta à prædictione mortuus est. Harpali filius ex libera Telephane, luxationem infra in pede magni digiti accepit. inflammatus est, & dolorosus erat. & vbi repositus est, & dolor remisit proficiscebatur ad agrum. rediens lumbos doluit, lauit, maxillæ ad noctem conserebantur, & opisthotonus aderat. Salua spumosa vix per dentes foras prodibat. Tertia die mortuus est. Thrinon Damonis filius, habebat circa tibiæ malleolum vlcus, iuxta neruum sanè iam purum. huic à pharmaco corroso contigit, vt opisthotono moreretur. Profectò in omnibus suppurationibus, & his quæ circa oculum sunt, dolores ad noctem. Tusses hyeme, maximè in austrinis, crassa & multa alba excreantibus. & febres succedebant leniter, & quinta die cessabant, Tusses autem circa quadraginta, velut Hegesipoli. Euty- chydes ex cholericis affectionibus, in cruribus ad neruorum distentionem desuit, vnà cum secessu deorsum. Bilem multam abundè coloratam vomuit ad tres dies ac noctes, valdéque rubram. & impotens erat, & anxius. Nihil autem continere poterat, neque ex potibus, neque ex cibis. & vrinæ ac transitus deorsum supressio multa, per vomitum fæx molis prodiit, & deorsum quoque erupit, Androphani

Harpali filius.

Thrinon.

Euty- chydes.

Androphani.

Hippocratis Liber V.

vocis interceptio. ignorantia, delirium. His solutis super-
erat adhuc diu multis annis, & recidiuæ fiebāt. Lingua verò
per totum tempus permanebat sicca. & si non collutione ute-
retur, loqui non poterat, & plerunq; erat valde amara. Ali-
quando etiam dolor ad cor, quem venæ sectio soluit. Huic
aquæ potus, aut aqua mulsa contulit. Veratrum nigrum
bibit. neque biliosum prodibat, sed modicum. Tandem
hyeme decubuit, & mente motus est. & linguæ affectiones
similes. calor tenuis sine dolore. lingua decolor. Vox peri-
pneumonica. de pectore stragula reiciebat, & se educi iu-
bebat. Nihil autem poterat clarè loqui. Ad noctem mor-
tuus est. **Nicanor.** Nicanoris affectio erat, quum ad conuiuium
progrederetur timor tibicinæ: quum sub initium vocis ti-
biæ, in conuiuium tibia canere audiuiſſet, præ timoribus
turbationes. Vix se sufferre posse dixit, quum nox eſſet.
Interdiu verò audiens, nihil commouebatur. Talia comi-
tabantur ipsum multo tempore. **Damocles** qui cum illo
erat, cæcutire, & corpore exoluto eſſe ſibi videbatur: & non
acceſſiſſet ſanè ad præruptum locum, neque trans pontem,
neque minimi ſcrobis altitudinem transgredi poterat, ſed
per ipsum ſcrobem. Hæc per tempus aliquod ipſi aſſuerunt.
Phœnis. Phœnicis affectio ex oculo dextro talis quædam erat, ple-
runque velut fulgur elucere putabat. Quum autem non
diu ipsum continuiffet, dolor ad tempus dextrum inſtabat,
& per totum caput ac collum. Caput intumeſcebat retro
ad verticula. & diſtentio, & duricies circum tendines. & **F**
vbi caput commouere, aut dentes diducere conabatur, non
poterat, vt qui valde diſtendebatur. Vomitus vbi facti fuiſ-
ſent, prædictos dolores auertebant, & leniores faciebant.
Sed & venæ ſectio proderat, & veratri potio. eduxit autem
varia & omnigena, maxime verò praſina. **Parmeni-**
ſcus. etiam prius incidebant triſtitia, & decedendi è vita cupidi-
tas. **Conon.** Quandoque verò rurfus lætitia. Cononis ſerua ex
capitis dolore incipiente, mente mota eſt. clamor. querelæ
multæ. raro quies. Circa quadrageſimum diem mortua eſt.
Adoleſcēs, Decem autem diebus ante mortem voce deſtituta, & con-
uulſa fuit. Adoleſcens quidam multo meraco poto, ſupi-
nus in habitaculo quodam dormiebat. Huic ſerpens Arges
appellatus in os ingreſſus eſt. & ſanè quum ſenſiſſet, & loqui
non

- A** non posset, dentibus stridit, & serpentem deuorauit. & dolore magno tenebatur. & manus prætensas adhibebat, velut qui strangularetur. & iactabat seipsum. & conuulsus mortuus est. Timocharis seruus, ex atrabiliariis esse putatus, à talibus actor viris, similiter mortuus est circa easdem dies. Nicolai filius circa solstitium hybernum ex potationibus horruit. ad noctem febres. postridie vomitus biliosus, merus, modicus. Tertia die quum concio fori adhuc plena esset, sudor totius corporis cessauit. Diopithis sorori in semitertiana, circa accessionem etiam cor grauiter dolens, & concomitabatur etiam is dolor tota die. & huiusmodi cordis dolor etiã aliis similiter aderat. Verumtamen
- B** sub pleiadis occasum, viris talia rariora fiebant. Epicharmi uxori antequam pareret, dysenteria erat. dolor vehemens. secessus recrementa, subcruenta, mucosa. Vbi peperisset, statim sanata est. Polemarchi uxori in morbo articulari, coxæ dolor quidam vehemens. causa erat quòd menses non prodierunt. Vox intercipiebatur, per totam noctem vsque ad meridiem. Audiebat autem & sapiebat, & per manum significabat, quòd circa coxam esset dolor. Epicharmo circa pleiadum occasum, dolor humeri, & grauitas in brachium. anxietas. vomitus multi. aquæ potus. Euphranoris filio pustulæ velut culicum morsus, verum modico tempore. postridie febricitauit. Siccitates multæ post Fauonium factæ sunt, vsque ad æquinoctium autumnale. Sub canem æstus magni. calidi venti. Febres sudorificæ. Tubercula iuxta aurem multis oborta sunt. Tychon in obsidione circa Datum, à catapulta percussus in pectus. & paulo post risus erat circa ipsum tumultuosus. Videbatur autem mihi medicus eximens lignum, reliquissè aliquid de spiculo in septo transuerso. Et quum ipsi videretur, ad vesperam infusum per clysterem adhibuit, & pharmacum deorsum purgans dedit. Noctem primam transegit molestè. Statim verò vbi dies illuxisset, & medico, & aliis, melius haberi videbatur. Erat enim quietus. prædictio facta est, quòd vbi conuulsio fieret, breui esset moriturus. Sequenti itaque nocte molestè habens, in somnis, plerunque in ventrem decumbens, tertia exoriente die cõuellebatur, & tunc mortuus est.
- Billo percusso in deorsum, spiritus multus per vulnus

Timocha-
ris seruus.
Nicolaus.

Diopithes.

Epichar-
mus.

Polemar-
chus.

Euphra-
nor.

Tychon.

Billus.

Y 5

cum

Hippocratis Liber VI.

Phile.
Phanias.
Euergetes.

Aristippus

Neapolis.

Metrodo-
rus.

Carcino-
ma pecto-
ris cur hæc
necauit.

Anginosa
cur mori-
tur.

cum strepitu processit sanguis erumpebat. Vbi vero medicamentum cruentis vulneribus destinatum adhibitum ac deligatum esset, sanatus est. Contigit & infelicissimo Philes filio, denudatione in fronte facta, nona die febris, deinde os liuefactum est. mortuus est. Et Phanix & Euergetæ filio, liuefactis ossibus, & febricitantibus, cutis ab osse discessit, & pus non comparuit. Aristippus in supernum ventrem violenter ac grauiter sagittæ ictu petitus est. ventris dolor vehemens, & breui ardebat. deorsum verò non egerebat. anxius erat. biliosa abundè colorata quum vomuisset, melius habere videbatur. paulò post rursus dolores vehementes, & venter velut in voluulis. calores. sitis. & in septem diebus mortuus est. Neapolis similiter percussus, eadem passus est: acri infuso per clysterem immisso, aluus deorsum erupit. color per corpus diffusus est, tenuis, pallidus, niger. oculi sicci, stupore rigidi, intus conuersi, intuentes in corde. Metrodori filio ex dentis dolore, maxillæ marcor, & gingiuarum carnis superexcrecentia. Moderatè suppuratus est. exciderunt dentes molares, & ipsa maxilla. Mulieri in Abderis, carcinoma obortum est circa pectus. & per mammam fluebat sanies subcruenta. obturata verò fluxione, mortua est. Plerique ex destillatione secundum dimidiam capitis partem dolebant. & humore secundum nares procedente febricitabant leniter. & in quinque diebus perfrigerabantur. Et quæ in partu concussa fuit, dolor circa pectus & latus factus est. excreationes purulentæ. Tabes constitit. Febres per sex dies. Rursus alui profluuium. quies. febris. aluus adstricta est: & circa septimam diem mortua est. Anginosa quædam dextram manum & crus doluit. febris tenebat debilis. strangulatio tertia die remisit. quarta conuulsa, voce destituta, stertor, dentium contritio, maxillarum rubor. Mortua est quinta aut sexta die. Signum circa manum subliuidum. Alia quoque in palato stertorosa. lingua sicca, peripneumonica. non desipiens, mortua est. Et in Olyntho hydropicus, derepente voce destitutus, desipiens per noctem ac diem, mortuus est.

HIPPO

AHIPPOCRATIS

COI DE MORBIS PO-
PVLARIBVS LIBER SEX-
TVS, IANO CORNA-
RIO MEDICO PHY-

SICO INTER-
PRETE.



Quibusque ex abortu circa uterum, & tu-
moribus, ad capitis grauitatem couertitur
& iuxta finciput maximè dolores, & qui-
cunque alijs ab utero: his in octo aut decem
mensibus ad coxā morbus desinit. Acu-
tum habentes caput, qui quidem validam
habent ceruicem, robusti sunt tum alijs, tum ossibus. Qui
verò caput dolent, & aures fluentes habent: his palatum ca-
num est, & dentes inter se non è directo respondentes. Qui-
buscunque os de palato discessit, his medius confidet nasus.
Quibus verò inde vnde dentes prodeunt, his summus nasus
simus fit. Puerorum elucescentiæ simul cum pubertate, in
quibusdam mutationes habent etiam alias. In rhenum do-
lor grauis, quum implentur cibo, vomunt pituitam. Quum
verò redundarint dolores, æru ginola, & melius quidem ha-
bent. Soluuntur autem, quum cibus euacuati fuerint, arenu-
læque fuluæ subsident, & cruentum mingunt, torpor femo-
ris è directo, quiescere non conducit. Sed exercitia, nō imple-
ri, iuuenes verò purgare, poplitem secare, vrinam cienti-
bus purgare, attenuare, & mollire. Menses aquosis diu per-
manent. Quum verò non breui prodierint, intumentum.
In Cranone antiqui dolores frigidi, recentes autem ca-
liidi, ex sanguine verò plurimi, & quæ ex coxa, frigida sunt.
Quæ ad rigores fortes progressa sunt, non valde miti-
gantur, nisi prope vigorem. Ante rigorem vrinarum
suppressiones, si ex bonis fuerint, & aluus egerat, & somni
ad sint, fortassis autem & febris modus, fortassis etiam quæ
ex lassitudinibus Abscessus non valde, quibus rigores.

354
Ligo cap
ho 2 di
off resp
Non contine
in hoc si m
Cnsent

Plinius hinc
plurima
sumpsit.

Menses, sc
minarum.
Cranon.

Lotium cū
retinetur.

Cruentum

Hippocratis Liber V I.

**Tubercu-
la quæ bo-
na, quæ nō**

**Tumor ar-
ticulorum.**

**Lachryma
sponte ma-
nans vel cō-
tra.**

**Oculorum
signa.**

**Febriū dif-
ferentia.**

Crurum effœmationes, veluti si aut ante morbū iter fe-
cisset, aut statim ex morbo: eo quòd fortassis ex lassitudinib.
in articulos abscessit ex quo crurum effœmationes. Tu-
bercula extra extuberantia, & acuta, & fastigiata, & æquali-
ter maturefcentia, & non obdura, & deorsum vergentia, &
non bifida, meliora: contraria verò, mala: & quanto plus con-
traria, pefsima. Ferinum autumno, & oris ventriculi dolo-
res, & horrores, & atra bilis. Circa initia exacerbationes
confidera, & in omni morbo, quale est ad vesperam exacer-
bari, & annus ad vesperam, & ascarides. Infantibus tussicu-
la cum ventris turbatione, ac febre continua, significat post
iudicationem bimestri, in totum vigesima die, etiam tumo-
res ad articulos. Si quidem infrà vmbilicum constiterint, E
in infernis articulis superna, bonum: si verò suprà, non simi-
liter morbum solvunt, nisi suppurata fuerint. Quæ verò in
humeris suppuratur tantillis, mustellæ cubito præditos, par-
uūque ac macilentum brachium habentes faciunt. Sol-
uerit autem & vlcusculorum infernè eruptio, si non rotunda
& profunda fuerint. Talia enim perniciofa etiam aliàs sunt
pueris. Soluerit itidem sanguis fluens. Magis autē in perfe-
ctioribus is apparet. Lachrymę in acutis male habentibus,
vltroneæ quidem bonæ. Inuoluntariæ verò defluentes, ma-
læ. Quibus circumtenditur palpebra malum. Malus est
etiam oculus inarescens, velut spuma, & obscuratio oculorū
mala est. Et squaliditas mala, & qui intrinsecus corrigatur,
& rigentes, & qui vix couertuntur, & qui intus conuersi sunt, F
& quæcunque alia omittuntur. Febres aliæ quidem mor-
daces sunt manui, aliæ lenes. Aliæ verò non quidem morda-
ces, verum augescentes. Aliæ autem acute quidem, sed quæ à
manu vincantur. Aliæ statim adurentes, aliæ semper debiles,
siccæ. Aliæ falsuginosæ. Aliæ inflatæ horrendi aspectus. Aliæ
ad manum humectæ. Aliæ rubicundæ valde. Aliæ valde pal-
lidæ. Aliæ liuidæ, & alia id genus. Distentiones corporis,
& articulorum duriciæ, malum, & ipse dissolutus, & confra-
ctiones articulorum, malum. Oculi audacia delirij signū
est, & oculorum deiectiones ac peruersiones malum.

S E C T I O S E C V N D A.

Dilatare, constringere, alia quidem, alia verò non. Hu-
mores alios quidem expellere, alios verò ficcare, alios
autem

- A** autem indere, & alia quidem parte, alia verò non. Attenuare, crassificare, corpus, cutē carnes, & alia, & aliqua quidem, aliqua verò non. Leuigare, exasperare, indurare, mollire, alia quidem, alia non. Excitare, torpescere, & quęcunque alia huiusmodi. Deriuare, subcedentia statim reuellere, renitentibus concedere. Alium humorem nō prodeuntem ducere, prodeuntem verò simul effundere, operari simile, velut dolor dolorem sedat. Dissimilia, si vergant sursum eleuata, infernē soluere, & contraria per eadem: velut est capitis purgatio, venę sectio, quando non temerē detrahatur. Abscessus velut glandularum tumores, signum quidem sunt earum partium quę germina habent, sed & aliarum. Maximē
- B** verò circa viscera. Maligni autem hi sunt. Spiritus parui densi, magni rari, parui rari, magni densi: extra magni, intus parui: intus magni, extra parui: alius extendēs, alius vrgens: dupla intro reuocatio, velut superinspirationibus, calidus, frigidus. Medela assiduarum oscitationum, spiratio longa. In non potantibus, & vix, spiratio brevis. E directo & laterum & pręcordiorū intentiones, & splenis eleuationes, & ē naribus eruptiones, & aures ē directo. Horum plurima etiam ad oculos. Vtrum igitur omnia? aut quę quidem ex infernis sursum, ē directo: qualia sunt quę iuxta maxillas, aut circa oculū aut aurē? quę verò ex supernis deorsum, non ē directo? Atqui & anginosi rubores, & laterū dolores ē directo. Aut etiā quę infra hepar sunt ex supernis distributa, velut in testes ac
- C** varices? Considerada sunt hæc quò, & vnde, & propter quid. Venę temporum non confidentes, neq; viriditas splendenda, si spiritus intus relinquatur, aut tussis sicca, non ferina: vt in articulos decumbat expectare oportet, ē directo distentionum secundum ventrem vt plurimum. Habent autem horū plurimi, & facies rubicūdas, & ex natura sunt modi albidioris & de naribus sanguis non erumpit, aut parum erumpit. & si quidē ex affusis intus relinquatur, paratus est abscessus. Sitis intus relicta, & oris resiccatio, & iniucunditas, & cibi fastidium, eodem modo. Febres autem non acutę, eiusmodi sunt, verū reuertentes. Quę relinquuntur post iudicationem, recidiuas facere solent. Primum itaque splenis eleuationes, si non ad articulos finierint, aut sanguinis ē naribus eruptio fit, aut dextra pręcordij intensio: si non penetrauerint

Tumores
quid por-
tendant.
Spiritus va-
rietas.

Hippocratis Liber VI.

rint vrinae. Hæc enim est interceptio vtrorunq;, & recidiuæ D horum merito fiunt. Abscessus igitur horum facere oportet, si non fiant, Eos verò qui iam fiunt declinare. Eos autem excipere, si prodierint iam, & qualia oportet, & qua parte oportet. Qui verò non valde, eos coadiuuare. Eos verò auertere, si omnino incòmodi fuerint, maximè si hi affuturi sunt:

Quartanae diurnae.

Tertianae.

Tussis sicca.

Capitis dolens medicata.

Simon.

Oculorum fluxiones.

sin minus, si iam incipiunt. Quartanae sanguinis è naribus eruptiones aggre iudicant. Febres quæ vna die intermittentes, altera superrigēt vnà cum iudicatione, ex quinque ad septem circuitus durant. Quæcunque tertianæ naturam habent, his nox molesta ante exacerbationem: Quæ verò sequitur: tolerabilior plerunque est. Tussis sicca parum irritantes à febre adurente, non pro ratione siticulosa, neque lingua torrefacta, non feritate, sed spiritu. Constat id inde. Quum enim loquuntur, aut hiant, tunc tussunt: quum verò nō, minimè. Hoc autem in febribus ex lassitudinibus obortis maximè contingit. Nihil temere affirmandum, nihil contemnendum. Contraria paulatim facta accessione adhibenda sunt, & interquiescendum. Dolenti capitis partem posteriorem, recta vena in fronte secta profuit. Successione præcordiorum ex quolibus qualia alterant, & viscerum inflammationū qualia possunt, siue ex hepate spleni, & vice versa: & quæcunque huiusmodi. Reuellere oportet, si non qua oportet repunt. Si verò qua oportet, his oscula aperire oportet, qualiter singula repunt. Lata pustula non valde pruriginosa sunt: Quale Simon habebat hyemè, qui vbi ad ignē F inungeretur, aut calida lauaretur, opem sentiebat. Vomitus non proderant. Arbitror si quis calida fomenta adhibuisset, opem ferre potuisse. Quæcunque concoqui oportet, conclusa esse conuenit. Contraria verò ficcare, & aperta esse. Oculorum fluxiones, si aliàs conducere videtur, reuellere ad fauces conuenit. Et vbi eructatio conducit, & quæcunque alia huiusmodi. Transitus apertos esse oportet, veluti nares, & alia quibus opus est, & velut opus est, & qualia, & qua parte, & quando, & quantum opus est, velut sudores, & alia sanè omnia. In magnis malis facies si fuerit bona, bonum signum est. In paruis autem, contraria significans bonæ significationi, malum. Apud magnum Theatrum vbi mulier retrò heroum, morbo regio superueniente permāsit ipsi. Apud

A Apud Temenæ neptim ille nigricantis erat coloris. In **Temenes.**
 Perintho genituræ similis vrina talis, quæ esset iudicatoria, **Lotium ge-**
 etiam pectinis affectionum. Nam huiusmodi vrinæ talia fa- **nitali temi-**
 nant: quoniam neq; flatu multo, neq; stercore multo egresso **ni tale.**
 euacuabantur. Non enim profectò magnum erat præcor-
 dium. Brasicam septima die quis comedit, quum adhuc dif-
 ficulter spiraret, postquam pecten emollitus est, rectè spirans
 factus est: alius ipsi expulit. De sanguine seroso, quoniam **Sanguis se-**
 in pavidis talis, aut in his qui vigilarunt: & siue malus, siue bo- **rosus in q-**
 nus. Quibus splen deorsum vergit, pedes & manus, & ge- **bus sit.**
 nua calida sunt: nasus & aures semper frigida. Num propter **Lienosorū**
 hoc quòd tenuis sanguis? Num & natura talem hi habent? **signa.**

B Suppurationibus vmbilicus terminus, quibus suppuratu-
 ris ventres turbantur. Splen durus non supernè, infernè,
 rotundus, latus, crassus longus, tenuis longus. Minus capitis
 grauedine laborantibus. Circa ægrotantem administra- **Quid me-**
 tio, & de morbo interrogatio: quæ narrat qualia, quomodo **dico agen-**
 accipiendi sermones: quæ ad ægrotantem, quæ ad præsentis, **dum erga**
 quæ ad externos. Quod in calidiore, solidiore, in dextris: **languētes.**
 & nigri propterea, & venæ extrinsecus, & multò biliosiores.
 Concretum est, compactum est citius: vbi motum est, defi-
 nit, & tardius augetur, & ad amplius tempus. Quòd soli-
 dum factum est, & biliosius, & sanguinolentius est: Hic cali-
 dior est locus animali.

S E C T I O T E R T I A.

C Utis raritas, ventris densitas: cutis constrictio, carnum **Caluities**
 incrementum: ventris torpor, vniuersorum confusio: va **caussa.**
 forum immundicia, cerebri consumptio. Quapropter & cal-
 uities, instrumentorum attritio. Detractio cursibus, luctis,
 quiete, multis celeribus deambulationibus, carne ouilla, ma-
 za cocta plerunque, panis modicus. Detractionis signum,
 eandem horam diei seruare, de repente enim trahitur. Re-
 mittito labores, aut defluet. Similiter enim totum concidit.
 Quum verò iam cōciderint carnes suillas affatas exhibe-
 to. Quum autem implentur, signum est, quòd corpus rursus
 floridum sit. In exercitationibus signum, sudor fluens gut-
 tatim, qui exit velut ex canalibus: aut collapsio ex eleuatio-
 ne. Mulier quam primùm curauim in Cranone, splen ipsi ma- **Mulier lic**
 gnus natura, febris ardens, rubicunda, spiritus, decima sudor **nostra.**
 pler

Hippocratis Liber VI.

**Damago-
ra & Arce-
silao quid
in Venere
passi sunt.
Frigus ve-
hemens
quid fa-
ciat.**

plerunq; supernè. Sed & infernè, decimaquarta. Minus his **D**
qui ex capite grauedine ac rauedine laborāt, vbi febre cor-
repti fuerint, recidiuæ velut puto fiunt. Quicquid suppura-
tur, non reuertitur. Ipsa enim maturatio, & iudicatio simul,
& abscessus. Quibusdam vbi venere vtuntur, venter infla-
tur, velut Damagoræ. Quibusdam verò in hoc strepitus, Ar-
cesilao verò etiam intumescebat. Flatuositas simul caussa
est in his qui scapulas alarum modo eminentes habent. Sunt
enim flatuosi. Frigidum valde, venas rumpit, & tussim mo-
uet, velut nix, glacies & constringit, velut sunt eminentiæ
oblongæ & rotundæ, Pherea & Gongronæ, à satyrorum cir-
ca aures eminentiis, & arborum quarundam tuberculis ap-
pellatæ. Simul caussa sunt etiam durities. Post mictionē con- **E**
cretio, pueris magis, num quòd calidiores? Figuræ magis
alleuantes, velut qui sarmenta manu nectebat & obtorque-
bat, præ doloribus decubens, arrepta paxilli summa parte su-
pra seipsum infixæ, inhærebat, & melius habuit. Quæ ex mō-
tano labore circa pontem ego vidi crura iactantem, altera ti-
bia minimè extenuabatur, femoribus autem valde. Vrinæ &
genitura non supprimebantur. Quæcunq; laterum natu-
ræ scapulas alarum modo eminentes habent, propter causas
debilitatem in destillationibus malignis, siue excretio fiat,

**Rigores
vnde inci-
pant.**

siue non fiat, malum. Rigores incipiunt mulieribus quidē
magis à lumbis, & per dorsum, & tunc ad caput. Sed & viris
posteriore corporis parte magis quàm anteriore. Horremus
enim magis exterioribus quàm interioribus corporis parti- **F**
bus, velut cubitis, femoribus. Sed & cutis rarior: Indicat autē
pilus. A quibus autem aliis rigent, fortassis vlceribus, inci-
piunt à vasis. Summa, ex natiuitate, & caussa, & plurimis
rationibus, & paulatim in cognitionem veniētibus colligen-
tem & addiscentem, an similia sint inter se, & an non similia
sint inter se: quo ex dissimilitudinibus similitudo fiat vna.
Sic sanè fuerit via. Sic etiam eorum quæ rectè se habent proba-

**Sanguis de
narib⁹ qui
bus manet,
& pueris
quando in-
cipit.**

batio, & non rectè se habentiū redargutio. Sanguinis ex na-
ribus eruptio, aut subpallidè nigricatibus, aut rubicundè pal-
lentibus, aut subpallidis. Parum demittentem crassefacere
oportet sicco. Aliis verò minus crassificatione opus est. Sic-
co autem opus est albo, velut galla, alumen. Postquam ve-
nere vti inciperint, aut hircire, sanguis ipsis è naribus erum-
pit.

A pit. In accessibus alij quidem strepitum edunt: velut Arce Arcesilaus. Alij verò accessuri, horridi fiunt ac rugosi. Alij postquam accesserint, ventre inflantur, velut Damnagoras. Mutationes cauendæ. Cibus modicus, non delassari, non sitire. Omnis attenuatio laxat cutem, deinde circumtenditur. Renuitritio vice versa. Cutis confidentis corrugatio, renutritæ extensio. Rugosum, leue, vtriusq; signum: itémq; subbiliosum & subrubrum: Sic etiam detractas esse mammas, graciles autem sursum tractas esse & circumtensas, etiam si quis non propterea putauerit id fieri, sed in carnosis. Clauiculæ conspicuæ, venæ pellucidæ. Herodicus febricitantes interficiebat circuitibus, luctis, multis fomentis, mala est febriculofitas, inimica fami, luctis, circuitibus, cursibus, frictioni: laborem labore. Iphis venarum rubor, liuor, pallor, laterum dolores molles. Non sitire faciunt, continere os, tacere, ventum cum potu frigidum inducere. Occasiones vnde ægrota- re cœperint, considerare oportet, siue capitis fuerit dolor, siue auris, siue lateris. Signum sunt dētes, & in quibusdam inguinum tumores, Vlcera fientia ac tubercula iudicantia febres. Quibus hæc non fiunt, iudicatio sublata est: Quibus intus relinquuntur, certissimæ, recidiuæ, accelerrimæ. Sputa rotunda delirium significant, velut in Pleno. Qui Hamor- rhoidas habent, neque pleuritide, neque peripneumonia, neque phagædena, neque furunculis, neque tuberculis terebinthi figuram habentibus corripiuntur, fortassis autem neque lepris, fortassis neque vitiliginibus. Multi tamen intempestiuè curati, talibus non tardè correpti sunt, & sic perniciose fuerunt: & quicunq; alij abscessus, velut fistulæ, aliorum medela sunt. Decubitus humorum ad aliquem locum, in quibus factos affectus liberat, in his prius ipse factus, illos impedit. Alterius loci morbos loca excipientia, aut ob dolorem, aut ob grauitatem, aut propter aliud quiddam liberant, aut quòd aliis sunt communicationes. Propter inclinationem non amplius sanguis prodit, sed iuxta humoris cognitionem talia spuunt. Conuenit quibusdam sanguinem detrahare, tempestiuè in talibus. In aliis autem velut in his, non conuenit. Impedimentum in spuentibus cruenta, tempus anni, pleuritis, bilis.

Damnagoras.

Herodicus.

Hamor-
rhoidas pa-
tiētes a qui-
bus tuti.

Z

SEC

Archige-
nes.

Agasis.

Capitis tu-
mor.Quæ medi-
cus erga læ-
guentes a-
gat.Legumina
in Acno.

Tubercula circa aurem quibus circa iudicationem ex-
orta non suppurata fuerint, his disparentibus recidiua
fit, pro ratione recidiuarum. Recidiua verò fiente, rursus in-
tumescunt, & permanent, velut febrium recidiuæ in simili
circuitu: his spes est ad articulos abscedere. Vrina crassa, al-
ba, qualis Archigenis familia erat, in lassitudinosis febribus
quarta die aliquando prodit, & liberat ab abscessu. Si verò
vltia hoc, etiam sanguis è naribus largè eruperit, etià valde.
Cui intestinum in dextra parte dolebat, & articulari morbo
correptus est: erat quietior. Postquam autē hic curatus fuit,
magis dolebat. Agasis filia quum esset puella, densum spiri-
tum habebat. Mulier autem facta, à partu nō diu dolore cor-
repta leuiter, magnum onus sustulit, & statim quidem in pe-
ctore aliquid crepuisse visum fuit. Postera die & anhelatio-
nem habebat, & coxam dexteram dolebat: & cum hæc dole-
ret, tunc etiam anhelatio habebat: coxæ verò dolore cessan-
te, etiam anhelatio cessabat. Spuebat spumosa, ab initio verò
florida: Vbi verò confidisset sputum, vomitu bilioso tenui si-
mile erat. Dolores maximè erant quum manu laboraret.
Hanc ab alio arcere visum fuit, porròque ac ouicula, & bo-
ue. In rebus autem agendis à clamore, & excādescencia. Cui
in capite tumor depascendo proserpebat, ei primū alu-
men vsum profuit. Habuit alium abscessum, fortè quod os
abscessurum esset, Abscessit sexagesima die supra aurem, sur-
sum ad verticem vulnus erat. Intestina crassa habet, qualia
sunt canis, verū maiora. Dependunt autem ex medianis
membranis, Mesocolis hac parte appellatis. Hæ verò ex ner-
uis, de spina sub ventrem. Aegrotantibus gratificationes, ve-
lut est purè præparare potus ac cibos, & ea quæ videt: molli-
ter ea quæ contingit. Aliæ gratificationes, quæ non magno
pere ledunt, aut facile reparari possunt, velut frigida, vbi hac
opus est. Aliæ gratificationes sunt, introitus, sermones, ha-
bitus, vestitus aegrotanti, tonsura, vngues, odores. Aqua de-
cocta partim vt aërem admittat, partim vt vas non plenum
sit, & operculum habeat. Quod ex sanguinis eruptioni-
bus, aqua inter cutem corripuntur. Si qualia oportet pur-
gari, purgentur, facile ferunt. In Acno legumina comeden-
tes assidua, fœminæ, mares crurum impotentes facti sunt, &
perman

A permanferunt. Sed & eruum comedentes, genuum dolores habebant. Palam vigilans calidior, externis partibus, frigidior autem internis. Dormiens vice versa. Calidæ naturæ frigiditas, potus, aqua, quiescere, somnus in frigore, cōtecto. somnus sedentium, erectorum nictatio. Debiles victus, frigidi: robusti verò calidi. Aquarum arte nō preparatarum, quæ quidem ab æthere excreta est, aut cum tonitruo, æstiuæ: procellosa verò mala. Aqua vorax, vigilia vorax. Per calidam naturam calido tēpore, in frigore cubile crassefacit: in calido attenuat. Exercitatio sanitatis est vesci citra saturitatem, non refugere laborem. Inter vigilandum siti leui somnus medela est. Siti verò ex somno, vigilia in quibusdam. Quibus plurimus calor est, maxima voce præditi sunt. Nam & plurimus est frigidus aer. Ex duobus autē magnis magna etiam quæ generantur existunt. Ventriculo calidi, carne frigidi & tenues, hi eminentes venas habent, & iracundiores sunt. Terra siccitatibus squallida, volucrum genus abundat. Hircire incipiens, vter testis extra apparuerit, siquidem dexter, masculū: si verò sinister, fœmellam protendit. Oculi prout validi fuerint, ita etiam corpus: Sed & color in peius aut melius vergit. Iustum est autem, prout se habuerit alimentum, ita & quod forinsecus est sequi. Si magna lethalia, per cutem, nares, calidus vapor: vbi prius nares frigidum spiritum emiserunt. Signa verò vitalia, contraria sunt. Labores cibos præcedant.

S E C T I O Q V I N T A.

Morborum naturæ medici. Inuenit natura ipsa sibi ipsi aggressiones, non ex præmeditato, partim velut & nictare, partim verò & ea quæ lingua subministrat, & quæcunque alia huiuscemodi, non edocta natura, & nullo magistro vsa, ea quibus opus est facit. Lachrymæ, narium humiditas, sternutationes, auris sordes, oris saliuæ eductio, spiritus introitus, exitus, oscitatio, tussis, singultus, non eiusdem omnino modi. Vrinæ secessus, & flatus, & huius alterius, alimenti, & transpirationis, & ea quæ fœminis solis adsunt, & in reliquo corpore sudores pruritus, corporis distentiones cum oscitatione, & quæcunque huiuscemodi. Hominis anima semper producitur vsque ad mortem. Si verò efferbuerit, vnā cum morbo etiam ani-

Qualitas ciborum & aquarum.

Sanitas. Somnus.

Volucrum abundātia

Oculi.

Mortis & vitæ signa.

Mortis & vitæ signa.

Mortis & vitæ signa.

Hippocratis Liber V I.

ma corpus depascitur. Morbi connutriti, in senecta, & D per concoctionem, & per solutionem, & per rarefactionem desinunt. Sanatio, contra sententiam non consentire affectioni. Frigidum & auxiliatur, & occidit, quæcunque ex calido sunt. Excandescencia retrahit cor & pulmonem in seipsa: & ad caput calida ac humidum. Letitia vero relaxat cor. Labor articulis & carnibus: cibus, somnus, visceribus. Animæ deambulatio est cura hominibus. In vulneribus sanguis concurrit, opitulandum igitur ut vacuum

Dolor au-
ris quæ leue
tur.

Linguae no-
ta varia.

expleatur. Si auris doleat, lana digito obuoluta oleum calidum instillato. Deinde lanam intus in volam manus positam, sub aurem subdito, ut aliquid ipsi exiisse videatur. postea in ignem immittito, Dolus. Lingua urinam signi- E
ficat. Linguae virides cum calore biliosa. Biliosum autem à pingui; Rubicundæ verò à sanguine. Nigræ ab atra bile. Sicca à fuliginoso ardore, & vterina parte. Albæ verò à pituita. Urina concolor cibo, & potui, & qualis intus est humidi colliquatio. Lingua concolor attingentibus ipsam humoribus; quapropter per hanc humores cognoscimus. Si salsa carnes gustanti, redundantia signum.

Sordes au-
ris quid
portendat.
Cibaria
qualia.

Defectio
nis reme-
dium.

Coitus qui
bus pro-
ferat pur-
gatio.

Sanguis
per somnū
intro fugit.
Cibi frigi-
dissimi.

Cucumis
agris.

Si mammarum papillæ, & rubor pallidus fuerit, morbosum vteri vas est. Hominibus sordes in auribus, dulcis quidem lethalis, amara verò non. Terram mutare commodum est in longis morbis. Debiliores cibi breuem vitam habent. In fluxionibus ad coxam, venas retro aures secato. Coitus morbis ex pituita commodus. Calido F
ventriculo præditos, fortes potus ac cibi perturbant. Atra bilis velut similis est hæmorrhoids. Augescentes morbos coitus. Frigiditas ea quæ in ventre sunt indurat. Coitus ea quæ in ventre sunt indurat. Eum qui veratrum bibit, si citius purgare volueris, lauare oportet aut comedere. Sanguis in somno intro magis fugit. Rigor à superiore ventre, febris ab inferiore magis. Attractio, pulmo, siccus ardor; Superuacuatum siccatur & somnus multus. Frigidissimus cibus, lentes, milium, cucurbitæ. Vlcera exoriuntur si quis dum impurgatus est laborauerit. Mulier, capra, elaterium aut cucumerem syluestrem comedentes, pueris purgatio. Calido corpori, id quod comedit, intrinsecus frigiditas est, forinsecus autem dolor à sole, igne, vestitu, in
tempo

De Morbis Popularibus.

359

A tempore æstiuo. Contrario verò contrario modo. Cibi partim celeriter superantur, partim tardè.

Ciborum
varietas.

SECTIO SEXTA.

CArnes attractices, & ex ventre, & extrinsecus. Indicium est sensus ipse, quòd expirabile ac inspirabile est totum corpus. Calidissima venula sanguinis multitudine, id quod fuliginosum est, exerit, & statim secernit. Et quibus quidem pingue, bilis flaua: quibus autem sanguis, atra.

Mentis, memoriæ, olfactus, aliorum etiam famis instrumentorum exercitatio. Labores, cibi, potus, somnus, res venereæ, omnia mediocria. Frigidior in frigido tempore ac regione calidior erit. In doloribus proximum ventrem purgato, sanguinis autem ventrem secato. Vitiatio, sectio, calefactio, perfrigeratio, sternutationes, plantarum succi, in quibus vim habent, & cyceonis mixtura. Maleficorum autem lac, allium, vinum feruefactum, acetum, sal. Homo ex lassitudinibus ex itinere, imbecillus, grauatus, expuit. Tussiuu enim ex vertice. febris acuta, ad manum submordēs. Secunda die capitis grauitas, lingua combusta fuit, naris vnguibuscalscalpta sanguinem non effudit. Sinister splen magnus & durus dolebat. A quartana correpti, à magno morbo non corripuntur, Si verò corripiantur prius, & succedat quartana, liberantur. Pro qualibus qui morbi. Bilis fit, quibus immunes præstet turosq; Deliratio quibus præstet. monia signum est. Turbationes, transitus. Nā mente motis dolores laterum desinunt: quibusdā febres, quibusdā non. Sed cum sudoribus. quibusdā autem cum turbatione, quibusdā verò cutis arida & circumtensa ac salsuginosa.

Torpefactiones quales ex quilibus, & quales illi cui coxa. Per aures, ex auribus, plerunque tertio die moriuntur. Dolor aurium magnus tertio die plerunque tollit. Locorum multatio quos. Quibus cutes circumtenduntur aridæ ac duræ, sine sudore: quibus laxæ sunt ac raræ, cum sudore moriuntur. In reciduiis mutationes profunt. His transmutare oportet ad ea quæ conueniunt, antea quàm male afficiantur, velut Cherioni. Quæ irritantur ex quilibus, stridulæ faciunt asperitates terminum præscribunt. Quibus quidē id quod sanum est, relinquitur, causa deorsum submissa, eos aut purgato, aut deligato, aut eiicito, aut rescato, aut exurito. Quibus verò nō,

Z 3

non.

Hippocratis Liber V I.

non. Quibus sanguis multus fluit ex naribus, qui quidem D
Sanguis de decolores mero modo sunt, his parum prodest. Quibus ve
naribus flu rò colores rubicundi, nō similiter. Et quibus capita sunt quæ
ens quibus facile tolerant, prodest: Quibus secus, non. Quibus nares na
profit. tura humidiores, & genitura humidior ac copiosior, hi mor
Quales sint bosijs sani sunt. Plurimis autem quibus ex morbo, vice
qui nares versa. Sputa rotunda, mentem emouent, veluti illi in Plin
humidasha thio. Huic sanguis ex sinistra nare erupit, & solutus est
bent. quinto die. Vrina multam subsidentiam habens, à men
Rotunda tis emotione liberat, qualis erat Dexippi. Post pilorum
sputa, defluuium, quartana febris non vltra annum. Aurium eru
Dexippus. ptiones æstate quinta die fiunt. Quandoque verò etiam
diutius durant. Ita & circa ginginas, & circa nares suppura- E
Piper den- tiones. Quibus in dentium dolore, de supercilio tenuia
tes iuuat. descendunt, his à pipere probe affricto post die crassiora
descendunt, si etiam alia non obtinuerint. Nam Hege-
sippo soporiferum inditum non obtinuit, sed magis & vio
lentijs insuper prouocauit. Ossium naturam ex capite
colligere oportet, deinde nerudum, & venarum, & car
Natura os- nium, & aliorum humorum, & supernorum ac inferno
sium, ner- rum ventriculorum, & mentis, & morum, & eorum quæ
uorum, ve- per annum fiunt, tempore quodam anni præcociore, velut
narum car- pustula & huiusmodi. Simile enim est his quæ quotidie
nis, & cate citius aut serius accipiuntur. Similiter & biliosum, & san
rorum qui guineum corpus atrabiliarium fit, si non habet euacuatio
cognosca- nes. Lycino postremum splen magnus dolorosus, in quar- F
tur. ta aut quinta.

S E C T I O S E P T I M A.

Tussis. T Viles cœperunt circa solstitia hyberna, decima quinta
aut vigesima die, ex frequenti australium & aquilona-
rium ac niuoforum transmutatione. Ex his aliæ breuiores,
aliæ diuturniores fiebant, & post has multæ peripneumoni-
cæ affectiones. Ante æquinoctium rursus plerisque reuer-
tebatur, quadragesima vt plurimum ab initio die: & aliqui-
bus sanè valde breues ac iudicatu faciles erant, aliquibus au-
tem fauces inflammatae sunt, quibusdam Anginæ obortæ,
quibusdam leues syderationes, alijs Nyctalopes, atq; hi ma-
Anginosi gis pueris. Verum perineumonice affectiones valde breues
Luciosi. erant. Faucium verò inflamationes post tussim, aut omnino
Syderati. parum

A parum pro tussi fiebant, atque hæc breues, magis autem Nyctalopes. Anginæ vero & leues syderationes, aut duræ & siccæ, aut parvæ & raro matura educentes: quibusdam vero etiam valde. Qui igitur aut vocibus amplius se fatigaverunt, aut riguerunt, in anginas magis desierunt. Qui verò manibus laborarunt, manibus tantum syderati ac resoluti sunt. Qui verò equitauerunt, aut amplius iter fecerunt, aut alios labores cruribus perfecerunt, his ad lumbos aut crura impotentia resolutoria obortæ sunt, & ad femora ac tibiae lassitudo ac dolor. Durissimæ autem & violentissimæ tusses erant quæ ad leuem syderationem ac resolutionem perducebant. Verum omnia hæc in recidiuis fiebant. In principiis vero non ita valde. Plurimæ autem tusses in mediis remiserunt, sed perfecte non defecerunt, verum cum recidiua affuerunt. Quibus voces frangebantur ad tussim, horum plurimi ne febricitarunt quidem, Quidam verò parum. Sed neque peripneumonica affectiones ulli horum fiebant, neque leues syderationes, neque ullus alius morbus de se significationem præbuit, sed in sola voce iudicabantur. At verò Nyctalopica affectiones firmabantur, ut quæ etiam ex aliis causis fiebant. Fiebant autem pueris maximè. Oculorum autem nigrae partes aliquantum variegabantur, quæ pupillas parvas habebant. In summa oculus niger ut plurimum erat. Et magnos magis quam paruos oculos habebant, & plurimi rectos capillos ac nigros. Caterum mulieres non similiter à tussi afflictæ sunt. Verum pauca febricitarunt, & ex his valde pauca ad peripneumonicam affectionem deveniunt, atque hæc seniores, & omnes superstites evaserunt. Causabar autem hoc fieri, eo quod non similiter velut viri prodiret, & quod nequaquam similiter ut viri morbis corripuntur. At Anginæ liberis duabus oboriebantur, atque hæc mansuetissimi moris erant: abundantius autem famulas corripiebant, quibus & violentissimæ fiebant, ipsasque celerrime perimebant. Viris verò multis fiebant, qui partim evaserunt, partim perierunt. In summa, qui solum deglutire non poterant, his valde mites ac toleratu faciles erant. Qui verò etiam insuper obsecrè loquebantur, his molestiores ac diuturniores. Quibus verò etiam venæ circa tempora & cervicem attollebantur, his aliquantum malæ erant. Pessimè vero his

Vocis labor & cæterorum quæ ferat.

Tussis varietas.

Luscioni pueri quæ fierent.

Mulieres aliter vexabantur.

Anginæ vexatio.

Hippocratis Liber VI.

verò his quibus & spiritus sublimis coeleuabatur. Hi enim **D** etiam incalescebant. Nam sicut scriptum est, ita consortia affectionum habebant. Et quæ quidē primū scripta sūt, etiam sine posterioribus fiebant. Quæ verò posterius, non sine prioribus. Celerrimè autem moriebantur, vbi febrili rigore insuper riguissent. His ita pressis nihil memorabile proderat, non ventris turbatio, non venæ sectio, neq; quæcunque alia tentauit. Secui etiam venam sub lingua, quosdā & sursum purgauit. Hæc igitur omnino in æstate fiebant, sicut etiam eruptiones omnino multæ, & potissimum in siccitatibus lippitudines dolorosæ populariter grassabantur.

Sanguinis venarū suppressiones faciunt animi deliquium. fiura alterata, interceptio, linamētum intortum, appositio, E deligatio. Inguinū glandularūque tumores plurimi fiebant, eo quòd hepatitis affecta esset. Erat autem & ab arteria male affecta malum signum, veluti Posidonix.

Posidonix. Quibus sanguis erumpebat, morientes fronte non exudarunt, sed velut contracti præ siccitate erant. Et anhelosi, ac cum sudoribus pereuntes, male habebant. Ventriū abundantia turbationē ferunt, velut Posidonix: & quæ animalcula in aluo inducunt. In attenuatione circūtentio ante obitum, & vmbilicus oblongus ipsi protractus est: & gingiuarum dentes ambientium exulcerationes. Multa de vnoquoque rectè præcipi possunt, quæ partim eadem possunt, partim non: velut est talia diffundi, exolui, & educi, & indurari, & maturari, & vbi mutatione opus est, de lecto propellere timidos, & torpentes excitare ad ea quæ relinquunt.

Hydropicos citius secare oportet, tabelcentes statim vire, caput secare, & huiusmodi. Hydropicorum pectinem ne contingito, neque internas partes. Simile est enim multigenibus. ~~Affectiones circa cor sine~~ ventriculo osculum

Xenarchus Xenarcho, & calidum aceruatim exspirare, & vlcus per euacuationem ab initio fouere. Vox qualis est irascentibus, si talis fuerit non irato, ex natura fuerit. & oculi tales fuerint ex natura turbulenti, quales sunt vbi irascuntur hi qui tales non sunt. Et alia iuxta morborum rationem, velut verbi causa, Morbus tabidam speciem inducit, si talis ex natura **Tabes.** ~~ager fuerit, ex tali morbo superstes euadet:~~ & alia eodē modo. **Tussis sic** Tusses laboriosæ contingunt locos læsos, & ~~maximè~~ articulos.

A articulos. Sed & in febribus lassitudinem inducentibus, tussis sicca ad articulos decumbunt cum febre, si intus relinquuntur. Spiritus tabescentibus obscuri mali, & non patientibus, & quicumque alij tales ab eadem constitutione.

Tabescentibus autumnus malus. Malum item ver, quum
fici folia cornicis pedibus similia fuerint. In Perintho ve- **Perinthus.**
 re plurimi ægrotarunt. Simul causa fuit tussis per hyemem populariter vagata, & aliis quicumque diurni sunt morbi. Nam & in ambiguis confirmati sunt. Quibusdam verò diurni non sunt oborti, velut his qui dolores rhenales habent. Sed & aliis, velut homo ille ad quem Cyniscus me adduxit.

Dolorum in lateribus, & pectore, & aliis partibus, tem- **Cyniscus.**
Bpora an multum differant considerandum est. Nam quum melius habuerint, rursus deterius habebunt, non delinquentes. In longis dysenteriis cibi fastidia mala, tum alias, tum si insuper febrierint. Ulcera circumglabra maligna sunt.

Lumbos dolenti recursus ad latus, & pustulae quæ seps vocantur. Rhenum affectiones non vidi sanatas supra quinquagesimum annum. Quæ in somnis exacerbatur, & quibus extremæ partes perfrigerantur, & mens turbatur, & alia quæ circa somnum fiunt eiusmodi: & quibus contraria.

Quibus nihil intra constitutum tempus accidit, singulis partus vitales fiunt. Apparentia in quibus mensibus fiunt.

Labores in circuitibus, quicquid in septuaginta mouetur, in triplicitate perficitur: & quicquid in nonaginta mouetur, **C**in triplicitate perficitur. Post menses, dextera & sinistra hiant. Humiditas per prodeuntia, diæta sicca opus habet.

Quod citius discretum ac motum est, rursus augefcit tardius, & ad longius tempus. Labores tertio, quinto, septimo, nono mense: & secundo ac quarto.

Hæc ex parua tabula consideranda sunt.

Victus ratio fit repletionem, vacuationem, ciborum, potuum. Mutationes horum qualia ex qualibus, prout se habent.

Odores delectantes, offendentes, implentes, placantes. Mutationes ex qualibus, prout se habent. Illabentes ingressos aut egressos spiritus, aut etiam corpora. Sermones qui audiuntur, alij meliores, alij offendentes. Et à lingua ex qualibus qualia alliciuntur. Spiritus tanta calidi-

Z s

tas,

Hippocratis Liber V I.

tas, frigiditas, crassities, tenuitas, siccitas, humiditas, plenus, D
imminutus & copiosior, à quibus mutationes, quales ex qua-
libus, prout se habent. Continentia, aut contenta, aut in-
tus permeantia corpora. Sermonibus, silentio, dicere quæ
mult. sermonibus quibus dicit, an magni aut multi, veri aut
conficti. Prodeuntia & egressa nosse oportet. ~~sermonibus~~
runt: aut vbi desuerunt, aut quantum diuulsa sunt, itémque
colores, in quibus aut caliditatem, aut falsuginem, aut dulce
dinem, aut tenuitatem, aut crassitiem, æqualiter aut inæqua-
liter, corpus, tempus: Mutationes quales ex quilibus habent.

Incepit eructationem, non obtinuit, Lachrymæ volen-
ti, nolenti, multæ, paucæ, calidæ, frigidæ, crassities, sapor.

Sputum an per se excreet, aut tussiendo reiiciat, itémque E
vomitum. Solis calor, frigus, humectatio, siccitas: Mutatio
per qualia, ex quilibus, ad qualia se habet. Labores, ocia,
somni, vigilia. Quæ in somno fiunt, insomnia, cubilia, &
in quibus, & ex quibus. Mentis intelligentia ipsa per se-
ipsam, citra instrumenta ac negotia, tristatur, lætatur, timet,
confidit, sperat, velut Hippothoi domestica famula mentis
suæ per seipsam gnara erat: & quæ in morbo acciderat scie-
bat. Aetatem ab ætate discernere, oportet, & an prius aut
posteriorius quàm cōuenit, quid fiat veluti si resolutus est hye-
me, & seni ætate, aut infanti, & ætate aut prius, aut posteriorius
quàm conuenit. Dentium emissiones, pilorum productio-
nes, genitura magis & minus, pilorum augmentum, crassi-
tudo, robur, imminutio, quod cognatum est, & quod per se F
ipsum, quanto magis & minus. Anni tempus, in quo & ci-
tius aut serius. Tempus in quo factum est, pluuiosum aut
siccum, frigidum aut calidum, sine ventis aut cum ventis, &
qualibus ventis. Temporis in principio, aut medio, aut fine,
aut semper, præterito aut præsentē. Morbi tempus & ho-
ra, accidentia, circuitus, & ex circuitibus maiores, & per am-
plius tempus: incrementa, & totius morbi incrementum, re-
missio, vigor, & magis & minus perficiens, & quādo, & qua-
liter, & in quali hora ac ætate. Populariter grassantium
morborum modi, & si quis ex incipientibus incepit sine
vomitu, veluti aut vbi biberunt quid cōtinentes, aut parum
purgati. Febriculosi fortassis valde candidi, quorum etiam
labia, qualis modus, tempora. * Corpus, actio, in considera-
tionem

Hippo-
thous.
Quæ obser-
uanda.

Ationem ducatur. Visus, auditus, nasus, tactus, lingua, cogitatio consideretur. Tumores in supernis palpebris relictum alia circumcirca gracilesunt, recidiuas faciunt: In extremitate verò subrubicundi, duri, & valde viscosi, & insurgentes ac inhærentes in his sunt, velut Pharsalio Polymedi. Erumpentes tumores aut liuores, in lippitudinibus aut vlcerebus: Sed & quæ deferuntur ex tuberculis ac suppurationibus, quia signa sunt. Circa mensē tormina circa vmbilicum, & dolores, quādoque à porro: Sed & ab alio his postea. Sacri ignes quibusdam à collo, & circa has partes, in facie iudicabuntur: Nigri etiam quibus à collo, mali erant: & si pustulæ essent, malæ erant: & quibus alius turbata esset. Adamantus atrabiliarius à peplis pluribus vomuit aliquando nigra, quandoque à cepis. Febres in quibus vlcerantur labia, fortassis intermittentes: & tertianis perfrigerationes. At amburètes statim ad manum soluuntur semper. Quale inest in articulis considerandum, an non suppurantur. Consuetudo autem, ex qualibus sanidegimus, victus modis, tegumentis, laboribus, somnis, rebus venereis, mentis affectionibus. Quomodo morbos ferant, à quibus quæ figuræ, ad quos locos conuersi sunt, quando cœperunt, affuerunt, desinuerunt. In quibus intemperans horrendus. Contrariæ in morbo victus rationes, qui facile, qui agrè toleratur. Victus rationes quantum fieri potest cognoscendæ. Nam non nosse, multarum calamitatum res est. Bonis autem medicis similitudines pariunt errores ac difficultates. Verum contraria facit causa & occasio. Scio quod difficile est ratiocinari ac cognoscere vias, veluti si sit acuto capite, simus, subaridus, biliosus, agrè vomens, facile vomens, niger, iuuenis qui temerè vitam degit: Hæc simul inter se consentire difficile est. Cui fistula refringebatur, tussiculæ permanere impediebant. Cui apex hepatis complicatus erat, eum concussidere repente dolor sedatus est. Satyrus in Thaso cognomento Grypalopex vocabatur, hic quum annorum viginti quinque esset, sæpe per somnum semen effudit: & interdum quoque frequenter ipsi prodibat. Quum autem ad annum trigesimum peruenisset, tabidus fiebat, & mortuus est. In Abderis palæstræ custos, qui Stheneus dicebatur, multum

Polymedes.

Adamantus.

Quanta observatione dicorū debeat esse.

Satyrus pollutione mortuus est.

Hippocratis Liber VI.

palæstræ tum luctatus aduersus fortio-rem, & in caput lapsus, digres-
custos. sus multam bibit frigidam aquam. Postea illa nocte vigilæ
 obortæ sunt, angustia, & extremarum partium frigiditates.
 Postridie ingressus ad domum, & glandula aluo subdita, non
 subiit, verum parum minxit, prius autem nihil minxerat: ad
 noctem lauit, nihilo minus vigilæ & angustia aderant, de-
 lirauit. Tertia die frigiditas extremarum partium, excalefa-
 ctus sudauit, pota autem aqua mulsa tertia die mortuus est.

Melancholi Atrabiliarij, etiam comitiali morbo corripitur plerunque so-
ci comitia lent, & vicissim comitiales fieri solent atrabiliarij. Vterque
lèsque cō- verò morbus magis fit, prout ad alteram partem inclinari-
municant. Si quidem enim ad corpus inclinari, comitiales fiunt. Si ve-
Phaethusa rò ad animum, atrabiliarij Melancholici dicti. In Abderis
Pytheas. Phaethusa Pythæ vxor, priore quidem tempore fœcunda
 erat: quum autem maritus ipsius in exilium abiisset, menses
 multo tempore suppressi sunt, postea dolores & rubores ad
 articulos oborti sunt. Hæc autem vbi contigissent, & corpus
 virile factum est, & hirsuta penitus euasit, & barbam produ-

Mensiu de xit, & vox aspera facta est. Et quum nos omnia tentassemus,
fectu mo- quæ ad menses detrahendos conferre visa essent, non prodie-
ritur. runt, sed mortua est, quum non ita multo tempore postea vi-
 xisset. Idem hoc contingit etiam Namyssiæ Gorgippi vxori
 in Thaso. Visum est autem omnibus medicis, in quos sanè
Namyssiæ ego incidi, vnam spem esse, si menses secundum naturam
Gorgippus prodirent, Verum & huic prolici non potuerunt omnia no-
 bis molientibus, sed paulo postea mortua est.

HIPPOCRATIS

COI DE MORBIS PO- PVLARIBVS LIBER SEPTI- MVS, IANO CORNA- RIO MEDICO PHY- SICO INTER- PRETE.

Post

A



Ost canem febres fiebant sudorifice, & non perfrigerabantur penitus ^{Canis sy-} ^{ce,} post sudorem, sed rursus incalescebant: & leniter longæ, & iudicatu ^{rus.} difficiles, & non valde siticulose, paucis in septimo & nono desinebant, aliis vndecimo, & decimoquarto, & decimoseptimo. Polycrati fe- ^{Polycra-} ^{tes.} bris, & sudor, qualis descriptus est, à

medicamento purgatio deorsum vehementer, & febris adeo lenis facta est, ut obscura consisteret, præterquam in temporibus, & sudores ad vesperam, circa caput, collum, pectus.

B Deinde rursus etiam per totum ventrem, & rursus incalescebat. At circa duodecimum & decimumquartum febris aucta est, & modicæ alui subegestiones, post purgationem usus est sorbitionibus. Circa decimumquintum dolores ventris iuxta splenem, & sinistram lateris mollitudinem. Calidorum appositio minus profuit quàm frigidorum. Quum infuso per clysterem molli usus esset, cessavit dolor. Idem quoque Cleocydi profuit, ad dolorem similiter habentem, itémque febrem. Circa decimam sextam calores leniores esse videbantur, & egestiones bilis meracæ, & animus audacior, spiritus autem moderatus. Quandoque verò aceruatim attractum, rursus aceruatim expirabant, velut præ animi deliquio, aut velut in umbra desidens respirare solet, is qui per æstum iter fecit. Decima septima itaque die desidens in sellam, animi deliquium incidit, & multo tempore sine voce ac sensu iacebat, & vix aquam mulsam suscipiebat, fibras in collo distendens, utpote faucibus resiccatis, ac omni virium exolutione præsentem. Vix itaque intra seipsum erat, & calores leniores fiebant. Postea verò desuit morbus vigesima secunda die. Pythodoro eodem ^{Pithodo-} ^{rus.} tempore febris continua, octavo die sudor obortus est, & rursus incalescebat. Decima rursus sudor, duodecima sorbuit succum, & usque ad decimam quartam obscura erat, in temporibus autem comparebat, & sine siti erat, & ipse sibi ipsi sanus esse videbatur. Sudores fiebant omni die. Decima quinta iusculum pulli sorbens vomuit bilem, & aluus infra exturbata est, & febris exacerbata est, rursus desuit, & sudores

fiebat

fiebant multi, & corpus totum perfrigeratum erat, exceptis **D**
 temporibus. Pulsus non defecit. Videbatur quieuisse modico
 tempore vt incalescere se putaret. Vigesimaquarta quum
 iam gustaret cibos multis diebus, & pransus esset, multa erat
 febris, & ad vesperam delirium, accedente simul etiam som-
 no. Detinebat itaque iam continua & vehemens, & quando-
 que vnā, quandoque duas noctes vigilabat: reliquo verò
 tempore somnus abundè contingebat, vt operosum esset ex-
 citare, & delirium in somno, & si quando ex somno excitatus
 esset, vix ipse sui ipsius erat. Sitis exors. Spiritus moderatus,
 talis aliquando, qualis Polycrati. Lingua non decolor. Post
 septimam recidiua rucci exhibebantur, post decimam quar-
 tam cibus. Circa primos septem eructabat, ac remouebat: **E**
 quandoque cum potu subbiliosum, citra anxietatem, donec
 alius deorsum soluta est. Sudores post recidiuam defecerunt,
 nisi quis circa frontem esset tantillus vt vix significationem
 de se præberet, lingua ex somno si non collueretur, subalba
 præ siccitate, & ruptiones vlcerum circa ipsam, & in labio
 inferno, & circa dentes, alui egestionis pauca. Circa decimā-
 quintam vt recidiua facta est, frequentiores & viscosæ. De-
 coctum malicorij sedauit ipsas. Vrinæ quales sunt diuturnæ.
 Sub vltimum tempus dolor pectoris deglutienti potum, &
 manus in pectore. Cuminum & ouum absorbenti sedatus est.
 linguae raritas profuit. Quinquagesima à prima circa arctu-
 rum, sudores breues iuxta lumbos & pectus, & corpus perfri-
 gerabatur, exceptis temporibus, valde modico tempore. Pri- **F**
 ma & quinquagesima remisit, nec iterum apprehendit. Era-
 tolaus. Eratolai filius circa æquinoctiū autumnale dysentericus fiebat,
 & febris tenebat. Egestionis alui erant biliosæ, tenues, mul-
 tæ, & moderate subcruentæ. Dolor autem ventris vehemens.
 Vbi serum & lac bibisset, filice candefacta immissa, dolores
 & subcruentæ egestionis moderatiores fiebant, sed biliosæ
 comitabantur: & sæpe ad exonerandam aluum surgebat, sed
 minore dolore. Febricula verò & agroto, & multis, omnino
 nō adesse videbatur per omne tempus, post primos sex dies,
 adeò obscura erat. Verum iuxta tēpora pulsus erat, & lingua
 præ siccitate subalba, & moderatè siticulosus, & sine somno.
 Sorbitionibus autem iam utebatur & vinis. Quum iam ad
 decimum quartum diem peruenisset, tubercula circa aurem
 oborta

Eratolaus.

Tubercula
aurium.

A oborta sunt, tum alteram, tum vtranq; dura ac cruda: omnia disparuerunt, moderatè autem dolorosa erāt. Quum autem non desinerent egestionēs, & semper biliosæ essent, absorben-
 ti herbam in farina, biliosæ egestionēs & dolores ad tempus aliquod mitiores facti sunt: liquidas verò multas sæpe ege-
 rebat, & cibos valde auersabatur, & omni necessitate co-
 ætus admittebat. Calor autē, & lingua, & sitis tales sequeban-
 tur quales dicti sunt: & sudores nulli. Obliuio verò huiusmo-
 di quædā. Vbi interrogasset de eo quod paulò antea audiuis-
 set, modico interposito tempore rursus interrogabat: & rur-
 sus repetebat, velut qui non dixisset: & se desiderare obliuiscer-
 batur, nisi quis ipsum commonefecisset: & ipse sibiipsi con-
 scijs erat huius affectionis, neq; ignorabat. Spiritus qualis sa-
 no. Vltra trigesium verò vsq; ad quadragesimum diem, &
 dolor vètris multum augescebat, & supinus decumbebat, &
 se conuertere ne tantillum quidem poterat: & quia dolor ve-
 hemens erat, alijs qui cibum exhiberēt opus habebat. Alui
 egestio erat multa, & discreta, tenuis, & colores vinosi, quæ-
 cunque tandem ingessisset, & quandoque subcruenti, & cor-
 poris dolor: colliquatio extrema, & impotentia: & ne alio
 quidem subleuante surgere amplius poterat. In medio verò
 vmbilici ac ovis pectoris, circa hanc sedem adhibita manu,
 talis palpitio erat, qualis neque à cursu, neque à timore circa
 cor generari possit. Bibenti lac asininum coctum, nouem
 heminarum Atticarum mensura ad duos dies, biliosa purga-
 tio vehemens oborta est, & cessauerunt dolores, & ciborum
 appetentia accessit. Postea verò bubuli lactis crudi quatuor
 heminas Atticas bibit, pro vice vna cyathos duos, in diem,
 primū sextam aquæ partē ammiscens, & vini nigri austeri
 parum. Semel autem in die cibum capiebat ad vespērā. Pa-
 nis erat ad mensurā dimidiæ chœnicis subcineritius, & pi-
 sciculus petrosus simplex, aut caruncula capræ aut ouiculæ.
 Potus lactis post primos decē dies, ad quadraginta vlque sine
 aqua, cum vini nigri modica parte. Post septuagesimum iam
 à primo diē, à balneo ad noctem, sudor exiguus obortus est.
 Vtebatur autem modico potu, & post cibum potu austerio-
 re. Ctesicratī lac in farinā magis quàm serum caprinum con-
 tulit, quum dolor esset circa totum ventrem, & dolores cum
 multa ad egerendum surrectione, ac subcruenta egestionē,
 & tunc

Obliuio
huius quæ.

Ctesicra-
tes.

Adrianus.
Caneas.
Cydes.

& tumor circa pedes, ferè iam ad dies viginti quinque esset. **D**
Et Adriano eadem contulerunt. Verùm Caneas filio lac
asini coctum. Cydis filio circa solstitium hybernū
rigor & febris, & auris dextræ dolor, & capitis dolor. Talis
autè auris dolor statim à paruo puero ipsum comitabatur,
fluidus, fistulosus, & grauis odoris. Quum autem ita se habe-
ret, plerunque doloris exors erat. Tunc autem dolor erat ve-
hemens, & capitis dolor, secunda aut tertia die bilis vomit-
us: desidenti exonerandi ventris gratia, prodiit excremen-
tum subbiliosum viscosum, velut ex ovo subpallidum. Quar-
ta & quinta ad noctem aliquantum delirabat: & dolor capi-
tis ac auris vehemens, & febris. Sexta alui egestio à mercuri-
ali: & calor, & dolor cessasse videbatur. Septima velut san- **E**
nus. In temporibus autè dolor non defecit, sudor nullus ob-
ortus est. Octaua succum sorbuit, ad vesperam autè betæ suc-
cum, & in noctem somnus: & valde doloris exors: & nona læ-
tabatur ad solis occasum. Verùm ad noctem capitis & auris
vehemens dolor. Contigit quoque aurem pure manare cir-
ca hoc tempus quum maximè doleret statim à principio. To-
tam verò noctem nonam, & sequentem diem, ac noctis ma-
gnam partem, neminem noscebat. Verū suspirans perseuera-
bat, in die verò intra seipsum erat: & dolores cessabant, & ca-
lor moderatior erat. Quum autè sorbuiisset mercurialem,
vndecima egeat per aluum pituitosa, mucosa, maleolentia,
duodecima & decimatertia moderatè habebat. Decima-
quarta initio mane facto, vsq; ad meridiè per totum corpus **F**
sudabat cū somno & sopore multo, vt operosum esset ipsum
excitare: ad vesperam expectatus est, & corpus quidem mo-
deratè perfrigeratum est, in temporibus autem pulsus perse-
uerabat: decima quinta & decima sexta succis vsus est. Deci-
ma septima venit rursus dolor eorundem ad noctē, & deli-
rium: & pus fluabat. Decima octaua & decima nona ac vige-
sima, insani modo degebat. Vociferabatur autem attollere se-
ipsum nitens, sed capiti dominari non potens, manibus pro-
tentis semper aliquid frustra venabatur. Prima & vigesima
sudor exiguus circa latus dexterum, & pectus, & caput. Vige-
sima secunda sudor circa faciem plurimus erat. Voce autem
hoc tempore, si quidem valde conaretur, quæ volebat perfe-
ctè loquebatur. Si verò ex tempore citra conatum semiper-
fecta

A fecta, & os exolutum, & maxillæ & labia semper in motu, velut qui loqui vellet, & oculorum frequens motus ac intuitus, & color in dextro oculo velut dictum est, subcruentus, & palpebra superna intumuit, & iuxta maxillam rubor in fine, & venæ omnes in facie manifestæ adeoque contractæ, & oculis non amplius nictabat, sed intentè intuebatur, & palpebras diducebat ad supernam partem, velut fieri solet ubi quid in oculum incidit, & quum biberet, descendens potus in pectora & ventrem strepitus audiebatur, qualis & Charadi. Spiritus leniter semper moderatus, lingua qualis est peripneumonici cum pallore albicans, ab initio & semper capitis dolor. Collum semper immobile ut vnâ cum capite circummageretur opus habebat, & pars secundum spinam ex collo recta ac inflexibilis, decubitus quales dicti sunt, & non semper supinus decumbebat. At pus iam serosum album, multum negotij ad detegendum cum spongiis exhibebat, odor eius valde excellens, circa postremum tempus pedum contactum non valde percipiebat. Harpalidæ sorori prægnanti circa Harpalidæ quartum aut quintum mensem, tumores circa pedes aquosi *soror.* fiebant, & oculorum cavæ partes intumescebant, & totum corpus in tumorem eleuatum erat, velut in pituita alba affectis, tussis sicca, rectæ cervicis spiratio, & eiusmodi anhelatio, & quandoque strangulationes à spiritu, ut sedens in lecto perseveraret, decumbere autem non poterat, sed etiam si qua somni expectatio esset, desidebat. Sine febre erat leniter, & fœtus ad plurimum tempus immobilis erat, veluti corruptus, & translabebatur. Comitabatur autem anhelatio ferè ad duos menses. At quum fabis melle ammixto, & eclegmate mellis vsa esset, & Aethiopicum cuminum in vino bibisset, melius habuit. Postea tussiendo eduxit multa, matura, pituitosa, alba, & spiratio illa cessauit, peperit autem fœtummellam. Polycratis vxori æstate circa caniculæ sydus *Polycrates* febris. Spiritus matutinus minor, à meridie magis & paulò densior spiritus. Tussis & excreatio statim ab initio, similis purulentis. Intus circa arteriam & fauces subsibilabat stridula asperitate, facies boni coloris, in maxillis rubor, non abundè coloratus, sed leniter floridus. Progressu verò temporis & vox rauca, & corporis colliquatio, & circa lumbos eruptiones, & alius circa postremum tempus liquidior. Septuage

Hippocratis Liber V I I.

ptuagesima die febris extrinsecus valde frigit, in tempori-
bus autē quies. Spiritus verò frequentior fiebat. Verum post
hanc quietem spiritus densior, adeò vt sedens perseveraret,
donec mortua est. In arteria strepitus multus inerat, sudores
pravi, intuitus valde modesti, vsque ad extremum tempus.
Dies accesserunt ipsi perfrigeratæ plures quam quinque.

Vetula lan-
guens eua-
sit.

Post primos autem purulentum excreare perseverabat.
Mulieri supra portas habitanti iam seniori febricula obor-
ta est: quæ quum iam desineret, colli dolor vsque ad spi-
nam & lumbos, & harum partium non valde potens erat.
Maxillæ erant compactæ, & dentes in seipsos, plus quam
vt specillum admitterent, & vox balbutiens, eo quòd reso-
lutum, & immobile ac debile esset corpus, prudens tamen
erat. Calefactoriis & aqua mulsa tepida, tertia ferè die
Vnctor. hæc laxavit, & postea succis & iusculis sana euasit, id quod
ad finem autumnalis temporis contigit. Apud Harpalidem
vnctor, crurū ac manuum impotētior circa autumnum fa-
ctus, bibit temerè medicamentum sursum ac deorsum pur-
gans, ex purgatione febris, & ad arteriam defluebat suor,
qui loquentem impediret, & faceret vt inter loquendum an-
helaret, similiter vt anginosus raucosus. Strangulatio deglu-
tienti, & alia quæ in angina. Verum tumor non erat. Febris
autem & tussis augetur, & excreatio liquidæ ac multæ
pituitæ. Progressu temporis & dolor circa pectus ac mam-
mam sinistram. Quum autem exurgeret, aut cōmoueretur,
anhelatio multa, & sudor à fronte & capite, & faucium affe-
ctio mollior erat, dolore ad pectus descendente. Ab initio
igitur fabis melle ammixto utebatur. Postquam autem fe-
bres detinebant, magis aceto mulso calido, & mellis delin-
ctu multo. Vbi præteriiissent dies quatuordecim omnia desi-
uerunt, & manuum ac crurum non longè postea potens fa-
ctus erat. Chartadi febris ardens, vomitus bilis multus, &
infra alui egestio, vigiliæ, & iuxta splenem tumor rotundus.
Tertia die mane surrexit, strepitu circa ventrem citra do-
lorem percepto. Vbi verò aluum exoneraret, sanguinis re-
centis plus quam congi mensura subiit, & vbi iterum atque
iterum cohibuisset, grumi concreti, anxietas circa cor & os
ventriculi & sudor per totum ferè corpus, & febricula frige-
scere videbatur, & primū prudens erat, progrediēte verò
die, &

A die, & inquietudo maior, & anxietas, & spiritus paulò densior, & confidentius ac benignius quàm pro tempore homines compellabat, ac excipiebat, & quædam animi deliquia accedere videbantur. Quum autem exhiberent aliqui succos, & aquam de farina crassa in ipsa macerata, non cessauit: sed spiritus, ad vespërâ valde multus erat, & iactatio multa, & ad dexterâ, & ad sinistra transmouens seipsum nullo tempore quiescere poterat, pedes frigidi. In temporibus & capite calor magis propinqua iam morte, & sudores multi, & bibenti strepitus audiebatur, circa pectus & ventrè descendens potus. Quod verò pessimum erat, vbi dixisset sibi aliquid infra subire velle, & oculis intente intutus esset, non diu se cohibens mortuus est. Hermoptolemi vxori hyemis tempore febris, & capitis dolores, & quum hibisset, vt quæ difficulter deglutiret, surrexit, & cor se sanasse dixit, lingua liuida ab initio. Occasio videbatur ex horrore post balneû facta esse. Vigilabat & nocte & die. Post primos dies interrogata, non adhuc solùm caput, sed & totum corpus se dolere dixit. Sitis quandoque vehemens, quâdoque moderata. Quinta & sexta & vsque ad nonam fermè delyriû, & rursus ad seipsam loquebatur semiperfecta cum sopore, & aliquândo manum ad dealbatum parietem protendebat, & puluinum quædam frigidum ad caput situm, etiam pectoribus adhibebat, & stragula quandoque reiciebat, & in oculo dextro subcruentum quid erat, & lachrymabatur. Vrina autem erat quæ in pueris semper pessima est. Ex aluo egerebat ab initio quidem subfulua, postea verò aquosa valde, & huiusmodi coloris. Vndecima moderatius calida esse videbatur, & quandoque sitis exors fiebat, adeò vt nisi quis dedisset, non peteret. Somni post primùm tempus contingebant moderatè interdium, ad noctem vigil erat, & ad noctem magis dolebat. Nona venter exturbatus est aquosis excrementis. Similiter etiam vndecima. Sequentibus verò moderatè multum ad egerendum surgebat, & talis egestio erat. Erant autè in prioribus diebus indignationes & ciulationes, velut pueri, & vociferatio, & timores, & circumspectiones, vbi sopore excitata esset. Verùm decima quarta operosum erat ipsam continere exilientem ac clamantem derepente & pertinaciter, velut ex plaga, & vehementi dolore ac timore, velut si quis ipsam

Hermopro-
lamos.

Hippocratis Liber VI.

apprehensam modico tēpore detineret. Deinde rursus quie- **D**
tem habebat, & sopore pressa dormiens perseverabat omni-
no non videns, quandoque neque audiens, & totam hanc
diem ad utrumque, modo ad tumultus, modo ad quietem
transmutabat. Sequenti nocte per alium subiit quid cruen-
ti, velut mucosum: & rursus velut limosum: postea prasina
valde ac nigra. Decimaquinta repentina iactationes, & ti-
mores, & vociferatio lenis fiebat. Sequebatur autem effera-
tio, & indignatio, & eiulatio, nisi ipsi cito quod vellet porre-
ctum esset, & cognoscebat quidem omnes & omnia statim
iam post primos dies, & oculi subcruentū illud sedatum est.
Verū insania iuxta temporis occasionem, & vociferatio,
& mutatio prædicta sequebatur ad soporem, audiebat inæ- **E**
qualiter, aliqua valde, & si submisit quis loqueretur: aliqua
verò clarius eloqui oportebat. Pedes semper æqualiter cum
reliquo corpore calidi, vsque ad extremos dies. Verū deci-
ma sexta minus. Decima septima moderatius quā aliis die-
bus habens, ad noctem horrore ipsi oborto, se cōtrahens ma-
gis febricitabat, & sitis multa erat, reliqua similia sequeban-
tur. Tremores autem circa manus fiebant, & aliquantum cō-
cutiebat caput, & oculorū intuitus pravi, & sitis vehemens,
vbi bibisset rursus postulabat, & rapiebat ac large bibebat.
neque auellere ipsi poterant, lingua sicca, valde rubicunda,
& os totum ac labia vlcerata erant ac sicca, & ambas manus
ad os admouens manducabat quum tremula esset, & si quis
aliquid ad manducandum aut sorbendum obtulisset, large ac **F**
furiosè deglutiebat ac sorbebat, & signa circa oculos mala.
Diebus autem tribus aut quatuor ante obitum, horrores
quandoque incidebant ipsi, adeò vt contraheret corpus, &
contegeretur, & anhelaret, crura distendebantur, & pedes
frigidi erant. Sitis similis, & mentis affectiones similes, &
surrectiones ad egerendum aut inanes, aut paucis & tenui-
bus prodeuntibus, cum modica quadam tensione. Postrema
tertia & vigesima, oculus magnus mane erat, & circumspe-
ctio brevis, & quietem agebat, quandoque etiam absq; con-
tentione ac sopore. Ad vespeream verò dextri oculi motus,
qualis videntis, aut aliquid volētis, ab externo angulo ad na-
sum, cognoscebatque & interroganti respondebat. Vox post
multa subblata, & præ vociferatione fracta ac rauca.

Amph

- A** Amphiphradis filio æstate lateris sinistri dolor & tussis. **Amphi-
phradæ**
& alui egestionibus multæ, aquosæ, & subbiliosæ, & febris cessasse videbatur circa septimam. Tussis aderat. Color subalbidus ac subpallidus. Circa duodecimam cum virore subpallidum spuebat. Spiritus progressu morbi semper dēfior, & anhelatio, & stridula asperitas circa pectus & arteriam. Sorbitionibus utebatur, prudens per omne tēpus, circa vigesimam octavam mortuus est. Sudores quandoque fiebant foras.
- Caupo peripneumonicus, alius statim subibat. Circa quartam sudor multus, febricula cessasse videbatur, tussicula nulla, ut ita dicam. Quinta, sexta & septima detinebat febris, sudor octava. Nona excreavit pallidum, decima subibat alius acruatim non sepe. Circa undecimam mitius habebat. **Causa.**
Decimaquarta sanus. Hermoptolemo post pleiadis occasum febris accessit. Tussis non valde, lingua peripneumonica, nona excreavit, totus frigefactus est, velut videbatur, obtrulerunt ipsi succum circa meridiem calescebat. Undecima sudor, & alius erupit biliosis egestionibus. Tussicula accessit. **Hermoptolemus.**
Decimaquarta pallidum excreavit, & stertebat. Decimaquinta quum per totum tempus prudens mansisset, mortuus est. Alius quidam in palato stertens, lingua sicca, peripneumonica, prudens mortuus est. Et Posidonius adhuc æstate instante, iuxta pectus & præcordia, & latus, multo tempore dolebat, citra febres. Multis autem annis antea suppuratus fuerat, hyeme verò quum inhorruisset, dolor augescebat, & febricula tenuis, & excreatio purulenta, tussis cum stridula asperitate circa fauces, & stertens, quum prudens esset mortuus est. **Posidonius.**
Balis filius quum ex monte penitus aberrasset, sexta lingua prava, subrubra, & vocem læserat inter aberrandum, oculi colorati, natantes velut dormitantium, color reliqui corporis non valde velut in morbo regio, sed subpallidum, liuidum. vox prava. lingua obscura, peripneumonica, non prudens. Spiritus ad manum malus, non densus, neque magnus, frigidi pedes lapidosi. Circa nonam mortuus est. **Balis.**
Quædam apud Metronem anginosa, dextra manum ac crus doluit. Febricula tenebat debilis suffocatio die tertia remansit. Septima cōnussa. vox intercepta. **Anginosus perit.**
Stertor, dētium collisio ac cōsertio, maxillarum rubor. Hæc non longè vitam protraxit, quinta aut sexta mortua est. Signum

Hippocratis Liber VII.

- Bion hydropicus.** gnum circa manum subliuidum. Bion ex hydropico diu-
turno cibum auersabatur ad multos dies. & vrinæ stillici
dio vexabatur. In sinistro genu abscessus fiebat. suppuratus
est. mortuus est.
- Ctesiphon.** Ctesiphon hydropicus ex febre ardente
multa, & prius hydropicus ac splenicus, valde repletus est &
scrotum, & crura, & peritonæum membranâ aluum ac inte-
stina ambientem. Ad finē tussis & suffocationes fiebant ad
noctem, magis à pulmone, velut pulmonicis ac tabescenti-
bus. Tribus aut quatuor diebus ante diem obitus, rigor, fe-
bris. circa femur dextrum intus ad venâ mediam ab ingui-
ne collectio velut ignis feri, subliuidum habens ruborem. ad
noctem cordis ac oris ventriculi dolor. & non longè postea
vocis interceptio strangulatio cum stertore. & mortuus est. **E**
- Prodromus.** Et in Olyntho hydropicus, derepente voce priuatus, no-
ctem & diem desipiens, mortuus est. Prodromi filius, æsta-
te subblæsus, æstiuolus. lingua ipsi subarida, obscura. egestio
alui deorsum multa. Superstes euasit.
- Leophorbida.** Leophorbida febris
acuta post solstitium hybernū. præcordiorū & ventris do-
lor alui egestionēs liquidæ, biliosæ, multæ. & interdium sopor-
osus. lingua peripneumonica. tussis non inerat. Duodeci-
ma nigra pauca & prasina egeffit. Decimaquarta febricula
cessasse videbatur. Postea verò sorbitionibus utebatur. De-
cimasexta os valde saluginosum siccum fiebat. ad summam
vesperam horror febris. Vigesima prima circa meridiem
rigor, & sudor. febris desinit, verum calor adhuc suberat te-
nuis. ad noctem rursus sudor. & vigesima secunda ad noctem **F**
sudor. & calor remisit. At prioribus diebus omnibus sine su-
dore erat. Aluus autem humecta fuit etiam in putata postea
recidiua.
- Theocles.** Quæ supernè habitabat Theoclis cognata, sub
pleiadas febris acuta. sexta videbatur cessasse. lauit velut fe-
bre sedata. septima mane maxilla valde rubicunda, vtra non
memini. In vespera febris venit multa. & animi deliquiū,
& vocis interceptio erat. non longè verò postea sudor. &
quies cessante morbo septima die.
- Theodorus.** Theodori vxori in fe-
bre vehemēti sanguinis eruptio facta est, hyeme, vbi febris
desisset circa nonam: non longè postea, lateris dextri velut
ab vtero grauitas. Sed & primum, & sequentibus diebus,
obortus est dolor vehemens iuxta pectus. & fomento ad la-
tus dextrum adhibito, remiserūt dolores quarta die spiritus
densior

A densior, arteria vix respirans sublababat. & supina difficulter se vertere poterat. ad noctem febris acutior, & delirium breue fiebat. Quinta mane mitior esse videbatur. sudor de facie diffundebatur primū modicus: deinde multo tēpore per totum corpus ac pedes. Postea verò videbatur ipsi febris remisisse. Erat autē ad manum frigidius corpus arteriarum.

Quæ verò in temporibus sunt etiā magis saliebant, & spiritus densior, & aliās atque aliās delirabat. & omnia ad deterius: lingua perpetuò alba valde: & tussis non inerat, nisi tertia ac quinta die ad breue tempus. Sitis non erat. Sputatio erat. Præcordium dextrū valde eleuabatur circa quintā. verum postea mollius. egestio tertia die à balneo stercoris modici. Quinta rursus liquidi modici. Venter autē mollis. Vrina acerbæ, cineris speciem referentes. oculi velut delassatæ difficulter suspiciebat ac circumferebat oculos. Quinta ad noctem agrè affecta fuit, & delirium sequebatur. Sexta rursus eadē hora qua plenū solet esse forum, multus sudor diffundebatur, incipiebat à fronte ad totum corpus. ad multum tempus prudenter res suas disponebat. ad meridiē verò valde delirabat. & perfrigeratio similis erat, omnia verò circa corpus grauiora. Ad vespērā tibia ipsius ex cubili decedit, & puero præter rationem minabatur, & rursus silebat, & ad quietem cōuertebatur. Circa primū somnum sitis multa, & insania, & erecta sedebat, & præsentibus conuiciabatur, & rursus cōticuit, ac in quiete erat. & videbatur reliquum noctis sopore pressa esse. Verūm oculos non clausit. Ad diē iudicabat pleraque nutibus, corpore quiescens, & moderatē intelligens. Sudor rursus eadē hora. similiter oculi demissi, ad infernam palpebram magis incumbentes, rigidè ac stupidè intruentes. alba oculorū partes pallidæ & mortiferæ. & totū corpus pallidum ac nigrum. manū plerunque ad parietē, aut ad stragula habebat. strepitus autem habēti magni fiebant, respuebat. & sursum ad nasum absorbebat. & floccos legebat. & faciem obuelabat. Post sudorem manus velut in glaciem cōgelatæ sudor sequebatur frigidus. corpus ad manum frigidum exsiliēbat, vociferabatur. insaniebat. spiritus multus. manus tremulæ fiebant, sub mortē progressæ iam etiā cōmulsæ. septima die mortua est. Sexta die in nocte stratum modicè perminxit, quod minxerat de festucis detrahebatur viscosum,

Hippocratis Liber VII.

**Antipha-
nes.**

viscosum, genituræ simile. Vigilabat per omnes dies, post sextam vrina subcruenta. Antiphanis filio hyeme, lateris dexteri dolor, tussis, febris, edebat, deambulabat etiam febriens. Videbatur ruptio facta esse. nona remisit. febris non reliquit. tussis multa. & crassa ac spumosa spuebat. latus dolebat. Circa decimam quartam & rursus vigesimam febres desinere videbatur, & rursus corripiebant. erat autem calor tenuis, & parum quid relinquebat. Tussis quandoque deficiebat, quandoque abundabat, cum multa suffocatione. Tunc verò remittebat. & excreatio post hos dies multa, cum strangulatoria tussi. & purulenta supra vas efferuentia ac spumantia prodibant. & in faucibus plerunque stridula asperitas subbilabat. anhelatio semper detinebat, & spiritus densior. rarò bene spirabat. **E** Ultra quadragesimum diem, prope sexagesimum opinor, oculus sinister excacatus est, cum tumore, sine dolore: nec longe postea etià dexter. & pupillæ valde albæ ac siccæ fiebant. & mortuus est post excacationem, non progressus ultra septem dies, cum stercore ac multa delyratione.

**Thessalio
Polemarchos.**

Similia & ex similibus eodem tempore contigerunt etiam Thessalioni, feruentia, & spumantia, & purulenta, & tusses, & stridulæ asperitates. Polemarchi vxori hyeme anginosæ tumor sub gutture. febris multa. vena secta est. cessauit strangulatio ex faucibus, febris comitabatur. Circa quintam genu dolor & tumor sinistri, & circa cor dixit sibi videri aliquid colligi. & respirabat velut respirant, hi qui sub aquammersi fuerunt. & ex pectore substrepebat, velut qui concluso ore loquuntur, engastrimythi, quasi ex ventre loquentes appellati. Tale quid cōtingebat. Circa octauam aut nonam ad noctē alius prorupit, ac liquida multa, aceruata

Aristippus. & graueolentia egebat. vox interceptiebatur. Mortua est.

Aristippus in supernum ventrē violenter ac grauiter fagittæ ictu petitus est. ventris dolor vehemens. & breui ardebat. deorsum verò nihil egerebat. anxius erat. biliosa abundè colorata quum vomuisset, melius habere videbatur. Paulò post dolores rursus vehementes. & venter similiter ardebat. velut in voluulis. calores & fitis. in septem diebus mor-

Neapolis. tuus est. Neapolis percussus similiter, eadē passus est. acri infuso per clysterē immisso, alius deorsum erupit. color per corpus diffusus est tenuis, pallidus, niger. oculi squallidi, stupore

A pore rigidi, intus conuersi, intentè intuentes. Et qui in hep-
par percussus est iaculo, statim color qualis est mortuorum
per corpus diffusus est. oculi caui, anxietas, molestia. Mor-
tuus est prius quàm concio solueretur, in qua die percussus
est. Qui caput percussus est lapide à Macedone supra tem-
pus dextrum, ita vt fissura saltē facta dissectio cōtigisset, ver-
rigine affectus est & cecidit. Tertia die voce destitutus erat.
anxietas. febris nō valde vehemēs. pulsus in temporibus ve-
lut tenuis caloris. nihil audiebat, neq; sapiebat, neq; quiesce-
bat. humiditas circa frontem, & sub nasum, vsque ad men-
tum. Quinta mortuus est. Eniates in Delo iaculo percus- **Eniates.**
sus est retrorsum in latus, iuxta sinistram partem. vlcus qui-

B dem sine dolore. Verū tertia die ventris dolor paruus. nō
egerebat. infuso per clysterem immisso, stercus prodibat, &
dolor deficiebat. sedes extra ad scrotum extabat. quarta die
etiam ad pubem, & totū ventrem, dolor vehementer irrue-
bat. quiescere non poterat. biliosa vomuit abunde colorata.
oculi cum virore pallidi, quales in animi deliquiis. Post quin-
tam mortuus est. Erat autem calor quidam tenuis in ipso.

Billo percusso in dorsum, spiritus multus per vulnus cum **Billus.**
strepitu prodibat, & sanguinem fundebat. Verū deligatus
emplastro cruentis vulneribus cōmodo, sanus euasit. Con-
tiguit & infelicissimo Philes filio, denudatione in fronte fa-
cta. nona die febris. Deinde liuefactum est os. mortuus est. **Phanias.**

Et Phaniæ & Euergetæ filio, liuefactis ossibus, & febrici- **Euergetes.**
C tantibus, cutis ab osse discessit. & pus subtus depascebatur.

His dum perforarentur, ex ipso osse egressa est sanies te-
nuis, serosa, subpallida, graueolens, lethalis. Cōtingit autem
talibus etiā vomitus accedere, & ad finem conuulsiones: & vt
clangorosam vocem edant, ac impotētes fiant, & si in dextris
fuerit vulnus, in sinistra parte: si verò in sinistris, in dextra.

Theodori filio nona die in sole versato, febris accessit de- **Theodo-**
cima die, ex denudatione iuxta os nullius momenti. In fe- **rus.**
bre verò denudatum est. discessit cutis. multum clangorosus
erat. Vigesima secunda venter eleuatus est maxime circa
præcordia. Vigesima tertia mortuus est. Quibus ossa fracta
fuerint, his septima die febres. Si verò calidus fuerit tem-
pus, etiam citius. At si magis fracta fuerint, etiam euestigio. **Exarmo-**

Et Exarmodi famulus similiter dolorem habebat ad fe- **dus.**
mur,

Posidoneon. **Isagoræ.** **Navis rector.** mur, non è directo vulneris. & factus est clangorosus. & colli D erat dolor. Et Posidocreon tertia conuulsio. calor non relinquebat. mortuus est die decimo octauo. Isagoræ filius percussus est terro in caput, confuso osse ac nigrefacto quinta die superstes euasit. os autem non discessit. Magnæ nauis gubernatori anchora digitum medium, & os dextræ manus cōfregit. inflammatio successit. & marcor. & febris. subpurgatus est. quinta calores moderatè remiserunt. itémque dolores. de digito quid decedit. Post septimum diem fanies exhibat leniter. Postea per linguam dixit se non omnia posse enunciare. Prædictio facta est opisthotonum aduentare.

Harpalus. Ad hoc conferebant maxillæ confertæ, & ad collum rigida. Tertia die totus conuellebatur in posteriorem partem, cum sudore. Sed à prædictione mortuus est. Harpali filius ex liberta Telephane, luxationem infra in pede magni digiti accepti, inflammatus est, & valde dolorosus erat. & ubi repositus est, & dolor remisit, proficiscebatur ad agrum. rediens lumbos doluit. lauit. maxillæ ad noctem conferebantur. & opisthotonus aderat. saliuæ spumosa vix per dentes foras prodibat. Tertia die mortuus est. Thrinon Damonis filius, habebat circa tibiā aut malleo ū vlcus, iuxta neruum iam purum. Huic à pharmaco corroso cōtigit, vt opisthotono moreretur. Menoni sub arcturum & prius, ex febre æstiuæ, & alui profluvio ægrè affecto, & ex itinere delassato, dolor lateris sinistri & tussis quæ ex destillatione quidē etiam prius aderat, verum tunc valde intenta erat, & vigilabat. & febrem statim ab initio ægrè ferebat. & erectus sedens tertia die spuebat pallidum. arteria ex stertore subsibilabat. Circa quintam spiritus moderatè densus. pedestibia, extremæ partes plerunque frigida, & extra stragula. alui egestio ab initio fiebat biliosa, neque valde modica, neque multa. septima, octaua, & nona, leuius ferre videbatur, & somni aliquid contingebant. & quæ excreabat crudiora erant. decima, & vsque ad decimam tertiam, alba & pura. & præcordium mollius fiebat. sinistrum tamen distentum. & melius spirabat. Subdita glande moderatè aluus subiit. Decima tertia rursus pallidum spuebat. Decima quarta magis. Decima quinta prasinum. Aluus autem maleolentia, biliosa, liquida, multa demisit. sinistrum præcordium eleuabatur. Decima

A cima sexta autem etiam valde intumuit, & spiritus iam ster-
torosus, sudor circa frontem & cervicem, raro ad pectus, ex-
tremæ partes, & frons, leniter permanebant frigida. Salta-
tio verò venarum circa tempora detinebat. Somni soporosi
noctem ac diem postremo tempore. Urina, ab initio cruda,
cineris speciem referens. Circa decimā, & vsque ad decimam
tertiā tenues, & nō decolores. Verū à decimatertia qua-
les ab initio. Cleocho lateris dolor & febris, remisit febris, Cleocho-
sudavit per totum corpus. In urina multa erant quæ fereban-
tur ac innatabant, postea turbata est. Circa Pleiadum occa-
sum Olympiadæ uxorem, foetum octimestrem gestantem, ex
casu febris acuta corripuit, lingua aestuosa: sicca, aspera, palli-
da, oculi pallidi, & corpus mortiferū, foetum corrumpit, quinta
die facile liberata est, & somnus ut videbatur soporosus, ve-
speri excitantes non sensit, sternutatorium adhibitum per-
cepit, potionem suscepit & succum, deglutiens potionem ali-
quantum tussivit, vox non soluebatur, neque ipsa quicquam
alleuabatur ex morbo, oculi tristes ac submissi, spiritus subli-
mis per nasum trahebatur, color prauus, sudor circa pedes,
& crura, ubi iam morti propinqua esset, mortua est. Nicolai
concupinæ ex febre ardenti, abscessus iuxta horam fiebant
ab utraque parte, paulo postea alter, quum iam febris re-
mittere videretur, velut tumor laxus. Circa decimum quar-
tum magni citra signa sedati sunt, recidiva facta est. Color
qualis mortuorum, lingua aspera, valde dēsa, subalbida. Siti-
culosa, alui egestio deorsum multa, liquida, male olens per
omne tēpus. Ante finem corruptum est corpus præ multitu-
dine egestionis. Mortua est circa vigesimum diem. Andreā
ante pleiadem horror, febris, vomitus. Ab initio semitertia-
na apparebat. Verū tertiana erat. Quū rursus in foro versa-
retur, inhorruit, febris acuta, vomitus bilis meraca, delirium
ad noctē quarta rursus melius habebat. Quinta difficulter.
Sexta à mercuriali probè egecit alui. Septima difficiliter
& sequētibz iam diebus febris magis cōtinēter affigebat,
& sine sudore ab initio, & siticulosus. Maximè verò os resic-
cabatur, & potionē nullam libenter admittebat, quum mul-
ta iniucūditas circa os esset, lingua sicca, inarticulata, asperi-
tas efflorescebat, cum pallore albicans. Vigil, anxius exolu-
tus, fractus, lingua præ siccitate quādoq; subblasa, donec ma-
defecit

Hippocratis Liber VII.

defecisset, succū maximè admittebat. Nona aut decima circa aurem sinistram, atq; etiam alteram, tumores parui citra signa apparuerunt. Vrinæ semper non decolores, verū sine subsidētia. Decimaquarta sudor circa supernas partes non multus, sed moderatior. Color circa decimāseptimam euauit. Aluus post decimam sicca, citra glandem subditam non egerens. Circa vigesimāquintā pustulæ per totum corpus pruriginosæ calidæ, velut igne ambusta. Dolor autē erat circa locos sub alis, & latera: trāsiuit ad crura citra signa, & desuiuit. Balneum proderat & vnguenti illitio cum aceto. Mēse verò secundo aut tertio fortassis, ad rhenes dolor, qui etiam antea quandoque fuerat, sedatus est. Aristocrati circa solstitium hybernum lassitudo, & horror, & calor. Postea tertia die incepit lateris dolor itēque lumborum, & tumor sub alis initium sumēs, per totum dextrum latus durus, rubicundus, liuidus, velut ab igne calefactus & iniustus, anxius, omnia molestè ferens, valde siticulosus, lingua subalbida. Vrinæ non procedebant, crura subfrigida, alui egestio à mercuriali modica, liquida, subalbida spumosa, ad noctem spiritus eleuabatur, sudor circa frontem, partes infernæ frigidæ. collum inflabatur, tussis non inerat, mortuus est prudens. Onesianacti circa autumnum lippitudo, postea verò febris quartana. Incipiente quartana cibos valde auersabatur, in progressu verò libenter accipiebat. Sed & Polichari in quartana, Mnesianax similia circa cibum accidebant. Mnesianacti alui egestio ante febrem, & postea, ad multū tempus sequebatur, multis albis mucosis prodeuntibus: & quandoque paucō sanguine, citra dolorem. Strepitus autem in vētre. Post febrem abscessit citra sedem tuberculum durum, quod multo tempore inconcoctum comitabatur, erupit ad intestinum, & foris fistulosum fiebat. Deambulare verò ipso in foro, splendorēs præ oculis obuersabantur, & solem non valde videbat, Quum autem parum discessisset, extra seipsum erat, & collum conuulsum est. Postquā autem domum deportatus est, vix suspexit, & ipse vix sui ipsius erat. Primū autem collustrabat circumstantes, & corpus perfrigeratum est, vix verò recalfectus est vtriculis & fomentis adhibitis. Postquā autem ipse intra seipsum esset, & exurgeret, non volebat exire, sed timere dixit. Si verò quis de grauibus morbis differeret, subducebat se præ

Aristocrates.

Onesianax

Polychares
Mnesianax

A se præ timore. Quandoq; etiam caliditatem sibi ad præcordia allabi dixit. & oculorū splendores comitari, & alui egestio multa, & sæpe, & similis hyeme cōtingit, facta est venæ sectio, datum est veratrum, bibit lac bubulum, prius autem alinum, contulit, & alui egestionem sedauit. Aquæ potus ab initio, deambulationes quoq; & capitis purgationes. **Anecheros.**

B ficabat. Quarta per linguā significabat. Quinta loqui nō poterat, sed in principiis nominum hærebat lingua valde, & conuulsio fiebat, & extra sese erat. Quum verò hæc remitterent, lingua vix in suum statum restituebatur. Sexta abstinere ab omnibus, & sorbitione, & potu, & à nulla amplius affectione corripiebatur. **Cleocho.**

C nus liuescebat. In tumoribus circa genua ac pedes velut supurationes erant. Tandem verò fieri non poterat, vt staret, aut calcaneis insisteret, sed in lecto decumbebat. Calores manifesti, quandoque cibum auersabatur, non valde siticulosus, neque ad sedem surgebat, anxius, & quandoque etiam pusillanimitas tenebat, veratrum exhibitum est, & capitis purgationes. Ad os pharmacum ex manna thuris, cum aliis ammixtis profuit. Ad vlcera in ore, sorbitio lenticulæ commoda erat. Circa sexagesimam sedati sunt tumores à secūdo veratro, dolores tantum ad genua decumbenti venerunt. Humor autem & bilis abscessit ad genua, etiam pluribus diebus ante veratrum. **Pisistratus**

Pisistrato humeri dolor, & grauitas diuturna deambulanti & alias sano, hyeme verò incidit multus lateris dolor, & calor, & tussis, & excretio sanguinis spumosi,

& in

Hippocratis Liber VII.

Simon.

Euxenus.

Polemarchus.

Hegesipolis.

& in faucibus stertebat. Verū facile ferebat, & apud seipsum D
 erat, & calor remisit, simulque & excreatio, & stridula asperitas, & circa quartam aut quintā diem sanus. Simonis vxor
 in partu concussā dolor circa pectus & latus, tussis, febres, excreationes purulentæ, tabes, ad sex menses febres, & alui
 profluvia semper. Ad finem febres cessauerunt, post cessationem substitit aluus, & post septem dies mortua est. Euxeni
 vxorem ex fomentis vt videbatur, calores nullo tempore relinquebant, magis tamen ad vesperam augeſcebant, sudores fiebant per totum corpus. Febre ad augmentū tendente frigiditas pedum, quandoq; etiam tibiārum & genuum fiebat, tussicula sicca ad modicū tempus, febre exacerbati incipiente, deinde cessabat. per multum autem tempus etiam totius corporis rigor fiebat. Sitis exors semper. Vbi medicamentum E
 bibisset, & serum, magis læsa est. Ab initio omnino sine dolore erat, & bene spirabat. Medio verò tēpore lateris dextrī dolor fiebat, & tussis cōmota est, & anhelatio, & excreationes parvæ albæ ac subtenues, & horror non ampliū ex pedibus, sed de collo & dorso, & aluus liquidior, remisit febris cū multo sudore, & perfrigerata est. Anhelatio verò erat varia, mortua est post remissionē septima die quum esset mente prudens. Polemarchi vxor æstate incepit febrire, dimisit autē ipsam febris sexta die, titubans obambulabat, ad noctem calores. Rursus interposito tempore corripuit febris, & non dimisit tribus ferē mensibus, tussis multa, excreatio pituitæ. Postquā verò viginti durasset diebus, spiritus semper F
 densus, in pectore strepitus, plerunque sudor, mane febris mitior, & horrores quandoq; corripiebant, somni fiebant, & aluus aliquando humectabatur, & rursus restitabat, moderatē cibum gustabat. At medio tēpore ad genua & tibiās dolor, & ad flexendum ac extendendū alio opus habebat. Perseuerabant crurum affectiones vsque ad finem iam propinquum & intumuerunt pedes vsq; ad tibiās, & ad contactum dolebat, & sudores ac rigores desierunt. Febris autē semper intendebatur. Ante obitum aluus erupit, prudens permanebat. Tribus ante obitum diebus, in faucibus stertebat, & spiritus reuertebatur. Mortua est. Hegesipolis filiolus quatuor ferē mensibus dolorem circa vmbilicū corrodentem habebat. Progressu tēporis augebatur dolor. Percutiebat ventrē, vellicab

A vellicabat, calores corripiebant, contabescebat, ossa reliqua erant, pedes tuebant. Testes, venter, partes circa vmbilicū inflata. Num & quibus futurū est vt alius exturbetur? cibū auersabatur, lac solum admittebat recens, & alius liquida erat, & subcruenta sanies subibat, male olens: alius ardebat, mortuus est vbi vomuisset modicū pituitosum, adeo vt quis genituram putasset. Plateæ filio vbi mortuus esset futura

Plateas.

B res sub obitum contigerunt. Hippia soror hyeme Phrenitica, mente aberrans, manibus negotiū exhibens, lancinans seipsam. Quinta & sexta ad noctem voce destituta, soporosa. inflans in maxillas & labia, velut dormientes, septima mortua est. Ofander vbi inhorruit, lateris dolor, & ad genua dolor, itēq; ad femur, vbi comedisset delyrabat, breui mortuus est. Cleotimo futuri aluo liquefacta multo tempore, & calore oborto, iuxta hepar tumor tuberculofus ad inum ventrē descendit, & alius liquida fiebat, & aliud ipsi tuberculum iuxta hepar sursum ad præcordiū, mortuus est. Quibusdam capitis dolor vehemens cum calore: quibusdam quidem ad dimidiam capitis partem, & secundum nares humor quidam decedit tenuis, aut maturus: aut ad aures: aut ad fauces ex capite securius. Quibusdam vero hæc sicca. At marcor

Hegetori-

des.

Hippias.

Ofander.

Cleotimus

Similia
hæc aphe-
rismis.

vehemēs periculofus est. Si verò affuerit anxiosus, aut biliofus vomitus, aut stupor oculorum, aut vocis interceptio, & raro quid loquitur, aut delyrium, lethalia hæc sunt & conuulsoria. Quicunq; verò ex destillatione dimidiā capitis partē dolent, & humore secundum nares decedente insuper febrierint leniter, in quinta aut sexta perfrigerantur. Echecrati cæco capitis dolor vehemēs magis ad posteriorem partem, & colli quo loco connexio est, & ad verticem procedebat. Progrediente tempore & ad aurem sinistram, & dimidia capitis pars dolorosa erat, mucosa semper procedebant leniter combusta, & calor comitabatur tenuia, & cibum auersabatur, in die melius habebat, ad noctem verò dolebat. Postquam autem pus per aurem erupit, cessauerunt omnia, erupit

Echecrates

pit

Hippocratis Liber VII.

Charites.

pit autē circa hyemem. Num & omnibus suppurationibus, D
& affectionibus circa oculum, dolores ad noctem? Quibus
tusses hyeme maximē austro spirāte crassa & multa excreā-
tibus, febres accedunt: leuiter autem quinta die sedantur.
Tusses verò circa quadragesimā, velut Hegeſipoli. Quibus
calores multi quandoq; sedantur, hi non per totum corpus,
sed aut circa cernicem, aut sub alis, aut capite sudantes libe-
rantur. Chariti hyeme ex tussicula populariter grassante
febris aduentās, acuta corripuit, stragula reiciebat: sopor cū
dolore. Vrinæ erant rubræ velut erui lotura: subsidentia sta-
tim ab initio multa, alba: postea etiam subrubra. Septima à
glande subdita pauca prodierunt: sopor detinuit sine dolore:
humiditas in fronte: somnus ad noctem, & calor mitior, octa E
ua succum admisit: soporosus permāsit vsq; ad vndecimam.
Hac autem die etiam calor maximē cessauit. Postquā verò
tussis erat, excreatio perseuerabat semper multa, facilis, pri-
mū viscosa, alba, crassa, postquam autem concocta esset: si-
milis purulentis. Vrinæ ab vndecima die puriores: subsiden-
tia aspera, decimatertia dolor ad dextera, vsq; ad lateris mol-
litudinem, ad imū ventrem. Vrina supprimebatur. Potus cal-
lyphylli cōtulit. Decimaquinta rursus dolor, decimasexta ad
noctem magis dolor præcordij incipiebat ad ventrem. Mer-
curialis aqua subduxit. Calor intra vigesimū euauit, & ex-
creationes secutæ sunt crassæ. Melius habuit ad quadragesi-
mum. Subpurgandi sunt ventres in morbis, vbi purganda
matura fuerint: Inferni quidem, vbi confidisse videris, signū E
habes si non anxij fuerint, neque capite grauati: & quum ca-
lores mitissimi, & quum post exacerbationes cessarint. Su-
perni verò, in ipsis exacerbationibus. Tunc enim & hi ele-
uantur, quū anxij, & grauati supernis partibus fuerint, pro-
pterea verò in principiis purgandum non est, quoniam sua
sponte in his temporibus expurgantur. In cubiti processu
ex casu sauciato, cubitus marcore corruptus suppuratur, ma-
turatione verò fiēte, viscosa sanies ac glutinosa exprimitur
Cleogenis
eus.
Demar-
chus.
Aglao-
tes. Aesch-
ylus.
Alcmanus.
& breui supprimitur: velut & Cleogenisco, & Demarcho A-
glaotelis filio. Similiter autem & valde ex iisdem pus nullū:
velut Aeschyli filio contigit. At vbi suppuratur plurimis hor-
rores & febres accedunt. Alcmani ex rhenum affectioni-
bus se recolligenti, & sanguine deorsum detracto, sursum ad
hepar

A hepar conuersus est morbus, & ad cor dolor vehemens, & spiritus præ dolore detinebatur, & alius difficulter egerebat parua caprini stercoreis pilulis similia, anxietas non inerat. Verum rigor quandoq; & febris corripiebat, & sudor. & vomitus, & in dolore non conferebat aqua marina per clysterem infusa. Verum furfurum decoctum infusum contulit, A cibo abstinuit ad dies septem, aquam mulsam meraciorem bibit: postea lentis succum, quandoq; verò ex lenticula fresa decoctum. Inde bibit aquam: postea catulum coctum: & mase parum, quæ potissimum diu antea confecta esset, progressu verò temporis, aut ceruices bubulas, aut extremas partes suillas coctas, vnà cum priore aquæ potu: quies, tegmen, ad rhenum affectionem infusum per clysterem ex cucumere sylue

B stri. Parmenisci filio surditas, contulit clysterem auricularium non adhibere. Verum lana expurgare, & solum oleum aut netopum infundere, deambulare, mane surgere, vinum album bibere, oleribus abstinere, pane & piscibus petrositis nutrir. Aspasij vxori dentis & maxillæ dolor vehemens. Castorium & piper colluēs, ac in ore tenens, remisit. Et stillicidij vrinæ affectionem ipsi sedauit farina cum rosaceo. **Ca.** Castorium

Parmeniscus.
Surditatis
medela.
Aspasius.

pitidis dolores ex vtero sedat castorium. Plurimas vteri affectiones flatus faciunt. Signum sunt ructus, & strepitus circa ventrem, & lumborum tumores, & dolores circa rhenes ac coxas. Ad hoc autem confert, aromatum tertiam partē, farinæ duas, in vino odorato albo coquere, & linteolo illita cataplasmatibus modo imponere, qua parte ventris dolores ab vtero affligunt. Callimedontis filio contulit ad tuberculum, quod habebat in collo durum, & magnum, & crudum ac dolorosum, venæ brachij sectio: & seminis lini torrefacti cataplasma, vino albo ac oleo subactum ac imbutum, ita vt neq; calidum, neq; valde coctum deligatur, Aut cum aqua mulsâ coquatur fœni Græci, aut ordeï, aut tritici farina. Melissæder

Callimedō

Melissæder

Euthichides.

crat, & anxius. Nihil autem continere poterat, neque ex potibus

B b

tibus

Hippocratis Liber V I I.

tibus, neq; ex cibis: & vrinæ ac transitus deorsum suppressio: D
 Arcuati per vomitus fæx mollis prodiit. & deorsum quoq; erupit. Re
 morbi me- gio morbo correpto prodest laborare, sudare, panem edere,
 dela. bibere non multum, lauare caput calida multa, sed potius te
 Calligenes pida, vinum album, somno nō multo vti. Calligeni circa vi-
 gesimū quintum ætatis annum destillatio, tussis multa, quod
 defluebat per vim educebat: nihil infrā persisterat, annos
 quatuor perseuerabat. Ab initio calores tenues fiebāt. Vera-
 trū non profuit, sed modicus cibus, & cōprimi corpus, edere
 panē, bibere vinū nigrum, obsoniorum quorūcunq; esus, ab-
 stinentia ab acribus, salsis, pinguibus, succo silphij, oleribus
 crudis, multa deambulatio. Lactis potus nō contulit, sed sesa-
 mū purū, crudū, acetabuli mensura bibere, cum vino molli. E

Timocha- Timochari hyeme destillatio, maximè in nares, Quū ve-
 res. nere vsus esset, resiccata sunt omnia, lassitudo, calor successit
 caput graue, sudor à capite multus, defluebat autē & per to-
 tum corpus. Erat autē etiā sanus sudare aduetus: tertia die
 Cleomenes sanatus est. Cleomenis filius hyeme initio facto cibū auer-
 sabatur, & eius fastidio citra febrem vexabatur: & vomebat
 cibos ac pituitam. Duobus autem mensibus cibi fastidium
 durabat. Coco in spina gibbositas facta est ex phrenitide.
 Cocus. Huic nulla medicamenti potio contulit, verū vinum ni-
 grum, & panis esus, & balneorū abstinentia, & vnctio, & fri-
 ctio ab vnctione, & fouere non valde, neque multo fomento,
 sed leni. Quibus fluxiones in oculis tenues ac diuturnæ, si
 maturæ in nares processerint, profunt. Quibus pręgnanti- F
 bus ex casu, aut cōuulsioe, aut plaga, aut dolores leniter fiūt,
 his in tribus diebus manifestum sit, an fœtum corrumpet.

Cuidam quæ circa vigesimum ætatis annū biberat vltro
 pharmacum adfœtum perdēdum, accidit dolor: vomitus bi-
 lioforū, multorum, pallidorum, prasinorū, nigrorū. Quum
 bibisset, tertia die conuulsio corripiebat: linguam cōmande-
 bat. Ad quartā diē ad ipsam ingressus sum: lingua nigra, ma-
 gna, ocolorū albæ partes, erant rubræ: vigilabat: quartā mor-
 tua est ad noctem. Pythocles ægrotātibus aquā, & lac mul-
 ta aqua ammixta dabat, & renutriebat. Perniones pertun-
 dere oportet, & calefacere, ita vt quā maximè excalefacias
 igne & aqua. Oculis incōmoda sunt lenticula, fructus po-
 morum dulces, & olera. Doloribus circa lumbos, aut coxa,
 aut

Aut crura, ex laboribus obortis, aquæ marinæ aceti que calidum fomentum confert, ita ut vel aspergas, vel spōgiam bis imbutam adhibeas. Deligare verò lanis oportet. Origanum potum, oculis & dentibus malum est. Puella quæ de rupe cecidit, voce destituta, iactatio ipsam tenebat, vomuit ad noctem sanguinem. Quum ad sinistram aurem impegisset, amplius inde fluebat, & aquâ mulsam difficulter deglutiebat, stertor habebat. Spiritus densus velut morientium. Venæ circa frōtem intentæ, decubitus supinus, pedes tepidi, febris multa, aliquādo acuta, maximè expauescebat, septima vocem rupit, calores tenuiores erant, superstes euasit. Nisantides humeri dolorem habebat, in ætate obortum ex abscessu, pro-

Nisantides

B fuit ipsi corpus & humerum in aqua marina madefacere, ad multum tempus, & per tres dies vinum album aquosum bibere, simul ut in aqua marina decumberet, ita ut & in ipsa urinam eiiceret. Fullo in Syro phreniticus, quum mouere-

Fullo.

tur cruribus tremulis, corpus velut à culicibus cōpunctum. oculus magnus, motus brevis, vox fracta, sed clara tamen, urina pura subsidentiam non habens. Num propter alui ex thapsia egestionē, decima octaua die morbus remisit, euanes- scens citra sudorem? Nicoxenus in Olyntho similiter septi-

Nicoxenus

ma die videbatur à morbo liber esse cū sudore. Sorbitiones assumebat, vinū, botrum ex sole. Decima septima die ingressus sum ad ipsum, lingua ardebat, calor forinsecus non valde fortis, exolutio corporis vehemens, vox fracta, ut operosum esset exaudire, clara tamen, tēpora collapsa, oculi caui, pedes molles ac tepidi iuxta splenem distentio. Infusum per clysterem nō valde suscipiebat, sed resiliebat, prodiit stercus compactum modicū, & aliquid sanguinis, arbitror ab infuso. Urina clara, pura, decubitus supinus, crura diducta ac disparata ob exolutionē, penitus vigil. Intra viginti dies calor euauit. Potus erat aqua de farina crassa in ipsa macerata. Sed & de pomis simulq; mali punici succus, & lentis torrefactæ, & farinæ lotura cocta, frigida, tenuis sorbitio. Superstes euasit.

Fullonum inguina extuberant dura & sine dolore, & circa pubem ac collum similia erant tubercula magna, febris ante diem decimū. Tussi vexabantur à ruptionibus. Tertio mense aut quarto venter colliquiuit. Calores successerunt, lingua sicca, sitis, egestionēs deorsum malignæ mortui sunt.

B b 2

Cho

Hippocratis Liber V I I.

**Cholerica
bilis malū
quī fiat.**

**Phereci-
des.**

Cholerica bilis sursum ac deorsum eruptiones, ex carnis **D**
 esu, maximè suillæ crudioris, & ex cicere, & ebrietate vini
 odorati veteris, & insolatione, & ex sepiis, & locustis, & gam-
 maris: & ex olerum esu, maximè porri & ceparum: Insuper
 & à lactucis coctis, & bralsica, & rumicibus crudioribus: & à
 placentis ac dulciariis & mellitis libis, & à fructibus pomo-
 rū, & cucumere pepone, & vino lactei teporis, & eruo, & po-
 lenta recenti. Cholerica affectiones magis in æstate fiunt,
 & febres intermittentes, & quibus horrores accedunt. Hæ
 quandoque malignæ fiunt, & ad morbos acutos perueniunt.
 Verum cauere oportet. Iudicat autē tales morbos maximè
 quinta & septima & nona dies. Melius tamen est cauere vsq;
 ad decimam quartam. Pherecydæ post solstitiū hybernum, **E**
 noctu lateris dextri dolor etiam prius fieri solitus cessauit.
 pransus est, & egressus horruit, febris ad noctem, doloris ex-
 ors, tussicula quædā sicca. Vrina non multa, subsidencia mul-
 ta. Ab initio ramentosa, glabra, diuulsa: post dies quatuor tur-
 bulenta, subsidebant, & vrina non decolor, subsidenciam ha-
 bens, & collectio nō apparebat in matula, vbi perfriguisset.
 Tertia die aluus sua sponte egeffit. Quarta subdita glande
 stercoracea & biliosa prodierunt, fluxus erat liquidus. Som-
 nus ad noctem non valde. Verum interdiu aliquantum dor-
 miebat. Sitis non vehemens. Quarta ad noctem maximè cu-
 tis circa frontem, & reliquum corpus mollis, semper super-
 excedens, febris vincebatur ad manū, & sub ea humescebat,
 pulsus in fronte valde obscurus, venarum grauitas in cōuer- **F**
 sionibus, & in omnibus egestionibus ad modicum tempus
 semper doloris exors, ab initio anxius, & paulatim vomebat.
 Septima à glande subdita, egeffit ter biliosum ac stercora-
 ceum, liquidum valde ac pallidum & iam aliquantū delyra-
 bat, & humiditas modicè quandoq; circa frontē, stragula in
 faciem ducebat, oculos frustra velut si quis videret contrahe-
 bat, & rursus nictabat, & stragula reiciebat. Nona die sudor
 mane obortus ad pectus perseuerabat donec moreretur, &
 febris, & delyratio augescebat. Circa frontem sudor pluri-
 mus graucolens, color valde albus, cutis sub pilis interpun-
 cta, præcordium dextrum eleuatum, demisit à seipso biliosa.
 Octaua apparebant velut culicū morsus, ante mortē tussien-
 do reiecit velut ex muco fungos, cōpacta quædā, alba pituita
 circun

A circundata. Excrearat autē & antea parua, alba, lactea, post
 cenā in somno horruit, mane surrexit, capite grauatus hor-
 ruit, vomuit, capite grauabatur, ad noctem remisit, vsque ad
 meridiem leniter horruit, rursus noctem grauiter tulit. Se-
 quenti die febris acuta, capitis torpor, vomitus multæ bilis,
 quæ plurima prasina erat, cessauerunt omnia, somnus ad no-
 ctē, mane perfrigerabatur, sudor & humiditas per plurimā
 corporis partem, iuxta splenem manu indicabat ad modicū
 tempus collectionē doloris exortem, statim euauit, ad no-
 ctē vigil. circa fori tempus exacerbabatur febris. anxietas,
 vertigo, tormen, capitis dolor, vomitus prasinus, leuis, visco-
 sus velut pituita, circa solis occasum cessauerunt omnia, su-
 dor capitis, colli, post vomitum egeffit per aluum stercora-
 cea, liquida, biliosa, neque nigra, neque inconuenientia. No-
 ctē moderatē habebat, itēque sequentē diem, ad noctem
 rursus vigil. Vomitus mane similiter & sequenti die, citra an-
 xietatē, dolores capitis post sudorē cessarunt, ad vesperā om-
 nia remiserūt. Nona non amplius vomuit, magis calefactus
 est. Reliquis nō videbatur febrile. Venæ in tēporibus salie-
 bāt, doloris omnino exors, sitis semper erat, Nona quū ad sel-
 lā surrexisset valde animo linquebatur, à glāde subdita egef-
 fit ramenta nigra & biliosa colore, quātū stercoracei destil-
 labat, vox fracta, in cōuersionib. grauis, oculi caui, cutis fron-
 tis circumtensa, alioqui bene spirabat, moderatus erat, ad pa-
 rietem plerunq; conuersus, flexibilis in decubitu, incuruatus
C quiescens, lingua alba, leuis. Circa decimā & postea, vrinæ ru-
 bræ in circuitu, in medio exiguū quid albū. Duodecima ad
 glandē subditā, similia destillabāt biliosa & ramentosa, post
 glādē animi deliquitū, postea os resiccabatur. Colluebat sem-
 per, & si non valde frigida esset aqua, calidā esse dicebat, ni-
 uē leniter gustabat, sitis nō inerat, stragula semper de pecto-
 re repellebat. Chlamydem calefieri nō sinebat, ignis procul,
 isq; paruus, vtriusq; maxillæ rubor, postea lingua inarticula-
 ta, recalescebat vnum aut duos dies, cessauit. Androphani **Androphana**
 vocis interceptio, ignorātia, delyrium. His sedatis supererat **nes.**
 multis annis, & recidiuæ fiebāt, lingua permanebat per totū
 tempus sicca, & si collutione non vteretur, loqui nō poterat,
 & plerunque erat valde amara. Aliquando etiā dolor ad cor.
 Venæ sectio soluit hęc, aque potus, aqua mulsa. Veratrū quo-

Bb 3

que

Hippocratis Liber V I I.

que bibit nigrū, biliosum nō prodibat, sed modicum. Tandē **D**
hyeme decubuit, & extra se positus mente motus est, & lin-
guæ affectiōes similes, calor tenuis, lingua decolor. Vox pe-
ripneumonica, de pectore stragula reiiciebat, & se educi iu-
hebat, velut micturū, quum nihil clarè loqui posset, neq; a-
pud seipsum esset, educebāt ipsum, ad noctē mortu⁹ est, duo-
bus aut tribus diebus decubuit. Nicanoris affectio erat, quū
Nicanor. ad cōuiuium progredieretur timor tibicina: quū sub initiū
vocis tibix, in conuiuiο tibia canere audiuisset, prae timori-
bus turbationes, vix se sufferre posse dixit, quū nox esset. In-
terdiu verò audiens nihil cōmouebatur, & hæc multo tem-
pore ipsum comitabantur. Damocles qui cū illo erat, cacu-
Damocles. tire, & corpore exoluto esse sibi videbatur, & sanè præruptū
locum non accessisset, neq; trans pontē, aut minimæ altitu-
dinis scrobem, ausus fuisset trāsgredi, prae timore ne caderet
sed per ipsum scrobem ibat, hoc ad tempus quoddā ipsi ade-
rat. Phœnicis affectio erat, ex oculo dextro plerunq; velut
Phœnix. fulgur elucere putabat. Vbi verò nō diu ipsum clausisset, do-
lor ad tempus dextrū vehemens oriebatur, postea etiā ad to-
rū caput, & collū, caput intumescibat retro ad verticula, &
distentio ac duritia erat circum tendines. Si itaq; conaretur
cōmouere caput, aut aperire dentes, nō poterat, utpote valde
distentus. Vomitus si quādo oborti essent, relatos dolores a-
uertebāt, ac mitiores faciebāt, & venæ sectio profuit, & vera-
trum duxit omnigena, & nō minimè prasina. Parmenisco
Parmeniscus. etiā prius incidebāt tristitiæ, & desiderium excedendi è vita.
Olynthus. quādoq; verò rursus latus erat. At in Olyntho aliquādo au-
tumni tempore, voce priuatus decumbebat, quietē agens, ita
ut parū saltē loqui conaretur, ac inciperet. Immo etiā si quid
loquutus esset, rursus voce destituebatur, somni aderāt, quā-
doq; verò vigiliæ: & iactatio cum silentio, & anxietas, & ma-
nus ad præcordia velut dolenti. Aliquando auersus iacebat
quietē agēs, febris perpetuò, & facilè spirabat. Postea dixit se
cognoscere ingressos. Bibere quādoq; tota die ac nocte, etiā
si potus exhiberetur, nō volebat: quādoq; verò vrina derepen-
te correpta, omnem aquā ebibebat. Vrina crassa velut iumē-
Conon. ti. Circa decimam quartam remisit. Cononis serua ex dolore
capitis incipiēte, extra se mēte mota erat, & clamor, & que-
relæ multæ, rarò autem quies. Circa quadragesimum diem
mortua

- A** mortua est. Decem verò diebus ante mortem, voce destituta & cōuulsa fuit. Timocharis seruus ex atrabiliariis esse quū **Timocha-**
putaretur à tot ac talibus viris, mortuus est similiter circa **res.**
eosdem dies. Nicolai filius circa solstitiū hybernū ex pota- **Nicolaus.**
tionibus horruit. ad noctem febres. postridie vomitus bilio-
sus, merus, modicus. Tertia die quum cōcio adhuc fori plena
esset, sudor totius corporis cessauit. & statim rursus calefa-
ctus est. vomitus similis. Quarta ab aqua mercurialis eges-
sit stercoracea & liquida. Vrina cineris specie, qualis est
aqua mercurialis, nō dissimilis, subsidētia non erat, neq; vri-
na multa, pauca quādā in medio vehebantur innatātia. dolo-
res præcordij sinistri & lumborū. Putabat se ex vomitu in-
B super respirare, & insuper respirabat, quandoq; duplā respi-
ratione. lingua alba, habens ex dextra parte cōcretionē adna-
tam instar lupini. Parum siticulosus erat. vigil. prudēs. Sexta
dexter oculus maior dum videret. Septima mortuus est. Ve-
rum alius ante mortem eleuata fuit. & mortuo posteriores **Meton.**
partes rubefactæ sunt. Metoni circa pleiadum occasum fe-
bris. lateris sinistri dolor vsq; ad clauiculā, atq; is adeò vehe-
mens vt quiescere non posset. & inflāmatio tenebat. alui ege-
stio multa, biliosa. In tribus ferè diebus cessauit dolor. Ca-
lor autē circa septimum aut nonū. Tussis inerat. excreatio-
nes neq; biliosæ, neq; multæ fiebant, verum pituitosæ. tussis
comitabantur. cibos gustabat. quādoque velut sanus exhibat.
Corripiebant autē aliquando calores tenues modico tēpore.
C sudores fiebant ad noctē. Spiritus in calore densior. maxilla-
rum rubor. circa latus grauitas, & sub alas, & ad humerum,
tussis tenebant. medicamentum per superna eduxit biliosa.
Tertia à medicamento erupit pus, verū ab initio morbi
quadragesima. repurgabatur circa trigintaquinq; alios dies,
& sanus euasit. Vxori Theotimi in semitertiana anxietas, **Theotimi,**
& vomitus, & simul horror incipiente febre. & sitis. progre- **vxor.**
diente tēpore incipiēte febre calor ingens. Vbi aquam mul-
sam bibisset, & vomuisset, & horror, & anxietas sedata sunt.
& mali punici succum postea accepit. Diopithis sorori in **Diopithes.**
semitertiana, cordis dolor grauis circa accessiōē, & comita-
batur is totā diem. & huiusmodi cordis siue oris ventriculi
dolor etiā aliis similiter aderat. Veruntamen sub pleiadis **Apomotis.**
occasum viristalia rariora fiebant. Vxori Apomoti in se-
mitertiana

Hippocratis Liber VII.

**Terpidas.
Doriscus.**

mitertiana circa arcturum, vehemens cordis dolor circa ac- **D**
cessionem. & vomitus. & strangulationes ab vtero simul in-
stabant, & ad dorsum dolores iuxta spinā. Quum autē huc
ipsi peruenirent, cordis dolores cessabant. Terpida matri à
Dorisco, quum abortus factus esset mense quinto gemello-
rum, ex casu, ab altero quidē statim, velut in tunica quadā li-
berata est. ab altero vero prius aut posterius quadraginta
diebus. Postea autē concepit in ventre. At anno dolores ve-
hementes circa ventrē ad multū tempus, quandoq; incipie-
bant ex collo ac spina, confidebant autē ad imum ventrem
& inguina: quandoq; ex genu dextro, confidebant autem ad
eundem locū. Et quum quidē iuxta ventrem dolores essent,

Cleomenes.

alius eleuabatur, quum verò sedarentur, cordis dolor coin- **E**
cidebat. Verum strangulationes nō aderant. Sed frigiditas
corporis, velut in aqua iacētis. Tempore quo dolor fiebat,
per totum corpus dolores spargebantur, mitiores his qui ab
initio erāt. allium, silphiū, acria omnia nō cōferebant, neque
dulcia, neq; acida: neque vīna alba. Verū nigra, & balnea
rara. Ab initio quoq; vomitus vehemētes fiebant, & ciborum
exclusiones. & circa dolores menses non apparebant. Cleo-
menis vxori circa fauonij flatus, ex nausea & lassitudine, la-
teris sinistri dolor, ex collo ac humero auspicatus. febris &
horror, & sudor. Inccepit autem febris, & non desit, sed au-
gescebat. & dolor vehemēs. tussis. excreatio subcruenta, pal-
lida, multa, lingua alba. alui egestionēs moderatæ, liquidæ.
vrinæ biliosæ. Quarta ad noctē mēses prodierunt multi. **F**

**Epichar-
mus.**

**Polemar-
chus.**

fauit & tussis, & excreatio, & dolor. calor autem tenuis. Epi-
charmi vxori ante partum dysenteria. dolor. alui egestionēs
subcruentæ, mucosæ. Vbi peperisset, statim sana erat. Pole-
marchi vxori in morbo articulari coxæ dolor derepente,
mensibus nō prodeuntibus. Vbi betæ succū bibisset, vox sup-
primebatur per noctem, & vsq; ad meridiem. attamē audie-
bat, & sapiebat, & manu significabat, dolorē esse circa coxā.

Clinias.

Cliniæ sorori seniori vomitus, quicquid accepisset per qua-
tuordecim dies, citra febrem. cruentorū vomitionum reie-
ctiones. & cōtracta strangulatio ad cor procedebat. Castoriū,
feseli, mali punici succus, sedauerunt omnia, abscessit autem
dolor moderatus ad lateris mollitudinem bulbi succus, &
vinum lactei teporis, austerū. & panes quā paucissimi cum
oleo.

De Morbis Popularibus.

377

- A** oleo. Pausaniæ filiam ex fungi crudi esu, anxietas. strangu- Pausanias.
latio. dolor vëtris. Aquam mulsam calidã bibere ac vomere
profuit. & balneum. In balneo fungum euomit. & vbi illa
cessatura essent, exsudauit. Epicharmo circa pleiadum oc- Epichar-
casum, humeri dolor, & grauitas vehemēs ad brachium. an mus.
xietas. vomitus multi. aquæ potus. Euphranoris filio pustu- Euphra-
læ velut à culicum morfu. Post faonium ficcitates fiebāt, nor.
vsque ad æquinoctiũ autumnale. Sub canem, æstus vehemen-
tes, & venti calidi, & febres sudorificæ. & statim aliquantum
recalescebant. Tubercula verò iuxta aurem multis fiebant.
Aniculæ à tussi vexatæ circa nonã diem. Adolescenti spleni-
co ancillæ filio, aluo liquefacta, circa idẽ tempus. Ctesiphon- Ctesiphon
B ti sub arcturum, ferè circa septimã. Adolescenti solũ suppu-
rata sunt. Eratylli filio euauerunt. Circa vtraque tempo- Eratyllus.
ra, nullæ exudationes. lingua præ ficcitate blæsi. Recti venti
spirauerunt multi ac frigidi. & niues ex clemēti cœlo quan-
doque fiebant, & post æquinoctium, austrina aquilonaribus
permixta. aquæ multę. populariter grassatæ sunt tusses mul-
tæ, magis autem in pueros. Circa aures multis talia, qualia
Satyri habēt. Quandoq; verò ante hoc tempus hyems valde
hyberna erat, cū niue & pluuiis aquilonaribus. Timonactis Timonax.
filio fermè bimestri pustulæ in cruribus, & in coxis, & lum-
bis ac imo ventre. & tumores valde rubicundi. His autẽ se-
datis, conuulsiones & comitiales fiebant, sine febribus, mul-
tis diebus. & mortuus est. Polemarchi filio contigit qui- Polemar-
C dem vt priore tempore suppuratus esset, & exscrearet. post- chus.
ea vero calores ipsi erant. & hydropicus erat, & splenicus, &
anhelosus. ad locum accliuem si quãdo accederet, impotēs, &
siticulosus. quãdoq; etiam cibum leniter auersabatur, & fic-
cæ tussiculæ ad multũ tempus ita fiebant, titubans obambu-
labat. & si nõ facile solubilis esset aluus deorsum, plena red-
debatur. & anhelatio ac strangulatio magis fiebāt. Tandem
autem defluxus & excreatio superuenit, ac tussis. Exscrea-
tio crassa, pallida, purulenta, & febris vehemens cessasse vi-
debatur. & tussis mitior. & excreatio pura. Rediit rursus fe-
bris acuta, spiritus densus. mortuus est. Verũ antea rigue-
runt pedes, & postea perfrigeratus est. Spiritus magis inter-
clusus est. Vrina substitit. extreme partes perfrigeratæ sunt.
prudens mortuus est, tertia die à recidiua. Thyni filio in Thynus.
febres

B b 5

Hippocratis Liber VII.

febre ardente inedia macerato, alui egestio multa. Verum cum bile, & animi deliquio. & sudore multo fiebat. perfrigeratus est valde. voce destitutus erat tota diem ac noctem. Instillatum ptisanæ succum continuit. sapiebat. bene spirabat.

Epicharmus.

Epicharmi filio accidit ex via & potu cruditas. Postridie mane anxietate oborta, ubi aquam, acetum, salem bibisset, euomuit pituita. Postea rigor apprehendit. lauit febricitans.

Ariston.

Pectus dolebat. Terria mane statim sopor modico tempore tenebat, & delirabat. & febris acuta. grauiter morbum tulit.

Polyphantus.

Quarta vigil. mortuus est. Aristoni ulcerato pedis digito, cum febre loquelæ obscuritas. Carcinoma ascendit usque ad genu. periit. Erat autem nigrum, subaridum, graueolens. Cui carcinoma in faucibus visum est, sanus euasit à nobis. Polyphantus in Abderis caput dolebat in febre vehementi. Urinae tenues, multae. Subsidentiae densae & conturbatae. Quum autem non cessaret dolor capitis, sternutatoria decima die adhibita sunt. Postea ad collum dolor vehemens. Urina prodiit rubicunda conturbata velut iumentum. mente motus est phrenitico modo. Mortuus est in vehementibus conuulsionibus.

Eualcides.

Consimiliter etiam Eualcidæ famula, quum multo tempore densae urinae prodissent, & capitis dolores adessent, phrenitica facta mortua est, eodem modo ex vehementibus doloribus. Nam urinae densae ac conturbatae, certum signum sunt doloris capitis, & conuulsionis, ac mortis.

Halicarnassensis.

Halicarnassensis qui in domo Xanthippi diuersabatur, aurem hyeme dolebat, & caput non mediocriter. Erat autem annorum circiter quin-

Metrodorus.

quaginta. Vena secta est iuxta Mnesimachum. laesum est caput euacuatum, ac perfrigeratum. Non enim facta est suppuration. Phreniticus factus est, & mortuus. Urinae erant & huic densae. In Cardia Metrodori filio ex dentium dolore corruptio maxillae, & gingivarum vehemens carnis excrescentia, mediocriter suppuration facta est. exciderunt dentes molares, & maxilla.

Anaxenor.

Anaxenor in Abderis, erat quidem splenicus, & viciati coloris. Contigit autem ipsi ut tumor circa femur sinistrum obortus, derepente euanesceret. Non multis vero postea diebus oborta est ipsi circa splenem velut pustula nocturna ab initio, insuperque tumor ac rubor durus. Post diem quartum febris ardens oborta est. & liuefacta sunt omnia circumcirca, & putrida videbantur. mortuus est.

Verum prius

- A** prius subpurgatus est, & intelligentiam habebat. Clonigus in Abderis, erat quidem nephriticus, mingebat autē sanguinem paulatim plerunq; difficulter. Vexabat etiam aluus dysenterica. Huic mane quidē dabatur lac caprinum, & aquae quinta pars, ita vt ex ambobus compositum totū essent heminae tres. Ad vesperam autem, panis valde assatus, obsonia, beta aut cucumis. Vinum nigrum tenue. Dabatur etiā cucumis pepo. Hac verò victus ratione quum vteretur, & aluus substitit, & vrinae purae prodibāt. Bibit autem lac donec vrinae restitutae sunt. Mulieri in Abderis carcinoma factū est circa pectus, erat autem tale, per papillam sanies subcruenta fluebat. intercepta autem fluxione, mortua est. Dinij filio in Abderis vmbilicum mediocriter fauciato, fistula parua relicta est. & quandoq; etiam lumbricus per seipsum satis crassus penetrauit. & quum febriret, vomebat biliosa, quādoque verò & haec ipsa per fistulā prodibant. Allapsum est & intestinum ipsi ad fistulam, & velut fistula corrodēbatur, & rursus refringebatur. & tusses permanere prohibebant. Pythonis filio in Pella febris statim incoepit multa. & in somnum collapsio. & cum vocis interceptione, somni fiebant. & aluus dura per omne tempus. At glāde ex felle subdita, multa egerebat, & statim remittebat. Verū breui aluus rursus eleuabatur. & febris exacerbabatur. & collapsio in somnum per eadem. Quum autē idem ductus esset, datum est medicamentum quoddā ex his quae cnico, & cucumere syluestri, & peplo constant. & biliosa egestio erupit. & statim sopor sedatus est. & febris mitigabatur. & omnia leuiora facta sunt. & iudicatus est in die decimaquarta. Eudemus splenem vehementer dolebat. imperarunt ipsi medici vt multum ederet, & vinum biberet modicum, tenue, & multum deambularer. nō mutatum est quicquam. Vena secta est, cibos ac potus parce sumpsit, deambulationes fecit sensim augmēto facto. Vinum bibit nigrū, tenue. sanatus est. Philistidi Heraclidæ vxori coepit febris acuta. rubor. faciei, ex nulla manifesta causa. paulo post in die rigorem habuit. quum non recalesceret, conuulsio facta est in digitis manuum ac pedū. paulo post recalescēta est. minxit vrinas compactis quibusdā innatātibus, nubeculosas, diuulsas. noctē dormiuit. Secūda die rursus riguit. paulo magis calefacta est. & rubor minor. & conuul

Clonigus.

Mulier
Abderita-
na.
Dinius.Python.
Pella.

Eudemus.

Philistides.

Hippocratis Liber VII.

cōuulsiones fiebāt moderatiores. Vrinæ cōsimiles, noctē dor **D**
 miuit, parū vigilauit, quū nulla molestia premeretur. Tertia
 die minxit coloratiora, modicā subsidentiā habentia, eadem
 hora rigor apprehēdit. Febris acuta, sudor ad noctē per totū
 corpus. Verūm vesperi color ad morbi regij modū permuta-
 tus est, noctu dormiuit, ac per totum corpus sudauit. Quarta
 sanguis ex sinistra nare probè fluxit, & mēses pauci cōparue-
 runt ordinatē. Rursus autē eadē hora febris exacerbata est.
 Vrinæ compactis quibusdā innatantibus paucae. Alius natu-
 ra quidem dura, verū multo magis substitit, neq; quicquam
 prodibat, si non glandem subdidisset, noctē dormiuit. Quin-
 ta febris mitior, & ad vesperam per totū corpus sudabat, &
 mēses prodierūt, & noctē dormiuit. Sexta minxit acernatam **E**
 multam vrinā, compactis quibusdam innatātibus, modicam
 subsidentiā habentem, concolorē. Circa meridiem verò pa-
 rum rigore tenebatur, aliquantum incaluit, sudauit per to-
 tum, noctem dormiuit. Supina parum calefacta est, facilē tu-
 lit, sudauit per totum, vrinæ boni coloris. Iudicata sunt o-
 mnia. Tychon in obsidione circa Datum, iētus est catapulta
 in pectus, & paulo post risus erat circa ipsum tumultuosus.
 Videbatur autē mihi medicus eximens lignū, reliquissē fer-
 rum in septo trāsverso, & quū ipsi ita videretur, ad vesperam
 infusum per clysterē adhibuit, & pharmacū deorsum purgās
 dedit. Noctē primā transegit. Statim verò vbi dies illuxisset,
 & medico, & aliis melius habere videbatur, erat enim quie-
 tus. Prædictio facta est, quòd vbi conuulsio fieret, non tardē **F**
 moriturus esset. Sequentē noctem molestē ferens, in somnis
 plerunq; in ventrem decūbens. Tertia mane conuellebatur.
 Circa meridiem mortuus est. Eunuchus ex venatione & di-
 scursu hydropicus factus est. Quidam circa Elealcis fontē, ad
 sex annos habuit ex equitatione inguinū tumorem, varices,
 & coxendicū dolores. Qui lateris mollitudine tabuit, septi-
 ma die mortuus est. Præpotent crudi salsa cum melle. Scor-
 ratio turpis, dysenteria medela est. Leonidæ filia natura
 concitata, auersa est: auersa, in iram excanduit: vbi ira excan-
 duit, reconciliata est. Medicus non intellexit, puella mortua
 est. Philotimi filius puber venit, ad me in Iechina, caluariae
 os habens medicina destitutum: in quo videbam occultas ra-
 tiocinationes non esse constantes.

Tychon.
 Cur hic re-
 peratur, nō
 video.

Eunuchus.
 Elealcis
 fons.

Leonides.

Philoti-
mus.

HIPP.

AHIPPOCRATIS

COI LIBER DE VICTVS

RATIONE IN MORBIS ACV-

TIS, IANO CORNA-

RIO MEDICO PHY-

SICO INTER-

PRETE.

B Priscorum medicorum tres fuisse familias *inuenio Galenus libro primo de Curandi via & ratione. Vna eorum fuit medicorum, qui Cum insulam incolebant, quorum fuit princeps Hippocrates. Alia Rhodiorum. Tertia secta auctores Cnidij vocabantur à Cnido insula, vna ex quinque Cycladibus. Horum placita Hippocrates, hoc loco Cnidas sententias vocat.*



Vi Cnidas appellatas sententias conscripserunt, rectè quidem scripserunt ea quæ patiuntur agroti in singulis morbis, & quomodo quædam ipsorum euenerunt: & hætenus quidem etiam qui medicus non sit, rectè conscribere possit, si probe ex singulis agrotis quæ patiuntur didicisset. Quæ verò medicum ante discere oportet, agroto non referente, horum pleraque omissa sunt, alia in aliis, & quædam valde commoda ad coniecturam. Quum autem ad coniecturam dicatur, quomodo singula curare oporteat, in his multa aliter sentio quàm velut illi prodiderunt. Et non solum ob hoc non laudo. Verùm quòd etiam paucis numero vsi sunt medicamentis. Nam exceptis morbis acutis, plurima ab ipsis relata sunt pharmaca aluum deorsum purgantia exhibenda, & serum ac lac pro tempore. Si quidem igitur hæc bona essent, & morbis conuenientia, in quibus exhibenda esse monuerunt: longè magis laudanda essent, eo quòd quum pauca sint sufficiunt. Nunc verò res non ita habet. Qui tamen postea eam tractationem repetiuerunt, magis sanè medico modo, de his quæ singulis exhibenda sunt, transegerunt. At neque veter

Hippocratis Liber De victus

veteres quicquam memorabile de victus ratione conscripserunt, & quanquam magna hæc res sit, eam omiserunt: attamen multos in singulis morbis modos, multiplicemque ipsorum diuisionem non ignorarunt aliqui. Caterum numeros singulorum morborum clarè pronuntiare volentes, non rectè scripserunt. Non enim facile sit enumerare, si ex eo quis agrotantium morbum æstimet, quod alter ab altero aliqua re differt: & ideo non putet eundem morbum esse, si non idem nomen habeat. Mihi verò placet, ut in vniuersa arte mentem adhibeamus. Nam quæcunque opera bene ac rectè tractat, ea singula bene ac rectè facere oportet: & quæ cito, cito: & quæ purè, purè: & quæ citra dolorè tractare oportet, ita facere ut quàm minimus dolor sentiatur: & alia omnia eiusmodi insigniter præ aliis ad meliorem modum transfigere oportet. Maximè verò laudauerim medicum qui in acutis morbis, qui plurimos homines occidunt, præ aliis insigniter ad meliorem partem excellat. Sunt autem hi acuti, quos veteres nominauerunt pleuritidem, peripneumoniã, phrenitidem, & febrem ardentem, & alij morbi qui ex his hærent, quorū febres omnino continuæ sunt, & occidunt. Quum enim non pestilentis morbi modus quis cõmunis grassatus fuerit, sed sparsi fuerint morbi, & nō similes ab his morbis plures moriuntur, quàm ab aliis omnibus. Idiotæ igitur non valde cognoscunt eos qui in his, aliis præstant: aliarumq; curationum magis aut laudatores, aut vituperatores existunt. Et profectò magnum signū hoc est, quòd populares minimè de his morbis intelligentiã habeant, veluti quos studio consequi oportet. Nam qui medici non sunt, medici esse videntur, maximè propter hos morbos. Facile est enim nomina ediscere, quæ proferri solent apud agros his morbis affectos. Si enim quis ptisanæ succum nominarit, & vinum tale, aut tale, aut etiam aquam mulsam, omnia hæc eadem plebeiis hominibus, & meliores, & deteriores medici dicere videntur. At res hæc nō ita se habet, sed in his sanè vel maximè alij ab aliis differunt. Videntur autem mihi digna esse quæ scribantur maximè hæc quæ ignorantur à medicis, maximè scitu cõmoda, & quæ magnas vtilitates, aut magna detrimenta afferunt. Quæ itaque ignoratur hæc sunt. Cur nam in acutis morbis, aliqui medici omne æuum terunt, ptisanas non colatas exhibentes, & rectè se

Acuti morbi qui.

A et se medicari putant. Aliqui verò plurimi faciunt, ut nullū ordeum ager deuolet. Magnum enim detrimentum afferre arbitrantur. Verum per linteum excolantes succū exhibent. Quidam verò ipsorum neque ptisanam crassam dederint. neque succum: atque hi partim donec ad septimū diem ager perueniat, partim verò perpetuò, donec iudicatus fuerit morbus. Sanè huiusmodi quæstiones ne proponere quidē medici consueuerunt: fortassis autem neque si proponantur, compariantur. Proinde calumniam incurrit tota ars apud vulgus adeò magnam, ut neque omnino medicinam esse putent. Nā in acutis morbis intantum inter se differunt artifices, ut quæ alter exhibet optima esse putans: ea alter iam mala esse existimet: & ferè ob id artem vaticinationi similem esse dixerint. Quia vates eandem auem, si sinistra appareat, bonā esse ducunt: si dextra, malam. Et in aruspicina talia sunt, alia in aliis. Verum aliqui vates contraria his dicunt. Assero autem hanc speculationem pulcherrimam esse, & cognatā plurimis ac maximè cōmodis in arte. Nam ægrotantibus omnibus plurimum ad sanitatē confert, & sanis ad securitatem, & his qui se exercent, ad bonum habitum, & ad quod quisque voluerit.

Ptisana igitur rectè omnibus frumentaceis eduliis prælatā esse videtur, in morbis acutis, & laudo sanè eos qui ipsam prætulerunt. Nam viscositas ipsius levis est, & continua, & iucunda, & lubrica, & moderatè humida, & sitim eximit, & facile eluitur: si fortè & hoc opus sit: & neque adstrictionem habet, neque malam turbationem, neque in ventre intumescit. Intumuit enim in coctura quā maximè tumesceri solet. Quicunque igitur ptisana in hisce morbis vtuntur, nulla die vasa vacua fieri permittant, ut ita dicam, led vtantur, & non intermittant, si non aut ob medicamenti, aut infusi per clysterē vsum, intermittere oporteat. Et qui quidē bis in die cibum capere soliti sunt, eis bis dāda est: qui verò semel edere consueuerunt, his semel primo die danda est. Verum sensim progressu facto, si fieri poterit, etiam his bis detur, si sanè opus habere visum fuerit. At verò copia sufficit ab initio dare non multa, neq; minus crassam: sed vt consuetudinis gratia quid ingeratur, & vt ne multa vasorum vacuatio fiat. Ceterum quod ad augmentum copię sorbitionis attinet, si quidem sicciior fuerit morbus, quā m quis putarit, nō ita magna copia

Artificum
differentia.Vnd. M.
VltusPtisanæ
laus.Ptisana
quādo ex-
hibenda.

Hippocratis Liber De victus

Copia dare oportet, sed ante sorbitionē, aut aquam mulsam, **D**
aut vinum præbibendum exhibere, vtrum ex his conuenien-
tius fuerit. Vtrum verò conueniat, in singulis modis refere-
tur. Si verò os humectetur, & à pulmone prodeuntia qualia
oportet fuerint, sorbitionis copiam, vt in summa dicam, au-
gere oportet. Quæ enim citius & magis humectantur, cele-
ritatem iudicationis significant. Quæ verò tardius & minus
tardio rem iudicationem significant. Et hæc quidem per se ta-
lia omnino existūt. Verum multa quoque alia commoda o-
mittuntur, ex quibus coniecturas facere oportet, quæ postea
referetur: & quanto copiosior purgatio fuerit, tanto plus da-
re oportet, vsq; ad iudicationem, maximè duobus à iudica-
tione diebus, quibus sanè quinta, aut septima, aut nona iudi-
care videtur: ita vt etiā parium ac imparium dierum ratio-
nem habeas. Postea verò sorbitione quidem mane vtendum
est. Vesperè verò ad cibos transeundum. Conueniunt autem
talia vt plurimum his qui statim tota ptisana vtuntur. Nam
& dolores in pleuriticis statim sua spē cessant, vbi memo-
rabile quid spueri ac expurgari cœperint: & purgationes lo-
gè perfectiores sunt, & minus suppurati sūt, quàm si quis ali-
ter victum suppeditet: & iudicationes simpliciores, & me-
lius iudicantes, & minus reuertētes. Ptisanam porrò ex opti-
mo hordeo factam esse oportet, & quàm optimè coctam, &
præsertim si non solo succo vti velis. Nam vnà cum reliqua
ptisanæ virtute, lubricitas facit, vt ordeum dum deglutitur
non lædat. Nusquam enim adhæret, neque secundum thora **F**
cis rectitudine mora trahit. Lubricissima autem est, & ma-
ximè sitim eximit, & facillimè concoquitur, & debilissima
est, quæ optimè cocta est, quibus omnibus opus est. Si quidem
igitur non opem tulerit quis quantum opus est, vt sufficiens
sit eiusmodi ptisanæ sorbitionis modus, multis modis læde-
tur. Etenim verbi causa, quibus cibus intus conclusus est, si
quis non facta deorsum euacuatione, sorbitionem dederit,
dolorem si adest amplius exacerbauerit: & si nō adest, statim
induxerit: & spiritus densior fiet. Hoc verò malum est. Pul-
monem enim resiccat, & præcordium, & pectinem, ac septū
transuersum dolore affligit. Quinetiam si lateris dolor assi-
duus est, & ad calefactoria non remittit, & sputū non prodit
sed circa putrefactionem ac concoctionē valde viscosum fit,
si non

A si non soluerit quis dolorem: aut ventrē mollito, aut vena se-
cta, vtrum tandem horū conducet: ptisanam autem ita habē
tibus dederit, cito mors talium cōtinget. Propter has igitur
 causas, & alias huiusmodi adhuc magis, qui tota ptisana utū
 tur, septima die & citius moriuntur, partim mente læti, par-
 tim ab erectæ cervicis spiratione, & stercore suffocati. Tales
 verò veteres sydere ictos esse putauerūt, ob hoc quidē maxi-
 mē, nō minus autē quod & mortuis ipsis latus liuidum repe-
 ritur, vt simile quid plagæ appareat. Causa verò huius est,
 quod prius quā dolor solvatur, moriuntur. Citò enim an-
 helosi fiunt. Præ multo autem ac denso spiritu, velut iam di-
 ctum est, valde viscosum circa cōcoctionē fit sputū, & egres-
 sum fieri prohibet. Imò stertorē inducit, chartilaginosus pul-
 monis arteriarū partibus bronchiis appellatis impactum: &
 vbi ad hoc deuenierit, lethale iam plerūq; existit. Nam & ip-
 sum sputum impactum, prohibet quidem spiritū intus fer-
 ri, cogit autem citò extra ferri. Atq; sic mutuā opem ad ma-
 lum inter se cōferunt, dum & sputum impactū, densum spi-
 ritum facit: & hic cū densus sit, sputū insuper viscosum fa-
 cit, & lubricum fieri ac elabi impedit. Occupant autem hæc,
 non solum si ptisana intempestiue vtantur: verū multò ma-
 gis, si quid aliud ederint, aut biberint, quod minus quā ptis-
 ana idoneum sit, proinde plerumq; consimilia sunt auxilia,
 & his qui tota ptisana vtuntur, & his qui succo ipsius: his ve-
 rò qui neutro horum, sed solo potu, quandoq; etiam diuersi-
 modè auxiliari oportet. At verò hoc modo omnino facere **Quid ob-**
 oportet. Si cui à cibo recens accepto, & aluo nondū subeua- **seruandū,**
 cuata, febris incēpit, siue cum dolore, siue sine dolore, inhi-
 benda est sorbitionis exhibitio, donec putarit cibum ad in-
 fernam intestini partem secessisse. Utendū autem est potu
 aceti mulsi, si dolor affuerit, hyeme quidem calidi, æstate ve-
 rò frigidi. Si verò multa fuerit sitis, etiam aqua mulsa, & a-
 qua. Postea verò si dolor aliquis affuerit, aut periculosi ali-
 quid apparuerit, danda est sorbitio neq; multa, neq; crassa,
 atq; hæc post septimū, aut nonū diem, si validus æger fuerit.
 Si verò non subiit vetustior cibum ei qui recens cibum accep-
 pit, si quidem validus sit, & ætate vigeat, infusum per clyste-
 rem adhibendum est. Si verò debiliior fuerit, glande utendū
 est, si non sua sponte probè prodierit. Tempus porro exhiben-
 da

Hippocratis Liber De Victus

de sorbitionis hoc maxime obseruare ab initio, & per omne morbum oportet. Quum quidem pedes frigidi fuerint, inhibere oportet sorbitionis exhibitione. Maxime vero & a potu abstinendum est. Vbi vero calor descenderit ad pedes, tunc exhibere conuenit, & putare in omnibus morbis, & non minime in acutis, & maxime in his qui magis febriles ac periculosissimi sunt, tempus hoc magnam vim habere. Utendum est autem primum quidem maxime lacte. Deinde vero ptisana iuxta praedictas coniecturas diligenti facta consideratione. Ca-

Lateris doloribus qui bus subueniendum.

terum pleuritis, hoc est dolor lateris, siue ab initio fiat, siue postea, calefactoris quidem primum non alienum est retinere dissoluere. Ex calefactoriis vero optima est aqua calida in vtre, aut in velica, aut in vase aeneo, aut testaceo admota. Verum molle quid antea ad latus supponere oportet. Lenitatis ergo. Comode etiam spogia mollis, magna, ex aqua calida expressa apponitur. Cōtegere vero stragulis ipsum fomentum oportet. Nam & ampliore tempore sic sufficiet & durabit, & simul ut ne vapor ad aegrotantis spiritum afferatur, nisi fortassis & hoc ad aliquid commodum esse visum fuerit. Aliquando enim ad aliquid commodat. Insuper autem & ordeum, & eruum in aceto diluto, ita ut paulo acidius sit quam ut quis bibere possit, dissoluta ac feruefacta, & in marsupia coniecta, apponere oportet, & furfur eodem modo. Siccum autem fomentum praebent sal & milium torrefactum, in laneis sacculis conuenientissimum. Nam & leue, & tene est miliu. Soluit autem huiusmodi mollitorium fomentum, etiam dolores ad clauiculam pertingentes. Sectio autem venae non similiter soluit dolore si non ad clauiculam pertingat dolor. Quod si ad calefactoria dolor non soluitur, non multo tempore calefacere oportet. Resiccat enim hoc pulmonem, & suppurationem facit.

Ad clauiculam dolore extenso medela.

At si quidem dolor ad clauiculam de se significationem praebet, aut grauitas ad brachium, aut circa mamma aut supra septum transversum: venam secare prodest in cubiti flexura internam, & non cunctari copiosum sanguinem detrahare donec multo rubicundior fluxerit, aut pro puro & rubicundo liuidus. Vtrunque enim contingit. Si vero sub septo transverso fuerit dolor, ad clauiculam autem de se significationem non praebet, aluum mollire oportet, aut veratro nigro, aut peplo, ita ut veratro quidem daucum, aut seseli, aut cuminu, aut

A aut anisum, aut aliud quid ex odoratis ammisceas, peplio vero sulphur succum. Sed hæc inter se si misceantur, consimilis modi existunt. Ducit autem nigrum veratrum melius, & ad iudicationem commodius quam peplium. Peplium verò flatus magis erumpere facit. Ambo autem hæc dolorem sedant.

Sedant item alia multa aluum subducentia medicamenta. Verum hæc inter ea quæ ego noui optima sunt. Alioqui & ea quæ in sorbitionibus exhibentur aluum subducentia medicamenta opitulantur, quacumque non valde iniucunda sunt, aut ob amaritudinem, aut propter aliam quãdam iniucunditatem, aut ob copiam, aut colorem, aut aliquam suspensionem. Ptisanam tamen statim insuper sorbendam dare oportet, postquam medicamentum bibit, non memorabili copia pauciorẽ, quàm quantam sumere aduersus est. Nam & rationi consentaneum est, in

B media purgatione sorbendam non dare. Quum autem cesserit purgatio, tunc minus sorbeat de ea, quàm aduersus est. Postea verò reducat semper ad maiorem copiam, si & dolor sedatus fuerit, & nihil aliud aduersetur. Idẽ mihi sermo est, si etiã ptisanæ succo uti opus fuerit. Melius enim esse assero, statim omnino incipere sorbere, quàm præuacuatis iam vasibus sorbere auspicari, aut tertia, aut quarta, aut quinta, aut sexta, aut septima die, si sanè non iudicatus fuerit morbus ante hoc tempus. Præparationes autẽ & his consimiles faciendæ sunt, quales dictæ sunt. De sorbitionis igitur exhibitione ita sentio. Sed & de potu, qualemcumque tandem quis ex descri-

C bendis sumpturus est, eadẽ mihi penitus sermonis ratio est. Noui autem etiã medicos maximè contraria facere his quæ fieri oportebat. Omnes enim volunt, ubi sub morborum iniuria homines fame premacerarunt, duobus aut tribus, aut etiã pluribus diebus, sic sorbitiones exhibere, itemque potus: & fortassis etiam par ipsis esse videtur, ut magna corpori mutatione fiante, etiam magnũ quid valde contra obiciatur. Verum mutare quidem non parum, bene habet. Recte tamẽ mutatio transferenda est, & ex mutatione adhuc magis exhibitio eorũ quæ per os sumuntur. Maximè igitur lædi poterunt, si non rectè mutationem fecerint, hi qui tota ptisana utuntur. Poterunt etiam lædi qui solo succo utuntur, lædi quoque possunt qui solo potu utuntur. Minimè verò hi. Oportet autẽ & in sanorum adhuc hominum victu addiscere quæ conferunt:

Error medicorum.

Cc 2

Si

Hippocratis Liber De Victus

Consuetudo multū potest.

Si enim sanis tales aut tales victus multum differre videtur, D
tum in aliis quibusdam, tum in mutationibus: quomodo nō
etiam in morbis multum differant, & maximè in acutis? At-
qui facile est hoc addiscere, quòd simplex victus cibi ac po-
tus, ipse sibiipſi semper similis, securior omnino est ad ſani-
tatem, quàm si quis derepēte ad alium meliorem, magnam
mutationem faciat. Nam & his qui bis in die cibum ſumūt,
& his qui ſemel, repentinæ mutationes noxas ac ægritudi-
nes inducunt, & eos ſanè qui prandere non adſueti ſunt, ſi
pranſi fuerint, ſtatim inſirmos facit hoc, & toto corpore gra-
ues & debiles, & pigros. Si verò etiam inſuper cœnauerint,
acidum ructantes. Quibusdam verò etiam alui liquida ege-
ſtio oboritur, quum præter conſuetudinem ventriculus gra-
uetur, ſolitus reſiccari, & non bis intumeſcere, neq; bis cibos
coquere. Auxiliatur igitur his, mutationē rursus adæquare,
domire enim oportet velut nocte reducta poſt cœnam, hye
me quidem, abſque frigore, æſtate verò, abſq; calore. Si verò
dormire nō queat, vbi multam lentam deambulationē non
ſtando oberrauit, nihil cœnet, aut pauca, eaque innoxia. Inſu-
pérq; minus bibat, & potum nō aquoſum. Talis autē adhuc
magis aſtigitur, ſi ter in die ad ſacietatē cibum acceperit, &
adhuc magis ſi ſæpius. Quanquàm ſanè multi ſunt, qui facile
ferunt, ſi ter in die cibū copioſè accipiāt, qui ita ſunt adſueti.
Quin & hi qui bis in die cibū capere ſoliti ſunt, ſi pranſi nō
fuerint, debiles & inſirmi ſunt, & ad omne opus timidi, &
ventriculi oſculum dolet. Viſcera enim pendere ipſis viden-
tur: & calidā ac cum virore pallidam vrinā mingūt, & alui
egeſtio comburitur. Quibusdam etiā os amareſcit, & oculi
caui ſiunt, & tempora palpitant, & extremæ partes perfrige-
rantur. Et plerique ex his qui pranſi non ſunt, cœnam edere
non poſſunt. Si verò cœnā ſumpſerint, ventriculum grauāt,
& multo magis ægrè in lecto degunt, quàm ſi etiam pranſi
fuſſent. Quum igitur talia hæc ſanis fiāt, ob victus dimidiæ
diei mutationem præter conſuetudinem: apparet neque ap-
ponere, neque detrahere commodum eſſe. Si igitur hic qui
præter conſuetudinem ſemel in die cibum accepit, vbi tota
die vaſa vacua fecit, quantum conſuevit cœnauerit, veriſimi-
le eſt ipſum, ſi tūc quum impranſus eſſet doluit ac ægrotarit,
& vbi cœnauit grauis fuit: multo magis grauari, Si verò etiā
long

A longiore tempore euacuatis vasis, postea derepente cœnauerit, adhuc magis grauiabitur. Qui igitur præter consuetudinem vasa vacua fecit, ei hac diem rursus adæquare sic cōducit absque frigore, & calore atque labore, hæc enim omnia grauius tulerit. & cœna multo minor exhibenda est, quàm consuevit, eaq; non sicca, sed modi humectioris & postea bibat potum non aquosum, neque pauciorē quàm pro cibi ratione. Sed & postera die pauca prandeat, quo sensim progressu fiente ad consuetudinē reuertatur. Qui tamen supernas partes amara bile infestantur, talia molestius ferunt. Pituitoli autē supernis partibus, cibi præter morem abstinentiam omnino facilius ferunt. Quare etiā semel in die cibum præter

B ter morem capere, facilius utique iidem tulerint. Sufficiens igitur & hoc signum est, quod maximè mutationes eorum quæ circa naturas nostras ac habitus contingunt, maximè morbos faciunt. Non igitur licet intempestiue, neque vehementissimas vasorum vacationes facere, neque vigentibus morbis, & in inflammatione consistentibus, cibos exhibere, neque licet derepente in tota re quicquam, aut huc aut illuc mutare. Multa verò his cognata, ex his qui ventri contingunt, itēq; alia referre quis possit, quod facile quidam ferunt cibos, quibus adsueti sunt, etiamsi natura nō sint boni. Similiter etiā potus: agrè autem ferunt cibos, quibus adlucti nō sunt, etiamsi nō sint mali, similiter etiam potus, & quæ quidem multus carnis esus præter consuetudinē assumptus

C facit, aut allium, aut silphiū, aut succus ipsius, aut caulis, aut alia huiusmodi, magnas quasdam peculiare vires habentia, minus admiretur quis ubi talia dolores ventriculis magis quàm alia inducunt. At iusta fuerit admiratio, si didiceris quantam maza turbationē, & molē, & flatum, & tormē ventriculo inducat si præter morē ingesta fuerit, ab eo qui mazam edere nō est solitus: aut qualem sitim panis ipse calidus ingestus inducat, & repentinā repletionem, ob siccandi vim, & quod tardè transit: & quàm diuersas inter se affectiones faciant, & panes valde puri, & qui ex toto sunt collati, præter consuetudinē in cibo accepti, itēq; maza sicca præter morem, aut liquida, aut viscosa: & quale quid faciāt polentæ recentes nō adsuetis, & aliæ his qui recentibus uti adsueti sunt itēq; vini & aquæ potus, præter morem derepente vicissim

Calidus panis sitim adfert.

Hippocratis Liber De Viſtus

permutatus, & aquoſum vinū, & meracū, præter cōſuetudinē D
derepente potatū. Illud enim humiditatē in ſuperno ventre
inducit. & flatū in inferno. Hoc verò venarū palpitationem,
& capitis grauitatē ac litim. Quin & album vinū, & nigrum
ſiquis præter cōſuetudinem permutet, etiā ſi ambo vinofa
+ fuerint, tamē multa in corpore alterarint, vt minus mirū ef-
ſe quis dixerit, dulce & vinoſum vinum nō idem poſſe, ſi de-
repēte permutata fuerint. Porro huiuſmodi aliquā partem
ſermoni contrario patrocinari oportet: quòd mutatio viſtus
his facta eſt, corpore non mutato, neq; ad robur, vt cibos ap-
ponere opus ſit, neq; ad debilitatē, vt detrahere oporteat. In-
ſuper autē & robur coniectandum eſt, & morbi vniuſcuiuſq;
modus, & hominis natura, & cōſuetudo viſtus agri, non ci- E
borum ſolū, ſed etiā potuū. Multo autē minus ad additio-
nem procedendū eſt. Nam detractiōem omnino tollere ſe-
pe conducit: vbi ſuffecturus eſt ager, donec morbi vigor ma-
tureſcat. In quibus autem hoc faciendum ſit, ſcribetur. Mul-
ta verò etiā alia relatis cognata ſcribere quis poſſit. Hoc ta-
men melius teſtimonium eſt. Non enim cognatū eſt rei illi
de qua plurimus à me ſermo habitus eſt, ſed ipſa res oppor-
tuniſſimū eſt documentū. Nam ab acutorū morborū initio,
aliqui quādoq; eadem die qua morbus inceperat, cibos come-
derunt: aliqui poſtridie: quidā etiā ſorbuerunt quicquid obla-
tum eſſet, quidā etiā cyceonem. Omnia autē hæc deteriora
quidē ſunt, quā ſi quis alio modo viſtū inſtituiſſet. multo ta-
men minus detrimentū afferūt in hoc tēpore peccata, quā ſi F
quis primis duobus aut tribus diebus, penitus vaſa vacua fe-
ciſſet, & quarta aut quinta die, tali viſtu vſus eſſet. Deterius
tamen eſt, ſi omnibus his diebus vaſis euacuatis, in poſterio-
ribus diebus hoc modo viſtū inſtituat, prius quā cōcoctus
ac maturus ſit morbus. Etenim hoc modo mortē plurimis
manifeſtē affert, ſi nō omnino facilis fuerit morbus. Quæ ve-
rò ab initio cōmittuntur peccata, nō ſimiliter, vt illa medelā
omnem reſpuunt, ſed multo facilius correctionē admittunt.
Hoc igitur maximum documentum eſſe arbitror, quod pri-
mi dies ſorbitiōe tali vel tali, nō ſint priuadi, in his qui pau-
lo poſtea talibus, aut talibus ſorbitiōibus vſuri ſunt. Fundi-
tus igitur ignorāt, tum hi qui granofa ptifana vtuntur, quòd
ab ipſa lēdūtur; quū ſorbere inceperint, ſi duobus, aut tribus,

aut

Errores ab
initio com-
miſi facili-
ter corrigū-
tur.

Aut pluribus diebus antea vasa euacuauerint: tum hi qui succo vtuntur, quod sorbentes læduntur, vbi non rectè sorbitionem inceperint. Tunc tamē cauent, & magnā noxam afferre cognoscunt, si priusquam maturus factus fuerit morbus granosam pitisanā sorbuerit ager, succo vti aduersus. Omnia igitur hæc magna testimonia sunt, quod medici ægros non rectè ad victū perducunt. Sed in quibus morbis vasa vacua facere non oportet, his qui sorbitionibus vti debent, vasa vacua faciunt. In quibus verò ex vasorum vacuatione, ad sorbitiones mutationē facere non oportet, in his mutationē faciunt, & hoc plerunq; absolutē. Aliquādo verò in his temporibus mutationē ad sorbitiones faciunt ex vasorum vacuatione, in quibus sæpe ex sorbitionibus ad vasorum vacuationem accedere expediebat, si ita morbum exacerbari contingat. Aliquādo autē & cruda attrahuntur de capite, & à thoracis regione, biliosa, & vigiliæ ipsis coincidunt, ob quas non coquitur morbus: & tristes ac amarulēti fiunt, & delirant, & splendores ipsis ob oculos obuersantur, & aures sonitu plenæ sunt, & extremæ partes perfrigeratæ, & vrinæ incoctæ, & sputa tenuia, & falsa, & meraco colore tincta, ac pauca, & sudores circa collum, & anxietudines, & spiritus in latione sursum versus offendens, densus, aut etiā valde magnus, supercilia distēta ac grauata, deliquia animi praua, & stragulorum de pectore reiectiones, & manus tremulæ. Quādoque verò labium infernum cōcutitur. Hæc autē in principiis compar-

Brentia, vehementis delirij significationem præbent, & plerunq; ægri moriuntur. Qui verò effugiunt, aut cū abscessu, aut cū sanguinis è naribus fluxione, aut ex crassi puris sputo effugiunt: aliās verò minimè. Neq; enim talium rerum peritos medicos esse video, quomodo debilitatos in morbis dignoscere oporteat, & quæ ex vasorum vacuatione efficiuntur, & quæ propter aliā aliquam irritationē, & quæ propter dolorem, & præ acumine morbi: itēmq; quot affectiones, & omnigenas species, natura nostra & habitus singulis pariat: & quidem quum talium cognitio, aut ignorantia, salutē aut mortem afferant. Maius enim malū est, si ob dolorē & morbi acumen debilitato, exhibet quis potum, aut sorbitionem copiosiore, aut cibū, ob vasorum vacuationē debilem esse existimans. Indecorum etiā est ob vasorum vacuationē de-

bilitatum nõ cognoscere, & viçtu premere. Affert equidem **D** periculum aliquod & hoc peccatum, verum multo minus quàm alterum. Multo autẽ magis risu dignũ hoc peccatũ est quàm illud alterũ. Si enim alius medicus, aut etiã idiota, ingressus cognouerit ea quæ cõtigerunt, & edenda ac bibenda dederit eã quæ alter prohibuit, palam auxilium tulisse putabitur. Talia verò faciunt, vt artifices maximẽ ab hominibus vituperentur. Videtur enim ipsis ille qui ingressus est medicus aut idiota, velut mortuũ suscitasse. Scribentur autem de his quoq; signa, ex quibus singula dinoscere oportet.

**Corporis
labor.**

Consimilia tamẽ illis quæ cĩcũ ventrẽ contingunt, & hæc sunt. Nã si totũ corpus præter consuetudinẽ multũ quiescat, non statim magis robustum fit. Si verò etiã vbi multo tempore quieuit, derepente ad labores prodierit, vitiosum quiddam palam operabitur. Ad eundẽ modum etiã singulæ corporis partes. Nã & pedes tale quiddã operabuntur, & alij articuli laborare non adfueti, si interposito tempore derepẽte ad laborandũ p̃deant. Eadẽ etiã oculi & dentes perpetientur, & quæcunq; tandẽ pars. Nam & lectus præter morem mollis dolořẽ inducit, itẽq; præter consuetudinẽ durus. Sed & si sub dio lectus præter morem sternatur, corpus indurat. Quin & talium omnium exẽpla scribere satius fuerit. Si quis enim accepto vlcere in tibia, neq; valde periculoso, neq; adeo contemnendo, ita vt nequẽ ipsi ita difficulter, aut adeo faciliẽ vlcera sanescant: statim prima ab initio die decumbens curetur, & nequaquam crũs eleuet, hic sanẽ **E** hoc modo citra inflammationẽ fuerit, & sanus multo citius sic fiet, quàm si obambulans curetur. Attamen si quinta aut sexta die, aut etiã prius surrexerit, & progredi voluerit, magis utiq; affligetur ac dolebit, quàm si statim ab initio obambulans curatus esset. Si verò etiã multum derepente se fatigauerit, multo magis dolebit, quàm si illo modo curatus, in illis diebus ita se fatigasset. Perpetuò igitur hæc omnia inter se testimonium præbent, quòd omnia quæ derepẽte multum supra modum huc & illuc mutantur, lædunt. Multiplex igitur in ventre læsio est, si ex multa vasorum vacuatione, plus moderato derepente ingeratur. Quin & in reliquo corpore, si ex multa quiete, ad ampliorem laborẽ derepente deueniat, multo magis lædetur, quàm si ex multo cibo ad vasorum

- A** forum vacuationem transmutetur, & si ex multo labore de repente ad ocium ac segniciem exciderit. Oportet tamen & his corpus quiescere. Oportet item illis ventrē à ciborum copia quiescere. Sin minus, & dolorem in corpore inducet, & totius corporis grauitatem. Plurimus itaq; sermo de mutatione huc atq; illuc à me habitus est, eo quod hæc nosse ad omnia cōmodum fit, & ad hoc præsertim de quo nobis sermo erat, quod in acutis morbis ad sorbitiones mutationem faciunt ex vasorum vacuatione. Facienda enim est mutatio velut ego iam iubeo. deinde non est vtendum sorbitionibus priusquam morbus maturus factus fuerit, aut aliud quoddā signum apparuerit, vel vacuatorium, vel irritatorium, circa **B** intestinum, aut circa præcordia qualia scribentur signa. *Vigilia immodica.* Vigilia fortis, potus & cibos crudos & inconcoctiores facit. Et *Vinū dulce.* rursus in cōtrariam partem mutatio, dissoluit corpus, & excoctionem ac capitis grauitatem inducit. Vinum porro dulce, & vinosum, & album, ac nigrum, & aquam mulsam, & aquam, & acetum mulsam, his notis distinguere oportet in morbis acutis. Vinum dulce minus caput grauat, quàm vinosum, & minus mentem ferit, & magis quàm alterū per aluum & intestinū subit. Viscera verò magna facit, splenem & hepar. Quare neq; his qui amara bile abundant commodum est. Nam & siticulosum in talibus est, & flatuosum in superno intestino: non tamen inferno intestino inimicū pro flatus ratione, & quidē quum nō valde penetret flatus à vino **C** dulci, sed circa præcordia moretur. Certē per vrinā hoc minus exit omnino quàm vinosum album. Sputū vero magis educit dulce quàm alterum, & quibus quidē siticulosum est dum bibitur, his minus quàm alterū vinum educit. Quibus verò siticulosum non est, his magis quàm alterum educit.
- At verò album vinosum vinum, plurima ac maxima ex parte iam & laudatum & vituperatū est, in dulcis vini enarratione. Ad vesicam autē magis penetrat quàm alterum: & quum vrinā cieat, ac semper perrumpat, multū in his morbis profuerit. Nam & si ad alia incommodius sit altero, attamen quæ in vesica sit ab ipso purgatio, liberat, si quale oportet propellatur. Bonæ verò hæ notæ sunt de vini vtilitate ac detrimento, quas seniores me non nouerunt. Fuluo verò vi- *Fuluum vinum.* no, & nigro austero, in his morbis ad hæc vti poteris, si capi-

Hippocratis Liber De Viçtus

Aqua mul-
sa.

ris grauitas non affuerit, neque mentis percussio, neque spu- D
rum ab ascensu prohibeatur, neque vrina suppressa sit: alui
autem egestionis humectiores ac ramentosiores fuerint. In
talibus sanè, vel maximè conuenienter ex albo transmutatio-
nem facere, & si qua his similia existunt. Hoc verò insuper
intelligere oportet, quòd si aquosum fuerit vinum, supernas
partes omnes, & eas quæ circa vesicam sunt, minus lædet.
Verùm partibus circa intestinum magis proderit, si mera-
cius fuerit. Aqua verò mulsa si bibatur per totum morbum
in acutis morbis, in totum quidem his qui amara bile abun-
dant, ac magna viscera habent, minus cōmoda est quàm his
qui tales non sunt. Siticulosa tamen minus est dulci vino. E
Pulmonem enim mollit, & sputum moderatè educit, & tussim
lenit. Habet enim vim quandam extensoriam, quæ magis
moderatò sputum viscosum facit. Vrinæ etiā sufficien-
ter ciet aqua mulsa, si nō aliqua ex visceribus affectio prohi-
beat. Sed & biliosa per aluum magis egerit, quandoq; bona,
quandoque magis quàm cōuenit colore saturata, ac spumo-
siora: atque hoc biliosis & magna viscera habentibus magis
contingit. Sputi igitur eductionem, & pulmonis mollitiōē,
aquosior aqua mulsa magis facit. At spumosas alui egestio-
nes, & biliosa magis quàm conuenit colorata, ac magis cali-
da, meraca aqua mulsa magis ducit quàm aquosa. Talis au-
tem egestio habet quidem & alia magna nocumenta: Neq;
enim ex præcordiis ardorē extinguit, sed concitat, & anxiam
molestiam, ac membrorum iactationem facit: Verùm & in- F
testina & sedem exulcerat. Horum autem auxilia scribentur.
Qui igitur aqua mulsa utitur, absque sorbitionibus, pro alio
potu, in his morbis, hic multū successum percipiet, & non in
multis successu destituetur. Quibus autem danda sit, & qui-
bus non, & ob quas causas non danda, maxima ex parte di-
ctum est. Damnata verò est aqua mulsa ab hominibus, velu-
ti quæ bibentes ipsam extremè debilitet: & propterea mor-
tem accelerare putata est. Verùm hoc propter eos qui se-
ipsos fame conficere constituerunt, dictum est. Aliqui enim
aqua mulsa sola in potu utuntur: nimirū velut talis existat.
At hoc non omnino hoc modo se habet. Sed si sola bibatur,
multò quidem fortior est, quàm aqua, si nō aluum exturbet:
Sed & vino albo ac tenui, & parum aquæ ferente, & inodoro,
aliqua

- A** aliquatenus fortior est, aliquatenus debilior, Multum tamen differt & vini & mellis meracitas, ad vtriusque vires. Nam etiam si duplam mensuram vini meraci quis bibat, respectu mellis quod delingat, multo tamen fortior fuerit ex melle solo, si alium non turbarit. Nam & multo plus stercoris ipsi prodibit. Si tamen p[er]isanæ sorbitione utatur, insuper autem aquam multam bibat, valde ipsum replebit, ac flatu excitabit, & visceribus circa præcordia incommoda erit. At si ante sorbitionem aqua mulsa bibatur, non ita lædit velut si insuperbibatur, sed etiam aliquo modo proderit. Cæterum cocta aqua mulsa, aspectu quidem multo melior est quam cruda. Splendida enim & tenuis, albâque ac pellucida fit: Sed
- B** quam ipsi virtutem attribuam, qua crudâ præcellat, non habeo. Neque enim iucundior est quam cruda, si mel bonum esse contigerit, debilior tamen, & minus stercoris ducēs, quorum neutro ut castigetur aqua mulsa opus habet. Proximè verò utendum tali cocta, si mel prauum fuerit, & impurum, & nigrum, & non boni odoris. Coctura enim maiorem partem turpitudinis prauitatis ipsius detrahare poterit. At verò acetum mulsum appellatum si bibatur, sæpe quidem commodum esse in his morbis comperies. Nam & sputum educit, & facilem spirationem facit. Tempora verò huiusmodi habet. Etenim quod valde acre est, nihil moderati fecerit, ad sputa quæ non facile prodeunt. Si enim educeret ea quæ stridulam asperitatem faciunt, & lubricitatem induceret, & guttur velut dilataret, pulmonem utique leniret. Ipsum enim molli- & si quidem hæc contingerent, magnam sanè utilitatem afferret. Aliquando verò id quod valde acre est, educationem sputi non obtinet, sed insuper viscosum id facit, & lædit. Maxime autem hoc perpetiuntur hi qui etiam alias perniciosè habent, & qui neque tussire, neque exscreare in hæretia possunt. Ad hoc igitur vires agroti insuper coniectare oportet, & si spem de ipso habeas, exhibere. Exhibere autem oportet si dederis, summè tepidum: atque tale paulatim, & non largè. Quod verò parum acre est, humectat quidem os & fauces, sputum item educit, & sitim sedat, & præcordio & visceribus quæ sunt hac parte lene est, & detrimenta ex melle hac parte prohibet. Quod enim biliosum est in melle castigat. Flatus etiam erumpere facit, & ad mictionem proritat. Intestini
- tamen

Aqua mulsa
sa quando
oblit & cō-
tra.

Oxymel.

Hippocratis Liber De Vi&ctus

tamen infernā partem humectiorem facit, & ramenta inducit. Quādoq; verò etiā malum hoc fit in acutis morbis, maxime quidem, quòd flatum penetrare, imò recurrere facit. Insuper autem & aliàs debilitat, & extremas partes frigefacit. Atque hanc solam læsionem ex aceto mulso cōringere noui, quæ sanè digna sit vt scribatur. Parum autem de huiusmodi potu, nocte & ieiuno ante sorbitionem præbibendum dare commodum est. Sed & vbi multum temporis post sorbitionē intercessit, bibere nihil prohibet. His verò qui solo potu degunt absq; sorbitionibus, propterea non est cōmodum semper & perpetuò hoc vti, maximè propter rasurā aut exasperationem intestini. Quum enim stercore vacuum sit, magis utique hæc induxerit: & quum vasorum vacuatio adsit, postea etiā aqua multa vires detraxerit. Si tamen opitulari apparuerit ad totum morbum multus huius potus vsus, parum acetæ affundere oportet, vt saltem cognosci possit. Ita enim & ea quæ lædere solet, minimè læserit: & his quæ auxilio opus habent, opem tulerit. Cæterum vt in summa dicatur, acedines siue aciditates ex aceto, amara bile abundantibus magis conferunt, quàm atrabiliariis. Amara enim dissoluuntur, & in pituitam transeunt, dum ab ipso attolluntur. Nigra verò fermentantur, & attolluntur ac multiplicātur. Acetum enim nigra sursum ducit. Mulieribus autem omnino magis aduersatur acetum, quàm viris. Dolores enim vteri inducit. Aquæ porrò potui in acutis morbis, nullum aliud opus habeo quod attribuā. Neque enim lenit tussim in peripneumonicis, neq; sputum educit, sed minus quàm alia, si quis semper aquæ potu vtatur. Si tamen inter acetum mulsum & aquam mulsam parum aquæ absorbeatur, sputum educit, propter qualitatis potuum transmutationem. Inundationem enim quandā inducit, aliàs autem neque sitim sedat, sed exacerbat. Est enim naturæ biliosæ biliosa, & præcordio mala, imò pessima fit ac biliosissima, & vires maximè prosternit, vbi in vacuitatē ingressa fuerit. Sed & splenem auget & hepar, vbi inflammatū fuerit, & fluctuat ac superinnatat. Nam & tardi transitus est, eo quòd frigida est & cruda ac incoctilis, & neque per aluum secedit, neque per vrinas transit. Insuper autem & propterea læsionem inducit, quòd à natura sterco non subducit. Si verò etiam dum adhuc frigidi sunt pedes aliquando bibita fuerit

Acetum.

Aqua.

A fuerit, hæc omnia multò plus lædit, ad quodcunque tandem ipforũ peruenierit. Vbi tamẽ in his morbis suspicatus fueris, aut capitis grauitatem vehementẽ, aut mētis percussionem, penitus à vino abstinendum est, & aqua in tali vtendum: aut vinum aquosum & albũ penitus dandum, & penitus in odorũ, & post ipsius potum aqua modica insuper bibenda. Ita enim robur vini caput & mētem minus perceller. In quibus autem potu ipsius maximè vtendum sit, & quādo valde multa, & quādo moderata, & quādo frigida, & quādo calida, partim prius dictũ est, partim pro temporis occasione dicitur. Cæterũ de reliquis potibus, qualis est ordeaceus, & qui ex herbis fiunt, & qui ex vua passa, & vuarum expressarũ retrimētis, & ex tritico: & cnico, & myrti baccis, & malo punico, & de aliis, vbi alicuius ipforũ vsus cōtigerit, scribetur circa ipsum morbum: quemadmodum etiā de aliis compositis medicamētis. Balneũ verò in multis morbis opẽ tulerit eo vtentibus, ad aliquos quidem assiduè, ad aliquos nō item. Quandoq; verò minus eo vtendum est, propterea quòd homines ad hoc sũt imparati. In paucis enim domibus præparata sunt necessaria instrumenta, & nec ministri velut opus est parati habētur. Si verò nō omnino bene quis lauetur, non modicam læsionẽ incurret. Nam & tugurio fumum non habente opus est, & aqua larga, & balneo multo, & nō valde largè affuso, si sanè non ita opus fuerit. Et defricatione quidem potius vtendum non est. Si verò defricetur, calido vtendum est ipso defricatorio medicamento, eoque multiplici magis quàm aliàs receptũ est, & insuper nō pauca aqua perfundendum, & citò perfundendũ. Breui quoq; via ad soliũ opus est, & vt facilis sit inscensus, & facilis item exitus, oportet autem eum qui lauatur esse moderatũ ac taciturnũ, & nihil ipsum operari, sed alios & perfundere, & defricare. Debet etiam postea multa aquæ mixtura parata esse, & celeres perfusiones fieri, & spongiis vtendum est pro strigili, & nō valde siccum inungendum est corpus. Caput tamen resiccatum esse oportet, quātum eius fieri potest maximè, ita vt spongia extergatur, & neque perfrigerari caput oportet, neq; extremas partes, neque reliquum corpus, & neq; eum qui recens sorbitionem accepit, neque eum qui recens potum sumpsit, lauare oportet, & neque sorbere, neq; bibere cito post balneũ. Ma-

Balneum.

gnam

D
 gnam tamen partem ægro tribuere conuenit, si sanus balnei
 valde amans fuit, & lauari adfuetus. Tales enim magis appe-
 runt, & loti vtilitatem sentiunt, & nō loti læduntur. Conue-
 nit autem in totum magis peripneumoniis, quàm febribus
 ardentibus. Nam dolorem lateris & pectoris ac dorsi balneū
 lenit, & sputum maturum facit ac educit: & facilē spiratio-
 nem reddit, & lassitudinē eximit, articulos enim & cutis su-
 perficiem mollit. Sed & vrinam ciet, & capitis grauitatē sol-
 uit, & nares humectat, tot igitur bona balneo adsunt, quibus
 omnibus opus est. Si verò apparatus penuria aliqua fuerit, in
 vna re vel pluribus, periculum est ne magis lædat balneum
 quàm profit. Singula enim ex ipsis magnū detrimentū affe-
 runt, si non à ministris velut cōuenit præparata fuerint. Mi-
 nimè verò tempestiuum est eos lauare, quibus alius in mor-
 bis liquidior iusto est, itémque eos, quibus plus iusto adstri-
 cta est, & non prius subiit. Sed neq; debilitatos lauare oporteret,
 neq; ex ciborum fastidio nauseantes, aut vomentes, neq;
 eos qui biliosum eructant, neq; eos quibus sanguis ex nari-
 bus erūpit, nisi minus quàm pro occasione cōuenit fluat. Oc-
 casiones autē nosti. Si verò minus quàm pro occasione fluat,
 lauare expedit, siue totum corpus ad reliqua inde opem sen-
 riat, siue caput solum. Si igitur præparationes cōmodæ fue-
 rint, & æger bene suscepturus est balneum, quotidie lauare
 conuenit. Eos verò qui balneo delectantur, etiam si bis in die
 laueris, nihil peccaueris. Cæterum balneis vti, multo magis
 licet his qui tota ptisana vtuntur, quàm his qui solo vtuntur
 succo. Licet autem & his aliquādo. Minimè verò his qui po-
 tu solo vtuntur. Sunt tamen ex his quoq; quibus licet. Con-
 iectare verò ex præscriptis oportet, & quibus balneum in sin-
 gulis victus modis profuturum est, & quibus non. Quibus
 enim aliquid horum deest cōmodorum, quæ balneum facit,
 & quæ balneo commodant, lauare non oportet. Quibus verò
 nihil horum deest, & adsunt ipsis signa in quibus lauari con-
 ducit, lauare oportet. Febris autem ardens fit quum resic-
 cata venulæ, hora æstiuā acres ac biliosos serosos humores,
 in seipsas attraxerint: & febris multa detinet, & corpus velut
 ex ossium lassitudine detentū, delassatur ac dolet. Fit autem
 plerunque & ex longo itinere, & longa siti, quum resiccata
 venulæ acres ac calidas fluxiones in seipsas attraxerint. Fit
 autem

Febris ar-
 dens qui
 fiat.

A autem lingua aspera ac sicca, & valde nigra, & dum circa vē-
 trem mordetur, dolet, & alui egestiones valde liquidæ ac pal-
 lidæ fiunt: & sitis vehemens inest, itémq; vigiliæ. Aliquando
 etiam mentis emotiones. Huic & aqua, & aquam mulsam a-
 quosam coctam, quantū voluerit, bibendam dato: & si amarū
 fuerit os, vomere conducit, & ventrem per clysterem sublu-
 re. Si verò ad hæc non solvatur, lacte alinipo cocto purgato.
 Salsum autem nihil, neq; acre exhibeto. Non enim iusteret.
 Sorbitionem verò donec extra iudicationes fuerit, ne dato.
 Et si sanguis ex narib; fluxerit, soluitur affectio, itémq; si su-
 dores accedat iudicatorij, genuini cū vrinis albis & crassis,
 ac subsidetiis leuibus: & si abscessus aliquis fiat. Si verò absq;

B his soluta fuerit, recidiua rursus ægritudinis contingit. **Aut** **Causas**
 coxæ, aut crurum dolor emerget: & crassa expuet, si sanus fu- **alius.**
 turus est. Febris ardentis genus aliud. Alius subit, siti

plena est, lingua aspera, sicca, salsuginosa. Vrinæ interceptio,
 vigilia, extremitates frigefactæ. Tali si non sanguis ex na-
 ribus fluxerit, aut abscessus circa collum fiat, aut crurum do-
 lor, & sputa crassa spuerit (hæc autē suppressa alio fiunt) aut
 coxæ dolor, aut pudendi liuor, non iudicatur: & testis inten-
 sus iudicatorium signum est. Sorbitiones attractorias dato.

Verum in acutis morbis venam secabis, si vehemens appa-
 reat morbus, & qui ipsum habeant in vigoris ætate fuerint,
 & robur ipsis affuerit. Siquidē igitur angina fuerit, siue ali-
 quis alius ex pleuriticis morbus, eclegmatis delinctu repur-

C gato. Si verò debiliores appareant, si plus de sanguine detra-
 xeris, infuso alui per clysterem tertio quoq; die vtere, donec
 in tuto fuerit æger, aut etiam fame opus habeat. Præcordia **Præcordio**
 inflāmata non ex flatuum interceptione: septi transuersi in- **rū inflam-**
 tiones, aut spirituum protensiones: in rectæ ceruicis spira **mationes**
 tione sicca, quibus pus non subest. Verum ex flatuum interce- **vnde.**
 ptione, affectiones hæc accedunt. Maximè autem & hepatis
 dolores, & splenis grauitates, & aliæ inflāmationes, & supra
 septum transuersum dolores ac morborum collectiones, sol-
 ui non possunt, si quis prius medicamētis purgare aggredia-
 tur. Nam venæ sectio in talibus principalis est. Deinde infu-
 sa per clysteres, si non magnus & vehemens fuerit morbus.
 Sin minus, etiam postea medicamēto purgante opus est. Sed
 & post venę sectionem, purgans medicamētum securitate ac
 mode

Vocis inter-
ceptio.

Comitia-
les morbi
vnde.

Angina
quādo fit.

moderatione opus habet. Quicunq; verò ea quæ inflamma-
ta sunt, statim in principio morborum medicamēto soluere
aggrediuntur, hi de intento quidem ac inflammato nihil au-
ferunt: non enim remittit affectio quæ adhuc cruda est: quæ
verò morbo resistunt ac sana sunt. colliquefaciunt. Debili ve-
rò fiēte corpore, morbus inualefcit. Quum autem morbus
corpori præualuerit, tale iam incurabiliter affectum est. Ut
aliquis derepente voce priuatus fiat, venarum interceptiones
faciunt, si sano hoc contingat absque manifesta, aut alia forti
caussa. Venam igitur secare oportet, in brachio dextro in-
ternam & sanguinem detrahēre, iuxta habitum ac ætatem
rationem ineundo, an plus aut minus oporteat. Coincidunt
autem plurimis ipsorum hæc: rubores faciei, oculorum sta-
bilitates, digitorum in manibus distentiones, dentium stri-
dores, pulsationes, maxillarum contractiones, extremitatum
perfrigeratio, spirituum per venas interceptiones. Quum
dolores accesserint, atræ bilis & atrium fluxionum affluxus
fiunt. Dolent autem partes internæ dum mordentur. Cōuer-
sæ verò, & valde siccæ fiētes venæ intenduntur, & inflama-
tæ affluētia attrahunt. Vnde corrupto sanguine, & spiritibus
non potentibus naturales in ipso vias permeare, perfrigera-
tiones fiunt ex statione, & vertigines, & vocis interceptio, &
capitis grauitas, & conuulsiones, si iam ad cor, aut hepar, aut
ad venam deuenerint. Hinc morbi comitiales fiunt, aut semi-
syderati, si in ambientes locos fluxiones inciderint, & à spi-
ritibus pertransire non potentibus resiccata fuerint. Quare
talibus, fomentis prius adhibitis, venam secare oportet sta-
tim ab initio, dum adhuc eleuati sunt omnes affligentes spi-
ritus, ac fluxiones. Facilius enim auxilium admittunt; & refe-
ctis viribus, & consideratis iudicationibus, medicamentum
exhibere sursum purgans, si non alleuetur; ad infernam verò
aliud, si nō subeat, infusum per clysterem adhibere. Postea
verò lac asininum coctum dato, & non minus quàm duode-
cim heminas bibat. Si verò virium robur adsit, plures quàm
sedecim. Angina fit quum fluxio ex capite multa ac gluti-
nosa, tempore hyberno aut verno, ad venas iugulares influ-
xerit, & hæ fluxionem ampliorem, propter amplitudinem,
attraxerint. Cū autē frigida & glutinosa sit, spiritus transi-
tus obturabit, & sanguinis transitus obturans, propinquas
sang

A sanguinis partes congelat, ipsumque immobilē ac stabilem facit: quū natura frigida sit, & obturandi vim habeat, & propterea suffocantur, lingua liuescente, & rotūda fiēte ac reflexa, propter venas quæ sunt sub lingua. Præcisa enim vna, quam aliqui columellam vocant, vena crassa ab utraq; parte est. Cū igitur hæ plenæ sint, & in linguam intantur, quæ rara est ac spōgiosa, propter siccitatem: cōtingit ut ipsa præ violentia humorem ex venis suscipiens, ex lata fiat rotunda: ex bene colorata, liuida: ex molli, dura: ex facile flexibili, inflexibilis: adeo ut æger citò suffocetur, si non quis citò auxilium ferat, venæ sectionem à brachiis faciens, & venas sub lingua secans, & eclegmatum delinctu curans, & calidos gargarismos exhibēs, & caput radens. Debet autem & ceratum collo ac capiti circumponere, & lanas obuoluere, & spongiis mollibus ex aqua calida expressis fouere. Bibat autem æger aquam, & aquam mulsam, nō frigidā. Succum verò ptisanæ tunc sumet, quum iam ex iudicatione in tuto fuerit. Quum verò æstiuo vel autumnali tempore, fluxio calida ac nitrosa, de capite defluerit, utpote ex tempore acris ac calida facta: talis ubi est, mordet, & vlcera, & spiritu implet, & ceruicis spiratio accedit, & siccitas multa, & quæ videntur gracilia apparēt: & tendines posteriores in collo distenduntur, & velut in tetano distenti esse videntur: & vox abrupta est, & spiritus parvus est, & retractio spiritus densa ac violenta accedit. Talibus arteria vlcera, & pulmo ardet, quum nō possint extrinsecum spiritum inducere. Et si his affectio non vltionea ad externas colli partes deferatur, grauior ac ineuitabilior est, & propter tēpus, & quod à calidis & acris sit humoribus. Si febris corripiat, veteri stercore non subeunte, aut à cibo recens accepto, siue cum dolore lateris, siue absque eo, quietem agere oportet, donec cibi descenderint prius ad infernam aluum: potu verò uti aceto mulso. Quum autē ad lumbos grauitas deuenerit, infuso per clysterem eluere, aut medicamento purgare oportet. Vbi verò purgatus fuerit, vitum præscribere ex sorbitione primū, & aquæ mulsæ potu, Deinde ex cibis ac piscibus coctis, & vino aquoso, modico, ad noctem. Interdiu autē, ex aqua mulsā aquosa. Quum verò flatus graueolentes prodierint, glandula subdititia, aut infuso per clysterem utendum erit. Sin minus, in aceti mulsi

D d

potu

quum
fiat Rin lingu
lang.
velinAliud ang
ne genus.uic
Angin

Hippocratis Liber De Victus

potu cohibere oportet, donec ad infernam aluum descende-
 rint cibi, deinde sic per infusum clysteris subducere. At si
 mollem ac vacuum ventrem habenti febris ardens accedat,
 si tibi commodum esse visum fuerit medicamentis purga-
 re, intra tres dies id ne feceris, sed quarto. Postquam verò
 medicamentum exhibueris, sorbitionibus vttere, obseruans
februm exacerbationes, vt nunquam exhibeas quum sunt,
 aut futuræ expectantur, sed vbi desinunt, aut quieuerunt, &
 quàm lōgissimè à principio. Quum verò frigidi sunt pedes
 neque potum, neque sorbitionem, neque aliud quicquā eius-
 modi dato, verum maximum hoc esse ducito, vt expectes do-
 nec valde fuerint calfacti. Deinde sic id quod conducit exhi-
 be. Plerunque enim futuræ exacerbationis febris signum est
 pedum frigiditas. Si verò in tali tempore exhibueris, maxi-
 mè per omnia peccaueris. Morbum enim non parum auge-
bis. Quum autem febris desinit, vice versa pedes reliquo
 corpore calidiores fiunt. Augetur enim frigefaciens pedes,
 accensa ex thorace, ad caput flammam remittens. Vniuerso
 autem calore acervatim sursum concurrente, & ad caput ex-
 halante, meritò pedes frigidi fiunt, vt qui excarnes & ner-
 uosi natura existant. Insuper autem etiam quum longè
 à calidissimis locis absint, perfrigerantur, calore ad tho-
 racem coacervato. Et rursus iuxta proportionem, quum
 febris soluitur, & in tenues partes dirimitur, ad pedes ca-
 lor descendit. Hoc igitur tempore & caput, & thorax ipso-
 rum perfrigeratur, qua de causa sorbitio exhibenda est. Nam
 vbi pedes frigidi fuerint, necesse est ventriculum calidum
 esse, & multo fastidio plenum, & præcordium intentum, &
 corporis iactationem, propter internam turbationem: &
 mentis abalienationem, & dolores, & æger distrahitur,
 ac vomere cupit, & si praua vomuerit, dolet. Postquam
 verò calor ad pedes descendit, & vrina progressa est, etiam
 si non sudarit, omnia desinunt. Hoc igitur tempore sor-
 bitionem dare oportet: alioqui perniciosa est. Quibus
 verò perpetuò alius in febribus liquida est, his præcipuè
 pedes calefaciens, & ceratis integens, & fasciis obuoluens,
 animum aduerte, vt ne sint reliquo corpore frigidiores. Si
 verò calidi sunt, calefactorium nullum adhibe, sed con-
 serua vt ne perfrigerentur: potu autem vtendum est quàm
 paucissi-

Pedum fri-
 gus febrim
 accessum
 denotat.

Pedum ca-
 lor.

Alui solu-
 tio curatio.

A paucissimo, aqua frigida, aut aqua mulsa. Quibus autem in febribus aluus liquida est, & mens perturbata, & multi ex talibus floccos auferunt, & nares scalpunt, & paulatim quidem respondent si interrogentur, ipsi verò a seipsis nihil aptum dicunt: talia atrabiliaria esse mihi videntur. Talibus igitur ita se habentibus, si aluus liquida fuerit, ac colliquerit, videtur mihi sorbitiones frigidiores ac crassiores exhibere oportere, & potiones aluum listentes, & vinosiores magis quàm adstringentes. At quibus in febribus vertigines ab initio, & capitis pulsus fiunt, & vrinæ tenues, in his expectare oportet, vt ad iudicationes febris exacerbetur. Nec verò admirarer, si delirarent. Quibus in principio vrinæ nebu-

Blosæ, aut etiam crassæ sunt, tales depurgare oportet, si etiam alia contulerint. Quibus verò in principio vrinæ tenues, tales ne purgato, sed si visum fuerit, infusum per clysterem adhibeto. Hos sic curare conducit. Aeger corpore quietem agat, vngaturque ac æqualiter contegatur. Potu vtatur aqua mulsa aquosa: & sorbitione succi ptisanæ ad vesperam. Aluum verò ab initio per clysteris infusum subducito. Medicamenta autem his ne exhibeto. Si enim quid circa ventrem commoueris, vrina non cōcoquitur, sed absque sudore ac iudicatione, febris ad multum tempus durabit. Sorbitiones autem vbi propè iudicationem fuerit, ne dato, si turbetur: verum quum remiserit turbatio, & ad melius procedet. Obseruare verò etiam omnium febrium iudicationes oportet, & in hoc tempore sorbitiones detrahare. Solent autem **C**longæ fieri hæ febres, & impetuosos humorū de loco ad locum illapsus habere, si quidem infernæ partes frigidæ fuerint, circa aures & collum. Si verò non fuerint frigidæ, alias mutationes habent. Fluit autem sanguis ex naribus, & alui his exturbantur. Quibuscunque verò febres anxiosæ sunt, & quæ præcordia intendunt: & decumbētes in eodem loco decubitus non sustinent, & extremæ partes perfrigerantur, hi plurima omnino diligentia ac custodia opus habēt. Degant autem hi vt nihil ipsis exhibeas aliud, quàm acetū mulsum aquosum. Sorbitionem verò ne exhibe, donec febris desierit, & vrina concocta fuerit. Decumbere autem debet æger in domo obscura, & in stratis quàm mollissimis reclinatus esse, ita vt multo tempore decubitus in eodem loco toleret,

D d 2

& quàm

Hippocratis Liber De Victus

*Vrinarum
cognitio.*

*Primus dies
in agro ob-
seruandus.*

*Signa vale-
tudinis.*

& quàm minimum se iactet. Hoc enim talibus maximè prodest. Super præcordium verò, lini semen linteum illitum imposito, obseruando ut ne horrescat æger dum apponitur. Sit autem summè tepidum, aqua & oleo coctum. Coniectare verò ex vrinis oportet id quod futurum est. Si enim crassiores ac pallidiores fuerint, meliores sunt. Si verò tenuiores ac nigriores, deteriores. Si autem mutationes habent, temporis diuturnitatem significant: & necesse est ut morbus & ad deterius, & ad melius, inæqualitatem permutet. Caterum inconstantes febres finire oportet, donec constiterint. Quum verò constiterint, & victu, & curatione conuenienti occurrere, speculatione secundum naturam facta. Sunt autem aspectus ægrotorum multi. Quare animaduertendum est medico, ut ne aliqua manifesta causa ipsum lateat, neque ex his que ratiocinatione cognoscuntur, neque ex his quæ ad numerum parem aut imparè apparere oportet. Maximè igitur numerum imparè vereri oportet. Nam hi dies in alterutrâ partem ægrotos inclinare faciunt. Primum itaque diem obseruare oportet, quo æger debilis esse cœpit, cognito principio ex quo, & quâdo. Præcipuum enim hoc est ut sciatur. Quum verò ægrum interrogaueris, etiam hæc omnia considerabis. Primum quidem quomodo caput habet, an doloris exors sit, nec grauitatem in seipso habeat. Deinde præcordia & latera an doloris exortia sint. Si enim præcordiū dolorosum fuerit aut eleuatum, aut obliquitatē aliquā habuerit, aut satietatem: aut lateris dolor affuerit, & vnâ cum dolore, tussicula, aut tormē, aut ventris dolor. Quum horum quid affuerit in præcordio, alium maximè infusis per clysterē soluere oportet. Bibet autem aquā mulsam calidam coctam. Considerandum verò est an dum exurgit, animi deliquium incidat, an bona spiritus tolerantia ipsum habeat: & inspicienda alui egestio, num vehementer nigro colore prodierit, aut pura, quales sani hominis sunt ægestiones: & an febris ad tertium diem exacerbetur. Vbi verò valde probè tales consideraue-
ris in his morbis tertia die, ad hæc iam etiam alia contemplare, & si quarta simile quid tertiæ habuerit ex iisdem illis, æger in periculo versatur. Et signis autem, nigra alui egestio, mortem significat. Quæ verò sani hominis egestioni similis est, si per omnes dies apparuerit, salutare signum est. At si glan

A si glande subdita non obedierit, & spiritus bona tolerantia affuerit, si ubi ad sedem exurrexit, aut isthic in lecto, animi deliquium inciderit: Hæc ubi ægroto, aut ægrota, ab initio affuerint, delyrium futurum expecta. Intentus autē sis quoq; ad manus. Si enim tremulæ fuerint, tali sanguinis de naribus destillationem futuram expecta. Inspicere verò ipsas nares oportet, an spiritus æqualiter per vtrasque feratur, & si multus feratur è naribus, conuulsio fieri solet. Si verò conuulsio fiat, tali mors expectanda est: & bene habet si quis hoc prædicat. Si verò in febre hyberna, lingua aspera fiat, & animi deliquia adsint, tali remissio febris contingere solet: at tamen fame talem macerare oportet, & aquæ mulsæ potu, ac ptisanæ succo conseruare, ita ut fidem ne habeas febrium remissioni. Nam qui talia signa habent, de vita periclitantur. Vbi verò hæc cognoueris, ac probè contemplatus fueris, ita fore prædicere potes, si placuerit. Quum verò in febribus horrendum quid acciderit quinta die, aut alius de repente liquida deiecerit, & animi deliquium incidat: aut vocis priuatio contingat, aut conuulsio, aut singultus fiat: ex his anxiosus fieri æger solet, & sudores sub naso, & circa frōtem ac ceruicem à posteriore capitis parte oboriri. Qui verò hæc patiuntur, spirituosif facti non longè postea moriuntur. Quibus autem in febribus crura fiunt tuberculola, atque hæc tubercula moram trahentia non maturantur, febribus perseverantibus, & strangulatio acciderit in faucibus, ita ut partes circa fauces graciles existant, & tubercula non matura facta, sed extincta fuerint: talibus sanguis è naribus fluere solet. Et si quidem multus fluxerit, solutionem morbi significat. Sin minus, morbum longum. Quanto autem minus fluxerit, tanto deterius est, & lōgitudo maior. Si verò reliqua facilima fiant, tali dolores ad pedes expectare oportet. Si autem contigerint pedem, & dolorosus esse perseveret æger, & calore affligatur, ac non solvatur, paulatim & ad ceruicem dolores perueniēt, & ad clauiculam, & humerum, & pectus, & articulum. Nam & hunc tuberculorum fieri oportebit. His autem extinctis, si manus contrahantur, aut tremulæ fiant, conuulsio talem corripit, & delyrium. Sed & pustulæ in supercilio oriuntur, & rubores habet, & palpebra altera ad alteram progerminat, & inflāmatio dura detinet, &

In ægro
quæ consi-
deranda.

Hippocratis Liber De Victus.

**Delirij si-
gna.**

oculus vehementer intumescit, & delyrium valde augefcit. **D**
Noctes autem plus quàm dies delyrij significationē prēbent.
Multa verò signa ad imparē numerū magis fiunt, quàm ad
parem. Vtro autē horum numerorū fiant, lethalia existunt.
Tales verò si quidē ab initio medicamentis purgare volue-
ris, ante quintū diem id facito, si venter murmurarit. Sin mi-
nus, impurgatos finito. Si verò murmurarit, & alui egestio-
nes biliofæ fuerint, scammonio dato moderatē purgato. In
reliquo verò victu potus ac sorbitiones parcissimē exhibe-
to, quo melius æger habeat, si nō remissione facta decimum-
quartum diem transgressus fuerit. Quum febricitātī deci-
maquarta die vocis interceptio accesserit, non cita solutio
contingere solet, neque liberatio à morbo fieri, sed temporis **E**
diurnitatem tali significat. Quum itaq; apparuerit in hac
die, longius protrahetur morbus. Quum febrienti quarta
die lingua conturbata loquitur, & aluus biliofa liquida ege-
rit, talis delyrare solet. Sed obseruare ac assequi euētus oportet.
Aestiuo ac autumnali tempore in morbis acutis, san-
guinis destillatio repentina, firmitatē ac multam inflamma-
tionem circa venas significat, & in posterum diem tenuium
vrinarū apparitiones, & si ætate viguerit, & corpus in exer-
cizio, aut bene carnosum habuerit, aut atrabiliarius fuerit,
aut ex potu manus tremulas habuerit, bene habet vt dely-
rium, aut conuulsionē prædicat. Et si quidem in diebus pari-
bus accedat, melius est. In iudicatione verò perniciosum, si
non multus aceruatim cōcitatus sanguis, redundantia exi- **F**
tus faciat per nares aut per sedem: aut abscessus, aut præcor-
diorum dolores, aut ad testes, aut ad crura dolores inducat.
His autem cōcoctis, exitus fiunt sputorum, crassarum vrina-
rum, leuium, albarum. Febri singultuosa silphij succum,
Singultus acetum mulsum, daucum tritum, bibēda dato. & galbanum
medela. in melle. & cuminum in eclegmate delingendum. & ptisanæ
succum post hæc sorbendum. Talis autem effugere nō po-
test, si nō sudores iudicatorij, & somni æquales accesserint: &
vrinæ crassæ & acres decurrerint, aut ad abscessum morbus
decubuerit. Nux pinea, & myrrha, in eclegmate dentur.
Peripneu- Bibendum autem talibus acetum mulsum quàm mini-
monicz af- mum dato. Si verò valde siticulosi fuerint, aquam ordea-
fectiones. ceam. Peripneumonicas ac pleuriticæ affectiones sic consi-
derare

Aderare oportet, an acuta sit febris, & dolores lateris alterius, aut vtriusque: & dum spiritus sursum fertur an doleat: & an tussis adsint, & sputa prodeant fulua, aut liuida, aut etiam tenuia, & spumosa, & florida, & si quid aliud diuersum habeat, ab his quæ illis fieri solent. Hunc sic degere oportet. Si quidem dolor sursum tendat ad clauiculam aut circa mammā, & brachium, venā in brachio secare oportet internam, vtra tandem fuerit parte, in ea ipsa: detrahare verò sanguinem iuxta corporis habitū, & tempus, & ætatem, & colorem, plus & cōfidenter. & si acutus fuerit dolor, ducere vsque ad animi deliquium. Postea verò infusum per clysterē adhibere. Si verò sub thoracē fuerit dolor, & valde distēdat, pleuritico medicamento aluum subpurgato, & interim dum purgatur, nihil dato. Post purgationē verò acetum mulsum. Medicamentum autē purgans exhibeto quarta die. Verum per tres ab initio, infusum per clysterem adhibeto: & si hinc nō alleuetur, sic subpurgato. Custodia autē fiat vsque ad febris quietem ad septimū diem. Deinde si in tuto esse videatur, succum modicum ac tenuem primū melle ammixto exhibeto. Si verò facilē educat sputum, & bene spiret, ac doloris exors sit circa latera, etiā paulo crassiorem ac ampliorē, & bis in die dabis. Si verò non facilē liberetur, potionem pauciorē, & modicam sorbitionem, succum tenuem, eūque semel, & in quo tempore melius degit, exhibeto. Cognosces autē hoc ex vrinis. Sorbitionem enim exhibere in his morbis non prius oportet, quā vrinas concoctas, aut sputa matura facta esse videris. Si verò is qui medicamentum accepit, frequenter & multum purgatus fuerit, necesse est dare, verū pauciorē ac tenuiorē. Nō enim poterit dormire, præ vasorū vacuatione: neque similiter coquere: neque iudicationes sustinere ac expectare. At vbi crudorum colliquationes factæ fuerint & ea quæ renituntur abiecerit, nihil obstat. Matura verò sunt sputa quidē, quum similia fuerint puri. Vrinæ autē subsidentias habētes subrubras, velut est eryum. Nihil autē prohibet & ad alios laterum dolores tepesfactoria apponere & cerata. Inungere autē crura ac lumbos oleo calido, & pinguedinem illinere. præcordia verò ex lini semine integere vsq; ad mamas. At vbi in vigore est peripneumonia, auxiliū nō admittit, si nō expurgetur: & malum est si æger difficulter spirauerit.

Peripnea-
monia me-
dela.

rit:& vrinae tenues & acres,& sudores circa collum ac caput D
fiant. Tales enim sudores prauī sunt,prae suffocatione,& im-
petu ac violentia,superatibus morbis,si non vrinae multae ac
crassae prodierint,& sputa matura exierint. Vtrum autē ho-
rum sua sponte venerit,morbum soluit. Ad peripneumo-
niam medicamentū quod delingitur. Nux pinea & galba-
num.in melle Attico.Abrotonum in aceto mulso.Piper,vera-
trum nigrum feruefacito,& pleuritico in principiis dum do-
lor vexat,bibēda dato. Bonum est & panacem in aceto mul-
so feruefacere,& excolare,ac bibendum dare,tum hepaticis,
tum in doloribus septi transuersi. Et quaecunq; ad ventrem,
aut ad mictionē impellere oportet,hac in vino & melle da-
bis,illa ad ventrē,cum aqua mulsa aquosa copiosiore biben- E
da dato. Dysenteria sedata abscessum,aut tumorē aliquem
faciet,si non ad febres,aut sudores,& vrinas crassas,& albas,
ac valde perspicuas,aut ad tertianas,aut ad varicem, aut ad
testem,aut ad crura,aut ad coxam dolor decubuerit. In fe-
bre biliosa ante septimum diem,cum rigore morbus regius
accedens,soluit febrem. Verū sine rigore si accedat,extra
temporis occasiones,perniciosus est. Tetanus lumborū in
anteriorem ac posteriorem partem distentio:& in atrabilia-
riis,vbi spirituum per venas interceptiones fuerint:venae se-
ctione soluantur. Quum autē a tendinibus vehementer in
anteriorem partē reuelluntur,& circa collum ac faciem su-
dores fiunt,dum prae dolore mordentur ac resiccantur ten-
dines vsque ad sacri ossis finem experrecti,qui crassiores spi- F
nam continent,qua parte maxima ligamēta exorta,deorsum
ad pedes vsque desinunt:Tali si nō febris & somnus accesserit,
& sequentes vrinae concoctionem habentes prodierint,&
sudores iudicatorij,vinum creticum vinosum bibendū da-
to,& farinam costā edendam. Et cerato vngito ac illinito,&
integito crura vsque ad pedes,vbi calida aqua prius in sca-
pha perfudisti: brachia quoque ad digitos vsque integito:&
lumbos ac spinam a collo vsque ad coxas pinguedine ince-
rata molli pelli illita circumdato,ita vt etiā anteriores par-
tes cōplectantur:& interposito tempore,per vtriculos calida
aqua infusa foueto,& circuntento linteo ipsum reclinato.
Aluum verò ne valde soluas,nisi glandula subdititia,si mul-
tum tempus fuerit,quo absque egestionē permāsit.& si qui-
dem

- A**dem in melius res tibi processerit, satis est. Sin minus, Mei radicem in vino odorato tritā, & Daucum bibenda dato, mane vbi ieiunus est ante calidā perfusionem. & post hæc breui farinā coctā, tepidam, plurimā edat. & vinum vbi voluerit: bene temperatum insuper bibat. & si quidē in melius res tibi processerit, satis est. Sin minus, prædicere oportet. Morbi porro omnes soluuntur, aut per os, aut per alium, aut per vesicam, aut alium aliquē eiusmodi articulum. Verum sudoris species omnibus cōmunis est. Veratrum dare his oportet, quibus à capite fluxio fertur. Quicunq; verò ex abscessibus, aut venæ ruptura, aut propter intemperantiam, aut ob aliam quandā fortem causam, suppurati fiunt, talibus veratrum ne dato. Nihil enim profuerit, & si quid perpetietur æger, veratrum in causa esse videbitur. Si verò corpus dissoluatur, aut dolor in capite sit, aut aures obturatæ sint, aut nares, aut sputatio: aut genuum grauitas sit, aut corporis tumida moles præter consuetudinē, dato quicquid tandē horum contigerit, si non ex potibus, neque ex rebus venereis, neque ex tristitia, neque ex curis, neque vigiliis hæc fiant. & si quidem horum quid in causa fuerit, ad hoc ipsum curationē institutio. Dolores ex itinere, laterum, dorsi, lumborum, coxarum, & quicunque respirantes dolent, causam manifestā habentes. Sæpe enim ex crapulis & cibis flatuosis, dolores procedere solent, & ad lumbos, & ad coxam. Quibus verò ipsorum talia fuerint, vrinæ difficultas ipsis accedit. Horū autem causa iter est, & grauedinum ac raucedinū. Quæcunq; ex victus ratione cōtingunt. Pleraque vnusquisque prout præter cōsuetudinem victu vsus fuerit maximè annotat. Nam qui non soliti sunt prandere, si pransi fuerint, multus ventris tumor ipsis accedit, & dormitatio ac repletio. Si verò insuper cœnauerint, aluus exturbatur. His vbi balneo vsi sunt, dormire conducit. Vbi verò dormiuerunt, deambulare lenta ac multa circuitione. & si quidem aluus euacuata fuerit, cœnare, & bibere vinum paucum, meracius. Si verò euacuata non fuerit, corpus oleo calido illinere. & si sitierit, vinum aquosum album aut dulce bibere ac quiescere. Si verò nō ob dormierit, amplius quiescere. Reliquus victus similiter vt his qui crapula grauantur, cōstituatur. Quod verò ad potus attinet, qui quidē aquosi sunt, tardioris trāsitus sunt, & intus

Morborū solutio.

Veratro purgandi sunt quibus à capite destillatio fluit.

Crapula morborum parens.

Medela.

Hippocratis Liber De Victus

obuoluuntur, & circa præcordia redundât, & ad mictionem non decurrunt. Tali verò potu repletus, nullum opus celeriter perficere poterit, ex his quæ intento corpore per violentiam aut celeritatem perfici solent. Quiescat autem quàm maximè, donec vnà cum cibus concoctus fuerit. Quicunq; verò potus meraciores sunt, aut austeriores palpitacionē in corpore, & pulsationē in capite inducunt. His cōmodum est vt insuper dormiât, & calidū quid sorbeant, ad quod maximè iucundè affecti sunt. At verò ieiunium ad capitis dolorem ac crapulam malum est. Cæterum qui semel in die cibum capiunt, hi & impotentes sunt, & calidā vrinam mingunt, præter consuetudinē vasa vacua habentes. sit autem & os salsum ac amarum, & in omni opere tremunt, & tēpora ipsis distenduntur, & cœnā concoquere nō possunt, velut si pransi essent. Hos autē minus bibere oportet quàm soliti fuerunt, & mazam liquidiores pro pane sumere: & ex oleribus, rumicem, aut maluā, aut ptisanā, aut betas. Bibere verò vinū inter cibum, moderatū & aquosius: & à cœna modicè deambulare, donec vrina descenderit, ac minxerint. Vtantur autē & piscibus coctis. Edulia porrò maximè de se significationē præbent. Allium flatum, & dolorē circa thoracem facit, & capitis grauitatem, & anxietatē, & si quis alius dolor ante fieri consuevit, eum exacerbauerit. Vrinā autem ciet, & hoc bonum habet. Optimum verò est vt quis ipsum edat, si aut ebrius est, aut ad potationem ire volet. Caseus flatum, & adstrictionem, & ciborū accensionem facit, quum crudum & incoctile sit edulium, pessimum autē est repletos ipsum inter potum edere. Legumina omnia flatuosa sunt, & cruda, & cocta, & fricta, & macerata, & virida. His autem vtendum non est nisi cū cibus. Vnumquodque verò ex ipsis sua peculiaria vitia habet. Cicer flatum, tum crudum, tum frictum, & dolorem inducit. Lens adstringit, & turbationē inducit, si cum cortice sumatur. Lupinus minimè inter hæc mala habet. Silphij caulis & succus, quibusdam quidē maximè, in expertis autē non transit per ventrem. Verū vocatur hoc malum cholera sicca. Fit autē maximè vbi cum multo caseo mixtus fuerit, aut cum carnis bubulæ esu. Nā & arrabiliaræ affectiones à bubularū carniū esu exacerbantur. Est enim insuperabilis ipsarum natura, & nō cuiusuis ventriculi est

Allij natura.

Casæi operatio.
Legumina.

Cicer.
Lens.
Lupinus.
Silphium.

Ali est ipſas concoquere. Optimè tamen ipſas concoxerint, ac ſummouerint, qui percoctis & quàm vetuſtiſſimis vtantur. At caprinæ carnes quæcunq; in bubulis inſunt mala, omnia habent, itémq; à concoctione alienitatē: & flatuoſiores ſunt ac ructus ampliores faciunt, & cholera generat. Sunt autem odoratiſſimæ, ſolidæ, ac iucundiſſimæ, optimæ, & percoctæ, & frigidæ. Verū iniucundiſſimæ & graueolentes ac duræ, peſſimæ: imò etiam recentes. Optimæ verò ſunt ætatis tēpore: peſſimæ autumno. Porcinæ verò carnes prauæ ſunt, quū fuerint crudiores aut ambuſtæ. Magis autē cholera generant, & turbationē faciunt, Suillæ autem optimæ ſunt omniū car-

Caprinæ
carnes.

Porcinæ
carnes.
Suillæ.

B ſunt, neq; tenues, neq; veteris victimæ ætatē habent. Edere verò ipſas oportet abſq; pelle, & ſubfrigidas. In cholera ſicca venter inflatus eſt, & ſtrepitus inſunt, & dolor laterū ac lumborū. Secedit autē nihil deorſum, ſed aluus adſtriſta eſt. Talem adſeruato vt ne vomat, ſed aluus ſubeat. Infuſum itaque calidum ac pinguiſſimū quā citiſſimè per clyſterē immittito: & oleo illitum in aquam plurimā calidā dimittito, in ſolium reclinās, & calidā paulatim affundēs. Et ſi caleſcētī ipſi aluus ſubierit, morbus ſolutus eſt. Domire quoq; tali conducit, & bibere vinū tenue, & vetus ac meracius, & oleum dato, vt & quieſcat, & aluus ſubeat, & ſoluatur morbus. A cibis verò & aliis abſtineat. Si verò nō remiſerit dolor, aſininū lac bibendū dato, donec purgatus fuerit. At ſi liquida fuerit aluus, & bilis ſubeat, & tormina ſunt & vomitus, ac ſuffocationes: his optimū fuerit quieſcere. Bibere verò aquā muſſam, & nō vomere. Hydropum duæ naturæ ſunt: quorum alter ſub carne ſi fieri aggreditur, ineuitabilis eſt. Qui verò cum inflatio-

Aque inter
cutem duo
genera.

egeſtio

egestiones acres & inæquales ipsis prodeunt præ colliquatio D
ne: his si quidem potentes fuerint, veratro albo reuellere o-
portet. Sin minus, succus tritici horni crassus, frigidus dādus
est, & lenticulæ fresæ decoctum, & panes subcineritij, & pi-
sces febrienti quidem cocti, non verò febrienti, assati: & vi-
num nigrum non febrienti: sin minus, aquam à mespilis, aut
myrti baccis, aut malis, aut sorbis, aut palmulis, aut vitium
cœnanthe. Si verò febris non habeat, & tormina adsint, lac
asininum calidum modicum primū, deinde sensim fiente
progressu amplius, & lini semen, & triticeā polentam, & fa-
bas Aegyptias, exempto eo quod in ipsis amarum est, molita
ac trita hæc inspergens bibat: aut oua semiconcreta assata E
edat, & similaginē & milium, & alicam coctam in lacte: hæc
cocta frigida edat, & quæ his similia existant, tum pocula, tū
edulia in cibo assumat. Maximi momenti circa victus ratio-
nem, est obseruare ac cauere, tū in acutis, tum in longis mor-
bis, & intēssiones febrium, & remissiones, quo temporum oc-
casiones scias, quando cibos exhibere non oportet, & quando
tuto exhiberi possunt. Insupérque quando plurimum ab in-
rentione absunt. Nossē porrò oportet eos quibus caput do-
let ab exercitationibus, aut cursibus, aut profectiōibus, aut
venationibus, aut ex alio quopiam intempestiuo labore, aut
ex re venerea: decolores item, raucos splenicos, exangues,
spirituosos, & siccam tussim habētes, ac siticulosos, & flatuo-
sos, & venarū interceptiones: & eos qui intenta habent præ-
cordia, & latera, & dorsum, & torpefactos, & obscurē viden- F
tes, & quibus aurium sonitus incidunt, & qui vrinariam fistu-
lam vrinam non continentem habent, & morbo regio labo-
rantes, & quorum alui cruda eiiciunt, & quibus ex naribus,
aut per sedem sanguis vehementer erumpit, & qui tubercula
habent, & quibus vehemens dolor incurrit, & non superaue-
rint: ex talibus nullum medicamento purgandum esse. Peri-
culum enim habebis, & nihil opis afferes, & spontaneas libe-
rationes ac iudicationes tolles. At si sanguinem alicui de-
trahere cōducit, solidam aluum facere oportet, atque sic de-
trahere, & fame macerare, ac vinū auferre. Postea victu con-
ueniente, & fomētis humidis, reliquam curationem perage.
Si verò aluus densa ac adstricta esse videatur, molle infu-
sum per clysterem immitte. Si verò medicamētum dare vi-
su m

Sanguis
quomodo
mittendus.

Asum fuerit, per veratrum tuto sursum purga. Deorsum verò nullum talium. Optimum autem est ad mictionē, & ad sudores, & ad deambulationes perducere, & leni frictione vti, vt ne habitum densum efficias. Si verò in lecto decumbat, alij ipsum fricēt. Et si quidem in thorace supra septum transuersum, affectio ipsum infestarit, plurimum resideat, & minimè ipsum reclinent, quandiu vires tolerant: & sedentem multo tempore multo oleo calido defricent. Si verò in inferna aluo sub septo transuerso dolores habeat, decumbere conducit, & nullo motu moueri tali corpori confert, extra defricitionem. Qui verò ex inferna aluo soluuntur dolores, per vrinas & sudores, si moderatè delabuntur, sua sponte soluuntur, qui parui sunt, vehementes autē parui sunt. Tales enim aut pereunt, aut absque aliis morbis sani non fiunt. Verum qui huiusmodi sunt incumbunt ac firmantur. Potio hydropico.

Hydropici
potio.

Cantharidas tres, detracto capite vniuscuiusque, & pedibus, & alis, corpora videlicet ipsarum in tribus aquæ cyathis terito. Quum autē is qui bibit doluerit, calida aqua perfundatur. Bibat autē prius illitus, ieiunus: & edat panes calidos ex oleo. Medicamentum sanguinem sistens Fici succum lana exceptum intus ad venam appone. Aut coagulo intorto nares obturato. Aut chalcitidem digito prius efformatam apprime, & cartilagine extrinsecus vtrinque comprime: & aluum lacte asinino cocto solue, & caput rade, & perfrigeratiā adhibe, si calidum tempus fuerit. Sesamoides sursum pur-

Sanguine
sistentia.

Cgat, potio eius est drachma dimidia in aceto mulso trita. Commiscetur etiam veratris tertia portionis pars, & minus suffocet. Ad trichiasin, id est pilos pungentes in palpebris enascentes. Immissum in acm foramen habentem filum, in summa supernæ palpebræ margine deorsum versus perpunctione facta trans mitte, & aliud itidem sub hoc infernè tradiice: & extenta fila consue ac deliga, donec decidant. & si quidem satis habuerit, bene est. Sin minus, & quid defecerit, rursus eadem facito. Sed & hemorrhoidas eodē modo trans mites, filo lanæ succidæ crassissimo ac maximo in acum immisso, ac deligato. Securius enim fit curatio. Deinde cōpressionē facta medicamento erodente vtere, & ne prolue donec deciderint: semper vnā relinque. Postea verò resectis viribus veratrum dato, deinde exerceatur & exudet, & ante

Trichiasis,

Hæmorrhoides.

exercita

Hippocratis Liber De Vi&ctus

exercitationē mane frictio multa fiat. Verūm à cursu absti-
neat, & ebrietate, & ab acribus, origano excepto. Vomat au-
tem per interpositos dies septem, aut ter in mense. Sic enim
quā optimē habuerit corpus. Vinum verò fuluū austerum,

Suppurati. aquosum ac modicum bibat. At verò ad suppuratos, scillæ
frusta rotunda secta in aqua coquito, & vbi valde bene effer-
buerit, diffundito, & alia effusa coquito, donec ad contactum
percocta ac mollia apparuerint. Deinde leuiter tritis cumi-
num frictum ammisce, & sesama alba, & amygdalas recen-
tes tritas, & hæc melle excepta delingenda præbe, & postea
vinum dulce bibendum. Sorbitiones verò sumat, peplum,
appellatum meconium album, tritum acetabuli parui men-
sura, in aqua loturæ farinæ recentis dilutum ac coctum, mel-
le affuso tepidum absorbens. Atque sic degat per diem. De-
inde supputans ea quæ eueniunt cœnam dato. Fabarū item
depuratarum quadrantem, & rubiæ sarmenta duodecim, te-
rito, misceto, coquito, & pingui addito delingenda præbero.

**Oculorum
medela.**

Ad oculos. Spodium lotum probè velut farinæ massam
subactum, nō liquidum, vix immaturæ acerbæ succo hume-
ctatum leuiter terito, in sole resiccato, & vt ad illitionē com-
modum sit humectato: quum verò siccum factum fuerit, le-
uiter trito sicco oculos sublinito, & angulos conspergito. Ad
eosdem. Ebeni drachmam, æris vsti obolos nouem, croci
obolos tres. Hæc trita in coticula terito, & vini dulcis hemi-
nam Atticam affundito. deinde ad solem obuelata exponi-
to, & vbi cocta exaruerint, ipsis vtete. Ad dolores oculo-
rum. Chalcitidis drachmam, vix expressæ vt duæ partes
sint reliquæ, myrrham & crocū terito, & mustum admisce-
to, & ad solem coquito, ac illinito. Sint autem in vase æneo.

**Strangula
tio vuluæ.
Hydropi-
corum cata-
potia.**

Earum quæ ab vtero strangulantur cognitio. Digitis duo-
bus comprimito, & si senserit, vteri strangulatio est. Si non,
conuulsio. Ad hydropicos. Pepli meconij appellari, aceta-
bulum paruum Atticum rotundum, potio vna, squamæ æris
specilla lota tria. Hæc leuiter trita, & cum farina recenti ag-
glutinata, ac in catapotia efformata, deglutienda dato. Pur-
gant aquam deorsum. Aliud, quod stercora per aluum expel-
lit. In caricæ succum tithymalli instilla, in singulas septies.
deinde in nouum vas compositas reconde, ac exhibe ante ci-
bum. Aliud. Peplum, quod & meconium appellatur, aqua af-
fusa

**Solutio v-
eris.**

A fusa trito ac excolato, & farinam placetarum torrefactarum amiscens, & mel coctum affundens, hydropicis edendum dato: & vinum dulce aquosum, & aquam mulsam aquosam insuper bibendam. At meconium, quod primum excrementum à pueris prodit, collectum recondito, ac curato. **Meconium**

HIPPOCRATIS

COI LIBER DE IUDICA-
TIONIBVS, IANO CORNA-
RIO MEDICO PHY-

B SICO INTER-
PRETE.



De iudicationibus quæ cito ad melius tendunt plerumque eadem signa sunt, quæ etiã sanitatis. **Sudores** enim optimi sunt, & celerissime febrẽ sedant, qui in iudicatoriis diebus fiunt, & febrem perfecte summovent. Boni quoque sunt qui per totum corpus fientes, morbum facilius ferre faciunt. Qui verò nihil horum faciunt, incommodi sunt. Densari verò oportet alui egestionẽ, morbo ad iudicationem tendente. Sit autem subfulua, & non **Qletum.** valde graueolens. Cõmodum est & lumbricos exire ad iudicationem. **Vrina.** Vrina autem optima est, quæ habet albissimam subsidetiam, & leuem ac æqualem, per totum tempus donec iudicatus fuerit morbus. Significat enim securum ac breuẽ fore morbum. Si sudore oborto morbus deficiat: & vrina fulua albam subsidetiam habens conspiciatur: his eadẽ die recidiua febris fiet, atque hæc quinta die citra periculum iudicatur. His qui in breuissimo tẽpore sani euadent, omnia maxima signa fiunt. Nam magis sine dolore degunt, & extra periculum, & noctu dormiunt, & alia signa secunda præ se ferunt. **Capitis dolor.** Quibus in febre non lethali capitis dolor, & alia signa circunstant, in his bilis dominatur. Quibus inceperit dolor primis diebus, & quarta & quinta magis premuntur, hi septima à febre liberantur, Febres iudicantur in iisdẽ numero diebus, ex quib

Hippocratis Liber

**Febres le-
nes.**

ex quibus & superstites euadunt homines, & ex quibus pe- D
reunt. Etenim placidissimæ febres, & signis securissimis fiē-
tes quarto die desinūt, aut prius. Lethalissimæ verò & signis
horredissimis fientes, quarto die aut prius occidunt. Primus
igitur ipsarum insultus sic desinit. Alter ad septimum dedu-
cit. Tertius ad vndecimum. Quartus ad decimum quartū.
Quintus ad decimum septimum. Sextus ad vigesimum. Atq;
hæ in acutissimis morbis, per quatuor ad viginti, appositio-
nes sunt. Non potest autem quicquam horū integris diebus
exactè numerari. Neq; enim anni ac menses totis diebus cō-
stant. In febribus ardentibus bona signa apparētia, qualia in
sanis scripta sunt, si quidem minora fuerint, ad tertiū diem E
remissionem indicant, crassiora verò, in crastinum crassa au-
tem, eadē die. In febribus ardētibus si posterius septimo die
morbus regius accedat, indicium est sublari sudoris. Nam mor-
bus nō solet exudare, neque vsquam alibi abscessum facere,
sed sanus fit. Necesse autem est vbi calor febris discessit, &
humorē in seipsum attraxit, feбри contingere iudicationem,
per vrinas prodeuntes, aut etiam alui egestionem, aut sangui-
nis ex naribus fluxum, aut mictionē multam, aut per multā
humiditatem, sudorem, aut vomitum. Mulieri verò etiā per
mensium viam. Maximè igitur hæc iudicationem faciūt, &
quicquid his propinquum contingit. Facit autem & alias iu-
dicationes, sed minus quā has. Si verò septimo die morbus
regius accedat, aut posterius, in febre ardente, & difficilis
multi sputi secessus, tum in ardētibus, tum in aliis febribus F
si nullo talium signorū fiēte dimiserit febris, necesse est ta-
les iudicationes pro illis fieri, aut magnorum tuberculorum
abscessum, aut dolores ex abscessu vehemētes, aut colliqua-
tiones humorū ex calore. Iudicationes & remissiones eorū
quæ febrem ardentem significant, longiorem morbū faciūt.
Si verò fortia fuerint, mors plerunq; sequitur. Reliquæ ve-
rò ardentes secutæ desinunt septimo aut decimo quarto die.
Solet autem & ad lipyriam deuenire, & detinet maximè xl.
dies, & in Epialum transit, & lipyria eadem quoque die cor-
ripit ac dimittit. Fit autē & capitis dolor. Si verò lipyria non
dimiserit in xl. diebus, sed producta fuerit, & dolor habuerit
caput, & delyret æger, ipsum purgato. Desinente verò febre
ardente si accedat morbus regius, non solet amplius exuda-
re,

**Morbus re-
gius.**

Are, neq; vsquam alibi abscessum facere, sed sanus sit. Tertia-
na in septem circuitibus plerunque iudicatur. Quibuscunq;
in febribus intolerabilibus septima, aut nona, aut decima-
quarta morbus regius accedit, bonum: si non dextrum præ-
cordium durum fiat. Sin minus, ambiguum. Acuti morbi in **Acuti mor-**
quatuordecim diebus plerunque iudicantur. Sudores fe- **bi.**
bricitanti si fiant tertia die, & v. & vij. & ix. & xj. & xiiij. & **Sudor de-**
xxj. & xxxj. hi sudores morbos iudicant. Qui verò non sic **cretorius.**
fiunt, dolores significant. Concoctiones vrinarum paula- **Lotiorum**
tim maturescentes, si in iudicatoriis diebus concoctæ fue- **maturatio**
rint, morbum soluunt. Exemplum vrinarū vlcera facere o- **digestio**
portet. Nam vlcera si repurgantur pure albo, celerem cura- **ve**
tionem indicant. Si verò in saniosos humores transmutetur, **Vlcera.**
maligna fiunt. Eodem modo & vrinæ significant. Si ex dolo-
re tenues fiant, ex occasione ratiocinari oportet, ex qua mor-
bus accessit, & hanc inspicere vbi sedatur. Nam hac deficien-
te, aliis signis qualia conueniunt accedentibus, non putan-
dum est morbo liberationem contingere. Si doluerit ca- **Capitis do-**
put, & ex hoc febris accedat, & hinc non sedetur: dolore non **lor cum fe-**
cessante febris nō iudicatur: & plurima talia iudicationis lō **bre.**
gæ sunt ad melius, etiam in his quæ ad sanitatem tendunt, **Præcordia**
In præcordiis tumores molles, & doloris exortes, & ad **turgida.**
contactum cedentes, diuturniores quidem iudicationes fa- **Tubercula**
ciunt, minus autem horrendas tuberculis his contrariis. Eo- **Vrinæ.**
dem modo habet & de tuberculis in reliquo ventre. Ex vri-
nis si quidem id quod mictum est, purum fuerit: subsiden-
tiam verò albam ac leuem habuerit, diuturnior fit morbus,
& minus quàm optima secuta est hæc vrina. Si verò & vrina
subrubra fuerit, & subsidetia subrubra ac leuis: diuturniorē
quidem hæc morbum quàm prior significat, sed valde saluta-
rem. Quicunque podagrici morbi fiunt, hi in quadraginta **Podagrici.**
diebus ab inflammatione liberi sedantur. Sed in his pleraq;
longæ iudicationis ad melius sunt. Quæ ad mortem ten-
dunt, in die ac nocte iudicantur, quæ videlicet debilitationis **Debilitatis**
signa sunt, velut epti medicamenti, exturbationis alui & **signa.**
sursum, & deorsum, anxietatis, & aliorum huiusmodi. Si igi-
tur horum signa in die ac nocte submoueantur, bene est. Sin
minus, lethalia esse putanda sunt. Sudores pessimi sunt fri- **Sudor fri-**
gidi, & circa ceruicem fientes. Hi enim mortes, & morborū **gidus.**

Ee

longitu

Vrina.

longitudinem præsignant. Alui egestionēs variæ, diuturniores quidem sunt nigris & aliis lethalibus egestionibus: nihilo verò minus perniciosæ. Sunt autem tales, ramentosæ, biliosæ, cruentæ, prasinæ, nigræ: & aliquādo simul omnes prodeunt, aliquando singulæ particulatim. Vrina si quandoque pura mixta fuerit, quandoque subsidentiā albam ac leuem habens, diuturnæ tales sunt, & minus securæ quàm optima vrina. Si verò fulua ac tenuis fuerit vrina multo tempore, periculum est ne sufficere homo possit, donec concocta fuerit vrina, & si aliās superstitis futuri signa fuerint, his abscessum affore expecta ad locos infra septum transuersum. In febribus si mutationes habeat vrina, diuturnitatem temporis significat, & necesse est ægrotum mutari & ad deteriora, & ad alteram partem. Si vrina ab initio non similes fuerint, sed ex tenuibus crassæ fiant, & penitus tenues, tales ægrè iudicant ac inconstantes sunt. Frigidi sudores cum acuta quidem febre, lethales sunt: cum mitiore verò, longitudinē morbi significant. Et ubi in corpore caliditas aut frigiditas, hic morbus est: & ubi in toto corpore mutationes repētinae sūt, & si corpus perfrigeretur, aut rursus calefiat, aut color alius ex alio transmutetur, morbi longitudinem significat. Si febricitanti sudor accedat, febre non deficiente, malū, prolongatur enim morbus, & humiditatem significat. Febricitanti frigidi sudores accedentes, longam febrem significant.

Sudor frigidus.

Sudor sani

Sudor multus intemperatē siens sano, morbum significat, æstate minore, hyeme maiorem. Alui egestionēs si in idem concedere ac cōsistere permiseris, velut ramenta subsident: si pauca, modicus est morbus: si multa, multus: his infusum per clysterē adhibere conducit. Quibus verò in egestionē infernē bilis atra subsidet, si copiosior, maior est morbus. Si paucior, minor. Si venæ pulsarint, & facies sana fuerit, & præcordia non mollia, sed in tumorem eleuata, diuturnus est morbus, & absque conuulsione non soluitur, aut multa sanguinis ex naribus fluxione, aut vehemēti dolore. Et palpitationes in manibus, diuturnæ febris signū sunt, aut brevis iudicatio nis in deterius: & in his pleraque quæ ad mortem tendunt.

Pulsus venarum.

Breui morituri signa
Febris continua.

His qui breuissimo tempore perituri sunt, maxima signa ab initio fiunt. Nam & difficulter spirant, & noctu non dormiunt, & signa periculosa præ se ferunt. In febre continua si quis

A si quis quarta die & septima affligatur, & vndecima non iudicatus fuerit, plerunque perit. Quicunque à distentione antro- **Tetanos.**
trorsum ac retrorsum corripuntur, in quatuor diebus per- **Morbus re-**
eunt. Si verò hos effugerint, sani fiunt. In febribus arden- **gius.**
tibus si accedat morbus regius, & singultus quinto die, le-
thale est. Recidivæ fiunt in his, quibus desinentibus vigiliæ
fortes accedunt, aut somni turbulenti, aut corporis robur, aut
dolores vniuscuiusque mēbri: & quibus febres sedantur, ne-
que signis solutoriis fientibus, neq; in iudicatoriis diebus: &
si deficiente febre, & sudore accedente, vrinam fulvā minxe-
rint, albam subsidentiam habentem, his febris recidivam ea-
dem die expecta. Hæc verò recidivæ quinto die iudicantur ex-

B trā periculum, & si ex iudicatione facta vrinā rubicundam,
rubram subsidentiam habentem minxerint, etiam his reci- **Febris ar-**
diva febris fit eadem die: & pauci ex hac servantur. Quum **dens.**
recidit febris ardens, plerunq; etiam exudat. Et si reuertens
tot diebus detineat quòt prius, etiam tertio recidivat, si non
impari die dimiserit reuerfa. Plerunque si crudæ sint vrinae, **Vrinae cru-**
& alia signa non secundum rationē eveniant, morbus in die **dæ.**
iudicatoria recidivat. Quandoq; verò etiā reuertitur in die
iudicatoria, his talibus relictis. Abscessus circa aurem qui **Abscessus**
bus circa iudicationem fientes non suppurantur, his sub mo- **circa aurē.**
ris recidiva fit, iuxta recidivarum rationē, similis circuitui:
in his spes est ad articulos abscessum fieri: aut vrina crassa,
qualis est alba in quartanis delassatoriis, liberat ab abscessu.
C Quibusdam verò horum etiā sanguinis è naribus eruptio-
nes fiunt. Hæc autem sanguinis eruptio quartanas non sol-
vit, neque morbos qui per alui egestionem sanari solent.

Atrabiliariis cum phrenitide occupatis, si hæmorrhoides **Phrenitis.**
oboriantur, bonum est. Quicunque insaniunt sua sponte **Insania.**
liberati ex morbis, his insaniā solvit dolor ad pedes progres-
sus, aut ad pectus: aut tussis vehemens oborta. Si verò horum
nihil fiat, insania soluta oculi priuatio contingit. Qui lin-
gua offendunt, & labiorum non sunt potentes, si hæc sedata
fuerint, suppurati fiunt. Dolorem in locis infernis fortem
soluit aut surditas, aut sanguis multus è naribus erumpens.

Insania magni morbi ex more gentis solutio. Quibus in **Causi solu-**
febris ardentibus coxarum dolor, oculorum distortio, aut **tio.**
cæcitas, aut testium tumores, aut mammarum eleuatio, febrē

Hippocratis Liber

Tremor.
Surditas.

Subiti do-
loris mede-
la.

Morbus
aquæ sub-
ter cutem.

Pituita al-
ba.

Alui pro-
fluuium.

Capitis do-
lor.

Lippitudo
Spasmos.

ardentem soluit, aut etiam sanguinis ex naribus fluxus. In D febre ardenti si insuper corripiat rigor, exudare solet. A febre ardente occupato, rigore accedente, solutio fit. Quibus in febribus ardentibus tremores oboriuntur, mentis emotio soluit. Quibus in febribus aures obsurduerunt, his non soluta febre, insanire necesse est. Soluit autem sanguis ex naribus erumpens, aut aluius biliosa egerens, aut dysenteria accedens, aut coxarum, aut genuum dolor. Quibus febribus rigor accedit, febris soluitur. Quibus dolores fiunt derepente, præcordium eleuatum est superne, & si circa spuriam costâ graues dolores fiunt, his solutio fit venæ sectio, & purgatio deorsum. Non enim corripit febris vehemens locis impotentibus. In his qui ab hydropse detinentur, si aquositas E per ventrem ad vesicam aut ventrem fluat, solutio fit. Si à pituita alba occupato, alui profluuium vehemens accedat, solutio fit. Qui ab alui profluuiio multo tempore detinentur vnâ cum tussi, non liberantur, si non dolores vehementes in pedibus inciderint. Si verò vult commutatio ac correctio naturæ fieri, postquam non amplius aluius profluit, aut inanem omnem egestionem habuerit, flatus foras prodeuntes accidunt. Nullum itaque humorem manifestum habent. Quare ei qui ita habet secure exhibere scies ea quæ conueniunt, & si voluulus accedat, vinum frigidum multum meracum paulatim bibendum dato, donec somnus, aut crurum dolor fiat. Soluit autem & febris, aut dysenteria. Caput F circuncirca dolenti ac agrotanti, si pus per aures, aut per nares fluxerit, soluit morbum. Quibuscunque sanis derepente dolores oboriuntur in capitibus, & statim voce priuantur, ac stertunt, hi in septem diebus pereunt, si non febris corripuerit. Caput circuncirca dolenti, quicunque ex supernis locus doluerit, cucurbitam affige. Soluit dolor ac coxas, & genua, & anhelatio, quicquid horum factum fuerit. Lippienti ab alui profluuiio corripiti, bonum est. A conuulsione aut distentione neruorum vexato, febris accedens soluit morbum. Si à febre detentum conuulsio corripuit, se datur febris eadem die, aut postridie, aut tertia die.

HIPP

AHIPPOCRATIS

COI LIBER DE DIEBUS

IUDICATORIIS, IANO COR-
NARIO MEDICO

PHYSICO IN-

TERPRETE.

*



Magnam artis partē esse arbitror, de his quæ rectē scripta sunt posse considerationem, facere ac iudicare. Qui enim hoc nouit, & his utitur, nō videtur mihi in arte multum falli posse. Oportet autem exactē perdiscere vnāquamque temporum cōstitutionem, & quēque morbum, & qui morbus sit bonus, & qui periculosus aut in constitutione, aut in morbo, & qui morbus longus sit & lethalis: & qui longus, & non perniciosus ad vitam, & qui acutus ac lethalis: & qui acutus, & superesse sinens. Ex his enim ordinem dierum iudicatoriorum considerandi ac prædicēdi facultas datur, & ex his cognoscere datur, quibus & quando & quomodo victum præscribere oportet. **C**um itaque signum in ægrotis qui victuri sunt, si nō præter naturam fuerit febris ardēs, & alij morbi eodē modo. Nihil enim horrendum, neque lethale fit in his quæ secundum naturam sunt. Secundum est, si non etiam ipsum tempus simul cum morbo impugnet. Plerunq; enim hominis natura, vniuersi potestatem non superat. Postea verò si partes circa faciem gracilescāt: & venæ in manibus, & in oculorum angulis, & superciliis quietem habeant, quum prius non quieuisent. Huic si vox fuerit debiliior, & sit leuior, & spiritus rariior ac tenuior, sequenti die remissio morbi contingit. Hæc igitur considerare oportet ad iudicationes: & an bifida linguæ pars velut saliuā alba obducitur, & an in summa lingua hoc idem factum sit, verū minus. Si quidem igitur parua hæc fuerint, ad tertium diem remissio fit morbi. Si verò aliquan-

Potissima
huius artis
pars.
Mens quā-
do non fal-
litur.
Prima mor-
borum ob-
seruatio.

Secunda.

Tertia.

Lingua sa-
liuosa.

Ee 3

to cras

Hippocratis Liber

Oculorum to crassior fit saliuā, in crastinum. Si verò adhuc crassior, ea- **D**
nora. dem die. Quin & albas oculorum partes in principio morbi
denigrari necesse est, si inualuerit morbus. Hæ igitur si puræ
Morbi acu fiant, perfectam sanitatem indicant: leniter quidem, tardius:
ti vnde. vehementer autem, citius. Cæterum acuti morbi fiunt à bi-
le, vbi in hepar influxerit, & ad caput constiterit. Hæc igitur
patitur hepar. Intumescit & expanditur ad septum transuer-
sum præ tumore, & statim ad caput dolor irruit, maximè ve-
rò ad tempora: & æger auribus non acutè audit. Sæpe etiam
oculis non videt, & horror, & febris corripit. Atque hæc qui-
dem ab initio morbi ipsi fiunt ex interuallo, quandoque ve-
hementer, quandoque minus. Quanto autem morbi tem-
pus magis progressum fecerit, tanto maior fit dolor in cor- **E**
pore: & pupillæ oculorum sparguntur, & obtuse vident: & si
digitum admoueris ad oculos, non sentit, eo quòd nō videt.
Cæcutien- Quòd autem non videat, inde cognoueris. Non enim nictat
tis signum. dum digitus admouetur: & floccos aufert de stragulis, si qui-
Præ oculis dem viderit, pediculos esse putans. Et quū hepar magis ex-
quæ cursita passum fuerit ad septum transuersum, delyrat: & ob oculos
re videtur. sibi aduersari putat reptilia, & alia omnigena animantia fe-
ra, & milites armatos pugnantes, & ipse aduersus ipsos pu-
gnare sibi videtur: & talia dicit velut qui videat, & egreditur
& minatur si quis ipsum egredi non permittat. Et vbi surre-
xerit, crura eleuare non potest, sed cadit. Pedes autē semper
sunt frigidi. Et quum dormierit, exilit à somno, & insomnia **F**
Somnia quæ horrenda videt. Hoc autem cognoscimus quòd ab insomniis
vexent. exilit ac pertèrretur, postquam ad sanam mētem rediit. Ex-
ponit enim insomnia hæc, qualiāq; & corpore fecit & lingua
loquutus est. Atque hæc quidem sic patitur. Quādoque verò
etiam voce priuatur, per totam diem ac noctem multū acer-
uatū spiritū respirās. Postquā verò delyrare cessauit, statim
ad sanā mentē redit. Et si quis ipsum interroget, rectè respon-
det, & intelligit omnia quæ dicuntur. Deinde rursus paulò
Morbi hu- post in iisdem afflictionibus iacet. Hic morbus accidit maxi-
ius causa. mē in peregrinatione, & si alicubi desertā viam iuerit, & ti-
mor ipsum ex spectro corripuerit. Corripit etiā aliis modis.
Tetanos Tetani tres. Si quidem ex vulnere tetanus, siue disten-
quotuplex. tio neruorū antrorsum ac retrorsum fiat, æger hæc patitur.
Maxillæ cōgelantur ac rigent, velut ligna: & os aperire non
potest.

A potest, & oculi frequenter lachrymantur ac distrahuntur, & dorsum riget, & crura flectere non potest, neq; manus, neque spinam. Quum verò lethalis fuerit, potus & cibi quos prius accepit, per nares quandoque redeunt. At opisthotonos, retrorsum fiens distentio, reliqua quidem eadem ægro inducit ut plurimum, fit autem quum in ceruice tendines retrorsum ægrotarit. Aegrotat autē, ab angina, aut ab vna, aut locis circa tonsillas suppuratis. Aliquādo etiam à capite febribus accedentibus conuulsio succedit. Iam verò etiā à vulneribus. Hic trahitur in posteriorem partem, & præ dolore dorsum ac pectora rigent, & eiulat. Hic cōuellitur vehementer, ut vix detineatur à presentibus, ne è lecto excidat. Alius, tetanus

Opisthotonos.

Spasmus.

B est minus lethalis prioribus. fit autem ab iisdem, & totū corpus similiter conuellitur. Febris ardēs prædictis non similiter fit. Vrit enim semel ut necesse sit febricitare. Sitis igitur multa hominē tenet, & febris vehemens. lingua verò rumpitur exasperata, & sicca fit: & color ipsius primum quidem pallidus est, velut solet. progressu verò tēporis nigrescit. Et si quidē in principiis nigrescat, citiores iudicationes fiunt. Si verò posterius, diuturniores.

Ischias.

Coxendicum morbus ex his maximē causis fit in plerisque: si quis diutius in sole versetur, & coxendices fuerint calfacti, & humor qui est in articulis, à calore fuerit resiccatus. Quod autē id quod resiccatur condensatur ac compingitur, hoc magnum signū est. Aeger enim articulos vertere ac mouere nō potest, præ dolore articulorum, & eo quod verticula sunt compacta. Dolet autem magis lumbos & verticula ea quæ sunt ex obliquo coxarum, & genua. Consistit autē dolor plurimo tēpore in inguinibus simulque coxendicibus, acutus ac æstuosus. & si quis ipsum erigat aut transmoueatur, eiulat præ dolore quā maximē potest. Quandoq; verò etiā conuulsio accedit, & rigor ac febris. Fit autem à bile & pituita. fit etiam à sanguine: & dolores consimiles ab omnibus morbis: & rigor & febris aliquando corripit debilis. Morbus regius acutus est, & celeriter occidens. Color totus malicorij speciem refert, & est vehementer cum virore pallidus, quemadmodum lacerti cum virore pallidiores. consimilis autem est cutis. Et in vrina subidet velut eruum fuluum & febris & horror debilis habet.

Morbus regius.

Quādoq; etiā stragula habere nō sustinet, sed mordetur ac

Ec 4

raditur

peripneu-
monia.

raditur matutino tempore, ubi nondum cibum accepit, in
ternis partibus. Deinde viscera plerunque sugunt. Et si quis
erigat ipsum aut alloquatur, non sustinet. Hic ut plurimum
moritur intra quatuordecim dies. Has autem ubi effugerit,
sanus fit. Peripneumonia talia facit. Febris vehemens tenet:
& spiritum densum ac calidum respirat: & anxietas adest, &
impotentia, & iactatio, & dolores circa scapulas, & clavicu-
las, & mammam: & grauitas in pectoribus, & delirium.

Quandoque verò doloris exors æger est, donec tussire in-
ceperit. Verum hic morbus diuturnior ac difficilior illo
est. Saliuam autem albam & spumofam primum sputat. Lin-
gua flaua est, verum progressu temporis nigrescit. Si qui-
dem igitur in principio nigrescat, citius morbus finitur. Si
verò posterius, tardius. Tandem verò etiam rumpitur lin-
gua, & si digitum apponas, inhæret. At liberationem à mor-
bo significat lingua, similiter velut in pleuritide. Hæc au-
tem patitur æger minimum diebus quatuordecim, ad sum-
mum unam & viginti: & tussit hoc tempore vehementer: &
una cum tussi purgatur, primum quidem saliuam multa ac
spumosa. Septima verò & octaua die, ubi febris in vigo-
re fuerit, & humida sit peripneumonia, crassior: sin minus,
non. Nona verò & decima, cum virore pallida ac subcruen-
ta. Duodecima autem usque ad decimam quartam, multa &
purulenta. Atque hoc in his contingit, quorum naturæ & cor-
poris affectiones humidæ sunt, & morbus fortis est. Quo-
rum verò & natura, & morbi constitutio sicca est, in his mi-
nus. Caterum de iudicatoriis diebus, etiam iam ante à me
dictum est. Iudicantur autem febres quarta die, septi-
ma, undecima, decima quarta, decima septima, vi-
gesima prima. Et his autem acutis quædam
etiam trigesima. Deinde quadrage-
sima, postea sexagesima. Quum
verò hos numeros exces-
serint, diuturna iam
februm con-
stitutio.
fit.

Februm de-
cretoria.

HIPP

AHIPPOCRATIS
 COI LIBER PRAENO-
 TIONVM, IANO CORNA-
 RIO MEDICO PHY-
 SICO INTER-
 PRETE.



B

EDICVM prænotionē adhibere, optimum *Quæ medi-
 esse mihi videtur. Prænoscens enim & præ- ci sunt.*
 dicens apud ægrotos, & præsentia, & præte-
 rita, & futura, & quæ ipsi egroti relinquunt
 exponens, fidē utiq; fecerit, quod ægrotorū
 res magis cognoscat, quare audebunt ho-
 mines seipsos medico cōmittere. At verò curationē optimē
 fecerit, vbi prænouerit futuras affectiones. Sanos equidē fa-
 cere omnes ægrotos impossibile est, hoc enim præstantius
 esset, quàm prænoscere in posterū euentura. Quandoquidē
 verò homines moriuntur, alij priusquam medicū vocēt, præ
 violentia morbi: alij verò accito etiā medico, derepentē vita
 decedunt, quidā vbi vnā vixerunt diē, quidam tēpore paulò
 diutiore, anteaquam medicus per artem aduersus singulos
 morbos repugnet: itaq; nosse oportet talium affectionū natu-
 ras, quantū corporū vires excedunt. Simul verò & si quid di-
 uini in morbis inest, etiā huius prænotionē ediscere. Ita enim
 Cmeritò admirationi fuerit, & medicus bonus extiterit. Nā
 quos superstites manere possibile est, eos adhuc magis rectē
 conseruare poterit, ex multo tēpore antea consiliū adhibens
 ad singula. & tum morituros, tum seruandos, prænoscens ac
 prædicens, & culpa exors fuerit. Cōsiderare porrò hoc modo *Quæ medi-
 conuenit in morbis acutis, primū quidē faciem ægroti, an co cogno-
 similis sit his quæ in sanis sunt, maximè verò an ipsa sibi ipsi. scenda.*
 Ita enim optima fuerit. Si verò maximè cōtraria simili fue-
 rit, horrendissima est. Talis autē fuerit, nasus acutus, oculi
 caui, tēpora collapsa, aures frigida ac cōtractæ, & extrema-
 tes auriū auersæ, & cutis circa frontē dura & circuntenta ac
 arida, & color totius faciei pallidus. aut etiā niger, & liuidus,
 aut plūbeus. Siquidē igit in principio morbi facies talis fue-
 rit, & nondū ex alijs signis cōiecturā facere licuerit, interro-
 gare

Ee 5

gare

gare oportet, num vigilauerit homo, an alui excrementa valde liquida sint, aut fames aliqua ipsum teneat. Et si quidem horum aliquid consteatur, minus graue esse putandum est. Iudicantur autem & cognoscuntur talia in die ac nocte, si ob has causas facies talis fuerit. Si verò nihil horum esse dicat, neque in praedicto tempore consistat. nosse conuenit morti proximum esse. At tu vetustiore existente morbo, aut triduo, aut quadriduo, talis fuerit facies, de his interrogare oportet, de quibus etiam prius iussit: itemque alia signa considerare, & in vniuersa facie, & in corpore, & in oculis. Si enim lucem fugiat, aut inuoluntarie lachrymetur, aut distorqueantur, aut alter alcer minor fiat, aut albas partes rubentes habeant, aut venulas liuidas aut nigras in ipsis habeant, aut leuæ ac sordes circa oculos appareant, aut etiam instabiles, aut eminentes, aut caui vehementer facti, aut squalentes & obscuri fuerint: aut color totius faciei alteratus fuerit. Hæc omnia mala & perniciose esse putandum est. Considerare verò conuenit etiam oculorum subapparitiones in somnis. Si enim albæ quid partis subapparuerit, palpebris non commissis, si id non ex alui profluuium, aut medicamenti potione fuerit, aut ægrotus non ita dormire consueuerit, malum signum & valde lethale est. Si verò retorta, aut contracta fiat, aut liuida, aut pallida palpebra, aut labium, aut nasus, cum aliquo ex aliis signis, morti proximum esse sciendum est. Lethale est etiam habere labia resoluta, & pendetia, & frigida, & albicantia facta. Decubentem ægrotum à medico deprehendi conuenit in latus dextrum aut sinistrum, & manus, & collum, & crura modice inflexa habentem, & totum corpus flexibile situm. Ita enim plurimi ex sanis decumbunt. Optimi autem sunt decubitus qui sanorum decubitibus similes existunt. At verò supinum iacere, & manus, & collum, & crura extensa habere, minus bonum est. Si verò etiam pronus fiat, & de lecto ad pedes delabatur, magis horrendum est. Si verò nudos quoque pedes habere coperiatur, nec admodum calidos: & manus, & collum, ac crura inæqualiter dissecta, ac nuda, malum est. Anxietatem enim significat. Lethale est & hiantem semper dormire: & crura supini iacentis valde incuruata esse ac complicata. At in ventrem decubere, si quis non sit adfuetus dum sanus fuit ita dormire, delirium significat, aut dolorem locorum circa ventrem. Ceterum erectum sedere velle ægrum in morbi vigore, in omnibus morbis

Oculorum
signa.

Dormien-
tium con-
suetudo.

Cubatio
qualis.

A bis acutis malū est, pessimum autē in peripneumonicis pulmone inflāmato. Dentibus stridere in febribus, quibus nō familiare id est à pueris, furiosum aclethale est. Verū prædicere oportet ab vtrifq; periculum futurū. Si verò etiā delyrus hoc faciat, perniciosum valde iam existit. Vlcus autē siue prius factū fuerit, siue in morbo accesserit, considerare oportet. Si enim periturus est homo, ante mortē liuidum ac ficcum erit aut etiā pallidū & ficcū. At de manuum latione ita sentio. Quæ in febribus acutis, aut peripneumoniis, aut in phrenitide, aut capitis dolore, ante faciē feruntur, & frustra venantur, & festucas legunt, & floccos de vestibis euellunt, & de pariete paleas detrahūt, eas omnes malas & lethales esse. Spiritus densus dolorē significat, aut inflammationem, in locis supra septū transuersum. Qui verò magnus expiratur, & per multū tēporis interuallum, delyriū indicat. Si verò frigidus ē naso & ore exspiretur, valde iam perniciosus est. Bonā autem spirationē valde magnā vim habere ad salutem, in omnibus acutis morbis putare cōuenit, qui cum febribus sunt, & in quadraginta diebus iudicātur. Sudores optimi sunt in omnibus acutis morbis, qui in diebus iudicatoriis fiunt, & febrē perfectē submouent. Boni verò sunt, qui per totū corpus fientes, hominē facilius morbū ferre faciunt.

Stridor dē-
tium quid
portendat.

Sudores
qui salu-
bres & cō-
trā.

Qui verò tale quid nō effecerint, incōmodi sunt. Pessimi autem sunt frigidi, & tantū circa caput & faciē fientes, & circa ceruicem. Hi enim cū acuta quidē febre, mortē præsignificant: cū mitiore verò, longitudinē morbi. Et qui per totum corpus fiunt, similiter significāt his qui circa caput. At verò milioformes, & solū circa collum fientes, mali sunt. Qui verò cū guttis fiunt, & euaporant, boni sunt. Cōsiderare porrò conuenit sudores in summa. fiunt enim aliqui propter corporum exolutionē, aliqui propter inflammationis vigorem. Præcordium optimum est doloris exors, & molle, & æquale, tum in dextra, tum in sinistra parte. At inflamatū, aut dolorem exhibēs, aut dextrę partes inæqualiter affectæ ad sinistras: hæc omnia obseruare oportet. Si verò etiā pulsus in-erit in præcordio, turbationē significat aut delyriū. Verū oculos taliū insuper intueri oportet. Si enim oculi frequenter moueantur, furiosos hos fore timor est. Tumor in præcordio durus existēs & dolorosus, pessimus quidem est si per totum

A præcor-
diis notæ.

Hippocratis Liber

totum fuerit præcordium. Si verò fuerit in altera parte, minus periculosus est in sinistra. Significat autem eiusmodi tumores, in principio quidem, mortem breui affuturam. Si verò viginti dies transgrediatur, tum febris detinens, tum tumor non confidens ad suppurationem conuertitur: Contingit autem his in primo circuitu, etiã sanguinis eruptio è naribus, & valde prodest. Verũ interrogare cõuenit, an caput doleat, aut hebetem visum habeant: Si enim horum quid fuerit, ad eum locum repit. Magis tamen in iunioribus quinque ac triginta annis, sanguinis eruptionem expectare cõuenit. At verò molles tumores, & doloris exortes, & qui digito cedunt, diuturniores iudicationes faciunt, & minus illis sunt horrendi. Si verò trãsgradiatur sexaginta dies febris detinens, & tumor non confidat, suppuratum fore significat & hunc, & eum qui in reliquo ventre est eodem modo. Quicunq; igitur tumores dolorosi sunt, & duri, & magni, periculũ mortis breui affore significat. Qui verò molles, & doloris exortes sunt, & digito compressi cedunt, diuturniores illis sunt. Cæterum tumores in ventre minus faciunt abscessus, quàm hi qui sunt in præcordiis. Minimè verò hi qui sub vmbilico consistunt, ad suppurationem conuertuntur. Sanguinis verò eruptionem, ex supernis locis maximè expectare oportet. Omnium autem tumorum diuturnorũ circa hos locos, suppurationes considerare conuenit. Sunt autem suppurationes hinc fientes hoc modo considerandæ. Quæcunque extra vertuntur, optimæ sunt, quæ paruæ sunt, & quàm maximè foras eminentes, & in acutum fastigiata. Quæ verò magnæ sunt, & lata, & minimè in acutum fastigiata, pessimæ sunt. Quæcunq; verò intro rumpuntur, optimæ sunt quæ nihil cum externo loco communicant, sed sunt contractæ, & doloris exortes, & totus externus locus concolor apparet. At verò pus optimũ est, si est album & æquale, & leue, & quã minimè graueolens. Quod verò huic contrarium est, pessimum est. Aquæ porò inter cutem, ex acutis morbis obortæ, omnes malæ sunt. Neque enim à febre liberat, & valde dolorosæ sunt, ac lethales. Incipiunt autẽ pleræq; à laterum mollitudine, & à lumbis: aliquæ verò etiam ab hepate. Quibus igitur à laterũ mollitudine & lumbis, principia fiunt, his & pedes intumescunt, & alui profluvia diuturna ipsos tenent, quæ neque dolores

ex

Hydropis
origo.

ex laterum mollitudine ac lumbis soluunt, neq; ventrē molliunt. Quibuscunq; verò ab hepate aquæ inter cutē oriuntur, his tussiles tussindique promptitudo accedit, & nihil me

Hydropis
diuersitas.

morabile expuunt, & pedes tument, & venter non egerit nisi dura, & coarctus, & circa aluū fiunt tumores, aliqui in dextra, aliqui in sinistra parte, tum consistentes, tum confidentes. Caput autem & manus, & pedes, si frigida sunt, malum est, ubi & venter, & latera calida sunt. Optimū verò est & totum corpus calidum esse, ac molle. Conuerti autem facile conuenit ægrotum, & in attollendo se leuem esse. Si verò grauis esse appareat, & reliquo corpore, & manibus, & pedibus, magis periculosum est. Si verò supra grauitatem, vngues &

B digiti liuidi fiāt, mors euestigio expectanda est. At si digiti ac pedes penitus nigrescūt, minus perniciosi sunt quā liuidi. Verū & alia signa considerare oportet. Si enim facile ferre videatur malum, & aliud quoddam ex salutaribus ad hæc signa subindictet, morbum ad abscessum verti spes est, ita ut æger quidē superstes māsurus sit, corporis verò partes nigrae factæ casuræ. Testes & pudenda reuulsa, dolores fortes significant, & periculum lethale. Quòd verò ad somnos at-

Somnus.

tinet, quemadmodum secundum naturam consuetum nobis est interdium vigilare oportet, noctu dormire. Si verò hoc fuerit transmutatum, peius est. Minimè verò lædi æger poterit, si dormiat manè ad tertiam partem diei. Qui verò ab hoc tempore fiunt somni, deteriores sunt. Pessimum autē est non

C dormire, neque noctu, neque interdium. Aut enim præ dolore ac afflictionibus vigiliæ adsunt: aut delirium aderit ab hoc signo. Egestio alui optima est, mollis & cohærens, & secundum horam, in qua etiā à sano egerebatur. Iuxta copiam verò, pro ratione ciborū ingestorū. Tali enim cōtingēte exitu, venter infernus sanus fuerit. Si verò liquida fuerit egestio, conducit neque stridere, neque frequentem esse, & paulatim secedere. Delassatur enim homo ex frequēti desessu, & vigiliis utique cōtraxerit. Si verò sæpe aceruatim egerit, periculum est ne in animi deliquiū incidat. Quin & iuxta copiam ingestorū egerere oportet, bis aut ter in die, & noctu semel. Plura verò mane, quemadmodum in consuetudine est homini. Inspissari autem oportet egestionē, morbo ad iudicacionem tendente. Sit autem subfulua, & non valde graueolens.

Alui excre-
menta.

Commod

Hippocratis Liber

Commodum est, & lumbricos rotundos cum egestionem prodi-
re, morbo ad iudicationem tendente. Oportet autem in
omni morbo mollem esse ventrem, & iusta mole præditum.

At verò aquosum valde, aut album, aut pallidum, aut viri-
de, aut vehementer rufum, aut spumofum stercus egerere:
Hæc omnia mala sunt. Malum insuper est & quod exiguum
est, & viscosum ac albū: & quod subpallidum aut subviride
ac leue. His verò magis lethalia fuerint stercorea nigra, aut
pinguia, aut liuida, aut æruginosa, & malè olētia. Quæ verò
varia sunt, diuturniora quidem his sunt, nihilominus autem
perniciosa. Sunt autē talia, ramentosa, & biliosa, & cruenta,
& prasina, & nigra, aliquādo simul inter se exeuntia, aliquan-
do particulatim. Flatum porrò sine strepitu ac crepitu pro-
dire optimum est. Melius autem est & cum strepitu exire,
quàm isthic reuolui, & qui sic progressus est flatus, aut dole-
re quid hominē significat, aut delirare: nisi sua sponte homo
ita flatum emittat. Cæterum præcordiorum dolores ac tu-
mores, si fuerint recentes, & non cum inflammatione, soluit,
murmur in præcordio obortum, & maximè quidem si per-
transierit cum stercore, & vrina, ac flatu. Sin minus, etiam

Vrinæ. ipsum per se si transierit, prodest. Prodest itē si subdescende-
rit ad infernos locos. Optima verò est vrina, quum fuerit
alba subsidentia, & leuis & equalis, per totum tempus, donec
iudicatus fuerit morbus. Significat enim & securitatem, &
morbum fore breuem. Si intermiserit, & aliquando quidem
pura mingatur, aliquando verò subsidet album ac leue, diu-
turnior fit morbus, & minus securus. Si verò fuerit & vri-
na subrubra, & subsidentia ipsius similis, & leuis, diuturnio-
rem quidem hæc morbū quàm prior significat, sed valde sa-
lutarem. At subsidentia in vrinis crassiores polentæ partes
referentes, prauæ sunt. His autē peiores sunt, laminosæ. Al-
bæ verò & tenues valde malæ sunt. Verū his deteriores sunt
furfuraceæ. Nubeculæ quæ feruntur in vrinis, albæ quidē
bonæ sunt, nigrae verò malæ. Quandiu verò fulua fuerit vri-
na & tenuis, morbum incōcoctum esse significat. Si verò &
diuturna fuerit talis existens, periculū est ne sufficere homo
possit, donec vrina fuerit concocta. Lethaliores autem sunt
vrinæ, & foetidæ, & aquosæ, & nigrae, & crassæ. At tum in vi-
ris, tum in mulieribus, nigrae vrinæ pessimæ sunt. In pueris
autem

A autē aquosæ. Quicunq; vrinas tenues & crudas mingūt multo tempore, si alia veluti superstitibus futuris signa fuerint, his abscessum expectare oportet ad locos infra septum trāsuersum. Sed & pinguedines supernè instantes, araneorum telis similes, damnare oportet. Sunt enim colliquationis signa. Considerare verò conuenit in vrinis in quibus nubesculæ sunt, an supernè aut infernè sint: & quales habeant colores. Et quæ quidem deorsum feruntur, cum coloribus relatis eas bonas esse putare, ac laudare. Quæ verò sursum feruntur, cum coloribus relatis, malas esse, & tales damnare. Nec verò decipiat te, si vesica morbum aliquem habēs, eiusmodi vrinas reddiderit. Non enim totius corporis signum est, sed

B ipsius per se vesicæ. Vomitus commodissimus est, ex pituita **Vomitus.** ac bile quàm maximè permixtus, & non crassus valde, neq; multus. Nam meraciores, deteriores sunt. Si verò id quod vomitu reiectum est prasini fuerit coloris, aut liuidum, aut nigrum: quicunque horum fuerit colorum, malum esse putandum est. Si verò omnes colores idē homo vomit, valde perniciosum hoc est. Celerrimam autem mortem significat liuidus vomitus, si graueolens fuerit. Omnes verò subputridi ac foetidi odores, in omnibus vomitibus mali sunt. Sputum vero **Sputum.** in omnibus doloribus, qui circa pulmonem & costas fiūt, citò ac facilè expui cōuenit, & flatum sputo valde permixtū apparere. Si enim longè postea post principium doloris, expuerit quod flauum est, aut fuluū, aut quod multam tussim inducit, & nō valde permixtum est, deterius est. Nam & flauum meracum, periculosum est: & album ac viscosum & rotundū, inutile est. Malum est & quod viride est valde, itēmq; pallidum, & quod spumofum. Si verò ita fuerit meracum, vt etiam nigrum appareat, hoc ipsum deterius est quàm illa.

Malum etiam est si nihil repurgetur, neque emittat pulmo, sed plenus ferueat in gutture. Grauedines & sternutationes in omnibus circa pulmonē morbis, & antecessisse, & succedere, malū est. At in aliis morbis lethalissimis sternutationes profunt. Sputum autem flauum, sanguine permixtum non multo, si in pulmonis inflammatione in principio morbi reiciatur, salutare est, & valde prodest. Si verò septimo die, aut posterius, minus securum est. Omnia sputa mala **Sputa quæ** sunt, quæ dolorem nō sedant. Pessima verò sunt nigra, velut **mala.** descri

**Pulmoquū
non purgat
malum est.**

Hippocratis Liber

**Suppura-
tiones.**

**Bona spei
signa.**

**Pus quādo
erumpit.**

descriptum est. Quæ verò dolorem sedant, omnium optima **D**
 existunt. Quicunq; dolores ex his locis non sedantur, neque
 ad sputorum purgationem, neque ad stercoreum alui subdu-
 ctionem, neque ad venæ sectiones, & victus rationem ac me-
 dicamenta. eos ad suppurationem verti sciendum est. Ex sup-
 purationibus quæcunque dum sputum adhuc biliosum est,
 suppuratur, perniciosæ valde sunt, siue biliosum illud in par-
 te, siue simul cum pure expuatur: & hoc potissimum si mor-
 bo ad septimū diem progressio, suppuratio ab hoc sputo pro-
 cedere incipiat. Timor autē est eum qui talia expuit, mori-
 turum esse decimaquarta die, si non aliquod bonū signū ipsi
 acciderit. Sunt autem bona hæc, facile ferre morbum, bene
 spirare, à dolore liberatum esse, sputum facile tussiendo reij- **E**
 cere, corpus æqualiter calidum ac molle apparere, sitim non
 habere, urinas & alui egestionem, & somnos, & sudores, velut
 descriptum est: hæc singula nosse conuenit accidere vt quæ
 bona sint. Nam omnibus his sic contingentibus, homo non
 morietur. Si verò aliqua ex his accesserint, aliqua non, non
 ampliore tēpore vita producta, decimaquarta die homo pe-
 ribit. Porro mala signa his contraria sunt: ægrè ferre mor-
 bum, spiritum magnum & densum esse, dolorem nō sedari,
 sputum vix tussiendo reicere, valde sitire, corpus inæquali-
 ter à febris teneri, ventrem quidem ac costas fortiter calidas
 esse, frōtem verò & manus ac pedes frigidos. Urinas autem
 & alui egestionem, & somnos, & sudores, velut descriptum est:
 hæc singula nosse oportet mala esse. Si enim ita accesserit **F**
 horum aliquid ad sputum, peribit utiq; homo priusquam ad
 decimumquartū diem peruenerit, aut nono die, aut vndeci-
 mo. Sic igitur coniecturam facere oportet, quòd hoc sputum
 lethale sit valde, & non perducatur ad decimumquartū diem.
 Proinde & mala & bona signa expendentem ex his prædi-
 ctiones facere oportet. Ita enim potissimum veritatē conse-
 qui quis poterit. At verò aliæ suppurationes rumpuntur
 plurimæ quidem vigesimo die, aliæ verò trigesimo, aliæ qua-
 dragesimo, aliquæ verò ad sexaginta dies perueniunt. Con-
 siderare verò futuræ suppurationis principium oportet, sup-
 puratione facta ab ea die qua primū homo febricitauit, aut
 si fortē ipsum primū rigor apprehēdit: & si pro dolore gra-
 uitatem sibi factam esse dixerit, in eo loco in quo dolebat.
 Hæc

- A** Hæc enim in principiis suppurationum fiunt. Ex his igitur temporibus eruptionem suppurationū fore expectare oportet ad prædicta tempora. Si verò suppuratio fuerit in altero latere solum, vertere & considerare oportet in his, num aliquem habeat dolorem in altero latere, & an alterum altero sit calidius; & reclinato ægro in latus sanum interrogare ipsum, an videatur ipsi graue quid ex superno latere incumbere. Si enim hoc fuerit, in altero est suppuratio, in quo grauitas affuerit. Caterum omnes suppuratos ex his signis cognoscere oportet. Primum quidem si febris nō dimittit, sed per diem quidem tenuis est, noctu verò amplior: & sudores multi oboriuntur, tussésque, ac tussiendo promptitudo ipsis adest, & nihil memorabile expuīt: & oculi caui fiunt, & maxillæ ruborem contrahunt, & vngues quidem manuum curuantur, digiti verò calescunt, & potissimum summi: & in pedibus tumores fiunt, & cibos nō appetūt, & pustulæ per corpus enascuntur. Quæcunque igitur suppurationes diuturnæ sunt, hæc signa habent, & fidem ipsis valde habere oportet. Quæ verò breues sunt, ex his signis cognoscere oportet, si quid apparuerit ex his, qualia in principiis fiunt. Simul autem & si aliquanto difficilius spirauerit homo. At verò quæ ex ipsis citius & tardius rumpuntur, his signis cognoscere oportet. Si quidē enim dolor in principiis fiat, & spirandi difficultas, & tussis, & sputatio perseverans, ad vigesimum diem pertingat, eruptionem tūc expectare oportet, aut etiā prius.
- C** Si verò quietior fuerit dolor, & alia omnia pro huius ratione, eruptio posterius expectanda est. Necesse verò est accedere & dolorem, & spirandi difficultatem, & sputationem, ante puris eruptionem. Ex his autem maximè superstites manent hi quos febris eodem post eruptionem die dimiserit: & qui cibos citò appetiuerint, & à siti liberati fuerint: & si vëter parua & compacta egresserit, & pus album & leue & eiusdem coloris fuerit, & à pituita liberum, & citra dolorem ac tussim fortem repurgetur. Ac optimè quidē sic ac celerimè liberatur. Sin minus, hi quibus proxima his cōtigerint. At verò intereunt hi quos febris non dimiserit, aut vbi ipsos dimisisse putata fuit, rursus recalescens apparuerit: & qui sitim quidem habuerint, cibos autem non appetiuerint, & si vëter liquidus fuerit, & pus pallidum siue viride, & liuidum

Suppurato
rū cognitio

Ff

expue

Tubercula
aurium.

expuerint, aut pituitosum & spumosum. Si hæc omnia conti-
gerint, pereunt. Quibus verò ex his quædã accesserint, quædã
non, horum aliqui intereunt, aliqui in multo tempore superstites
evadunt. Verum ex omnibus signis quæ adsunt, tum in his, tum
in aliis omnibus coniecturam facere oportet. Quibuscunque
ex inflammato pulmonis morbis, abscessus circa aures fiunt,
& suppuratur, aut ad infernas partes, ac fistulatur, hi supersti-
tes evadunt. Verum huiusmodi sic considerare oportet. Si & fe-
bris detinuerit, & dolor non sedatus fuerit, & sputum pro ra-
tione non prodierit, neque biliosa, neque soluta faciles, & mera-
cæ alui egestionis fuerint, neque vrina valde multa, & multam
subsidentiam habens: indicatur autem superstes futurus ab om-
nibus reliquis salutaribus signis, tunc abscessus huiusmodi fo-
re sperandum est. Fiunt autem partim ad infernas partes, quibus
videlicet inflammatio aliqua circa præcordia affuerit: partim
in supernis, quibus præcordium molle & doloris exors perma-
nerit, & ubi spirandi difficultas, quæ per tempus aliquod affuit,
desierit citra aliam manifestam causam. Ceterum abscessus ad cru-
ra, in pulmonis inflammationibus fortibus ac periculosis, om-
nes quidem utiles sunt, optimi verò sunt, qui dum sputum iam in
mutatione est, fiunt. Si enim tumor & dolor fiat, sputo pro fla-
uo purulento fiente, & foras procedente: ita securis si in eum homo su-
perstes evaserit, & abscessus absque dolore celerrime sedabi-
tur. Si verò sputum non bene processerit, neque vrina subsidentiam
bonam habens apparuerit, periculum est claudum fore articulum,
aut multum molestiarum exhibiturum. At si evanescat & recur-
rant abscessus, sputo non prodeunte, febreque permanente hor-
rendum est. Periculum enim est ne deliret homo & moriatur.

Ex suppuratis à pulmonis inflammatione, seniores magis
intereunt. Ex aliis autem suppurationibus, iuniores magis mo-
riuntur. Dolores cum febre fientes circa lumbos & infernas
partes si septum transversum attigerint, infernas partes relin-
quentes, perniciosi valde sunt. Proinde aliis quoque signis ani-
mum advertere oportet. Nam si quod etiam ex aliis signis malum
apparuerit, desperatus est homo. Si verò assiliente ad septum
transversum morbo alia signa non mala accesserint, hunc suppu-
ratum fore multa spes est. Quicumque verò suppurati videntur,
quibus quidem purum pus fuerit, & album, & non fetidum,
hi servantur: quibus autem subcruentum, & cænosum, hi pe-
reunt

A reunt. Porro vesicæ duræ & dolētes, penitus quidē horrendæ ac perniciosæ sunt, perniciosissimæ verò quæ cū febre conti- **Ex vesica**
 nua fiunt. Etenim dolores ab ipsis vesicis ad occidendū suffi- **notæ.**
 ciunt, & alui nō egerunt hoc tempore, nisi durū quiddam, &
 hoc coactæ. Soluit autē vrina purulēta micta, quæ albā ac le-
 uem subsidentiā habet. Si verò neq; ab vrina quicquā remi-
 serit dolor, neq; vesica molliatur, & febris continua fuerit, in
 primis circuitibus morbi ægrū moriturū esse timor est. At-
 que hic modus potissimū pūeros corripit septēnes, donec ad
 quintumdecimū annum peruenerint. Febres iudicantur in **Febriū de-**
 iisdem numero diebus, ex quibus & superstites euadunt ho- **cretoria.**
 mines, & ex quibus pereunt. Etenim placidissimæ febres, &
B signis securissimis nitētes, quarto die desinūt, aut prius. Ma-
 lignissimæ verò, & signis horredissimis fiētes, quarto die aut
 prius occidunt. Primus igitur ipsarū insultus sic desinit. Se-
 cundus autem, ad septimum producit. Tertius ad vndeci-
 mum. Quartus ad decimū quartum. Quintus ad decimū se-
 ptimum. Sextus ad vigesimum. Hi igitur imperus ex acutis-
 simis morbis, per quatuor ad viginti, ex additione desinunt.
 Non potest autem quicquam horum integris diebus exactē
 numerari. Neq; enim annus, & menses, integris diebus nu-
 merari possunt. Postea verò eodem modo iuxta eandem ad-
 ditionem, primus circuitus quatuor & triginta dierū est, se-
 cundus quadraginta dierum, tertius sexaginta dierum. At in
 horum principiis difficillimū est cognoscere eos qui in plu-
C rimo tēpore iudicabuntur. Simillima enim sunt ipsorū prin-
 cipia. Verū a primo die animaduersionem facere oportet,
 & prout singuli quaternarij adduntur considerare, & non la-
 rebit te quo verretur morbus. Fit autem & quartanarum fe-
 brium cōstitutio ex huiusmodi ordine. Qui porro morbi in
 breuissimo tēpore iudicabuntur, faciliores cognitu sunt. Ma-
 ximæ enim differentiæ ab initio ipsis sunt. Qui enim super-
 stites ab ipsis euasuri sunt, facilē spirantes, & doloris exortes
 sunt, & noctu dormiunt, aliāque signa securissima habent.
 Qui verò morituri, ægrē spirātes fiunt, delirātes, vigilantes,
 aliāque signa pessima habentes. Vt igitur his ita contingen-
 tibus, cōiectare oportet, & iuxta hoc tempus, & iuxta vnam
 quamq; additionem, tendentibus ad iudicationem morbis.
 Iuxta eandem rationē mulieribus quoq; iudicationes fiunt

Hippocratis Liber

ex partu. **Capitis dolores fortes & continui cum febre, si D**
Capitis dolor assiduus quando malus. quidem lethaliū signorum quid accesserit, perniciosi val-
de sunt. Si verò absq; talibus signis, dolor viginti dies trāsmi-
ferit, & febris tenuerit, sanguinis à naribus eruptionē, aut ab-
scessum quendā ad infernas partes expectare oportet. Sed &
quā diu dolor recens fuerit, similiter sanguinis è naribus
eruptionem, aut puris eruptionē sperare cōuenit, cum aliās
tum si dolor circa tēpora & frontē fuerit. Verū sanguinis
eruptio magis expectanda est iunioribus trigintaquinque
Auris dolor. annis, senioribus verò puris eruptio. Auris dolor acutus cum
febre cōtinua ac forti, horrendus est. Periculum est enim de-
lyraturum esse hominē, ac periturū. Proinde quum hic mo-
dus minimē tutus sit, cito mentem aduertere oportet etiam **E**
aliis signis, à primo statim die. Pereunt autē iuniores homi-
nes septimo die, & adhuc citiūs, ex hoc morbo. Senes verò
longē tardius. Nam & febres & delyria minūs ipsis accidūt,
& hac de causa aures antea suppurantur. Verū his quidem
ætatibus recidiuā morbi contingentes, plurimos occidunt.
At verò iuniores priusquā suppuretur auris, pereūt. Nam
si pus albū effluxerit ex aure, spes est iuuenē superstitem eua-
surum esse, si sanē & aliud quoddam bonū signum ipsi acce-
Fauciū exulceratio. dat. Fauces exulceratæ cum febre, horrendæ sunt. Verū
si quod aliud item signum accedat, ex his quæ antea mala ef-
se iudicata sunt, in periculo hominem versari prædicendum
est. Anginæ liorrendissimæ sunt, & citissimē accidunt, quæ **F**
neque in faucibus quicquam conspicuum faciunt, neque in
cervice: verū plurimum dolorem exhibent, & erecta cer-
uice spirationem inducunt. Hæ enim eodem die suffocant,
secundo item ac tertio & quarto. Quæ verò alioqui similiter
dolorem exhibent, attollūtur autem, & in faucibus rubores
faciunt, perniciosæ quidem valde sunt, verū prioribus ma-
gis diuturnæ, si rubor fuerit magnus. Quibuscunq; verò fau-
ces & ceruix simul rubuerint, hæ anginæ diuturniores sunt,
& ex ipsis maximē euadunt, si & ceruix, & pectus ruborem
Erysipelas habuerit, & erysipelas ignis sacri non intro recurrerit. Si ve-
rò neque in diebus iudicatoriis dissipetur erysipelas, neque
tuberculum ad externam partem conuertatur, neq; pus tuf-
fiendo reiiciat, facilēq; ac sine dolore degere videatur, in or-
tem significat, aut ruboris recidiuam. Securius est autem tu-
morem

- A** morē & ruborē quā maximē foras verti. Si verò ad pulmonē vertatur, & delirium inducit, & quidā ex ipsis suppurati plerunque fiunt. Gurguliones periculosi sunt ut & refecentur, & scarificentur, quā diu rubicundi fuerint & magni. Nam inflammationes ad hos succedunt, & sanguinis eruptiones. Quare tales aliis machinamentis attenuare conari oportet hoc tēpore. Quum verò totum iam fuerit secretum, quòd sanē vuam appellāt, & fiat extrema gurgulionis pars maior & rotunda, superior autem tenuior, in hoc tempore tutum est rem aggredi. Præstat tamen & aluo subducta, chirurgia hac vri, si & tempus permittat, & homo non stranguletur. Quibus febres cessant, neque signis solutoriis apparentibus, neque in diebus iudicatoriis, his reuersuras esse expectandum est. Quæcunque febris longiorem moram traxerit homine alioqui ad salutem disposito, ita ut neque dolor teneat ob inflammationē, aut ob aliquam aliam manifestam causam: huic abscessum expectare oportet cum tumore ac dolore ad aliquem articulum. vel maximē infernum. Fiunt autem huiusmodi abscessus magis, & in breuiori tēpore, his qui iuniores sunt triginta annis. Expectare verò statim oportet abscessum si febris detinens viginti dies transmiserit. Senioribus autē minus fiunt, diuturniore etiam existente febre. At verò huiusmodi abscessum expectare oportet febre continua existente. Verum ad quartanam deducetur, si intermiserit, & erroneo modo apprehenderit, & si hæc faciens ad autumnū
- C** appropinquarit, Quemadmodū autem iunioribus triginta annis abscessus fiunt: Ita quartanæ magis his qui triginta sunt annorum, & senioribus. Caterum hæc nosse expedit abscessus magis hyeme fieri, tardiūque cessare, & minus recurrere. Quicumque verò in febre non lethali, dixerit sibi caput dolere, aut etiam præ oculis obscurum quiddā apparere, si & osculi ventris morsus huic accesserit, ei biliosus vomitus aderit. Si verò etiam rigor accesserit, & partes infra præcordium frigidas habuerit, citius adhuc vomitus aderit. At si quid biberit aut ediderit sub hoc tempus valde cito vomet.
- Porrò quibus horum dolor fieri inceperit primo die, hi quarto magis quā quinto premuntur: septimo verò liberantur. Plerique tamē ipsorum tertio die dolere incipiunt, vexantur autem maximē quinto, liberantur nono, aut vndecimo

Hippocratis Liber

mo. Qui verò incoeperint quinto die dolere, aliâque iuxta D
ratione priorum ipsis fiant, his ad decimū quartum morbus
iudicatur. Fiunt autē hæc & viris, & mulieribus maximē in
tertianis. Iunioribus verò fiunt quidem & in his, verū ma-
gis in continuis febribus, & in sinceris tertianis. Quibus-
cunque verò in huiusmodi febre caput dolentibus, pro eo
quod obscurum quiddam præ oculis appareat, visus hebetu-
do contingit, aut splendores ob oculos obuersantur: & pro
osculi ventris morfu, in præcordiorū dextra aut sinistra par-
te aliquid tenditur, neque cum dolore, neque cum inflamma-
tione: sanguinem de naribus his, pro vomitu fluxurum esse
expectandum est. Magis tamē & hic in iuuenibus sanguinis
eruptionem expectare oportet, his autem qui triginta sunt E
annorum, & seniores adhuc, minus: verū vomitus in his ex-
pectari debent. At verò pueris conuulsiones fiunt, si febris
fuerit acuta, & venter non egresserit: & vigilarint, & terreantur,
& eiularint, & colore mutarint, & viridē siue pallidum
aut liuidū, aut rubrū cōtraxerint. Fiunt autē hæc promptis-
simē quidem pueris nuperrimē editis, vsq; ad septimum an-
num. Seniores autem pueri, & viri, non amplius in febribus
corripiuntur cōuulsionibus, si non quid ex signis fortissimis
ac pessimis accesserit, qualia sanē in phrenitide fieri solent.
Perituros porro & superstites futuros, tum pueros, tū alios,
ex omnibus signis coniectare oportet, prout singula de singu-
lis perscripta sunt. Atque hæc & de acutis morbis, & de his
qui ex ipsis fiunt, dico. Qui verò rectē prænosceat, & F
superstites futuros, & morituros: & quibus per plures dies,
& quibus ad pauciores morbus duraturus est: eum signa om-
nia ediscere, & iudicare posse conuenit, ita vt vires ipsorum
inter se conferendo expendat, quemadmodum perscriptum
est: & de aliis, & de vrinis, & de sputis, vbi simul & pus & bilē
agrotus tussiendo reiecerit. Quin & impetus morborū sem-
per populariter grassantium cito animaduertere oportet, &
temporis cōstitutionem non ignorare. Probè tamen id nosse
expedit de coniecturis certis, & aliis signis, & non ignorare
quod in omni anno, & omni tēpore, mala malū, bona bonū
significant. Nam & in Libya, & Delo, ac Scythia, præscripta
signa vera comperiuntur. Proinde sciendum est, minimē dif-
ficile esse, in iisdē regionibus posse aliquem pleraq; ex ipsis
assequi

Libya, De
los, Scy-
thia pro o-
mnibus po-
nantur.

A assequi, si memoria tenens ipsa, iudicare ac rectè expendere sciat. Caterùm nullius morbi nomen desiderare oportet, quod hic non est adscriptum. Omnes enim qui in prædictis temporibus iudicantur, ex iisdem signis cognosces.

HIPPOCRATIS

COI PRÆDICTIONVM,

LIBER I. IANO CORNA-

RIO MEDICO PHY-

SICO INTER-

PRETE.



Oporosi in principiis fientes, cum capitis, lumborum, præcordij, colli dolore, vigilantes, num phrenitici sunt? Nasus in his destillans perniciosus, tum alias, tum quarto ab initio die. Alui proluuium valde rubicundum, malum quidem est in omnibus morbis, non minimè verò in prædictis. Linguae asperæ & resiccatae, phreniticae. Inturbatis vigilantibus, urinae decolores, nigrae, innatantes, in sudoribus, phreniticae. Insomnia etiam in phreniticis manifesta sunt. Sreatio frequens, si sanè & aliud quoddam signum affuerit, phrenitica sunt. Qui relinquuntur in præcordio ardores, febre perfrigerata, mali sunt, tum alias, tum in sudoribus. Prædebilitatorum desipientia pessima, velut etiam Thrasynonti. Phreniticae vehementes affectiones, tremulae desinunt. Vomitus. Vomitus in capitis doloribus æruginosi, cum surditate & vigiliis, cito insaniam affore denuncient. Loci circa fauces in acutis morbis dolorosi, graciles, parui, suffocatorii, quando hiarit æger ut os claudere & aperire non facile possit, mentis emotionem portendunt. Ex talibus phrenitici fiunt, & perniciosè affecti. In phreniticis in principio mansuetudo. Verùm frequenter transmutari, malum id est, & sputatio mala est. In phreniticis alba alui egestio, malum: quemadmodum & Archecrati. Num & in his torpor fit? Riliu cæce. Quibus melancholico modo mente thes.

Hippocratis Liber I.

Phrenitici si-
gnum.
Hermozygæ
gas.

Tinnitus
aurium qua-
lis.

Lingua
spasmi.
Lingua
tremor.

Oletula
spumosa.

Singultus
quado ma-
lus.

Vocis in-
terceptio-
nes.

Aristago-
ras.

Vrinæ clau-
destinæ.

Hermip-
pus.

Surditas
malum in
his.

Didymar-
chus.

motis, tremores accedunt, malignum hoc est. **Mente moti D**
acutè, vbi insuper febrierint, cum sudore phrenitici fiunt.
Phrenitici paucibili, strepitum valde percipientes, tremuli.

Ex vomitu nauseabundo oborta, clāgorosa vox, oculi puluil-
lim incumbentem habentes, insaniam portendunt: quem-
admodum etiam Hermozygæ vxor, insania acutè correpta,
voce destituta mortua est. In febre ardenti sonitibus auriū
accedentibus, cum visus hebetudine, & grauitate in naribus
accedente, melancholico modo mente mouentur. Mentis

perculsiones cum voce clangorosa, linguæ conuulsiones tre-
mulæ: & voces tremulæ fientes, mortem alienāt. duricies in
his perniciofa est. Lingua tremulæ signum sunt mentis non
firmæ. In biliolis meracis alui egestionibus, spumosa floru- **E**

lentia mala, tum alias, tum si cui lumbi antea doluerint, &
mente motus fuerit. Rari circa latus in his dolores, desipien-
tiam significāt. Vocis interceptiones cum singultu pessimæ.

Vocis interceptiones cum exolutione pessimæ. In vocis
interceptione, spiritus veluti his qui stragulantur præ ma-
nibus expositus, malus est. Num & talis mentem emouet?

Modicè feroces mentis emotiones, ferinæ sunt. Molestè
ferre morbum cum perfrigeratione, si non sine febre exsu-
dent partes supernæ, phrenitim portendit: quemadmodum
etiam Aristagoræ. Sed & perniciosum hoc est. Frequentes
in phreniticis permutationes, conuulsoriæ. Vrinæ quæ min-
guntur à non recordantibus, nec commonefactis, pernicio-
sæ. Num his minguntur velut si subsidentiam conturbasses? **F**

Palpitantes per totum, num voce destituti moriuntur? Spu-
rationes in phreniticis cum perfrigeratione, nigræ reuo-
muntur. Surditas, & vrinæ non confidentes, valde rubicun-
dæ, innatantes, mentis emotionem portendunt. His morbo
regio corripī malum est. Mala est & ex morbo regio fatui-
tas. Hos voce quidē destitui, verū sentientes esse contingit.

Arbitror autem & aluos his perrūpere, velut contigit Her-
mippo, & mortuus est. Surditas in morbis acutis & turbu-

lensis consequens, mala. Mentis emotiones tremulæ, obscu-
ræ, palpatoriæ, valde phreniticæ sunt. Velut & Didymarcho
in Co. Torpores ex rigore, non valde apud seipsos sunt. Do-
lores circum vmbilicum palpitantes, habēt quidem aliquid
quod mentem emouet. Verū circa iudicationem his spiri-
tus

A tus aceruatus cum prompta tēſione penetrat. Et dolores circa ſuram, in his mentis emotionem faciunt. Si innatarit quid in vrina, dolore circa femur diſſipato, mentis emotionem portendit. & qualia circa aurium ſonitus contingunt, talia exiſtunt. In aluo liquida, laſſato, caput dolēti, ſiticuloſo, vigilantī, obſcure loquenti, impotenti, quibus talia ſunt, his timor eſt vt mente moueantur. Exudantes & maximè circa caput, in morbis acutis ſubmoleſtè ferentes, malū, tum alias, tum in vrinis nigris. & turbidus ſpiritus in his malus.

Impotentia præter vacuatorum vaſorum rationem cōtingentes, non exiſtente vaſorum vacuatione, malum. Alui interceptæ, ſed parua, nigra, velut caprarum ſtercora ad neceſſitatem coactè emittentes, naſus in his erumpens, malum.

B Quibus lumborum dolor diutinus, cum ardore ſtudioſo ac nauſeabundo, hi ſi exudent, malum eſt. Num his tremores ſiunt? Sed & vox velut in rigore conſpicua? Extremitates ſi in vtranque partem cito tranſmutentur, malum eſt. Et ſitis huiusmodi, mala eſt. Ex moderato ferox reſponſio, malum. Vox acuta, his præcordia intro trahuntur. Oculus hebes, malus: & fixus accaliginofus, malus. Vox acuta clangoroſa, mala. Dentium ſtridor pernicioſus eſt, quibus non & ſanis familiaris eſt, Suffocatio in his valde mala. Faciei bonus color, & vehemens toruitas, malum. Egeſtiones alui deſinentes in ſpumofas meracas, exacerbatoria ſunt. Vrinarum in morbis acutis ex perfrigeratione interceptiones,

Vox acuta.
Dentium
ſtridor.

C peſſimæ. Pernicioſa ſi citra ſigna, leuia facta fuerint, mortem ſignificant. In morbis acutis bilioſis valdè albæ, ſpumofæ, circumbilioſæ egeſtiones, malæ. Malæ item & vrinæ eiufmodi. Num his hepar doloroſum eſt? Vocis interceptiones in febris conuulſorio modo ſientes, ad mentis emotionem cum ſilentio deueniunt, pernicioſum. Vocis ex dolore interceptiones, doloroſam mortem inducunt. Febres ex præcordiorum doloribus malignæ. Sitis præter rationem ſoluta in acutis morbis, mala eſt. Sudor multus cum febris acutis ſiens, malus eſt. Et vrinæ doloroſæ, malæ ſunt.

Lotij interceptio.
Mortis ſignum.
Silentiū in febris pernicioſum.

Sitis.
Sudor.
Vrinæ malæ.

Et rubicundæ ex his florulentia detentæ, itémque æruginofæ, malæ ſunt: & paruas apparere veluti ſtillas. Et vomitus cum varietate, mali ſunt, tum aliàs, tum ſi propius inter ſe prodeant. Quæcunq; in diebus iudicatoriis, cum an-

Vomit.
malus.

Hippocratis Liber I.

Sopor.
Ignorantia.
Oblivio.

Oculi di-
stortio.

Qui cito
moriuntur.
Collidolor
pessimus.

Perfrigera
tio.

Pernicies
fœminarū.

xietudine, absque sudore perfrigerantur, malum est: Et quæ D
ex his insuper riguerint, mala sunt. Vomitus meraci, an-
xiosi, mali. Somnus num ubique malus est. Ignorantia cum
rigore, malum. Malum item obliuio. Perfrigerationes ex
rigore non recalescentes, malæ sunt. Sudantes ex perfrige-
ratione recalescentes, malum. In his ardor dolorosus in late-
ribus, & insuper rigere, malum est. Aestuarii rigores aliqua-
tenus perniciosi: & flammea facies cum sudore in his mala
est: In his posteriorum partium frigiditas, conuulsionem ac-
cerfit. Exudantes vigilantes recalescentes, malum. Ex lum-
borum recurso, oculi distortio malum. Dolor in pectus fir-
matus cum torpore, malus. Hi si insuper febriant, acutè ardē-
tes, moriuntur. Qui nigra reuomunt, cibos auersantur, de-
liri sunt, iuxta pubem parum dolorosi, oculum ferocem aut
clausum habent, eos medicamentis purgare nō oportet. Per-
niciosum enim est: Neque intumescētes, vertiginosos, in le-
uiter vagando deficientes, cibos auersantes, decolores. Ne-
que in febre fractos, si soporosi fuerint. Perniciosum enim
est. Oris ventriculi dolor, cum præcordio distento, & ca-
pitis dolor, malignum, & quidpiam anhelosum. Num hi re-
pente moriuntur. velut in Dysodæ. Huic etiam vrinæ vehe-
menter fermentatæ, erant valde rubicundæ. Colli dolor
malum quidē in omni febre, pessimum autem his quibus ti-
mor est vt insaniant. Febres soporosa, lassatoria, caliginosa,
vigilias inducentes, exudantes, malignæ. Horrores frequen-
tes ex dorso, celeriter translabentes, molesti, vrinæ interce-
ptionem dolorosam significant. Qui auxiæ se iactantes, ci-
tra vomitum exacerbantur, male habent. Perfrigeratio cum
duricia signum malum. A ventre tenuia non sentienti pro-
dire, ei qui est apud seipsum, perniciosum: velut Hepatico. F
Vomitones exigui biliosi malæ, tum aliàs, tum si insu-
per vigilauerint ægri. Nasus in his destillans, perniciosum
est. Quibus ex partu alba detinentur cum febre, surditasque
adeft, & in latere dolor acutus, hæc perniciose mente mouen-
tur. In febribus ardentibus subperfrigerantibus, egestio-
nibusque alui biliosis aquosis frequentibus, oculorū distor-
tio signum malum est, tum aliàs, tum si stupore prehensi de-
tineantur. Siderationes repentinæ ei qui exolutè ac diu-
tinè insuper febriit, perniciosæ sunt: quale quiddā passus est
Numenij

A Numenij filius. Ex lumborum dolore ad os ventriculi recursiones, febriculosa, horrida, reuomentes aquosa tenuia multa, mente mota, voce destituta, nigrorum vomitu facto moriuntur. Oculi confractio in morbo acuto mala. Num anxiae se iactantibus citra vomitum, lumbos dolentibus, si ferociter mente moti fuerint, spes est ut nigra per aluum prodeant? Fauces dolorosa, graciles, cum aegre tolerabili molestia, strangulatoria, perniciose acutè. Quibus spiritus retrahitur, vox autem strangulatoria est, & vertebra intro consideret, his in fine velut contrahente quodam spiritus fit. Caput dolentes, & stupore detenti delirantes, alio intercepta, oculum ferocem præ se ferentes, florescentes, opisthotono posteriorum partium conuulsoria distentione corripuntur.

Numenius.

Oculi confractio.

Dolor faucium.

Capitis dolor.

B In oculorum distortionem, febriculoso, lassato, rigor perniciosus. Et soporosi in his, malum. In febribus ad præcordium dolores, sine voce, si sudore non soluantur, maligni sunt. His dolores ad coxas, una cum febre ardente, & si aluus aceruatim eruperit, perniciosum. Quibus voces cum febribus deficientes post iudicationem, hi tremantes ac soporosi moriuntur. Quibus affectiones ardentes, fatuitatem inducentes, stuporis detentionem inferentes, præcordia variantia, & ventris tumor, cibis interceptis, in sudoribus: Num his turbidus spiritus, & genitura simile quid superueniens, singultum indicat? Sed & aluus spumosa, biliosa, insuper egerit? Splendidum in his mictum prodest. Venter autem his insuper turbatur. Quibus sopor fit spumosis prodeuntibus, his febris exacerbat acuta. Ex capitis dolore vocis interceptiones si sint, cum sudoribus febriculosi laxantur in seipsos, fiuntque morbi reuertentes diutius durantes, His insuper rigere, non malum est. Manus tremula, caput dolentes, collum dolentes, subfurdi, mingentes nigra densata: quibus hæc sunt, his nigra ventura esse expectare oportet, perniciosum. Vocis interceptiones cum exolutione, stupore detinente, perniciose. Lateris dolor, ex sputis biliosis, citra rationem si euauerit, mente mouentur.

Oculorum distortio.

Præcordiorum dolor.

Manus tremula.

Lateris dolor.

Ex colli dolore, soporoso, sudanti, aluus inflata, si sanè ad necessitatem liquida demiserit, infuso immisso sublata: ex his ea quæ biliosa non sunt supprimuntur. Talia verò si seruentur retenta, longius ægrotat. Num itaque pro

Cervicis dolor cum sudore.

Hippocratis Liber I.

que proluuia quæ biliosa non sunt, meliora sunt? & flatuo- **D**
 so tumori profuerint? Alui circumtensio, ad necessita-
 tem liquida demittens, cito intumescens, habet quid con-
 uulsorium, velut etiam Aspasij filio. Superrigere his perni-
 ciosum. Ex his conuulsus factus ac inflatus, vbi diutius agro-
 tasset, ori putrefactio viridis superuenit. Quibus circa lum-
 borū **Lumborū** **mala.** tenues diuturni dolores, ad præcordium se reuoluentes,
 & ciborum fastidium inducētes vnà cum febre: his ad caput
 dolor intentus progressus, repente conuulsorio modo occi-
 dit. Affectiones insuper rigentes, & quæ ad noctem ali-
 quāto magis exacerbantur, cum vigiliis, & delirio in som-
 nis, aliquando vrinas inuoluntariè emittentes, in conuulsio-
 nes soporosas desinunt. A principio exudantes vrinis con- **E**
 coctis, ardentes qui citra iudicationem perfrigerantur, bre-
 ui circum circa ardentes: Torpidi item, soporosi, conuulsi,
 perniciosè affecti sunt. Vrerum gerentibus capitis dolores,
 Capitis do- **lor graui-** **Capitis do-** **lor graui-**
dis perni- **dis perni-**
ciosus. **ciosus.** **ciosus.** **ciosus.** **ciosus.** **ciosus.** **ciosus.** **ciosus.**
 soporosi, cum grauitate fientes, mali sunt. Fortassis autē his
 etiam conuulsorium quid pati contingit. In faucibus gra-
 cilibus dolores strangulatorij, habent quid conuulsorium,
 tum aliàs, tū à capite oborti, Velut etiam Thrasynontis con-
 sobrinæ. Tremores conuulsorij fientes in sudoribus, reuer-
 ti solent. Iudicatio his fit vbi superriguerint. Superrigent hi
 ardore circa ventrem prouocati. Lumborum dolor, & ca-
 pitis dolor, & oris ventriculi dolor, cum excreatione violen-
 ta, conuulsorium quid habet. A ventre subliuida, turbulen-
 ta: & lotia tenuia ac aquosa, suspecta. Fauces exasperatæ **F**
 parum, & venter murmurans inanibus ad egerendum surre-
 ctionibus, & frontis dolores, & palpantes, delassati, in stragu-
 lis ac vestimentis dolorosi. Quæ ex his augentur, difficilia
 sunt. Somnus multus in his conuulsorius, & dolores in fron-
 tem graues, & mictio difficilis. Vrinæ suppressio quibus
 rigores, & in conuulsoriis affectionibus: velut & ipsa vbi in-
 horruit, sudauit. Meracæ desinentes purgationes, omni-
 bus quidem exacerbatoriæ sunt. His verò etiā valde. Ex ta-
 libus etiam circa aurem abscessus exurgunt. Turbulentæ
 ferocissimæ è somno excitationes, cōuulsoriæ sunt tum aliàs
 tum cum sudore. Et colli, & dorsi perfrigerationes appa-
 rentes, sed & per totū corpus: In his etiā spumosa mictio-
 nes, vnà cum animi deliquio, & oculorum obscuratio, cōuul-
 sionem

- A** sionem propè adesse significant. Cubiti ac colli dolores conuulsorij. A facie autem hi. In faucibus sonitus frequentes, cū saluę sputatione. In his in somnis sudores, boni. Num & sudore leuari, plurimis non malum est? Dolores ad infernas partes, his toleratu faciles. In febribus exudantes caput dolentes, aluo intercepta, conuulsi fiunt. Subfriabiles liquidæ alui egestionēs, perfrigeratēs non sine febre, malæ sunt. Rigores ex his vesicam & ventrem occupantes, dolorosi. Proinde soporem his habere aliquid conuulsorij, non sanè mirum apud me fuerit. Quæ in acutis vomitorio modo trahuntur, mala sunt. Et albæ alui egestionēs, difficiles, Non viscosa ex his progressa, cum multo ardore ad mentis emotionem perueniunt. Num ex his soporosi torpidi fiunt? Morbi ex talibus diutius durant. Num circa iudicationem hi arescentes difficile spirantes? Quæ ex lumbis ad collum ac caput progressa sunt, & levis syderationis modo resolverunt, conuulsoria fiunt & mentem emouentia. Num & soluantur talia cōuulsione? Ex talibus variè ægrotant, & per eadem progressi. Conuulsiones in his quæ ab vtero strangulantur sine febre, faciles sunt, velut etiam Dorcadi. Vesica intercepta tum aliàs, tum cū capitis dolore, habet quid conuulsorium. Quæ in his cum torpore exoluuntur, difficilia sunt, non tamen perniciofa. Num id quod tale est, etiam mentem emouet? Num & ossium circa tempora dissectiones, conuulsionem accersunt? aut si quis ebrius verberetur, aut sanguis multus effluat in principiis, non hoc facit conuulsionem? In sudore sputa defluentia febricitanti, leuia sunt. Num ad dies aliquot alui humectantur? arbitror. Num his ad articulos abscessus fiet? Quæ modicè ferociter mentem emouent, atrabiliaria sunt. Si verò à muliebrium purgationum retentione fuerint, ferina. Hæc verò sæpius accidunt. Num & cōuulsæ fiunt hæ? Num & vocis interceptiones cū sopore, conuulsoriæ sunt? velut coriarij filia, quæ muliebris purgationibus præsentibus affici cœpit. Quibus conuulsis oculi intentè relucēt, neque apud seipsos sunt, & diutius ægrotant. Sanguinis eruptiones ex contrario, malæ sunt: velut in splene magno si ex dextra nare fluat. Et circa præcordia eodem modo res se habet. Verùm cum sudore hoc peius est. Ex naribus erumpente sanguine, cum exiguis sudoribus,

duobus, perfrigescentia maligna ac praua. Post sanguinis **D**
 eruptionē, nigrorum per aluum transi, us, malus. Praua sunt
 etiam valde rubra. Num verò quarto die hæc sanguinis eru-
 ptio contingit? Soporosi ex his conuulsione moriuntur.
 Num nigris prægressis, & ventre tumefacto? Vulnera san-
 guinem fundentia, exudantia, maligna. Sic affecti loquen-
 tes latenter moriuntur, Post modicam sanguinis eruptio-
 nem, & nigrorum egestionem, in acutis surditas malum.

Sanguinis egestio in his perniciofa. Verum surditatem
 soluit. Lumbis dolentibus oris ventriculi dolores acceden-
 tes, signa hæmorrhidum fluxionis futuræ sunt, Atbitror a u-
 rem & hos prægressæ hæmorrhoidum eruptionis signum
 esse. Sanguinis eiruptionem statis temporibus fientes, siticu- **E**
 losæ, difficiles ac exoluentes, si sanguinem non effuderint,
 in comitalem morbum finiunt. Morbi qui statim turbu-
 lenti sunt, insomnes, sanguinem de naribus stillantes, sexta
 die alleuati, noctu afflixaerunt, postridie exudarunt, in som-
 numque delati mentem emouerunt, hi largè sanguinē fun-
 dent. Num & aquosa vrina tale quid significat? Quibus san-
 guinis eruptiones plures, his temporis progressu alui malè
 afficiuntur, si non vrinæ concoctæ fuerint. In iudicato-
 riis perfrigerationibus, sanguinis eruptiones fortes pessi-
 mæ sunt. Capite grauati, iuxta sinciput dolentes, insom-
 nes sanguinē profundunt, tum aliàs, tum si quid ad collum
 contēdat. Vigiliis infestati, derepente cum inquieta ia-
 ctatione, sanguinem fundunt, tum aliàs, tum si quid antea **F**
 perfluxerit. Num vbi inhorruerunt? Colli dolores, oculi
 valde rubicundi, sanguinis eruptionem significant. Qui-
 bus aluo suppressa sanguinis eruptio fit, & insuper rigent,
 Num aluus intestinorum leuitate corripitur, & obdura fit,
 aut ascarides insunt, aut vtrunque? Quibus ex lumbis re-
 cursus fit ad caput, & manus, hi stupidi, os ventriculi dolen-
 tes, saniosis ac serosis humoribus pleni, largè sanguinē pro-
 fundunt. Sed & aluus his turbulentis erumpit. Quibus ex
 sanguinis eruptione larga ac frequēti, nigrorum multorum
 sit egestio, hi suppressa aliud dolorosi sanguinē profundunt.
 Cum quadā verò fluxione, facillè ferunt. Numhi multos fri-
 gidos sudores excludunt? Conturbata in his vrina non ma-
 la, neque id quod genituræ simile in ipsa residet. Verum fre-
 quenter

A quenter hi aquosa mingunt. Quibus in surditate & torpore parua est à naribus destillatio, ea habet quid difficultatis. Vomitus his confert, & alui perturbatio. Quibus ex rigore febres cum lassitudine, his menses muliebres decurrunt. At collum in his dolorosum, sanguinis eruptionis è naribus signum est. Et per nares sanguinem effundere spes est, ea quæ caput concutiunt: Et quæ aurium sonitum faciunt, sanguinem profundunt, aut menses deducunt, tum aliàs, tum si iuxta spinam ardor consequetur. Fortassis autem & dysenteriam facient. Et circa ventrem palpitationes cum præcordij intensiōe sublonga ac tumentē, sanguinis eruptionem significant. Inhorrescunt autem hi. Quæ larga, violenta, multa ex naribus fluxerint, aliquando ad conuulsiones adducunt.

B Venæ sectio soluit. Frequentes & paulatim fientes ad egerendum surrectiones, subflauæ, viscosæ, modica stercoracea habētes, cum præcordiis ac lateris dolore, morbo regio participant. Num autem his suppressis hi exoluuntur? arbitror sanè, & sanguinem profundunt? His tensio lumborū, & dolores in his, sanguinis eruptionem significant. Præcordij tensio, cum capitis grauitate ac surditate, & quæ ad hæc consequenter diuexant, sanguinis eruptionem indicant. Undecimo die sanguinis stillicidia difficilia, tum aliàs, tum si superstillauerint. Qui in horroribus simul iudicatoriè exudarunt, postridie verò postquam inhorruerunt præter rationem vigilant, eos sanguinem effusuros esse arbitror. Quibus ab initio largæ sanguinis eruptiones, rigor fluxionem sistit. Ex sanguinis eruptione, rigores longi. Quibus capitis dolores, ac colli dolores, & totius corporis impotentia quædam, sanguinis eruptiones soluunt. Sed è tempore sic soluuntur. Vrinæ quæ in his qui iuxta aures abscessus habent, citò & modicè concoquuntur, malæ sunt. Et perfrigerari hoc modo malum est. Subsoporati, morbo regio affecti, non valde sentientes, quibus singultus, his aluus erumpit, fortassis & suppressa est. Hi exoluuntur. Num his etiam abscessus iuxta aures fiunt? Suppressæ cum rigore urinx malæ, tum aliàs, tum si antea sopor apprehenderit. Num iuxta aures abscessus parotides dictos, in his fore spes est? Ex torminoso subsidencia limosa subliuida, mala est. Num ex præcordiis dolet puto dexterum? & exoluitur? Num abscessus

iuxta

Hippocratis Liber I.

iuxta aures talib⁹ parū dolorosi? Aluus erūpens his in omni-
 bus pernicioſa eſt. In anxioſis quibuſdā vigiliis abſceſſus cir-
 ca aures maximè. Ex voluulis graueolētibus, in febre acuta,
 præcordiis ſublimibus diutius permanētibus, abſceſſus cir-
 ca aures oborti occidūt. Ex ſurditate leniter abſceſſus circa
 aures fiūt, tum aliàs, tū ſi anxioſum quippiā ſuccedat, & ſopo-
 roſi: inter hos adhuc magis. Abſceſſus iuxta aures leniter ſy-
 deratis mali ſunt. Quæ cōuulſorio modo exacerbātur, cū ſtu-
 poris detētionē, abſceſſus iuxta aures producūt. Cōuulſio, tre-
 mor, anxietas, cū ſtuporis detentione paruos circa aures abſ-
 ceſſus exacerbant. Num quibus abſceſſus ſunt iuxta aures, ca-
 pitis dolore affecti ſunt? Num & ſupernis partib⁹ exudāt, nū
 inſuper rigēt quoq; aliquo modo? Deinde & aluus erūpit, & E
 ſoporofum quippiā habēt? Num & aquoſæ vrinæ alba inna-
 tantia habentes, & quæ variè exalbidæ ſunt, ac fœtidæ, abſ-
 ceſſus iuxta aures faciūt? Num quibus tales vrinæ, frequētes
 ſanguinis è naribus ſtillæ profluunt? num & lingua his leuis
 eſt? Quibus magnū & frequentem ſpiritū habentibus, mor-
 bus regius, & febres acutæ cum præcordiis duris perfrigera-
 tæ ſunt, num his abſceſſus magni ad aures conſiſtunt? So-
 poroſa, anxioſa, præcordia dolentia, vomitoria parua ſym-
 ptomata. In his abſceſſus iuxta aures oboriūtur. Antea verò
 & ea quæ circa faciem fiunt. Aluo nigra ſtercorea egerente,
 ſopor inſuper apparēs, abſceſſum iuxta aures producit. Tuſ-
 ficulæ quæ ſunt cum ſputatione abſceſſum circa aurē ſubmo-
 uent. In capitis dolore ſopor & ſurditas, circa aurem abſceſ-
 ſum aliquem eructat. Præcordij diſtentio cum ſopore an-
 xioſo, ac capitis dolore, abſceſſus circa aurem attollit. Dolo-
 roſi aurium abſceſſus, citra iudicationē diſſipati, mali ſunt.

Tuſſicula
 aurium ab-
 ſceſſus mol-
 lit.

H I P P O C R A T I S C O I P R A E D I C T I O N V M L I B E R I I . I A N O C O R N A R I O M E D I C O P H Y S I C O

interprete.

*

Medicor

Prædictionum.

413

A



Edicorum prædictiones narrantur multæ, & variæ, & admirandæ, quales ego quidem neque ipse prædixi, neque alium aliquem prædicere audiui. Sunt autem aliquæ ex ipsis huiusmodi. Hominem perniciose affectum esse, & medico ipsum curanti, & aliis videri. Verum medicum alterum superuenisse ac dixisse, Non peribit hic homo, verum cæcus euadet. Item ad alium qui omnino malè habere videbatur, ingressum prædixisse, hominem quidem euasurum esse, verum manum claudam habiturum, & ad alium quendam qui similiter superstes, fore non putabatur, dixisse, ipsum quidem sanum fore, verum pedum digitos nigrefactos putrefactione corrumpendos esse. Et aliæ huiusmodi prædictiones in tali prædictionis specie dicuntur. Alius autem prædictionis modus est, ementibus ac negotiationes tractantibus prædicere, aliis mortem, aliis insaniam, aliis alios morbos: & ad hæc omnia, etiam ea quæ prioribus temporibus facta sunt, prædicere, ac omnia vera narrare. Alia porro adhuc forma prædictionum est, athletas & eos qui morborum causa exercentur ac se fatigant cognoscere, si quid aut circa cibum deliquerint, aut alteratum quippiam ederint, aut potu vberiore vsti fuerint, aut deambulationem intermiserint, aut res venereas quasdam exercuerint. Horum omnium nihil illos latet, adeo ut etiam minima quæque, in quibus non paruerit homo, exactè cognoscant. Hi omnes prædictionum modi esse feruntur. Ego verò talia quidem non vaticinabor, Verum signa scribam, ex quibus & sanos futuros homines, & morituros coniectare oportet: & tum breui tempore, tum longiore, sanos futuros, aut perituros. Scriptum est autem à me & de abscessibus, quomodo singulos considerare conueniat. Arbitror autem & eos qui de claudicationibus prædixerunt, aliisque eiusmodi, confirmato iam morbo prædixisse, & quum iam manifestum esset, quod abscessus non esset recursurus, si modo intelligentiam habuerunt: multò sanè magis quàm priusquam abscessus fieri inciperet. Spero item & alia prædixisse, magis humano more quàm refertur, quæ videlicet ementibus & negotiationes tractantibus prædixisse dicuntur.

Gg

tur

Hippocratis Liber I I.

Per hæc
exempla hæc
confirmat.

Prædictio
de mariscis

parcius
prædictio.

tur mortes, & morbos, & infanias. Atque hæc mihi videntur **D**
talia facta esse, & nulla mihi videtur esse difficultas prædi-
cendi, si quis circa talia studium ac curâ adhibere velit. Pri-
mum etenim aqua inter cutem laborantes, & tabidos, quis
non cognouerit? Deinde deliraturi non diu latere possunt, si
quis nouerit quibus his morbus cognatus est, aut prius ali-
quando insanuerunt. Si enim hi homines ebriosi fuerint,
aut carnes vorauerint, aut vigilauerint, aut in frigore aut ca-
lore inconsideratè versati fuerint, multus timor est ex tali
victus ratione, ipsos deliraturos esse. Et eos qui hæmorrhoi-
das habent, si quis hyeme multo potu uti viderit, & bono
colore præditos, de his prædicere licet, quòd ad ver multa **E**
spes sit sanguinis eruptionis, ut & decolores & aquatici sub
æstatem fiant. Verum omnia hæc addiscere, ac prædicere
oportet, si quis in talibus studiis palmam ferre expetat. Li-
cet enim ex scriptis prædicere, & mortem, & infaniam, &
bonam habitudinem. Possem autem referre & alia mul-
ta huiusmodi, sed quæ facilima cognitu sunt, visum est mi-
hi scribere. Consulo autem ut quàm prudentissimè agant,
tum in reliqua arte, tum in huiusmodi prædictionibus, il-
lius probè memores, quòd si cui successerit prædictio, is a-
pud ægrotum intelligentia præditum in admiratione fue-
rit. Si verò quis aberrarit, supra hoc quod odio habetur,
fortasse etiam insanire videbitur. Quapropter iubeo ut tū
alias omnes, tum has prædictiones prudenter faciant: quan- **F**
quam sanè & audiam, & videam, neque iudicare rectè ho-
mines ea quæ dicuntur, ac fiunt in arte, neque narrare.

Ceterum de his quæ exercentur ac laboribus se fatigant,
eas asseuerationes quas asserunt hi qui ipsas asserunt, neque
esse puto, neque si quis putat, prohibeo. A nullo enim si-
gno, neque bono, neque malo, læduntur suspensiones, cui si-
gno fide habita quis sciat, an rectè pronunciatum sit, aut se-
cus: alioqui per me licet ut si quis velit credat. Non enim
ego impedimento sum. Arbitror autem si quid veri ab ipsis
dicitur, aut his qui de his qui exercentur, asseuerant, aut
illis cui prius scripti sunt: primum quidem hunc qui cogno-
uit, ex signis coniectasse. Deinde verò ambiguè & humano
more prædixisse: & simul eos qui id narrant, monstrosius
quàm factum fuit recensere. Nam neque in morbis facile est
peccata

Prædictionum.

414

A peccata cognoscere, etiam si decumbant homines, & victu pa-
rum nutriente utantur, ut non adeo multa intueri opus sit Diversitas
languentium
eum qui hæc considerandi curam suscepit. Alij enim bibunt
solum. Alij ad hoc quod bibunt, aut sorbitionem, aut cibum
paucissimum assumunt. Necesse igitur est eos qui vberiore
potu uti sunt, magis difficulter spirare, & plus urinae eiicere,
Eos vero qui sorbitionem aut cibum auxerunt, magis & siti-
re, & febrere. Si vero quis utrisque, & potu & cibo, immodi-
ce usus fuerit, ad hoc quod febrit, & difficulter spirat, etiam
ventrem circumtentum & maiorem habebit. Licet porro &
hæc, & alia omnia experimentis optime explorare, quæ &
habemus, & omnibus recte utimur. Varia ob-
servatio. **B** Primùm equidem & in-
telligentia, & oculis cognoscere facile est, hominem in eo-
dem loco decumbentem, & exacta victus ratione utentem,
si non paruerit, aut obambulando, aut multa edendo. Dein-
de qui manibus contrectavit ventrem ac venas, minus falli
potest, quam qui non contrectavit. Et nares in febrienti-
bus quidem, & multa & bene significant. Odores enim mul-
tum inter se differunt. At vero insanis & recto victu uten-
tibus, haud scio qua re vel in hoc experimento faciendo uti
possim. Postea audiendo, vocem & spiritum auribus co-
gnoscere datur, quæ in sanis non similiter sunt manifesta,
sed qualiter etiam antea. Quod si etiam mores morbo-
rum ac ægrotorum didicerit medicus, non tamè quicquam Quando
non prædi-
cendum. prædicere oportet. Non enim difficilius spirabit homo,
C morbo adhuc errante, & febriet acutiore febre, & venter
intentus fuerit. Quare propter hæc non tutum est prædica-
re priusquam statum accipiat morbus. Verùm post hoc tem-
pus, quicquid præter rationem acciderit, dicere oportet.
Manifesta rerò sunt mala, quæ propter ægri inobedientiam
sunt. Nam & spirandi difficultates, & alia huiusmodi po-
stridie sedabuntur, si ob peccatum fiant. Si igitur quis hanc
iudicationem considerans dixerit, non delinquet. Atque
ego quidem hunc considerandi modum nunc consulo, tum Modus ob-
servationis
qui, de his qui domi manent, tum de his qui exercentur, itém-
que de aliis omnibus, qualia peccata committant. At exa-
ctam illam narrantes rationem & audio, & derideo. Quum
enim parum inobedientes fuerint homines, haud scio quo-
modo id deprehendere possim. Si vero maiora fuerint pec-
cata,

Gg 2

Hippocratis Liber I I.

cata, quem in modum considerare oporteat, scribam. Oportet autem primum hominem, in quo quis per inobedientiam admissa cognoscere velit, per totum diem intueri, & in eodem loco, & eadem hora, sole praesertim recens orto, hoc enim tempore subeuacuatus fuerit, & adhuc ieiunus est, & nullo labore fatigatus est, praeterquam matutinis deambulationibus, in quibus minimè inobediens est, si sanè ubi de somno surrexit homo, ad deambulandum prodierit. Quare necesse est eum qui iusta victus ratione utitur, hac hora maximè aequaliter habere, & coloris, & totius corporis constitutionem.

Quae praeter ceteris obferuentur. Quapropter & is qui huius considerationis curam gerit, acutissimus fuerit & mente, & oculis, eo tempore. Contemplari praeterea oportet hominis mentem, & mores, & corporis vires. Alij enim alia facilius aut difficilius imperata faciunt. Primum igitur is cui inedia imperata est, si plura comederit & biberit, per haec manifestus fiet, & tumidius corpus ipsius apparebit, & plenius ac coloratius erit, si non excrementa alui malè ipsi processerint. Erit item animosior ad ferendum laborem. Considerandum etiam an ructum edat, aut à flatibus vrgeatur. Haec enim fieri solent his qui ita affecti sunt, propter hoc peccatum. Si verò dum edere multa cogitur, & fortiter laborare, aut cibum imperatum non ederit, aut ebrius factus fuerit, aut à cœna larga non obambulauerit, hoc modo explorare oportet. Si quidem cœnam non ederit, solito autem more deambulauerit, iucundiores aspectum praeseferet, & vegetior ac operosior in exercitiis erit. Verùm alui egestio modica & compacta maximè in hoc fuerit. Si verò cœna sumpta non deambulauerit, ructum utique edet, & flatuosus fuerit, & plenitudo non minor apparebit, & inter laborandum magis quam antea sudabit, & difficulter spirabit, ac grauis erit, & transitus alui maiores, ac minus viscosi his fuerint. Quòd si neque cibum consumpserit, neque deambulauerit, pigrior utique fuerit ac tumidior. Si verò ebrius factus fuerit, sudabit magis quam antea, & difficulter spirabit, & ipse seipso grauior erit ac humidior. Sed & latior erit, si non caput ipsi affigatur. Quòd si vxore semel usus fuerit, vegetior utique erit, & magis solutus. Si verò saepius rem peregerit, durior euadet, & squallorem quendam habebit, & decoloratior ac magis lassa

**Coitus
quid his fa-
ciat.**

A lassatus erit. Porro egestionem alui procedere oportet his qui laboribus exercentur, quandiu parum ederint, ac parum potauerint, modicas & duras, atque hoc quotidie. Si verò tertio quoque die, aut quarto, aut ex longiore intervallo prodierint, periculum est aut febrim, aut alui profusio corrumpendos esse. Quæcunque verò egestionem liquidiores sunt, quàm ut in transitu conformentur, hæc sanè omnes peiores sunt. At verò his qui multum edunt, & multum laborant, egestionis transitum mollem, oportet esse siccum, & copiam ciborum ingestorum pro ratione laboris. Procedunt autem ab æquali ciborum copia, his quidem qui minimum laborant, plurimæ egestionem, his verò qui plurimum laborant, modicæ, si sani fuerint, & iuxta victus rationem utantur.

Oletum quale omnium esse debeat

B Nam ad hæc coniecturam facere oportet. Liquidiores autem egestionem, & sine febribus fientes, & quæ septima die, aut citius iudicantur, commodæ sunt, si semel una vice omnes fiant, & non reuertantur. Si verò insuper febrierint homines, aut alui profusio redierint, si longa fuerint, penitus mala sunt, siue biliosa fuerint, siue pituitosa, siue cruda: & victus ratione propria, singula opus habent, itémque medicamentis aliis aliis. Cæterum urinam iuxta potionis copiam mingere oportet, & semper æqualem, & quàm maximè aceruatim, & momento paulo crassiorem, quàm id quod in potu acceptum fuit. Si verò fuerit aquosa, & copiosior quàm pro eo quod bibi imperatum est, significat hominem non obedire, sed copiosiore potu uti: Aut non posse renutrir, quàm diu talia urinam faciunt. Si verò paulatim stridat urina, aut medicamentis hominem opus habere significat, aut morbum aliquem circa vesicam habere. At sanguinem mingere, ratio quidè & sine febre ac dolore, nihil mali significat, sed lassitudinum solutio sit. Si verò sæpius mingat, & aliquid ex his accesserit, malum est. Verum prædicere oportet, siue cum dolore mingatur, siue cum febre, fore ut insuper pus mingat, atque ita dolores ac afflictiones quiescant. Crassa verò urina albam subsidentiam habens, aut circa articulos dolorem aliquem, aut tumorem significat. Aliæ verò omnes subsidentia in urinis eorum qui exercentur, à morbis circa vesicam sunt, id quod ipsi manifestum facient. Cum doloribus enim erunt, & tales ut difficulter quis ab ipsis liberari possit. Atque hæc

Lotium quale.

Sanguinis mistio.

Puris mistio.

Crassum lotium.

Hippocratis Liber I I.

Hydropi-
sis.
Phthisis.
podagra.
Morbus
sacer.

Qui Hy-
dropes sa-
nantur.

quidem de his scribo, & huiusmodi alia dico. Cæterum ex D
his qui exactam ac certam prædictionum rationem prædi-
cant, cum aliquibus ipse conuersatus sum, cum aliquorum
verò filiis ac discipulis rem contuli, quorūdam verò scripta
accepi. Quare quum probe sciam qualiter quisque ipsorum
sentiant, & exactas certitudines nusquam compererim, hæc
scribere aggressus sum. At verò de aqua inter cutem, &
tabidis, & podagris, & his qui à morbo sacro appellato cor-
ripiuntur: hæc dico, ex aliqua quidem parte de omnibus idē.
Nam qui hos morbos congenitos habet, is agrē ab ipsis li-
berari potest. Reliqua verò singulatim scribam de singulis.
Eum qui ab hydrope, siue aqua inter cutem correptus est, & E
superstes esse volet, bonis visceribus præditum esse oportet,
ita vt natura se exerat, simulque facile cōcoquat, & bene spi-
ret, sitque sine dolore, & totum corpus æqualiter tepidū ha-
beat, & non circa extremas partes colliquatum. Melius est
autem vt tumores potius habeat in extremis partibus. Opti-
mum verò est neutrum horū habere. Nam molles ac graciles
esse conuenit extremas partes, itēque ventrē ad contactū
mollem. Tussim verò adesse non oportet, neque sitim, neque
linguam resiccare, tum reliquo tempore, tum post somnos,
quando hæc valde fieri solent. At cibos libenter accipere o-
portet, & vbi multum satis comedit, non affligi. Alium ve-
rò ad medicamenta quidem celerem habere, reliquo autem
tempore egerere recrementum molle efformatum. Vrinam F
autem apparere cōuenit, pro studiorum ratione, & vinorum
mutatione transeuntē. Laborem verò ferre oportet facile, &
lassitudinis exortem esse. At optimum quidē est hominē ita
per omnia dispositum esse, & sic securissimē sanus fieri pote-
rit. Sin minus, plurima ex his habeat. Nam spes erit vt super-
stes euadat. Qui verò nihil horum habuerit, sed contraria,
eum desperatum esse scito. Qui autem pauca horum habue-
rit, quæ bona esse dixi, si hydrope laboranti adsint, huic exi-
guæ spes restant. Cui verò multum sanguinis sursum ac
deorsum eruperit, & febris insuper accesserit, eum multa
aqua repletum iri timor est, atque hic hydrops breuissimi
temporis est, & ex quo paucissimi euadunt. Verū de hoc
alteri prius significare oportet. At quibus magni tumores
facti emarcescunt ac rursus attolluntur, hi magis cōualescunt
quàm

Aquàm illi qui ex sanguinis eruptione implètur. Verùm fallunt hi hydropes ipsos ægrotos, faciuntq; vt ipsi à medicis discedant ac pereant. De tabescentibus quod ad sputum actusim attinet, eadem dico quæ de pectore suppuratis scripsi. Phthysicorum bona signa.

Oportet enim eum qui probe liberari volet, facilè sputum per tussim reiicere, & id esse albū, & æquale, & eiusdem coloris, & ab inflammatione alienū. Quod verò à capite defluit ad nares conuerti, febrem autē non inuadere, vt ne à cœnis prohibeatur, neque sitiat. Venter autem egerat quotidie, & id quod egerit sit durum, copia pro ratione ciborum ingestorum. hominem verò quàm minimè tenuem esse oportet. Pectus autem laudare conuenit quadrangulum & hirsutum. & os ipsius paruum sit, & robustè carnosum. Quicumque enim hæc omnia habuerit, maximè superstes erit. Qui verò nihil horū habet, interitui proximus. Quicumq; verò pectore suppurati facti fuerint, dum iuuenes sunt, ex humorum illapsu, aut fistula, aut alio quopiā huiuscemodi, aut ex abscessu recursum, hi nō euadunt, nisi valde multa bona signa ipsis accesserint. Pereunt autem homines hi ad autumnum. Sed & ex aliis morbis longis pleriq; ad hoc tempus maximè moriuntur. Ceterum ex aliis minimè superstites manēt & virgines, & mulieres quibus ex suppressis mensibus tabes oborta est. Quo tēpo-
re hi pereūt

Si verò aliqua virgo, aut mulier euasura est, & aliorum signorum bonorum multa accedere oportet, & menses splendide ac purè apparere, aut nulla spes est. Qui verò ex sanguinis eruptione, pectore suppurati fiunt, & viri, & mulieres, & virgines, non minus euadūt. Verùm signis omnibus tum suppuratorum, tum tabescentium collectis, & superstite futurum, & perituum prædicere oportet. Maximè verò euadunt ex sanguinis eruptione, hi quibus dolores sunt atrabiliarii, & in dorso, & in pectore: & qui post eruptionem minus dolent. Phthisis
mulierum.

Nam & tussēs non valde insuper accedunt, & febres pleræque perseverant, sitim facilè ferētes. At reuersiones eruptionis sanguinis maximè sūt his, si nō abscessus succedāt. Optimi verò sūt abscessus sanguinolentissimi. Quibus autem in pectoribus dolores insunt, & per tempus attenuantur, & tussis fiunt, ac difficulter spirant, neque febribus insuper corripiē- Suppurati.

ribus, neque suppurationibus succedentibus, eos interrogare res. Qui absces-
sus melio-
res.

oportet, quum tussiant, & difficulter spirent, an & compa-

Hippocratis Liber I I.

Podagra.

Sacer mor-
bus.

Comitialis
fenes tollit
ferè.

A clauda facta est, citra aliam causam: his omnibus morbum antea factum fuisse, scire oportet, præ his vniuersis. Et plurimi qui pueros educant, si interrogentur confitebuntur: quosdam verò etiam res latet, negantque se scire quicquam tale factum esse. Qui porro de vlceribus cognoscere volet, quomodo singula finient, eum primum hominum species perscrutari oportet, tum eas quæ meliores sunt ad vlcera, tum quæ deteriores. Deinde ætates nosse, in quibus singula vlcera curatu difficilia existunt. Locos item in corporibus perspectos habere, quantum alij ab aliis differunt. Sed & alia qualia in singulis accedunt tum bona, tum mala, nosse oportet. Si quis enim omnia hæc nouerit, is sanè sciet etiā quomodo singulorum **Quæ ad vlcera faciēda. Aetatu & locoru differentia.**

B euentus continget. Qui verò non nouerit hæc non nosse poterit quales fines vlcerum erunt. Species equidem bonæ sunt hæ, Leues, & commodatæ, & bonis visceribus præditæ, & neque valde carnosæ, neque duræ. Iuxta colorem verò sit species alba aut nigra, aut rubens. Hæ enim omnes bonæ sunt, si puræ sunt. Si verò pallidus color ammixtus fuerit, aut color ipse pallidus aut liuidus fuerit, peius est. Species verò quæ præscriptis contrariæ sunt, eas deteriores esse scito. At verò quod ad ætates attinet, tubercula quidem suppurata fiunt, & strumosa hæc plurimos pueros occupant, & facillimè ex ipsis liberantur. Senioribus verò pueris & adolescentibus, minus quidem oriuntur, verum difficilior ab ipsis liberantur. Viris autem talia quidem tubercula non valde fiunt, verum, cæria **Quæ hominu species & qui colores probi.**

C Græcis dicta, ad modum faui cœcreta, horrenda: & cancri occulti submersi, & ex pustulis nocturnis herpes, donec sexaginta annos transmiserint. Senibus autem nihil talium tuberculorum accedit, verum cæcri & occulti, & summas partes occupantes, & cœmoriuntur. Cæterum ex locis subalares difficilior curatu sunt, & laterum mollitudines, ac femora. Nam & **Struma.**

mora in ipsis sunt, & recidiua. Ex articulis periculo maxime obnoxij sunt magni digiti, & præsertim pedum. Quibus autem in obliqua linguæ parte vlcus sit diuturnum, in his dentes considerare oportet, an quis iuxta illam vlcis partem acutior sit. Vulnere magis lethalia sunt, quæ in venas crassas in collo ac inguinibus infliguntur. Deinde quæ in cerebrum, & **Herpetes.**

in hepar. Postea quæ in intestinum & vesicam. Sunt autem hæc omnia perniciofa valde, non tamen ita ut nemo ex his **Loca saucia curata difficilia.**

Vulnera lethalia sunt.

euadat, velut putatur. Nam & loci qui hæc nomina habent, **D** multum inter se differunt, & iidem modi. Multū etiā differt corporis ipsius hominis structura. Aliquando enim neq; febricitat, neque inflammatur sauciatus. Aliquando etiam citra causam febricitat, & aliqua corporis pars omnino inflammatur. At quādo is qui vlcus habet, delirat, & facile fert vulnus, tunc vulnus aggredi oportet, velut iuxta medicinæ & accedentium rationem, euentum habiturum. Moriuntur enim homines ab omnis generis vulneribus. Multæ enim venæ sunt & tenues, & crassæ, quæ sanguinem fundentes occidunt, si gliscere ac eo ferri ipsas contigerit, quas alia temporis occasione si quis pertundat, corporibus prodesse sentiat. Multa verò vulnera in locis vilibus ac non malis esse, & **E** nulla re grauiā videntur, & tamē sic dolore affligit plaga, vt respirare non possit. Alij verò præ vulneris dolore, quod sanē graue nulla re erat, spiritū quidem duxerunt, verū de lirarunt, & febrientes mortui sunt. Quicunq; enim aut corpus febricitans habent, aut mentem turbatam, talia patiuntur. Sed neq; hæc admirari oportet, neq; formidare, illud expendendo, quod & animæ & corpora hominum plurimum differunt, & vim maximam habent. Quæcunque igitur vulnera tempus nanciscuntur, aut corpus & mētem huiusmodi aut ita gliscentem sanguinē, aut magnitudine tanta fuerint, vt homo ad curationem adduci ab eius contemptu non possit, ab his quidem discedere oportet, qualia eunq; tādē fuerint, diariis animi deliquiis exceptis: alia verò omnia ag- **F** gredi, quæ recēs sunt incussa, quo & febres effugiāt homines, & sanguinis eruptiones, & nomas vlcerum proserpentes, hi qui euadent. Exactissimē verò & ad plurimum tempus, eorum quæ grauissima sunt custodiam facere oportet. Nam ita facere iustū est. At verò nomæ lethalissimæ sunt, quarū putredines profundissimæ & nigerrimæ ac siccissimæ existūt. Præuæ etiam sunt ac periculosæ, quæ nigram saniem remittunt. Albæ verò ac mucosæ putredines, minus quidem occidunt, magis autē reuertuntur, & diuturniores sunt. Herpetes autem minimē omnium vlcerum quæ depascendo proserpūt, periculosi sunt. verū maximē difficulter submoueri possunt, quemadmodū canceri occulti. In omnibus autem talibus febrem superuenire vna die confert, & pus quā albis-
simum.

Quæ vulne-
ra curāda.

Nomæque
malæ sint.

Herpetes
quæ malæ
non sint.

A limum ac crassissimū. Cōmodat & corruptio nerui, aut etiā
 ossis, aut etiā amborū, tum in profundis, tum in nigris putre-
 dinibus. Nam in corruptionibus pus multū fluit, & putredi-
 nes soluit. Porro ex capitis vulneribus lethalissima sunt **Capitis vul-**
 quæ ad cerebrum pertingunt. velut etiā antea scriptum est. **nera.**
 Grauius sunt & huiusmodi omnia, os nudum magnum, os in-
 farctum, os diffractum. Si verò etiā osculum vlcis paruum
 fuerit, fissura verò ossis aliquandiu permāserit periculosius **Quid in his**
 est. Hæc autē omnia grauiora sunt, si & iuxta futurā sunt, & **petendum.**
 ex locis semper periculosiores summi in capite existāt. Cæte-
 rū in omnibus memorabilibus vulneribus interrogare oportet,
 si adhuc recētes fuerint plagæ, aut etiā iactus fuerint, an
B conciderit homo, aut an in soporem altiorē collapsus sit. Si
 enim horum quippiā factum fuerit, amplius custodia opus
 habet, nimirum quum cerebrū vulnus tunc perceperit. Si ve-
 rò nō recens sauciatus fuerit, ad alia signa respicere oportet, **Quæ in his**
 ac consilium capere. Optimum quidē igitur est, neque feбри- **conferant**
 re eum qui vlcus in capite habet, neque sanguinem insuper **vel contra.**
 ipsi erupisse, neque inflammationem, neque simul vllum ali-
 quem dolorem accessisse. Si verò quid horum apparuerit, se-
 curissimum est vt in principio fiat, & modico tēpore perma-
 neat. Conducit autem in doloribus, etiam inflammatione ex
 vlceribus accedere. In sanguinis autem eruptionibus, pus in
 venis apparere. Quæ verò in acutis morbis cōferre febribus
 scripsi, ea etiam in his fieri conducit, & eadē hic quoq; bona
C esse assero, contraria verò mala. At incipere febrē in capitis
 vulnere quarta die aut septima, aut vndecima, valde lethale
 est. Iudicatur autem plerisque, si quidem quarta vulneris die
 febris inceperit ad vndecimā. Si verò septima die febris in-
 choarit, ad decimam quartam, aut decimam septimam. Si ve-
 rò vndecimo febrē inceperit, ad vigesimam, quemadmo-
 dum in febribus descriptum est, quæ absque manifestis cau-
 sis fiunt. Cæterum in principiis febrium, siue delirium ac-
 cesserit, siue alicuius membri sideratio, periturum hominē
 sciendū est, si nō omnino aut ex optimis signis aliquod acce-
 dat, aut corporis vires adsint. Verū considerabis modū. Nam
 homini adhuc spes salutis, sed claudū fieri articulū in quem **Clauda læ-**
 incubuit necesse est, etiam si superstes maneat homo. Por- **siue quī**
 rō vulnera in articulis, quæ quidem magna sunt, & nervos **membra**
coniun-

Hippocratis Liber I I.

Vulneris observatio. coniungentes penitus præsecant, clarum est quòd claudos efficiant. Si verò ambiguum fuerit de nervis, quomodo se habeant, si quidẽ fuerit acutum telum quod rectũ vulnus fecit, melius est obliquo. Si verò graue & obtusum fuerit id quod vulneravit, nihil refert. Sed plagæ profunditatẽ & alia signa considerare licebit. Sunt autem hæc. Pus si insuper accedat ad articulum, duriores fieri necesse est. Si verò etiam tumores simul permanferint, hunc locum ad multum tempus durum esse necesse est, & quum sanum iam est vlcus, tumorem permanere necessarium est, simulque flecti ac extendi, quæcunque dum articulus incuruus est, curantur. Quibus verò etiam nervus elapsurus esse videtur, securius de claudicatione prædicere licet, tum aliàs, tum si inferiorũ neruorum aliquis fuerit exolutus. Ex his autẽ cognosces neruum qui excidet. Pus album & crassum, multo tẽpore defluit, dolorẽque ac inflammationes circa articulũ in principiis fiunt. Eadem fiunt etiam si os elabetur. At verò dissectiones in cubiti gibbis, præsertim quæ sunt cum inflammatione, ad supurationem perueniunt, sectionesque ac vstiones. **Medulla tergi affe- & signa.** verò spinæ si ægrotarit, siue ex lapsu, siue ex alia aliqua causa, siue sua sponte, homo & cruribus impotens fit, vt neque si tangatur percipiat, & vêtre ac vesica, vt circa prima tempora, neque stercus, neque vrinam egerat, nisi ad necessitatem. Quum autem vetustior factus fuerit morbus, nõ vrgente homine, & stercus prodit, & vrina. Moritur autem postea, non **F**
Fauces cruentæ. multo interposito tempore. Quòd si verò cuiusdam fauces implentur sanguine sæpe singulis diebus ac noctibus, cui neque caput antea doluit, & qui neque tussim habuit, neque vomuit, neque febre correptus fuit, neque dolorem habuit, nec pectoris, nec dorfi, huius considerandæ sunt nares, & fauces, an vlcus aliquod habere compareat in hoc loco, aut hirudinem. **Lippitudo.** Oculi porro lippientes optime permutantur, si & lachryma, & sordes, & tumor, simul fieri inceperint. Si verò lachryma sordi fuerit permixta, & non valde calida: Sordes autem alba fuerit & mollis, & tumor levis solutus: Si ita hæc se habuerint, oculus cõglutinabitur ad noctes, vt doloris exors sit, atque hoc modo res minimè periculosa fuerit, ac minimè diuturna. Si verò lachryma procedit multa & calida, cū paucissima sorde, ac paruo tumore, atq; hoc ex altero oculo tantum,

- A** tum, tunc diuturnum valde fit malum, verum non periculosum, & doloris exors est hic modus. Et iudicationem in his maximè expectare oportet, primam quidem ad vigesimam diem. Si verò hoc tempus transmittat, ad quadragesimam expectanda est. Si verò neque in his diebus sedetur, in sexaginta iudicatur. Per totum autem tempus hoc, sordem considerare oportet, an in digito misceatur, & alba ac mollis fiat, maximè sub iudicationis tēpus. Si enim desinet, hæc faciet. At si vtriq; oculi hæc perpetiatur, in maiori periculo sunt, ne vlcerentur. Verum iudicatio breuioris temporis erit. Sordes autem siccae valde dolorosæ sunt, sed cito iudicantur, si non vulnus acceperit oculus. Si verò tumor magnus fuerit, dolorisque exors & siccus, periculo vacat. Si verò cum dolore fuerit, malus est si siccus sit, & periculū est ne vlceretur oculus ac cōcrescat. Sed & grauis est tumor: si lachrymā coniunctam habeat, itēque dolorem. Si enim lachryma procedit calida ac salsa, periculū est & pupillam exulcerari, & palpebras. Si verò tumor confederit, sed lachryma multa multo tempore effundatur, & sordes fuerint, viris quidē palpebrarū euersionem prædicere oportet: mulieribus autem & pueris exulcerationē ac euersionem palpebrarum. At si sordes pallidæ aut liuidæ fuerint, & lachryma multa ac calida, & in capite ardor fuerit, & de tempore dolores in oculum decubuerint, & vigilæ his accesserint, necesse est vlcus in oculo factū esse, & timor est quoque vt talis rumpatur. Prodest autem febris accedens, aut dolor ad lumbos innixus. Prædicere verò his futura oportet, ita vt respectus & ad tempus habeatur, & ad ea quæ ex oculo fluūt, & ad dolores itēque vigilias. Postquam verò & oculum cōtueri datum fuerit, si quidem compertus fuerit ruptus, & per fissuram prominuerit oculus, malum est & difficile vt sedetur. Si verò & putredo tali suberit, penitus inutilis oculus redditur. At verò alios vlcerum modos prædicere oportet, locos considerando, & putredines, & profunditates. Necessarium enim est iuxta vlcerū vehementiam cicatrices fieri. Quibus igitur rumpuntur oculi, & postea prominent, vt extra locum oculus sit, his & tempore, & arte, opem ferre non datur, ad hoc vt videant. Paruæ verò oculorū rransmotiones sedari possunt, si nihil mali accesserit, & homo iuuenis fuerit. At vlcerum cicatrices, quibus nihil

Cum acies
oculorum
extubere
de visu a-
rum est.

hil

Hippocratis Liber I I.

**Pupillarū
color.**

hil aliud mali affuerit, omnes & à temporibus, & ab arte, **D**
opem ferre posse putandum est, maximè recentissimas, & in
iuuenū corporibus. Cæterum ex locis maximè oculi lædun-
tur, si exulcerantur, deinde pars quæ est supra supercilia, po-
stea quicquid vicinissimum his locis fuerit. Pupillæ verò
flauescentes, aut argenti speciem referentes, aut ceruleæ, non
bonæ sunt. His autem paulò meliores sunt, quæ aut minores
apparent, aut ampliores, aut angulos habentes, siue ex causis
tales factæ fuerint, siue sua sponte. Caligines & nubeculæ,
& cicatrices subalbicantes: leuigantur ac delentur, si nō vul-
nus aliquod in eo loco accesserit, aut prius cicatricē habue-
rit in hoc loco, aut vnguē pterygion dictum. Si verò splen-
dicans cicatrix in nigra oculorum parte fiat, partem aliquā **E**
nigredinis dealbat, adeò vt si multò tempore permaneat, &
aspera & crassa, etiam memoriam sui relinquat. Porro iudi-
cationes quemadmodum in febribus scripsi, ita & hic se ha-
bent. Verum signa edoctum, iuxta differētias lippitudinum
prædictionē facere oportet, quum pessima signa accesserint,
diuturnarum lippitudinum, velut de singulis perscriptū est:
quum verò apparuerint optima signa, breuium. Tunc enim
septima die desituras esse prædicendum est, aut propè hoc
tempus, & alioqui securas esse putandum est. Reciduias autē
expectare oportet his, quibus melius habere contingit, neq;

**Præcipua
in his obser-
uatio.**

**Dysenteria
quæ mala.**

in diebus iudicatoriis, neq; signis bonis cōspectis. Omnium
verò maximè vrinæ statim in oculorum affectionibus con- **F**
siderare oportet. Nam temporū occasiones repentinæ sunt.
Dysenteria si quidē cum febre inuaserint, aut variis alui
egestionibus, aut cum hepatis inflāmatione, aut præcordij,
aut ventris: aut quæ dolorosæ fuerint, aut cibos intercipiūt,
sitimq; inducunt: hæ omnes malæ sunt. Et qui sanè plurima
horum malorū habuerit, citissimè peribit. Cui verò paucis-
sima talium affuerint, huic plurimæ spes sunt, Moriuntur au-
tem ex hoc morbo maximè pueri quinquennes, & seniores
adhuc, decennes. Reliquæ verò ætates minus. At quæ dy-
senteria commodæ sunt, hæ mala hæc nō inducunt. Verum
sanguine & ramentis egestis, desuerunt septima die, aut de-
cimaquarta, aut vigesima, aut quadragesima, aut intra hæc
tēpora. Huiusmodi enim egestionēs, etiā eos q prius sunt in
corporibus, morbos sanant, antiquiores quidē diutius tem-
pore,

A pore, recētiore autem in paucis diebus submouere possunt. Nam & quæ vterum gestant, etiam ipsæ euadunt superstites magis ad partum, & ex partu, & fœtus conseruant, sanguine & ramētis egestis, etiam per multos menses: nisi dolor ipsis affuerit, aut aliud quoddam malum signū ex his quæ in dysenteriiis fieri scripsi, accesserit. Si verò aliquod illorum apparuerit, & fœtui perniciem significat, & prægnanti periculum. si non post fœtus effugium, & secundæ exolutionem, ipsa dysenteria eadem die, aut post modicum tempus desinat.

Leuitates porrò intestinorum, lienteria græcis appellatæ, **Lienteria.** hæ quidem sunt continuæ & diuturnæ, & per omnem horā, & cum strepitibus, & sine strepitibus exturbantur, & similiter noctu ac interdiu incumbentes, & egestionē subeunte, aut valde cruda, aut nigra & leui ac graueolente: hæ omnes malæ sunt. Nam & sitim inducunt, & potum nō ad vesicam promouent, vt per vrinam eiiciatur, & os exulcerant, & ruborem eleuatū in facie efficiunt, & maculas solares varios colores habentes. Simul autem & ventres emollitos, & sordidos ac rugosos reddunt. Ex talibus autem homines impotentes fiunt, ad cibum capiendum, ad deambulandum, ad faciendum alia quæ facere debent. Estq; morbus hic grauissimus senioribus. Vehemens est etiam viris. Reliquis autem **Medela** ætatibus multò minor. Quisquis autem neq; in ætatibus his **qua.** est, quas malè tractari ab hoc morbo dixi, & paucissima ex signis habet, quæ mala esse scripsi, hic securissimè dispositus est. Indiget autem curatione hic morbus, donec & vrina pro ratione eius quod in potu acceptum est, procedat, & corpus ab egestis cibis augmentum cupiat, & à malis coloribus liberatum fuerit. At verò alia profluvia alui, quæ sine febre sunt, & breui tempore durant, & mitia existunt. Aut enim eluta sedabuntur, aut sua sponte. Prædicere autem oportet excretionem subtus erumpentem desituram esse, quum tangenti ventrem manu nullus motus occurrerit, & in fine egestionis flatus penetrarit. Sedes autem euertuntur ac proci- **Sedis proci-** dentia. dunt, viris quidē, quos vbi hæmorrhoidas habent, alui profluium corripit: pueris autem calculo laborantibus, & in dysenteriijs longis ac meracis: Senibus verò quibus muci agglu- **Mulierum** rinati insunt. Porrò ex muliebribus, quæ magis aut minus **fœcundita-** tis cogni- in vtero concipere solent, ita considerationem facere con- **uenit**

uenit, primum quidem specierum. Paruæ enim ad cōceptio-
nem præstantiores sunt maioribus, tenues crassis, albæ rubi-
cundis, nigræ liuidis. Quæ item venas conspicuas habēt, me-
liores sunt quàm quibus non apparent. Carnem autem vbe-
riorem habere, aniculæ malum est: mammas autē tumidas
ac magnas, bonum. Atq; hæc quidem ad visum exposita sunt.
Verum interrogare oportet etiam de menstruis purgationi-
bus, an omnibus mensibus compareant, & an copia satis ma-
gna, & an boni coloris sint, & æquales in singulis tēporibus,
& in iisdem mensium diebus. Sic enim has fieri optimū est.

**Vteri qua-
litas.**

**Conceptus
impedimē-
ta.**

**Post vlcus
qualis lo-
cus.
Cum vlcus
in altera
parte est
quid pa-
riant.**

Locum verò in quo conceptio fit, quem sanè vterum nomi-
namus, sanum esse oportet, & siccū, ac mollē. Sit item neq;
retractus, neque pronuus, neque os ipsius sit auersum, neque **E**
conclusum, neq; euersum. Fieri enim non potest vt cōceptio
fiat, quodcunq; tandem talium impedimentorum affuerit.
Quæcunq; igitur mulieres in vtero concipere non possunt,
verum pallidæ apparent, neq; febre, neq; visceribus in caussa
existentibus, hæc capite se dolere docent, & menses sibi malè
ac meracos prodire. Siue autem breui, siue longo tempore,
ipsi sic affectis menses non comparuerint, vteri in his purga-
tione opus habent. Quæcunque verò bene coloratæ sunt, &
carnem multam ac pinguem habent, & venulas occultatas,
& dolore carent, & menses his aut omnino non apparēt, aut
modici & meraci prodeunt: Hic modus difficilimus est ad
cogendum vt concipiant. Si verò mensibus comparentibus
inculpatè, & mulier sic corpore dissipata fuerit, & non conce- **F**
perit, locus in quo est vterus in caussa est, vt foecunda foetu
fieri non possit. Aut enim reuulsus est, aut euersus. Nam &
alia quæ isthic fiunt cum doloribus decolorationēque ac col-
liquatione fiunt. Quibus porro vlcus factum fuerit in vte-
ro, siue ex partu, siue ex tuberculo, siue ex alia quadam caussa
his febres & inguinum tumores, succedere necesse est, & do-
lores in his locis. Si verò & puerperij purgamenta simul fue-
rint intercepta, hæc mala si fuerint, omnino meraciora sunt
& diuturniora. Et ad hæc præcordiorum ac capitis dolores.
Vlcere autem facto & sanato, locum hunc leuiorem ac du-
riorem fieri necesse est, & minus concipere posse. Si verò so-
lū in sinistra parte fiat vlcus, & mulier in vtero concipiat,
siue dum adhuc habet vlcus, siue vbi iam sana est, masculum
magis

Prædictionum.

421

A magis enixurâ esse spes est. Si verò in dextra parte vlcus fiat, & mulier concipiat, foemineum magis fore foetum expectandum est. At si febres corripiant concipere non potentem, & attenuata sit muliercula, interrogare oportet, an vteri vlcus aliquod habeât, aut aliud quippiâ ex malis de quibus scripsi. Si enim in hoc loco nihil mali subesse apparuerit, quod causa sit attenuationis, & quòd concipere nò possit, sanguinem vomituram esse mulierem expectandum est, menses autem tali necessario euauerunt. Si verò febris soluta fuerit à sanguinis eruptione, & menses cõparuerint, in vtero concipiet. Si verò priusquam sanguis erumpat, alui excrementa liquida facta fuerint paruo modo, periculum est perituram esse mulierem antea quàm sanguinem vomat. Quæcunque in vtero se concepisse putant, & non cõceperunt, & per multos menses falluntur, mēstruis purgationibus non apparentibus, & ventres augeri ac moueri vident; hæ & caput dolent, & colum, & præcordia, & in mammis lac ipsis nò est, nisi modicū quiddam, atque id aquosum. Postquam verò ventris tumiditas exoluta fuerit, ac molles factæ fuerint, in vtero concipiet si non aliud quoddam impedimentum ipsi fiat. Nam hæc affectio bona est ad mutationem in vtero faciendum, vt post hoc tempus in vtero concipiant. At his quæ cõceperunt, dolores hi non sunt, nisi familiares his fuerint capitis dolores, & lac in māmīs gignitur. At verò eas quæ à diuturnis fluxionibus vexantur, in terrogare oportet an caput doleant, & lumbos, & infernam ventris partem. Interrogandæ sunt etiā de dentium stupore, & visus hebetudine, & aurium sonitu. Quæcunq; autem dum ieiunæ sunt, subbiliosa vomunt per multos dies, quum neque vterum gestent, neque febricitent, eas interrogare oportet an lumbricos rotundos simul vomāt. Si enim hoc non confitentur, prædicendum est ipsis futurum esse. Fit autem hic morbus maximè quidem mulieribus: deinde verò etiam virginibus, aliis autem hominibus minus. Quibuscunque verò sine febribus dolores fiunt, mortē quidem non inducunt, verum plerique diuturni sunt, & multas mutationes ac recidiuas habent. Modi autem hi sunt. Primū quidem ex capitis doloribus aliqui sunt leues, aliqui multò grauiores. Vtrosque verò hoc modo considerare oportet. Quicunque hebetem visum habet, & rubor quidam ipsis fit

Conceptus fallacia.

Quid ab his petendum.

H h

in oca

Hippocratis Liber I I.

in oculis & pruritus frontem vexat, his sanguis sua sponte manans opitulatur. Atque hic modus necessario simplex est.

Quibus verò dolores circa caput & frontem, ex magnis ventis fiunt, & ex frigoribus quum vehementer calfacti fuerint, eos grauedines quidem maxime perfecte liberant, pro-

Quid his sunt autem & sternutationes, & muci in naribus fientes, magis quidem sua sponte, sin minus, coacte. Grauedines autem fiunt perfecte, adeò vt & tussis succedant: & sternutationes succedentes si dolores non sedauerint, necesse est tubercula & decolorationes his succedere. Quibus autem dolores sine manifestis causis fiunt, & diurni, & in toto capite, suntque ipsi & graciles, & debiles. his prædicendum est morbum longè grauiorem priore esse. Si verò etiam ad collum, & ad dor-

E sum dolor descendat, caput relinquens, & rursus ad caput recurrat, adhuc grauior fit. Verum omnium horum grauisimus est, si ex capite ad collum ac dorsum tēdat. Vtilitates autem his ex abscessibus fore expectandum est: aut vbi pus per tussim reiecerint, aut hæmorrhoidas habēt, aut pustulas in corporibus enatas. Confert etiam caput furfures habens. Tor-

Torpor. pores & pūcturæ pruriginosæ velut ab vrtica, quibus per caput discurrunt, aliquando per totum, aliquādo per aliquam partem. Sæpe verò & frigiditas aliqua ab ipsis sentiri putatur, velut per caput discurrere, hos interrogare oportet, an etiam ad summam linguam punctura illa procedat. Si enim hoc fecerit, perfectus morbus fit, & qui difficilius submoueri possit. Verum absque hoc facilis est. Modi verò utilitatum

F consequendarum ex abscessibus cōtingent, veluti antea scriptum est. Sed tamen abscessus minus in his succedunt, quàm in illis. Quoscunque verò vnà cum doloribus vertigines corripunt, malum agrè exolubile ac furiosum existit. Senibus autem maxime hic modus fit. At alij morbi circa caput, & viris, & mulieribus, cum securitate vehementissimi sunt, & diuturniores: fiunt autem & adolescentibus, & virginibus in ea pubertatis ætate, & maxime circa mēsum progressum. Mulieribus verò in capitis doloribus, alia quidē omnia fiūt, quæ & viris. Verum puncturæ illæ pruriginosæ & affectiones atrabiliariæ, his minus quàm viris, si non menses, penitus aboliti fuerint. Quibus colores dum iuuenes sunt, prauis sunt ad multum tempus, & continenter, non tamen morbi

Color. regij

Prædictionum.

4 2 2

A regij modo: hi siue viri sint, siue fœminæ, dolent caput, & lapides ac terram comedunt, & hæmorrhoidas habent. **Pal- Pallor.** pallidi verò cū virore colores qui diuturni sunt, & morbus regius vehemens non est, alia quidem eadem facere solent, verum pro lapidum ac terræ esu, præcordia hos magis affigunt quàm alteros. Quicumque verò multo tempore pallidi apparent, & facies in tumorem eleuatas habent, eos caput dolere sciendum est, aut circa viscera dolorem habere, aut in se de malum aliquod in seipsis. Ex his autem apparëtibus, plerisque non vnum aliquod horum malorum apparet, sed plerunque multa, aut etiam omnia. Qui nocte vident, quos **Nyctalopes.** sanè nyctalopas vocamus, hi morbo corripuntur iuuenes, aut pueri, aut etiam adolescentes, & liberantur sua sponte, aliqui in quadraginta diebus, aliqui septimo mense, quibusdam verò & per totum annum permanfit. Quapropter de tempore coniectare oportet, ita vt & ad morbi robur, & ad ægri ætatem respicias. Abscessus autem his profunt insuper apparentes, & ad infernas partes fluentes. Verum non valde accedunt, propter iuuentutem. At mulieres nō corripuntur ab hoc morbo, neque virgines quibus menses comparent. **Temporū dolor.** Quibus autem lachrymarum fluxiones diuturnæ fuerint, & hi nyctalopes fiunt, eos interrogare oportet an caput doluerint antea quàm hæc reuelarunt. Quicumque dum neque febricitant, neque decolores sunt, sæpe & verticem & tempora dolent, si non alium manifestum habuerint abscessum **Lien nō sanus quid faciat.** in facie, aut grauitè loquantur, aut dentes doleant, his sanguinem per nares erupturum esse expectandum est. Quibus verò ex naribus sanguis fluit, hi alioqui sani esse videntur, hos autem vel splenem in tumorem eleuatum habere comperies, vel caput dolere, & splendicās quiddam ipsis ob oculos obuersatur. Plerisque verò horum simul & caput & splē, hoc modo se habere apparent. Gingiua vitia, & ora graueolentia his sunt quibus splenes magni. Quicumque verò habent splenes magnos, & neque sanguinis eruptiones ipsis contingunt, neque oris graueolentia, horum tibiæ vlcera praua habent, & cicatrices nigras. Quibus partes sub oculis vehementer attolluntur, eos magnos habere lienes comperies. Si verò etiam in pedibus tumores accefferint, aquam etiam habere videbuntur. Verum & ventrem, & lumbos in-

Hh 2

spicere

Hippocratis Liber I I.

Distortio - spicere oportet. At verò distortionem in facie, si nulli alij cor- **D**
nes faciei, poris parti communicent, cito sedantur, aut sua sponte, aut
ad necessitatem coacti: reliqui verò syderati fiunt. Quibus
una cum hoc quod mouere non possunt, morbosa corporis
pars attenuatur, hi in sanitatem restitui non possunt. Qui-
bus autem colliquationes non accesserint, hi sani euadent.
Ceterum de tempore quando sani erunt prædicendum est,
respectu habito ad vim morbi, ad tempus, & ad ætatem ho-
minis, & ad anni tempus, ita ut eius rei memor sis, quod ve-
tustissimi morbi, & pessimi, & qui reuoluuntur, grauissimè
obediunt: itémque hi qui sunt in vetustissimis corporibus.
Sed & autumnus & hyems, ad tales morbos submouendos
minorem commoditatem exhibent quàm ver & æstas. **E**
Humerorū dolores porro in humeris fientes, qui quidem ad manus descen-
dolor. dunt, torporésque ac dolores inducunt, his abscessus non suc-
cedunt, verum nigram bilem vomentes sanantur. Qui verò
isthic in humeris manent, aut etiam ad dorsum progrediun-
tur, eos puris, aut atræ bilis vomitu effugiunt. Verum de his
ita considerationem facere oportet. Si quidem enim facile
spirauerint, ac graciles fuerint, atram bilem ipsos vomitu-
ros esse spes est. Si verò difficilius spirauerint, & in faciem ip-
sis color incurrit, qui prius non erat, siue rubicundus siue ni-
ger, eos magis pus sputuros esse sperandum est. Ad hæc verò
considerandum est etiam, an in pedibus tumores sint. Nam
& hoc signum in his consentit. Atque hic morbus viris vehe-
mentissimus esse solet, à quadragesimo anno vsque ad sexa- **F**
gesimum. Qua ætate etiam coxendicum morbus maximè
affligit. Porro de coxendicum morbo sic cōsiderationem
facere oportet. Quibuscunque senioribus & torpores vehe-
mentissimi sunt, & perfrigerationes tum lumborum, tum
crurum: & qui pudendum arrigere non possunt: & quibus al-
uus non egerit, nisi ad necessitatē coacta, & prodit ipsis mul-
tus stercoraceus mucus; his maximè diuturnus morbus erit,
prædicendumque est annum ut minimum duraturum esse
morbum, ab eo tempore quo incepit, & opem ad ver & æsta-
tem expectandam esse. At verò iuuenibus non quidem mi-
nus doloris inducit coxendicum morbus, verum breuior est.
Nam quadragesimo die liberantur. Sed neque torpores ve-
hementes accedunt, neque perfrigerationes crurum ac lum-
borum

A borum. Quibus autem hic morbus est quidem in lumbis ac cruribus, non autem affligit adeo ut decumbant, considerare oportet an alicubi sint collectiones in coxa, & interrogare an ad inguen dolor progrediatur. Si enim ambo hæc habet, diuturnus fit morbus. Interrogandum insuper est, an in femore torpores insint, & ad poplitem progrediantur, & si hoc confiteatur, rursus interrogandum, an & per tibiā ad summū pedem procedant. Quicumque enim pleraque horum confessi fuerint, his dicendum est, quod crura ipsis aliquādo calida, aliquando frigida fiant. Quod si morbus hic lumbos relinquens, aliquibus ad infernas partes vertatur, eos confidentes esse iube. Quibuscunque verò coxas & lumbos non relinquens, ad supernas partes conuertitur, malum id esse prædicendum est. At quibus circa articulos dolores fiunt, & tumores, & sedantur, non podagrico modo: in his comperies viscera magna, & in vrina subsidentiam albam. Et talis si tempora eleuarit, dicet se sæpe dolere, dicet etiam sudores sibi nocturnos oboriri. Si verò neque in vrina subsidet talis subsidentia, neque sudores fiunt, periculum est ne aut claudi fiant articuli, aut affectio abscessus humore melli similis, quem melicerida vocant, sub ipsis nascatur. Fit autem hic morbus his quibus in pueritia & iuuentute sanguis ex naribus fluxu solitus desit. Proinde interrogandum est de sanguinis eruptione, an in iuuentute facta fuerit: & an pruriginosæ velut ab urtica puncturæ, & in pectore, & in dorso insint; & quibus alui dolores fortes inducant, citra exturbationes: & quibus hæmorrhoides fiant. Hoc enim horum morborum principium est. Si verò etiam malo colore præditi sint hi homines, interrogandum est an caput doleant. Hoc enim fatebuntur. Quibus verò ex his alui dolores in dextris fuerint, dolores his vehementiores fiunt, & præsertim quum ad præcordium iuxta hepar reliquæ doloris fuerint. His autem doloribus prodest strepitus statim in aluo obortus. Postquam autem dolor quieuerit, vrinam crassam ac cum virore pallidā mingunt. Atque hic modus nequaquam lethalis est, verum valde diuturnus. Quum autem iam vetustus fuerit morbus, homines ab ipso cæcutiunt. At de sanguine interrogare oportet, an in iuuentute fluxerit, & de visus hebetudine, & de vrinæ euacuationis pallore, itēq; de strepitibus an insint, & succeden

Hippocratis

Impetigines cedentes profint. Hæc enim omnia fatebuntur. Impetigines D
& lepræ, & vitilignes albæ, leucæ appellatæ, quibus quidem
Leucæ. iuuenibus aut pueris aliquid horum factum est, aut paula-
tim conspectum in multo tempore augefcit: his non putare
oportet abscessum esse, eam papularum eruptionem, sed
Leucæ vn- morbum. Quibus verò horum aliquid factum est multum
de. & derepente, hoc sanè fuerit abscessus. Fiunt autem leucæ
Lepræ vn- quidem ex lethalissimis morbis, qualis est & morbus tabi-
de. dus appellatus. Lepræ verò & impetigines, ex morbis ab
atra bile factis. Ex his autem facilius sanantur ea quæ in ma-
ximè iuuenibus fiunt, & quæ recentissima sunt, & in mollif-
simis ac carnosissimis corporis partibus producuntur.

H I P P O C R A T I S

COI COACAE PRAENO-
TIONES, IANO CORNA-
RIO MEDICO PHY-
SICO INTER-
PRETE.

*

*Qui post
rigorem pe-
reant.*



**Perfrigera-
tio.**

Pavor & timor, & tristitia præter rationem, in conuulsionem finit.
tristitia si-
ne causa. Ex perfrigeratione urinas intercipi pessimum est.
Ignorantia, Ignorantia cum rigore, malum. Malum item obliuio.
obliuio. Soporosi rigore aliquatenus perniciosi, & flammeus in

**Rigores
soporosi.**

VI ex rigore perfrigerantur, caput ac col-
lum dolentes, voce destituti, insuper exu-
dantes, postquam se recollegerint, moriun-
tur. Molestè ferre morbum cum perfrigera-
tione, pessimum est. Perfrigeratio cum du-
ricia perniciofa est. Ex perfrigeratione,
Pavor & timor, & tristitia præter rationem, in conuulsionem finit.
Ex perfrigeratione urinas intercipi pessimum est.
Ignorantia cum rigore, malum. Malum item obliuio.
Soporosi rigore aliquatenus perniciosi, & flammeus in
facie color, cum sudore, in his malignus est. In his frigidi-
tas posteriorum partium conuulsionem accersit. Et in sum-
ma, posteriorum partium frigiditas, conuulsoria est. Ex
dorso horrores frequentes, & cito transeuntes, agrè tolerari
possunt. Urinæ enim interceptionem dolorosam signi-
ficant

Aficant. Insuper exudare, his pessimum est. Rigor continen- **Rigor continen-**
 ter vexans, corpore iam debili existente, lethalis est. Qui fre- **tinuus.**
 quenter exudant, ac insuper riget, perniciosum hoc est, & in
 fine suppurationem habere comperiuntur, ventresq; pertur-
 batos. Rigores ex dorso molestiores sunt. Qui verò decima
 septima die rigorem habuit, & quarta ac vicesima insuper
 riguerit, malignum hoc est. Horrore affecti, caput dolentes,
 exudantes, malignum id est. Horrore affecti, multum insu- **Horror quā**
 per exudantes, difficili malo implicantur. Rigores multi **malus.**
 torpidi, maligni sunt. Quibus sexta die rigores fiunt, hi æ- **Rigore s**
 grè iudicantur. Quibus sanis horrores frequentes sunt, hi **multi.**
 ex sanguinis fluxione suppurantur. Horror & spirandi di- **Horror &**
Bfficultas in doloribus, signa tabis sunt. Ex pulmonis suppara- **dyspnœa.**
 tione, & circa ventrem aliquando ac claviculam dolores, &
 anxie stertere, sputi copiam in pulmone significat. Horrore **Horrentes**
 affecti, anxij, delassati, lumbos dolentes, aluos humectas ha- **quales.**
 bent. Affectiones insuper rigentes, & quæ ad noctem ali-
 quāto magis exacerbantur, cum vigiliis ac delirio in somnis,
 aliquando vrinas inuoluntariè emittentes, in cōuulsione de-
 finunt. Continui rigores in acutis, prauī sunt. Ex rigore, cum **Rigor con-**
 capitis dolore exolutiones, perniciosæ. Cruentæ in his vrinae **tinuus.**
 prauæ. Rigor cum distentione neruorum in posteriora occi- **Rigor opi-**
 dit. Qui in horruerunt & exudarunt iudicatorio modo, & **thotonon-**
 postridie præter rationē horruerūt, si quis non vigiliis infe- **des.**
 stetur, neq; cōcoxerit, ei sanguinē erupturum esse puto. Vri- **Lorium re-**
Cnæ cum rigore suppressæ, malæ & cōuulsoriæ, tum aliàs, tum **tentum ma-**
 si quis antea graui sopore pressus fuerit. Spes autē in his est **lum est.**
 abscessus retro aures fore. Rigores velut in febre tertiana, si
 in media inordinata febre exacerbentur, valde maligni sunt.
 Si verò contrario cōuellentibus modo exacerbentur, cum ri-
 gore & febre, perniciosum est. Vocis interceptiōes ex rigore,
 soluuntur tremore. Et insuper rigentes tremores succeden-
 tes iudicant. Qui ex rigore cum capitis dolore exoluuntur,
 in periculo versantur. Cruenta vrina his mala est. Quibus
 rigor, his vrinae suppressio. Conuulsio in febre, manuum, ac
 pedum dolores, maligni sunt. Malignus est & doloris ex fe-
 more progressus. Neq; genuum dolor bonus est. Sed & sura-
 rum dolores maligni sunt, mētēmq; emouēt, tum aliàs, tum
 si vrinae subsidentia in medio innatet. Febres ex præcordio-

rum dolore maligna sunt, sopor in his pessimus est. Qui frequenter exudare cum praecordij intentione non cessant, plerumque maligne habent. & dolores in summi humeri ac claviculam incumbentes, in his pravi sunt. Febres tertianae naturam referentes, cum anxietudine, maligna sunt. Vocis interceptiones in febre male sunt. Lassati, caligantes, vigilantes, soporosi exudantes, recalcrescentes, male habent. Lassati cum horrore si exudarunt iudicatorio modo, recalcrescenti in morbo acuto, male habent, tum alias, tum si circa haec sanguis de naribus stillarit. E regio morbo abunde colorati, moriuntur, alba vero alui egestio in his praecedit. Febres tertianae naturam referentes erroneae, in pares dies translapse, difficiles sunt. Anxietudines in diebus iudicatoriis, si in his sine sudore perfrigerentur, & omnes qui sine sudore perfrigerantur citra iudicationem, male habent. Et qui insuper riguerunt ex his, ubi vomuerunt meraca, anxij, tremuli in febre, malum. Qui ex rigoribus, parvis sudoribus, perfrigerantur, malum. Exudantes, vigilantes, recalcrescentes, malum. Qui insuper exudant in febre, maligne habent. Quibus biliosa est alui egestio, his circa petus morsus & amaritudo, malum est. In febribus inflata alui, flatu non erumpere malum. Lassati, singultientes, stupore detenti, mali. Praeter consuetudinem quid facere, velut est, proponere sibi aliquid, & expectare aliquid, prius non consuetum, aut contrarium, malum est, & mentis emotioni proximum. Qui morbi in malis signis leuantur, & qui in bonis non remittunt, difficiles sunt. Qui exudant, & maxime capite, in morbis acutis submolestere ferentes, malum, tum alias, tum si urinae sunt nigrae & turbidus spiritus in his malus. Extremae partes si in utranque partem cito transmutentur, malum est. Sed & sitis huiusmodi mala est. Ex moderato ferox responsio, malum. Vox acuta, malum. Praecordia his intro trahuntur. Qui ex perfrigeratione sudorosa cito recalcrescunt, malum. Qui acutis exudant submolestere ferentes, malum. Qui praeter rationem nulla existente vasorum euacuatione, impotentes fiunt, malum. In febre tractus velut a vomitu, in secretionem desinens, malum. Torpor in utranque partem cito translabens, malum. Sanguinis stillae pusillae, malae. In acuto morbo sitis praeter rationem soluta, malum. Qui ad manum exiliunt, male habent. Quibus cum febre ardente, tumores somnolenti, torpidi fiunt, his dolor in
latus

A latus superueniens levis sideratiōis ac resolutionis modo occidit. Suffocatio in acutis agris attenuatis, pernicioſa. In pernicioſis iam parui tremores, & vomitus æruginofus. Qui in potibus ſubſtrepunt, & ſubmurmurāt in ſiccis: & qui difficulter deglutiunt ſpiritu tuſſiēte, pernicioſe habēt in acutis perfrigeratis. Rubores in manibus ac pedibus, pernicioſi. Effuſantes & refracti, in ſomnis leuiter ſuſpicientes, morbo regio abundē colorati moriuntur, alba alui egeſtio in his præcedit. In febribus mentis emotiones taciturnæ, in eo qui voce priuatus non eſt, pernicioſæ ſunt. Liuioreſ ſientes in febre, breui mortem affore ſignificant. Quibus in febre dolore lateris ſiente, alui multa aquoſa ac bilioſa egerit, hi alleuantur. Quibus verò inedię conſequenter accedunt, ac ſudores, cū bono faciei colore, & aluo liquida, ita vt adſit etiā aliquis cordis, ſeu potius oris vētris dolor, hi vbi longius ægrotarunt, peripneumonicorum modo moriuntur. Febrienti ſi atrabilis in principio, ſurſum aut deorſum prodierit, lethale eſt. Qui cum perfrigerationibus, nō ſine febre, ſuperne exudant, moleſtē ferētes & phrenitici, in acuto morbo pernicioſe habent. Dolores modicē acuti, ad clauiculam ac ſurſum tranſeunt, pernicioſi. In longis pernicioſis morbis, ſedis dolor lethalis eſt. Si debilitate iam affecti, non videant, aut nō audiāt, aut labiū, aut oculus aut naſus iſtis diſtorqueatur, lethale eſt. In febribus inguinis dolor, morbum diuturnum ſignificat. In febribus iudicationes impeditæ ac ſublatæ, temporis quidē diuturnitatē inducunt, non autē pernicioſæ ſunt. Febres ex doloribus vehementibus diuturnæ. Mentis emotiones tremulæ, palpatoriæ, phrenitiæ ſunt, & dolores circa ſuram, in his mentem emouent. Quicunq; in febre cōtinua, voce deſtituti iacentes, oculis conuiētes niſtant, hi ſi poſtquam ſanguis iſtis ex naribus fluxit, & vbi vomuerūt loquātur, & ad ſeipſos redeant, ſeruantur. Si verò hæc nō fiant, difficulter ſpirantes facti breui moriuntur. Qui melius habuerunt, ſi poſtridie exacerbantur, malum eſt. Si tertia die cohibiti, quarta exacerbantur, malum eſt. Num & tales exacerbationes phrenitiæ ſunt? Quibuſcunq; deſinunt febres, non in diebus iudicatoriis, his recidiuæ fiunt. Qui in principio tenues, cum capitis pulſu, & vrina tenui, ad iudicationē acerbātur, his nihil miri eſt ſi & mētis emotio inſupérq; vigilæ

giliae accedant. In morbis acutis, motus, iactatio, somnus D
turbulentus, quibusdā cōuulsionem significat. Turbulentae
cum ferocia excitationes mentem emouentes, malae sunt,
itemq; conuulsoriae, tum aliās, tum cū sudoribus. Conuulso-
riae etiā videntur colli ac dorfi perfrigerationes, imò etiam
totius corporis. In his mictiones sunt pelliculosae. Delyria
cum sopore, cōuulsoria. Mentis emotiones modicè feroces,
ferinae sunt, sed & conuulsiones significant. In morbis lon-
gis, ventris praeter rationē tumores, conuulsorij. Affectiones
statim turbulentae, vigilias inducentes, sanguinē de naribus
stillantes, sexta die alleuantes per noctem, verū postridie
rursus affligentes, exudātes in somnum delatae, mentē emo-
uentes, largè sanguinē fundunt, & morbos soluunt. Aquosa E
vrina talia significat. Qui cum relatis, ab atra bile mente
moti, tremuli fiunt, malignè habent. Delyrium in spiritu &
sudore, lethale est. Lethale est & in spiritu ac singultu. In-
somnia in phrenitide euidentia bona sunt. In phrenitide
egestiones alui albae, & torpor malum. Rigor his pessimus
est. In phreniticis in principiis affectiones māluerat, ac fre-
quenter transmutationem habentes, malae sunt. Quibus ab
atra bile mēte motis, tremores fiunt, malum est. Qui ab atra
bile mente moti, tremuli fiunt, ac saliuam fundūt, num sanè
phrenitici sunt? Mēte moti, acutè insuper febriētes phreniti-
ci fiunt. Phrenitici parum bibētes, strepitū valde percipien-
tes, tremuli, aut conuulsi. In vehementer phreniticis, tremo-
res lethales sunt. Delyria circa necessaria, pessima. Quae ex F
his exacerbantur lethalia sunt. Mentis percussiones, voces
clangorosae, linguae conuulsiones tremulae, & voces tremulae
fientes, mentē alienant. Duricies in his perniciosa est. Prae-
debilitatorum delyria pessima. Affectiones in phreniticis
frequenter transmutationem habentes, cōuulsoriae, prauae.
Phrenitici cū perfrigeratione saliuā fundētes, vomitum ni-
grum indicant. Qui variè agrotant, & frequenter soporosi
mente mouentur, his nigrum vomitū expectandū esse dici-
to. Quae conuulsorio morbo exacerbātur, stupefactoria sunt.

Tumores iuxta aurem in morbis longis prauis sunt: San-
guinis fluxiones ac vertigines insuper apparentes, pernicio-
sae. Febres vertiginosae, & cum voluulis, & sine voluulis, per-
niciosae. Anhelosis febris postea acuta. Cum praecordio in-
tento

A tento perfrigeratis, magnus circa aurem tumor. Quibus in febre dolores circa lumbos & infernas partes fientes septum transuersum cōtingunt, infernas partes relinquentes, perniciosi sunt, tum aliàs, tum si aliud quoddā signum prauum accedat. Si verò alia signa non fuerint praua, suppuratum fore timor est. Pueris febris acuta, & alius suppressa, cum vigiliis, & calcitrare, & colorem mutare, & ruborē habere, conuulsorium est. Affectiones statim turbulentæ, vigilias inducentes, & nigra compacta egerētes, partim sanguinē fundūt.

Affectiones cū vigiliis & anxietudine repentina, sanguinē fundunt, tum aliàs, tum si quid etiā antea profluxerit. Num & qui modicè perfrigerati postea horruerunt? At qui circa

B exacerbationes tussunt, & parum exudāt, malignē habent. Ad latus dolore ac suffocatione accedente, hi suppurantur.

Quibus in febribus cōtinuis pustulæ per totū corpus erumpunt, lethale, si nō purulentus abscessus fiat, maximè autem circa aurem his fieri solet. In morbo acuto externas partes perfrigerari, internas autem ardere, & sitire, malum est. Febres continuæ per tertiā diem augescētes, periculosa. Quibus febris aliquādo intermittit, periculo vacat. In febribus longis, aut tubercula, aut dolores, in articulis fiunt: & si facti fuerint, non sunt inutiles. Capitis dolor in morbo acuto, præcordium reuulsum, non profluente ex naribus sanguine, ad phrenitidem deuenit. Febres lypiricæ, bilis fursum ac deorsum effusione nō accedente, nō soluuntur. Morbus regius ante septimum diem accedens, malū. Septimo verò ac nono, & vndecimo ac decimoquarto, iudicatorius est si non præcordia induret: sin minus, ambigua res est. Frequentes per eadem recidiuæ, circa iudicationē sanguinolentæ, nigrorum vomitū faciunt, fiunt autē & tremulæ. Dolores qui in tertianis febribus exacerbantur, tertianarum generis morbum faciunt, & grumosum sanguinē egerunt. In febribus secundum venā quæ est in collo, pulsus ac dolor, in dysenteriam desinit. Color qui sæpe in calore transmutatur, utilis est. In biliosis spiritus magnus, & febris acuta, cum præcordij intensione, iuxta aurem abscessum facit. Qui ex morbis longis se refocillantes bene cibum accipiunt, & nihil proficiunt, hi malignē recidiuā incidunt. Quibus in febribus venæ in tēporibus pulsant, & facies sana est, & præcordiū non molle,

Hippocratis

molle, diuturnū mobum significat, & non desinentem citra **D**
 multi sanguinis ex naribus fluxum, aut singultū, aut conuul-
 sionem, aut coxendicum dolorem. In febre ardente si al-
 uus eruperit, mortale est. Ex alui dolore laborioso, febris
 ardens, pernicioſa. In febribus ardentibus si aurium ſoni-
 tus accedant, cum viſus hebetudine, & grauitate ſecundū na-
 res, melancholico modo ab atra bile mente mouetur, ſangui-
 ne iſtis non erumpente. Tremores in febribus ardentibus,
 mentis percuſſio ſoluit. In febre ardente fluxio ſanguinis
 ex naribus, quarta die, mala eſt, ſi nō aliud quid boni coinci-
 derit. Verū quinta minus periculofa eſt. Qui ex febribus
 ardentibus aliquātulum perfrigerantibus, cum egeſtionibus
 alui aquoſis ac bilioſis laborant, oculis malum eſt, tum aliās **E**
 tum ſi ſtupidi fiant. Febris ardens rigore ſuperaccedente
 ſoluitur. Febres ardentes recidiuare ſolent, & vbi per dies
 quatuor ſignificationem de ſe præbuerunt, poſtea exudant,
 ſi minus, ſeptima die. Febres ardentes quatuordecim dies
 diiudicant, aut alleuantes, aut perimentes. Ex febre arden-
 te, abſceſſu purulento circa aurem non fiente, non valde ſer-
 uantur. Letargici, tremuli ex manibus, ſomnolenti, diſcolo-
 res, tumidi, pulſibus, tardi ſunt, & partes ſub oculis eleuatas
 habēt, & ſudores in ſuper accedunt, & aluos bilioſas, & intem-
 peratas ſubtumidas habent. Si verò obaridas habuerint, vri-
 næ & egeſtiones alui latenter iſtis progrediuntur, vrina ve-
 lut iumentorum eſt, potum non experunt, neque aliud quic-
 quam. Poſtquam verò reſipuerint, collum doloroſum ſe ha- **F**
 bere dicunt, & ſonitus per aures tranſire. Qui verò ex le-
 thargicis ſeruantur, plerunq; pectore ſuppurati ſunt. Qui-
 buſcunque in febribus tremores circa iudicationem ceſſant,
 hiſ temporis progreſſu abſceſſus doloroſus ſuppuratus in ar-
 ticulos fit, & veſica doloroſa. Febrientibus quibus rubores
 ſunt in facie, & dolor capitis fortis, & venarū pulſus, hiſ ſan-
 guinis fluxio plerunq; contingit. Quibus autem cibi faſti-
 dia ſunt, & oris vētriculi morſus, & multum ſaliuæ, hiſ vom-
 itus fit. Quibus verò ruſtus adſunt, & flatuſ, ſtrepituſ ac ele-
 uationeſ ventriſ, hiſ fit alui exturbatio. Qui diutinuſ ſe-
 cure ex febre continua laborant, citra doloreſ aut inflam-
 mationem, aut aliam cauſam, hiſ abſceſſuſ expectandus eſt
 cū dolore ac tumore, & magis in inferniſ partibuſ. Expecta-
 re autem

- A** re autem oportet abscessus, his magis qui trigesimū annum egredi sunt, & tunc expectare abscessus oportet, ubi viginti dies febris trāsmiserit. Senioribus autem minus fiunt, & ubi multo tempore febres durant. At intermittentes & erroneo modo inuadentes, autumno maximè in quartanam leniter transcunt, & hoc magis his qui triginta annos exceſſerint. Abscessus autem hyeme magis fiunt, & tardiùs desinunt, & minùs recurrunt. Quibus verò sæpe recidiua contigit, his si semestre tempus trāsmiserint, tabes coxendicum leniter accedit. Quæcunque signa febrī se opponunt, & non abscessus significationem habent, maligna sunt. Febres quæ neque in diebus iudicatoriis, neque post solutorium signum decesserunt, recidiuant. Acuti morbi in diebus quatuordecim iudicantur. Tertianæ exquisitæ in quinque aut septem circuitibus, aut ad summū in nouem iudicatur. Quibus febrīre incipientibus, sanguis de naribus sternutatione fiēte distillat, & vrina subsidentia albam in quarta die habet, his in septima die solutionem significat. Morbi acuti iudicantur, sanguine de naribus fluente, in die iudicatorio: & sudore multo fiēte, & vrina purulenta ac vitri formam referente, prodeunte & bonam subsidentiam habēte, & acruatim exeunte: Abscessu item memorabili fiēte, & aluo mucosa & cruenta derepente egerente: & vomitibus non paruis fiētib; circa iudicationem. Somni profundi, non turbulenti, firmam iudicationem significant. Turbulenti verò cum dolore corporis, inconstantes sunt. Septima die, aut nona, aut decima quarta, fluxiones sanguinis à naribus fiētes, plerunque febres soluunt: Similiter & alui fluxio biliosa, & qualis in dysenteria fieri solet: & genuum ac coxendicum dolor: & vrina concocta ad iudicationem. In muliere verò etiā menstruæ purgationis fluxus, Quibus in febribus sanguis abūdè vnde cūq; profluxit, his in refectionibus à morbo alui humectantur. Qui in febribus exudant, caput dolentes aluo suppressa, conuulsi fiunt. Mentis emotiones modicè feroces, & ferinum, & conuulsionem significant. Conuulsio in febre fiēns, & eadem die desinens, bona est. Conuulsio in febre fiēns, sedat febrē eadem die, aut postera, aut tertia. Si verò tempus in quo incepit, transgrediatur, & non desinat, malum est. Febres intermittētes, verū inæqualiter caleſcentes,

Hippocratis

res, aluo inflata, pauca egerente, in his post iudicationē lum- **D**
 borum dolore sequuto, alui erumpunt. At amburētes ad ma-
 num, torpide, siticulosā, anxiosā, in his aluo suppressa gra-
 uati excoluntur. Quandoque verò & rubicundā in pedibus
 ambustiones, eadē significant. Hybernæ febres quartanæ,
 leniter in acutos morbos transeunt. Capitis dolor pertinax
 cum febre acuta, & alio signo maligno, lethale est. Ceterum
 sine signo malo, transgrediens vigelimū diem, sanguinis aut
 puris fluxū ē naribus, aut abscessus ad infernas partes signi-
 ficat: fluxiones quidē iunioribus trigintaquinque annis, se-
 nioribus verò, abscessus. Si verò circa frontē ac tempora fue-
 rit dolor ille pertinax, fluxiones. Quibus capitis sunt dolo-
 res, & sonitus aurium, citra febrem & vertigo, & vocis tardi- **E**
 tas, & manuum topor, eos aut syderatos, aut comitiales, aut
 obliuiosos fore expecta. Qui caput dolent, stupore corre-
 pti, delirantes, aluo suppressa, oculo ferociente, florulenti, hi
 in posteriorem partem conuelluntur. Capitis successiones,
 oculi rubicundi, mente manifestē emouentes, perniciosæ
 sunt. Non commoriuntur hæc, sed circa aurem tumorem fa-
 ciunt. Capitis dolor, cum sedis & pudendorū dolore, & tor-
 pore, & impotentiā inducit, & vocem resoluit. Hæc hor-
 renda non sunt, verū somnolenti ac singultientes fiunt no-
 no mense: ex quibus soluta voce, in idem restituuntur. Qui
 in capitis dolore ascaridas habent, his surditas & sopor con-
 sequens, abscessus circa aurem ex suscitatur. Qui caput dolent, **F**
 stupore detenti, dolorosi, oculum rubicundum habentes, f
 sanguinem effundunt. Capitis concussiones, & aurium fo-
 nitus sanguinem effundunt: aut mulieri menses deducunt,
 tum aliās, tum si iuxta spinā ardor consequatur: fortassis au-
 tem dysentericis fluxiones. Capite grauati, iuxta sinciput
 dolentes, vigiliis infestati, sanguinem effundunt, tum aliās,
 tum si quid ad collum se extendat. Vomitus in capitis do-
 loribus æruginosi, cū surditate, vigilantibus, cito insaniam ex-
 citant. Quibus capitis ac colli dolor est, sed & totius corpo-
 ris tremula quadā impotētia, sanguinis eruptio soluit. Quin
 & tēpore hæc solvuntur. Verū vesicæ in hoc supprimuntur.
 In acutis capitis doloribus, & in torpidis cum grauitate,
 conuulsiones fieri solent. Capitis dolorem soluit pus per na-
 res, aut sputa crassa, & non olentia. Soluit item vlcerum eru-
 ptio

Aptio. Quandoq; & somnus, & alui fluxus. Capitis dolor moderatus, cum siti cibū capiente, aut cum sudore nō solvente febrem, abscessus in gingivis, aut circa aurē significat, aluo non exturbata. Capitis dolor soporofus cum gravitate, convulsorium quid facit. Caput dolentes, siticuloti, aliquatenus vigilantes, obscuri cognitu, impotentes, ex aluo liquida delassati, num mente mouentur? Caput dolentes, surda stri, manibus tremuli, collum dolentes, mingētes nigra condensata, vomentes nigra, perniciosē habent. Caput dolentes, exudantes, aluum suppressam habentes, convulsioni obnoxij sunt.

Sopor ubique malus est. Soporosi in principiis fientes, cum capitis lumborum, colli præcordij dolore, vigilantes, num phrenetici sunt? Nasus in his destillans perniciosus, tū aliās, tum quarto ab initio die. Malum est etiam alui proluuium valde rubicundum. Soporosi ab initio exudantes, urinis concoctis ardentes, verūm citra iudicationem perfrigescentes, & breui rursus ardente, torpidi, soporosi, convulsi, perniciosē habent. Somni soporosi, & perfrigerationes, perniciosi sunt. Soporosis delassatis, surdis factis, aluo erumpente si rubicunda egesta fuerint circa iudicationem profunt. Soporosi, anxiosi, præcordium dolentes, parum vomentes, abscessus iuxta aurem habent. Antea verò circa faciem tumores cum sopore. Morbi derepentē mentem percellentes cum anxietudine, sanguinem profundunt. Soporosa, anxiosa, dolorosa præcordia, frequēter parū spuentia. Tumores circa aurem habent. Soporosi, num aliquid convulsorij habent? Affectiones soporosa, fatuitatem inducentes, stuporis detentionem inferentes, præcordia variantia, & ventrem tumidum habentes, cibū fastidientes, aluo suppressa exudantes, nū his turbidus spiritus, & genituræ simile quid pertransiens, singultū significat? Nū & aluus biliosa insuper egerit? Splendidū in his mictum prodest. Ventres quoq; his insuper turbantur. Cerebro corrupto alij in tribus diebus, alij in septē moriuntur. Has verò si effugerint seruātur. Quibus autē ex his resectis os disparatū repertū fuerit, hi pereunt. Caput dolentibus ex posteriore parte ossa rupta habentibus, fluxio ē nare larga crassa, mala est: Hi vbi oculum antea doluerint, rigent. Num & iuxta tempora ossium diruptiones cōuulsoriae sunt? Auris dolor pertinax, cum febre acuta, & alio quodam

Hippocratis

dam signo aliquantū maligno, iuuenes quidem septima die **D** occidit, & citius delirio correptos, si non multum pus effluxe rit ex aure, aut sanguis è naribus, neque aliud quoddam bonum signum compareat. Seniores autem tardius, & minus tollit. Nā & aures suppuratione præueniunt, & minus delirant. Verū multi ex his recidiuant, atq; sic pereunt. Surditas in acutis ac turbulentis consequēs, malum. Malū etiā in longis. In his autē dolores etiam ad coxas deducit. In febribus surditas, aluum sistit. Aures frigide, & pellucide, & contractæ, perniciosæ. Tinnitus in acutis, & sonitus in auribus, lethale. Sonitus auriū, cum visus hebetudine, & narium grauedine mentem emouet, & sanguinem profundit. Quibus **E** surditas cum capitis grauitate, & præcordij intentione, & ad splendorem turbatio, sanguinem profundit. In febre acuta aures obscurdescere, furiosum est. Valde surdi, in accipiendo tremuli, linguam resoluti, torpidi, malum. Accedente ægritudine surditas, & vrina subrubicunda subsidentiam nō habens, sed id quod in medio innatat, mentē emouet. Morbo regio corripit, in his malū est. Mala est & ex morbo regio fatuitas. Hos voce priuari, sentientes tamē esse cōtingit. Fortassis autem & alius malè his afficitur. Quæ circa aurē dolorose excitantur, perniciose sunt. Rubores circa aurem ex progressu dolore, in febribus fientes, signum quidē sunt erysipelatis in facie futuri. Sed & conuulsionēs ex talibus fiunt, cum vocis interceptione ac exolutione. Tumores circa aurē **F** ex plurimis graueolentibus cum febre acuta, & præcordio intento, tardius excitati, occidunt. Tumores circa aurem leuiter syderatis, mali. Tumores circa aurem in longis morbis nō suppurātes, lethales. Alui verò his deorsum feruntur. Num quibus abscessus sunt iuxta aures, caput dolent? Num & supernis partibus exudant? Num & insuper rigent? Num & alui erumpunt, & quid soporosum habent? Num & aquosa est vrina, alba innatantia habens, & aliquantum varia, exalbida, graueolentia. Abscessus iuxta aurem submouent tusciculæ cum sputationibus fiētes. Vrinæ in abscessibus retrò aures citò & modicè maturescentes, malæ sunt, & sic perfrigerari, malum est. Abscessus circa aurem in morbis diuturnis suppurati, non valde albo & inodoro pure, occidunt, & maximè mulieres. Abscessus iuxta aurem, ex acuis

- A** tis morbis maximè in febribus ardentibus fiunt: & si non iudicationem fecerint, & maturescant, aut ex naribus sanguis fluxerit, aut vrinæ subsidetiam crassam habuerint, agri pereunt. Pleriq; verò talium tumorum antea propulsantur. Verùm considerare oportet insuper etiam ipsas febres, siue augeant, siue remittant, atque sic pronunciare. Ex surditate ac torpore, de naribus aliquid destillare, difficultatis aliquid habet. Vomitus his conueniet, & alui turbatio. Ex surditate leniter abscessus iuxta aures fiunt, tum aliàs, tum si quid nausæ accedat. Sed & soporosis ex his, etiam magis abscessus ad aurem fiunt. Surditatem ex febribus, sanguinis è naribus fluxio soluit: itémque alui turbatio. Facies quæ ex tumida humiliatur, & vox leuior ac debilior fiens, & spiritus rarior ac leuior, remissionē in sequentem diem significat. Faciei corruptio, lethalis. Verùm minus, si propter vigilias, aut famem, aut alui exturbationem fiat: Et si id quod propter hæc corruptum est, sedetur per diem ac noctem. Talis autem fuerit, oculi caui, nasus acutus, tempora collapsa, aures frigide ac contractæ, cutis dura, color pallidus aut niger. Liuescens verò ex his palpebra, aut labium, aut nasus, breui lethale est. Faciei bonus color, & toruitas, in morbo acuto malum est. Frontis ex his contractio, phrenitidis signum est. Circa faciem color bonus, & sudores non febrientibus stercora vetusta subesse significat, aut victus rationem inordinatam. Rubores circa nasum, alui humescētis signa sunt.
- C** Dolores circa præcordia aut pulmonem si suppurentur, malum est. Oculorum puritas, & albas ipsorum partes ex nigris aut liuidis puras fieri, iudicatorium est. Si igitur citò purgentur, celerem iudicationem significat, Si tardè, tardior. Caligo oculorum, aut si alba ipsorum pars rubescat, aut liuescat, aut venulis nigris impleatur, bonum non est. Malum est etiam lucis splendorem fugere, aut lachrymari, aut distorqueri. Et alterum minorem fieri, malum est: & oculos frequenter agitare, ac iactare, aut paruas lemas ac fordes circa ipsos, aut concretionem tenuem albicantem habere: aut albam partem maiorem fieri, nigram verò minorem: aut nigram sub palpebram supernam occultari. Mala est etiam oculorum cavititas, & expressio valde foras, & splendoris restrictio, vt pupilla extendi non possit. Et extremitatum

Hippocratis

palpebrarū curuitas, & oculi fixi, & assidue nictare, & colores permutare, & palpebras inter dormiendū non committere, perniciosum est. Malus est & oculus peruersus. Oculorū rubor in febre fiens, alui diuturnā malignam affectionē significat. Circa oculos pustularum eruptiones in virium refectionibus, aluum prorumpere faciunt. In oculorum distortionibus, febriēti, lassato, rigor perniciosus: & soporosi in his malē habent. Viro lipienti, febre superueniente, solutio.

— Sin minus, periculū est ne cæcus fiat, aut pereat, aut vtrunq;

Quibus lipientibus capitis dolor accedit, & ad multum tempus concomitatur, periculū est ne cæci fiant. Lippienti alui profluuium sua sponte prodiens vtile est. Oculorum E obscuratio, & oculus fixus, caliginosus, malum. Oculorum obscuratio, cum animi deliquio, breui cōuulsionem inducit.

Oculorum reſtitudo in morbo acuto, & motus velox, & somnus turbulentus, & vigiliæ, & quandoq; sanguis ē nari- bus stillationes, nihil boni. Qui febres ad tactum non adu- rentes habent, phrenitici fiunt: & magis si sanguis fluxerit.

Lingua quæ in principio quidem inhorruit, in colore verò permanet: progressu autem temporis exasperatur, & liuescit & rumpitur, lethalis est. Si verò valde nigrescat, in quartade- cima die iudicationem fore significat. Periculosissima autē est nigra, & cum virore pallida. Linguam circa bifidam sui partem, velut saliuā alba obduci, febris remissionis signum est, si quidem id quod superinductum est, crassum fuerit, ea- F dem die. Si verò tenuius, postridie. Si verò adhuc tenuius, ter- tia die. Eadem significat etiam huiusmodi, si circa summam linguam fiant, verū minus. Lingua tremula cum rubore iuxta nasum, & aluo liquida, si reliqua sine signis sint circa pulmonē, malū est, & celeres purgationes, perniciosas signi- ficat. Lingua citra rationē tenera fiens, & cum cibi fastidio nauseabunda, cum frigido sudore, ex aluo liquida, nigrorū vomituum, signum est: lassitudo in his mala est. Lingua tre- mulæ quibusdam etiam aluum liquidam quādoque faciunt. Denigratæ verò in his, celerem mortem significant. Num — lingua tremula mentem non firmā significat? Lingua aspe- — ræ & resiccata, phrenitica sunt. Dentes collidere aut stride- re, quibus non familiare id est à pueris, furiosum ac lethale est: Iam verò delirans si hoc faciat, penitus lethale est. Per- nicio

A niciosum autē est & resicari dentes. Dentis corruptio ab-
fcessum circa gingiuā factum soluit. Ex dentis corruptio-
ne, vehemens febris superaccedens, & delyriū, lethale est. Si
verò feruentur, vlcera suppurabunt, & ossa discedent. Qui-
bus circa palatū humoris collectio fit, plerūque suppuratur.

Dolores vehementes circa maxillas, periculum est ne ad
ossis educationē deueniant. Labium cōtractum, alui biliosæ
eruptionem significat. Sanguis de gingiuis, ex aluo liquida
perniciosus. Sputi excreationes in febre, liuidæ, nigræ, bi-
liosæ, si quidem supprimātur malæ sunt, secedentes verò pro-
ratione, vtiles. Quibus saluginosa sputa, ac tussis suppri-
muntur, his corpus velut à pustulis rubescit. Verū ante
B obitum exasperatur. Sreatio frequēs, si sanè & aliud quod-
dam signū affuerit, phrenitidē indicat. Vocis interceptiones
cū exolutione, pessimæ. Modicè feroces mentis emotiones,
malæ & ferinæ sunt. Quibus vox cum febre deficit, & cum
iudicatione intercepta, tremuli moriuntur. Vocis interce-
ptiones in febre cōuulsorio modo fientes, ad mentis emotio-
nem cū silentio deueniūt, perniciosum. Vocis ex dolore in-
terceptiones, dolorosam mortē inducunt. Vocis interceptio-
nes cum exolutione stupefactorio modo, perniciosæ sunt.

Voces confractæ post medicamēti sumptionē, num prauæ
sunt? Pleriq; horum exudant, & ventres humectos habent.

In vocis interceptione spiritus, velut his qui strāgulantur,
præ manibus expositus, malus est. Num & mentem emouet?

C Ex capitis dolore vocis interceptiones si sint, febricitantes
cum sudore laxantur in seipsos, fiuntque morbi reuertentes
diutius durantes. his insuper rigere, malum non est. Mentis
emotiones cū vocis interceptione, perniciosæ. Vocis inter-
ceptiones insuper rigentibus, lethales. Tales autē leniter ca-
put dolēt. Vocis interceptiones cū exolutione, in febre acuta
sine sudore, sunt quidem lethales, minus verò quàm cū su-
dore. Verū diurnitatē temporis significāt. fortassis autē
& qui ex recidiua tale quid patiūtur, tutissimi sunt. Pernicio-
sissimè autē ex talibus habēt quibus sanguis ex naribus fluit,
& quibus alui humectantur. Vox acuta, plāctū referens, &
oculorū obscuratio, conuulsoriū est. Dolores his ad infernas
partes, toleratu faciles sunt. Cū voce tremula, solutio alui
præter rationē, in his moram trahētibus diuturnis, perniciēs
est

est. Frequentes subsporida vocis interceptionis consisten- **D**
tes, tabem præsignant. Spiritus qui densus quidem & par-
uus est, inflammationē & dolorē in locis principalibus signi-
ficat. Magnus autē & per multū tempus delirium aut con-
uulsionem. Et frigidus quidē lethalis est, lethalis autē est &
febriculofus & fuliginofus. Verū minus quā frigidus, &
qui magnus foras expiratur, paruus verò intro: & paruus fo-
ras, magnus verò intro, pessimus sanē est, & morti propin-
quus. Itēq; extendēs, & vrgens, & obscurus, & dupla intro
reuocatio, veluti super inspiratibus. Bona autem spiratio, in
omnibus morbis qui cum febre acuta sunt, & in quadragin-
ta diebus iudicantur, magnū momentum ad salutem habet.

Collum durum & dolorofum, & maxillarū colligatio, & **E**
venarū iugularium palpitatio fortis, & tendinum distentio,
perniciosum. Dolores in faucibus gracilibus strangulato-
rij, à capitis dolore originē trahentes, conuulsorij sunt. Fri-
giditates colli ac dorsi apparētes, Sed & totius corporis con-
uulsoria, in his mictiones fiunt crassiorē farinam referentes.

Quibus circa fauces irritamēta sunt, his tumores circa au-
rem leniter erumpunt. Fauces dolorofæ, graciles, cum agrē
tolerabili molestia, perniciosæ acutæ sunt. Quibus spiritus
retrahitur, & vox strangulatoria est, & vertebra intro confi-
det, his in fine velut, cōtrahente quodam spiritus fit. Fauces
modicē exasperatæ, & alius vanis conatibus nitens, frontis
dolores, ægri palpando cōtrectantes, dolorofi: quæ ex his au-
gescunt, difficilia sunt. Dolores fortes circa fauces, tumores **F**
circa aurē, & conuulsiones efficiunt. Colli item ac dorsi dolo-
res. Cum febre acuta cōuulsiones perniciosæ. Colli & cu-
bitorum dolores, conuulsorij. A facie autem hi, & secundum
fauces. Pallidi, graciles, saliuam sputantes, In his in somnis
sudores boni sunt. Num & sudore leuari, plurimis non malū
est? Dolores ad infernas partes his toleratu faciles sunt. In
dorsi ac pectoris dolore, mictio cruēta suppressa, perniciofa
est dolorosē. Colli dolor malum quidē in omni febre, pes-
simū autē his quibus timor est vt etiam insaniant. In pe-
ctoris dolore febriculoso, alius turbata, torpida, nigrarum
egestionū signa sunt. Dolores parui in acutis iuxta fauces
graciles, in gracili vbi hiarit, nō facilē os contrahente, men-
tem emouent. Ex his phrenitici perniciosē habent. Fauces
exulcer

- A** exulceratæ in febre, cum alio signo ex his quæ difficilia sunt, periculosa sunt. In febribus derrepente suffocari, & deglutire nō posse, citra tumore, malum est. Collum cōvertere nō posse, neq; deglutire, vt plurimum lethale est. Præcordium molle esse conuenit, & doloris exors, & æquale. At inflammatum, aut inæqualiter se habens, aut dolens, signū est ægritudinis non leuis. Tumor verò in præcordiis durus & dolorosus, pessimus quidē est, si iuxta omnes partes fuerit. Ex his autem qui ab vna parte sunt, minus periculosus est qui à finistris est. Significant autē in principio quidem tales, mortem citam. Si verò viginti dies transmittant, febre manente, suppurationem. Contingit autē his in primo circuitu, etiā sanguinis eruptio è naribus, & valde prodest. Plerunque enim hi caput dolent, & visus obscuratur. & magis in his sanguinis eruptionem affore expecta. In ætatibus autē annorum trigintaquinq; Senioribus verò minus. At verò molles & doloris exortes tumores, diuturniores iudicationes faciunt, & minus periculosi sunt. Sed & hi sexaginta dies transgredientes, febre manente, suppurantur. Consimilia verò significant & tumores circa ventrem, his qui sunt in præcordiis, Verum minus suppuratur hi quàm illi. Minimè verò qui sub vmbilico consistunt, & fiunt etiā hi quidem in tunica, illi verò sursum diffusi. Lethales autē sunt ex ipsis, quicunq; intro rupti fuerint. ex reliquis autem suppurationibus, quæ quidē foras rumpuntur, optimū est vt in breuissimā & acutissimam molem colligantur: quæ verò intro, vt neq; mole, neque dolore, neq; colore, foris se manifestas faciāt. Contrariū autē pessimum est. Quidā verò ex his propter puris crassitudinē, nullam de se significationē præbent. Porro recentes in præcordiis tumores, si nō cum inflammatione fuerint, & dolores ab ipsis soluit murmur in præcordio obortū, & maximè quidē si pertransierit per vrinas, & alui egestionem. Sin minus si etiam ipsum pertransierit. Prodest autē & si subdescenderit ad infernos locos. Pulsus in præcordio cum tumultu, mēris emotorius est, & magis si oculi frequēter moueantur. Oris ventriculi dolor, & pulsus præcordiorum, febre perfrigerata malum, tum aliās, tum si insuper exudarint. Dolores ad præcordium irruentes, tū aliās mali sunt, tum si aluos humectēt. Peiores autē sunt, si breui fiant. & tumores circa aurē ex his

Hippocratis

emergētes, maligni sunt, & aliæ suppurationes. Oris vētri- **D**
culi dolores cū tormine vētris animalcula erūpere faciunt.

Oris ventriculi dolor seniorē frequenter imperens, mor-
tem repentinā significat. Quibus præcordia eleuantur, aluo
suppressa, malū est, maximē autē in morbis tabidis, longis.
& quibus alui humectantur, in præcordio inflāmatio suppura-
toria est, quibus ante mortem nigra per aluum subeunt.

Præcordiorū distētio cum sopore anxioso, in caput dolen-
te abscessus circa aurem attollit. Post præcordiorū tumo-
rem, biliosis spiritus magnus & febris acuta, abscessus circa
aurē attollit. In dolore præcordiorū submurmuranti, lum-
borum dolor superaccedēs in febribus, vētres vt plurimū
humectat, si non flatus eruperit, aut vrinæ copia prodierit. **E**

Ex præcordio diutinē afflicto, & aluo graeolenti, absces-
sus circa aurem, occidit. Quibus à præcordiorū doloribus,
aluus paulatim subuiscosa egerens, pauca stercoracea effun-
dit. num etiam sanguinē effundit? Quibus derepente dum
sine febre sunt, præcordij & oris vētriculi dolor, & circa cru-
ra, ac infernas partes, & aluus in tumorem eleuata est: soluit
venæ sectio, & alui fluxio. His febrile nocuum est. Longæ
enim & vehemētes febres fiunt, & tussēs, & spiritus & singul-
tus fiunt. His autem ad solutionem tendētibz, dolor fortis
coxarū, aut crurum, aut puris sputum, aut oculorum priua-
tio succedit. Quibus dolores præcordiorum, oris ventricu-
li, hepatis, partium circa vmbilicum, hi sanguine per aluum **F**
egesto, seruantur: non autē egesto, moriuntur. Quibus præ-
cordia non mollia, facies sana, non liberātur citra multi san-
guinis ex naribus fluxum, aut conuulsionē, aut coxendicum
dolorē. Dolores ad præcordia in febre voce intercepta, sine
sudore soluti, malum est. His ad coxendices dolores fiunt.

Iuxta ventrem in febre palpitationes, mentis emotiones
inducunt. Sanguinis autem fluxio horrorem efficit. Dolo-
res in febre ad præcordia exilientes, sine sudore soluti, mali-
gni sunt. His ad coxendices dolores fiunt, & ipsis vnā cum fe-
bre ardente, aluus deorsum erumpēs, perniciosum est. Do-
lores circa vmbilicum palpitatorij, habēt quidē & aliquid
mentis emotorium, verū circa iudicationem pituita his
aceruatim copioso cum dolore penetrat. Post aluum suppres-
sam, præcordia subleuata in tumorem, mala sunt, maximē
tabescen

A tabescentibus iam diu, & quibus alui humectantur. Anxietatem in præcordio sentientibus, tumores circa aurē obortiti, ipsos occidunt. Duricies circa ventrem cum dolore, infibrientibus cum horrore, cibum auersantibus, si aluo insuper parum humectata, purgationem non faciant, ad suppurationem peruenient. Dolor supra umbilicum, & lumborū dolor, si medicamentis nō soluantur, in hydropem siccum desinunt. Dolores ex lumbis diuturniores, qui febre tertianæ generis modo exacerbantur, grumosum sanguinem egerere faciunt. Dolores in lumbis sanguinis fluxionem inducunt.

Ex lumborum dolore sanguinis fluxiones largæ fiunt.

Quibus ex lumborum dolore, recursus ad caput, & manus torpidæ, & oris ventriculi dolores, & aurium sonitus, his sanguis largè profluet. Sed & alui his deorsum erumpunt, & mens turbata est vt plurimum. Ex dorsi dolore ægritudinis principia difficilia sunt. In lumborum dolore pertinacis, & ampliore alui subductione, à veratro vomere spumosa multa prodest. Spinæ distortionē ac spirandi difficultatem, sanguinis fluxio soluit. In lumbis dolentibus oris ventriculi dolores insuper accedentes, signa sanguinis fluxionis sunt, etiā prægressæ. Affectiones ex lumbis ad collum & caput transeuntes levis siderationis modo resoluētes, conuulsoria, mentis emotoria sunt. Num tales etiā soluantur cōuulsionibus? Aut talium alui ægrotāt per eadē prodeuntia? Ex lumborum doloris cursu, oculorū distortio, malum. Dolor in pectus firmatus torpore, malus in febre est. Hi repente pereunt. Ex lumborum dolore recursiones ad os ventriculi febriculosæ, horrorem inducentes: Sic affecti reuomentes tenuia aquosa, mente moti, voce destituti, nigrorum vomitu facti moriuntur. Diuturni circa lumbos, & tenue intestinum dolores, & ad præcordia dolores, si ægri cibos auersentur vnā cum febre, his dolor intentus ad caput progressus, repente ipsos occidit conuulsorio modo. Quibus lumborum dolor est, hi male habent. Num his tremores fiunt, & circuli rubicundi in tibiis in rigore? Num lumbos dolentibus, cibos fastidientibus, non vomentibus, modicè ferociter mente motis, spes est nigra proditura esse? Lumborum dolor in vetriculi os dolente, cum excreatione violenta, habet quid conuulsorium. Rigor vnā cum iudicatione ali-

quatenus horrendus est. Lumborum dolor sine causa manifesta sæpe impetens, maligni morbi signum est. Lumborum dolor cum sopore anxioso, malus est. Lumborum distentio ex muliebriū mensium multitudine, ad suppurationem tendit, & variè prodeuntes viscosi, graueolentes, strangulatorij menses ex prædictis, ad suppurationem tendunt. Arbitror autem tales etiā aliquantū delirare. Quibus lumborum dolor, & lateris, sine causa manifesta, hi regiū morbum incurrunt. Perfrigerationes ex sanguinis eruptionibus in diebus iudicatoriis vehementes, pessimæ sunt. Vice versa sanguinem erumpere, malum est, velut in splene magno ex dextris, & circa præcordia eodem modo se res habet.

Vulnera sanguinem fundentia, insuper rigentia, maligna. **E** Sic affecti loquentes latenter moriuntur. Affectiones quæ quinta die sanguinem largè fundunt, sexta insuper riguerunt, septima perfrigeratæ fuerunt, & repenti recalescunt, in his alui malè afficiuntur. Post sanguinis eruptionem, nigrorum per aluum egestio, mala. Mala autem sunt & rubicunda valde & æruginosa. Quarta die tales fiunt sanguinis eruptiones. Soporosi ex talibus conuulsi moriuntur, nigris prægressis, & ventre tumefacto. Post sanguinis eruptiones, & nigrorum egestionem, in acuto surditas, malū. Sanguinis egestio his perniciofa. Surditas autem soluit. Quibus sanguinis eruptiones plures, his temporis progressu alui malè afficiuntur, si nō vrina concocta prodierit. Num & aquosa vrina tale quid significat? Quibus ex sanguinis eruptione **F** larga frequenti, multa sit alui cū nigris egestio, ea autē suppressa, sanguinis fluxiones: hi aluum dolent, vnā verò cum quibusdam flatibus, faciliè tolerāt. Num tales multis frigidis sudoribus exudant? Conturbata in his vrina, mala non est: neq; id quod genituræ simile in ipsa residet, verū plerunq; hi aquosa mingunt. Quibus de naribus in surditate ac torpore, pauca destillant, habent quid difficultatis. Vomitus his conducit, & alui perturbatio. Magnæ in principiis sanguinis eruptiones, circa resectionem aluos humectant. Fluxiones ex naribus largæ per vim suppressæ, quandoque conuulsionem prouocant. Venæ sectio soluit. Vndecima die fientes sanguinis stillationes, difficiles sunt, tum aliàs, tum si bis superstillauerint, & rursus stillauerint. In sanguinis fluxione

Axione multa, aut singultus, aut conuulsio, mala est. In his qui decolores vsq; ad septem annos vires recolligunt & spiritus in viis aceruatus, & terræ cōcupiscentia, sanguinis corruptionē ac exolutionē significat. In morbis longis parua comparentes sanguinis fluxiones, perniciosæ sunt. Vertigines ab initio sanguinis nariū fluxio soluit. Ex naribus erumpente sanguine, cū exiguis sudoribus perfrigescentia, maligna sunt. Sanguinis detractio in perfrigeratione torpida, mala est. Qui aluo suppressa sanguinem effundunt, & vnā cum sanguinis effusione insuper rigent, his aluum velut ex intestinorum leuore lubricā hæc faciunt, itēque duram, & ascaridas, aut ambo. Sanguinis fluxiones statis temporibus

Bfientes, siticulosa, si sanguinem non effuderint, comitialis morbi mortem inducunt. Ex hæmorrhoidē parū apparente, vertigines oborta, paruam ac modicam siderationē significant, soluit venæ sectio. & quicquid hoc modo apparuerit, mali aliquid significat. Palpitantes per totum. num etiam voce intercepta moriuntur? Tremores conuulsorij fientes in sudoribus reuerti solent. Iudicatio his fit, vbi superriguerint. Superrigent autē hi ardore circa ventrem prouocati. Somnus multus in his conuulsorius, & ad frontē grauitates, & mictio difficilis. Conuulsiones antea nō cognitæ in strangulatis ab vtero, faciles sunt. Conuulsoria sine sudore spūta defluentia in febriente, leuia sunt, His insuper alui aliquantum humectatur. fortassis autē & ad articulos aliquid

Cabscedet. Quibus conuulsis oculi intente relucet, neque apud seipsos sunt, & diutius ægrotant. Quæ conuulsorio modo exacerbantur, cū stuporis detentione, abscessus iuxta aurem excitant. Tremulis, anxiosis, parui iuxta aurē tumores conuulsionē significant, aluo male affecta. Conuulsiones & tetanicas distentiones febris accedēs soluit. Conuulsio ex vulnere lethalis est. Conuulsio in febre fiens, perniciofa est. Minimè verò pueris. Seniores septem annis in febre non corripuntur conuulsione. Sin minus, perniciosum est. Conuulsionem soluit febris superueniens acuta, quæ prius non fuit. Si verò fuit prius, iam exacerbata. Prodest & vrinæ transitus vitri speciem referens, copiosus, & alui fluxus, & somni. At repentinas conuulsiones soluit febris, alui fluxus. In conuulsionibus vocis interceptio diu durans, mala est:

la est: parua autem, aut linguæ sîderationem, aut brachij, aut **D**
dextrarum partium significat. Soluitur autē vrinis multis
aceruatis derepentē prodeuntibus. Sudores autem paulatim
fientes profunt, Aceruati verò, itēque sanguinis detractio-
nes aceruatæ lædunt. In distentionibus & ante & retro
fientibus, & intergum solū contingētibus, si maxillæ solu-
tur lethale est. Lethale est etiam sudare in distētionē in dor-
sum fiente, & corpus dissolui, & in eadē affectione reuomere
per nares, aut clamare, aut nugari, si ab initio vox intercepta
fuit. In posteram enim diem mortem significat. Febriles in
dorsum distentiones, vrinæ genituæ similes soluunt. An-
ginæ quæ neque in collo, neque in faucibus, quicquam con-
spicuum faciunt, verū suffocationem vehementem ac spi- **E**
randi difficultatem inducunt, eadem diē & tertia occidunt.
Quæ verò tumores & ruborem in collo accipiunt, in cæteris
quidem cōsimiles sunt, verū diuturniores. Quibuscunque
verò & fauces, & ceruix, & pectus, simul rubuerint, diutur-
niores sunt, & ex ipsis maximè seruantur, si non recurrerint
rubores. Si verò dissipentur, neque tuberculo foras conuerso
ac collecto, neque pure leniter ac sine dolore excreato, ne-
que in diebus iudicatoriis, perniciosæ sunt. Num etiam sup-
purati fiunt? Securissimum autem est ruborem & abscessus
quàm maximè foras verti. Erysipelas verò foris quidem ac-
cedere, commodum est, intro autem conuerti, lethale. Con-
uertitur autem intro, quum disparente rubore pectus grau-
atur, & difficilem spirationem habet. Quibus verò anginae ad **F**
pulmonem vertuntur, partim in septē diebus pereunt, par-
tim euadentes suppurati fiunt, si non eductio pituitosa sur-
sum ipsis fiat. Quibus per pulsationis venarum vehemen-
tiam, stercus derepentē per aluum secedit, lethale est. In an-
ginis sputa gracilium subarida malum. Anginosi in linguis
tumores, circa signa disparentes, perniciosi: & dolores dispa-
rentes citra manifestam causam, perniciosi sunt. In ang-
inis qui non breui concocta exspuunt, perniciose habent. In
angina dolores ad caput, citra notas, cum febre, perniciosi.
In angina dolores ad crura, citra notas, cum febre, perni-
ciosi. Ex anginis citra indicationem præcordij dolor, cum
impotentia ac torpore fiens, occidit occultè, etiamsi valde
mansuetè se habere putent. Ex anginosis citra notas atte-
nuatis,

Anuatis, dolor ad pectus & ad aluum progressus concitatus, pus egerere facit, aliàs autem eius qui exoluitur tale est. In anginis omnia perniciofa sunt, quæ non manifestū dolorem faciunt. Sed & ad crura dolores diurni procedunt, & difficulter suppurantur. Ex angina sputa viscosa, crassa, valde alba, quæ violēter educantur, mala sunt. Et omnis eiusmodi maturatio, mala. Purgatio multa deorsum, tales levis considerationis modo perimit. Ex angina, subarida frequentia sputa, cum tussi, lateris dolorē inducentia, perniciofa: itēmq; ea quæ inter potandū per tussim subemergunt: & deglutitio violenta, mala. Pleuritici quibus in principio sputationes penitus purulentæ sunt, tertia die moriuntur, aut quinta. Si **B** verò has effugerint, non multo melius habentes, septima, aut nona, aut vndecima suppurari incipiunt. Quibus supra aurem rubor, & similiter veluti pleuritici calescunt, & aluus biliosis ac graueolētibus exturbatur, hi vigesima ac quadragesima die periclitantur. Vbi verò has effugerint, seruantur.

Pleuritides sicæ ac sine sputo difficilimæ sunt. Horrédæ quoq; hæ in quibus dolores supernè sunt. Pleuritides sine cōuulsionibus, grauiores sunt his quæ cū cōuulsionibus fiūt.

Quibus pleuriticis in principio lingua biliosa fit, hi septima die iudicantur. Quibus autem tertia aut quarta die, circa nonam. Bulla subliuida fiēte in lingua, in principio, qualis est ferri tincti in oleum, difficilior solutio contingit, & iudicatio quidem ad decimum quartū diem peruenit, sanguinem autem plerunque spuunt. Sputum in pleuriticis tertia die maturari ac exspui incipiens, citiores solutiones facit: verū postērius, tardiores. In doloribus pleuritico-
Crum commodum est aluum molliri, sputa colorari, strepitus in pectore non fieri, urinam bene procedere. His autem contraria, diffīcilia sunt: itēmq; sputū dulce fieri. Biliosæ simul & sanguinæ pleuritides, plerūque nona aut vndecima die iudicantur, & maximè sanantur. Quibus autem pleuriticis in principio quidem dolores molles sunt, quinta verò aut sexta die exacerbantur, hi magis ad duodecimā perueniunt, & non valde seruantur. periclitātur autem maximè septima die ac duodecima. Vbi verò bis septem dies effugerint, seruantur. Quibus pleuriticis strepitus sputi multus in pectore est, & facies tristis, & oculus morbi regij colore infectus, ac caligi

Hippocratis

caliginosus, hi pereunt. Qui ex pleuritide suppurati fiunt, **D**
in quadraginta à ruptione diebus expuunt. Sputum in o-
mnibus pleuriticis ac peripneumonicis facile ac cito expui
conuenit, & flauum sputo ammixtum esse. Quod verò longè
post dolorem educitur flauum, aut non mixtum, & multam
tussim inducens, malum est. Prauum autem penitus est fla-
uum meracum, & viscosum, & album, & rotundū, & cum vi-
rore pallidum valde, & spumofum, & liuidum, & æruginoso-
sum. Peius autem aliquanto est id quod ita meracum est, vt
nigrū appareat. At sanguine non multo permixtum flauum,
in principio quidem salutare est, septima verò die, aut po-
sterius, minus tutum. Sanguineum verò valde, aut liuidum.
statim in principio periculosum est. Præua sunt etiam sputa, **E**
spumosa, & flaua, & nigra, & æruginosa ac viscosa, & quæcū-
que cito colorantur. At mucosa ac fuliginosa, & cito coloran-
tur, & securiora sunt. Quæ verò intra quintum diem ad co-
ctionem colorantur, meliora sunt. Omne porrò sputum non
soluens dolorem, malum est: soluens autem, bonum. Quicun-
que verò cum bilioso purulentum educunt, aut seorsim, aut
permixtum, plerumque decimaquarta die moriuntur, si non
mali aut boni quippiam ex præscriptis superueniat. Sin mi-
nus, pro ratione, maximè autem his quibus eiusmodi pus se-
ptima die incipit. Bonū verò est & in his & in omnibus cir-
ca pulmonē morbis, facile ferre morbū, à dolore liberatum
esse, sputū facile educere, bene spirare, & sine siti esse, & totū **F**
corpus æqualiter calefcere, ac molle esse. Et ad hæc somnos,
sudores, vrinas, alui egestionem, bonas esse. Mala autē sunt his
cōtraria. Si quidem igitur omnia bona ad hoc sputum acces-
serint, seruari homo poterit. Si verò partim affuerint, partim
non, non vltra decimūquartū vita producta peribit. Quod si
contraria signa accedant, citius etiam. Quicunq; verò dolo-
res in his locis non sedantur, neque ad exspuitiones, neque
ad venarum sectiones, ac victus rationes, suppurantur. Qui-
buscunque autem ex peripneumonia abscessus circa aurem,
aut ad infernas partes fiunt, & suppurantur ac fistulantur, hi
superstites euadunt. Fiunt autem his quibus & febris, & do-
lor affuerit, & sputum pro ratione non proderit: neque bilio-
sæ alui egestionem, solutūque faciles ac meracæ fiunt, neque
vrina crassa valde, & multam subsidetiam habens: & alia sa-
lutaria

A lutaria habuerint. Fiunt autem ad infernas quidē partes, his quibus circa præcordia inflāmatio fit: ad supernas verò, quibus præcordiū molle & doloris exors fuerit, & vbi per tempus aliquod difficulter spirauerint, ac citra manifestam causam cessauerint. At abscessus ad crura in periculosis inflammationibus pulmonis, omnes quidē commodi sunt, optimi autem, sputo purulento pro fluo fiente. Non procedente verò sputo secundum rationem, neque vrina bonam subsidētiā habente, periculum est claudum fore hominē, aut multum molestiarum exhibitura res est. Si verò recurrerint abscessus, febre consequente, & sputo non procedente, periculū est ne moriatur ac deliret. Quicūque verò peripneumonici nō purgati sunt iudicatoriis diebus, sed mēte moti quatuordecim dies effugerunt, eos periculum est suppuratos fieri,

Peripneumoniæ ex pleuritide trāsmutata, securiores sunt his quæ ab initio fiunt. Corpora exercitata ac densa citiùs à pleuriticis ac peripneumoniciis morbis pereūt quàm inexercitata. Grauedines & sternutationes in morbis circa pulmonē, & antecessisse, & succedere, malū est. Reliquis autem sternutatio non incommoda est. Peripneumoniciis quibus lingua tota alba ac aspera fit, ambæ pulmonis partes inflāmatae sunt, Quibus verò dimidiū, vna iuxta quam apparet, Et quibus ad vnā clauiculā dolor fit, his superna pulmonis ala vna ægrotat. Quibus autem ad ambas clauiculas dolor fit, ambæ supernæ pulmonis alæ ægrotant. Quibus iuxta **C** mediam costam, media. Quibus ad discriminationem, inferna. At totam vnā partē dolentibus, omnia iuxta hanc partem dolent. Siquidem igitur aortæ appellata, vtrinque appendentes pulmonis partes, valde inflāmatae sunt, vt ad latus assideant, hac corporis parte resoluuntur, & liuores foris circa costam habent. Hos autē veteres ictos, siue syderatos vocabant. Si verò non valde inflāmatae sunt, vt nō assideant: dolor quidem fit per totum: non tamen resoluuntur, neq; liuores habent. Quibus verò totus pulmo inflāmatu fuerit, vnā cum corde, vt ad latus allabatur, hi toti resoluuntur, & iacet æger frigidus, sensus exors. Moriturque secunda aut tertia die. Si verò etiam sine corde contigerit, minus diu viuunt. Quidam autē etiā seruantur. Qui suppurati fiunt, maximè ex pleuritide ac peripneumonia, eos colores comitantur,

tur, interdiu tenues, noctu vehementiores, & nihil memora-
tu dignum spuunt, & circa collum ac claviculam sudant, &
oculi caui fiunt, maxillæ verò rubent. digiti summi deterius
calescunt ac asperantur. Ungues curvantur, ac perfrigerantur,
& circa pedes tumores habet, & circa corpus pustulas, & ab-
stinent à cibis. Diuturnæ igitur suppurationes, signa hæc ha-
bent. Quæ verò breui rumpuntur, ex notis ad eas consequen-
tibus cognoscere oportet, & ex doloribus in principio. Simul
autē & si aliquando difficilius spirauerit homo. Rumpuntur
autē plurimæ suppurationes, partim vigesima die, partim
quadragesima, partim sexagesima. Quibus igitur dolor in
principio incumbit intentus, & spirandi difficultas, & tussis
cum sputatione, ad vigesimū diem aut citius, eruptionem ex-
pecta. Quibus autem leuiores hæc sunt, iuxta rationē: Suppu-
tare autem oportet tempus, à quo primū doluit, aut graua-
tus fuit, aut febriit, aut si quando rigor corripuit. Necesse est
autem præcedere & dolorem, & spirandi difficultatē, & spu-
tationem, ante ruptionē. Quibus igitur & febris statim post
ruptionem decedit, & cibum appetunt, & pus facile educitur
album, inodorū, leue, eiusdem coloris, & à pituita liberū, &
alius parua cōpacta egerit, plerunque breui seruantur. Quos
verò & febres sequuntur, & sitis, & cibi fastidium, & pus liui-
dum, aut cum virore pallidū, aut pituitosum, aut spumofum,
& aliis insuper liquida sit, moriuntur. At quibus aliqua ex
prædictis accesserint, aliqua non, horum aliqui pereunt, ali-
qui multò tempore seruantur. Qui suppurati futuri sunt,
primū falsuginosum spuunt, deinde dulcius. Quibus in
pulmone tubercula fiunt, pus educunt ad dies quadraginta
post ruptionem. Has verò transgredientes plerunque tabidi
fiunt. In lateris dolore, stillatio sanguinis de naribus, ma-
la est. Quos suppuratos mitius habentes, sputorum gra-
ueolentiæ sequuntur, eos recidiua occidit. Qui ex pleuri-
tici exspuunt purulenta, subsidiaria, rotunda: aut purulen-
ta subcruenta progressu tempore, perniciosè habent. Perni-
ciosè item qui nigra fuliginosa spuunt: aut quibus velut à vi-
no nigro sputa fiunt. Quicunque sanguinem spumofum
spuunt, dextrum præcordium dolentes, de hepate spuunt,
& multi pereunt. Quibus dum concutiuntur pus cœno-
sum & graueolens prodit, plerunque pereunt. Quibus à
pure

A pure specillum coloratur, velut ab igne, plerunque pereunt.

Cum lateris dolore, non tamen pleuritico, & turbulentis tenuibus lenibus, hi phrenerici euadunt. In morbis pulmonis valde rubicundæ sanguinis stillæ, malæ sunt. Cum raucedine, sputa viscosa, fæluginosa, mala. Si verò etiam quid attollatur iuxta pectus, in his malum est. Dolores ad collum his attenuatis perniciosi. Raucedo cum tussi, & aluo liquida, pus educit. Quibus in peripneumonia vrinæ crassæ in principio, deinde ante quartum diem attenuantur, lethale est. Qui in peripneumoniis siccis pauca concocta educunt, horrèda res est. Rubores in pectoribus sublatis, talibus perniciosi sunt. Lateris dolor in sputo bilioso præter rationem

B euanescens, mentem emouet. Febres intermittentes ob suppurationem, pleræque sudorificæ sunt. Suppuratis surditas oborta, cruentam egestionem significat. His ad finem nigra prodeunt. Lateris dolor cum febre diuturna, puris educationem fore significat. Horrore affecti frequenter ad suppurationem deueniunt. Sed & febris tales ad suppurationem perducit. Quos ex lateris dolore cibi fastidia sequuntur, oris ventriculi dolore ac sudore aliquantulum vexantur. Facie flores habente, & aluo liquidior, suppurationes circa pulmonem habent. Erectæ ceruicis spirationes facit hydrops siccus. Conuulsiones omnes quidem molestæ sunt, & dolores in principio intentos inducunt: & postea quoque aliquos commonefaciunt. Verum difficilimæ sunt circa thoracem, &

C maximè periculosa. Quibus est vomitus sanguinis, febris multa, & dolor circa mammam, thoracem, & dorsum: quibus hæc omnia fiunt, breui moriuntur. Quibus autem non omnia, neque valde tardius. Inflammati autem sunt diebus quatuordecim ad summum. Sanguinem spuenticibus confert, vt sint sine febre, & tussiant, ac doleant leuiter, & vt sputum tenue fiat ad dies bis septem. Febrile verò & tussire, ac dolere pertinaciter, & sanguinem recentem semper spueri, incommodum est. Quibus latus subleuat in tumorem ac calidus est, & inclinatis in alterum, grauitas aliqua impendere videtur, his pus ex vna parte est.

Suppuratis pulmonem per aluum pus secedere, lethale est. Quicunque vulnerati in thoracem, externa vulneris parte sanati sunt, interna non, periclitantur ne suppurati fiant.

Hippocratis

fiant. Quibus autem debilis inducta est intus cicatrix, facile **D** refringitur. Ex peripneumoniciis suppurationibus seniores magis pereunt, ex reliquis iuniores. Quibus suppuratis dum cōcutiuntur, multus strepitus de humeris fit, minus puris habēt hi, quā in quibus paucis, si difficilius spirent & meliorem colorem habeant. Quibus autem strepitus quidem nullus fit, verū difficultas spirandi fortis, & vngues liuidi, hi pleni sunt pure, & perniciosē habent. Qui spumofum sanguinem vomunt, dolore infra septum transuersum non existente, de pulmone vomunt. Ex quibus quidem magna in ipso vena rumpitur, multum vomunt, & in periculo versantur. Quibus verō minor, minus educunt, & securiores sunt.

Quibus tabidis sputum in igne grauem nidorem olet, & **E** capilli de capite fluunt, pereunt. Quibus tabidis in mare expuentibus, pus ad fundum fidit, breui pereunt. Sit autem mare in æneo vase. Quibus tabidis capilli ex capite defluunt, à profluuiio alui moriuntur. Et quibus tabidis alui profluvia accedunt, moriuntur. In tabescentibus sputa suppressa, mentem ad nugas garriendas emouent. His spes est hæmorrhoidem apparere posse. Tabes periculossimæ sunt, à ruptione venarum crassarū, & à defluxu de capite. Aetates periculossimæ sunt ad tabem, ab anno decimo octauo, vsq; ad trigelimum quintū. Pruriginosa corpora post aluum suppressam, in tabidis mala sunt. In habitibus tabescentibus cum febre, fluxiones ad gingiuas & dentes comparentes, malæ sunt. In omnibus in tumorem eleuata præcordia, mala **F** sunt, in tabidis autem pessima. Ex his qui diutina tabe perniciosē consumpti sunt, aliqui ante finem rigore apprehenduntur. Pustularum eruptiones velut ferro lancinatae, habitus tabem significant. Difficulter spirantes ex putredine, multa cruda educentes in tabe, perniciosē habent. Quibus hepaticis multum est sputum cruētum, siue subputridum, siue biliosum meracum, statim perniciosum est. In hepatico colliquatio cum raucedine, malum, tum aliās, tum si aliquantum tussiat. Hepar dolentes, os ventriculi dolentes, soporosi, rigore habentes, & aluum turbatam, tenues, cibum auersantes, multum exsudantes, purulenta per aluum egerunt.

Hepar derepentē circumcirca dolentibus, febris accedens dolorem soluit. Qui sanguinem spumofum spuunt, præcordium

A dium dextrum dolentes, de hepate spuunt, & moriuntur.

Quibus hepar vstis, velut amurca prodit, lethale est. Hydrops ex morbis acutis dolorosi fiunt, ac perniciosi. Incipiunt autem plerique à laterum mollitudine, aliqui etiam ab hepate. His igitur quibus à laterum mollitudine initium sumunt, pedes tument, & alui profluvia diuturna sequuntur, aluum non mollietia, neque dolores ex lumbis & laterum mollitudine soluentia. Quibus verò ab hepate, tussis adhuc promptè oboritur, & pedes tument, & aluus dura egerit, eaque ad necessitatem coacta, & tumores circa ipsam fiunt, partim in dextra, partim in sinistra, & rursus sedantur. In hydropicis siccis, vrinæ stillicidia mala. Malæ etiam vrinæ paruas subsidetias habentes. Hydropicis comitialis morbi affectiones accedentes perniciosæ sunt, & inter se signa praua sunt, & aluos humectant. In biliosis aluus turbata, egerens parua genituræ similia, mucosa, & dolor circa pubem inducetia, & vrinæ non facile solubiles prodeunt, ex talibus in hydropem desinunt.

Hydropico febrienti, vrinæ parua, & turbata, perniciofa est. in aqua inter cutem incipiente, alui profluvium aquosum fiens, citra cruditatem, morbum soluit. In hydrope sicco sui significationem præmittente, tormina circa intestinum tenue infidentia, mala sunt. Et hydropicis comitiales perniciosi. Hydrops qui ad curationem remisit recurrens, desperatus est. Hydropicis circa venas aqua, in aluum prolapsa, solutio fit. Dysenteria intempestive suppressa, abscessum in costis, aut visceribus, aut in articulis facit. Nunc igitur biliosos abscessus in articulis, sanguineus in costis aut visceribus fit? Dysentericis vomitus biliosus in principio, malus est. Quibus ex dysenteria acuta, humor ad purulentiam deuenit, his id quod superstat, valde album ac multum erit.

Dysentericæ, subrubræ, limosæ, largæ egestionis alui, in flammeis valde rubicundis coloribus solutæ, insaniam timorem inducunt. Dysenteria non longa splenicis commoda est, longa verò mala, desinente enim si hydrops, aut intestinorum leuitates fiunt, lethale est. In intestinorum leuitatibus, cum animalculis, dolores tormine soluti, partes circa articulos tumefaciunt, ex talibus squamulæ rubicundæ pustulosæ: hi ubi exudarunt velut flagris cæsi rubescunt. Qui in longis intestinorum leuitatibus, vna cum animalculis, tormina

K k

na patiuntur

na patiuntur, & doloribus afficiuntur, his solutis intumescunt. **D**
 Insuper rigere his malum est. Intestinorum leuitates cum spirandi difficultate, & lateris punctura, in tabem desinunt. Voluulosis vomitus, & surditas, malum. Vesicae durae & dolentes, omnino quidem malae sunt, pessimae vero cum febre continua. Nam dolores ab ipsis vesicis, ad occidendum sufficiunt, & alui his non valde egerunt. Soluit autem hos urina purulenta prodiens, albam ac leuem subsidentiam habens. His vero non solutis, neque vesica mollescente, in primis circuitibus, agrum moriturum esse timor est. Fit autem hoc maxime a septem annis: usque ad decimum quintum. Calculosi ita figurati, ut lapis ad urinarium meatum non illabatur, facile mingunt.

Quibus tuberculum est circa vesicam, quod mingendi difficultatem inducit, ad omnis generis figuras vexantur: huius **E**
 autem solutio fit, pure erumpente. Quibus urina clandestine allabatur ad pudendum, exoluuntur desperati. In urinae stillicidio voluulus accedens, septima die perimit, si non febre accedente urina aceruatim prodeat. Torpores, & sensus stupiditates, praeter morem fientes, futurae syderationis signum sunt. Qui ex vulnere impotentes fiunt corpore, febre quidem accedente citra rigorem sanantur: non autem accedente, syderati fiunt dextra aut sinistra parte. Syderatis si haemorrhoides accedant, utile est: Si vero frigiditates & torpores, malum. In syderatis ex spiritus agra latione, sudor accedens, lethale. Rursus autem in his ipsis si febris accedat, solutio fit. Syderationes derepente exolutorio modo fientes, insuper temporis progressu accedente, perniciosae sunt.

F
 Quibus ex aliqua aegritudine, ad aquam inter cutem res deuenit, his alui siccae excrementa caprini stercoreis pilulis similia egerunt, cum eliquidatione mucosa, & urina non bona, & distentiones circa praecordia, & dolores ac tumores circa ventrem, & dolores circa laterum mollitudinem, & iuxta spinas musculos accidunt: febres item, & sitis, & rufles siccae sequuntur, & circa motus spirandi difficultas, & crurum grauitas, & a cibis abstinere, & paucis ingestis explentur.

Hydropas leucophlegmatias appellatos, alui profluuium sedat. At tristitia cum silentio, & hominum auersiones, leniter eo modo affectos occidunt. Qui ex timore cum perfrigeratione mente mouetur, febres cum sudoribus, & somni

Ani vocem aliquantum intercipientes, hæc soluunt. Ex infania, ad raucedinem cum tussi, fit discessus. In furiosis conuulsio accedens, dissipationē facit. Mentis emotiones taciturnæ, non quiescentes, oculis circumspicientes, spiritum extra efferentes, perniciosæ sunt. Faciunt autem & leues syderationes diurnas. Sed & ita affecti ad insaniam deueniunt. Qui verò in ventris turbatione ita exacerbatur, his nigra circa iudicationem prodeunt. Quibus sanis hyeme circa lumbos frigiditas, & grauitas ex leui causa, & aluus suppressa, superno ventriculo probè officium suum præstante, his coxendicum morbus, aut rhenū dolor, aut vrinæ stillicidium fortassis contigerit. Quibus infernæ partes affliguntur, pruritibus antea fortibus obortis, his arenosa vrina fit, & suppressitur. Qui verò ex his perniciosè habent, his mens obtorpescit. Qui circa articulos rubicundas in superficie pustulas habent, insuperque rigorem, hi circa ventrem & inguina rubescunt, velut ex plagis dolorosis, & moriuntur.

Morbo regio affecti, non ita subtili sensu præditi, quibus singultus sunt, his alui erumpunt. Fortassis autē & suppressio fit, hi viridanti pallore inficiuntur. Dolores iuxta latus, in febribus tenuiter cōsistentes, citra notas, venæ sectio læserit, siue cibum auerfetur æger, sine præcordium sublime habuerit: & in perfrigeratione, nō sine febre torpidos, sanguinis detractio lædit: & putantes se melius habere, hi moriuntur. Caput & pedes, & manus perfrigerari, aluo & lateribus calidis, malum est. Optimum autem est, totū corpus similiter calidum ac molle esse, Conuerti autem conuenit facile agrotum, & in attollendo se leuem esse. At grauitas totius corporis, & manuum ac pedum, mala est. Si verò etiā ad grauitatem liuidi fiāt digiti ac ungues, mors propinqua est. Si verò penitus nigrescāt, minus perniciosi sunt liuidis. Verum etiam alia considerare oportet. Si enim facile fert morbum, & aliud quoddā ex bonis signis subindicat, morbus ad abscessum vertitur, & partes corporis nigrefactæ decidunt.

Testes, & pudenda reuulsa, malum significant. Flatum sine strepitu ac crepitu prodire, optimū est. Melius autē est & cum strepitu exire, quàm isthic reuolui, etiam si tali modo progressus, dolorē & desipientiā significet: si non volens homo vltro flatum ita emittat. Vlcus liuidum & ficcum, aut

Kk 2

cum

cum virore pallidum, lethale est. Decubitus optimus est, **D**
 velut quis sanus solitus fuit. At supinum iacere, cruribus ex-
 tentis, bonum non est. Si verò etiam delabatur pronus ad pe-
 des, deterius est. Lethale autem est & hiare, & dormire sem-
 per, & crura supinè iacentis valde incuruata esse ac compli-
 cata. In ventrem autem decumbere, si quis non sit adfuetus,
 delirium significat, & dolores circa ventrem. At pedes nu-
 dos habere & manus, si quis non vehementer calidus sit, & cru-
 ra dissecta, malum est. Anxietatem enim significat. Caterum ere-
 ctum sedere velle, malum est in acutis, pessimum autem peripneu-
 monicis ac pleuriticis. Dormire verò oportet noctu, inter-
 diu vigilare, Contrarium autem malum est. Minimè verò lædi
 æger poterit, si dormiat manè ad tertiam diei partem. Verum **E**
 postea somni mali sunt. Pessimum autem est non dormire, neq;
 die, neq; nocte: aut enim præ dolore & afflictione vigilarit,
 aut ab hoc signo delirabit. Quibus tempora secantur, con-
 uulsio ex contrariis sectioni partibus oboritur. Quibus cere-
 brum coccissum fuerit & doluerit, percussis, aut aliàs lapsis,
 hi statim voce priuantur, & neq; vident, neq; audiunt, & ple-
 runq; moriuntur. Quibus cerebrum vulneratur, febris ple-
 runq; ac bilis vomitus accedit, & corporis syderatio, atq; ta-
 les perniciosè habent. Ex ruptis capitis ossibus, difficillima
 cognitu sunt ea, quæ circa futuras rupuntur. Rumpuntur au-
 tem maximè à grauibus ac rotundis telis, & ex his quæ ex
 subcontrario afferuntur, & non ex plano loco. At verò de qui-
 bus ambiguum est, rupta ne sint an non, iudicare oportet, ex- **F**
 hibito ad manducandum in vtranque maxillam asphodeli
 caule, aut ferula, ita ut animaduertere iubeas, an os aliquod
 ipsi strepere videatur. Nam fracta strepere videntur, Pro-
 gressu verò temporis, fracta partim septima, partim decima
 quarta, partim etiam aliter significationem de se præbent.
 Nam & carnis ab osse discessus fit, & os liuidum, & dolores
 sanie effluente. Hæc autem ægre iam auxilium admittunt.

Quibus omentum excidit, necesse est putrefieri. Si in-
 testinum quoddam ex gracilibus dissectum fuerit, non co-
 alescit. Nervus dissectus, aut genæ tenuis pars, aut præpu-
 tium, non coalescit. Quodcunque os in corpore rese-
 ctum fuerit, aut cartilago, non augetur. Ex vulnere con-
 uulsio accedens, mala est. Ex vulnere bilis vomitus acce-
 dens

A dens malum, & maximè in capitis vulneribus. Nerui crassi si vulnerantur, plerunque claudi fiunt, & si obliqui vulnerantur præsertim, & si musculorum capita, maximè in femoribus. Moriuntur maximè ex vulneribus, si quis cerebrum fauciatum fuerit, aut spinalem medullam, aut hepar, aut septum transversum, aut cor, aut vesicam, aut venâ crassam. Moritur autem etiam, si in arteriam & pulmonem valde magnæ plagæ fiant, ita ut pulmone percussio, paucior spiritus per os procedat, quàm is est qui ex vulnere elabitur. Moriuntur autem qui in intestina vulnerati sunt, siue ex tenuibus aliquod, siue ex crassis vulneratum fuerit, si per transversum fiat plaga, & magna. Si verò parua & recta, quidam euadunt. Minimè **B** verò moriuntur vulnerati in partibus corporis ubi hæc non sunt, aut ab his quàm longissimè absunt. At verò visus obscuratur in vulneribus fientibus in supercilium, & paulo altius. Prout autem vulnus recentius est, maximè vident, cicatrice verò diutius tardante ac senescente, magis obscurari cōtingit. Fistulæ difficilimæ sunt, quæ in cartilaginosis & excarnibus locis sunt, & cauæ sunt, & procedunt ac sanie manant semper, & carūcula in osculo ipsis inest. Curatu autem faciliores sunt, quæ in mollibus & carnosiss & non nervosis existunt. Morbi hi ante pubertatem non fiunt, peripneumonia, pleuritis, podagra, nephritis, varix circa tibiā, fluxus sanguineus, cancer non congenitus, vitiligo leuce dicta non à natura insita, defluxus medullæ spinalis, hæmorrhoids, voluulus chordasus **C** appellatus non cognatus. Horum morborum nullū ante pubertatem fore expectandū est. Verūm ab anno decimoquarto, usque ad quadragesimum secundum, natura corporis morborum omnis generis ferax fit. Rursus ab hac ætate, usque ad annos sexagintatres, non fiunt strumæ, neque lapis in vesica, nisi prius existat, neque defluxus medullæ spinalis, neque nephritis, nisi ex alia ætate comitetur, neque hæmorrhoides, neque fluxus sanguineus, nisi prius fuerit. Hi usque ad senectutē absunt morbi. In mensibus muliebribus qui aquosi ante partus prodeunt, mali sunt. Ora feruido aphthæ ulcere affecta, uterum gestantibus, non sunt bona. Num & alui humectantur? Dolores ex laterū mollitudine, ad intestinum tenue transeuntes, in morbis longis, ex corruptione fœtus non valde purgata, perniciosi sunt. Quæ ex partu ac fœtus cor-

Hippocratis

ruptione multa repente concitata, supprimuntur, difficilia **D**
sunt. Rigor his infestus est, & alui turbatio, tum aliàs, tum si
præcordium doleant. Vterum gestatibus dolores capitis so-
porosi, cum grauitate fientes ac conuulsione, plerunq; mali
sunt. Quibus dolores pertinaces ex mensibus, circa super-
nam partē, & intestinum tenue, aluos humectant, aliquātum
cibos auersantur. His circa iudicationē, delationes in somnū
fiunt, & impotentes ex capitis dolore exsudent, ac perfrige-
rantur. Tales recidiuæ plerisque fientes post remissionem,
cito occidunt. Spiritus qui cum suspiriis extra feruntur, &
colliquatio præter rationē, in uterum gestantibus abortum
facit. Dolor ventris post partum, in his purulenta purgat.

Torpidæ, & præsertim in motibus, cum impotentia fra- **E**
ctæ, circa iudicationem vexatæ, anxiosæ, multum exsudent.
Alui his humectæ, malum. Menfes non supprimi commo-
dum est, ex talibus comitiales morbi fiunt, vt arbitror, qui-
busdam verò ventris subductiones diuturnæ, quibusdā hæ-
morrhoides. Prægnantibus præcordij dolor, malum & alui
his subeuntes, malum, & insuper rigere his malum. Dolor
ventris in talibus, minus malum, si limosa purgentur. Quæ
ex talibus faciliè pariunt, post partum vehemēter molestan-
tur. Prægnantibus tabescentibus quibus rubor in facie fit,
stillationes de naribus fientes hunc auertunt. Quibus ex
partu prodeunt alba, his verò suppressis cū febre surditas, &
dolor acutus ad latus fit, mente mouentur, & perniciose ha- **F**
bent. In gestatibus uterum sanguinolenta, significant post par-
tum molestias ex albis mordacibus. Tales purgationes in-
durant, singultus in his malum. Ad pedes & ad lumbos di-
stentiones ex mēsis, suppurationem inducunt, itēque ea
quæ de aluo viscosa graueolētia cū dolore prodeunt. Stran-
gulationes quoq; ex præscriptis suppurationē faciunt. Vte-
rinæ in ventriculis duricies dolorosæ acutè, perniciosum.

Vterum iam gestantibus ex feruido vlcere fluxiones do-
lorosæ, malum. Hæmorrhoids his pessimū. Quibus aluo tu-
mefacta, ad pudendū rubor deuenit, mensibus albis humidis
derepente progressis, in longis febribus moriuntur. Con-
uulsionis, si menses in principio apparuerint, febre non ac-
cedente, solutio fit. Vrinæ tenues cum aliquantula nubecu-
la in medio consistente, rigorem significant. Si à quarta die
sanguin

A sanguinis fluxus fiat, diuturnitatē significat, & alius erūpit, & crurum tumores. Vterum gerētibus capitis dolores, soporosi, cum grauitate fientes, mali sunt, fortassis autem his etiam conuulsoriū quid pati contingit. Quæ ante partum, iuxta modū bilis sursum ac deorsum erumpētis, doluerunt, facile quidē pariunt, verū si febricitent, malignē habēt: tum aliās tum si circa fauces quid vexet, aut aliquod signū in febre malignū appareat. Aquosa ante partus erumpentia mala. Vterum gestantibus saluginosæ iuxta fauces fluxiones, malum. Ante partum rigorem habere, & partus circa dolorem, periculosi. Vterum gerentibus ex feruido vlcere fluxiones, malum: conuulsæ, exolutæ, & postea perfrigeratæ excallescunt acutē. Sed & difficiles fiunt prægnantibus tumores circa tenue intestinum, quales circa eminentias osculi vteri fiunt, erectæ ceruicis spirationem inducentes. Num tales tumores gemellorum partum significant? Num & conuulsionem tales tumores faciunt? Quæ suspiriosum efferunt spiritum in febribus, abortiunt. Horrorem habentibus, lassitudine affectis, capite grauatis, menses erumpunt. Ad manū torpidæ, obaridæ, sitis exortes, menses multos emittentes, suppuratæ fiunt. Alba derepentē ex abortu decurrentia, si aliquantum riguerit: & ad femur impetus, in his tremor difficilis est. Ora feruido, aphtha appellato, vlcere affecta, vterum gestantibus alios humectant. Prægnantes præagrotantes ante partus insuper rigent. Torpefactoriæ exolutiones difficiles quidem ex partibus contingunt & mentem emouentes, non tamen perniciosæ. Sed & mensium copiam præsignificant. Quæ in partu os ventriculi prædoluere, paulo post eiiciunt. Horrores, lassitudines, capitis grauitates, colli dolores, menses extrudunt. Circa iudicationem tale fiens cum tussicula rigorem insuper inducit. Quibus puellis erectæ ceruicis spiratio contingit vterum gestantibus, his mammae suppurantur, & menses apparere in principio, malum est. Infantiæ febres acutas turbulentas non bilioso os ventriculi dolenti solunt. In sterilibus, & non parientibus sanguinis vomitus ad conceptionem prodest. Caligines mensibus multis comparentibus soluntur. Quibus mulieribus ex febribus dolor mammarū fit, sputatio cruenta non fæculenta oborta, soluit dolores. Conuulsiones ex vtero affecto sine febre faciles

Kk 4 sunt

Hippocratis

sunt, velut etiam Dorcadi. Quibus ex rigore febris lassato- **D**
 ria, menses decurrunt, collū in his dolorosum sanguinis eru-
 ptionem inducit. Vomitus minimè molestus est ex pituita
 ac bile permixtus. verū ne valde multus vomatur. At me-
 raciores vomitione deteriores sunt. Prasinus autē vomitus,
 & niger, & liuidus malus est. Si verò etiā omnes colores idē
 vomuerit, perniciosum est. Celerrimam autem mortē signi-
 ficat liuidus, & male olens. Est etiam lethalis ruber vomitus,
 & maximè si cum necessitate dolorosa vomatur. Qui anxie
 se iactantes, citra vomitum exacerbātur, male habēt, itēq;
 qui lancinantur citra vomitum. Parui vomitus biliosi sunt,
 tum aliās, tum si vigilauerint. In nigris vomitibus surdi-
 tas non nocet. Pauci sientes, celeres, biliosi, meraci vomitus. **E**
 mali sunt in alui subductione vberiore, & pertinaci lumbo-
 rum dolore. Ex vomitibus anxietates, clangores, oculi con-
 cretionē lanuginosam habētes, furiosa. Acutē infania corre-
 pti, voce intercepta, ita affecti moriuntur. In vomitu si quis
 siticulosus sit, & sitis exors fiat, malum est anxiosis vigili-
 bus. Abscessus iuxta aurem maximè fiunt anxiosis. Aluo
 turbata suppressa, breui velut culicum puncturæ erumpunt,
 & ad oculos lachrymosus abscessus deuenit. In meracis vo-
 mitibus singultus, malus, mala etiam conuulsio. Similiter
 etiam in nimis purgationibus ex medicamentis. Qui vo-
 mituri sunt, antea sputationes faciunt. Ex veratro conuulsio
 perniciofa. In omni purgatione redundante, frigiditas cum
 sudore, perniciofa est: & qui insuper vomunt, siticulosi in his, **F**
 malum. Anxiosi, lumbos dolentes, aluo humectantur. Pur-
 gationes valde rubicundorum, nigrorum, à veratro, malæ
 sunt: & tum talibus exolutio, mala. A veratro vomere rubi-
 cunda, spumosa, pauca prodest: facit tamē duricias, & suppu-
 rationes magnas abducit. Sunt autem qui talia vomunt aliās
 & pectus dolorosi, & in rigoribus exudātes, & testes intume-
 scunt, quod si cōtigerit, insuper rigent, & gracilescunt. Fre-
 quentes per eadem recidiuæ vomitoria, circa iudicationem
 nigrorum vomitū faciunt. fiunt item tremulæ. Sudor opti-
 mus quidem est, qui febrem in die iudicatorio soluit. com-
 modus autem est & qui leuat. frigidus verò, & circa caput so-
 lūm ac collum fiens, malus est. Nam & temporis diuturnita-
 tem, & periculū significat. At frigidus in febre quidē acuta,
 lethalis

- A** lethalis est. In mitiore verò, diuturnitatem significat. Sudor unà cum febre fiens in acuto morbo, malus est. Vrina in febre albam habens & leuem subsidentiam firmatam, celerem dimissionem significat. Celerem etiam ea quæ ex indiscreta, pinguedinem quandam habens, exaquescit. At subrubra, & subsidentiam subrubram habens & leuem, si quidem ante septimum diem prodeat, septima die liberat. Post septimum verò, tardius, aut omnino post tempus aliquod diuturnius. & quæ in quarto die nubeculam subrubram habet, septimo liberat, si reliqua iuxta rationem habeant. Cæterum tenuis & biliosa, & vix tenuem ac exiguam subsidentiam habens, & quæ ad melius, ac deterius mutatur, diuturna est. Hæc autem diutius consequens, aut temporis diuturnitate circa iudicationem fiente, periculo non vacat. Aquosa verò & alba perpetuò, in diuturnis morbis difficulter iudicat, & secuta non est. Nubeculae in vrinis albæ quidem & infernæ, comodæ sunt. rubicundæ verò, & nigrae, ac liuidæ, difficiles sunt. Periculosa vrina est biliosa, non subrubra, in acutis: & quæ crassiores farinæ partes refert, albas habens subsidentias, & quæ varia est colore ac subsidentia, & maximè in fluxionibus de capite. Periculosa est & quæ ex nigra in tenuem biliosam transmutatur: & quæ ex subsidentia diuellitur: & quæ ex cōpactis innatantibus, subsidentiam habet subliuidam, limosam. Num ex talibus præcordium dollet? dextrum arbitror, aut etiam cum virore pallidi fiunt? & abscessus circa aurē dolentes? His paululum erumpens alius perniciosus est. Vrinæ quæ derepente citra rationem paulatim concoquuntur, malæ sunt: & in summa, quæ citra rationem matura est, in morbo acuto, mala est. Mala est etiā valde rubicunda ex his, florulentia æruginosam continens. Alba verò & diffusa pellucida vrina, mala est, maximè si in phreniticis cōparet. Mala est quoque quæ post potum cito mingitur, & præsertim pleuriticis ac peripneumonicis. Mala est & quæ ante rigorem oleosa mingitur. Malæ sunt & in acutis viridantis palloris, non existentes in colore. Perniciosus est vrina nigræ subsidentiam habens, & nigra. In pueris verò tenuis, magis quàm crassa. Verum in tenuibus vice versa quàm in crassis. Et grandinosa genituræ similis diffusa, eadēque dolorosa. Perniciosus etiam est omnis quæ latenter mingitur. At peripneumonicis perniciosus est quæ in principio quidem

Hippocratis

cocta est, post quartū verò diem attenuatur. Pleuriticis vri- **D**
na cruenta, caliginosa, cum subsidentia varia, indiscreta, le-
thalis est plerunq; in quatuordecim diebus. Lethalis est item
in pleuriticis breui prasina, nigram subsidentia habens, aut
furfuraceam. Verum in febre ardēti stupefactorio modo de-
tentis, pessima est vrina valde alba. Vrina cruda multo tem-
pore manens, aliis signis salutaribus, abscessum & dolorē si-
gnificat, & magis in partibus sub septo trāsverso. Si verò do-
lores in lumbis oberrarint, ad coxā, & in febre, & sine febre.
At quæ emittitur vrina pinguedinem habens in subsidentia,
febrē significat. Cruenta verò in principio mista, diuturnā,
turbata, cum sudore, recidiuam. Alba velut iumentorū, capi-
tis dolorem, pelliculosa, cōuulsionē. Quæ sputo similes sub- **E**
sidentias, aut limosas habet, rigorem indicat: Quæ aranei te-
lis similes, colliquationem. At in febribus erroneis nigre nu-
beculæ, quartanā indicant. Decolores autē, nigra innatantia
in medio habentes, cum vigiliis & turbatione phrenitidem.
puluerulentæ, cum spirandi difficultate, aquā intercutē. Vri-
na aquosa aut turbata friabili asperitate, aluum liquidā fore
significat. Verū tenuis valde vrina si densa fiat, num sudorem
futurum indicat: iam verò factum, spumosa in seipsam con-
sistens. In tertianis cum horrore velut nubeculæ nigrae, hor-
roris inconstantis indicia sunt. Et pelliculosa vrinae, & cum
horrore subsidentes, conuulsoriae sunt. Vrina bonam habens
subsidentiam, derepentē non habens, dolorem & mutationē **F**
significat. At subsidentiam habens turbata desinēs, rigorem
circa iudicationem. Fortassis autem & in tertianā aut quar-
tanam transitionem. In pleuriticis vrina subrubram ha-
bens leuem subsidentiam, securam iudicationem significat.
Cum leui virore ac pallore florulenta, albam subsidentia ha-
bens, etiam celerem. At rubicunda valde & florulenta, subsi-
dentiam cum virore pallidam, leuem, sinceram habens, diu-
turnum valde turbulentum morbum qui in alium trāsmu-
tatur, non tamen perniciosum. Alba verò aquosa, subsiden-
tiam crassas polentæ partes referentem, fuluam habens, do-
lorem & periculum significat: & quæ cum virore pallida est,
fuluam crassas polentæ partes referentem subsidentiam ha-
bens, tempus & periculum significat. Vrinae quæ in his qui
iuxta aures abscessus habent, cito & modicē concoquuntur,
malæ

A malæ sunt, & perfrigerari hoc modo, malum est. Vesica intercepta tum aliàs, tum cum capitis dolore, habet quid conuulsoriū. Quæ in his cum torpore exoluuntur, difficilia sunt, non tamen perniciofa. Num & aliquantū mente mouentur?

Rhenum dolor repentinus, cum vrinæ suppressione, calculorum aut vrinarum crassarum mictionem significat. Tremores senioribus in febre fiunt, atque sic comparentes, fortassis calculos per vrinam ægri eiiciunt. Vrinæ suppressio, & grauitas in imo ventre plerunque stillicidium vrinæ significat futurum. Sin minus alium morbum ex quo ægrotare solet. In biliosis vrinæ interceptio, breui occidit. Vrina

B in febre densitatem habens diuulsam, recidiuam aut sudorem significat. In febribus longis, tenuibus, erroneis, vrinarum tenuium mictiones, splenicæ sunt. In febre aliàs aliarum vrinarum mictiones, morbum producant. Vrinæ quæ minguntur à non recordantibus nec commonefactis perniciosæ sunt. Num his minguntur velut si subsidentiam conturbasset? Quibus vrinæ pauca, grumosa, non sine febre, copia ex his progressa tenuis prodest. Prodit autem talibus ab initio, aut breui subsidentiam habet. Quibus vrinæ cito subsidentiam habent, hi cito iudicantur. Comitiali morbo laborantibus vrinæ tenues & crudæ, præter morem, sine repletionem, morbi inuasionem significant, tum aliàs, tum si quis dolor, aut cōuulsio, in summū humerū, aut collū, aut dorsum incidat, aut torpor corporis fiat, aut turbulētum insomniū viderit. Parua comparere, veluti sanguinis stillas, & vrinam & vomitum, & alui egestiones, penitus quidem malum est. Pessimum verò si propinquè inter se prodeant. Alui egestio optima est mollis, coharens ac compacta, subfulua, non valde graueolens, prodiens hora consueta, copia pro ratione ciborum ingestorum. Spissum autem fiat ad iudicationem. Commodum est & lumbricos rotundos exire simul vbi ad iudicationem tendit. In acutis spumosa, circumbiliosa alui egestio mala est. Mala item valde alba. Adhuc verò peior est, quæ farinæ ac sterquilini speciem refert. Sopor in his malus est, & cruenta egestio, & vacuorum vacuatio præter rationem. Alui interceptio, parua nigra, velut caprarum stercora, ad necessitatem coacta emittens, nasus his erumpens, malum. Viscosa meraca, aut alba

alui

Hippocratis

alui egestio, mala est. Mala est & abundè multū fermentata, **D** subpuitosa. Praua item ex compactis quibusdam innatantibus, subfidentia subliuida, purulenta, cum biliosa. Sanguinem splendidū egerere, malum est, tum aliàs, tum si quis dolor affuerit. Spumosa circumbiliosa alui egestio, mala est. Sed & morbum regium ex talibus incurrunt. In biliosis alui egestionibus spumosa florulētia, mala est, maximè ei cui lumbi doluerint, & mente motus fuerit. Num autem his dolores? Tenuis spumosa alui egestio, aquosam cum virore pallidam habens subfidentiam, mala est. Mala etiam purulenta & nigra cruēta mala, cum febre, & aliàs, & varia, abunde bile colorata egestio, mala est, tantòque deterior quantum colore magis horrenda est, praterquā in medicamentorum usu. **E** In hoc enim periculo vacat, si non copia excedat, & tenuis, mollis egestio, in febre mala est. Mala quoque sicca, friabilis, decolor, tum aliàs, tum si aluū humectet. Nigris verò antea egressis occidit. Liquida alui egestio, & aceruatim, & paulatim fiens, mala est. altera enim vigilias, altera exolutionē facere poterit. Liquida subtenuis alui egestio perfrigescens, non sine febre, mala est. Rigores in his vesicam & ventrem corripunt. Aquosa verò valde non desinens in acutis, mala: & magis si etiam sitim non habuerit. Valde rubicunda egestio in alui profluuium, mala est. Mala quoque valde cum virore pallida, aut alba, aut spumosa, aut aquosa, & parua, & viscosa, & leuis, & cum virore subpallida, mala est. Et soporosis torpefactis liquida egestio, pessima est. Lethale autē & aluū **F** sanguine manare, multa grumosa egestionē, itēq; alba ac liquida, cum ventre in tumorem eleuato. Egestio alui nigra velut sanguis, & cum febre, & sine febre, mala est. Malæ item omnes variæ abundè ex bile coloratæ. Egestionē desinētes in spumosas meracas, omnes quidem exacerbat, conuulsos autem etiam valde. Ex talibus abscessus iuxta aurem emergunt. At quæ valde liquidæ fiunt, & rursus compactæ, meracæ, stercoracæ egestionē, longitudinem morbi significant. Valde rubicunda in febre delirium. Alba stercoracea morbo regio difficilis est, itēque liquida quæ seposita ruborem capit. In sanguinis eruptionibus viscosa egestio nigris variegata, maligna est, maximè autem valde albidis.

Valde alba egestio in febre, non bene iudicat. Aluus turbulenta

A bulenta parvis frequētibz ad egerendum progressibus, maxillas intendit. Soluit etiam rubores in facie fientes. Stercoracea cum contentione egestio, alui afflictionē significat. Pituitosa verò acutē cum oris ventriculi dolore, dysenteria: fortassis autē & lumborum dolorem. Talibus alui circumfensio ad necessitatem liquida dimittens, citiūs restitans, habet quid conuulsorium, Insuper rigere his perniciosum est.

Quibus nigra per aluum prodeunt, frigidum sudorē excludunt. Quibus aluus ab initio turbatur, vrinae verò paucæ sunt, & progressu temporis aluus quidem siccatur, vrina verò tenuis redundat, his abscessus ad articulos fiunt. Progressus ad egerendum paulatim fientes, horrore ac rigorem inducunt, & quibus larga sit egestio difficilimum est quartanis incipientibus. Frequentes ad egerendum progressus paulatim fientes, pauca stercoracea subuiscosa habētes, cum præcordij & lateris dolore, morbum regium denotāt. Num his suppressis hi cum virore pallidi fiunt? Arbitror autem & hoc sanguinem effundere. At dolores in lumbis, in his sanguinem fundentibus, sanguinem egerunt splendidum. Cum sopore, & capitis dolore, calefcere insuper, perniciosum est.

Viscosæ, biliosæ, magis abscessus iuxta aurem faciunt.

Quicunque tumores aluo humecta eleuantur, cum doloribus, malum, Aluo verò suppressa, & nulla alia re nouata, cito rumpuntur, & malignus est. Vomitiones in his malæ & ferinæ. Quibus & flammeis & valde rubicundis solutis, graueolens, larga, subrubra fit, hi ne insaniant timor est. Corpus squalidam aluum malè affectam significat, In his valde rubicundæ, instar purulentæ carunculæ, egestionēs maximè prodeunt. Ad aluum biliosam mollem stercoracea egerentem, ardores comparentes, tumorem iuxta aurem faciunt.

Biliosas egestionēs surditas sedat, & surditatem sedat biliosa alui egestio. Pustulæ serpiginosæ supra inguina, ad laterum mollitudinē ac pubem fientes, aluum malè affectam significant. Exolutio dolorem soluens, aluum maximè humectat. Iuxta sedem dolorosæ suppurationes aluum turbāt. Lethales egestionēs sunt, pinguis, nigra, liuida cum graueolentia, & biliosa habēs in se simile quiddam ciceri aut fabis fressis, aut veluti floridos sanguinis grumos, & quæ odore similis est egestionī infantium, & varia eadēque diuturna,
Talis

Hippocratis Coacæ Prænotiones.

Talis autem fuerit cruenta, rametosa, biliosa, nigra, prafina, D
& simul, & permutatis vicibus. Lethalis quoque omnis est quæ
sensus ægri fugiens exit. Qui potum difficulter deglutiunt
spiritu tussiente, eructatio subtracta intro reuoluta dolorem
ventris significat. Malæ sunt etiam egestiones valde rubræ
æruiginosæ in quartanis. Et tales sanguinis fluxiones soporo-
sæ sunt, ex his couulsione moriuntur, nigris antea egressis.

Exolutiones alui repentinæ præter rationem, in diuturni-
tate tēporis consumptis, vñ cum vocis tremula interceptio-
ne, perniciosè habent. Tenuēs nigrorum egestiones horri-
ficæ, meliores talibus sunt. Tales profunt maximè in ætate
ante vigorem. Pruriginosæ affectiones omnibus nigrorum
egestionem significant, & vomitum grumosum. Et tremula E
affectiones cū morfu ac capitis dolore, nigras egestiones si-
gnificant. Ante tales, vomitus prodit, & vbi vomuerunt, mul-
tæ tales insuper detrahuntur. Quibus in alui turbatione
exacerbatur morbus, circa iudicationem nigra infernè pro-
deunt. Ex aluo diutinè affecta, vomentibus biliosis, cibum
fastidientibus, sudor multus cum impotentia repentina, oc-
cidit. In medicamentorum vsu, in defluxione tenuis abun-
de sanguis eliquescens, malum est. Duricies circa ventrem
cum sudore, in febribus cū horrore cibos auersantibus, aluo
parum ad purgationem humectata, non suppurantur. Vñ
cum febre aluus turbata salsuginoso modo, soporosos, torpi-
dos, non valde comitatur. Ex aluo liquida lassatos, caput F
dolentes, siticulosos, vigilantes, valde rubicunda egestione so-
lutos, timor est ad infantiā deuenturos esse, si difficulter spi-
rauerint. Ad hoc vbi quis cum virore pallescit, bene spira-
re noxium non est aluo insuper probè egerente. Adustæ ege-
stiones contentionem habentes, aluum malè affectam signi-
ficant, Biliosis aluus turbata, parua, frequenter egerens, disten-
dentia cum paucis mucosis, dolorem circa tenue intestinum
hæc faciunt, & vrinam non faciliè prodeuntem, ex talibus ad
hydropem desinunt. Linguae tremulae quibusdam alui eru-
ptionis futuræ signum sunt. Quibus ardor fit, & ad egres-
sas egestiones alui, insuper exsudant, his febris exacerbatur.

Ex aluis liquidis perfrigeratio cum sudore, mala. Ex aluis
liquidis, sanguis de gingiuis defluens, lethalis est. Alui ege-
stio pura superueniens, soluit febrem acutam cum sudore.

Hippoc

444 A H I P P O C R A T I S

COILIBER DE CAPITIS

VVLNERIBVS, IANO

CORNARIO MEDI.

CO PHYSICO

interprete.

*



B

Vllum capitis vulnus leuiter contemni debet. Sæpe enim cutis sola contusa ferro, aut alia aliqua re, si non diligēter, aut cum quadam cautione curetur: veluti si sanguis concretus non expurgetur: aut aliud quiddam negligatur: vlcus inrudescens non parum molestiæ exhibet, & aliquando etiam febrem inducit: & medico quidem negotia, agroto verò periculum non minus affert. Verùm hoc multò magis contingit, si caluaria, & cerebri mēbranæ rūpuntur. Quare si non singula hæc diligēter medicus curauerit, sæpe mortis causa existit. Et de his quidē omnibus etiā alibi diximus, sed & nunc dicendum est.

Cutis capitis læsa periculosa.

Primùm igitur capite vulnerato interrogare oportet: per quid vulneratū sit. Deinde quid homo fecerit, quum vulneratus fuit. Postea qua parte vulnus inflictum sit. Nam hominum capita nihil inter se similiter habent, neq; suturæ capitis in omnibus eodē loco cōsistunt. Verùm quisquis ex prior capitis parte prominentiā habet: est autem prominentia, rotunda ossis pars eminens præ alia: huius suturæ consistunt in capite, velut litera græca tau T pingitur: Breuiorē enim lineam ad prominentiam transuersam cōstitutam habet: alteram verò lineā per medium caput, sed secundū longitudinem ad collum semper habet. Qui verò ex posteriore capitis parte prominentiā habet, huius suturæ etiam cōtrario prior modo cōsistunt. Breuior enim linea ad prominentiā trāuersa cōsistit: longior autem per mediū caput, secundū longitudinem ad frōtem semper cōstituta est. Quisquis autem ex vtraq; capitis parte, & anteriore, & posteriore, prominentiam habet: huic future sunt similiter cōstitutæ, velut litera græca

Suturæ capitis diuersæ.

Prominentia capitis prioris parte.

H scrib

Suturae ca H scribitur. Consistunt autem longae quidem lineae ad utramque; **D**
pitis H lite prominentiam transuerse. Brevis autem per medium caput
rae similes. secundum longitudinem ad utranque longam lineam definiens. At qui neutra parte ullam prominentiam habet, hic suturas habet velut litera graeca X pingitur. Consistunt autem

Aliae X similes.

Os capitis duplex.

Colorosis capitis.

hae lineae, altera quidem transuersa ad tempora pertingens, altera vero secundum longitudinem, per medium caput.

Duplex autem est os iuxta medium caput: durissima vero ac delissima suprema ipsius pars existit, & infima quae est ad membranam. Consimilis est color ossis sub carne: consimilis est color ossis inferne. Secedit autem a supremo ac infimo osse, a durissimis ac densissimis, ad mollius, ac minus densum & communius, ad duplicatam laminam. Est autem duplicata **E**
 lamina cauiissima, ac mollissima, & maximè antrofa. Est aut & totum os capitis, excepta valde modica suprema ac infima parte, spongiae simile & habet os in seipso carunculas similes multas humidas, & si quis ipsas digitis conterat, sanguis utriusque ex ipsis prodierit. Sunt etiam in osse venulae tenuiores ac cauiiores, sanguine plenae. Quod igitur ad duriciem, & molliciem, & ciuitatem attinet, sic habet. Quod vero ad crassitudinem ac tenuitatem, hoc modo. Vniuersi capitis os tenuissimum est ac debilissimum, quod est circa sinciput: & carnem paucissimam ac tenuissimam hac parte os in seipso habet: & cerebrum hac capitis parte plurimum subest. Et quia haec ita se habent, ut & vulnera, & tela aequalia sint magnitudine, & minora: & similiter vulneratus quis sit, & minus: os hac capitis parte & magis contunditur, & rupitur, & magis intro contusum cedit: & lethaliora, ac ad curandum, & ad effugiendam mortem, difficiliora sunt vulnera hac parte, quam alibi in capite, & ut sint aequalia vulnera, & similiter vulneratus quis sit, & minus: homo ubi etiam alias ex vulnere moriturus est, breuiore tempore moritur, qui hac parte capitis vulnus habet, quam qui alia. Cerebrum enim & citissime & maximè iuxta sinciput sentit mala, quae & in carne, & in osse fiunt. Sub tenuissimo enim osse, ac modica carne, cerebrum est hac parte: & plurimum cerebrum sub sincipite iacet. Caterum ex reliquis ossibus id quod circa tempora est, debilissimum est. Commisura enim est infernae maxillae ad caluariam, & motus in temporibus sursum ac deorsum, velut articuli: & auditus prope ipsum

Cur verticis vulnus ceteris periculosius sit.

Cerebri situs.

Tempora cur periculosa.

Ape ipsum est: & vena per tempora extenta est, caua ac fortis.

Omni verò capitis osse robustius est os verticis: & quod Capitisque
est retro aures, robustius est quàm totum quod in anteriore parte duru
parte est: & carnem ampliore ac profundiorē in seipso hoc est os.

os habet. Et sanè his ita se habentibus, si quis & vulneribus,
& telis, omnibus aequalibus ac similibus, & maioribus ac mi
noribus, similiter sit vulneratus, & magis: hac capitis par
te os minus rumpitur, & contunditur: & si homo aliàs mori
turus est ex vulnere, si in posteriore capitis parte vulnus ha
bet, diutius durans tempore morietur. In longiore enim tē
pore os suppuratur, & deorsum ad cerebrum transpuratur,
propter ossis crassitudinem: & paucius etiam cerebrum hac
B parte subest: & plures mortem effugiunt plerunq; ex his qui
posteriore capitis parte vulnerati sunt, quàm qui anteriore.
Sed & in hyeme diutius tempore viuit homo quàm in æsta
te, quisquis etiā aliàs moriturus est ex vulnere, quacunque
capitis parte vulnus habeat. At verò sedes telorum acuto
rum ac leuiorum, ipsæ in seipsis fientes in osse, & cum fis
sura, & cōtusione, ac intrō cessione: fiunt autem hæ similiter,
& in anteriore & in posteriore capitis parte: ex his mors non
contingit secundum iustitiam, etiam si contingat. Sutura ve
rò in vlcere si compareat, osse denudato, quacunque capitis
parte vlcere fiente, debilissimus ager est ad resistendum vul
neri ac telo, si in ipsam suturam telū incubuerit: & maxime
omnium si telum in sincipite, iuxta debilissimā capitis par
tem incussum fuerit, & suturæ circa vlcus, si ita cōtingat, fue
Crint, & telum ipsas suturas contigerit. Vulneratur porro os
in capite tot modis. Singulorum autem modorum plures
species fracturæ in vulnere fiunt. Os vulneratum rumpitur,
& ossi fissuram continenti ac ambienti necesse est contusio
nem accedere, si ruptum fuerit. Nam telū quod os rumpit,
idem hoc etiam os, aut magis, aut minus cōtundit, id ipsum
videlicet os, in quo fissuram rumpit. Atque hic vnus modus
est, Species autem fissurarum omnigenæ fiunt. Nam & te
nuiores, & valde tenues conspicuæ fiunt. Quædam verò neq;
statim post vulnerationem, neque in diebus, in quibus dolo
rum vtilitas mors homini contingere potest. Rursus autem
aliquæ fissuræ crassiores ac ampliores fiunt: quædam verò
etiam valde amplæ. Et aliæ quidem in longiorem modum
LI rumpun

Varij lasio
nis modi.

Modus pri
mus.

Hippocratis Liber

Secundus
modus.

rumpuntur, alia verò in breuiorem: & alia rectiores sunt, a-
lia etiam valde recta: alia verò curuiores & curuæ ac pro-
fundiores: alia autem ad infernam partem, & per totum os.
Poterit autem & os in sua ipsius natura contundi, ita vt nul-
la fissura ad contusionem ossi accedat. Atq; hic secundus mo-
dus est, Species autem contusionis plures sunt. Nam & ma-
gis, & minus contunditur, & altius ac per totum os, & mi-
nus in altum ac per totum os, & in ampliorem & minorem
tū longitudinem, tum latitudinem. Verū harum specie-
rum nullam oculis intuēti cognoscere datur, qualisnam spe-
cie existat, & quanta magnitudine. Neque enim etiam si sint
contusa, & malum factū sit, an cōtusa sint, oculis videre con-
spicuum fit, statim post vulnerationē: quemadmodum neq; E
aliquæ fissuræ videri possunt, quæ rupto osse procul absunt.

Tertius mo-
dus.

Intrò etiam cedit os ex natura sua, vnà cum fissuris: aliàs
enim nō intrò cesserit. Nā quod intrò cedit, abrumpiturque
ac frāgitur, intrò cedit ab alio osse, quod in sua ipsius natura
manet, & sic sanè fissura adest intrò cessione. Atq; hic tertius
modus est. Intrò autem cedit os per multas species. Nam &
maior ossis pars, & minor intrò cedit: & magis ac profundi-
deorsum, & minus ac magis in superficie. Quin & sede teli
in osse contingente, fissura utiq; ad sedem accesserit, & ad
fissurā etiam contusionē magis aut minus accedere necesse
est, si quidē & fissura accedat ea parte qua & sedes facta est:

Quartus
modus.
Teli sedes.

& fissura sit in osse continente & sedem, & contusionē. Atque
hic quartus modus est, in quo sedes teli sit in osse. Sedes autē F
vocatur, quum manēre osse in sua ipsius natura, telū quod in
os incubuit, manifestum fecerit vbi icubuit. Verū in singu-
lis modis plures species sunt. Et de cōtusione quidē ac fissu-
ra, si ambo hæc ad sedem accedant: & si cōtusio sola fiat, iam
dictum est quod multæ species contusionis, & fissuræ sunt.

Hæc autem sedes ipsa in seipsa, longior ac breuior fit, &
curuior ac rectior, & orbiculatio: & multæ alia species talis
modi sunt, prout etiam figura teli fuerit: & eadem etiā pro-
fundiores deorsum, & magis & minus, & angustiores, & am-
pliores, & valde amplæ, si dissectione intercisa fuerit. Quan-
ta autem dissectio in longitudinē ac latitudinem fiat, in osse
sedes est, si alia ossa dissectionem ambientia in sua ipsorū na-
tura manserint, & nō vnà cum dissectione intrò cesserint ex
sua

De Capitis Vulneribus.

446

A sua natura. Nam si ita contingat, intrò cessio fuerit, & non amplius ossis sedes. Si verò alia capitis parte vulneratur, & vlcus habet homo, & os carne denudatū est, quintus hic modus est: & hāc calamitatē vbi facta est, nulla re iuuare queas. Quintus modus.
 Nam si passus est hoc malum, nō est quod ex ipso exquirere possis, an passus sit hoc malum, neq; qua capitis parte; & ex his fracturæ modis ad perforationem deuenit, tum si contusio ad visum incōspicua est, tū si aliquo modo manifesta fuerit: & fissura si inconspicua visui fuerit, & ad visum manifesta. Sed & si sede teli in osse fiēte, fissura ac cōtusio ad sedem accedat: & si cōtusio sola accedat ad sedem, absq; fissura: hęc quoq; ad perforationem deuenit. At verò os quod ex sua natura intrò cessit, parum perforatione opus habet: & quæ maximè intrò cesserunt, & maximè fracta sunt, & perforatione minimè opus habent. Neq; sedes ipsa in seipsa fiens, absque fissura ac cōtusione, perforatione indiget. Neq; dissectio ipsa si magna ac ampla fuerit. Dissectio enim & sedes idem sunt.

Cæterum primum spectare oportet in vulnerato, qua capitis parte, & num in debilioribus vulnus habeat: & capillos considerare circa vlcus, an dissecti sint à telo, & an intus sint in vulnere: quod si est, periculū est os carne nudum esse. Itaque dicere oportet, os aliquam læsionem à telo habere. Atq; hęc longè prius considerasse ac dixisse oportet, anteaquam hominem contingas. Vbi verò iam cōtigeris, clarè nosse conari, an nudum carne os sit, aut non, & si quidem oculis conspicuum fuerit os nudum, bene habet: Sin minus, specillo cōsiderato, & si quidem inueneris os carne nudum esse, & non sanum à vulnere, eius quod in osse est dinotionem primum facere oportet, inspiciendo & quantū sit malum, & quo opere opus habeat. Oportet etiam vulneratum interrogare vt passus sit, & quo modo. Si verò non conspicuū fuerit os, multo adhuc magis interrogationem facere oportet, an habeat quid malī, aut nō habeat: & si nudum est os, vt fractum sit, & iuxta quem modum. Nam cōtusiones & fissuras in osse non apparentes, & tamen præsentēs, ex vulnerati responsione cognoscere primum conari oportet, an tale quid passum sit os, aut nō passum, deinde ratione & opere exquirere, citra specilli admotionem. Specilli enim admotio nō indicat, an tale quid malī os passum sit, & an habeat quid in seipso, aut non

Ll 2

pas

Hippocratis Liber

passum sit. Sed sedem teli indicat specillum, & an intro ces-
 ferit os ex natura sua, & an vehementer fractum sit os: quæ
 etiam oculis conspicua videnti cognoscere datur. Rumpitur
 autem os & obscuris fissuris, & manifestis: & contunditur ob-
 tuscis contusionibus: & intro ex sua natura maxime cedit,
 quum alter ab altero sauciatur, de industria sauciare volēs:
 aut quum ex altiore loco sit iactus, aut plagæ ictus, vter tan-
 dem fuerit, magis quàm ex plano loco: & si contineat manu
 telum, siue iaciat, siue percutiat: & si fortior debiliorem vul-
 nerat. Ex his verò qui cadentes vulnerantur ad os, aut in
 ipsum os, is qui ex altissimo loco cadit, & in durissimum ac
 obtusissimū: huic periculum est vt os & rumpatur, & contun-
 datur, & intro cedat ex sua natura. Ei verò qui ex plano ma-
 gis loco cadit, & in molliorem, os minus hæc patitur, aut
 etiam non patitur. Quæcunque verò illabentia in caput te-
 la, ad os, vulnerant, ex his id quod ex altissimo loco illapsum
 est, & minimè ex plano, & quod durissimū ac obtusissimum,
 & grauissimum ac minimè leue est, & quod minimè acutū
 ac molle: hoc & ruperit os, & contuderit, & maxime sanè pe-
 riculum est vt os hæc patiatur, quum & hæc fiant, & è dire-
 cto aduersus telum, os sauciari contingat, siue ex manu per-
 cutiatur, siue iactum suscipiat, siue quid ipsi incidat, siue ipse
 collapsus saucietur ita vt quomodocunque sauciatus, osse
 aduersus telum occurrat. Quæ verò tela ex obliquo os sau-
 ciant, minus & os rumpunt, & intro ad caput contundunt,
 etiam si carne fuerit os denudatum. Nam quædam vulnera
 ita inflicta, neque denudant os carne. Profectò ex telis maxi-
 mè os rumpunt, & manifestis, & obscuris fissuris, & contun-
 dunt, & ex natura sua os intro cedere faciunt, quæ sunt ro-
 tunda, & orbiculata, & vndiquaque plana, & obtusa, & gra-
 uia, & dura: & carnem hæc contundunt, & maturam faciunt,
 ac concidunt: & vlcera fiunt à talibus telis in obliquum, Sed
 & in circulum, subcaua, & suppurata magis fiunt, ac humida
 sunt, & diutius tempore purgātur. Necesse est enim carnes
 contusas ac concisas: pus fieri ac consumi. At tela oblonga,
 multum tenuia, & acuta, & leuia, carnem magis dissecant
 quàm contundunt, & os eodem modo. Et sedem quidem in-
 ducit id ipsum quod etiā dissecauit. Dissectio enim & sedes
 idem sunt. Verum non valde os contundunt talia tela, neque
 rump

Os quæ pa-
 tiatur.

Cadentes
 de alto &
 ecōtrā quid
 patiantur.

Telorū va-
 rietas.

A rumpunt, neque ex natura sua intro cedere faciunt. Ceterum oportet supra conspectum tuum, quicquid tandem apparuerit in osse, etiam de omnibus his interrogationem facere. Nam magis & minus sauciari signa hæc sunt, si vulneratus soporē altiorē inciderit, & caligo offusa fuerit, & vertigo, & si ce-

Sauciari
signa.

B ciderit. Quum autem os carne denudatū à telo fuerit, & circa ipsas futuras vlcus fieri contigerit, difficile est sedem teli deprehendere, quæ in alio osse manifesta est, an insit in osse, aut nō insit, & an sedes facta sit in ipsis futuris. Occultat enim ipsa futura, asperior existens reliquo osse, & non satis clarum est ubi in ipso futura est, & ubi ossis sedes, si non valde magna sedes fiat. Accedit etiam ruptio ad sedem, plerunque & ipsa in futuris fiens, & fit etiam hæc ruptio rupto osse deprehensu difficilior, eo quod circa ipsam futuram ruptio fit, si rumpitur, ut plurimum. Procliue enim est hac parte os rumpi ac dissolui, propter ossis hac parte debilitatem ac raritatem, & propterea quod parata sit futura ut rumpatur ac dissoluatur. Nam reliqua ossa futuram ambientia ruptionis exortia manere possunt, eo quod robustiora sunt quam futura: Verum ruptio circa futuram fiens, etiam dissolutio futuræ est, & non facile est deprehendere, neq; si à tali sede fiat in futura, ubi rupta fuerint ac dissoluta. Verum difficilius est deprehendere fissuram ex contusione. Fallunt enim & mentē, & visum medici hæc futura, fissuræ speciem referentes, & reliquo osse asperiores existentes, nisi vehementer dissectæ fuerint ac dissolutæ.

C Dissectio autem & sedes idem sunt. Proinde si circa futuras vulnus factum fuerit, & ad os telum incubuerit, animaduersionem habere oportet, ac inuenire quod os passum sit. Nam ab æqualibus magnitudine telis, & similibus ac multo minoribus, & similiter & multo minus vulneratus, longè magis malum accipit, qui in osse in futuras telum recepit, quam qui non in futuras id recepit. Et pleraq; horū perforare oportet. Verum ipsas futuras perforare nō oportet, sed secedendo in propinquo osse perforationem facere, si perfores. Porro de curatione vulnerum in capite. & quo modo deprehendere oportet affectiones in capite sientes non manifestas, ita mihi videtur. Vlcus in capite nullo humore humectare conuenit, ac ne vino quidem; neq; cataplasmate integere, neq; linamēto curationem facere. Neq; verò comprimere oportet vlcus

Non per
fac. in

Capitis vl
cus qui cu-
retur,

Hippocratis Liber

in capite, si non in fronte fuerit, aut in loco pilis nudato, aut D
circa supercilium & oculū. Hic enim fientia vlcera, caplas-
matis ac deligatione magis opus habent, quā in aliis capi-
tis partibus. Continet ac ambit reliquum caput totam fron-
tem, partes autem vlcus ambientes, in quacunque tandē par-
te vlcera fuerint, inflammantur ac intumescunt, propter san-
guinis influxionem. Oportet autem neque ea quæ in fronte
sunt vlcera, per omne tempus cataplasmatibus integere ac deli-
gare, sed postquam inflammatio sedata est, & tumor sedatus, à
cataplasmatibus ac deligatione cessare. At in reliquo capite vl-
cus, neque linamentis, neque cataplasmatibus, neque deligatio-
ne curare oportet, si non & sectione opus habeat. Secare au- E
tem oportet vlceribus in capite ac fronte fientibus, qua par-
te os carne nudum fuerit, & læsionem aliquam ex telo habe-

**Vlceraque
secanda.**

re visum fuerit. Vlcera verò quæ non habent sufficientem
magnitudinem longitudinis ac latitudinis, ad ossis inspe-
ctionem, an quid mali passum sit à telo, & quale id passum
sit, & quantum caro contusa est, & quantam os læsionem ha-
bet: & rursus an illæsum sit os à telo, & nihil mali passum sit
& ad curationem, qualinam opus habet vlcus, & caro, & os-
sis affectio: talia sanè vlcera sectione opus habet. Si verò etiā
os quidem carne fuerit denudatum, subcaua verò fuerint vl-
cera in obliquum, cavitatem quā plurimū refecare oportet
vbi nō facile est medicamēto quocunq; peruenire. Sed & or-
biculatiores vlcera, ac plurimū subcaua, etiā ipsa refecare o-
portet, circulo diuissim inciso secundum longitudinē pro ho- F
minis natura, vt lōgius fiat vlcus. At verò in capitis sectione,
reliquæ quidem capitis partes securitatē habent dum secan-
tur. Verū tempora, & adhuc supra tempora venā, quæ per tē-
pora fertur, secare nō oportet. Cōuulsio enim corripit sectū.
Et si quidem sinistra tempora secta fuerint, dextera cōuulsio
corripit. Si verò dextera secta fuerint, sinistra cōuulsio ap-
prehendit. Quum igitur vlcus in capite secas, ossium grātia
carne denudatorum, scire cupiens an habeat os quid mali à
telo, aut nō habeat, secare oportet vulnus tanta magnitudi-
ne, quāta sursum opus habere visum fuerit. Secantē verò car-
nē ab osse diducere oportet, quæ ad mēbranam, & ad os exi-
stit. Deinde linamentū per totū vlcus adhibere oportet, quod
vlcus quā amplissimum in posterum diem faciat, cum mini-
mo do

*in partibus
secanda.*

Amo dolore. vbi verò linamentum adhibuisti, cataplasmate
 vtere, quanto tempore etiam linamento, ita vt mazam ex te
 nui polenta in aceto subigas, aut coquas, & quàm maximè vi
 scosam facias. Postridie verò vbi linamentum exemeris, in
 spectro osse quod passum est, si non conspicua tibi sit vulnera
 tio, qualisnam sit in osse: neq; cognoscas an os aliquid mali in
 se habeat, aut non habeat: telum autem ad os peruenisse ac
 læsisse videatur: radere oportet specillo rasorio, secundū lon
 gitudinem ac profunditatem pro hominis natura. & rursus
 si etiam transuersum sit os, ruptionū gratia ad visum incon
 spicuarum, & contusionis obscuræ gratia, quæ non intrò ces
 sit ex natura alterius ossis capitis. Indicat enim ipsa ratio ma
 gis, si non etiam aliàs conspicuæ fuerint hæ affectiones, ex te
 lo in osse existētes. Et si sedem teli in osse videris, tum ipsam
 teli sedem radere oportet, tum ambientia ipsam ossa, ne sape
 ad sedem ruptio accedat, & contusio, aut sola contusio, & de
 inde lateant, quum non conspicua existant. Postquam autem
 os scalp pro raseris, si quidem ad perforationem tendere ossis
 fauciatio videatur, perforare oportet, & citra perforationem
triduum non excedere, sed in hoc perforare, tum aliàs, tum
tempore calido, si ab initio curationem susceperis. Si verò su
 spiceris os ruptū, aut contusum esse, aut ambo hæc: coniectu
 ra facta quod vehementer sauciatus sit, ex vulnerati verbis:
 & quod à forti id contigit qui sauciauit, si aliud ab alio vulne
 ratus fuerit: & quod telum quo vulneratus est, ex malefico
 rum telorū ordine fuit: deinde quod vertigo & caligo ipsum
 corripuerit, & quod in soporem profundiorē inciderit, &
 quod ceciderit: His ita fientibus, si non cognoscas an os ruptū
 sit, aut contusum, aut ambo hæc, neque aliàs videas: super os
 aliquid maximè nigri coloris, nigro medicamento liquato
 subactum, imponere oportet: & subextento linteo oleo im
 buto super vlcus, & deinde mazæ cataplasmate appposito de
 ligare, postridie verò exoluto ac expurgato vlcere deradere.
 Et si sanum non fuerit, sed ruptum ac contusum, reliquū qui
 dem os rasum album erit, fissura verò & contusio, quæ nigrū
 medicamētum eliquatum in seipsam suscepit, in reliquo osse
 albo nigra erit. Cæterum hanc fissuram conspectam rursus
 secundum profunditatem radere oportet. Et si quidē radens
 fissuram hanc conspectam nigrā exemeris, & deleueris è con

Cum os an
 ruptum sit
 ambiga
 tur.

spectu sublatam, contusio quidem ossis, aut magis aut minus **D**
 facta fuit, quæ sanè etiam fissuram à scalpro rasorio deletam
 rupit. Verùm minus horrenda hæc est, & minus negotij exhi-
 buerit, fissura deleta. Si verò in profundo sit, & dum raditur
 deleri nolit, ad perforationem deuenit hæc calamitas. Sed
 perforare oportet, ac de cætero vlcus curare. Cauere autem
 conuenit vt ne aliquid mali os contrahat ex carne, si malè cu-
 retur. Nam & perforato ossi, & aliàs denudato, sed sano: & si
 læsionem aliquam ex telo habeat, & tamen sanum esse pute-
 tur, periculum magis imminet vt suppuratum fiat, etiam si
 aliàs futurum non esset, si & caro os ambiens malè curetur,
 & inflammetur ac cōstringatur. Ignescit enim, & multa flam-
 ma impletur. Et sanè os ex ambientibus carnibus in seipsum **E**
 calorem & flammam, & quæcunq; mala in seipsa habet caro,
 trahit, & ex his ita suppuratum fit. Malum est etiam humi-
ppur:
ta pte
 dam esse carnem in vlcere, & putrescentē, & ad multum tem-
 pus purgari. Quare suppuratum quidem quàm celerimè
 vlcus facere oportet. Sic enim ambientes vlcus partes quàm
 minimum inflammabuntur, & vlcus citissimè purum erit.
 Necesse est enim carnes concisas ac contusas à telo suppara-
 tas fieri ac cōsumi. Postquam autem purgatum fuerit, siccus
 fieri vlcus oportet. Sic enim citissimè sanum fiet, sicca carne
 germinante, & non humida. Et sic quoque vlceri caro non su-
 perincrescet. Eadem ratio membranæ circum cerebrum est.
 Statim enim osse perforato & exsecto, ac de membrana de-
 tracto, ipsam denudatam membranam puram quàm citissi-
 mè ac siccam facere oportet, vt ne vbi ad multū tempus hu-
 mida sit, computrescat ac in tumorem attollatur. His enim
 ita fientibus, periculum est ipsam putrescere. At verò os quod
 discedere à quouis alio osse oportet vlcere in capite fiente, &
 sede teli in osse existente, aut aliàs osse plurimum denudato:
 discedit vbi plurimum exangue factum est. Resiccatur enim
 sanguis ex osse, & à tempore, & à plurimis medicamentis.
 Citissimè enim discesserit, si quis vlcus quàm citissimè pur-
 garit, & de cætero & vlcus, & os, tum maius, tum minus re-
 siccauerit. Quod enim citissimè resiccatur ac testaceum fa-
 ctū fuerit, ex hoc facto maximè dimittitur ab alio osse, quod
 sanguinolentum ac viuum existit, & quum exangue ac sic-
 cum fiat, à sanguinolento ac viuo valde discedit. Quæcunq;
 vero

A verò ossa intro contusa cedunt ex sua ipsorum natura, rupta aut etiam dissecta, valde ampla, talia minus periculosa sunt, ubi membrana sana fuerit: & quæ pluribus fissuris & amplioribus intro rupta sunt, adhuc minus periculosa sunt, & ad de tractionem faciliora fiunt. & nullum ex talibus perforare oportet, neque periclitari ossa auferre conando, priusquam sponte sua emergāt, priore forma exoluta. Emergunt autem carne subnascente. Subnascitur autem ex duplicata ossis lamina, & ex sano osse, si superna ossis pars sola fuerit corrupta. Sic verò quam citissimè & caro subnasci ac germinare poterit, & ossa emerferint, si quis vlcus quàm citissimè suppuratum redditum, purum faciat. Et si per totum os ambæ partes **B** intro cōtusæ cesserint ad membranam, & superna ossis pars, & inferna, si quis similiter medeatur, vlcus celerrimè sanum erit, & ossa quæ intro cesserunt celerrimè emergunt ac reuertuntur. At verò puerorum ossa, & tenuiora & molliora sunt, ea de causa, quòd sanguinolentiora sunt, & caua, & neque antrofa, neque densa, neq; solida: & à telis æqualibus ac debilibus si similiter ac minus fuerint vulnerati, iunioris pueri vulnus, & magis & citius suppuratur, & in breuiori tempore quàm senioris: & si aliàs ex vulnere moriturus est, iunior seniore citius perit. Caterum si os denudatum carne fuerit, an in aduersione habita cognoscere conari oportet, si oculis videre ac noscere non datur, an ruptum sit os, & an contusum, aut solum contusum, & an sede teli facta, adsit contusio, aut **C** fissura, aut ambo hæc. Et si quid horum os passum fuerit, de tracto sanguine, paruo terebello modicè & cum cautione, os terebrare oportet. Tenuius est enim os, & minus profundum iuuenibus, quàm senioribus. Quicumq; verò ex vulneribus in capite moriturus est, & fieri non potest vt sanus fiat ac seruetur, ex his signis diuotionem morituri facere oportet, & quod futurum est prædicere. Patitur enim hæc. Quum quis os fractum, aut ruptum, aut contusum, aut quocunque modo fractum intelligens, per errorem deliquerit, & neq; raserit, neq; perforauerit, veluti os non opus habeat, & velut os sanum existat: ante decimum quartum diem febris corripiet vt plurimum in hyeme. In æstate verò post septimum diem febris corripit. & postquam hoc factum fuerit, vlcus colorem amittit, & ex ipso sanies pauca fluit, & quod inflamatū est ex ipso

Ossa fracta quæ minus periculosa.

Puerorum ossa.

Morituri signa.

emoritur, & viscosum fit, & apparet velut salsamentum, colo-
 re fuluum, subliuidum. & os tunc corrumpi incipit, & fit val-
 de nigrum, postremum pallidum aut valde album euadens.
 Quum vero iam suppuratum fuerit, in lingua pustulae ob-
 oriuntur, & desipiens aeger moritur, & conuulsio plerumque cor-
 rigit in altera corporis parte: si quidem in sinistra parte capi-
 tis vlcus habeat, in dextra corporis parte conuulsio corripit.
 Si vero in dextra capitis parte vlcus habeat, in sinistra corpo-
 ris parte conuulsio corripit. Sunt autem & qui syderati fiunt,
 atque sic pereunt ante septimum diem in aestate, aut deci-
 mumquartum in hyeme. Similiter autem significant haec si-
 gna, & in iuniore, si vulnus existat. Quapropter ubi intellexe-
 ris febrem inuadere hominem, & ex aliis signis aliquod ipsi
 accedere non cunctari oportet, sed os usque ad membranam
 perforare, aut scalp pro rasorio deradere. Est enim & ad perfo-
 rationem, & ad rasionem, facile ac expeditum. Deinde reli-
 qua sic curare, prout conducere visum fuerit, respectu ad id
 quod sit habito. Quum vero in vulnere in capite, homine
 terebello perforato, aut non perforato, osse autem denudato,
tumor rubicundus, ignis sacri speciem referens, accesserit in
 facie, & in oculis utriusque, aut altero: & si quis tumorem con-
 tingat, doleat: & febris corripiat ac rigor: & vlcus ipsum tum
 quod ad carnem attinet, tum quod ad os, bene habeat ad aspe-
 ctum: & ambientes vlcus partes bene habeant, excepto tumo-
 re qui in facie existit, & aliud peccatum nullum tumor ha-
 beat, quod ad reliquam victus rationem attinet. Huius in-
 fernam aluum deorsum purgare oportet medicamento, quod
bilem ducit, & ubi sic purgatus fuerit, & febris dimittit, &
 tumor sedatur, & sanus euadit. Medicamentum vero dare
 oportet, ad vires hominis respiciendo, prout robore validus
 fuerit. Caeterum de perforationis ac terebrationis usu, ubi
 ea necessitas ingruat, ut necesse sit hominem perforare, sic
 statuendum est. Si ab initio assumptam curationem admi-
 nistras, non oportet statim os ad membranam perforare ac
 excindere. Non enim conducit membranam osse denuda-
 tam esse, ad multum tempus male afflicta: sed postremum
ubi in aduere corrumpi ac putrescere ipsam periculum est.
 Est & aliud periculum, si statim osse ad membranam per-
 forato, ipsum auferas, ne in ipso opere membranam per te-
 rebellum

Medela hu-
 ius.

Terebra-
 tionis mo-
 dus qui.

A rebellum vulneres. Verum terebrantem oportet, ubi iam valde parum abest ut os sit perforatum, & os iam mouetur, à terebratione desistere, & finire ut os sua sponte discedat. Nam in osse perforato, & à perforatione relicto, nihil mali accedere poterit. Tenue enim iam id quod restat fit. Reliqua verò curare oportet, prout vlceri conducere visum fuerit.

Terebrantem autem frequenter eximere terebellum oportet, caliditatis ossis gratia, & in frigidam aquam immergere. Calefcens enim ex circumductione terebellum, etiam os exalfaciens ac resiccās adurit, & maius os perforationem ambiens discedere facit, quam aliàs discessurum fuisset. Si verò etiam statim volueris vsque ad membranam perforare, **B** & postea os auferre, eodem modo frequenter eximere terebellum oportet, & in frigidam aquam demergere. At si non ab initio curationem assumpseris, sed ex alio traditam susceperis, ita ut posterior tardè ad curationem deuenias, terebello exsculpto statim os ad membranam perforare ac exscindere oportet, & exempto sæpe terebello speculari: tum aliàs, tum per admotum specillum, circumcirca ipsius terebelli viam. Nam multo citius perforatur os, si suppuratum iam ac transpuratum perforaueris. & sæpe contingit ut non profundum os sit, tum aliàs, tum si ea capitis parte fuerit vulnus, qua tenuius magis quàm crassum os ipsum existit. Quare cauere oportet, ut in terebelli admotione ne fallaris, verum qua parte crassissimum os esse visum fuerit, in eam semper **C** terebellum admotum adigito, ita ut frequenter confideres, ac comoueas os, & eiicere coneris. Postquam autem abstuleris, reliqua velut vlceri conferre visum fuerit curato.

Terebra
aqua intin
genda.

H I P P O C R A T I S
C O I C H I R V R G I A E O F -
F I C I N A, I A N O C O R N A -
R I O M E D I C O P H Y -
S I C O I N T E R -
P R E T I.

Aus



**Lux du-
plex.**

**Quæ chi-
rurgo pro-
spicienda.**

Vt similia, aut dissimilia, à princi- D
pio, à maximis, à facillimis, ab his
quæ vndiquaque penitus cogno-
scuntur: quæ & videre, & tange-
re, & audire licet: & quæ visu, &
tactu, & auditu, & naribus, & lin-
gua, & intelligentia sentire licet:
quæ & quibus cognoscuntur, om-
nibus cognoscere licet. Quæ ve-
rò ad chirurgiæ officinam. Aegrotans, agens, ministri, in-
strumenta, lumen, vbi, quomodo, quot, quomodo. quando,
corpus, vasa commoda. Tempus. modus. locus. Agens aut se-
dens, aut stans, moderatè ad seipsum, ad id quod tractatur, E
ad splendorem lucis. Lucis igitur species duæ sunt, altera
communis, altera artificialis. Communis, in nobis non est.
Artificialis, etiam in nobis est. Vtriusque verò duplices vsus
sunt, aut ad lucem, aut sub lucem. Sub lucē, & modicus vsus
est, & moderatio manifesta. Ad lucem verò, ex præsentibus,
ex conferentibus luminibus, ad splendorem cōuertere opor-
tet id quod tractatur, exceptis his quæ aut latere oportet,
aut videre turpe est: ita vt id quod tractatur ex aduerso sit
luci, qui verò tractat ex aduerso eius quod tractatur, verum-
tamen vt ne tenebras inducat. Sic enim & qui agit videre po-
terit, & quod tractatur non videtur. Ad seipsum verò, si qui-
dem sedeat, pedes secundum rectitudinem sursum versus e di F
recto ad genua sint, distantia autem parua in cōsistendo in-
tercedat. Genua autem superiora sint inguinibus modicè di-
stantia, pro commoda cubiti positione ac appositione. Vesti-
tus expeditè, distinctè, æqualiter, similiter, cubitis, humeris.
Ad id verò quod tractatur, vltra & propè, & sursum ac de-
orsum, & hac aut illac, aut in medio. Vltra quidem & propè
termini sunt cubitorū gibbi, ita vt in anteriorem partem nō
excedant genua in posteriorem costas. Sursum verò, vt non
supra mammas, summas manus habeat. Deorsum vt nō infe-
rius quàm vt vbi pectus ad genua habet, summas manus an-
gulares ad brachia figuret. & in medio quidem hoc modo se
habet. Hac verò aut illac, vt non extra sedem: sed pro ratio-
ne conuersionis & corpus, & operantē corporis partem pro-
ducat. Si verò stet, vtrisque pedibus ex æquo insistere satis
est.

A est. Agere verò oportet ita vt altero pede inscendat, non eo qui est ad manum agentem, genu ad inguem sublato, velut in sede, sed & alij termini iidem sunt. At qui tractatur, reliqua corporis parte tractati inseruiat, aut stans, aut sedes, aut decumbens, quo quàm facilius ita velut figurā habens perseueret, seruans subfluxionem, subsidentiam, euerfionem, decliuitatē. Sic quæ debet seruari & figura, & forma eius qui tractatur in exhibitione, in tractatione, in habitu postea sequente. Ungues neque præminere oportet, neque deficere. Digitorū vertices ad vsum exercere, digitis quidem summis pleraque, indice ad magnum admoto. Tota verò manu prona, ambabus autem aduersis. Digitum extendere cogit

Ungues & digiti chirurgi quales esse debeant.

B magnum quiddam in medio digitorum positum, & oppositum facere magnū digitum indici. Morbum autem esse manifestum est, per quem etiā læduntur hi quibus ex natiuitate, & educatione, assuevit magnus digitus ab aliis contineri. Opera omnia exercere oportet vtrisque seorsim agendo, & ambabus simul. Similes enim sunt: ambabus cōiectando bene, pulchre, citò, non laboriosè, concinnè, expeditè. Instrumenta quidem, & quando, & qualiter dicetur. Vbi oportet, vt ne quid impediatur opus, neq; impedimento sit inter accipiendum circa operatē corporis partem. Si verò alius det, paulò prius paratus sit, & faciat vbi iusseris. Qui verò circa ægrotantē sunt, id quod tractatur exhibeāt prout visum fuerit. Reliquum autem corpus detineant, vt totum quiescat, ta-

Instrumenta in promptu sint & ministri.

C centes, & præfecto obedientes. Deligationis species duæ sunt, quæ facta est, & quæ adhuc fit. Quæ adhuc fit, citò, non laboriosè, expeditè, concinna. Cito quidem perficiendo opera. Non laboriosè, facile agēdo. Expeditio verò ad omnia parata est. Concinnitas autē iucunda aspectu est. Ex quibus verò exercitationibus hæc cōtingant, dictū est. Quæ facta est, benè, pulchrè. Pulchrè quidē, simpliciter, distinctè: aut similia ac æqualia, æqualiter ac similiter: aut inæqualia ac dissimilia, inæqualiter ac dissimiliter. Species verò hæ sunt, simplex rotunda in orbem, ascia, sima, oculus, rhombus, & semisecta: ita vt species congrua sit speciei & affectioni eius quod deligatur. Eius verò quod bene deligatur, duæ sunt species, roboris quidem, aut compressione, aut copia linteolorum, & partim quidem ipsa deligatio sanat, partim curanti-

Deligatio duplex.

Ligationū species.

bus

Modi ligandi.**Nexus.****Deligamentum
qualia.**

bus inferuit. Ad hæc igitur lex hæc est. In his autem maxima deligationis vis est. Compressio quidē, ut incumbentia non abscedant, neque penitus innitantur: sed sint quidem firmata, non autem coacta, & minus quidem extrema, minimè verò media. Nexus & filum procedant non deorsum, sed sursum, in exhibitione, & præparatione, & deligatione, & habitu postea sequente. Initia non super vlcus iniicere oportet, sed hinc aut illinc facere nexum. Nexum verò neque in semita, neque in opere, neque illic ubi inane est, ut ne in vanum iaceat. Nexum autem & filum, mollia non magna. Hoc tamen probè nosse conuenit, quòd omnis deligatio ad decliuiam & acuminata fugit, velut in capite, ad partem supernam: in tibia, ad infernam. Deligare oportet dexter partes, in sinistras: & sinistras, in dexter: excepto capite. Hoc verò secundum rectitudinem. Verum contraria ex duobus initiis. Si verò ex vno, ad id quod simile est, ad subtilitatem: velut est media pars capitis, & si quid aliud huiusmodi. Quæ vero mouentur, velut articuli, qua quidem parte inflectuntur, quam minimis ac expeditissimis linteis obuoluere oportet, velut poplitem: qua vero circumtenduntur, expansis ac latis, velut est patella. Circundare quoque insuper oportet, comprehensionis quidem gratia eorum quæ circa hæc sunt, appensionis vero vniuersi deligamenti, in quiescentibus & depressioribus corporis partibus, qualis est & supra, & infra genu. Conuenit autem in humero quidē, circumductio circum alteram alam: In inguine vero, circum alteram lateris mollitudinem: in tibia, supra suram. & quibuscunq; sursum contingit fuga, his infernè appensio conuenit: quibus autem deorsum, vice versa. Quibus verò non est, velut in capite, his in æqualissima parte comprehensiones facere oportet, & minimè obliquo deligamento uti. Nam stabilissimū postremum circumdatum, vel maximè vagabunda continet. Quibuscunque autem neque comprehensio, neque appensio linteorum, comòdè se habet: his per fila appensiones facere conuenit, ex iniiectione, aut consutione. Deligamenta sint pura, leuia, mollia, tenuia. Obuoluere verò oportet ambabus simul, aut vtrisque seorsim exercere. Conueniente autem deligatione uti, coniectura ad latitudinem ac crassitudinem partium facta. Obuolutionis capita dura, æqualia, distincta sint. In quibus

- A** quibus autem futurum est ut decidant, ea peiora sunt, quam si cito decidant. Quædam verò sunt eiusmodi, ut neque comprimere, neque decidere oporteat. Quæ verò spectat deligatio, aut subligatio, aut ambo, hæc sunt. Subligatio, quidem in causa est, ut aut disparata attrahantur, aut expansa contrahantur, aut contracta diducantur, aut distorta dirigantur, aut vice versa. Preparare autem oportet lintea leuia, tenuia, mollia, pura, lata, non confuta, neque extuberantias habentia, & sana, ut extensionem ferant, & paulò præstantiora, non sicca, sed succo imbuta singulis affectionibus familiari: & ea quidem quæ disparata abscesserunt, ita ut sublimia sedem quidē contingant, non tamē comprimant. Initium autem sumere
- B** oportet ex sana parte, & ad vlcus desinere, quo id quidem quod subest exoletur, aliud autem non amplius colligatur. Deligare autem oportet recta quidem, in rectum: obliqua verò, oblique, in figura doloris exorte, in qua neque constrictione, neque discessio contingat: ex qua ubi translatio fit ad appensionē, aut positionē, non transmutent, sed similia habeant hæc, musculos, venas, nervos, ossa, & bene posita, & bene dentata. Appensa verò aut posita esse conuenit, in figura doloris exorte, quæ est secundum naturam. In quibus verò discesserint, vice versa. At quibus expansa sunt, contrahere oportet quod ad alia quidem attinet eodē modo ex multo verò temporis spatio interposito contractionem facere oportet, & sensim progressu facto cōpressionē, primū minimē, deinde
- C** magis, ita ut terminus quod maximē facta sit, mutuus contactus fiat. Quibus verò contracta sunt, diducere: cum inflammatione quidem vice versa, sine hac autem, præparatione quidē eiusmodi, diligatione verò contraria. Distorta verò dirigere oportet, quod ad alia quidem attinet eodem modo. Verū quæ quidem abierunt, ea reducere oportet, subligatione, agglutinatione, appensione. Contraria verò contrario modo. Spleniorum longitudinem, latitudines, crassitudines, Splenia. multitudines. Longitudo, quāta est deligatio. Latitudo, quatuor aut trium digitorū, crassitudo, ut triplices aut quadruplices sint. Multitudo, ut dum circundantur non excedant, neque deficient. Quibus verò ad directionem, in longitudinem circundando, latitudinem ac crassitudinem defectu coniectare oportet, ita ut non acervatim expleamus. At verò

Lintea quæ
lia.Deligatio
qualis.

Splenia.

Hippocratis

Linteorum verò linteorum subligationes duæ sunt, prima ex loco læso **D**
subligatio. ad supernas partes desinit: altera ex loco læso, ad infernas.

Iuxta locum affectum maximè comprimere oportet: Mi-
Deligamē nimè extremas partes: Reliqua verò pro ratione: Deligatio
sa qualia. autem multam sani loci partem occupet. Deligamentorū
 multitudo, longitudo, latitudo. Multitudo quidem, vt ne su-
 peretur à loco læso, neque per ferulas illisio fiat, neque pon-
 dus, neque circuncirca inclinatio, neque effeminatio deli-
 gamenti contingat. Longitudo verò & latitudo, trium, aut
 quatuor, aut quinque, aut sex, cubitorum quidem longitu-
 do, digitorum autem latitudo. Et affulcimentī circunductio-
 nes tot sint, vt ne comprimant. Molliā verò & non crassā **E**
 sint hæc omnia, pro longitudine & latitudine, & crassitudi-

Ferulæ. dine partis affectæ. Ferulæ porrò sint leues, æquales, iuxta
 extremitates simæ, hinc atque illinc paulò minores deliga-
 tione, crassissimæ autē ea parte qua extat fractura. Quacūq;
 verò partes incuruæ sunt, & excarnes, in his quæ præminent
 cauendæ sunt, velut circa digitos & malleolos, aut positione
 aut breuitate. Affulcimentis autem fulcire ac firmare o-

Ceratum. portet, non comprimere primū. Ceratum molle, & le-
Aqua. ue, & purum sit. In aqua spectatur caliditas, multitu-

do. Caliditas, vt supra suam ipsius manum medicus affun-
 dat. Multitudo, ad laxandum quidem & attenuandum, plu-
 rima optima est. Verū ad incarnandum ac molliendum, **F**
 moderata. Moderatio autem in perfusione ea est, quòd dum
 adhuc attollitur pars, priusquam confidat, desistere oportet.
 Primū enim attollitur. Postea verò attenuatur. Positio
 sit mollis, æqualis, sursum vergens, in eminentibus corpo-
 ris partibus, velut calcaneo, & coxa, vt neque refrangatur,
 neque euertatur. Canalem toti potius cruri quàm dimidio
 adhibere oportet. Ad affectionem tamen respicere oportet;
 & reliqua quæ lædere solent, manifesta sunt. Exhibitio ve-
 rò & distentio, & restitutio, & reliqua secundum naturam
 fiant. Natura in operibus est: operis actione quid illa velit
 coniectandum est. Ad hæc autem ex quiescente, ex commu-
 ni, ex consuetudine. Ex quiescente quidem ac remisso, recti-
 tudines considerare oportet, velut in manus figura. Ex com-
 muni verò, extensionem & inflectionem, veluti figura cubiti
 ad brachium, quæ prope ad angularem accedit. Ex consuetu-
 dine.

A dine, quod non alias figuras magis ferre possunt, velut cura extensionem. In hac enim figura plurimum tempus facili-
mè durarint, nulla facta immutatione. In immutatione ve-
rò ex distentione, similia hæc habent, ad habitum aut posi-
tionem, musculos, venas, neruos, ossa, & bene posita, & bene
detenta. Distentio fit maximè circa maxima, & crassissima, **Distentio.**
ac æqualia, & vbi ambo ossa læsa sunt. Secundo loco vbi sub-
iectum, minimè vbi supernum. Si verò magis moderato fiat,
detrimentum affert; pueris exceptis. Oportet autē ipsa pau-
lulum accliuia habere. Directionis exemplum, æquiuocū,
coniugatum simile, sanum. Defricatio potest soluere, ligare, **Defricatio.**
incarnare, minuere. Dura, ligare. Molliā soluere. Multa, mi-
nuere. Moderata, crasse facere. Deligare verò oportet, pri-
mū vt is qui deligatur, dicat, maximè se compressum esse
circa læsam partem, minimè circa extremas: & firmatum se
esse, non compressum, copia linteorum, non robore: & hac
die ac nocte paulò magis, postridie minus, tertia laxè. Repe-
riatur autem postridie in extremis partibus tumor mollis.
Tertia verò die deligatum solutum gracilius sit, atque hoc
per omnes deligationes. Secunda verò deligatione an iustè
deligatum apparuerit discere oportet. Hinc autem magis &
pluribus comprimatur. Tertia adhuc magis, itēque pluri-
bus. Septima verò à prima deligatione soluta, inueniantur
gracilia ossa ac depressa. At verò in ferulas deligata, si graci-
lia & pruritus exortia, & sine vlcere fuerint, sinere oportet
vsque ad dies viginti à læsione. Si verò quid suspectum sit,
soluere in medio tempore, & ferulas tertio quoque die fir-
mare. Appensio, posicio, deligatio, vt in eodem statu sint cu-
stodire oportet. Figurarum summa hæc est, consuetudines, **Figura.**
naturæ singulorum membrorum species excurrando,ambu-
lando, stando, decumbendo, ex opere, ex remittendo. Nam
usus corroborat, ociū autē colliquat. Aut compressione, aut
copia linteorum. Quæcunque verò effuso sanguine sugilla-
tiones, aut contusiones, aut vulsiones, aut tumores inflam-
mationis exortes, ex vulnere oboriuntur, ad supernam par-
tem plurimum, ad infernam etiam parum deligare oportet.
ita vt manum aut crus non habeat in decliue, & initium su-
pra vulnus ponat, ac maximè firmet, minimè extremas par-
tes, medio modo medias, vltimam partem ad supernas cor-
poris

M m


poris

poris partes distribuendo, deligatione, compressione. Sed & D
hæc copia magis quàm robore. Maximè autem his lintea te-
nuia, leuia, mollia, pura, lata, sana debentur, vt pote sine fe-
rulis: & vberiore perfusione vti oportet. At verò elapiones
aut luxationes, aut tortiones, aut distantia disparata, aut a-
uulsiones, aut abruptiones, aut distortiones, veluti mutilatio-
nes ad alteram partem vergentes, vnde quidem excesserunt,
remittendo deligare oportet; quò verò accesserunt, intendē-
do deligamentum, vt ad contraria vergant deligata, etiam
priusquam fuerint deligata, paulò magis quàm vt ex æquo
sint, & deligamentis, & spleniis, & appensionibus, & figuris,
extensione, defriktione, directione: & hic etiam vberiore per-
fusione. Cæterum imminutiones multam sanam partem oc E
cupando deligare oportet, vt ex influxione qua colliquata
plus quàm sua sponte imminuta sunt, alia deligatione per-
mutata ad augmentum declinent, & carniū efformatio-
nem faciant. Melius autem est, vt & superna pars simul deli-
getur, velut tibia, & femorum, & alterum crus cū sano cru-
re, quo similis sit, & similiter quiescat, & similiter alimen-
tum excludant, & suscipiant. Linteorum verò copia, non cō-
pressionem vtendum est, remittendo primū id quod maxi-
mè opus habet, & vtendo defriktione incarnante, & perfusio-
ne absque ferulis. Fulcimenta porrò ac stabilimenta adhi-
bere oportet, veluti pectori, costis, capiti, & aliis quæ eiusmo
di sunt: partim pulsuū gratia, vt ne concutiantur: partim
etiam distantiarum disparatarum gratia. circa iuncturas, in F
ossibus capitis, quo firmentur. Et in tussibus, aut sternutatio-
nibus, aut alio motu, qualia sunt circa thoracem & caput sta-
bilimenta. Horum omnium eadem sunt deligationis com-
moderationes. Qua enim parte læsiones sunt, maximè com-
primendum est. Supponere igitur oportet lanam mollem,
affectioni conuenientem: deligare verò non amplius com-
primendo, vt ne pulsus concutiat: neque amplius quàm vt
distantiam iuncturarum extremitates mutuò se cōtingant.
Neque vt ruses & sternutationes fiāt, sed vt prohibeantur
stabilimentum adhibeatur, quo neque cogatur quid, neque
concutiatur.

Fulcimen-
ta quibus
aptanda.

HIPPO

454
HIPPOCRATIS
COI LIBER DE FRACTURIS, IANO CORNARIO MEDICO PHYSICO INTERPRETE.
*
Shibb
Ho. Hm
Sho. D
San. de



B Portet medicum & luxationum, & fracturarum extensiones quàm directissimas facere. Hæc enim iustissima natura est. Si verò quid vel hac, vel illac inclinarit, ad pronam partem vergere cōuenit. Minus enim hoc peccatū est quàm ad supinam. Qui igitur nihil præmeditati sunt, plerunq; nihil peccāt. Ipse enim qui deligatur, manum porrigit, vt qui ita à iusta natura cogatur. Qui verò sapientes sibi videntur medici, hi sunt nimirum qui peccant. Studij igitur non multi est manum fractā tractare, & quilibet vt ita dicam, medicus hoc potest. Verūm cogor plura de hoc scribere, quod sciam medicos esse, qui sibi sapientes esse videntur ex figuris manus in deligatione, ex quibus ipsos indoctos esse putare oportebat. Sed enim multa in hac arte hoc modo iudicantur. Quod enim peregrinum est, quum nondum intellexerint an bonum sit, magis laudāt quàm familiare, quod iam bonum esse sciunt: & alienū magis laudant quàm probè notum. Dicendum igitur, quanam medicorū peccata de natura manus, tum dedocere, tum docere velim. Nam & aliorū corporis ossiū doctrinā hic sermo affert. Manū itaq; de qua nobis sermo est, quidam pronā deligandam dedit, ille verò cogeabat sic tenere velut sagittātes, quū humerū iniiciunt, atq; ita habentē deligabat: hoc ipsum illi secundum naturā esse existimans, & in testimoniū adducebat, tum omnia cubiti ossa, quòd directionem inter se haberent, tum coloris cōcordiam, quod ipsa per seipsam rectitudinē haberet, idque hoc modo & externa & interna parte. Hoc modo etiā dicebat & carnes, & neruos, à natura, productos esse, & artem sagittandi in testimoniū citabat, & hæc di

Quæ medicus in his præstare debeat.

Medicos imperitos taxat.

M m 2 cens

cens ac faciens, sapiens esse sibi videbatur. Verum aliarum artium oblitus erat, & eorum quæ robore, & eorum quæ artificio operantur ac efficiunt: non animaduertens aliam in alio figuram secundum naturam esse, & in eodem opere alias dextræ manus figuras secundum naturam esse, alias sinistræ, si ita contingat. Alia enim figura in iaculatione secundum naturam est, alia in fundæ iactu, alia in lapidis iactu, alia in pugilatu, alia in quiescendo. Quot verò artes inuenire quis possit, in quibus non eadem figura manuum naturalis est? & in vnaquaque arte, aliter ad instrumentum quod quisque habet, & ad opus quod perficere vult manus figurantur. Ei verò qui sagittandi artem exercet, hanc figuram alterius manus optimam esse consentaneum est. Cardiniformis enim brachij pars, in cubiti secunde in hac figura innitens, ossibus cubiti & brachij rectitudinem facit, veluti totum vnum esset, & refectio articuli fracta est in hac figura. Verisimile est igitur hoc modo minimè flexibilem & rigidissimum esse hunc locum, & non superari, neque remittere, dum à dextra manu nervus trahitur, & sic nervum quidem quam plurimum trahet, à firmissimo verò ac confortissimo emitteret. Ex talibus enim sagittarum emissionibus, celeres & vehementiæ, & longinquitates fiunt. Deligationi verò cum arte sagittandi nihil commune est. Nam & ubi deligauit, si manum ita habiturus esset, multos utique dolores maiores vulnere adderet: & si flectere iuberet, neque ossa, neque nerui, neque carnes in eodem permanerent, sed suppurata deligatione alio transferrentur. Et quæ tandem est figuræ sagittarij utilitas? Et in hac parte fortasse non peccaret is qui sibi sapiens esse videtur, si ipsum vulneratum sibi manum exhibere permetteret. Alius porro medicus supinam manum præbens, ita extendere iubebat, atque hoc modo habentem deligabat, hanc figuram naturalem esse putans, coniectura ex colore facta: & ossa hoc modo secundum naturam esse existimans, eo quod os eminens circa manus iuncturam, ubi parvus digitus est, è directo esse apparet eius ossis, ex quo videntur homines metiuntur, & hæc testimonia adducebat, quod secundum naturam hoc modo figura se haberet, & rectè dicere putabatur. At verò siquidē manus supina extendatur, vehementer utique doluerit. Cognoscere autem poterit hoc quisque sua manu ita extenta, quod dolorosa est hæc figura. Nam & debiliior vir, fortio

Modus alius deligendi.

A tiores ita manibus suis comprehensum, ut cubiti flexura supina frangitur, quocumque voluerit duxerit. Neque enim si gladium in hac manu habeat, eo uti poterit, adeo violēta hęc figura est. Deinde si ubi deligauit quis, in hac figura sinat, maior quidem dolor ubi obambularit, magnus autē etiam ubi decubuerit, sentietur. Quin & flectere manum si opus fuerit, omnino necesse est & musculos & ossa aliam figuram habere. Sed & citra reliquā perniciem, in hac figura hęc ignorabat. Os enim circa iuncturam manus eminēs, iuxta paruum digitū, hoc quidē cubiti est. Quod verò in flexura est, à quo vlnā homines metiuntur, id brachij caput est. Ille verò idem os esse, & hoc & illud putabat: itēque multi alij. Est autē idē

B cum illo, is qui cubitus siue cubiti gibbus vocatur, in quē ininitimur. Si quis igitur ita supinam manus habeat, tunc & os distortum apparet, & nerui à manus iunctura tendentes, ex interna parte & de digitis, distorti fiūt. Tendūt enim hi nerui ad os brachij, vnde vlna mensuratur. Tanta sanē ac talia sunt peccata, & ignorantia naturæ manus. Si verò velut ego iubeo, manum fractam quis extēdat, os quidem quod est circa paruum digitum, ad cubiti flexuram tendēs, in directum conuertet, rectitudinem verò habebunt nerui à manus iunctura ad brachij summas partes tendētes: & manus dum appensa excipitur, in consimili figura erit, in quali etiam erat dum deligaretur, ita ut neque ambulanti, neque decumbēti, vllus dolor aut fatigatio accedat. Desidere verò hominē ita

C oportet, ut ossis pars ad clarissimā præsentem lucē constitutatur, ne is qui extensionē tractat circa sufficientē directionem fallatur. Nam periti artificis manum admotam, ne os quidē eminēs in cōtactu latere poterit. Porro ex cubiti ossib⁹ ubi non ambo fracta sunt, facilius curatio est, si supernū os sauciatus est, etiam si crassius id existat: partim quod sanū substantum fundamenti loco ipsi est, partim quod facilius occultari potest, nisi iuxta manus iuncturam sauciari contigerit. Crassa enim est caro quæ supernē nascitur. Infernum verò os excarne est, & non facile occultari potest, & vehemētiore extensione opus habet. Si verò hoc cōtritum non fuerit, sed alterum illud, vilior extensio sufficit. At si ambo fracta fuerint, fortissima extensio opus habent. In puero etenim vidi extēta magis quā oportebat. Verū plerique minus quā

Cubiti ossa
si fracta
fuerint.

M m 3

opor

oportet extenduntur. Conuenit autem facta extensione, vo- **D**
Deligatio. lis admotis dirigere: deinde cerato illito non ita multo, vt
 ne deligamenta circumfluent, ita deligare, vt summā manū
 non inferius cubiti flexura habeat, sed etiam paulo superius
 ne ad summā partem sanguis influat, sed intercipiatur. Post-
 ea linteo deligare, initio eius supra fracturam iniecto, ita vt
 firmet quidem, nō tamen admodū premat. Postquā autē cir-
 cundedit eodem loco bis aut ter, ad supernā partem deligās
 distribuatur, quo sanguinis influxiones intercipientur, & illic
 desinat. Conuenit autem prima lintea non esse longa. Secun-
 dorum verò linteorū initium supra fracturā iniicere, ita vt
 semel circundet eodē loco, deinde deorsum distribuatur, & mi- **E**
 nus premēs, & magis traducēs, quo linteum ipsi sufficiens sit,
 ad recurrendū eō vbi alterum desinit. Hic igitur lintea ad si-
 nistram, aut dextrā deligētur, aut ad vtrā partē contulerit ad
 fracturæ figurā, & in vtram declinare expedierit. Postea ve-
 rō splenia extēdere oportet modico cerato illita. Nam sic &
 mitius & stabilius se habent. Deinde sic linteis deligare alter-
 natim, modò in dextrā, modò in sinistram: & plerunq; infer-
 nē initio facto, sursum ducere aliquādo etiam supernē deor-
 sum. Extremitates autē subaridas, & in acutū abeuntes, sple-
 niis obuolutis curare oportet, ita vt copia opertiorū non
 totū aceruatim, sed particulatim corrigat. Insuper autē cir-
 ca manus iuncturā siue articulum laxē circumdare splenia co-
 portet aliās atq; aliās. Copia verò linteorum sufficiens pri- **F**
 mum, duæ partes sunt. Signa autē bene curati, & terminus re-
 ctē deligati, hæc sunt: si interrogaueris ipsum an compressus
 sit, & si cōpressum quidē se esse dixerit, sed leniter, & maxi-
 mē circa ipsam fracturā. Huiusmodi ita facta esse perpetuò
 dicere oportet eum qui rectē deligatur. Signa verò medio-
 critatis hæc sunt. Ea die ac nocte qua deligatus est ipse sibi ip-
 si videatur non minus, sed magis compressus esse. Postridie
 verò tumorem paruum, mollem, ad summam manum obor-
 tum esse. Mediocritatis enim factæ à te compressionis si-
 gnum hoc est. Desinente autem die minus compressus esse
 sibi videatur. Tertia verò die deligamenta laxa esse ipsi vi-
 deantur. Et si quid horum iam relatorum defecerit, nosce-
 re oportet deligationem moderata laxiorem esse. Si verò
 quid ex relatis abundauerit, nosse oportet ultra modum
 compress

A compressum esse. Et ex his coniectura facta, postea deligans aut laxabis, aut comprimes magis. Resolvere autem oportet tertia die, ubi extēderis. Et si primū moderatē deligasti, hāc deligationem paulo magis quā illā cōprimere oportet, & initia supra fracturā iniicere, quēadmodū etiā antea. Si quidem enim hanc prius deligaueris, sanies ex hac ad extremitates hinc atque illinc exhauritur. Si verò aliquā aliā partē prius cōprefferis, in illā ex cōpressa exhauritur. Intelligentia autē ad multa vtilis existit. Sic igitur semper incipere oportet & deligationē, & cōpressionem ex hoc loco. Reliqua verò iuxta rationē, ita ut quāto longius à fractura digressus fueris, minus cōprimas, nunquā quidem laxa omnino circūdando, sed adhærentia. Postea verò pluribus linteis deligare oportet in singulis deligationibus. Et si interrogetur, dicat se paulo magis cōpressum esse quā prius, & præsertim circa fracturā. Sed & alia, & circa tumore, & circa dolore, & circa alleuationē, pro prioris deligationis ratione fiant. Postquā verò tertius iam aderit dies, laxiora esse ipsi videātur deligamenta. Deinde resolvere oportet, & rursus paulo magis comprimendo deligare, & hoc cum omnibus linteis quibus deligandus erat. Et postea omnia ea ipsum apprehendant, quæ etiam in primis deligationum circuitibus contigerant. Vbi verò tertius aderit dies, & septimus à prima deligatione, si quidem rectē deligatus fuerit, tumor in summo manu, atq; hic non valde magnus erit: locus autem qui deligatur, in omnibus deligationibus tenuior ac gracilior cōperietur: Verū in septimo etiam valde tenuis, & ossa fracta magis mouentur, & facilius ad correctionem ducuntur. Et si hæc huiusmodi fuerint, facta coaptatione velut ad ferulas adhibendas deligare oportet, paulo magis cōprimendo quā antea, si nō dolor aliquis maior fuerit ex tumore qui est in summa manu. Postquam autem linteis deligaueris, ferulas circumponere oportet, & vinculis quā latissimis circūdare, quietis saltē gratia, ut ferularum appositio ad compressionē manus nihil faciat. Postea verò & dolor, & alleuatio, eodem modo fiant, velut in primis deligationū circuitibus. At verò ubi tertio die laxas esse dixerit, tunc postea ferulas firmare oportet, maximè quidem circa fracturam, sed & alia iuxta rationem, si quidem & deligatio magis laxa fuerit quā compri-

Ferula
quando ap-
ponenda.

M m 4 mat.

mat. Crafsissimam autem ferulā esse oportet, qua parte ex-
tat fractura, non tamen multum. Et ad hoc studium vel ma-
ximè adhibendum est, vt ferula è directo magni digiti non
ponatur, sed hac vel illac: imò neque à directo parui digiti,
qua parte os superminet in manus articulo, sed hac vel illac.
Quòd si ad fracturam conferat, hac parte aliquas ferulas po-
ni, breuiiores ipsas aliis esse oportet, vt ne perueniant ad ossa
præminētia, iuxta manus articulum. Periculum est enim vl-
cerationis, & denudationis neruorum. Oportet autem tertio
quoq; die ferulis valde leniter firmare, hoc cogitantes, quòd
ferulæ deligationis conseruandæ gratia apponuntur, non au-
tem compressiōis gratia alligantur. Si quidem igitur pro-
bè noueris, quòd in prioribus deligationibus ossa sufficien-
ter sunt directæ, & neq; pruritus infestent, neq; vlla aliqua vl-
ceratio suspecta sit: ita cum ferulis deligatum sinere oportet
donec viginti dies transgressus fuerit. In triginta enim die-
bus vniuersis maximè ex toto cubiti ossa corroborantur. Cer-
tum tamen nihil est. Nam & natura à natura, & ætas ab æta-
te valde differt. Postquam autem solueris, aquam calidam af-
fundere oportet, & postea deligare, paulo minus comprimē-
do quàm antea, & paucioribus linteis quàm prius. Et postea
tertio quoq; die soluere, ac rursus deligare, ita vt minus com-
primas, & paucioribus linteis vtaris. At verò si vbi ferulis de-
ligatus est, ossa nō rectè posita esse suspiceris, aut aliud quid
vulneratū vexet, in dimidio temporis spatio, aut paulo prius
soluere, & rursus deligare oportet. **Victus** porro his quibus
ab initio vlcera non facta fuerint, neq; ossa extra eminēt, suf-
ficit aliquanto simplicior. Verum pauciore victu vtendū est
ipsis, vsq; ad diem decimum, vt qui iam etiam quiescant: &
obsoniis tenellis vtendum, quæ transitui mediocritatem ex-
hibent. A vino verò & carnis esu abstinendum. Postea tamē
sensim progressu facto reficiēdi sunt. Hic sermo velut lex iu-
sta posita est de fracturarum curatione, & quomodo tractare
oporteat, & quomodo euentus sequi, ex iusta tractatione.
Quicquid verò non ita euētū habuerit, scire oportet, quòd in
tractatione quid defectuose, aut redūdanter factū est. Quin
& hæc insuper in hoc simplici modo cōsiderare oportet, quæ
non ita valde curare solent medici, & quidem quum omnē
curationem, & totam deligationē corrumpere possint, si nō
rectè

**Victus ho-
rū qualis.**

A rectè fiant. Si enim ambo ossa fracta fuerint, aut infernum so-
 lum: is verò qui deligatus est, in fascia quadam manum exce-
 ptam ac appēsam habeat, & plurima fasciæ pars circa fractu-
 ram existit, ita vt manus hinc atque hinc pendeat: hunc ne-
 cesse est reperiri os ad supernam partē distortum habētem.
 Si verò sic fractis ossibus, & summam manum in fascia ha-
 bet, & partem iuxta cubiti flexurā: reliqua verò cubiti pars
 nō sit eleuata: hic ad infernam partem os distortum habere
 comperietur. Proinde in fascia molli latitudinē habēte ma-
 ximam cubiti partem, & manus articulum, æqualiter suspē-
 dere ac eleuata gestare oportet. At verò si brachium fractum
 fuerit, si quidem quis extentam manum in hac figura exten-
B dat, musculus brachij extētus deligabitur. Postquam autem
 deligatus cubiti flexuram inflexerit, musculus brachij aliam
 figuram habebit. Iustissima igitur brachij extensio hæc est.
 Lignum cubitale aut paulo breuius, qualia sunt ligna quę in
 foramina ligonū immittuntur, suspendere oportet, hinc atq;
 illinc catena deligatum. Hominem verò in alta quapiam se-
 de collocatū, ita manu superincumbere oportet, vt lignum
 id sub ala sit moderatè habens, vt homo vix sedere possit, &
 ferè subleuatus sit, supposito postea alio quopiā fulcimento,
 & coriaceo puluino vno aut pluribus subiectis, quo modera-
 tam altitudinem habeat cubitus, ad rectū angulum obliqua-
 tus. optimum quidem est corium latum ac molle, aut fasciā
 latam circumdare, & magnum aliquod pondus appendere,
C quod moderatè intēdere possit. Sin minus, vir aliquis robu-
 stus in hac figura cubiti, circa cubiti flexuram deorsum co-
 gat. At verò medicus erectus stans, & alterū pedem in altio-
 re quopiā habens, aggressionem faciat, ita vt volis os diri-
 gat ac componat: facile autem dirigitur. Nam hæc extensio
 bona est, si quis ipsam rectè præparet. Deinde deliget fasciā
 rū principiis supra fracturā iniectis: & reliqua omnia, quę
 admodum prius monuimus, tractet: & easdem interrogatio-
 nes faciat. & iisdē signis vtatur, an moderatè habeat, aut se-
 cus. Et per tertium diem deliget, & magis comprimat. Et se-
 ptima aut nona die cum ferulis deliget. Et si suspicionem ha-
 beat, os non bene positum esse, intermedio tēpore soluat, &
 vbi probè collocauit, rursus deliget. Corroboratur autē ma-
 ximè os brachij in xl. diebus. Postquam verò hos excefferit, coalescat.

Quis bra-
 chiū fractū
 coapteretur.

Quæ rem-
 pore bra-
 chiū fractū
 coalescat.

M m s soluere

soluere oportet, & minus comprimere, & paucioribus quoq; D
lintheis deligare. Caterum victum quendam exquisitiorē quam
prius constituere oportet, & ad longius tēpus. Eius verò con-
iecturam facere oportet, ad tumoris qui in summa manu est
robur respiciendo. Insuper autem & ad hanc animum aduer-
tere oportet: quod brachium à natura ad externā partem in-
curuatum est, & distorqueri solet, si non bene curetur. Sed &
alia omnia ossa, quæ à natura ad hanc partem distorta sunt,
etiam dum curantur vbi fracta sunt, distorqueri solent. Vbi
igitur tale quippiā in suspicionē venerit, lata insuper fascia
brachium circūcirca complecti oportet, & circū pectus de-
ligare: & vbi quiescere volet, inter cubiti flexuram & costas,
splenium quoddam multiplex conuolutum ac complicatum E
supponere: aut aliud quid quod huic simile existat. Hoc enim
modo incuruatio ossis recta euadet. Cauere tamen oportet,

*Pes & ossa
eius fracta
quā curen-
tur.*

ut ne minus ad internam partem vergat. Pes verò hominis
ex multis ac paruis ossibus compositus est quemadmodum
etiam summa manus. Franguntur quidem non ita valde hęc
ossa, si non vnā cum corpore, ab acuto aliquo aut graui vul-
nerato. Vulnerata igitur quomodo curare oporteat, in vlce-
rationum parte refertur. Si verò quid è loco suo motū fuerit,
aut digitorum articulus, aut aliud quoddam ex ossibus sum-
mi pedis, vnumquodq; in suum locum cogere oportet, quem-
admodum & ea quæ in manu sunt. Curare verò oportet cera-
to, & spleniis, & lintheis velut etiam fracturas, exceptis feru-
lis, eodem modo comprimendo, & per tertium diem deligā- F
do. Interrogetur item is qui deligatur similiter velut in fra-

*Quoto tē-
pore hęc
sanescant.*

cturis, & de cōpressionē facta, & an laxa sit deligatio. At ve-
rò sana fiunt in xx. diebus perfectē omnia, exceptis his quæ
cum tibiæ ossibus communionem habēt, & cum ipsa è dire-
cto. Conducit autem hoc tempore decumbere. At non tole-
rant contēnentes morbum. Verū priusquā sani fiant obam-
bulant: & propterea plurimi non perfectē sanantur, sed dol-
lor ipsos sæpe meritō commonefacit. Totum enim corporis
pondus pedes vehunt. Quum igitur nondū sani iter faciunt,
articuli moti malè curantur, ideòq; alias atq; aliàs hi qui ad
tibiā sunt, dolēt. Quæ verò cum tibiæ ossibus cōmunionem
hahent & maiora aliis sunt, & vbi hęc mota sunt diuturnio-
rem medelam requirunt. Curatio tamen eadem est. Verū
lintheis

A linteis & spleniis pluribus uti oportet: Et in totū hinc atque illinc deligare, cōprimere item velut alia omnia, ea maximē parte qua emota sunt, & primas quoq; linteorū obvolutiones eodem modo facere. In vnaqua; verò resolutione, multa, calida aqua uti oportet. In omnibus enim circa articulos lēſionibus, multa aqua calida affundēda est. Cāterū cōpressiones & laxationes in iisdem tēporibus eadem signa ostendunt, quā in superioribus: & religationes eodē fiant. Sani verò perfectē hi sūt in xl. maximē diebus, si decumbere sustinuerint. Sin minus, eadē patiuntur quā prius relata sunt, & adhuc amplius. Porro quicunq; saltu de alto quopiam loco facto, in calcaneū vehementer se fulciuerunt, his ossa quidē

Qui de alto desiliūt.

B disparantur, venulæ verò sanguinē effundunt, carne circa os contusa, tumor autem accedit, & dolor multus. Os enim hoc parū non est, & supereminet quidem sub tibiæ rectitudinē, cōmunionem verò habet cum venis ac nervis principalibus. Tendo autem posterior huic ossi annectitur. Hos curare

Curatio horum.

oportet cerato, & spleniis, & linteis, & aqua plurima calida, & linteis pluribus. Et ab his opus est etiam aliis quā optimis ac lenissimis, & si quidē mollis fuerit à natura cutis circū calcaneum, sic sinere oportet. Si verò crassa & dura veluti quidā habent, incidere oportet, æqualiter, & attenuare, ita tamē ut ne vulneretur. At verò talia bene deligare non cuiusvis est. Si enim deliget quis, quomodo alia circa malleolos deligantur, ita ut aliquando circū pedem, aliquando circum tendi-

C nem, fasciæ circūdentur: hæ cōstrictiones calcaneū separant: qua parte contusio facta est. Atq; ita periculum est, ne calcanei os corrumpatur: & sanē si corruptum fuerit per omne æuum morbus durare potest. Nā & alia quæ non ex tali modo sunt, ipsum corrumpūt, sed in decubitu denigrato calcaneo, ex figuræ neglectu: aut in tibia vulnere fiēte periculoso, ac diuturno, & cōmunionem cum calcaneo habente: aut in femore: aut ubi ex alio morbo diuturnus decubitus contingit. Attamen & talibus diuturnæ ac molestæ affectiones sūt, & quæ sæpe refringantur, si nō bona diligentia, & multa quiete curentur. Quare etiā ea quæ ex tali modo corrumpuntur, supra aliquā lēſionem, magna corpori pericula inducunt. Febres enim peracutæ oboriuntur, continuæ, tremulæ, singultuosæ, mentem contingentes, paucis diebus durantes ac occiden-

occidentes. Fieri etiam possunt venarum sanguifluarū liuo- **D**
res venarū nausæ, & cancerationes ex compressione. Fieri
autem possunt hæc absque alia corruptione. Atque hæc qui-
dem relata sunt, ubi vehementissimæ contusiones fiunt. Plu-
rima tamen leniter circumcirca cōtunduntur, neque vllum
magnum curationis studium exigunt, sed rectè tamē tracta-
re oportet. Quū verò vehemens in fulciēdo illisio facta esse
visa fuerit, tūc sanè relata facere cōuenit, & deligationē plu-
rimam facere circum calcaneum obuolutam, ita vt aliquan-
do ad summas pedis partes, aliquando ad medias, aliquando
ad tibiæ partes, ex opposito lintea obuoluantur. Deligare in-
super oportet & vicina omnia, hinc atq; illinc, velut etiam **E**
prius dictum est, & vehementem compressionem non face-
re, sed cum multis linteis. Præstat autem & veratrum biben-
dum dare eadem die, aut postridiē: & tertia die resolvere ac
rursus deligare. Signa porrò an recrudescant, aut non, hæc
sunt. Quum sanguis è venis effusus, & denigrationes, & his
vicina, fiunt subrubra & subdura, periculum est ne recrude-
scant. At si quidem febre careat, sursum purgās medica-
mentum dandum est, velut dictum est: itémque si non continua
febre laboret. Si verò continua fuerit febris, medica-
mentum dandum non est. Verùm & à cibis, & à sorbitionibus
abstinendum. Potu verò vtendum aqua, non vino, sed fauo-
rum cremore decocto, aut aceto mulso dulci. Si verò non re-
crudescent, sanguis è venis effusus, & denigrationes, & vici- **F**
næ partes, cum virore subpallidæ fient, & non duræ, & bo-
num est hoc testimonium in omnibus sugillatis, sanguine è
venis subter cutem effuso, quòd non recrudescant. Quæcun-
que verò cum duricia liuescunt, ea vt denigrescant, pericu-
lum est. Cæterum hoc studio habere oportet, vt pes ple-
runq; paulo altius reliquo corpore habeatur. Sanus autē fie-
Tibiæ ossa. ri poterit in sexaginta diebus, si quieuerit. At verò tibiæ duo
ossa sunt, quorum alterum altero hac parte multo tenuius
est, illa verò parte nō multo tenuius. Cohærent autem inter
se iuxta pedem, & appendicem communē habent. Verùm in
rectitudine tibiæ non cohærent. Iuxta femur autē cohæret,
& appendicem habent, & appendix discriminationem. Lon-
gius verò paulo alterum os est, quod secundum paruum di-
gitum est. Et talis quidem est natura ossium in tibia. Luxan-
tur aut

A tur autem aliquando iuxta pedem ambo ossa, quandoque cum appendice, quandoque verò appendix tantum emouetur, quandoque alterum tantum os. Hæc autem minus molesta sunt, quàm ea quæ in articulo manus existunt, si quiescere homines sustineant. Curatio verò cõsimilis est velut illorũ. Nam & repositionem ex extensione, velut in illis facere oportet. Verũ vehementiore extensione opus habet, quanto fortius est ea parte corpus. Plerũq; tamẽ sufficiunt viri duo, alter hinc alter illinc extendentes. Si verò nõ satis robusti fuerint, facile est vehementiorem extensionem facere. Aut enim rotæ modiolũ, aut aliud quid huic simile defodere oportet, & molle quiddã pedi circũdare, & postea latis bubulis loris pede deligato, principia lororũ aut ad paxillũ, aut ad aliud lignũ alligare, atq; ita ligno in summũ modiolũ indito refringere, ita vt alij contra extendant humeris & poplite apprehensis. potest etiã superna corporis pars necessitate hac extensionis vrgeri, partim quidẽ si ita voles, ligno rotũdo leuigato altẽ defosso, partem quandã ipsius supereminentem intra crura iuxta ani & scroti intercapedinẽ applicato, quo corpus sequi prohibeat ad eos qui à pedibus extendunt. Deinde ad crus quod extenditur declinare non oportet, sed aliquem à latere assidere, qui nates retrudat, ne corpus circũtrahatur: partim verò si etiã circa alas hinc atque illinc ligna affigantur, manus autẽ extensione seruentur, apprehendat autem qui circa genu, atque ita contra extendat: partim item si quis velit, aliis loris circa genu aut circa femur deligatis, & alio rotæ modio supra caput defosso, & loris ex ligno quopiã alligatis, & ligno ita in rotæ modiolũ defixo, ad contrariã partem his qui à pedibus extendunt, adtrahere potest. Quin & si voles, pro rotarum modiolis trabem mediocrem sub lectum extendes, deinde ad trabis hinc atq; illinc caput ligna fulciens ac refringens, lora ipsis alligata intendes. Si verò & hoc velis, asellis hinc atque illinc constitutis, in ipsis extensionem facies. Sunt autem & alij multi extensionum modi. Optimum autem fuerit, si quis in magna ciuitate medicum agit, vt lignũ habeat præparatum, in quo omnes necessitates insint, tum ad omnes fracturas, tum ad omnes articulorum repositiones, ex extensione, ac vectium usu. Satis autem est si lignum fuerit & longitudine, & latitudine, & crassitudinetale, quales columnæ quernæ

Tibiæ ossa
quæ luxan-
tur.

quernæ quadrangulæ fiunt. Postquàm autē sufficienter ex- **D**
 tenderis, facile iam est articulum reponere. Eleuatur enim
 in directum supra pristinam sedē. Dirigere itaq; manuum
 volis oportet, ita vt his partim in id quod eluxatum eminet
 innitaris, partim ab altera parte infra malleolum renitaris.
 Vbi verò reposueris, si quidem fieri poterit, extentum ita de-
 ligabis. Si verò præ loris impediaris, his exolutis distentionē
 facias, donec deligaueris. Deligare autem eodē modo oportet,
 & fasciarum initiis similiter in id quod luxatum eminet,
 iniectis, & primis obuolutionibus plurimis suprà id factis
 imò etiam spleniis plurimis supra id impositis, & compres-
 sione maximè isthic fiēte. Sed & hinc atque illinc multum
 insuper deligare oportet. Magis autem hic articulus cōpres- **E**
 sione opus habet: in prima deligatione, quàm is qui in manu
 est. Postquàm autem deligaueris, sublimius reliquo corpore
 deligatam partem habeat. Positum autem ipsius ita facere
 oportet, quo quàm minimè pes dependeat. At verò attenua-
 tionem corporis ita facere oportet, prout talem vel talem
 vim ipsa luxatio habet. Aliqua enim parum, aliqua multum
 luxantur. In totum verò magis & longiore tempore, in vul-
 neribus circa crura, quàm his quæ circa manus fiunt, at-
 tuare oportet. Nā & maiora & crassiora hæc quàm illa sunt:
 & sanè etiam necessariū est quiescere corpus ac decumbere.
 Verum postea deligare articulum tertia die, neque prohibet **F**
 quicquam, neq; vrget, & alia omnia similiter velut superius
 relata curare oportet. Et si quidem quietè decumbet, suffi-
 cient quadraginta dies, si solum in suum locum ossa rursus
 defederint. Si verò quiescere nolet, non facilè quidem crure
 vti poterit, & deligatione ad multum tempus vti cogetur.
 Quæcunq; verò ossa non perfectè desident in suum locū, sed
 aliquid deficit, progressu tēporis attenuatur coxa, & femur &
 tibia. Et si quidē intro luxata fuerint, externa pars attenua-
 tur. Si verò extra, interna. Plurima autem ad internam par-
 tem luxantur. Postquàm verò ambo tibiæ ossa fracta fuerint,
 citra exulcerationē, extensione vehementiore opus habent,
 Extendere autem oportet quibusdam modis ex prædictis, si
 magnæ emotiones fuerint. Sufficiunt etiam à viris fientes
 extensiones. Plerunque enim suffecerint duo viri robusti, al-
 ter hinc, alter illinc distendentes. Intendere autem oportet
 in

Tibiæ vtra-
 que ossa cō-
 fracta sunt.

A in directū, secundū naturā, & secundum rectitudinē tibiæ ac femoris, siue tibiæ fractæ, siue femoris ossa extenderis. Sed & deligare sic oportet vtriusq; extentis, vtrū tandē horū deligaueris. Nō enim eadē cruri & manui cōferunt. Nam vbi cubiti & brachij ossa fracta fuerint deligata, manus appensa excipitur. At si extenta deligaueris, figuræ carniū alterantur inter flectendum in cubiti flexura. Fieri enim non potest, vt cubiti flexura ad multū tempus maneat extenta. Non enim sæpe in hac figura, sed in flexione esse consuevit. Quin & quum homines obambulare possint, vbi circa manum sauciati fuerint, opus habent flexione in cubiti flexura. At crurum & in ambulando, & in stando consuevit, aliquando

B quidem extensum esse, aliquando verò ferè extensum esse, ad infernam partem secundum naturā: & sanè etiam ad hoc vt reliquum corpus vehat: propterea facile est ipsi extensum esse, vbi eius necessitatem habuerit. Quin & in cubilibus sæpe in hac figura est, vt videlicet sit extensum. Postquam autem vulneratum fuerit, necessitas animi propositum in seruitutem adigit. Impotentes enim fiunt ad se attollendum, adeò vt ne meminerint quidem, vt inflectāt ac exurgant: sed quiescunt in hac figura decumbētes. Propter has igitur causas, neq; extensionis, neque deligationis figura eadem, manui & cruri conducit. Si quidem igitur suffecerit extensio quæ per viros fit, nihil aliud laboris frustra insumere oportet. Imperitiam enim arguit, machinas adhibere vbi ipsis non est

C opus. Si verò non sufficiens fuerit extensio per viros, etiam ex aliis necessariis quædam adhibere oportet, si quæ commoda fuerint. Quum autē satis iam extenta fuerint, facile est dirigere ossa, & ad naturam reducere, manuum volis ac palmis corrigendo ac coaptando. Vbi verò direxeris, linteis deligare extenta, siue ad dextram partem, siue ad sinistrā circumducere prima lintea conducatur. Initia autem ipsorum supra fracturam iniiciantur, & circū hanc primæ quoq; obuolutiones circumducantur, deinde deligando sursum ad tibiā distribuuntur, velut in fracturis dictū est. Cæterum lintea latiora esse oportet, & lōgiora, eaq; multò plura circa crus quàm in manu. Vbi verò deligaueris, super planum quoddam & molle deponere conuenit, vt neq; hac, neque illac distorqueatur: neque repandū, neque gibbum fiat. Maxime autem cōfert puluin

Canales an
sint suppo-
nendi.

puluinar, aut lineum, aut laneum non durum, laxū, per me- **D**
dium secundum longitudinē subiectum, aut aliud quid quod
huic simile existit. Nam de canalibus qui sub crura fracta
subiiciuntur, quid cōsulam ambigo, an supponere ipsos con-
ueniat, aut non: profunt enim, non tamen quantum putāt hi
qui ipsos supponunt. Non enim quiescere cogunt canales, ve-
lut illi putant. Nam neq; dum reliquum corpus aut hāc, aut
illāc vertitur, cogit canalis vt crus ne sequatur, si non ipse ho-
mo huius rei curam habeat: Neq; rursus absq; corpore crus
moueri canalis prohibet, vel in hāc, vel in illam partē. Quin
& crudelius est lignum subiicere, si non simul molle quiddā
in ipsum indatur. At utilissimum est in strato permutando, **E**
& in progressibus ad aluum exonerandam. Licet igitur, &
cum canali, & sine canali, & bene, & malè rem moliri. Verū
vulgò persuasum est, etiam medicum minus delinquere, si
canalis subiiciatur, etiam si minus hoc artem referat. Opor-
tet enim super plano quopiam ac molli cubare crus ipsum,
penitus in directum: alioqui necesse est deligationem su-
perari à distortionē, quæ in positu contingit, quocunque &
quantumcunque tandem inclinarit. Respondeat autem deli-
gatus eadem quæ etiam prius dicta sunt. Nam & deligatio-
nem talem esse oportet, & tumorem ita attolli ad extremas
partes, & laxationes ita, & religationes per tertium diem: &
quod deligatur gracilius inueniri, & deligationes magis fa-
cere, & pluribus linteis, & circūdare pedem laxè, si non vul- **F**
nus valde propinquum genu fuerit. Extendere autem mo-
deratè, & dirigere ossa, in vnaquaque deligatione oportet.
Si enim rectè curetur, & tumor secundum rationem proce-
dat: tum locus qui deligatur tenuior ac gracilior erit, tum
ossa adducta faciliora, & extensioni magis obedientia. Post-
quam autem septimus aut vndecimus aderit dies, ferulas ap-
ponere oportet, quemadmodum & in aliis fracturis dictum
est. **Ferule quādo apponēda.** Ceterum ferularum locationes vitare oportet, & se-
cundum malleorum rectitudinem, & supra tēdinem, qui est
in tibia pedis. **Tibię ossis coalescētia quota.** Ac tibię ossa corroborantur in quadraginta
diebus, si rectè curentur. Si verò suspicionem habeas, os ali-
quod directione opus habere: aut de vlceratione aliqua ti-
meas, intermedio tempore soluere, & probè coaptata reli-
gare oportet. Porro si alterum tibię os factum fuerit, ex-
tensionē

A tensione quidem debiliore opus habet, non tamen deficere, neque segniter agere, in extendendo conuenit: & maxime quidem omnes fracturas in prima deligatione, quātum eius fieri debet, extendere oportet: Sin minus, quā citissime. Quodcunque enim os non recto modo coaptatum deligans quis compresserit, locus maiori dolore vexabitur. Reliqua verò curatio eadem est. At verò ex ossibus his internum, tibia & prima tibia appellatū, molestiā maiore in curādo exhibet, & extēsiōne magis opus habet: & si non rectē coapta ossa fuerint, occultari nō possunt. Est enim totum conspiciuum & carnis exors, & hoc facto lōgē tardius progredi eo crure poterint. Si verò externum os fractum fuerit, & multò facilius ferunt, & multò melius occultare possunt, etiā si non bene fuerit coaptatum. Est enim carnosum, & cito in pedes consistunt. Plurimum enim oneris interdum tibiæ os vehit. Nam simul & vnā cum ipso crure: & oneris secundum crus rectitudine, maiore laboris partem internum os suffert. Femoris enim caput supernam corporis partem sustinet. Hoc autē intra crus est, & nō extra, sed secundum tibiæ rectitudinem: & simul reliqua dimidia corporis pars huic rectitudini magis appropinquat, & non externæ: & simul crassius est internum quā externum, quēadmodum etiam id quod in cubito est, secundum parui digiti rectitudinem, tenuius est & longius. In articulo tamen inferno nō similis est ossis longioris cōstitutio. Inæqualiter enim cubiti gibbus siue flexura, & poples flectitur. Propter has igitur causas, externo quidem osse fracto, celeres progressus fiūt, interno verò fracto, tardi. At verò si fœmoris os fractum fuerit, extensionē præ omnibus facere oportet, ita vt ne defectuosius fiat. Amplior enim facta nihil læserit. Neq; enim si quis distantia ex vehementia extensionis ossa deligauerit, fieri poterit vt deligatio ipsa teneat, vt ita distent: sed coeūt inter se ossa, quā citissime, vt intendentes ipsa remiserunt. Crassissimæ enim ac fortissimæ quum sint hac parte carnes deligationem superabunt, non ab ipsa superabuntur. Magnum enim dedecus est ac detrimētum, femur breuius efficere. Nam si quidem manus breuior fiat, & occultari poterit, & nō est magnus error. At crus si breuius fiat, claudum hominē efficiet. Sanū enim crus lōgius est, & id redarguit. Quare vtili⁹ fuerit, vt si quis

Fœmoris
os fractum.

N n malè

Curatio.

Femur fractum quorum coalescit.

malè curā dus sit, ambo potius crura fracta habeat, quā al-
 terum tantū: æquilibrium enim ipse sibi ipse fuerit hoc modo.
 Postquam verò sufficienter extenderis, directione ac coapta-
 tione per manuum volas facta, eodē modo deligare oportet,
 velut etiam prius scriptū est, iniectionis etiam fasciarum initiis
 velut dictum est, & deligationis distributione sursum versus
 fiente: & deligatus eadem respondeat, velut etiam prius: &
 doleat eodē modo, & melius habeat, & similiter rursus deli-
 getur: & ferularum appositio eadem sit. Corroboratur autē
 femur in quinquaginta diebus. Insuper verò & hoc confi-
 derare oportet, qd femur gibbosum magis est ad externam
 partem, quā ad interuā, & magis ad anteriorem, quā po-
 steriorem. In has itaq; partes etiam distorquetur, si non probè
 curetur, & sanè iisdem partibus etiā ipse seipso magis excar-
 nis est, vt neq; occultari possit in distortionē. Si igitur huius-
 modi quippiam suspectum habueris, machinari ea oportet,
 quæ in brachio distorto consulimus. Pauca insuper lintea
 circa coxam, & locum inter coxas & lumbos, circumdare o-
 portet, quo & inguina, & articulus circa intermediam crurū
 ac inguinam partē plecada appellatum, insuper deligetur.
 Nam & aliàs confert, & vt ne extremæ ferularum partes læ-
 dant, si non ad deligata adhibeantur. Deficere autem o-
 portet semper ferulas, à nuda parte, & hinc atq; illinc multum:
 & positionem ferularum semper ita prouidere conuenit, vt
 neque super os aliquod circa articulos natura prominens,
 neq; super neruum circa articulū fiat. Tumores verò iuxta
 poplitem, aut circa pedem, aut iuxta aliam quampiam par-
 tem, ex compressione eleuatos, multis lanis succidis probè
 carminatis, vino ac oleo respersis, cerato sublito, deligare o-
 portet, & vbi presserint ferulæ, citius laxare. Graciles autem
 fieri poterunt, si supra ferulas gracilibus linteis tumores de-
 ligaris, ab infima parte initio facto, ad supernam proceden-
 do. Sic enim quā citissimè tumor gracilis fieri poterit, &
 transcendit supra priores deligationes. Verū hoc deliga-
 tionis modo vti non oportet, si non periculum fuerit in tu-
 more, pustularū, aut denigrationis. Tale verò nihil fit, si non
 quis valde premat fracturā, aut suspensam habeat, aut manu
 scalpat, aut aliud quid quod irriter corpori allabatur. At ve-
 rò canalem si quis sub ipsum femur supponat, qui poplitem
 non

Canalis
quātus esse
debeat.

A nō excedat, læserit magis quàm profuerit. Neq; enim prohibuerit, quo minus & corpus, & tibia, sine femore moueatur. Noxius enim erit ad poplitem pertingens, & quod minimè oportet, id facere impulerit. Minimè verò oportet genu flectere. Omnè enim turbationē deligationibus inducit, & femore, & tibia deligata, quisquis genu flexerit. Necesse enim erit propter hoc, musculos aliàs atq; aliàs aliam figurā habere. Necesse est item ossa fracta moueri. Præ omnibus itaque faciendum, vt poples sit extentus. Videtur igitur canalis similiter prodesse, qui à coxa ad pedem vsque subiectus contineat, & aliàs circa poplitem, fasciam cum canali laxè circumdare oportet: quemadmodū infantes in cunis fasciis obuoluuntur. Deinde si femur ad supernam partem distorqueatur, aut ad latus, melius ita cōtineri poterit vnà cum canali.

B Caterūm calcanei summi valde magnā curam habere conuenit, vt & in tibiæ, & in femoris fracturis, aptè se habeat. Si enim dependeat pes, reliqua tibia firmata, necesse est iuxta anteriorem tibiæ partē, ossa incurua esse. Si verò calcaneum quidem moderato altiùs fuerit firmatum, reliqua verò tibia aliquantulū eleuata, necesse est huic ossi, vt circa anteriorem tibiæ partem, moderato cauius appareat: atque hoc adhuc magis, si calcaneum hominis natura fuerit magnū. Sed & omnia ossa tardiùs corroborantur, si nō secundum naturam posita fuerint, itémque ea quæ non in eadem figura quiescunt: & calli quoque debiliores ipsis obducuntur. Atque

C hæc quidem de his quibus ossa quidem fracta sunt, non autem extra eminent, neque aliàs vlcus factum est. Quibus verò ossa fracta sunt simplici modo, & non multifido. ita vt eadem die reposita sint, aut postridie in sedem suam recepta, & nullus timor sit fissorum ossium discesssionis: aut etiā quibus vlcus quidem factū est, ossa verò fracta non extra eminent, neque modus fracturæ talis est, vt sint segmenta à fissis ossibus separata: tales spes est simplici modo curari posse.

Et quidem sanè neque magni quippiam boni, neque mali faciētes, vlcera quidē curant aliquo purgatorio, aut picatum ceratum, vt emplastrum cruentis vulneribus idoneum, aut aliud quid ex his quæ facere solent, imponētes: Ego verò eos laudo qui splenia vino imbuta, aut lanas succidas, aut aliud quid huiusmodi deligant: Vbi verò vlcera pura facta fue-

Calcanei in
his cura.

rint, & iam coalescunt, tunc multis linteis deligare, & ferulis **D**
 dirigere conantur. Hæc quidem curatio boni aliquid facit,
 nihil autem magni mali: Ossa tamen non similiter in suam se-
 dem firmari possunt. Verum corpora aliquanto tumidiora ea
 parte fiunt, quam sit opportunum, fiunt autem & breviora his
 quibus utraque ossa, aut cubiti, aut tibiæ fracta sunt. Alij ve-
 rò rursus sunt, qui talia statim linteis curant, & hinc atque il-
 linc linteis deligant, vlcus verò ipsum relinquunt, & perfri-
 gerari sinunt. Deinde super vlcus purgatorium aliquod im-
 ponunt, & splenis vino imbutis, & lanis succidis curant. Hæc
 curatio mala est, & verisimile est eos qui ita curant, tum in
 aliis fracturis, tum in huiusmodi maximè imprudenter se-
 gerere. Maximum enim est cognoscere quomodo initium lin- **E**
 tei iniicere oportet, & qua parte maximè comprimere: & qua
 utilitas contingat, si quis initium lintei rectè iniiciat, & qua
 maximè oportet parte premat: & quæ detrimenta inducan-
 tur, si quis non rectè iniiciat, neque qua maximè oportet pre-
 mat, sed hinc atque illinc id faciat, & dictum quidem est etiã
 in superioribus, quæ ex utrisque eneniant. Testatur autem &
 ipsa hæc medicina. Necesse est enim ei qui ita deligatur, tu-
 morem ad ipsum vlcus eleuari. Etenim si sanum corpus
 hinc atque illinc fuerit deligatum, in medio verò relictum,
 iuxta relictum utrique spatium maximè intumuerit, ac deco-
 loratum reddetur, quo modo vlcus hæc non perpetietur? Ne-
 cesse igitur est, ut vlcus quidem decoloratum sit, & labiis euer-
 sum ac protuberans, verum lachrymosum & non suppuras: **F**
 ossa verò etiam quæ discessura non erant, discedant: sed &
 pulsans, & febriens vlcus fuerit. Coguntur autem propter tu-
 morem cataplasmata insuper imponere, quod & ipsum in-
 commodum est his qui hinc atque illinc deligantur. Ponderus
 enim inutile ad reliquum pulsum accedit. Postremum verò
 deligamenta resoluunt, ubi iam malum ipsis recrudescit, & de
 cetero citra deligationem curant. Neque verò minus, etiam
 si aliud quoddam eiusmodi vulnus acceperint, eodem modo
 curant. Non enim deligationem hinc atque illinc factam, & vl-
 ceris perfrigerationem, in causa esse putant, sed aliud quoddam
 infortuniū. Attamen de hoc tam multa non scripsissem, si non
 certo scirem incommodam esse hanc deligationem, & multos
 esse qui ita curent, & magni momenti esse hanc rem dedi-
 scere

Quid potius
 si in his,

A scere, & testimonio hæc esse, quod rectè scripta sint ea quæ prius scripta sunt, siue maximè præmendæ sint, siue minimè ipsæ fracturæ. Oportet autem ut in summa dicā, his quibus non est futuri discessus ossis expectatio, eandem curationem adhibere, veluti his quibus os fractum fuerit, vlcus autē non habent. Nam & extentiones, & directiones ac coaptationes ossium eodem modo facere oportet, & consimilem deligationem. Super ipsum enim vlcus splenium tenue duplex, picato cerato illitum deligandum est, & circumsitæ partes cerato albo illinendæ. Verum lintea, & reliqua latiora, aliquantum fissa sint magis, quàm si nō vlcus haberent: & id quo primū deligamus, multo latius sit ipso vlcere. Quæ enim angustiora sunt quàm vlcus, cinctum vlcus tenent, id quod fieri non conuenit, sed prima circumductio totum vlcus comprehendat, & linteam hinc atque illinc præmineat. Itaque

Ligationis
modus.

B gustiora sunt quàm vlcus, cinctum vlcus tenent, id quod fieri non conuenit, sed prima circumductio totum vlcus comprehendat, & linteam hinc atque illinc præmineat. Itaque premere paulo minus, quàm si vlcus nō haberent. Distribueda verò est deligatio, velut etiā prius dictum est. Lintea autem semper quidē mollis modi sint, magis tamē in talibus, quàm si vlcus non esset. Copia verò linteorum nō minor sit prius relatis, sed etiam aliquanto amplior. Si verò deligatus fuerit, videatur is sibi lintea firmata quidē esse, nō autem compressa: dicatq; super vlcus maximè firmata esse. Eadem autē tēpora esse oportet, ad hoc ut magis firmata esse videantur, & ad hoc ut magis laxa videātur, quemadmodum etiā in superioribus dictū est. Deligatio etiā postea facienda per tertium diē, ita ut omnia postea faciamus cōsimili modo, velut prius dictū est, præterquā quòd in totū, minus aliquatō hæc quā illa comprimenda sunt. Quòd si secundū rationem, quæ fieri par est, facta fuerint, gracilior quidē semper cōperietur vlceris pars, graciliores autē & reliquæ omnes, quæ à deligatione continentur: & suppurationes citiores erunt, quàm in vlceribus aliter curatis: & quæcunque carunculæ in vulnere denigratæ sunt & mortificatæ, citius abrumpuntur ac excidunt in hac curatione, quā in aliis: & ad cicatricē citius peruenit vlcus, si hoc modo quàm si alio curetur. At omnium horum causa est, quòd & locus circa vlcus gracilis sit, & quæ circumsitæ sunt gracilia omnia sunt. In reliquis igitur omnibus consimiliter curare oportet, velut ossa sine vlcerationibus

Nn 3

fracta

Ferularum appositio. fracta, Verū ferulas apponere non oportet. Et propterea lin- **D**
 tea his, plura esse debent quā aliis, & quod minus compri-
 mantur, & quod ferule tardius apponantur. Si tamen ferulas
 apposueris, non secundum rectitudinem vlceris appones, sed
 ita vt laxæ adhibeantur, prouidendo vt nulla magna ab ipsis
 constrictio fiat. Dictum autem hoc quoque est in his quæ
 prius scripta sunt. Victus autem rationem exquisitiorem, &
 longiori tempore constituere oportet, his quibus ab initio
 vlcera fiunt, & quibus ossa extra eminent, & vt in summa di-
 catur, in vehementissimis vulneribus exquisitiore, eoque
 diuturniore victu vti conuenit. Eadem etiam curatio vlce-
 rum est in his quibus ossa quidem fracta sunt, sed vlcus ab **E**
 initio non fuit. Verū inter medendum factum est, aut vlce-
 re linteis magis compresso, aut à ferularum infessu, aut ab
 alia quapiam causa. Cognoscuntur autē tales fracturæ, an vl-
 cus subsit, & dolore, & pulsibus, & tumor qui in extremis par-
 tibus est, talibus durus efficitur, & si digitum admoueris, at-
 tollitur: sed & cito rursus subterfugit. Si igitur tale quid su-
 spicatus fueris, soluere oportet: & si quidem pruritus circa
 subligationes fuerit, aut alia quapiam parte deligata, cerato
 picato pro altero vti. Si verò horū nihil fuerit, verū ipsum
 vlcus irritatum, reperitur nigrum valde aut impurum: & fu-
 turum est vt & carnes suppurētur, & nerui insuper excidant,
 hos omnino perfrigerare nō oportet, neq; quicquā has sup-
 purationes vereri, sed curare in reliquis omnibus consimili **F**
 modo, velut eos quibus ab initio vlcus factū est. Linteis verò
 deligare incipere oportet valde laxis, à tumore qui in extre-
 mis partibus consistit, atq; ita deligationem distribuere sem-
 per sursum versus, nusquā quidem cōprimendo, sed maximè
 super vlcus firmādo, super alia verò minus, & prima quidem
Linteorum quantitas. lintea hæc munda sint, & nō angusta. Copia verò linteorum
 tanta sit, quāta est si cum ferulis deligatio fiat, aut paulo mi-
 nor. Super ipsum autē vlcus sufficiens est splenium cerato al-
 bo illitum. Siue enim caro, siue nervus denigratus fuerit, ex-
 cidet. Talia enim acris curare non oportet, sed mollibus,
 velut ambusta. Deligare verò postea per tertiū diem conue-
 nit, ferulas autē non apponere. Quiescere verò magis quā
 prius, & modico cibo vti. Scire verò expedit, siue caro, siue
 nervus sit, id quod excidet, q̄ hoc modo multo minus vltra
 depasci

- A** depascitur, & multo citius excidet, & multo graciliores circumsitæ partes erunt, quã si quis exolutis linteis, aliquid medicamentorum purgatoriorũ super vlcus imponat. Quin & si exciderit id quod suppurasset, & citius carne repletur, & citius ad cicatricem peruenit, quã si illo aut alio modo curetur. Omnia sanè in hoc fita sunt, vt quis hæc rectè & moderatè deligare sciat. Conferūt insuper & figuræ quales esse oportet, & reliqua victus ratio, & linteorum aptitudo. Si verò in recens vulneratis decipiaris, ossiũ discessum non fore putas, quum tamẽ expectatio sit illa emersura esse, modum curationis timere non oportet. Nihil enim magni mali cõtigerit, si modo bonas ac innoxias deligationes manu facere noueris.
- B** Signum autẽ hoc est, si ossiũ discessus in hoc curationis modo futurus est. Pus enim multũ fuit ex vlcere, & gliscere ac turgere affecta pars videtur. Frequẽtius igitur deligare oportet, ob nimiam humiditatẽ, & quòd aliàs etiã febres fiunt. Et si quidẽ valde præmantur à deligatione & vlcus, & circumsitæ partes graciles fiunt. Quicunq; itaq; valde tenuium ossium discessus fiunt, hi nulla magna mutatione opus habẽt, nisi vt laxius deligatio fiat, vt ne pus intercipiatur, sed facilè effluere possit. Sed & frequẽtius deligare oportet, donec os discesferit, & ferulas non apponere. Quibus verò maioris ossis discessus expectatur, siue hoc à principio prænoueris, siue etiam postea cognoueris, non amplius eadẽ curatione opus habet. Sed extensiones & directiones ita facere oportet, velut dictũ
- C** est: splenia verò duplicata, latitudine quidẽ dimidio palmo non minora: quale tamẽ fuerit vulnus iuxta hoc coniectura facienda est: longitudine verò paulo quidem breuiora, quã vt bis circum fauciatum corpus circumduci possint, multo verò longiora quã vt semel. Copia verò tot sint, quot facere cõducit. Hæc in vino nigro austero madefacta, ex medio initio factò circũuoluere oportet, quemadmodũ fascia ex duobus initiis deligatur: & deinde asciatim alternatione ipsorũ facta, initia dimittere. Hæc & super ipsum vlcus adhibenda sunt, & ab vtraq; vlcere parte, & ne comprimantur, sed saltẽ fulciendi vlcere gratia incũbant. Supra ipsum verò vlcus, ceratũ picatum imponere oportet, aut aliquod ex emplastris eruentis vulneribus destinatis, aut aliud quoddam medicamentum, quod familiare acidoneum sit humectationi adhibendũ

Ossis maioris abscessus.

Quid estas
& hyēs in
his poscat.

Quis sine li
gatione cu
retur.

Hæ pilæ
quid sibi
velint.

Virgæ cor
neæ.

bendæ. & si quidem æstatis tempus fuerit, vino madefacere **D**
splenia frequēter oportet. Si verò hyems, lanas succidas mul
tas vino & oleo imbutas adhibeto. Oportet autē capræ pel
lem substernere, & defluxiones obseruare, vt faciliē effluere
possint, ita vt meminerimus quòd hi loci in iisdem figuris
multo tempore permanentes, intertrigines curatu difficiles
faciūt. Qui verò deligatione sanari per aliquē ex relatis, aut
referendis modis non possunt, eos magnam huc curam adhi
bere conuenit, vt fractam corporis partē commodē positam
habeant secundum rectitudinem, animaduersione ad hoc ha
bita, vt sursum magis quàm deorsum vergat. Si verò quis be
ne ac faciliē opus perficere velit, operæ precium est etiam ma
chinamenta facere, quo iustam & non violentā extensionem **E**
pars corporis fracta habeat. Maximè verò in tibia machina
mēta adhibere expedit. Sunt igitur aliqui qui in omnibus ti
biæ fracturis, & quæ deligantur, & quæ non deligantur, pe
dem summum ad lectum alligant, aut ad aliud quoddam li
gnum iuxta lectum defossum. Hi itaq; omnia mala faciunt,
nihil autem boni. Neque enim vllam opem affert extēsiōni,
hæc pedis alligatio. Nihilo enim minus ad pedem conceder
reliquum corpus, atq; sic non amplius extenditur: neque rur
sus ad rectitudinem quicquam prodest, sed etiā obest. Dum
enim vertitur reliquum corpus, aut hac, aut illac, nihil prohi
bebit vinculum illud, quo minus & pes, & ossa pedi annexa,
reliquū corpus sequantur. Imo si pes alligatus non fuisset, mi
nus distorqueretur. Si verò quis pilas duas ex corio Aegyptio **F**
consuat, tales quales gestāt hi qui multo tempore in magnis
compedibus vincti sunt: habeant autem pilæ hinc atq; illinc
tunicas, ad vulneris quidē partes, profundiores: ad articulo
rum verò partes, breuiiores: Sint itē tumidæ ac molles, & cō
gruentes ad hoc, vt altera supra malleolos, altera infra genu
coaptetur. Habeat insuper vtrāq; duas vtrinq; appendices à
latere, aut ex simplici, aut ex duplici loro, breuiiores velut an
sas, ita vt alteræ sint ab vtraque malleoli, alteræ ab vtraque
genu parte: & superna pila alteras tales habeat secundum
eandem rectitudinem. Postea virgis corneis acceptis, æqua
lem inter se magnitudinem habentibus, crassitudine qui
dem digitali, longitudine verò vt flexæ appendicibus con
gruant, huc diligētiā adhibeas, vt extremæ virgarum par
tes

Ates non ad corpus, sed ad summas pilarum eminentias inni-
tantur. Oportet autem esse tria virgarum paria, aut etiam
plura, & alias aliis aliquanto longiores, & aliquanto breuio-
res ac minores, vt si velis magis distendere possis. Locentur
autem virgæ vtræque hinc atque illinc à malleolorū vtraque
parte. Hæc itaque si bene machinatus fuerit, & extensionem
iustam exhibuerint, & secundum rectitudinem æqualem, &
vulnere nullus dolor accesserit. Nam quæ expressa fuerint, si
quid tamen exprimeretur, partim ad pedem abducentur, par-
tim ad femur: & virgæ hinc atque illinc à malleolis accom-
modatiores erunt, vt tibiæ positio non impediatur, & vulnus
probè impingat ac sustentetur. Neque enim impedimento
Best, si quis velit duas virgas superiores, ipsas inter se coniun-
gere, & si quis leuiter quid superimponere velit, vt id quod
superimponitur, à vulnere eleuatum sit. Si quidem igitur
& pilæ lenes, & molles, & bonæ, & recenter consutæ fuerint:
& virgarum intentio probè intenta fuerit, velut iam dictum
est, commodum erit machinamentum. Si verò quid horū
non rectè habuerit, læserit magis quàm profuerit. Conuenit
autem & alias machinas, aut bene machinari, aut non ma-
chinari: Turpe enim est & minimè artificiosum, in machinis
struendis à machinis aberrare. Plerique porrò medici fra-
cturas, & cum vlceribus, & sine vlceribus, primis diebus la-
nis succidis curant, & nihil ab arte alienum ipsis hoc esse vi-
detur, & qui quidem à recens vulneratis coguntur, ex linteo-
Crum inopia lanis vti, his plurimus veniæ locus patet. Non
enim habuerit qui in linteorum penuria, aliud quid multo
melius ad tales deligādas quàm est lana. Verū omnino mul-
tæ lanæ esse debent, & valde bene carminatæ, & non asperæ.
Nam paucarum & malarum vires etiam modicæ sunt. Qui
verò ad vnum ad duos dies, lanis deligare iustū esse censent,
tertia verò ac quarta linteis deligātes premunt, ac extēdunt
tunc vel maximè, hi in re multi adeo ac magni in medicina
momenti, se imprudenter gerunt. Minimè enim tertia ac
quarta die omnia vulnera mouere oportet, & vt in summa
dicam, etiam omnes specillorum admotiones vitare conue-
nit in his diebus, & alia quoque quibus vulnera irritantur.
In totum etiam tertia ac quarta dies in plerisque vulneribus
recredescantias pariunt, & quæ ad inflammationem ac im-

munditiam procedunt, & quæ ad febres deueniunt. Et hæc D
res multi momenti est vt discatur, vt si qua alia. Cum qua
enim ex vtilissimis in medicina rebus, non solum circa vul-
nera, verum etiam circa alios multos morbos, cōmunionem
non habet: nisi quis etiam alios morbos vlcera esse dixerit,
Habet enim & hic sermo aliquam verisimilitudinē. Multis
enim modis alij aliis cognati sunt. Quicunque tamen iu-
stum esse putant lanis vti, donec septem præterierint dies,
deinde verò extendere ac dirigere & linteis deligare, hi non
similiter imprudentes videri poterint. Nam & maximum
inflammationis periculum præterit, & ossa laxa ac apta post
hos dies sunt. Longè tamen & hæc curatio superatur, ab ea
deligatione quæ ab initio linteis fit. Ille enim modus præpa-
rat ac efficit vt septima die ferulis perfectè deligari possint. E
Hic autem modus multò tardior est. Sed & alia quædam de-

Cum ossa
fracta &
extantia nō
redeunt.

trimenta habet. Verum longum esset omnia scribere. Qui-
bus verò ossa fracta & extra eminentia in suam sedem col-
locari non possunt, his hæc restitutio debetur. Ferramenta fa-
cere oportet ad eum modum quem vectes habent illi qui-
bus lapidæ vtuntur, alia latiora, alia angustiora. Esse verò
conuenit tria, aut plura etiam, quo quis maximè congruis
vtatur. Postea cum his vnà cum extēsiōne motionem aggre-
di oportet, ita vt ad inferiorem ossis partem subiicias ad su-
periolem verò partem ossis, superiorem ferramenti partem
innitendo firmes, In summa, quemadmodum si quis lapidē
aut lignum vehemēter vecte cōmoueat. Sint autē valida fer-
ramenta quantum eius fieri potest, vt ne flectantur. Hoc ma- P
gnum auxilium est, si & ferramenta idonea fuerint, & si quis
velut conuenit commotionem faciat. Nam ex omnibus in-
strumētis quæ homines machinati sunt, fortissima hæc tria
existunt, aselli circunductio, per vectes commotio, & cuneo-
rum vsus. At sine horum vno aliquo, aut sine omnibus, nullū
vehementissimum opus homines perficiūt. Non igitur sper-
nenda est hæc per ferreos illos vectes commotio, aut enim
hoc modo, aut nullo alio, in sedem suam collabentur. Si verò
superna ossis pars immutata fuerit ac confracta, vt vecti ad-
hibendo locus non sit commodus, sed acutum quid pro-
minet, tunc osse scalpendo derafo, securam vecti sedem fa-
cere oportet. Hanc autem per vectes commotionem & ex-
tensio

A tensionem, eadem die aut secunda facere oportet. Non autem tertiam. Minimè verò quarta aut quinta. Nam etiam si non reponas, sed aliàs molestiam exhibeas in his diebus, inflammationem induxeris: quanto magis si reponas. Conuulsionē tamen multo magis induxeris si reponas, quam si reponere omittas. Atque hæc probè nosse conuenit. Si enim reponenti conuulsio accesserit, non multa salutis spes est. Commodum autem est rursus eiicere os à sua sede, si hoc fieri citra molestiam possit. Non in laxioribus quàm opportunum est, cōuulsiones ac distensiones accedunt, sed in his quæ magis extenta sunt. Cæterum de qua re nunc nobis sermo est, in prædictis illis diebus molestiam exhibere nō oportet, & curam adhibere vt vlcus minimè inflāmetur, & maximè suppuretur. Postquam verò septem præterierint dies, aut paulo plures si sine febre fuerit, & vlcus non inflammatū sit, tunc minus vetat vt reponere tentes, si speres obtenturum te esse. Sin minus non oportet frustra molestiam suscipere & inferre. Si igitur ossa reposueris in suam sedē, iam scripti sunt modi quomodo curare oportet, siue ossa discessura esse, siue nō, expectatio sit, & si quidem ossium discessus expectatio sit, eo quem dixi modo cum linteis, in omnibus talibus deligationem facere oportet, ex medio linteo initio facto vt plurimum, velut ex duobus initio fascia deligatur. Coniecturam autem facere oportet iuxta vlceris formā, quo sit quam minimum hians ac labiis protuberans & expassum. Aliis enim ad dextram deligare commodū est, aliis ad sinistram, aliis ex duobus initiis. Quæcunque verò ossa repositionem effugerunt, ea discessura esse nosse oportet: itēque ea quæ carnibus penitus nudata sunt. Nudatur autem quorundam superna pars, quorundam verò carnes circumcirca mortiferantur. Et quibusdam quidem ex veteri vulnere aliqua ossa emarcuerunt: quibusdam verò non. & aliquibus magis, aliquib⁹ minus, & partim parua, partim magna. Propter hæc igitur relata, vno morbo dici non potest, quādo ossa sint discessura. Aliqua enim ob paruitatem, aliqua ex eo quod in summa parte existunt, citius discedunt: aliqua eo quod non discedunt, resiccata & marcida fientia desquamantur. Præterea differt curatio à curatione. In totum igitur ossa citissimè his discedunt, quibus citissimæ fiunt suppurationes & citiss

Tertius,
quartus,
quintusq;
dies repositio-
nem nō
admittit.

& citissimæ ac optimæ carnis productiones. Subnascentes D enim iuxta læsam partē carnes, plerunque ossa ipsa eleuant. Totustamen ossis circulus, si in quadraginta diebus discesse rit bene discedet. Quædam enim ad sexaginta dies perue niunt. Nā & rariora ossa citius discedunt, solidiora verò tar dius. Alia autē minora: multo minore temporis spacio, alia aliter. Cæterum os extra eminens his de causis præsecare oportet, si reponi nō possit, & parum absit vt reponi posse vi deatur, & fieri poterit vt auferatur, & si noxium fuerit, & de carnibus quid rumpat, & sensus molestiam exhibeat. Sed & si nudum fuerit, tale auferre oportet. Reliqua siue præseces, siue non præseces, non multum refert. Hoc enim certo scire expedit, quòd ossa quæ carnibus perfectè priuantur, ac exa E rescunt, omnia penitus discedent. A quibus verò squamæ di fcessuræ sunt, ea præsecare non oportet. Coniecturam verò eorū quæ discedent, ex constitutis signis facere oportet. Cu rare autem tales spleniis & vinosa curatione, velut etiā prius de discessuris ossibus scriptum est. Sed cauere decet ne pri mo tempore frigidis madesiant. Rigorū enim febrilium pe riculum est. Periculū item cōuulsionum. Frigida enim sem per conuulsionem prouocant quandoque verò etiam vlce ra. Nosse quoque id conuenit, necesse esse ibi corpora bre uiora fieri, vbi ossa fracta ac immutata curātur, & quibus to tus ossis circulus discessit. At verò quibus femoris aut bra chij os extra eminet, hi non valde superstites euadunt. Nam F & ossa magna sunt, & multū medullæ habent: & quæ si mul vulnerantur, multa sunt & magni momenti, & nerui, & mu sculi & venæ. Et si quidem reposueris, conuulsionem accede re solent. Si verò non reposita fuerint, febres acutæ, & bilio sæ, & singultuosæ oboriuntur, & denigrātur. Non minus au tem superstites euadunt hi, quibus reposita non sunt, neque tentatum est vt reponeretur. Adhuc verò magis euadunt, quibus inferna ossis pars eminet extra, quàm quibus super na. Euadunt etiā quibus reposita fuerint, attamen raro. Nam & curationes à curationibus multū differunt, & naturæ cor porum à naturis, ad facile tolerādum. Multum etiam differt an in interna brachij ac femoris partē ossa extra promineāt. Multæ enim & periculossæ venarum extensiones in interna parte sunt, quarum aliquæ si vulnerentur, lethales sunt. Sunt autem

A autem & in externa parte, verū minus. In talibus igitur vulneribus, qualia pericula immineant, ignorare nō oportet, & ad temporum occasiones prædicere. Si verò reponere hæc ossa cogaris, & reponendi aliqua tibi spes sit, & non multa ossis immutatio fuerit, & masculi non cōcurrerint: solent enim concurrere: vectis mollitio etiam his cum extensione, opem bene ferre poterit. Vbi verò reponis, veratrum molle bibendū dare oportet eadem die, si eadem die reposita fuerint. Sin minus, ne aggredi quidem oportet. Verū vlcus curare oportet velut in capitis ossibus fractis, & frigidi nihil adhibere, & cibos penitus auferre. & si quidē amara bile præditus natura fuerit, fauorum cremorem odoratū coctū, aut acetum mulsum dulce, in aquam instillato, eoque pro victu vtatur. Si verò amara bile præditus nō sit, aquæ potione vtatur. Et si quidem continua febre laborarit, ad quatuordecim dies vt minimum hoc victu degat. Si verò sine febre sit, septē diebus, Postea sensim progressu fiente secūdam rationem ad vulgarem victum adducatur. Et quibus ossa nō reposita fuerint, eandem itidem medicamēti purgationem facere oportet, & vlcus curationem, eundem item exhibere victum: & dependentem de corpore partem non extendere, sed magis adducere, quo laxior sit pars circa vlcus. At ossiū discessus diuturnus est, velut etiam prius dictum est. maximè verò talia fugere oportet, si modo quis honestam fugam habeat.

C Nam & spes pauca sunt, & pericula multa. & si quis non reponat, artis expertus esse videri poterit: & si reponat, propinquius ad mortem quàm ad salutem perduxerit. **Cæterum** Luxatum genu facile reponitur. luxationes & emotiones ossiū circa genua, multo mitiores sunt emotionibus ac luxationibus circa cubiti flexurā. Nam femoris articulus pro magnitudine expeditior est quàm brachij, & iustam naturam solum habet, eamq; rotundam. Brachij verò articulus & magnus est, & sinus plures habet. Ad hæc verò, tibiæ ossa longitudine inter se similia sunt, & externum os paululum, ne memorabili quidem modo excedit, nullum magnum impedimentū afferens, à quo externus tendo circa poplitem enascitur. At cubiti ossa inæqualia sunt, & quod breuius est, multò crassius est: quod verò tenuius est, multum superat & excedit articulū. Dependet tamen & hoc ex nervis, iuxta communem ossium cōnexionem. **Maiorem autem**

Luxatum
genu facile
reponitur.

Tibiæ &
cubiti ossa
qualia.

Cubiti re-
aptatio.

autem partem connexionis neruorū in brachio os tenue ha- **D**
bet, quā crassum. Horum itaque articulorum & osiū fle-
xuræ cubiti natura huiusmodi est, & propter naturæ modū,
ossa circa genu sæpe quidem luxantur, facile autē rursus in-
cidunt ac reponuntur. Inflammatio verò nō magna accedit,
neque vinculum articuli. Luxantur autem plerunque in in-
ternam partem, aliquando etiam ad externam, quandoque
etiam ad poplitem. Horum omnium repositiones non sunt
difficiles. Verū si quidem foras aut intro luxentur, hominē
in humili aliquo sedili sedere oportet, ita vt crus altiū, non
tamen multò habeat. Extensio autem plerunque moderata
sufficit, ita vt ab altera parte tibia, ab altera femur in diuer- **E**
sum extendatur. At ossa circa cubiti flexurā molestiora sunt,
quā quæ circa genu sunt, & difficilius reponi possunt, etiā
ob inflammationē, si quis non statim reponat. Luxantur qui-
dem minus quā illa, verū difficilius reponuntur ac co-
aptantur, insupérq; inflammātur, ac callum acquirunt. Sunt
autem & horum plerunque parux inclinationes, aliquando
ad partem ad costas, aliquādo ad externam, non vt totus ar-
ticulus sit emotus, sed manet quid iuxta ossis brachij cauita-
tem, qua parte cubiti os excedēs habet. Talia igitur siue hac,
siue illac luxentur, facile est reponere: & sufficit extensio in
directum fiens, secundum brachij rectitudinem, ita vt alter
iuxta manus iuncturam extendat, alter locū sub alis ample-
ctatur: Medicus verò altera manu ad emotum articulū ad- **F**
mota, volis impellat, altera propē ad articulū iniecta retru-
dat. Obediunt autem tales luxationes, & non tardē reponun-
tur, si quis antea quā inflammentur, reponat. Luxantur au-
tem plerunque magis ad internam partem: luxantur etiā ad
externam. Innotescit id ex figura: & talia sæpē etiam absque
vehementi tensione rursus incidunt. Oportet autem in his
quæ intro luxātur, articulum quidem ad naturam suam re-
pellere, cubitum verò magis in pronam partem vergentem
circumducere. Et plerūque sanē cubiti luxationes huiusmo-
di sunt. Si verò trāsgressus fuerit articulus, aut hac, aut illac,
supra cubiti os, quod ad brachij cauitatē excedit: fit quidem
raro hoc, si verò fiat, non ampliū similiter extensio in dire-
ctum fiens, talibus luxationibus idonea est. In tali enim ex-
tensione, os à cubito excedens, brachij transgressionem pro-
hibet,

Ahibet. Oportet itaque sic emotis extensionē tali facere, qualis prius descripta est, ubi quis ossa brachij fracta deligat, ut ab alia quidem in supernam partem tensio fiat, ab ipsa verò cubiti flexura, ad infernam cogatur. Sic enim brachium supra suum finem maximè eleuabitur. Si verò eleuatū fuerit, facilis est restitutio cum volis manū, ita ut emotā quidem brachij partem apprehendentes impellamus, os verò cubiti iuxta articulum retrudamus, vtrāq; eodem modo, minus tamen. Atque talis extensio huiusmodi luxationis iustissima est. Poterit etiam reponi per extensionem in directū, verū minus, quā hoc modo. At si in anteriorem partem brachiū luxetur: rarissimè autem hoc contingit. Sed quid repentina

Brachium
antrorsum
luxatum
quale.

B eluctatio nō eiecerit? Multa enim etiā prater naturā suam excidūt, etiam si magnum quid sit quod prohibeat. Huic autem eluctationi magnū quoddam obstaculum est, & os crassius quod superexcedit, & multa neruorum extensio: attamen quidam sanè eluctantur. Signū autē his qui ita eluctati sunt. Nihil enim de cubito flectere possunt. Manifestus est etiam articulus ad contactum. Si quidem igitur non statim repositus fuerit, vehementes ac violentæ inflammationes, itēque febriles fiunt. Si verò statim quis occurrat, facile reponi potest. Oportet autem linteum durum conuolutum (suffecerit nō magnum) imponere obliquum in cubiti flexuram, & de repente cubitum inflectere, & manū quā maximè ad humerum adducere. Sufficiens igitur fuerit hæc repositio his

C qui ita eluctati sunt. Sed & extensio in directum, hunc repositionis modum coaptare potest: volis tamen manus in eminentem brachij partem iniectis, iuxta flexuram retro impellere oportet, ita ut aliquis infernè iisdem in cubiti gibbū iniectis, ad cubiti rectitudinem retrudat. Efficax est etiam in hoc luxationis modo illa extensio quæ prius scripta est, quomodo ossa brachij fracta extendere oportet, ubi sunt deliganda. Postquam verò extenta fuerint, sic cū manum volis iniectis coaptationes facere, velut etiam prius scriptū est.

Cæterū si in posteriorem partem brachium exciderit, rarò autē hoc contingit, hæc luxatio omnium maximè dolorosa existit, & febres continuas meracæ bilis paucorum dierum ac maximè lethales inducit: & tales extendere brachiū non possunt. Si igitur statim affueris, extēto cubiti gibbo cogere

Brachium
retrorsum
luxatum.

gere oportet, & sponte incidit. Si verò febris præuenerit, non D
 amplius reponere oportet. dolor enim in cogendo augefcet,
 Vt autem in summa dicam, neq; alium articulum febrienti
 reponere oportet, minimè verò cubiti gibbum. Sunt autē &
 aliæ læsiones ac molestiæ circa cubiti gibbum. Hoc enim os
 crassius, si quando ab altero emotum est, neque flecti, neque
 extendi similiter potest. Manifestum autem fit ex contractu,
 iuxta cubiti flexuram, circa venæ discissionem supra muscu-
 lum tendentem. Quibus autem tale accidit, his non amplius
 facile est ad suam naturā reducere. Neq; enim aliam vllam
 communem duorum ossium connexionem emotam, ad pri-
 stinam naturam collocare facile est: sed necesse est tumorē E
 habere ipsam disparationem. Quomodo verò deligare opor-
 tet in articulo, dictum est in deligatione circa malleolum.
 Quibusdam autem os cubiti brachio subiectum frangitur,
 quandoque quidem cartilaginosa ipsius pars, ex quo tendo
 retrò brachiū enascitur, & vbi hæc emota fuerit, febrile est
 ac malignum. Articulus tamen manet in suo loco, æqualiter
 enim basis ipsius hac parte excedit. Quum autem abductus
 Caput bra- fuerit ea parte qua caput brachij excidit, vagabūdu magis
 chij fractū. fit articulus, quā si penitus sit abruptus. Nam vt in summa
 dicam, omnia ossa quæ franguntur, minus noxia sunt, quā si
 ossa quidem non franguntur, venæ autem & nerui alicuius
 momenti in his locis contendantur. Vicinius enim ad mor-
 tem accedunt hæc quā illa, si febris cōtinua accesserit. Pau- F
 cæ tamen tales fracturæ fiunt: quandoque verò hoc brachij
 caput iuxta appendicem frangitur, atq; hoc quum videatur
 multò magis noxiū esse, lōgè mitius noxis circa cubiti gib-
 bum contingentibus existit. Quomodo igitur singulas lu-
 xationes reponere, & præsertim curare oportet, scriptū est:
 & q̄ statim reponere articulum maximè confert, propter ce-
 leritatem inflammationis neruorū. Nam etiam si elapsa sta-
 tim reposita fuerint, similiter tamen nerui distentionem fa-
 cere solent, & ad tempus aliquod tum extensionem, quam fa-
 cere solent, tum influxionem impedire. Confert autem om-
 nia hæc similiter curare, & quæ franguntur, & quæ disparan-
 tur, & quæ luxantur. Omnia enim multis linteis, & spleniis,
 & cerato curare oportet, velut etiam alias fracturas. At figu-
 ram cubiti gibbi in his etiam omnino talem facere oportet,
 qualem

A qualem in his quibus brachium fractum, & cubitus deligabatur. Communissima enim omnibus luxationibus, & emotionibus, & fracturis, hæc figura est. Communissima item ad distentionem postea fiendam, & ad singula extendenda, ac inflectenda. Hinc enim viæ sunt ad utrasque partes consimiles. Commodissima est etiam hæc figura ipsi agroto, ut ipsum & gestet, & appensum excipiat. His adde si à callo apprehensus fuerit, si quidem extenta manus apprehendatur, melius fuerit si non adsit: multis enim impedimento erit, paucis adiumento. Si verò inflexa, magis quidem comoda fuerit. Verum longè commodior, si mediam figuram obtinens callo apprehendatur: & hæc quidem de figura. Deligare verò oportet, primum lintei initio super ipsam læsam partem iniecto,

B siue fracta fuerit, siue emota, siue disparata, primas etiam obvolutiones super ipsam facere, ita ut maximè hac parte innitentur, minus verò hinc atque illinc. Deligationem autem communem facere oportet, & cubiti & brachij, utriusque multò plus quàm plerique faciunt, quo quàm remotissimè à læsa parte tumor hinc atque illinc exprimatur. Circundetur insuper etiam acuta cubiti pars, siue læsio in hac fuerit, siue nò, ut ne tumor ibi circa ipsam colligatur. Fugiendum verò est in deligatione, quantum eius fieri potest, ut ne circa flexuram multa lintea coaceruata sint. Compresio autem quàm maximè circa læsam partem facienda est. Sed & reliqua compresio ac laxatio eadem adhibeatur, & iisdem temporibus singula quemadmodum in ossium fractorum curatione antea scriptum est. Et religationes postea per diem tertium fiant. Videatur autem laxa esse deligatio tertia die velut etiam tunc. Et ferulæ conueniente tempore adhibeantur. Neque enim alienum hoc est, & in his quibus ossa fracta, & quibus nò fracta sunt, si non febriant. Sint autem quàm laxissimæ partim à brachio extentæ, partim ad cubitum positæ: & nò sint crassæ. Necesse est etiam inæquales ipsas esse inter se, ut vicissim permutentur quæ par parte conducit, coniectura iuxta inflexionem fiende. Quin & spleniorum appositionem eiusmodi facere oportet, velut de ferulis dictum est, ita tamen ut paulò tumidiora super læsam partem apponantur. Tempora verò ab inflammatione, & ab his quæ prius scripta sunt, coniectare oportet.

Ferulæ quales in his ponendæ.

*fructus
16. hys.
26. hys. di
Hipp. fructus*

HIPPOCRATIS^D

COI LIBER DE AR-

TICVLIS, IANO CORNA-

RIO MEDICO PHY-

SICO INTER-

PRETE.

**Humerorū
luxatio.**



Vmeri verò articulum vno modo luxari noui, ad locum sub alis. Sursum autem nunquam, neque ad externam partem. Non tamen affirmauerim an luxetur, aut non, etiamsi habeam quod dicam de ipso. Sed neque in anteriorem partem vnquam vidi, neque videtur mihi vnquam excidisse. Medicis tamen videtur valde in anteriorem partem luxari, & maximè decipiuntur in his, quorum carnes tabes circa articulum & brachiū occupauit. Apparet enim in talibus caput brachij omnino in anteriorem partem eminens. Atque ego tale aliquando non excidisse asserens, ob hanc rem apud medicos & vulgus malè audiui. Solus enim ipsis ignorare videbar, alij verò omnes cognoscere. Nec potui ipsis persuadere, nisi admodum difficulter, rem ita se habere. Si quis in brachio supernam humeri partem carnibus denudarit, denudarit autem qua parte musculus sursum tendit. Nudarit autem tendinem, qui sub alis, & iuxta clauiculam ad pectus est: apparuerit utique caput brachij in anteriorem partem vehementer eminens, etiamsi non sit elapsum. A natura enim prouum est brachij caput in anteriorem partem, reliquum autem brachij os, ad externam partem incuruum. Conuersatur autem brachium cum scapulæ cauitate obliquū, quum iuxta costas fuerit porrectum. Quum verò ad anteriore partē extensa fuerit tota manus, tūc brachij caput è directo est in scapulæ cauitate, & non amplius in anteriorem partem eminere conspicitur. Verum de quo nunc est sermo. nunquā vidi in anteriorem partem elapsum: non tamen affirmarim ne de hoc quidē, an ita excidat, necne. Quum igitur exciderit brachiū ad locum sub alis, multi reponere nouerunt, utpote quòd multis elabatur.

Erud.

- A** Eruditi autem est omnes modos nosse, quibus medici id reponunt, & quo modo quis his modis quam optimè vtatur. Optimo verò horum modorum vti oportet, si fortissimam necessitatem videris. Optimus autem est qui postremus describetur. Quibuscunq; igitur frequenter humerus excidit, hi plerunque ipsi sibi ipsis ad reponendum sufficientes sunt. Immissis enim alterius manus digitis ac nodis in locum subalarem, articulum sursum cogunt, cubiti verò gibbum ad pectus adducunt. Eodem etiam modo medicus reponet, si ipse quidem sub alam, articulo magis intro elapso, subtentis digitis à costis diducat, ita vt capite suo in summum humerum iniecto, renitendi gratia, genibus verò iuxta cubiti gibbum ad brachium admotis, ad costas retrudat. Conducit autem eum qui reponit fortes manus habere: aut ipse quidem manibus & capite ita faciat, alius verò quidam cubiti gibbum ad pectus adducat. Est autem & humeri repositio, vt cubitus retrorsum ad spinam subducatur, deinde altera manu in summam gibbi cubiti partem iniecta retortio fiat, altera verò iuxta articulum retro innitatur. Hæc repositio, & ea quæ prius dicta est, quum non sint secundum naturam, tamē articulum circumagittantes incidere cogunt. Qui verò calcaneo reponere conatur, propinquum quid ei quod est secundum naturam cogunt. Oportet autem hominem humi supinum reclinare, eum verò qui reponit humi sedere qua parte articulus excidit. Deinde apprehensam manum læsam, cum suis manibus extendere, calcaneo verò in subalarem locum iniecto, dextro in dextrum, sinistro in sinistrum, retrudere. Oportet autem in cavitatem sub ala rotundum quid congruens indere, commodissime verò fuerint pilæ valde parvæ ac duræ, quales multæ ex coriis consuuntur. Si enim non eiusmodi quid inditum fuerit, calcaneum ad brachij caput peruenire non potest. Dum enim manus extenditur, locus sub ala cauatur. Tendines enim qui hinc atq; illinc locum sub ala constringunt, contrarii sunt. Oportet autem aliquem ab altera parte eius qui extenditur confidentem, sanum humerum continere, vt ne corpus circumtrahatur, dum læsa manus in alteram partem extenditur. Postea ubi pila sub alam subdita fuerit, molle lorum sufficiēti latitudine præditum, circum pilam circumdare oportet, ita vt quidem eo loco ex utrisque initiis apprehenso sursum retrahat, à capite eius qui extenditur confidens

Humeri laxis repositio.

Alia repositio.

Alia repositio.

Alij repositionis modi.

Repositio per scalam,

Repositio optima.

fidens, & pede ad summi humeri os innitēs. Pila verò quàm **D**
penitissimè & maximè intus ad costas sita sit, & non ad brachij caput. Est & alia repositio, quum humerum alter subdit. Maiorem tamen esse oportet eum qui humerum supponit, ita ut apprehēsa manu, humerum suum acuminatū sub illius luxati alam supponat, & deinde aliquantum verset, ut velut sedi insideat, ea coniectura facta, ut homo ille circa humerum suum ex ala pēdeat, ipse verò seipsum in hūc humerum altiorē faciat quàm in alterum, brachiū autem pendens ad pectus suum quàm citissimè cogendo adducat. In hac verò figura insuper concutiat ubi hominē sustulerit, quo reliquum corpus in aduersam partem brachio quod cōtinetur vergat. Si verò valde levis fuerit homo, puer aliquis levis **E**
super ex ipso retrorsum dependeat. Atque hæc omnes repositiones in palæstra vītatæ sunt, eo quòd non opus habēt aliorum instrumentorū importatione. Poterit tamē quis etiam alibi his uti. Sed & qui circum pistillum cogunt, propemodum secundum naturam reponunt. Oportet autem pistillū molli quadam fascia esse inuolutū: minus enim ita labarit: & inter costas ac brachij caput subter intrusum, & si quidem breue fuerit pistillū, collocare hominē in sedili aliquo oportet, quo vix brachium circum pistillum circūdare possit. Sit autem potius longū pistillum, quo homo stans fermè circū pistillum dependeat. Postea brachiū quidem & cubitus circa pistillum porrigantur, ab altera verò corporis parte, quis manibus circa ceruicē ad clauiculam circumiectis deorsum **F**
cogat. Hæc repositio moderatè secundum naturā est, & repositionem facere potest, si probè ipsam tractent. Quin & per scalam alia quædā huiusmodi repositio fieri potest, & adhuc melior, eo quòd corpus hinc atque illinc eleuatum, securius librando adæquari potest. Nam circum pistillū etiam si humerus fixus maneat, periculum tamen est ne corpus hac aut illac circūagatur. Oportet tamē & super scalā supernè rotundum quid deligatum esse, quod ad loci sub ala cavitatem congruum sit, & quod brachij caput ad naturam redire insuper cogat. Optima verò ex omnibus repositionibus talis est. Lignum esse oportet latitudine quidē quinque aut quatuor in totum digitorum, crassitudine verò duorum digitorum, aut etiam tenuius, longitudine autem bicubitali, aut paulò breuius.

- A** breuius. Sit autem altera parte summa rotundū, & angustissimum ac tenuissimum hac parte, habeatq; crepidinem paululum supereminentē, in extrema rotunditatis parte, sed nō ea quæ ad costas, verū ea quæ ad brachij caput existit, quo sub alam congrua sit, iuxta costas sub brachij caput subdita. Linteo autem vel fascia molli, lignū summa parte obuoluetur, quo leuius reddatur. Deinde subdito ligni capite quā penitissimē sub alam, inter costas ac brachij caput, totam manum ad lignum porrectam alligare oportet, iuxta brachiū, iuxta cubitum, & iuxta manus iuncturam, quo quā maximē sit quieta. præ omnibus autē curandum est, vt summa ligni pars, quā penitissimē intra subalarē locum recipiatur, brachij caput trāsgressa. Postea inter duas columnas trabē transversam probē alligare oportet, & deinde manum cum ligno supra trabē transmittere, quo manus ab altera parte sit, corpus ab altera, trabs verò sub ala, & postea ad alteram partē manum deorsum cogere vnā cum ligno, circum trabē: ad alteram verò reliquum corpus. Trabs autem ea altitudine alligetur, vt reliquum corpus eleuatum summis pedum digitis innitatur. Hic modus repositionis humeri lōgē optimus est. Iustissimē enim commotionem facit, si solū penitius intus ad brachij caput lignum fuerit. Iustissimæ item sunt in vtrāque partem adæquationem facientes librationes, & ad hæc ossi brachij securæ. Recentes itaque luxationes citius incidunt, quā quis putare possit, & priusquam extentæ esse videantur. Sed & veteres sola hæc repositio reponere potest, si non iam ob vetustatem, caro quidem in acetabulū deuenit, caput autem brachij in loco ad quem declinauit, semitā sibi ipsi iam fecit. Veruntamē etiam ita inueteratum brachij elapsū, mihi posse reponere videtur. Quid enim iusta molitio nō nouerit: manere tamen in loco posse, nō ita mihi videtur sed prout conuenit rursus luxabitur. Idem facit etiam si circum scalam, eodem modo velut dixi præparatam coactio transmissi brachij fiat. Abundē item sufficit circum magnam sedem Thessalicam coactionem facere, si recens fuerit luxatio. Præparatum autem esse oportet lignum, velut dictum est: hominem verò locare oportet in sede obliquum, deinde brachium vnā cum ligno supra sedis reclinatorium transmittere, & ad alteram partem corpus deorsum

Quæ in his
perpenden-
da.

cogere, ad alteram brachium cum ligno. Idem quoque fa- D
cit coactio supra biforem ianuam. His autem quæ forte præ
sentia fuerint vtendum est. Nosse igitur expedit, quòd na-
turæ à naturis multum differunt, ad hoc vt elabentia faci-
lè rursus incidunt: differt etiam acetabulum ab acetabulo,
quum aliud facilè transcendendi possit, aliud minus. Plurimum
item differt neruorum ligamentum, quum in quibusdam re-
missum sit, in quibusdam intentum. Nam humiditas homi-
nibus fit ex articulis, propter neruorum connexionem, si la-
xa fuerit, & intensiones facile ferat. Multos enim videas qui
adeò humidi sunt, vt quando velint, articuli ipsis citra dolo-
rem excidunt, & absque dolore restituantur. Differt etiam
habitus quidam corporis. Nam his quibus bene se habet E
membrum, & carnosum, & minus excidit, & difficilius inci-
dit. Vbi verò ipsi seipsis tenuiores & magis excarnes fuerunt,

Exemplo
comprobat

tunc & magis excidit, & facilius incidit. Argumentum au-
tem quòd hæc ita se habeant, hoc est. Bobus enim tunc ma-
gis femora excidunt ex acetabulo, quum tenuissimi existunt.
Fiunt autem tenuissimi boues ad finem hyemis. Tunc igitur
etiam maximè luxantur: si tamen & huiusmodi quiddam
in medicina scribere conuenit. Verum conuenit utique. Be-
ne enim Homerus didicit, quòd ex omnibus pecudibus bo-
ues quàm maximè laborèt hoc tempore, & ex bobus potissi-
mum aratores, eo quòd hyeme operentur. His itaque maxi-
mè excidunt articuli. Hi enim maximè attenuantur. Nam
reliqua quidem pecora breuem herbam depasci possunt, F
Bos autem non ita valde priusquam alta fiat. Reliquis enim
tenuis est labri prominentia, & tenuis item superna maxil-
la. Boui verò crassa est labij prominentia, crassa ita & obtu-
sa superna maxilla. Quapropter in breues herbas subiicere
non potest. Rursus solipeda animalia utpote vtrinque denta-
ta, & dentes inter se committere possunt, & sub breuem her-
bam dentes subiicere queunt, delectanturque tali herba ma-
gis quàm alta. Breuis enim herba in totum melior ac solidior
est quàm alta, adde quòd alta etiam prius fructum effert. Ob
hoc igitur ita cecinit,

Herba bre-
uis melior
pecoribus.

Haud secus ac bobus nigris gratissima veris

Tempora proueniunt.

quia

A quia gratissima apparet ipsis alta herba. Sed & alias bos laxū habet hunc articulū, magis quā alia animalia: & ob id etiā magis quā alia pedē trahit, & maximē quum macilentus est, & iam senex. Propter omnia hæc etiā maximē boui excidit. Plura autē de ipso à me scripta sunt, eo quòd omniū antea relatorum testimonia hæc sunt. Verū de quo nunc sermo est, excarnib. magis excidit, sicut etiā citius incidit, quā probè carnosīs: & humidis ac excarnibus minus inflammatur, quā siccis ac carnosīs: & in posterum tempus quoq; minus vincitur: sed & mucus amplior moderato subest, si non adsit inflāmatio, & sic sanè lubricus fuerit. Mucosiores enim omnino sunt articuli excarnibus quā carnosīs. Nam &

B ipsæ carnes eorum qui nō rectē ex arte fame macerati sunt, in macilentis mucosiores sunt, quā in crassis. Quibus tamen cum inflammatione mucus subest, his inflāmatio vinculo facto articulum cōtinet: & ob id hi qui submucosi sunt articuli non valdē excidunt, & exciderent vtique si non plus aut minus inflammationis accessisset. Quibus igitur quum articulus excidit, circumlitæ partes non inflammantur, & statim citra dolorem humero vtī possunt, hi putant quidē nihil opus esse vt sui ipsorum curā gerant, medici tamē est vt contra tales vaticinetur: talibus excidit rursus magis quā his quibus nerui sunt inflāmati. Atque hæc res in omnibus in homine ita habet, & maximē circa humerum & genu. Maximē igitur etiam hæc excidunt. Quibus autem nerui inflā-

C mati sunt, hi humero vtī nō possunt. Prohibet enim dolor & inflāmationis distentio. Tales igitur curare oportet cerato, & spleniis, & linteis multis deligando. Sub alam verò lanam mollem pura conuolutam subiicere oportet, ad cavitatē explendam, quo fulcimentū quidem sit deligationi, articulum verò sustentet. At brachium plerunq; sursum vergens tenere oportet. Sic enim procul fuerit humeri caput à loco, in quem excidit. Oportet autē postquam humerum deligaueris, brachium ad costas adalligare, fascia quadam in orbem circum corpus obducta. Fricare quoq; humerum oportet placidē & accuratē. Multarum autē rerum peritum medicū esse expedit, & non minus frictio. Ex eodē enim nomine, non idem euētus subsequitur. Nam & vincere potest frictio articulum iusto laxiorē, & soluere articulū iusto duriorē. Verū de fri-

Curatio
horum.

Brachium
an excide-
rit, signum.

Etione in alio opere à nobis tractabitur. Talem igitur hume-
rum mollibus manibus fricare cōuenit, cōfert enim, & aliàs
leniter. Articulū autē commouere non violenter, sed intan-
tum vt circa dolorem cōmoueatur. Restituūtur verò omnes
articuli partim longiore, partim breuiore tēpore. An autem
brachium exciderit, his signis cognoscere oportet. Nam vbi
iustū corpus habent homines, manus itē ac crura, sano in exē-
plum vti oportet, ad non sanum: & non sano ad sanum, non
alienos articulos inspiciendo, (alij enim aliis magis extanti-
bus sunt articulis) sed ipsos eius qui affectus est, an dissimilis
sit sanus ægroto, & hoc rectē quidē dictum est, multā tamen
erroneam intelligentiam talia habent: & non satis est solum
sermonis doctrina artem hanc nosse, sed conuersatione etiā
versare oportet. Multa enim præ dolore, aut ex alia causa,
quā non exciderint ipsis articuli, tamē nō possunt in similes
figuras restitui, in quales sanum corpus figuratur. Proinde &
talem figuram insuper intelligere ac cōsiderare oportet. Sed
& in loco sub ala, caput brachij multo magis incumbere vi-
detur, in luxato quā in sano. Quin & supernē iuxta super-
nam humeri partem, cauus apparet locus: & summi humeri
os extans conspicitur, vtpote articulo ad infernum locum di-
gresso, & est etiam aliquā erronea in hoc intelligentia, sed
postea de ipso scribetur. Est enim dignum de quo scribatur.
Præterea in luxato cubiti gibbus magis à costis distare, vide-
tur quā in altero. Si tamē quis vim afferens cogat, adduci-
tur quidē, sed cū dolore. Sed & sursum ad aurē manum attol-
lere cubiti gibbo extento, non valde potest, velut sanam: ne-
que hac & illac similiter diducere. Hæc igitur signa sunt hu-
meri luxati, repositiones item præscriptæ & curationes hæ-
sunt. Operæ precii verò est discere, quomodo frequenter ex-
cidentes humeros curare oporteat. Multi enim à certamini-
bus iam prohibiti sunt, ob hanc calamitatem, quum aliàs pe-
nitus fuerint inculpabiles. Multi etiam ad res bellicas inuti-
les fuerunt, & ob hanc calamitatem perierunt. Sed & pro-
pterea res digna est quæ discatur, quòd nullum nouerim qui
rectē medeatur, sed alios ne aggredi quidem sciam, alios cō-
tra quā conducit & sentire, & facere. Multi enim medici
humeros luxatos vsserunt, & iuxta supernam humeri partē,
& iuxta anteriore, qua parte caput brachij extuberat, & iuxta

xta

Axta posteriorem paululum retro supernam partem. Hæ igitur vstiones, si quidem sursum brachiū excidisset, aut in anteriorem aut posteriorem partem, rectè inusta essent. Nunc verò quū deorsum excidit. eiiciunt magis hæ vstiones quàm impediunt. A superna etiam spacij amplitudine caput brachij excludunt. Verūm hæc ita vrere oportet. Cutem sub ala

Excidentes
humeri qui
vrantur.

digitis apprehensam attrahere oportet, secundum ipsam maximè rectitudinem, secundum quam brachij caput excidit. Deinde ita attractam cutem in vltioriē partem perurere. Ferramentis autem talia vrere oportet non crassis, neq; valde caluis, sed oblongis. Citius enim penetrant, & manu firmata transigi possunt, pellucidis item his vrere oportet, quò

Ferramēta
qualia ad
hūc vsum.

Bnetrantia, latiores crustarum elapsiones faciunt, & periculū est ne cicatrices rumpantur, & nihilo quidem deterius hoc esset, verūm turpius & ab arte alienius. Postquam autē in vltiorem partem perusseris, in plurimis satis est vt infernæ parti soli has crustas inuras. Quòd si periculum esse non videatur ne cicatrices rumpantur, sed multum spacij interpositum sit, tenue quoddā specillum per inusta foramina traicere oportet, cute adhuc attracta. Neque enim aliàs traicere possis. Vbi verò traieceris, cutem dimittere. Postea inter crustas aliam crustā tenui ferramēto infligere ac inurere, donec specillum contingas. Quantū verò de cute sub ala apprehendere oportet, hinc coniectare licet. Glandulæ sub ala sunt sicut etiā in aliis corporis partibus. Verūm in alio libro de to-

Cta glandularum natura scribetur, quòd sint, & qualia in quilibet significant ac possunt: glandulas igitur simul apprehendere non oportet, neque ea quæ glandulis sunt interiora. Magnum enim afferunt periculum. Sunt enim nervis maximi momēti vicina. Quantū verò extra glandulas est, eius quàm plurimam partem apprehendere oportet. Nihil enim periculi est. Nosse tamē hoc expedit, quòd si fortiter brachium extenderis, nihil cutis sub ala apprehendere poteris, quòd sanè attractu memorabile sit. Distrahitur enim in extēsiōe. Nec verò nervos vlla machina vulnerare oportet. Hi enim prompti expositi sunt ac extenti in hac figura. Si verò parum brachium eleuaris, multum quidē cutis apprehendes: Nerui verò quorum curam gerere oportet, intus vltra apprehensionē

Glandulæ
periculoſæ.

Nerui non
lādendi.

O o s confi

consistent. Nōne igitur in omni arte pro omnibus curan-
 dum est, vt in singulis figuræ iustæ inueniantur. Atq; hæc qui-
 dem de loco sub ala, & sufficiunt hæc apprehensiones, si cru-
 stæ rectè fuerint iustæ. Extra verò alam duo solū loci sunt,
 vbi quis crustas inurere queat huic affectioni auxiliantes.
 Vnam in anteriore parte, inter brachij caput, & tendinem iu-
 xta alam. Et hac quidem parte cutem penitus perurere opor-
 tet, sed non altius. Vena enim crassa propinqua est, & nerui,
 quorum neutra igne calfaciēda sunt. Retrorsum autem alte-
 ram crustam inurere licet, multum supra tendinē, qui est iu-
 xta alam, & paululum infra brachij caput. Et cutē quidē pe-
 nitus perurere oportet. Verū neq; hic valde altam crustam
 facere. Inimicus enim est ignis neruis. Curare igitur vlcera
 per omnem curationem oportet, ita vt brachium nunquam
 vehementer extendas, sed moderatē, vlcerum saltem curan-
 dorū gratia. Minus enim ita perfrigerantur. Conducit enim
 omnes vstiones tegere, vt etiam leniter curentur, & minus
 disparentur, minūsq; sanguinis erūpat: & minus conuulsio
 accedat. Vbi verò pura facta fuerint vlcera, & ad cicatrices
 deuenerint, tunc sanē penitus brachium semper die ac nocte
 costis alligatū esse oportet. Sed & quū sana facta fuerint vlce-
 ra, similiter ad multum tempus, brachium ad costas alligan-
 dum est. Sic enim maximē cicatrix induci poterit, & spatij
 amplitudo intercipietur, in quam maximē luxatur brachiū.
 Quibuscunque verò humerus repositione fuerit destitutus,
 siquidē homines adhuc crescant, os brachij non similiter vt
 fanum coaugescit, sed augescit quidem, verū altero bre-
 uius aliquanto efficitur. Et qui mustellæ cubito præditi sunt,
 paruūque ac macilentum brachium ex natiuitate habent,
 galeancones vocati, ob duplices has calamitates fiunt tales,
 rum si talis aliqua luxatio ipsos dum in vtero sunt corripue-
 rit, tum ob aliam calamitatem, de qua postea aliquando scri-
 betur. Quin & hi quibus dum adhuc infantes sunt, profun-
 dæ ac submersæ suppurationes circa brachij caput fiūt, om-
 nes galeancones efficiuntur: & siue secti fuerint, siue vsti, si-
 ue sua spōte ipsis eruperint, hæc ita se habere nosse oportet.
 Qui tamen ex natiuitate galeancones sunt, etiam si manu po-
 tentissimē vti possint, tamen neque ipsi extento cubiti gib-
 bo, brachium ad aurem extendere ac eleuare possunt. Sed
 multo

Ignis inimi-
 cus neruis.

Galeanco-
 nes.

- A** multo minus hanc quā sanam manum. Quibus verò iam vi-
ris exciderit numerus, & repositus non fuerit, his superna hu-
meri pars magis excarnis efficitur, & habitus hac parte te-
nuis fit. Quum tamen dolor cessauerit, non omnia ea simili-
ter operari possunt, quæ eleuato cubiti gibbo à costis in obli-
quum operari oportet. Quæ verò transmotò brachio iuxta
costas, aut in anteriorem, aut in posteriorem partem operari
oportet, ea operari possunt. Nam & scobinam, & ferram tra-
here poterunt, securi item findere, & fodere, si non valde sur-
sum cubiti gibbum attollant, sed & alia iuxta tales figuras
operantur. At verò quibus summus humerus fuerit auulsus,
his os auulsum extra eminens apparet. Est autem hoc velut
B vinculum clauiculæ & scapulæ. Alia enim est hominis natu-
ra hac parte quā aliorum animalium. Medici igitur in hoc
vulnere maximè falluntur. Nam quū os auulsum emineat,
superna humeri pars humilis & caua apparet, vt etiam velut
humeri elapsi curam adhibeāt. Multos igitur noui medicos
aliàs nō malos, qui grauius afflixerunt, tales humores repo-
nere conantes, ita excidisse rati, & non prius desistunt ipsi exi-
stimare se humerum reponere, quā vel desperarint, vel
frustrati fuerint. His curatio quidem eadem quæ etiam a-
liis huiusmodi, ceratum, splenia, & lintea, & deligatio eius-
modi, deorsum tamen cogere os supereminens oportet, &
splenia super hoc ponere plurima, & hac parte maximè pre-
mere: & brachium ad costas adalligatum ad supernam par-
C tem tenere. Sic enim os auulsum maximè appropinquaret.
Hæc tamē probè nosse expedit, & velut certa prædicere, si a-
lioqui voles, quòd nullum detrimētum, neque paruum, neq;
magnum, humero contingit ex hoc vulnere. Sed locus tur-
pior euadit. Neq; enim hoc os in pristinam sedē similiter fir-
mari poterit, velut natura exigit, sed necesse est plus aut mi-
nus tumidum esse ad supernam partē. Neq; enim aliud vllū
os in eundē locum restituitur, quod cum alio osse cōmunio-
nem habet, & adhærens à veteri naturali sede auulsum fue-
rit. Paucis autem diebus summus humerus doloris exors fit,
si probè deligetur. Clauicula porrò fracta, si quidem peni-
tus caulatim hoc contigerit, curatu facilius est. Si verò oblō-
ge, difficilius sanatur: & contraria in his contingunt, aliter
quā quis putauerit. Nā quæ penitus caulatim fracta est, cogi
magis

Humerus
summus 2-
uulsus.

Curatio.

Clauicula
fracta.

magis poterit ut ad naturam redeat. Et si diligens cura adhi- **D**
 beatur, parum quæ superior est, inferiorē fecerit figuris ido-
 neis, & deligatione cōueniente. Si verò perfectè non firmata
 fuerit, attamen supereminens ossis pars non valde acuta fit.
 At quorū os in longitudinem fractum fuerit, his similis os-
 sibus auulsis calamitas contingit, de quibus antea scriptum
 est. Neq; enim ipsum ad seipsum valde firmari solet, & sum-
 ma ossis eminētis, valde acuta fit. In vniuersum igitur nosse
 expedit, quòd nullum detrimentū neque humero, neque re-
 liquo corpori, ob clauiculæ fracturam accedit, si non insuper
 corruptio aliqua contingat. Raro autem hoc fit. Deformitas
 tamen circa clauiculæ fracturā accedit, primū turpissima,
 deinde verò minor fit. Coalescit autem clauicula cito, itē- **E**
 que alia ossa laxa. Celerem enim calli obductionem talia fa-
 ciunt. Quū igitur recens fracta fuerit, vulnerati ad curatio-
 nem festinant, maius malum esse putātes quā est, & medi-
 ci quoque prompti sunt ad rectè curandum. Progressu verò
 temporis & vulnerati, utpote qui neque dolent, neq; iter fa-
 cere, neque cibum capere prohibentur, negligunt: & medici,
 utpote qui suis sedibus restituere nō possunt, aufugiunt, ne-
 que vulneratorum negligentiam ægre ferunt. In hoc autem
 calli obductio acceleratio. Deligatiōis verò modus plerisq;
 cōsimilis est, ut cerato & spleniis, & mollibus linteis curatio
 fiat. Insuper autem & hæc curatio, & hac animaduersio ha-
 benda est, & præsertim in hac aggressione: q̃ plurima sple-
 nia iuxta eminentem partem imponere oportet, & plurimis **F**
 deligationibus maximè circa hanc partē premere. Sunt au-
 tem aliqui quibus cōplacuit plumbum graue insuper adal-
 ligare, ut supereminentem partem deorsum cogat. Fortassis
 autem neque intelligunt qui simpliciter deligant. Sed neq;
 hic modus ad clauiculam fractā pertinet. Neque enim fieri
 potest ut id quod eminet memorabili modo deprimat. Alij
 verò quidē sunt, qui quum cognouerint quòd hæ deligatio-
 nes erroneæ sunt, & non secūdum naturam supereminentia
 deorsum cogunt: deligāt quidē ipsos spleniis & linteis vten-
 tes, velut etiam alij. Verū cincto homine fascia quadam
 qua parte maximè cingi solet, postquā splenia supra eminen-
 tes fracturas imposuerunt, ita ut isthic magna mole extube-
 rent, tunc initium linteī ad cincturam ex anteriore parte al-
 ligant,

Deligatio.

A ligant, atq; ita deligant in directum claviculae extendentes ac retrorsum ducentes, & isthic cincturae circūdatum in anteriorem partem reducant, & rursus in posteriorem. Aliqui verò non cincturae linteum circundant, sed circum interfœmineum iuxta sedem, & per spinā linteum circūdantes, hoc modo fracturam comprimunt. Hæc itaq; si quis inexpertus audit, prope secundum naturam esse videntur, verum si quis vtatur inutilia existunt. Neq; enim stabilia sunt, etiam si decumbat quis, quamuis ita vel maximè stabilitas cōtingat: atamen si decumbens aut crus inflexerit, aut ipse se inclinet, omnia deligamēta mouebuntur: & alioqui noxia est hæc deligatio. Nam & sedes intercluditur, & lintea in hac angustia

B aceruata fiunt. & quæ rursus cingulo circundantur, non ita valida facta cinctura circundari possunt, vt non cingulū sursum ascendere cogant, neque ita necesse est omnia deligamenta laxari. Quam proximè verò quis rem conficere videri possit, etiam si non magna faciat, si quibusdam linteis cingulum circūdet, plurimis autem linteis priorem deligationem perficiat. Sic enim maximè stabiles fuerint deligationes & mutuam inter se opem tulerint. Plurima igitur ex his quæ cōtingunt his quibus clavicula fracta est relata sunt. Insuper autē & hoc adintelligere oportet, quòd clavicula plerunq; frangitur ita vt os quod à pectore est, ad supernā partem emineat: quod verò à summo humero est, in infernam partem subsidat. Causæ verò horū hæc sunt, quòd pectus neque multo inferius, neq; superius procedere potest. Nam articuli in pectore motus paruus est. Ipsum enim sibi ipsi, & spinæ, ex continuitate commissum est. Proximè quidem clavicula ad humeri articulum fluctuat. Cogitur enim frequentē motum habere, propter summi humeri connexionē, & alioqui vbi vulnerata est, ad supernam partem defugit ea pars quæ pectori adhæret, & non valde ad infernam partem cogi potest. Nā & à natura leuis est, & loci amplisudo ipsi supernè maior est, quàm infernè. At humerus, & brachium, & quæ his annexa sunt, à costis ac pectore facilè exolui possunt: & propterea multo superius ac inferius abduci queunt. Quum igitur fracta fuerit clavicula, os quod ad humerū est magis deorsum repit. Huc enim ipsum vnà cū humero & brachio defluere procliuius est quàm sursum ferri. Quū igitur hæc
ita

ita se habeant, imprudenter se gerunt qui supereminentem **D**
 ossis partem deorsum cogere oportere putant. Nam infer-
 nam ad supernā adducendā esse manifestum est. Hæc enim
 motum habet. Hæc est quæ à natura discessit. Clarum itaq;
 est aliter nullo modo ipsam cogi posse. deligationes enim ni-
 hilo magis appellant quàm repellūt. Si verò quis brachium
 quàm maximè ad costas admotū sursum cogat, vt quàm acu-
 tissimus esse humerus videatur, perspicuum est quòd sic ad-
 aptari poterit ad os quod à pectore est, vnde est diuulsa. Si
 quis igit legitima deligatione vtatur, celeris curationis gra-
 tia: & reliqua omnia frustra fieri putet, præter figuram rela-
 tā, is & rectè intellexerit, & celerrimè ac optimè curauerit.

Alia clauicula fractura.

E Decumbere tamen hominem multū refert, & sufficiunt dies
 quatuordecim si quieuerit, aut ad summum viginti. Si ta-
 men contrario modo clauicula fracta fuerit, quod non valde
 cōtingit, vt os quod à pectore est subsidat, quòd verò à sum-
 mo humero est superemineat, alterique superstet: nulla ma-
 gna curatione in his opus fuerit. Ipse enim humerus & bra-
 chium si demittatur, ossa inter se committere ac firmare po-
 test, & vilis quæpiam deligatio suffecerit, & pauci dies satis
 erunt ad callum obducendum.

Alia.

Quòd si hoc modo fracta non fuerit, sed in obliquum hæc vel illàc luxata, ad naturam
 reducere oportebit, humero cū brachio sursum adducto, ve-
 lut etiā ante dictum est. Quum autem ad pristinā naturam
 resederit, reliqua curatio velox erit. Plerasq; igitur immuta-
 tiones, ac luxationes, brachium si sursum cogatur corrigit. **F**
 Quæcunque verò luxationes ex supernis obliquè ad latus
 fiunt, aut deorsum, his correctio præparatur, si homo supinus
 decubuerit. iuxta medias autem scapulas aliquid altius sup-
 positum fuerit, quo pectus maximè in vtranq; partem infle-
 xum sit: & brachium adducat quis ad costas porrectum. Me-
 dicus autē altera manus vola in brachij caput iniecta retru-
 dat, altera ossa fracta componat. Sic enim quàm maximè ad
 naturam reduxerit. Verū quod iam dictum est, supernum
 os facile ad partem subsidere solet. Plerisque igitur vbi deli-
 gati fuerint, figura ipsa opitulatur, ita vt ad ipsas costas cubi-
 ti gibbum habentes, hoc modo humerū ad supernā partem
 cogit. Quibusdam verò humerum quidem sursum velut di-
 ctum est, cogere oportet: cubiti autem gibbum ad pectus ad-
 ducere

A ducere: summam verò manum ad summum sanū humerum adhibere. Siquidem igitur decumbere sustinet, fulcimētum aliquod quod obfirmet apponere oportet quo humer⁹ quàm maximè supernè maneat. Si verò obambulare volet, fundā ex fascia factam, & acutæ gibbi cubiti parti circumdatam, de collo appensam gestare oportet. Cubiti porrò gibbi articu- Cubiti lu-
xatio. lus vbi emotus ac luxat⁹ est, ad costas, aut foras, acuta ipsius parte in brachij cavitāte manente, extensione in directum facta, id quod eminet retrorsum & in obliquum repellere oportet. Vbi verò perfectè excidit, aut hāc aut illāc, extensio in qua brachium fractum deligatur requiritur. Ita enim incurua gibbi pars non impedit. Excidit aut maximè ad partem Curatio. **B** tem versus costas. Correctiones verò facere oportet quā plurimum abducendo, & vt ne brachij caput cornicem contingat, sublimem circumducere ac inflectere, & non in directum cogere, simul autem cōtraria in vtranque partem detrudere, & in sedem compellere. Cōtulerit etiam in his gibbi cubiti inuersio, modò in supinā, modò in pronā partem. Curatio verò ex figura est, vt summam manum paulò altiorē cubiti gibbo habeant, brachiū verò ad costas. Sic etiam appensi exceptio, & positio, & gestandi facilitas, & natura, & vsus, in communi sunt, si modò non malè callus obducatur. Obducitur autem cito. Curatio fit linteis iuxta legem articu- Curatio. larem, ita vt acuta eius pars insuper deligetur. Recrudescit autem maximè cubiti gibbus febribus, doloribus, nausea & **F** vomitu meracæ bilis, præsertim si retrorsum luxat⁹ fuerit, ob torporē: deinde, si in anteriorem partem. Verū curatio eadem est. Repositio verò retrorsum luxati, vt extensum distendamus: Signū autem est, quòd extendere ipsum non possunt, sicut in anteriorem partem luxati, quòd inflectere nequeunt. Verū tunc durum quiddā inuolutum indere oportet, & circum hoc ab extensione derepentè inflectere. Disparationis autem ossium signum est manifestum ex contactu iuxta venam quæ in brachio finditur. At verò callus cito his obducitur. Ex natiuitate autem breuiora sunt ossa infra noxam. plurimū quæ proxima sunt, cubiti. deinde manus, postea digitorum. Verū brachium & humerus robustiora sūt. propter inuersionem. At altera manus propter opera adhuc fortior est. Imminutio verò carniū fit, si foras excidit, intrinsecus:

secus, Sin minus, in contrarium ponit, excidit. Cubiti verò **D**
gibbus si intrò, aut extra exciderit, extensio fit in communi
figura cubiti ad brachiū: fascia enim sub alā data, ipsam ex-
ceptam suspendere oportet: ad summum verò cubiti gibbū
iuxta articulum pondus appēdere, aut manibus deorsum co-
gere. Vbi verò articulus vltra eleuatus est, coaptationes ma-
num volis fiunt, velut etiam in manibus. Deligatio quoque
in hac figura, & exceptio appēsi, & positio. At si in posteriōre
excidit partē, statim extensum palmis dirigere ac coaptare
oportet. Simul autē in directione etiā aliis opus est. Si in an-
teriorē, circum linteum conuolutum iustā molis inflectēdo
simul directionē facere oportet. si verò in alteram partē in-
clinarit, in directione simul vtraq; facere oportet. Verū cu **B**
rationi cōmunis est figura & deligatio. Possunt autē ex di-
stentione omnia in cōmuni cōtingere. At verò repositiones
aliæ ex supereleuatione reponūtur, aliæ ex extēsiōne, aliæ ex
circūuolutione. Hæ verò ex figurarū excessibus, aut hanc, aut
illac celeriter fiunt. Manus articulus aut intrò, aut extra lu-
xatur, plerūq; verò intrò. Signa autē facilia cognitu sunt. Si
enim intrò luxatus est, digitos inflectere non possunt. Si ex-
tra extēdere nequeūt. Repositio fit, digitis supra mēsam posi-
tis, vt ab aliis atque aliis in diuersum extensio fiat, & id quod
eminet, aut vola aut calcaneo retrudatur, & in anteriōre par-
tem deorsum protrudatur. Infernē verò iuxta alterū os mo-
les aliqua conuoluta mollis supponatur, si supra eminet, ma- **F**
nu prona locata: si infrā, supina. Curatio verò linteis fit. Tota
porrò manus, aut intrò, aut extra, aut hanc, aut illac luxatur.
Maximē verò intrò. Quandoque autem & appendix emota
est. Quandoque verò alterū os disparatum distat. His exten-
sio foris facienda est, & quod quidem eminet retrudatur, al-
terum verò contra trudatur, duabus speciebus simul contin-
gētibus, & retrorsum, & in obliquū, aut manibus supra men-
sam, aut calcaneo. Quæ verò recrudescūt ac deformia sunt,
tempore ad vsum corroborantur. Curatio fit linteis cum ma-
nu & cubito: & ferulæ vsque ad digitos ponuntur. At ferulis
hæc deligata frequentius quàm fracturas soluere oportet, &
perfusionem ampliorem adhibere. Ex natiuitate autem ma-
nus breuior fit, & carnes imminuuntur maximē in cōtraria
parte ei in qua luxatio facta est. At adulto iam ossa manent.
Digi

Manus lu-
xatio.

Repositio.

Curatio.

A Digiti verò articulus luxatus facilis cognitu est. Repositio Digitus luxatus. Curatio. fit extendens in directum, ita ut quod eminet os protrudatur, contrariū verò contra trudatur. Curatio fit fasciis ac linteis. Si verò nō reponatur, forinsecus callo obducitur. At si hi ex natiuitate, aut dum adhuc crescit homo, luxata fuerint ossa, breuiora fiunt infra luxationē & carnes imminuuntur cōtraria maximè parte ei in qua luxatio facta est. In adulto verò ossa manēt. Maxilla verò paucis iam perfectè luxata est. Os Maxillæ luxatio. enim quod à superiore maxilla prodit, cū eo osse subiugatū est, quod sub aurē annexum est, quodq; capita infernæ maxillæ concludit, ac dirimit, cū altero capite superius sit, altero inferius: & extremæ infernæ genæ partes ita se habēt, ut altera ob longitudinē non facile accessum admittat: altera verò cornix est, & supra iugale os excedit. Simul autē & ambarū harum extremitatū neruosi tendines existunt, ex quibus musculi dependent, qui tēporales ac manducatorij appellantur. Propterea autē appellantur, & propterea mouētur, eo quod hinc dependent. Nā in edendo, & in loquendo: & in reliquo oris vsu, superna quidē maxilla quiescit. Est enim capiti connexa, & nō coarticulata. Inferna autē maxilla mouetur. Coarticulata enim est à superna maxilla, & à capite. Cur igitur in conuulsionibus ac distētionibus hic articulus distentus primus de se significationē præbeat: & cur plagæ tēporales periculosæ sint, ac soporē inducant, alio libro referetur. Quod verò non valde luxetur, causæ hæ sunt. Sed & hæc quoq; causa est, quod non valde tales ciborum necessitates hominem apprehēdunt, ut magis quàm potest, hiet. Excederit autem à nulla alia figura, quàm si quis valde hiās maxillam in alterā partem diducat. Confert tamē ad hoc ut excidat, hoc ipsum. Quicūq; enim nerui, & quicūq; musculi circa articulos sunt aut ab articulis ex quibus colligantur, horū quicūq; in vsu sæpe mouentur, hi etiam maximè ad extensiones remittunt, quēadmodum etiam pelles mollissimæ multū remittunt. De quo igitur sermo est, luxatur quidē & excedit maxilla raro: laxatur tamen sæpe in hiatibus, velut etiam aliæ musculorum ac neruorū immutationes hoc faciunt. Manifestū verò ex his maximè fit, vbi excidit. Prominet enim inferna maxilla in anteriore partem, & in cōtrariam luxationi partem abducitur, & ossis cornix circa supernam maxillā tumidior fit, &

Repositio. fit, & infernas maxillas difficulter cōmittunt. Quæ verò re-
positio his conueniat, manifestum est. Oportet enim aliquē
vulnerati caput detinere, & alterum infernā maxillam in-
trinsecus ac extrinsecus ad mentum digitis apprehēdere, &
primū maxillam aliquādiu hāc atq; illāc manu abducere, &
ipsum hominē iubere, vt maxillam laxā habeat, & simul ad-
ducat ac quā maxime remittat. Deinde repēte tribus figu-
ris simul laxare oportet, diligēti in hoc animaduersione ha-
bita. Nam & ex distortionē ad naturam deducere oportet, &
infernā maxillam retrorsum protudere, ita vt agre hāc se-
quatur, & maxillas cōmittat. ac non hiet. Atq; hāc quidem
Curatio. repositio est, & neque aliis figuris fieri poterit. Curatio verò
breuis sufficit. Splenium enim inceratum apponitur, ac laxo
deligamento deligatur. Securius autem hāc aggressio perfici-
tur, homine supino reclinato, & coriaceo puluinarī plenif-
simē factō capiti supposito, vt in ipsum innitēs quā mini-
mū cedat. Insuper autem & caput vulnerati aliquis detine-
re debet. Si verò ambæ maxillæ luxatæ fuerint, curatio qui-
dem eadem est, verū hi os minus committere possunt. Nā
his genæ prominentiores sunt, sed indistortæ. Quòd verò
distortæ non sint. maximē cognoueris ex dentium tum su-
pernorum, tum infernorum terminis, ē directo inter se cor-
respondentibus. His confert vt quā citissimē reponantur.
Repositionis autem modus prius dictus est. Si verò nō repo-
nantur, animæ periculum imminet præ febribus continuis,
& torpido sopore. Soporiferi enim hi muscoli sunt, & dum
alterantur, & dum intēduntur præter naturā. Solet etiam al-
uus his biliosa, meraca, pauca egerere. Et si vomuerint, mera-
ca vomūt. His igitur etiam moriuntur decima maximē die.
At si fracta fuerit inferna maxilla, si quidem nō omnino cau-
latim hoc contigerit, sed cohæret adhuc os, confractum ta-
men fuerit, dirigere quidem os oportet digitis circa linguā
obliquam subiectis, forinsecus verò, contra niti, prout contu-
lerit. Et si distorti fuerint dentes iuxta vulnus cōmoti, post-
quam os directum fuerit, dentes inter se coniugare oportet,
non duos solū, sed etiam plures, atq; hoc maximē auro, sin-
minus, lineo filo, donec os corroboretur. Postea cerato, & sple-
niis paucis, & linteis modicis deligare, non nimīū firmis, sed
laxis. Nam hoc probē nosse expedit, quòd deligatio per lin-
tea

470

A tea, maxilla fracta parū quidem contulerit, si recte fiat: magnopere verò laeserit, si prauè deligetur. Frequenter autē circa linguā explorare oportet, & multo tempore reniti ac digitis dirigere os confractum, optimūque esset si hoc semper fieri posset. sed fieri nequit. Si verò os penitus caulatim diffractum fuerit, raro autem hoc cōtingit: dirigere quidem os oportet velut dictum est. Vbi verò direxeris, dentes coniungere, quemadmodum antea dictum est. Magnopere enim contulerit ad quietem, & adhuc magis si quis recte cōiungat, & velut oportet suturas consuat. At enim nō facile est omnem chirurgiam scripto exquisitè proderet, sed ex his quae scripta sunt, formam & imaginem cōcipere oportet. Postea corio opus est Carthaginēsi, & si quidem iunior fuerit vulneratus, satis est squama inde detracta vti. Si verò adultior, ipso corio ita vt defecta inde particula trium digitorum latitudine, aut prout cōgrua fuerit, sublata prius ē gūmi maxilla, ita enim mitius fuerit, glutine agglutinetur summa sui parte, ad diffractam maxillae partem, digiti aut paulo ampliore distātia à vulnere. Et haec quidem particula ad infernā partem agglutinanda est, & habeat fissuram ē directo menti quo acutam eius partem circuncirca complectatur. Alterum autem eius modi lorum, aut paulo latius, ad supernā maxillae partem agglutinare oportet, tanta à vulnere distātia, quanta illa altera lori particula abfuit. Sit autem & hoc fissum, vt circuncirca aurem ambiat. Sint autē haec lora acuta, qua partē cōmittuntur, & vbi ipsorum extremitates connectere accolligare oportet. In agglutinatiōe verò, caro, corij ad cutē vergat. Sic enim magis agglutinatum adhærescit. Postea extento hoc loco, magis autem eo quod circa mētum est quā maximè, ne maxilla exacuatur, lora ipsa circa verticem connectere oportet, & deinde linteo frontem deligare, & superiniectū quid esse oportet, velut moris est, quo vincula quiescent ac firma. Decubitus autē faciat in sanam maxillam, nō maxillae, sed capiti innitens. Attenuandum verò est corpus vsque ad dies decē, deinde renutriendum nō tardè. Si enim primis diebus inflammatio non accesserit, in viginti diebus maxilla corroboratur, perfecte enim callo obducitur, quēadmodum etiā alia ossa rara, si nō corruptio infestaret. Verū de corruptionibus omnium ossium alia longa tractatio restat. Haec exte-

sio per agglutinamenta fiens, mitis est, & prompta ad mode- **D**
 rationem faciendam, & ad multas ac multis locis faciendas
 directiones accommodata. At medici non intelligētia æquē
 ac manibus prompti, tum in aliis vulneribus, tum in maxil-
 larum fracturis tales existunt. Varijs enim modis, & bene &
 male, maxillam fractam deligant. Omnis enim deligatio
 maxillæ sic fractæ, ossa ad fracturam magis vergentia incli-
 nat, quàm ad naturam ducit. St verò interna maxilla circa
 connexionem ad mentum diuulsa fuerit. Sola autē hæc con-
 nexio in interna maxilla est. Verùm in superna multa. Sed
 non volo sermone longius aberrare. In aliis enim morborū
 speciebus de his dicendum est. Si igitur connexio ad men-
 tum disparata fuerit, ipsam coaptare cuiuslibet viri est. **O** **E**
 enim quod eminet, ad internam partem digitis admotis de-
 trudere oportet. Quod verò intrò vergit, ad externam par-
 tem digitis immisisis reducere. Hæc tamē extensione disten-
 dendo facere oportet. Facilius enim sic ad naturam redibūt,
 quàm si quis ossa inter se complicans cogere conetur. Vbi ve-
 rò coaptata fuerint, coniugare oportet dentes inter se hinc
 atque illinc, velut prius dictum est. Curare verò cerato, &
 splenijs paucis ac linteis. Deligationem autem breuem po-
 tius quàm variam hic locus maximè admittit. Nā vt æqui-
 libris non est, propè tamen ad æquilibrium accedit. At linte-
 obuolutionem facere oportet, si quidem dextra maxilla emi-
 net, in dexteram. In dexteram enim fieri putatur, si dextra
 manus deligationi præit. Si verò altera maxilla eminuerit, **F**
 aliter deligationem ducere oportet, & si quidem rectè quis
 coaptationem adeptus fuerit, & velut cōuenit quieuerit, ci-
 tra curatio continget, & dentes illæsi manent. Sin minus, diu-
 turnior fiet curatio, & distortionem habebit, dentes autē læ-
 si & inutiles fiunt. Porro si nasus fractus fuerit, fracturæ mo-
 dus non vnus est. Verū qui pulchris deligationibus gaudent
 citra intelligētiam, tum in aliis multis damnum incurrunt,
 tum in fracturis circa nasum vel maximè. Ex deligationib⁹
 enim hæc maximè varia est, & quæ plurimas ascias habeat,
 & interruptiones ac interceptiones cutis maximè varias rhō-
 biformes. Sicut igitur dictū est, qui nulla intelligentia præ-
 diti aggressione studio tenentur, vltro se offerunt ad nasum
 fractum deligandum. Vna itaque alteraque die lætatur me-
 dicus,

Nasi fra-
 ctura.

A dicus, gaudet quoque is qui deligatur. Deinde cito quidē is qui deligatur, satiatur. Noxia enim & molesta est gestatio: satis autem est medico ostentasse, quod nasum variē deligare novit, facit autem talis deligatio omnia contra quā convenit. Partim enim qui propter fracturam simi fiunt, si supernē quis magis premat, simiores nimirum fient, partim verō quibus nasus hac aut illac distorquetur, aut circa cartilaginē, aut superius, palam est quod neque ipsis supernē deligatio proderit, sed etiam magis lædet. Non enim ita congruit spleniis altera nasi pars, quanquam neque hoc faciant deligantes. Proximē verō deligatio resistere mihi videtur, si iuxta medium nasum circa acutam partem, confusa caro ad os fuerit, aut etiam os parum, & non multum confusum sit. Talibus enim nasus callo obducitur, & aliquanto asperior euadit. Sed tamen neque his deligatio multo negotio opus habet, si modo etiam deligare oportet. Sufficit autem super contusionē splenium incratum extendere. Postea velut ex duobus initiis deligatio fit, ita semel linteum circundandum est. Optima *Curatio.* tamen curatio est, per farinam triticeam hornam, lotam, viscosam, subactam, modicā, ita ut talia ex illa velut cataplasmate integantur. Si igitur triticea farina bona fuerit, & tractu facilis, ea ad omnia huiusmodi uti oportet. Si verō non facilis tractu sit, modicam mannam leuissimē tritam, & aqua dilutam, cum farina subigere oportet, aut gummi parum, similiter ammiscere. Quibuscunque igitur nasus fractus est,

C ut deorsum & in sinum vergat, si quidem ex anteriore parte iuxta cartilaginē subsidat, fieri potest ut aliquid quod ipsum dirigat in nares indatur. Si minus, omnia talia digitis in nares iniectis dirigere oportet, si id fieri datur. Sin minus, crassum specillum nō in anteriorem narium partem digitis indere oportet, sed qua parte nasus subsidit: extrinsecus autem ab utraque parte nasum apprehendere, simulque cogere ac sursum ducere. Et si quidem valde in anteriore parte fuerit fractura, fieri poterit, ut aliquid intra nares indatur, velut iam dictum est, nimirum linteī rasura, aut aliud quid huiusmodi, linteo inuolutum, aut potius in corio Carthaginensi confutum; ea figura quæ congruat loco cui incumbet. Si verō ulterius facta fuerit fractura, fieri non potest ut aliquid indatur. Si enim in anteriore parte molesta

est gestario, quomodo non sit in interiore? Primum igitur & intrinsecus conformando, & forinsecus non parcendo, ad pristinam naturam reducere ac dirigere oportet. Valde enim conformatur nasus fractus, maxime quidem eadem die: sin minus, paulo postea. Verum segniter agunt medici, & leuius quam conuenit primum contingunt. Iniicere enim manus hinc atque illinc iuxta naturam nasi quam infime oportet, ex infernis sursum cogendo, & sic quam maxime erigere, vnam cum interna directione etiam extrinsecus dirigendo. Postea ad hæc nullus talis medicus est, si studium adhibere ac tolerare vult, velut ipsius digiti indices. Hi enim maxime secundum naturam sunt. Vtrunque enim digitorum iniicere, eoque totum nasum firmare oportet, atque ita in quiete habere, si quidem fieri posset, semper donec corroboretur: sin minus, plurimo tempore velut dictum est. Quod si fieri nequeat, aut puer aut aliqua mulier hoc faciat. Molles enim manus esse oportet. Sic enim quam optime nasus curari poterit, ubi non in obliquum, sed ad infernam partem æqualiter subsidat. Ego igitur nullum vnquam nasum vidi, qui sic fractus dirigi non potuisset, si statim ita cogeretur priusquam callus obduceretur, si modo quis recte curare velit. Verum homines ut ne deformes fiant, multo quidem precio coemerint, studium autem adhibere non sciunt, simulque non tolerant, si non dolore vexentur, aut mortem timeant: quanquam breui tempore nasus callo obducatur. decem enim diebus corroboratur, si non corruptio insuper accedat. Quibuscunque verò os in obliquum frangitur, curatio quidem eadem est. Verum directionem non æqualem vtrinque facere oportet, sed quod inclinatum est, intrinsecus cogendo ad naturam compellere, & in nares facta cōtrectatione, ea quæ intrò repunt impigrè dirigere, donec correctæ fuerint: ita ut eius probè memineris, quòd si non statim corrigantur, fieri non possit ut nasus non distortus fiat. Postquam autem ad naturam reduxeris, digitos plures aut vnum digitum ad locum ad mouere oportet, qua parte eminebat, atque ita aut ipsum, aut alium quendam sustentare, donec vulnus corroboratum fuerit. Sed & in narem paruum digitum immittere oportet, & alias atque alias impellendo ea quæ inclinata sunt dirigere. At si quid inflammationis his accedat

Accedat, farina subacta vti oportet: & tamen incumbente etiam farina digitos similiter admouere opus est. Si verò iuxta cartilaginem in obliquum fractus sit, necesse est summum nasum distorqueri. Talibus igitur in summam narem aliquid quod dirigat ex relatis, aut quod his simile sit, indere oportet. Poterit autem quis multa idonea inuenire, quæ neque odorem habeant, neque aliàs lenia sint. Ego verò quandoque pulmonis ouilli frustū defectum indidi. Hoc enim forte obtingebat. Nam spongiæ inditæ humiditates suscipiunt. Postea Carthaginensis corij squamā magni digiti latitudine, aut prout contulerit resectam, extrinsecus ad nasum inclinatum agglutinare oportet, & deinde hoc corij lorum prout contule-

Brit extendere. Paulo tamen amplius extendere conuenit, quo erectus & absolute directus sit nasus. Longum autē sit hoc lorum, ut postea infra aurē abductū circū caput obducatur: & licet quidē lori extremitatem ad frontem agglutinare, licet etiā longius deducere, & deinde capiti obductum deligare. Hic modus simul iustam directionem habet, & simul ad moderationē faciendā promptus est, ut si quis magis aut minus nasi inclinationē ad contrarium facere velit. Nam quibus in obliquū nasus frangitur, eos in reliquis velut relatum est curare oportet. Plurimis tamen insuper opus est, ut inclinationis in contrarium gratia, lorum ad summū nasum agglutinetur. Quibuscunq; verò cum fractura etiā vlcerā adsunt, eos ea propter turbari non oportet. Verū super vlcerā ceratum picatū imponere, aut ex emplastris aliquod cruentis vulneribus idoneum. Facilia enim curatu talia sunt. Similiter etiā, si ossa discessura sunt. Primam directionem impigrē facere oportet nihil omittendo, & directionem per digitos etiā postero tempore, ita ut laxius quidem admoueas, admoueas tamē. Ex omnibus enim corporis partibus nasus facili mē conformari potest. Cæterum lororum agglutinatione ac in contrarium inclinatione vti omnino nihil prohibet, siue vlcerā affuerint, siue inflammatio. Nullam enim molestiā exhibēt.

At verò si auris fracta fuerit, deligationes omnes inimicae sunt. Neque enim ita laxam quis circū dare poterit. Si verò magis premit, maius malum operabitur. Nam & sana auris deligatione pressa, dolore, & pulsatione, & febre afficitur. Sed & cataplasmata pessima quidē omnino sunt quæ grauissima

Auricula
fractura.

Pp 4 sunt.

sunt. Verum & alia pleraque omnia mala sunt, & abscessus inducunt, & mucum ampliorem suggerunt, & deinde suppurationes noxias. His autem fracta auris minimè opus habet. Proximum tamen locum habet, si quid imponi debet, farina viscosa, quam neque ipsam grauem esse oportet. Contingere verò quàm maximè conducit. Bonum enim aliquando medicamentum est, etiam nullum adhibere medicamentum, & ad aures, & ad multa alia. Vellicationem insuper ac scalpturam vitare oportet. Corpus autem attenuare, & magis in quo periculum est ne auris suppuretur, melius est quoque; alium mollius. Si verò quis facile vomat, ex moderata aliqua purgatione vomitum faciat. At si ad suppurationem deueniat, cito quidem aperire non oportet, multa enim ex his quæ suppurari videntur quæ E doque resorbentur, etiam si nòdum quis vllum cataplasma imposuit. Si verò quis aperire cogatur, celerrimè quidè sana fit, si in vltiorem partem perurat. Illud tamè certo scire expedit, quod mutila fiet auris, & minor altera, si perusta fuerit. Si verò non in vltiorem partem peruratur, tumidam partem non valde parua sectione incidere oportet. Sub crassiore enim cute pus reperitur quàm quis putauerit. Verum ut in summa dicam, alia quoque omnia mucosa, & mucos facientia, utpote quæ sunt viscosa, ad contactum sub digitis hac atque illac cito dilabuntur: & propterea sub crassiore cute medici talia inueniunt, quæ putarint. Nam & aliquas neruorum contortiones, ganglia appellatas, quæ sanè laxæ ac fluidæ sunt, mucosamque carnem habent, multi aperiunt, humorem in talibus se inuenturos esse E putantes. Medicus quidè igitur sententia sua fallitur, verum rei huiusmodi nullum ex apertione accedit detrimentum. Qui verò aquosi loci sint, aut mucos pleni: & in quolibet locis singula si aperiatur mortem afferant, aut etiam alia detrimenta inducant, de his in alio opere scribetur. Quum igitur inciderit quis aurem, ab omnibus quidè cataplasmatibus, & ab omni linamentorum usu abstinere oportet. Curare autem vel emplastro aliquo cruentis vulneribus idoneo, vel aliquo alio, quod neque grauitatè, neque dolorem inducat. Si enim cartilago denudari inceperit, & subsidentia purulenta aut mucosa habuerit, molestum est: Fit autem & hoc propter illas curationes. Cæterum omnium eorum quæ recruderunt, perustio in vltiorem partem sufficientissima medela est. Verticula verò spinæ quibus

Auris inci-
sa.
Curatio.

Verticula
spinæ.

A quibuscunq; in gibbum trahuntur ex morbis, pleraq; vt soluantur fieri non potest. Insuperq; & quæ supra septi transuersi iuncturam ac connexionem gibba fiunt. Quæ verò infra, eorum aliqua soluunt varices in cruribus fientes. Magis autem hæ varices quæ in vena iuxta poplitem fiunt, quibuscunque gibbositas cõtigerit, eam soluunt. Fiunt autem & in vena circa inguina. Iam verò quibusdã etiã dysenteria diuturna soluit. Et quibus quidẽ gibba fit spina dum pueri sunt, priusquã corpus ad augmentum plenum perfectum fuerit, his corpus iuxta spinam coaugeri non solet. Sed crura quidẽ ac manus perficiuntur, illæ verò partes defectuosiores fiunt, & quibus supra septum transuersum gibbositas est, his & costæ in amplitudinem augeri non solent, sed in anteriorem partem: & pectus acutum fit, sed non latum: ipsique & difficulter spirant, & stridulam faucium asperitatem habent. Nam vetriculi qui spiritum suscipiunt ac emittunt, minorem amplitudinem habent. Sed & iuxta magnum verticulum ceruicem repandã habere coguntur, vt ne caput ipsis pronum sit. Multa igitur angustiam faucibus exhibet etiã hoc os intro vergens. Nam & his qui natura recti sunt, spirandi difficultatem hoc os inducit, si intro vergat, donec repressum fuerit. Ob talẽ igitur figurã eiusmodi homines eminentis gutturis, magis quàm sani apparent: & tuberculis circa pulmonẽ duris ac crudis plerumque tales affecti sunt. Nam & gibbositatis occasio, & distensio pleurisque propter tales collectiones fit, cum quibus vicini nervi cõmunionẽ habent. Quibus verò infra septum transuersum gibbositas est, horum quibusdam morbi rhenũ ac vesicæ accedunt. Sed & abscessus ad suppurationem, & circa laterum mollitudines, & inguina diuturni ac agrè curabiles, & neutri horum gibbositates soluunt. Coxæ verò his magis excarnes fiunt, quàm his quibus supernè gibbositas cõtigit. Vniuersa tamẽ spina his longior est quàm supernè gibbosis. Pubes verò & barba tardior ac imperfectior. Sed & infecundiores hi sunt quàm supernè gibbosi. At verò quibus iam aucto corpore gibbositas facta fuerit, his palam presentis tunc morbi iudicationem gibbositas facit, per tempus tamẽ, aliquid ex iisdem significationem de se plus aut minus præbet, quemadmodum etiam in pueris. Minus autem malignè in totum talia se habent, & multi sanè iam faciliè ac sano modo gibbositatem su-

Pp s finuer

Spina gib-
bosa.

stinuerunt, usque ad senectutem: & maximè hi quibus ad car-
nositatem ac pinguitudinem promotū fuerit corpus: pauci
tamen talium sexaginta annos transgressi sunt plerique ve-
rò breuioris vitæ sunt. Quibusdā etiā in latus, aut hac aut
illac, verticula obliqua fuit. Et omnia aut pleraque talia, pro-
pter collectiones intra spinam fiunt. Quibusdā vnà cū mor-
bo etiam figuræ insuper conferunt, ad quas reclinari consue-
uerunt. Verū de his in diuturnis pulmonis morbis dicitur.
Illic enim de his quæ futura sunt, pulcherrimæ prænotiones
habentur. Porro quibus ex casu spina gibba fit, horum sa-
nè pauca superantur, ita vt dirigi possint. Nam quæ in scala
fiunt extensiones, nihil direxerunt quod ego sciam. Vtruntur
enim ipsa maximè hi medici, qui multitudinis famam aucu-
pantur. Apud tales enim hæc in admiratione sunt, si aut pen-
dentem, aut proici aliquem aut quæ his similia sunt videāt,
& hæc celebrant semper, neque ipsi curæ est quale quid eue-
niat ex hac aggressione, siue bonum id sit, siue malum. Medi-
ci tamen qui talia studio habent, quos sanè ego noui, imperi-
ti sunt. Inuentum equidem verus est, & laudo sanè vehemen-
ter eum qui primus excogitauit & hoc machinamentum, &
quoduis aliud secundum naturam inuentum. Nihil enim de-
spero, si quis rectè constructum concutiat, fieri posse vt quæ-
dam dirigantur. Ipse tamen omnia huiusmodi hoc modo cu-
rare erubui: propterea quod impostorū magis tales sunt mo-
di. Quibus igitur prope ceruicem gibbositas fuerit, his veri-
simile est has in caput extensiones minus prodesse: paruum
enim pondus habet caput, & summi humeri deorsum vergē-
tes. Verū tales verisimile ex magis dirigi posse, si in pedes
cōcutiantur. Ita enim maior propensio ad huiusmodi fieret.
Quibus autē magis inferius gibbositas est, hos par est vt ma-
gis in caput concutiantur. Si quis igitur concutere volet, re-
ctè sanè hoc modo præparare poterit. Scalam coriaceis aut
laneis puluinaribus insternere oportet probè alligatis, paulo
amplius & in longitudinem, & in vtrāque partē, quàm quan-
tum corpus hominis occuparit. Deinde hominem supinum
supra scalam reclinare, & postea pedes quidē alligare iuxta
malleolos ad scalam non disparatos, vinculo quidem satis va-
lido, verū molli, alligare verò etiam oportet infra & supra
vtrunque genu, itēque circa coxas. Circa laterum autem
mollit

A mollitudinem, & circa pectus, laxas fascias circumdare, ita ut ne impediunt concussione. Manus verò ad costas extensas, ad corpus applicare, & non ad scalam. Vbi verò hæc præparaueris, scalam ita ad turrim aliquam altā, aut ad domus lacunar attrahere oportet. Locus autem in quo concussione facis, renitens sit. Eos verò qui extendunt probè doctos esse conuenit, quo æqualiter, & probè, & ex æquilibrio, ac derrepente demittant, ut neque scala in alteram partem repens ad terram deueniat, neque ipsi pronui sint. Quod si tamen à turri, aut malo defixo carthesium habente, quis demittat, adhuc melius præparabit, ita ut ex trochlea aut asello laxatis instrumentis ac funibus demissio fiat. Verum iniucundum est de his longius verba facere: attamen ex his structuris maximè quis concuti poterit. Si verò valde supernè fuerit gibbositas, & concutere sit opus, omnino in pedes id faciendum est, velut dictum est. Ita enim maior propensio ad hæc contingit. Et firmare quidem oportet iuxta pectus ad scalam fortiter deligando, iuxta ceruicem verò fascia quàm laxissima directionis saltem gratia. Sed & ipsum caput iuxta frontem ad scalam alligare oportet, manus autem porrectas ad corpus alligare non ad scalam. Reliquum verò corpus indeligatum esse oportet, nisi quantum satis est directionis gratia, alia atque alia laxa fascia circumdatum esse. Verum considerandum est ne concussione impediunt hæc vincula. Crura verò ad scalam quidem ne deligentur, sed inter se, ita ut secundum spinam in directum vergant. Atque hæc quidem hoc modo facienda sunt, si omnino opus fuerit in scala concussione fieri. Turpe tamen est & in omni arte, & non minimè in medicina, multā turbam, & multam ostentationem, & multum rumorem cōcitare, deinde nullam vtilitatem afferre. Oportet autem primū spinæ naturam qualis est cognoscere, ad multos enim morbose ea opus fuerit. Nam qua parte ad ventrē vergit, verticula intus inter se paria sunt, & inter se ligata vinculo mucoso ac nervoso de cartilaginibus exorto vsq; ad medullam. Alij verò nerui nervosi perpetui annexi, hinc atq; illinc iuxta ipsa porriguntur. Verum venarū & arteriarū cōmunitates, in alio sermone declarabuntur, quot & quales sint, & vnde proficiantur, & in qualibus qualia possint. Itēque quibus inuolucris ipsa medulla intecta sit, & vnde profect

*Quid turp
m' n' art*

Spinæ natura pernoscenda.

Arteriarum

profectis, & ubi desinentibus, & quibus cū communione ha- **D**
bentib⁹, & qualia potētib⁹. At in vltiore parte in articulis
verticula inter se cardinis in modum cōserta sunt. Nerui ve-
rò communes iuxta omnia, & in externis, & in internis par-
tibus porriguntur. Et processus ossis ad externā partem, ab
omnibus verticulis vnus de vnoquoq; tum à maiorib⁹, tum
à minoribus. In his autem processibus cartilaginum appen-
dices, & ex illis neruorum progerminatio, cognata ac consi-
milis extremis neruis. Costæ verò annexæ sunt, ad internam
partem magis quàm ad externam capitibus vergentes, ad
vnumquodq; autem verticulum adarticulatæ sunt. Curuissi-
mæ autē sunt hominis costæ obtorto modo. Intermediā ve- **E**
rò partem costarum & ossium de verticulis procedentium,
explent vtrinque muscoli, à ceruice initio sumpto, vsq; ad se-
pti transuersi annexionē. Ipsa autem spina secundū longitu-
dinem rectobliqua est, à sacro quidē osse vsque ad magnum
verticulū, iuxta quod crurum annexio depēdet, gibbosa est.
Nam & vesica, & genitura, & intestini recti laxa pars, in hac
parte constituta sunt. Inde verò vsque ad septi annexionem,
in directum repāda est, & musculos ad nates habet solus hic
locus, ex internis partibus, quos lumbarios vocāt. Ab hac au-
tem parte vsq; ad magnū verticulū, quod supra supernas hu-
meri partes est, è directo gibbosa est, imò magis esse videtur
quàm est. Nam spina media sui parte, altissimas ossiū propa-
gines habet, hinc autē atq; illinc, minores. Ipse verò ceruicis **F**
articulus repandus est. Quibuscūq; igitur gibbositates iuxta
verticula fiunt, his expulsio magna à connexionē abrupta,
vnus aut plurium verticulorū, nō ita multis, sed paucis con-
tingit. Neq; enim talia vulnera fieri facile est, neq; ad exter-
nam partem expelli facile est, si non ex anteriore parte, forti
aliqua re per ventrē quis vulneratus fuerit: Sic autem vtique
perierit: aut nisi quis ex alto loco delapsus, coxis aut hume-
ris impegerit. Sed & hic vtique morietur, etiam si statim nō
intereat. At ex posteriore parte ad internam, huiusmodi ex-
pulsionem fieri non est procliue, si non in immensum graue
aliquod onus irruat. Nam ex ossibus quæ foras enata sunt,
vnumquodq; eiusmodi est, vt prius ipsum frangatur, quàm ma-
gnam intrò inclinationē faciat, ita vt & ligamenta, & articu-
los inter se alternatos ac articulatos violet. Præterea & spi-
nalis

A nalis medulla affligeretur, si ex modico loco inflexionem haberet, ubi verticulū tali expulsiōe exiluisset: & verticulum quod exiluisset, spinalem medullā utiq; premeret, si non etiā abrumperet: At ea pressa ac intercepta, multarū & magnarū & nobilium partium torpore induceret. Quare neq; curę foret medico, quomodo verticulū dirigat ac coaptet, quū multa & violenta alia mala adsint. Itaq; si tale contingat, palām est quod neq; concutiendo, neque alio quodam modo, reponi possit, nisi quis dissecto homine, & manu in ventrem iniecta inquisitionem faciat, & ex interna parte ad externam manu retrudat. atq; hæc in mortuo quidē fieri possent, in viuo autem non ita. Cut igitur hæc scribo? Quia sunt quidam qui putant se curasse homines, quibus intro exciderint verticula articulos penitus transgressa: & sanē facillimam hanc distortionē esse, ut quis inde cōualescat, aliqui censent, eāque nulla repositione opus habere, sed sua sponte talia sanescere. Ignari autē multi sunt, & lucro hoc habēt quod ignorāt. Persuadent enim alios. Verū fallūtur hi hac de causa. Spinā quæ in spina ipsa eminet, verticula ipsa esse putāt, quia vnūquodque ex his ossibus ad contactū rotundum apparet, ignorātes quod hæc ossa sunt ea quæ à verticulis enata sunt, de quibus paulō antē dixi. At verticula longē magis in anteriore partem absunt. Angustissimum enim ventrem ex omnibus animalibus homo habet, quantum ad magnitudinem attinet, à posteriore ad anteriore partem, insuperq; etiā iuxta pectus.

C Quum igitur horum supereminentiū ossium aliquod vehementer fractum fuerit, siue vnū, siue plura, ea parte humilior locus redditur, quā hinc atq; illinc: & propterea decipiuntur putātes verticula intro abiisse. Decipiunt autem insuper ipsos etiā figuræ vulneratorū. Si enim inclinare se conantur, dolent: quū ea parte qua vulnerati sunt, cutis sit circumtenta: & simul ossa fracta ita magis corpus affligunt. Si verō in repandum recurvantur, melius habēt. Nam & cutis iuxta vulnus laxior fit, & ossa minus affligunt. Sed & si quis ipsos contingat, ea parte repādi cedunt, & locus vacuus ac mollis hac parte ad contactum apparet. Hæc omnia relata insuper medicos decipiunt. Verū tales cito sanī & illæsi sua sponte sūt. Cito enim omnia eiusmodi ossa quæ laxa sunt, callo obducuntur. Obliquatur igitur spina etiam sanis iuxta multos modos,

Angustissimum
 ventrem
 animalis
 habet homo

Spinae obli-
 quatio.

modos. Nam & in natura, & in usu ita se habet. Sed & pre-
 neſtute, ac doloribus. Nā hæc colligādi vim habent. At gib-
 boſitates ex caſibus contingentes plerunq; fiunt, ſi aut in co-
 ſtas innitatur ac impingat, aut in humeros cadat. Neceſſe eſt
 enim foris apparere in gibboſitate vnum aliquod altiſſimū
 verticulū, minus verò ea quæ ſunt hinc atq; illinc. Nō igitur
 proſilit multū ab aliis, ſed parū, quū ſingula, aceruatim con-
 cedāt. Propter hoc igitur etiā ſpinalis medulla eiſmodi di-
 ſtortiones facile fert, eo q̃ circularis ipſi diſtortio contingit,
 non angularis. Oportet autem fabricam inſtrumēti coactio-
 rij huiuſmodi cōſtruere. Licet equidē lignum robuſtū & la-
 tum, inciſuram oblongam habens, defodere. Licet etiā pro li-
 gno, in pariete inciſuram oblongā facere, quæ aut cubiti al-
 titudine, aut prout congruum fuerit, à paui-^Emēto extet. Poſt
 ea columnā querneam, quadrangularem, obliquā ad parietē
 adſcere oportet, tanto ſpacio in medio relicto, vt aliquis
 pertranſire poſſit, ſi forte opus ſit. Et ſuper columnā quidem,
 aut tunicas, aut aliud quid molle, quod tamē non multū ce-
 dat, inſternere oportet, homini verò fomentum adhibere. Si
 verò admittat, ipſum etiā lauare. Deinde pronū extentū re-
 clinare, & manus ipſius ſecundū naturā extenſas ad corpus
 alligare. Poſtea verò loro molli ſatis lato ac lōgo, ex duobus
 perpetuis inter ſe aduerſariis loris conſtante, ex media ipſius
 parte, iuxta medium pectus quā proximē ſub alas, bis cir-
 cundare oportet, & quod ſuper eſt de loris vtriſq; iuxta alam
 circum humeros obuoluatur, & initia ipſorū ad lignū quod-
 dam piſtilloforme alligentur, ita vt congruant ſecundū lon-
 gitudinē ſubiectæ columnæ, ad quam lignū illud piſtillofor-
 me apponere, & retinendo extenſionem facere oportet. Tali
 verò quodam alio vinculo & ſupra genua, & ſupra calcanea
 alligato, initia itē ad eiſmodi lignū alligare oportet. Poſt-
 ea autē alio loro lato ac molli & robuſto ſcix formā habē-
 te, longitudinēmq; ac latitudinē ſufficientē, partem inter co-
 xas & lumbos, quā proximē ad coxas, circum circa fortiter
 deligare, atq; ita tum huius lori, tum aliorū duorum capita,
 ad lignū à pedibus extās alligare. & poſtea in hac figura hinc
 atq; illinc, æqua ſimul inclinatione, ſimulq; in directū exten-
 ſionē facere. Nullū enim magnū malū talis extenſio induxe-
 rit, ſi cōmodē preparata fuerit, niſi quis de induſtria ſe exten-
 dendum

484

A dendum exhibeat. At medicus, siue alius quisquam fortis & nō imperitus imposita manus vola supra gibbū, & altera manu insuper alteri superimposita, deorsum cogat, animaduersione habita an in directum deorsum cogere oporteat, siue ad caput, siue ad coxas. Atque hæc coactio maxime innoxia est. Sed & si quis insideat super gibbum, & attollēdo se dum ille distēditur incutiat, innoxium est. Neque quicquā prohibet pede inscendere ac gestari supra gibbum, atq; ita sensim incutere. Ad hoc autem moderatē faciendum idoneus quis fuerit ex his qui in palestra adsuēti sunt. Efficacissima tamē coactio est si aut partes incisuram habeat, aut lignum defossum infra spinæ altitudinem incisum sit, quantum moderatē habere videatur, ita vt tabula tiliacea, aut cuiusdam alterius ligni, non tenuis, incisuræ indatur, & postea linteum quoddā multiplex, aut paruū quoddā coriaceum puluinar, super gibbū imponatur. Quā paucissima tamen imposita esse cōducit, cauendi saltē gratia, vt ne tabula præ duritie dolorem aliquē importunē inducat. Sit autem gibbositas ē directo maxime incisuræ in pariete, quo qua parte maxime extat, ea quā maxime tabula imposita premat. Vbi verò imposita fuerit, aliquis extremā tabulæ partem deprimat, aut duo hoc faciāt, si vnus nō suffecerit. alij verò corpus secundū longitudinem velut dictum est extendant, partim hinc, partim illinc cōstituti. Potest etiam asellis extensio fieri, aut iuxta lignum defossis, aut in ipso ligno asellorū postibus constructis, siue erectos velis vtrinq; paululum supereminētes, siue hinc atq; illinc iuxta ligni verticem. Hæ coactiones moderationem admittūt, vt & vehemētissimē, & moderatē fieri possint. Talem autem vim habent, vt si quis etiam ad perniciem tales necessitates adhibere velit, & nō ad curationem, tunc quoq; multum possint. Nam si quis secundum longitudinem hinc atq; illinc saltem sic extendat, & nullam aliam necessitatem addat, tamen sic etiam extensionem facere poterit. Sed & si non extendat, & tabula solū ita quis vtatur, etiam sic sufficienter deorsum cogere poterit. Bonæ autem sunt huiusmodi violentiæ, quibus & vehementioribus & debilioribus vt licet, vsu ipsorum prout quisq; vult moderato. Et sanē etiam secundū naturam coactionem faciūt. Nam ea quæ extant, ad locū suū redire cogit depressio. Quæ verò
præter

præter naturam coiuverunt, ea extendunt extensiones secundum naturam. Proinde neque meliores his necessitates ego habeo, neque iustiores. Rectitudo enim extensionis iuxta ipsam spinam, infernè & iuxta os sacrum appellatum, nullam ansam habet: supernè verò iuxta ceruicem & caput, habet quidè ansam, sed in speciem indecora est: & si hac parte extensio fiat redundans, etiam alias læsiones inducere poterit. Experimentum autem aliquando feci, ut homine supino extento utrem non inflatum sub gibbum subderem, & postea folle ex officina fabri in subiectum utrem immisso inflarè. Verum res mihi non successit. Quum enim bene extenderem hominè, vincebatur vter, & non poterat flatus aliquam coactionem facere. Sed & aliàs hæc res prompta erat ad dilapsionem, nimirum quum in idem & hominis gibbositas, & vtris pleni incuruaturgiditas cogatur. Quum autem rursus non valde extenderem hominem, vter quidem præ flatu incuruus turgebat, homo verò omnino magis quam conducebat repandus fiebat. Scripsi autem hoc de industria. Pulchrum enim est etià ea discere quæ in experimentum assumpta successu caruerunt, &

Verticula cur successum non habuerunt. Quibuscunq; porro verticuli obliquata. In intro obliquantur, aut ex casu, aut graui aliqua re illapsa, his nullum quidem verticulum extat plerumque ita multum ab aliis. Si verò extiterit multum, aut vnū aut plura, mortem inducunt, velut etiam antea dictum est. Circularis etiam hæc & non angularis emotio existit. Vrinæ igitur talibus magis **F** supprimuntur, itemque alui egestio, quam his qui extra gibbosum fiunt: & pedes ac tota crura magis perfrigerantur, & lethalia sunt hæc magis quam illa quæ dixi. Sed & si superstites euadunt hi, magis profluam urinam habent, & cruribus impotentiores ac torpidiores fiunt. Si verò etiam in superna parte magis repadi fiant, totius corporis impotentia ac torpor accedit. Atque ego sanè nullam machinam habeo, per quam talia in idem restitui possint, si non alicui cōcussio per scalam opem tulerit, aut etià alia quædam eiusmodi curatio aut extensio, qualis est ea quæ paulò antea relata est. Ad coactionem vnā cum extensione nullam habeo, quæ sanè fieri ita posset, velut in gibbo tabula coactionem faciebat. Quomodo enim quis ab anteriore parte per ventrem coactionem facere possit? Neque enim fieri hoc potest. Sed neque tusses, neque sternutatio

A nutationes vllam vim habent, vt extēfioni auxiliari possint.

Nec verò flatus immisio in vētrem quicquā efficere poterit. Quin & si magnæ cucurbitæ affigatur, attractionis nimium gratia verticulorum intrò repētium, magno hoc mētis errore contingit. Propellunt enim magis quàm attrahunt, & neque hoc animaduertunt hi qui ipsas affigunt. Quāto enim magis ipsas quis adigit, tanto magis repandi fiunt hi quibus affiguntur, cute simul sursum coacta. Possem autē & alios cōcussionū modos, quā hi sunt quos antea retuli, exponere, quos sanè affectioni magis conuenire quis putare possit, verum non valde ipsis fidem habeo, & propterea non scribo. In summa igitur de his quæ relata sunt, ita acervatim cōstitue-

B re oportet, quòd ea quidem quæ in repādum emota sunt, lethalia sunt ac noxia: quæ verò in gibbum, innoxia in totum, quantum ad mortem, & vrinæ suppressionem ac torporem attinet. Non enim riuos qui sunt in ventre gibbolas ad externam partē intendit, neq; fluidos esse prohibet. Repāditas verò ambo hæc facit, & ad alia multa hæc accedunt. Nā multo plures & cruribus & manibus impotentes fiunt, & corpore torpescunt, & vrinæ his supprimuntur, quibus gibbolas quidem neque extra neq; intrò extiterit, verum in reēitudinem spinæ vehemēter concussi fuerint. Quibus verò gibbolas extat, hi minustalia perpetiuntur. Multa verò etiam

C alia in medicina quis videre poterit, ex quibus ea quidem quæ fortia sunt, innoxia sunt per se totā morbi iudicationē inducētia: quæ verò debiliora, noxia, ita vt & diuturnos morbos progenerent, & cum reliquo corpore ampliorem cōmunionem habeant. Nam & costarum fractura eiusmodi quid perpetitur. Quibus enim fracta fuerit costa vna, aut plures, velut plurimis frāgitur, ita vt ossa ad internam partem non vergant, neq; denudata sint, ex his pauci iam febricitarunt. Sed neque sanguinem multi iam expuerunt, neq; suppurati multi fiunt. neque curatione medicamentorum ex illitis linamentis opus habent, neq; ossium corruptiones accedunt, & victus vulgaris sufficit. Si enim febris continua ipsos non corripuerit, etiam vasa per inēdiam his vacua fieri deterius est, quàm si nō vacua fiant. Maiorem item dolorē ac febrem & tūssim inducit. Moderata enim ventris repletio, costarum fit directio. Verum vacuatio pendentes costas facit, & hæc

Qq

depen

Hippocratis Liber

dependentia dolorem inducit. Extrinsecus autem vulgaris **D**
 deligatio talibus sufficit, ita ut cerato, & spleniis, & linteis,
 plana deligatio placide firmeretur, aut etiam laneum quiddam
 insuper opponatur. Corroboratur autem costa diebus vigin
ti. Celeriter enim his ossibus calli obducuntur. At confusa
 circa costas carne, aut ex plaga, aut ex casu, aut renisu, aut a
 lio quopiam eiusmodi, multi iam multum sanguinem spuerunt.
 Riui enim in molli ad vnamquamque costam extenta parte, &
 nerui, à principalissimis in corpore partibus progressus ha-
 bent. Multi itaque iam tussiculosi, & tuberculosi, ac suppurati
 facti sunt, & linamentis opus habuerunt, & costa ipsis corru-
 ptionem sensit. Sed & quibus nihil tale accessit, carne circa
 costas confusa: tardius tamen dolor in ipsis sedatur, quam in **E**
 his quibus costa facta fuerit: & in talibus vulneribus locus
 dolorum recidivas magis habet. Proinde aliqui tales noxas
 magis contemnunt, si costa ipsis fracta fuerit. Quin & cura-
 tione exactiore tales indigent, si modò sapiant. Victum enim
 contractum esse conducit, & corpore quam maximè quiesce-
 re, & à venere abstinere, edulibusque pinguibus, & fauces exa-
 sperantibus, ac fortibus omnibus: Venamque in cubiti flexu-
 ra secare, & quam maximè filere. Deligare verò locum con-
 tusum conducit spleniis non multiplicibus, sed multis &
 multò latioribus tota contusione, & cerato sublinere, & lin-
 teis latis cum fasciis latis ac mollibus deligare, & moderatè
 firmare, ut deligatus non valde se compressum esse dicat ne-
 que rursus laxum. Initium autem sumere debet qui deligat **F**
 in ipsa contusione, atque isthic maximè firmare, facienda
 verò est deligatio velut à duobus initiis, deligandumque ut
 ne circumflua sit cutis circa costas, sed æquilibris. Deli-
 gandum autem aut singulis aut alternis diebus. Præstat
 autem & aluum mollire leui aliquo medicamento, cibi sal-
 tem euacuandi gratia: & ad decem quidem dies attenuare.
 Postea verò corpus renutrire ac tenerum facere. Quandiu
 verò attenuas, deligatione magis firmata utendum est.
 Quum autem ad teneritudinem deducis, laxiore. Et si
 quidem sanguinem ab initio expuerit, quadraginta die-
 rum curationem ac deligationem facere oportet. Si verò
 sanguinem non spuat, sufficit viginti diebus ut plurimum
 curatio. Verum ex robore vulneris tempora coniectare
 oportet

A oportet. Qui porrò tales contusiones neglexerint, etiam si aliud nihil maioris mali ipsis contingat, tamen locus contusus mucosiores carnem habet, quàm antea habebat. Vbi verò tale quippiam relinquitur, & curatione non probè exprimitur, deterius quidem est si iuxta ipsum os mucositas relicta fuerit. Neque enim caro amplius similiter os contingit, & os ipsum morbosius redditur, & corruptiones ossis diuturnæ, multis iam ex huiusmodi occasionibus factæ sunt. Sed & si iuxta os non fuerit, verum ipsa caro mucosa sit: attamen etiam sic recidiuæ, ad dolores, aliàs atque aliàs fiunt, si quis forte corpore ægrotauerit. Quapropter deligatione uti oportet bona, simulque multum conueniente, quo ad ea humoris effusio, quæ in contusione facta est, relicet ac resorbatur, locus autem carne sana augeatur, & ossis quoque caro augeat. At quibus ex neglectu vetustatem contraxerit, ita ut locus sit dolorosus, & caro submucosa, his vltio medela optima est. Et si quidem ipsa caro mucosa fuerit, vltque ad os vrere oportet, non tamen ut os percalescat. Si verò inter costas mucositas fuerit, ne sic quidem in superficie vrere oportet, cauere tamen ne in vltiorem partem peruras. Si verò ad os ipsum contusio esse videatur, & sit adhuc recens, & nondum os corruptionem sentiat: si quidem parua admodum fuerit, sic vrere oportet veluti dictum est. Si verò oblonga fuerit iuxta os contusionis eleuatio, plures crustas incutere oportet. Caterum de corruptione costæ, vnâ

B cum eorum, qui linamentis opus habent curatione, dicitur. Si verò femoris articulus ex coxa exciderit. Excidit autem iuxta quatuor modos, intrò quidem sæpe, foras autem præ aliis sæpe. Verum in posteriorem ac anteriorem partem excidit quidem, sed raro. Quibus igitur intrò exciderit, his longius apparet crus, si ad alterum comparatur, atque hoc merito, propter duas causas. Nam os quod à coxa procedit, & sursum ad pectinem fertur, fundamentum sit capitis femoris, & articuli ceruix in acetabulo vehitur: & nates forinsecus cauæ apparent, utpote quum intrò cesserit femoris caput. Et rursum summa femoris pars iuxta genu, extra repere cogitur. Tibia ite, & pes, eodem modo. Quum igitur foras repat pes, medici ob imperitiã, sanum pedem ad hunc adhibent, & nō hunc ad sanum: & propterea multò longius

Femoris articulus quatuor modis excidit.

læsum crus apparet quàm sanum. Multis autem etiã aliis lo-
 cis talia sinistram intelligentiam habent. Nec verò flectere
 iuxta inguen similiter vt sanum possunt. Sed & si femoris ca-
 put in interfœmineo contingatur, palàm extuberare com-
 peritur. Signa igitur hæc sunt, in his quibus femur intrò ex-
 cidit. Quibus igitur articulus elapsus nō fuerit repositus, sed
 aut frustra tentatus est, aut neglectus, his & ambulatio per
 cruris circumuolutionem, velut in bobus fit, & plurima ve-
 xatio ipsis in sano crure contingit: & coguntur iuxta lateris
 mollitudinem, aut iuxta elapsum articulum, mutili ac obli-
 qui esse. Iuxta sanum verò crus, nates ad externam partem
 rotundæ esse coguntur. Si quis enim sani cruris pede extra
 ambularet, protruderet vtique reliquum corpus, vt ad læ-
 sum crus veheretur. Læsum autem vehere hoc non poterit.
 quomodo enim posset? Cogitur igitur sic sani cruris pede
 intro ambulare, & non extra. Ita enim maximè vehit sa-
 num crus, & suam ipsius, & læsi cruris, partem corporis vtrif-
 que incumbentem. Quum autem iuxta lateris mollitudinē,
 ac iuxta articulum cauentur, parui apparent, & baculo in-
 niti coguntur à latere iuxta sanum crus. Hac enim parte ful-
 cimento opus habent. Ad hanc enim & nates repunt, & in
 hac corporis pondus vehitur. Coguntur intem se inclinare.
 Manum enim quæ est à parte cruris læsi, ad obliquū femur
 firmare coguntur. Non enim potest læsum crus vehere cor-
 pus, in crurum permutatione, si non detineatur dum ad ter-
 ram premitur. In his igitur figuris esse coguntur hi quibus
 intrò elapsus, non fuerit repositus articulus, homine non præ-
 meditante vt quàm facilimè sit figuratus. Sed ipsa hæc cala-
 mitas ex præsentibus ea quæ facilima sunt eligere docet.
 Nam & qui vlcus habent in pede aut tibia, non omnes cru-
 re valde ingredi possunt, & infantes sic iter faciunt, extra
 enim ingrediuntur læso crure. Et duplex lucrum conse-
 quuntur. Duplici enim opus habent. Nam & corpus non si-
 militer vehitur in eo crure quod extra ingreditur, sicut in
 eo quod intrò. Non enim secundum rectitudinem ipsi in-
 cumbit pondus, sed multò magis ei quod subingreditur. Ipsi
 enim è directo incumbit pondus, tum in ipsa ambulatione,
 tum in crurum permutatione. In hac enim figura sanū crus
 celerimè supponere poterit, si eo quod læsum est, exterius:
 sano

A sano interius ingreditur. Verum de quo nunc sermo est, Bonum est ut corpus ipsum sibi ipsi facilimas figuras inueniat. Quibus igitur nondum perfectis ad augmentum, elapsus articulus non fuerit repositus, his femur decurtatur, & tibia, & pes. Neque enim ossa similiter in longitudinem augescunt, sed breuiora fiunt. Maxime autem femoris. Ex carne item & emusculatū, ac effœminatum & tenuius totū fit crus, simul quidem propter priuationē loci articuli, simul autem quod eo uti non possunt, eo quod secundum naturam situs non est. Vfus enim aliquis liberat ab effœminatione, liberat etiam aliquantum ab intercepto in longitudinē augmentum. Maxime igitur læduntur hi quibus dum in vêtre sunt, hic articulus fuerit luxatus. Secundo loco hi quibus valde infantibus idem contigit. Minimè verò hi qui perfecti sunt. Qualis igitur ambulatio perfectis contingat, dictum est. Quibus verò dum infantes sunt calamitas hæc incidit, plerique ad corporis directionem tardi sunt, imò male ad sanū crus deuoluuntur, manu quæ est ad sanum crus, ad terrā se fulciētes. Sed & ex perfectæ ætatis hominibus quidā, quibus hæc calamitas contigit, ad ambulationem rectā cunctātur. Quicunq; verò infantes hac calamitate pressi, rectè educati fuerint, sano quidem crure in rectum vtuntur, verum sub alam secundum sanum crus scipionem ferūt, aliqui etiam sub vtranque alam. Crus autem læsum eleuatū habent, & tanto melius habent, quanto breuius ipsius læsum crus fuerit. Sanum autem crus nihilominus ipsis robustum est, quàm si ambo sana essent. Effœminantur tamen omnibus talibus carnes cruris, & plerunq; hoc magis perpetiuntur hæ quæ sunt ab externa parte, quàm quæ ab interna. Cæterum quidam fabulantur Amazonides masculam suam sobolem statim dum infantes sunt luxare, aliàs circa genua, aliàs circa coxas, quo nimirū claudi fiant, & masculum genus fœmineo insidias non struat. Vtuntur itaque his pro opificibus, ad coriaria, aut fabrilia, aut alia sedentaria opera. An equidem vera hæc sint, ego non noui: quod autem tales fiant, scio, si quis ipsos statim dum infantes sunt luxet. Iuxta coxas igitur magna differentia est, an extra, an intrò fiat luxatio. Iuxta genua verò, differentia quidem aliqua est sed minor. Modus autem vtriusque claudicationis propius est. Decurtantur enim magis hi quibus

Ossium co-
auctio.

extra luxatio facta est. Recti autem minus stant, quibus in- **D**
trò luxatio cōtingit. Eodem modo etiam si iuxta malleolum
luxatio fiat, si quidem ad externā partem id contingat, mu-
tuli quidem fiunt, verū stare possunt. Si verò ad internā val-
gi quidem fiunt, minus autē stare possunt. At verò coauctio
ossium talis fit. Quibus quidem circa malleolum tibiæ os
excessit, his pedis quidē ossa minimē coaugescunt, hæc enim
proximē ad vulnus sunt. Verū tibiæ ossa augentur quidem
non multo defectuosius, carnes tamen minuuntur. Quibus
verò iuxta molleolum manserit articulus secundum natu-
ram, iuxta genu autem excefferit, his tibiæ os similiter coau-
gescere non solet, sed breuius fit. Hoc enim proximē ad vul-
nus est. Pedis autē ossa minuuntur quidem, sed non similiter, **E**
velut paulo ante dictum est, quia articulus circa pedē saluus
est. Si verò ipso etiam uti possent, velut mutilo, minus adhuc
pedis ossa his minuerentur. At quibus circa coxā luxatio con-
tingit, his femoris os non similiter coaugescere solet: Hoc
enim proximē ad vulnus est: sed breuius sano fit. Tibiæ tamē
ossa nō similiter his augmento destituuntur, neq; ossa pedis,
atq; hoc ea de causa, quod femoris articulus qui ad tibiā est,
& tibiæ articulus qui ad pedem est, in sua natura manet. Car-
nes tamen minuuntur his totius cruris. Si verò uti crure pos-
sent, adhuc magis ossa augerentur, velut etiā prius dictū est,
excepto femore, & minus excarnes essent. Multo tamen mi-
nus carnosī quā hi qui sunt, essent. Argumento autē quod ta-
lia ita se habent, hoc est. Quicunq; enim brachio elapso, mu- **F**
stellæ cubito præditi sunt, parūmq; ac macilentū brachium
habent, aut ex natiuitate, aut etiā dum augescunt, priusquā
perfecti euadant, galeācones appellati, hi os quidem brachij
breue habent, cubitum autē & summā manum paulo defe-
ctuosiorē quā sani propter relatas causas, eo quod brachiū
vulnerato articulo proximū est, ut ideo breuius factū sit. Rur-
sus autē cubitus propterea nō similiter calamitatē percipit,
quia brachij articulus qui est ad cubitū, in veteri natura ma-
net. Et rursus manus adhuc longius abest à calamitate quā
cubitus. Propter has igitur causas cōtingit, ut & ossa quæ non
coaugētur, nō coaugescāt, & quæ coaugētur, coaugescāt. Cæ-
terū ad carnositatē & manui & brachio multum profuerit, si
quis manu laborādo se fatiget. Quæcunque enim manuum
opera

A opera sunt, plurima ex ipsis Galeancones hac manu operari conantur, velut altera possunt, & nihilo defectuosius quam cum illaesa efficiunt. Non enim supra manus, velut supra pedes, corpus vehi necesse est. Verum leuia sunt ipsis opera. Propter usum autem non minuuntur carnes Galeanconibus, neque circa manum, neque circa cubitum. Sed & brachium propterea aliquam opem sentit ad carnositatem. Quum autem coxa eluxata fuerit ad internam partem à natiuitate, aut adhuc infanti, carnes ideo magis minuuntur quam in manu, quod crure uti non possint. Quod autem hac hoc modo se habeant, testimonium vnum quoddam in paulo posterius referendis habebitur. At quibus in exteriorem partem femoris caput excesserit, his crus breuius apparet, si ad alterum extendatur, atque id merito. Non enim super os fundamentum fit capitis femoris, sicut quum intro excidebat, sed iuxta os quod inclinatum naturam habet in carne humida ac cedente firmatur: & propterea quidem breuius apparet. Intrinsecus autem iuxta plechada, intermediam crurum ac inguinum partem, femur magis mutilum & excarne fit. Nates autem extrinsecus incuruiores, utpote quum extra femoris caput elapsum sit. Sed & superius apparent nates, utpote cum caro quae isthic est, femoris capiti cesserit. Summa vero femoris pars circa genu, intro repere videtur. Tibia item & pes. Sed neque inflectere velut sanum crus possunt. Et signa quidem femoris extra elapsi haec sunt. Quibus igitur perfectis iam elapsus articulus non fuerit repositus, his totum crus breuius apparet. In ambulatione autem calcaneo terram pertingere non possunt. Verum pectore pedis in terra consistunt ac progrediuntur, parum autem ad internam partem summis digitis vergunt. At crus laesum in his multo magis corpus vehere potest, quam quibus ad internam partem excidit, partim quod caput femoris, & ceruix articuli, quum natura obliqua sit, sub multam coxae partem substitit: partim quod summus pes non ad externam partem inclinatus esse cogitur, sed propè est ad rectitudinem corporis, & tendit etiam interius. Quum igitur semitam ac callem acceperit articulus, in carne ad quam elapsus est, & caro viscositatem contraxerit, doloris exors progressu temporis fit. Quum autem doloris exors factus fuerit, possunt quidem absque baculo iter facere, si aliam voluerint, possunt autem &

Qq 4 vehere

vehere corpus supra crus lesū. Itaque propter vsum, carnes **D**
talibus minus effœminantur, quàm illis de quibus paulo
ante dictum est. Effœminantur autem aut plus, aut minus.
Magisque adhuc effœminantur plerunque iuxta internam
partem, quàm iuxta externam. Plerique tamen ex his calcea
mentum sibi inducere non possunt, propter cruris inflexibi
litate. Quidam verò etiā hoc possunt. At quibus dum adhuc
in ventre sunt, hic articulus fuerit luxatus, aut dū adhuc
augefcunt, vi elapsus, non fuerit repositus, aut etiā præ mor
bo hic articulus excefferit, ac luxatus fuerit: multa enim
huiusmodi fiunt: talium quibusdam si corruptionem sense
rit femur, suppurationes diuturnæ & linamentis indigen
ges fiunt, & aliquibus ossium denudationes. Similiter autem **E**
& quibus corruptionem femoris os sentit, & quibus non sen
tit, multo breuius fit, & velut sanum coaugefcere non solet.
Tibiæ tamen ossa breuiora quidem fiunt quàm alterius tibi
e, sed paululum, ob causas antea relatas. Ambulare verò ta
les possunt, & quidam ex ipsis eo modo quo perfecti, quibus
elapsus articulus repositus non est, aliqui verò etiam toto
pede consistentes progrediuntur, declinant tamen inter am
bulandum propter cruris breuitatem coacti. Hæc autē hoc
modo fiunt, si diligenter educati fuerint in figuris, & rectē
in quibus oportet, priusquam ad iter faciendum corroborari
fuerint, diligenter item & rectē, postquam corroborati
fuerint. Plurima autem diligentia opus habent hi, quibus
dum maximè iafantes sunt, hæc calamitas cōtigerit. Si enim
neglecti fuerint dum iafantes sunt, inutile penitus, & omni **F**
augmento priuatum, totum crus euadit, & carnes totius cru
ris magis minuuntur quàm sani. Multo tamē minus his mi
nuuntur quàm illis quibus intro excidit, propter vsum & la
borem, ita vt statim crure vti possint, velut etiam paulo an
te in Galeanconibus dictū est. Sunt autem aliqui, quibus par
tim statim à natiuitate, partim præ morbo, amborū crurum
articuli exciderunt ad externam partem. His igitur ossa qui
dem easdem affectiones habent ac perpetiuntur. Carnes ta
men minimè effœminantur. Sed & Satis carnosa crura fiūt,
præterquam si quid sanè circa internā partem paululum de
ficiat. Propterea verò Satis carnosa sunt, quia vtrisque cruri
bus similiter vtuntur. Similiter enim fluctuant hac atque
illac

- A** illac inter ambulandum: & vehementer eminentibus nati-
bus hi videntur, propter articulorum excessum. Si verò ossa
ipsis corruptionem non senserint, neque gibbosi supra co-
xas fiant: nonnullos enim etiam talia corripunt. Si igitur
tale quid non contigerit, satis sani de cætero durant. Totum
tamen corpus hi minus augescens habent, capite excepto.
At verò quibus in posteriorem partem femoris caput excide-
rit: paucis autem excidit: hi crus extendere non possunt, ne-
que iuxta articulum elapsum, neq; ita valde circa poplitem,
& multo minus quàm hi quibus iam dudum id contigit. Hi
enim magis & circa inguē, & circa poplitem, articulum ex-
tendunt. Illud tamen insuper intelligere oportet: Et enim
commodum, & magni faciendum, & plerisq; ignotum: Quod
B neq; sani articulum circa poplitem extendere possunt, si non
simul extendant etiam articulum circa inguen, præterquàm
si pedem valde sursum attollant. Sic enim poterunt. Hi itaq;
neq; inflectere articulum circa poplitem similiter possunt,
sed multo difficilius, si non etiam articulum circa inguen in-
flexerint. Multa verò etiam alia circa corpus huiusmodi fra-
ternitates ac cognationes habent, & circa neruorum disten-
tiones, & circa musculorum figuras, plurima, & pluris facien-
da ut cognoscatur, quàm quispiam putauerit. Item circa in-
testini naturam, & totius ventris, & circa vterorum errores
ac distentiones. Verùm de his alibi nobis sermo erit cogna-
tus his quæ nunc dicuntur. Sed de quo nunc sermo est, neque
extendere possunt, velut iam dictum est, & brevius crus ap-
C pareret, atque hoc ob duas causas, & quòd non extenditur, &
quòd ad natium carnem elapsum est. Natura enim ossis co-
xæ ea parte est, qua & caput & ceruix femoris existit. Vbi ve-
rò luxatum fuerit, pronum ad externam partem natium de-
fertur. Inflectere tamen possunt, si dolor non prohibeat, & ti-
bia & pes moderatè recta apparent, & neq; hæc, neque illac
multum inclinata. Iuxta inguen verò caro insuper aliquāto
mollior esse videtur, præsertim ad contactum, ut pote articu-
lo ad alteram partem elapso. Ad ipsas autem nates si attrecte-
tur femoris caput, aliquāto etiā magis extuberare videtur.
atque hæc quidem signa sunt, si cui in posteriorem partē fe-
mur excidit. Cui igitur iam perfectò elapsum non fuerit, re-
positum, hic ambulare quidem potest, ubi tempus interces-
serit.

ferit, & dolor sedatus fuerit, & articulus in carnem versati
 adfueuerit. Cogitur tamen vehementer se inflectere circa
 inguina, dum iter facit, atque hoc ob duas causas, tum quòd
 multo breuius crus fit, ob ea quæ antea dicta sunt: tum quòd
 multum valde abest ab eo, vt calcaneo terram contingat. Si
 enim conaretur vel paululū pede illo vehi, ita vt nihil aliud
 habeat quo se firmet, retro sane corruerit. Magna enim fue-
 rit momenti inclinatio & coxis multum in posteriorem par-
 tem supereminentibus super pedis gressum, & spina insuper
 ad coxas vergente. Vix autem pectore pedis terram attin-
 git, & ne sic quidem, nisi ipse se ipsum circa inguina inflectat,
 & altero crure circa poplitem insuper se inflectat. Ob hæc
 autem cogitur, vt manum quæ est secundum læsum crus, ad
 supernam femoris partem in singulis gressibus firmet. Co-
 git igitur aliquantum hoc ipsum, vt circa inguina inflecta-
 tur. Nam in permutatione crurum in ambulando, corpus su-
 pra læsum crus vehi non potest, si non insuper firmetur crus
 per manum ad terram, nimirum quum non sub corpora ar-
 ticulus subsistat, sed ad posteriorem partem iuxta coxam extet.
 Absq; tamen baculo tales iter facere possunt, si alias adsueue-
 rint, eo quòd gressus pedis in vteri rectitudine manet, & non
 ad extremam partem inclinatus est. Quapropter nihil opus
 habent baculi fulcimento. Quicumque tamen pro femoris
 per manum apprehensione, supposito sub alam, quæ ad fini-
 strum crus est, scipione inniti volunt, hi siquidem longiorem
 scipionem supposuerint, erectiores quidem iter faciēt, pede
 autem ad terram non innituntur. Si verò pede inniti vo-
 lent, breuior ipsis baculus faciendus est, & ad inguina, vt se
 inflectant necesse fuerit. Cæterum carniū inminutio-
 nes etiam his secundum rationem fiunt, velut antea dictum
 est. Qui enim eleuatū habent crus, & nihil laborant, his
 etiam maximè minuuntur. Si verò plurimo vtuntur ingres-
 su, his minimè minuuntur. Sanū tamen crus nihil inde uti-
 litatis consequitur, sed etiam deformis fit, si læso crure ad
 terram innitentes vtantur. Illi enim simul inferuiens, & ex-
 tra prominente coxa esse cogitur, & citra poplitem se infle-
 ctere. Si verò quis læso crure non ad terram vtatur, sed ele-
 uatū habeat, & scipioni innitatur, sic sanū crus robu-
 stum fiet. Nam & in naturali statu degit, & exercitationes
 ipsum

A ipsum corroborant. Possit aliquis dicere, extra medicinam talia esse. Quid enim opus est de his quæ incurabilia iam facta sunt, amplius tractare? At hoc facere multum refert. Eiusdem enim professionis est & hæc cognoscere. Non enim fieri potest, ut inter se dirimantur. Oportet enim curabilia ita tractare, ut ne incurabilia fiant, ea intelligentia ut quàm maximè prohibeamus, ne ad hoc deueniant ut incurabilia reddantur. Oportet autem & incurabilia cognoscere, ut ne maximè lædant. Prædictiones autem splendide sunt ac gloriosæ ex cognitione, quò & qualiter & quando, singula desinent, siue eo vertantur ut incurabilia fiant, siue curationis spem exhibeant. Quibuscunque verò ex natiuitate, aut dum adhuc aliàs augescunt, ita elapsus fuerit articulus, & non repositus, siue ex violentia elapsus sit, siue præ morbo: Multæ enim huiusmodi luxationes fiunt in morbis: Qui verò sint hi morbi, in quibus articuli elabuntur, postea scribetur: Si itaque elapsus non fuerit repositus, femoris quidem os breue fit, affligitur autem totum crus, & augmento destituitur, & multo magis excarne fit, eo quòd ipso non utantur. Nam & articulus circa poplitem his affligitur. Nervi enim ob ea quæ antea dicta sunt intenduntur. Quare articulum circa poplitem extendere non possunt hi quibus hoc modo coxa excidit. Ut enim in summa dicam, Omnia quæ in corpore ad vsum facta sunt, si quis moderatè ipsis utatur, & in his laboribus exerceat, ad quos singula sunt adsueta, sic quidem sana sunt, & augescunt, & probè consenscunt, Si verò quis non utatur, sed quiescat, morbosiora fiunt, & non augescunt, & cito consenscunt. Inter hæc autem non minimè perpetiuntur hoc & articuli, & nervi, si quis non ipsis utatur. Propter has igitur causas, magis in hoc luxationis modo quàm in aliis affliguntur. Totum enim crus & in ossium, & in carnum natura, augmento destituitur. Tales igitur ubi iam in viros euaserunt, eleuatum ac inclinatum crus hoc habent, altero verò vehuntur baculo innitentes, aliqui vno, aliqui duobus. Quibus porro in anteriorem partem femoris caput elapsum fuerit: paucis autem hoc contingit: hi extendere quidem eius perfectè possunt, inflectere autem se minimè hi possunt circa inguen. Affliguntur autem etiam, si circa poplitem se inflectere coguntur. Longitudo

Articulus
cum repositus
non fuerit.

Femur ant-
trorsum c-
lapsum.

gitudo verò cruris confimilis apparet, & circa calcaneum **D**
 quidem valde. Verùm summus pes aliquanto minus in an-
 teriorem partem prominere solet. Totum autem crus recti-
 tudinem habet secundum naturam, & neque hanc, neque il-
 lac vergit. Caterùm hi statim dolore corripuntur maxi-
 mè, & vrina imprimis supprimitur, aliquanto magis quàm
 in aliis luxationibus. Caput enim femoris proximè his in-
 cumbit ad præcipuos neruos, & circa inguen quidem extu-
 berantes videtur, & locus extentus apparet, Verùm circa na-
 res rugosior, & maximè excarnis. Atque hæc quidē quæ re-
 lata sunt, signa sunt eorum quibus ita femur excidit. Qui-
 buscunque igitur viris iam factis, hic articulus elapsus, non
 fuerit repositus, hi vbi dolor ipsis sedatus fuerit, & articulus **E**
 in eo loco in quem excidit versari adsueuerit, statim ferè re-
 cti ambulare possunt, absque baculo, & valde quidem recti,
 vtpote quum ad læsum crus, neque circa inguen, neque circa
 poplitem, facile se flectere possint. Propter inguinis itaque
 inflexibilitatem, rectiore toto crure in ambulando vtuntur,
 quàm quum sani essent. Sed & aliquando ad terram pedem
 trahunt, vtpote quum supernos articulos non facile infle-
 ctant, & toto pede ingrediuntur. Nihilo enim minus hi cal-
 caneo ingrediuntur, quàm anteriore pedis parte. Si verò ma-
 gnis gressibus progredi possent, etiam valde calcaneo insi-
 stentes progredierentur. Nam & sani quāto minoribus gres-
 sibus iter faciunt, tanto magis calcaneo ingrediuntur, alte- **F**
 rum pedem deponentes, contrarium eleuantes. Quibus-
 cunque itaque hoc modo excidit, adhuc etiam magis calca-
 neo terram contingunt, quàm anteriore pedis parte. Ante-
 rior enim pedis pars, vbi reliquum crus extensum fuerit, nō
 similiter in anteriorem partem inflecti potest, sicut vbi crus
 fuerit inflexum: Neque rursus sinuari pes potest crure infle-
 xo, sicut vbi crus fuerit extētum. Sana igitur natura hoc mo-
 do est, veluti dictum est. Quum verò elapsus articulus repo-
 situs non fuerit, sic iter faciunt, velut dictum est, ob prædi-
 ctas has causas. Magis tamen excarne crus fit quàm alterū,
 & iuxta nares, & circa suram, & iuxta posteriorem rectitudi-
 nem. At verò quibus dum adhuc infantes sunt, articulus sic
 elapsus, nō fuerit repositus, aut etiam à natiuitate ita habue-
 rint, & his femoris os aliquāto magis minuitur, quàm tibiæ
 aut ped

- A** aut pedis ossa. Et minimum quidem in hoc luxationis modo femur minuitur. Carnes tamen vndique minuuntur, maxime circa posteriorem rectitudinem, quemadmodum etiam prius dictum est. Quicumque igitur recte educati fuerint, hi ubi augescunt, crure uti possunt, breuiore aliquantulum existente quam altero, ita tamen ut baculo innitatur ea parte qua laesum crus est. Non enim absque calcaneo, pedis pectore admodum uti possunt, ut in id innitantur, quemadmodum in aliis claudicationibus aliqui possunt. Causa vero cur non possint, ea est quae paulo ante relata est. Ob id igitur baculo insuper opus habent. Qui vero neglecti fuerint, & crure ad terram non utuntur, sed eleuatum id habent, his minuuntur quidem ossa,
- B** ubi augescunt, magis quam his qui eo utuntur. Minuuntur autem & carnes magis multo quam his qui utuntur. Verum circa articulos in directum mutilatur his crus aliquanto magis, quam quibus alio modo luxatio facta est. Quo igitur in summa dicatur, Articuli excident ac qui luxantur, inaequaliter inter se ipsos excidunt ac luxantur, aliquando multo plus, aliquando multo minus. Et quibus quidem multo plus luxati aut elapsi fuerint, his omnino difficilius reponuntur. Et si repositi non fuerint, maiores & manifestiores mutilationes ac afflictiones tales habent, & ossium, & carnum, & figurarum. Vbi vero minus exciderint & luxati fuerint, tales facilius quam alij reponi possunt. Si vero frustra tentati, aut neglecti fuerint, minores ac minus noxae mutilationes his sunt, quam
- C** illis de quibus paulo ante dictum est: Reliqui igitur articuli etiam valde multum differunt ad hoc ut aliquando minor, aliquando maior luxatio fiat. Verum femoris & brachij capita, quam simillime inter se utraq; excidunt. Nam capita prout rotunda sunt, simplicem & caluam rotunditatem habent. Orbiculatiores autem sinus sunt, qui capita excipiunt, capitibus tamen ipsis congruentes. Quapropter fieri non potest ut dimidium articuli ex ipsis elabatur. Nam ob rotunditatis circumferentiam, aut ad externam, aut internam partem luxari poterit. Sed de quo nunc sermo est, perfecte excidunt, nam alioqui non excidunt. Attamen & hi aliquando plus, aliquando minus, a naturali statu profiliunt, & femur aliquanto magis quam brachium patitur, Nam aliqua etiam ex his luxationibus quae a natiuitate fiunt, si parum elapsae fuerint, ad naturalem

tum reduci possunt, & maximè articuli circa pedē. Quicun- **D**
 que à natiuitate mutili fiunt, pleriq; ex his curabiles sunt, si
 non valde magna emotio facta fuerit, aut etiam præauctis
 iam pueris contigerit. Optimum igitur est vt talia quàm ce-
 lerrimè curentur, priusquàm valde magnus ossium defectus
 fiat, & priusquàm admodum magnus carniū defectus circa
 tibiam contingat. Modus itaq; mutilationis nō vnus est, sed
 plures. Plurima quidem eluxata non sunt penitus, sed per fi-
 guræ cōsuetudinem, in quadam pedis interceptione mutila-
 ta. Animaduertendum autem in horū curatione est, vt tibiæ
 circa malleolum os, quod extrinsecus est, ad internā partem
 detrudatur ac dirigatur, & calcanei os quod è directo illi
 subiaceret, ad externā partem retrudatur, quo ossa quæ eminet **E**
 sibi ipsis occurrant iuxta medium ac obliquum pedem. Digi-
 ti verò aceruati vnā cū magno digito ad internam partē in-
 clinentur, atque ita circuncirca cogantur. Probè autem deli-
 gare oportet cerato resinato, & spleniis, & linteis mollibus
 nō paucis, neq; nimis compressis, atq; ita deligationis circun-
 ductiones facere, velut etiam manibus directo pedis fiebat,
 quo pes paulò magis ad valgum vergere videatur. Soleam
 etiam quandā facere oportet, aut ex pelle nō nimis dura, aut
 è plumbo, eāmq; insuper alligare nō ad corpus positam, sed
 vbi iam postremis linteis deligare voles. Quū verò iam deli-
 gatus fuerit, vnus alicuius linteī ex his quibus deligatur, ini-
 tium, ad deligamēta quæ infra pedem sunt assuere oportet, **F**
 è directo parui digiti, & postea sursum extendere, ita vt mo-
 deratè habere videatur, atq; sic supra suram circundare, quo
 sic extantum ac collocatum stabile maneat. In summa, quasi
 quis ceramingat, ad naturā iustam adducere oportet, ita vt
 & inclinata, & distenta præter naturam, & manibus sic diri-
 gamus, & similiter deligatione adducamus autem non vio-
 lenter, sed leniter. Assuere verò ita oportet lintea, vt cōducant
 ad reparationes ac appensiones faciendas. Aliæ enim clau-
 dicationem alia reparatione ac appensione opus habent. Cal-
 ceum insuper plumbeū facere oportet, extra deligationem
 adalligatum, qualem modulum crepidæ chiæ habebunt. Ve-
 rùm nihil ipso opus est, si quis & manibus rectè direxerit, &
 linteis rectè deligauerit, & appensiones ac reparationes per
 assuta lintea rectè fecerit. Atque hæc quidem est curatio, &
 neque

A neque sectione, neq; vstione, neque alia varietate quicquam opus habet. Citius enim talia medicinae obtēperant, quam quis putarit. Deuincire tamen tempore oportet, donec in iustis figuris corpus auctū fuerit. Vbi verò calcei ratio habenda est, Arbylæ lutigrade, calceamēti ita appellati species, accommodatissimæ existunt. Hoc enim calceamentū minimè à pede superatur, sed potius ipsum superat. Idoneus est etiā creticus calceamentorum modus. At verò quibus tibiæ ossibus luxatis, ac vlcere indulto, articuli circa pedem penitus eminent, siue intrò vergant, siue extra, tales reponere non oportet, sed permitttere vt quicunque velit medicus reponat. Illud enim clarè scire oportet quòd homo morietur, si repositi permanserint. Sed & vita paucorum dierū his contingeret. Pauci enim ex ipsis septimū diem transgrediuntur. Conuulsio enim est quæ ipsos occidit. Sed & cancerari contingit tibiā ac pedē. Hæc ita futura esse certo scire oportet. Et neque veratrum mihi videtur profuturū esse, & eadem die datum, & rursus epotum: proximè autem si quicquā huiusmodi facit, non tamen mihi hoc videtur. Si verò repositi nō fuerint, & ne tentati quidem ab initio, pleriq; ipsorū superstitēs euadunt. Sic autem & tibiā & pedem coaptari oportet, prout ipse volet, modò non sint dependentia, aut commota. **Curatio.** Curatio verò facienda est cerato picato, & spleniis vino imbutis paucis nō valde frigidis. Frigiditas enim in talibus conuulsione accersit. Idonea etiam sunt folia betarum, aut tussilaginīs, bechij appellatæ, aut alicuius alterius huiusmodi, in vino nigro austero semicocta ac imposita. Et faciēda est curatio super vlcus, & super partes adiacentes. Et cerato tepido ipsum vlcus illinendum. Si verò hyemis tēpus fuerit, etiā lanæ succidæ vino ac oleo tepidis imbutæ supernè ipsum madesfaciant. Deligatio verò nulla, neque vllum cataplasma adhibendum est. Probè enim nosse conuenit, quòd compressio ac omnis oneris gestatio, talibus omne malū affert. Accommodata autē sunt ad talia, & ex emplastris aliqua quæ cruentis vulneribus destinata sunt, quibus videlicet ex ipsis cōfert, vt lanæ superimpositæ vino madesfiant, & multo tempore finātur. Quæ verò ex illis cruētis emplastris, paucissimis diebus incumbere dehent, & quæ resina comprehenduntur forinsecus adiecta, non similiter vt illa idonea sunt: diuturna enim

Tibiæ ossa
luxata.

Curatio.

enim

enim fit horum vlcerū purgatio, quum multo tempore ma- D
dore abundant. Quosdam tamē ex his deligare, bonum est.
Verū illud clarē nosse oportet, quod necesse est hominem
turpiter claudum fieri. Nam pes in talibus in supernā partē
retractus est: & ossa luxata, extra eminētia apparent. Neque
enim vllum ex talibus ossibus plerunque denudatur, nisi le-
uiter aliquantum: neque abscedit, sed tenuibus ac debilibus
cicatricibus circumducitur: atq; hoc si multo tempore quie-
uerint: Sin minus, periculum est ne vlcusculum immedicabi-
le relinquatur. Verū de quo sermo est, qui sic curantur, ser-
uantur. Si verò repositus fuerit articulus ac permanferit, mo-
riuntur. Eadem ratio est, si etiam cubiti ossa circa manus ar-
ticulum vlcere facto emineāt, siue ad internam manus par- E
tem, siue ad externam. Clarē enim nosse id oportet, quod is
moriatur intra paucos dies tali morte, qualis antea dicta est,
cui reposita ossa permanferint. Quibus verò reposita nō fue-
rint, neque repositio tentata est, hi multò plures superstites
manēt. Curatio autem eiusmodi etiā talibus commoda est,
qualis iam dicta est. Figuram verò claudicationis turpē esse
necesse est, & digitos manus debiles ac inutiles. Sin enim ad
internā partem ossa laxata fuerint, digitos inflectere non po-
test. Si verò ad externam, extendere nequit. Quibus verò
tibiæ os facto vlcere, circa genu eminuerit foras, siue ad ex-
ternā partem siue ad internā, his si quis reponat, adhuc prom-
ptior mors adest quā aliis, etiam si etiam illis prompta ade-
rat. Si verò omīssa repositione medearis, spes quidem salutis F
hoc solo modo existit. Verū periculosa hęc ossa sunt, quan-
to superiora ac robustiora sunt, & à fortioribus elapsa. At
si os femoris quod ad genu est, vlcere facto elapsum fuerit
& repositū permanferit, mortē adhuc violentiorē citius in-
duxerit quā prius relata. Si verò repositum non fuerit, lon-
gē magis periculosum est quā priora. Sola tamē hęc salu-
tis spes est. Eadē verò ratio est, & de articulis circa gibbū cu-
biti, & de cubito ac brachio. Quęcunque enim ex his luxa-
ta, vlcere facto eminuerint, ea omnia si reposita fuerint mor-
tem inducunt: non reposita, spem salutis: claudicationem ve-
rò superstitibus. Lethaliores autē sunt superiores articuli, si
reponantur. Sed & si non reponantur, periculosiores iidem
sunt. Si verò alicui superiores articuli luxati, facto vlcere
emineant

Ostibia
eminens.

O, femoris
quā peric-
ulosum.

A emineant, hi & si reponantur celerrimam mortem inducunt: & si non reponantur, periculosiores sunt. Curatio verò iā re- Curatio.
lata est, quæ mihi accommodatissima esse videtur. At verò qui
bus articuli digitorum aut pedis, aut manus luxati, facto vl-
cere eminuerint, osse nō fracto, sed circa ipsam connexionē
auulso, his si repositi permanferint, adest quidem periculum
conuulsionis, si non bene curati fuerint: attamen operæ pre-
cium est vt repositio fiat, cum prædictione quòd multa cu-
stodia ac cura opus habet. Reponere verò facilimum est, ef-
ficacissimūmq; ac artificiosissimum per vesticulū, velut etiā
antea dictū est in fractis ac eminētibus ossibus. Postea quie-
scere quā maximè conuenit, & decumbere, ac pauco cibo
B vt. Melius est & pharmaco sursum purgāte leui aliquo vt.
Vlcus verò curare oportet, aut cruentis emplastris quæ ma-
desiūt, aut polyophthalmi siue buphthalmi foliis impositis,
aut quibus ossa in capite fracta curantur. Nihil autem valde
frigidum adhibere. Minimè igitur primi articuli periculosi
sunt. Superiores autem periculosiores. Reponere verò opor-
tet eadē die aut postridie: Tertio ac quarto minimè. Quarto
enim die maximè recrudescere solent. Quibus autem nō sta-
tim repositi fuerint, in his dictos dies transgredi oportet.
Quicquid enim intra decem dies repositum fuerit, omne id
continetur. Si verò reposito osse conuulsio accedat, articulū
statim eiicere oportet, & calida quā sapissimè humectare,
& totum corpus, & præsertim circa articulos, calidè & leni-
C ter ac molliter tractare. Verū inclinātū magis quā ex-
tentum totum corpus esse oportet. Expectandū tamē est ar-
ticulos circa digitos qui reponuntur abscessuros esse. Plerū-
que enim ita contingit, si vel quæuis inflāmatiō subsit. Qua-
re si non propter vulgi imperitiā, modico verēda esset ac-
cusatio, nullum penitus reponere oportebat. Atque ad hunc
modum periculosa sunt ossa, circa articulos eminētia foras,
si reponantur, quemadmodum dictum est. Quæcūque verò
circa articulos digitorum penitus resecātur, ea plerūq; in-
noxia sunt, si nō quis in ipsa vulneratione ex animi deliquio
lædatur. Et curatio vulgaris talibus vlceribus sufficit. Sed &
quæ nō circa articulos sed iuxta aliam quandam ossium re-
ctitudinem resecantur, & hæc innoxia sunt, & adhuc aliis cu-
ratu facilia. Ex quæ iuxta digitos ossa fracta extra eminēt,
R r non

non ad articulum, & hæc si reponantur, innoxia sunt. At re- **D**
 sectiones ossium perfectæ circa articulos, & in pede, & in ma-
 nu, & in tibia ad malleolos, & in cubito ad iuncturâ manus,
 plerisq; quibus refecantur innoxia sunt, si non statim animi
 deliquiū euertat, aut quarta die febris cōtinua accedat. Cor-
 ruptiones tamen carniū contingunt, & in vulneribus san-
 guifluis fientibus, & vehemētibus cōstrictionibus, & in ossiū
 fracturis magis quàm oportet compressis: & aliis vinculis
 violentis intercepta plerisq; decidunt. Et plerique ex talibus
 superstites euadunt, & quibus femoris pars aliqua & carniū
 & ossis decedit, & quibus brachij pars (Minus autem si cubi-
 ti aut tibiæ pars deciderit) & amplius facillè ferentes super-
 stites euadūt. Quibus igitur fractis ossibus corruptiones sta- **E**
 tim fiunt, & denigrationes, his abruptiones corporis celeres
 circūcirca fiunt, & decidentia cito decidunt, vt cū ossa iam
 antea remiserint emollita. Quibus verò dum ossa sana sunt,
 denigrationes fiunt, carnes quidem etiā his cito moriuntur,
 ossa verò tardè abscedūt, qua parte termini sunt denigatio-
 nis, & ossis nudatio extat. Oportet autē partes corporis quæ
 cūq; infra terminos denigrationis sunt, quum iam penitus
 mortuæ fuerint, & doloris exortes, iuxta articulum auferre,
 prouidendo vt ne vulneret. Si enim is cui resectio fit, dolore
 affectus fuerit, & corpus nōdum mortuū fuerit ea parte qua
 refecatur, magnum periculum est ne præ dolore animi deli-
 quium incidat. Talia verò animi deliquia multos iam euesti **F**
 gio peremerunt. Femoris itaque os tali modo denudatum
 octogesimo die abscedere vidi. Tibia tamen huic homini cir-
 ca genu vigesima die ablata fuerat, aut vt mihi videbatur
 etiā citius. Non enim simul, sed ad maiore p̄uidentiam fa-
 cere quid mihi visum fuit. At tibiæ ossa ex eiusmodi deni-
 gratione circa mediā tibiā, sexagesimo die mihi deciderunt,
 quæcūq; ex ipsis fuerunt denudata. Differt equidem & cu-
 ratio à curatione, ad hoc vt ossa denudata citius aut tardius
 decident. Differt etiam cōpressio à compressione, prout ve-
 hementior aut debilior fit, ad hoc vt citius aut tardius nervi
 denigrati emoriantur, carnes item & arteriæ ac venæ. Nam
 quæcūq; non vehementer intercepta moriuntur, ex talibus
 quædā ad ossium denudationes non perueniūt, sed magis in
 superficie decidunt. Propter has igitur causas, non vnum nu-
 meri

Ameri nomen tēpori poni potest, in quāto singula ex his iudicantur. Assumere verò valde oportet tales curationes. Sunt enim magis horrēdi aspectus quā curationis, & curatio lenis omnibus talibus sufficit. Ipsa enim seipsa solū iudicāt: & circa victū diligentia adhibere oportet ut pro viribus febris exors sit: & in iustis figuris corpus collocare. Iustæ autem hæ sunt, ut neq; sublimius eleuatum sit, neq; deorsum repat. Sed magis prætereā sursum vergat, donec perfectè fuerit circum circa abruptū. Nam in hoc tempore sanguinis eruptionū periculum imminet. Ob id igitur vulnera deorsum repētia facere non oportet, sed vice versa. Alioqui ubi tempus ampliùs accesserit, & vlcera pura facta fuerint, non ampliùs hæ figuræ cōmodæ sunt, sed positio recta, & aliquando deorsum repentes. Temporibus enim progressu quibusdā horum ossis dissections fiunt, & subligaminibus opus habent. Expectare tamen oportet, ut tales per tempus à dysenteria corripiantur. Nam in plerisq; denigrescentibus dysenteria accedit, & in sanguinis eruptionibus ex vlceribus. Accedit autem iudicatis iam denigrationibus ac sanguinis eruptione, & procedit quidē large ac vehementi impetu, sed nō ad multos dies durat, neque lethalis est. Neq; enim valde cibum auersantur tales, neque aliās vasa vacua facere conducit. Femoris porro luxationē circa coxam hoc modo reponere oportet, si ad internam partē elapsum fuerit. Bona quidem ac iusta & secundum naturam hæc repositio est, & sanè etiam aliquid ostentationis habēs, si quis talium rerum iactatione superbire velit. Ex pedibus hominē ad transversam mediæ domus trabē suspendere oportet, vinculo forti, sed molli ac lato, ita ut pedes quatuor digitorū spatium, aut minus, inter se distantes habeat. Sed & supra genua latum ac molle lorum circūdatum esse oportet, quod itē ad trabem illam extendat. Crus autem læsum duobus digitis ampliùs quā alterum extensum esse oportet. A terra verò absit caput ad duorum cubitorum spatium, aut paulò plus, aut minus. Manus autē iuxta latera extensæ, aliquo molli sint alligatæ. Omnia verò hæc supino iacenti ipsi præparentur, ut quā breuissimo tēpore pendeat. Postquā verò suspensus fuerit, virum peritum & non debilem immisso inter femora cubito ita agere oportet, ut cubitum inter caput femoris elapsum, & inter femineū locum-

Femoris luxati repositio.

que inter anum ac pudendū ponat, & postea altera manu ad **D**
illam interpositā coniuncta, rectus astans ad suspēsi corpus,
derepente se appēdens sublimis quā æquabilissimè depen
deat. Hæc repositio omnia quibus secundum naturam opus
est exhibet. Nam & ipsum corpus suspensum sua ipsius gra
uitate extensionem facit: & is qui appendet, vnā cum exten
sione, femoris caput super acetabulum eleuari cogit, simulq;
cum cubiti osse, velut cum veste molitur ac cogit, vt ad pri
stinam naturam relabatur. Oportet autem vincula omnino
bene constructa esse, & curare vt fortissimus sit is qui se ap
pendit. Quēadmodum igitur etiā antea dictum est. Magna
est differentia naturarum in hominibus, ad hoc vt vel facilè,
vel difficulter repositio fiat. Et cur magna sit differentia di **E**
ctum est antea, vbi de humero egimus. Quibusdam enim fe
mur rursus incidit nullo adhibito apparatu, sed ex modica
extensione, quantum manibus directio fieri potest, & ex leui
cōmotione. Multis autem qui crus iuxta articulū inflexerūt,
iam facta circūagitatione rursus incidit. At multò plura vul
gari cuilibet apparatui non obtemperant. Quapropter scire
quidē oportet de singulis optima in omni arte, vti verò his
quæ singulis vicibus idonea visa fuerint. Relati igitur sunt
extensionum modi etiā in superioribus, vt quis vtī possit ex
his qui fortè affuerint. Oportet enim in cōtrarias partes fie
ri extensionē vehemēter, in alteram, cruris: in alterā, corpo
ris. Si enim probè extensio facta fuerit, femoris caput supra
pristinā sedem eleuabitur. Et si quidē ita super eleuatum fue **F**
rit, ne prohibere quidē facile sit, quo minus ipsum in suā sedē
insideat. quare omnis iam vestis molitio ac directio suffi
cit. sed enim in extēsiōne deficiūt, & ob id maiorē turbatio
nem exhibet repositio. Oportet igitur non solū iuxta pedem
vincula alligata esse, sed etiā supra genu, quo non magis cir
ca articulum sit deligatio in extēsiōne, quā circa coxæ ar
ticulum. Sic igitur extēsiōne ad pedis partē præparatam fa
cere oportet. Sed & in alterā partem extensionē, non solū
ex deligatione circa pectus & alas, in contrarium extendere
oportet, sed etiā loro longo, duplicato, robusto, leni, circa in
terfœmineum inserto. & à posteriore parte ad spinam porre
cto, ab anteriore verò ad clauiculam tendente, ibiq; ad alte
rum initiū alligato, ita coactionē facere oportet, vt alij hinc,
alij

A alij illinc extensionē faciant, ita tamen vt lorum circa interfœmineū, non super femoris caput porrectū sit, sed inter caput & interfœmineū. Verū inter extendendū pugno ad femoris caput quis innixus, id ad exteriorē partē propellat. Si verò is qui trahitur eleuetur, iniecta manu, & cū altera manu cōiuncta simul deorsum trahat, simulq; ad externā partē cogat. Alius verò quispiā partē femoris ad genu, placide ad internam partē dirigat. Dictum autem est etiā antea, operæ precium esse vt si quis in vrbe populosa medicinā exerceat, lignū possideat quadrangulare sex cubitorum, aut paulo minus latitudine bicubitali: crassitudo autē sufficit dodrantalis. Id secundū longitudinē hinc atq; illinc sectionē incisam

B habere oportet, vt ne altior quā oportet machinatio fiat deinde postes aselli breues, robustos, vtrinq; inaptatos habere. Postea sufficit quidē in dimidia ligni parte, nihil tamē vetat etiā per totum, velut fossas longas quinq; vel sex, quatuor digitorū spacio inter se distantes, incisas esse: & satis est vt sint hę & latitudine & profunditate triū digitorū. Habere etiā in medio hoc lignū debet excuationē profundiorē quadrangulā trium digitorū quo in hanc excuationē, vbi opus esse visum fuerit, lignū cavitati congruum infigatur, quo supernē sit rotundū. Infigendū autem hoc est, si quādo conducere visum fuerit, inter caput femoris & locū inter anum ac pudendū. Hoc lignū erectum stans prohibet ne cōcidat corpus, dū à pedibus extēditur: Quādoq; enim hoc ipsum lignū sufficit pro extensione in contrariū supernē faciēda. Aliquādo etiā dum hinc atq; illinc crus extēditur, hoc ipsum lignū hac vel illac laxum incūbens cōmodum ad hoc fuerit, vt instar vectis, caput femoris ad externam partem extrudat. Ob hoc enim etiam fossę incisę sunt, quo in quibuscunq; ex ipsis cōgruū id facere fuerit, vectes ligneus immissus molitionē faciat, aut circa articularū capita, aut ad ipsa penitus capita infixus, vnā cū extensione, siue ad externā partē, siue ad internam, molitionē facere expedierit: siue etiam rotūdum vectē esse conducat, siue latū, alius enim alij articulo conducit. Cōmoda autē est in omniū articularum cruris repositione, hęc per vectes molitio vnā cū cōcussione. Verū de quo nunc sermo est, teretē ac rotundum vectem esse conuenit. Ex his machinis ac coactionibus, nō videtur mihi fieri posse vt

Hippocratis Liber

vilius articuli repositio frustra tentetur. Inuenire tamē quis **D**
possit etiam alios modos repositionis huius articuli. Si enim
lignū hoc magnū, habeat in medio à lateribus duos postes
pedales, eius altitudinis, quæ cōferre videtur, alterum hinc,
alterū illinc. Deinde lignū transuersum, velut scalæ gradus,
postibus impositū sit: atque ita sano crure inter postes trans-
misso, lēsum crus suprā gradum adaptatū habeat. Verū ad al-
titudinem, & ad articulum qua parte excidit facilē quiddam
adaptare oportet. Gradum enim moderato altiore facere
oportet, & stragulum multiplex prout congruum fuerit, sub
corpus subextendere. Deinde lignum moderatam latitudi-
nem ac longitudinem habens, sub crus ad malleolum vsque **E**
extentū esse oportet, quōd vltra femoris caput, quātum eius
fieri potest porrigatur, & ad crus alligetur quotiescūq; opus
fuerit, vt moderatē habeat. Postea dū extenditur crus, siue li-
gno pistillo formi, siue aliqua alia ex his extensionibus, crus
simul circū gradū vnā cū alligato ligno, deorsum cogere o-
portet, ita vt aliquis supra articulū iuxta coxam hominē de-
tineat. Hoc enim modo simul & extēsiō femoris caput su-
per acetabulū attollet, simulq; mollitio femoris caput in pri-
stinā naturā detrudet. Hæ omnes relatæ necessitates ac co-
actiones fortes sunt, & omnes calamitate superiores, si quis re-
ctē ac bene præparet. Quemadmodum autē etiam antea di-
ctum est, à longē debilioribus extēsiōnibus, & viliore appa-
ratu plerisq; rursus incidit. At verō si ad externam partē fe-
moris caput luxatū fuerit, extensiones quidē hinc atq; illinc **F**
facere oportet, eodē modo velut dictū est. Verū molitionē
cum veste lato, vnā cum extēsiōne facere cōuenit, ab externa
parte ad internā cogendo, ita vt ad ipsas nates, & paulo supe-
rius vestē adhibeas. Ad sanam verō coxā iuxta nates aliquis
manibus renitatur, vt ne cedat corpus: aut alio quopiam hu-
iusmodi veste submisso, & ex fossa conueniente fulcito con-
tra obnitatur. Partē autē femoris luxati quæ ad genu est, ab
interna parte foras placide abducatur. Cæterū suspēsiō in hoc
modo luxationis articuli non conuenit. Cubitus enim eius
qui se appendit, caput femoris ab acetabulo propellit. Moli-
tionem tamen cū ligno subiecto, ita quis adaptare possit, vt
huic luxationis modo conueniat, si forinsecus adhibeat. Sed
quid opus est plura dicere? Si enim rectē extēsiō fiat, & rectē
per

Apet vestes molitio cōtingat, quī articulus hoc modo elapsus nō reponi possit: At si in posteriorem partē femur exciderit, extēsiōes & in diuersum tēsiōes ita facere oportet, velut dictum est, ita tamen vt super lignum multiplex stragulum infertatur, quo mollissimum sit, & homo pronus reclinetur ac sic extendatur. Verū vnā cum extēsiōe, etiā tabula deorsum cogere oportet eodē modo veluti gibbositates, ē directo natium tabula collocata, aut magis ad infernam quā ad supernā coxarū partem, & incisura in pariete ad tabulā excipiendā non recta sit, sed paululum decliuis ad pedū partem. Hac repositio maximē secundum naturā est huic luxationis modo, & simul fortissima. Suffecerit autem fortassis pro tabula, vt aliquis infideat, aut manibus innitatur, aut inscendat derepente, simulq; cum extēsiōe incūbat. Nulla verò alia ex relatis repositionibus secundū naturā est huic luxationis modo. Si verò in anteriore partem elapsus fuerit, idem quīdem modus extēsiōnū faciendus est. Verū virū & manibus validissimū, & aliās peritissimū, vola manus alterius circa inguina firmata, & altera manu insuper iniecta, simul luxationem deorsum propellere, simulq; femoris partem quæ ad genu est ad anteriore partem compellere oportet. Hic enim modus repositionis, huic luxationi maximē secundum naturā est. Sed & suspensio finitimum quid secundum naturam habet. Oportet tamen eum qui se appendit peritum esse, vt ne cubito articulum excutiat, sed circa medium inter anum ac pudendum locū, & iuxta os sacrū se appendat. Laudatur etiā is qui per vtrē hunc articulū reponere conatus est. Et iam sanē aliquos vidi, qui prę imperitiā, etiā extra & rētro luxatos, per vtrē reponere conabātur, nō animaduertentes q̃ magis ipsum eiicerent quā reponerēt articulū. Nā qui primus excoGITauit, haud dubiē ad intrō elapsos articulos, per vtrē repositionem tētauit. Nosse igitur oportet q̃ alia multa vtre sunt potiora. Oportet autē vtre non inflatum infra femora ponere, quantū fieri potest supremē ad locū inter anū ac pudendum adductum: & facto à patellis genu initio, femora per fasciam vsq; ad mediā femorum partē deligare, deinde in partem vtris solutam folle ex officina fabri immisso inflare, & vtrē cogere vt distēdatur. Homine verò in latus decumbere oportet, & læsum crus supernē habere. Atq; hic quidē est ap-

Rr 4 paras

Hippocratis Liber

paratus: sed plerique; peius præparât quàm ego nũc dixi. Non D enim deligant femora ad multã partem, sed solum genua, & non insuper extendunt, est autẽ insuper extẽsio quoq; facienda. Attamẽ aliqui iam reposuerant, facile rem allequuti. Nõ autẽ ita facile est coactionẽ hoc modo perficere. Nã & vter, dũ inflatur, tumidissimas partes suas ad articuli caput nõ habet, quod maximẽ emoliri oportet: sed inferius ipso, medius ipse locatus est circa media femora, aut adhuc inferius: & rursus femora ipsa natura sunt curua. Supernẽ enim carnosæ sunt, & inter se sociatæ. Infernẽ verò sicca, vt etiam natura femorum vtrẽm ab opportunissimo loco repellat. Si verò quis paruum vtrẽm imponat, fieri nõ potest vt paruum robur articulum cogat. Si itaq; vtre vti velis, femora inter se ad multam partem colliganda sunt: & vitã cum corporis extensione vter inflandus est. Crura verò ambo deligãda sunt vsq; ad finem in hoc repositionis modo. At verò in vniuersa arte hoc plurimi facere præ omnibus oportet, vt id quod agrotat sanum facias. Si verò multis modis fieri possit sanatio, vt eum qui minimẽ molestus est eligas. Nam & virum bonum, & artis peritum, hoc declarat, qui populo imponere non studeat. Verũ de quo nunc sermo est. Tales quãdam sunt familiares extensiones corporis, vt ex his quæ adsunt expedita ac facilis reperiri possit. Nam si vincula ex loris mollia ac lenia non affuerint, sed aut ferrea, aut funes nautici aut domestici, fasciis aut pãniculis laneis ea maximẽ parte amplius obuoluere oportet, quæ vincula detentionẽ factura sunt, atque ita F vinculis deligare. Deinde in lecto robustissimo & ex præsentibus maximo, hominẽ bene extendere oportet, hoc modo. Lecti pedes qui ad caput sunt, aut à pedibus, ad limen ianuæ, intus aut foris prout cõmodum fuerit firmentur. Ad alteros autem lecti pedes lignũ quadrangulare transuersum obiciatur, ita vt à pede ad pedem pertingat. Et si quidem tenue fuerit lignum, ad pedes lecti deligetur. Si verò crassum, non est opus. Deinde initia vinculorum, & eorum quæ à capite sunt, & eorum quæ à pedibus, vtraq; alligentur ad pistillũ, aut ad aliud huiusmodi lignum: ita vt è directo corporis sint, aut paulò superius. Moderatẽ verò extendãtur ad pistilla erecta consistentia, quorum alterum ad limen, alterum ad lignum obiectum firmetur, atque sic refractis pistillis extensio fiat, Sufficit

A Sufficit autem scala quæ robustos gradus habet, sub lectum extenta, pro limine ac ligno obiecto, quo pistillis ad convenientes gradus hinc atq; illinc firmatis, ita vinculorum extensio fiat. Porro reponitur femoris articulus etiam hoc modo, si ad internam, & ad anteriorem partem luxatus fuerit. Supra scalam in terram defixam hominē collocare oportet, deinde sanum crus placidè externum deligare, vbi commodum fuerit ex sinistro verò vas testaceum aqua plenum, aut sportulam lapidibus refertam appendere. Alius repositionis modus, si ad internā partē luxatus fuerit: inter duas columnas trabē moderata altitudine deligare oportet. Præmineat autem vna pars trabis pro magnitudine natiū, & vbi stragula circū pectus hominis deligaueris, ipsum hominē supra præminentem trabis partem collocato, & deinde pectus ad columnam lato aliquo vinculo alligato. Postea sanum quidē crus detineat aliquis, vt ne circumagatur. Ex laeso verò appē datur pondus quantum congruit, velut etiam prius dictū est.

B Primū igitur scire expedit, quòd omnium ossium cōmissuræ plerunq; sunt caput & acetabulum. In quibusdā verò & locus acetabuli formam refert, & oblongus est. Quidam verò loci leuiter sinuosi sunt. Semper autem reponere oportet omnes articulos elapsos, maximè quidem statim dum adhuc calidi sunt. Sin minus, quàm celerrimè. Nam & ei qui reponit, facilius ac citius reponere contingit, & ægroto multo minus doloris affert repositio priusquam intumuerit. Omnes

C etiam articulos vbi reponere voles, præmollire ac commouere oportet. Sic enim facilius reponi solent. Circa omnes autem articulorum repositiones hominem attenuare oportet, maximè circa maximos articulos & repositu difficilimos minimum circa minimos & faciles. At verò si digitorum articulus, siue primus, siue secundus, siue tertius in manu exciderit, idem ac æqualis repositionis modus est, difficilius tamen semper maximi articuli reponuntur. Excident autem quatuor modis, aut sursum, aut deorsum, aut in obliquum vtrinq; maximè quidem supernè, minimè autē in obliquū, in vehementi motu. Vtrinq; autē in ea parte in quam exciderunt, velut crepido est. Si quidē igitur ad supernā aut infernam partem exciderit articulus, eo quod leuior est hic locus quàm à lateribus, & simul parua facta est transgressio, facile

Digitonū
articuli.

R. r s est

Hippocratis Liber

est reponere. Modus autem repositionis sic habet. **D**igitum summū aut deligamento aliquo, aut alia quapiā huiusmodi reobuoluto, ut ne ubi summū digitum apprehensum extendis, elabatur. Quum autē obuolueris, alter quispiā manum supra iuncturam apprehendat, alter digitū obuolutum, atq; ita vterque ad seipsum probè extendat, simulq; elapsū articulum ad sedem suā detrudat. Si verò in obliquum excidit, extensionis quidem idem modus est. Vbi verò iam visus fuerit tibi articulus lineam transgressus esse, simul cum extensione statim ad locum suum detrudere oportet, ita ut alius quidam ex altera digiti parte obseruet ac repellat, ut ne rursus illic elabatur. Moderatè quoque repositionem faciunt vimineæ texturæ, sauræ id est lacertæ appellatæ, ex palmis con- **E**textæ: ita ut dum digitum hinc atque illinc distendis, altera manu lacertam, altera manus iuncturam apprehendas. Postquam autem reposueris, deligare oportet linteis quàm citissimè tenuissimis inceratis, cera neque valde mollī, neque valde dura. Dura enim de digito abscedit. Mollis autē & liquefcens eliquatur, & digito calefiente deperit. Soluendus autem est digiti articulus tertia aut quarta die. In summa, si inflammatus fuerit, frequentius soluendus est: sin minus, rarius. De omnibus articulis hæc dico. Restituitur digiti articulus decima quarta die. Idem verò est curationis modus digitorum manus ac pedis. Circa omnes autem articulorum repositiones attenuare oportet ac fame macerare vsq; ad septimū diem: & si inflammati sint, frequentius soluere: sin minus, rarius. **F**Quietem verò semper habere oportet afflictum articulum, & quàm optimè figuratum positum esse. Genu porro propter expeditam ac facilem naturam, mitius est quàm cubiti gibbus. Quare etiam facilè excidit. Excidit autem saepe intrò. Sed & extra, & in posteriorem partem. Repositiones autem fiunt ex repētina conflexione aut ex calcitrations: aut conuolutam fasciæ molem in poplitem ponito, & circū illā corpus ita ad flectendū genua in terrā dimittito. Potest etiā ubi in posteriorem partem excidit, moderata extensione reponi, veluti cubiti gibbus. Si verò hac aut illac excessit, ex conflexione aut ex calcitrations reponitur. Caterum directio ex moderata extensione omnibus cōmunis est. Si verò non inciderit, hi quibus in posteriorem partem excidit, flectere

- A** Sterere nō possunt: Sed neq; alij ita valde: minuitur autem femoris & tibiæ anterior pars. Si verò intrò, valgiore fiunt. Minuuntur autem externæ partes. Si verò extra, magis varij ac detorti, minus claudi fiunt, crassiore autē osse vehūtur, & internæ partes minuuntur. At si ex natiuitate, aut in augmento hæc fiant, iuxta priorē rationem res se habet. Cæterū articuli circa malleolos luxati extensione vehementi opus habent, aut manibus, aut aliis huiusmodi: & simul directione vtrunq; præstāte. Cōmune autem hoc est omnibus. At verò luxationis articulorum in pede, velut eas quæ in manu fiunt Luxationis articulorū pedis. sanabis. Qui verò cum tibia cōmunionem habent, & ex natiuitate elapsi sunt, aut etiā in augmento luxati, eandem cum
- B** manu repositionem expetunt. Quicunq; verò facto saltu ex supernis, calcaneo innitentes se firmarunt, sic vt ossa disparata sint, & venæ humores effuderint, & nerui contusi sint: si grauitè hæc acciderint, periculum est ne corruptione accedente per omnem vitam affligantur, obtorta enim sūt ossa, nerui autem inter se cōmunionem habent. Quin & quibus fractis, aut ex vulnere, vel in tibia, vel in femore: aut neruis exolutis qui his cōmunicant: aut ex negligenti decubitu, calcaneum fuerit denigratū, etiā his maximæ recrudescētiæ ex talibus fiunt. Quandoq; etiā ad corruptionē accedunt febres acutæ, singultuosæ, mentē percellētes, citā mortem inducētes, & insuper venarū sanguifluarum liuores. Signa recrudescētiarū sunt, si effuso sanguine sugillata, & denigrata, & vicina his, subdura ac subrubra fuerint. Si enim cū duricia liuescant, periculum est ne denigrescant. Si verò subliuida sint, aut etiā liuida mollia & diffusa: aut cū virore subpallida ac mollia: hæc in omnibus talibus bona sunt. Curatio si febris absit, veratro in potu dato sit: sin minus non, sed potu si opus sit, fauorū cremor decoctus, aut acetum mulsū dulce detur. Deligatio conuenit qualis in articulis. Ad contusiones autem magis quàm ad omnia, linteis pluribus ac mollioribus vtendū est, & minus comprimēdum, & plurima insuper calcaneo obuoluenda. Figura sit velut deligatio postulat, vt ne ad calcaneum exprimat. Ferulis vtendum nō est.
- Quibus verò aut ipse pes solus excesserit, aut cum appendice, excidit quidem magis ad internam partem: his si non rursus incidat, attenuatur progressu temporis & coxa
& femur

Hippocratis Liber

& femur, & tibiæ pars luxationi opposita. Repositio est velut iuncturæ ad manum. Extensio autem vehemens. Curatio pro lege articulorum. Recrudescit, sed minus quàm manus articulus siue iunctura, si quieverint. Victus parciore quiescentibus expedit. Quæ verò ex natiuitate, aut in augmento fiunt, iuxta priorem rationem.

H I P P O C R A T I S

COI LIBER DE VL-

CERIBVS, IANO CORNARIO MEDICO PHY-

SICO INTERPRETE.

*al. somn
ep. viij
i. parat Hipp. t. 6.*

Quæ vlcera
curentur.



ulcus

Vulnus omne
ne quietem
poscit.
Vlcera ne
inflammen-
tur.

Lcera vniuersa, nisi vino, humectare non oportet, si non in articulo fuerit vlcus, Nam siccum sano propius est, & humidum non sano. Est enim vlcus humidum: quod verò sanum est, siccum. Præstat autem absque deligatione finire, præterquam quod cataplasma imponitur: quanquam aliqua vlcera neque cataplasma ferre possint, magis autem recentia quàm vetustiora, & quæ sunt in articulis. Modicus cibus, & aqua, quàm maximè omnibus vlceribus conducunt, & magis recentioribus quàm vetustioribus, & si quod aliud vlcus inflammatum est, aut inflammationem minatur, & si periculum est corruptionis: & vlceribus ac inflammationibus in articulis: & vbi conuulsionem fieri periculum est: & vulneribus in ventre. Maximè verò omnium, fracturis in capite ac femore, & si cui alij parti fractura contigerit. Stare autè vlceri minimè cōducit, præsertim si quis in crure vlcus habeat: imò neque sedere, neque ambulare. Verum otium & quies maximè conferunt. At verò recentia vlcera omnia, tum ipsa, tum circumsitæ partes, minimè inflammationem incurrent, si quis quàm citissimè suppurèt, & pus ab osculo vlceris non interceptum supprimatur: aut si quis auertat, vt omnino non suppurentur, præterquam necessario, eoque paucissimo

A cisismo pure, & ficca sint quàm maximè ex medicamēto nō molesto. Igneum enim fernorem hoc inducit, vbi horror & pulsatio accesserit. Inflammātur enim vlcerā tunc quum ad suppurationem tendunt. Suppurantur autē alterato sanguine ac calefacto, donec putrefactus talium vlcerum pus fiat. Pus. Quum verò cataplasmate opus esse visum fuerit, non ipsum vlcus cataplasmate integere oportet, sed circumscitas partes, quo pus decedat, & quæ indurata sunt, mollescant. Ceterum ex vlceribus si quod acuto specillo incisum aut dissectū fuerit, cruentis vulneribus aptum medicamētum suscipit, & resiccatorium quoddam, quod prohibet suppurationem. Si qua caro ex telo contusa & dissecta est, eam curare oportet, quo quàm celerrimè suppuretur. Nam & minus inflāmatur, & necesse est carnes contusas ac dissectas, putrescere ac pus fieri, & eliquari ac consumi: & postea nouas carnes nasci.

B Omni recēti vlcēri, praterquàm in ventre, cōducit frequenter sanguinem defluere facere, prout opportunū esse visum fuerit, & ab ipsis partibus vlcus complectentibus, tum aliās, tum si in tibia vlcus fuerit, aut in digito pedis aut manus, magis quàm si alicubi in alia corporis parte. Sanguine enim defluēte gracilescētia sicciora fiunt ac minora. Prohibet enim hoc maximè talia vlcerā humectari. Deinde verò in omnibus. Putredo sanguinis ex sanguinis trāsmutatione fit. Confert autē post sanguinis defluxionē in talibus vlceribus, etiā spongiā deligare densam, mollem, cōcisam, sicciorē quàm humidiorē, aut super spongiā superne folia multa ponere. At oleum, & quæcunque mollia, aut oleosa sunt medicamenta, talibus vlceribus non conducunt, si non valde iam ad sanitatem tendant. Neq; vlceribus ex recenti vulnere oleum conducit, neque mollientia, neq; adiposa medicamenta, tum aliās, tum quòd vlcus ampliore purgatione opus habet. Ut autem in summa dicā, oleo illitio faciēda est, & in æstate, & hyeme, in his ad quæ talibus medicamentis opus habemus.

C Depurgatio ventris deorsum plurimis vlceribus confert, & in vulneribus quæ sunt in capite, & in ventre, & in articulis, & in quibus corruptionis periculum est, & in his quæ consumpta sunt, & in exedentibus ac serpentibus, & aliās inueteratis vlceribus. At vbi deligare voles, pharmaca non prius imponere oportet, quàm vbi valde siccū feceris vlcus. Tūc verò apponere

Sanguinis
defluxio in
his quid fa
ciat.

Oleū qui-
bus inutile.

Purgatio
ventris con
fert his.

Tempus ca-
lidius qui-
bus vulneri-
bus proficit.

Vlceraque
non coeunt.

Ignis sacer
vulceris.

ponere oportet, vlcus autem saepe spongia detergere, & rur-
sus linteum siccum ac purum saepe adhibere, atque sic im-
posito medicamento quod conferre videtur, deligare, aut non
deligare. Plerisque vlceribus tempus calidius commodius
est hyeme, exceptis his quae in capite sunt ac ventre: magis
verò aquinoctij tempus. Vlcera quaecunque probe & pro-
ut oportet purgata sunt, semper ad sicciorum modum germi-
nationem faciunt. Hæc autem plerumque carne non superex-
crescunt. Si vndeunque tandem os discesserit, aut vltimum, aut
sectum aut alio modo, horum vlceru cicatrices cauiores fiunt.

Vlcera non purgata, non committi solent etiam si adducan-
tur, neque sua sponte coeunt. Vbi circumsita vlcere partes
inflammatae sunt, quandiu durat inflammatio vlcera coire non
solent. Sed & vbi circumsita partes denigratae fuerint, & san-
guinis putredine, aut etiam varice, influxione sanguinis ex-
hibente, neque hæc coire solent, si non circumsitas vlcere par-
tes sanas feceris. Ex vlceribus rotunda si subcaua fuerint, ex-
cidere oportet vndique in orbem ea quae discesserunt, aut
omnia, aut ex dimidio circuli, secundum longitudinem na-
turae hominis. In omni vlcere igne sacro accedente, cor-
pus purgationem facere oportet, in vtram partem vlcere con-
tulerit, siue sursum, siue deorsum. Cui tumor obortus fuerit
circa vlcus, vlcere non inflammato, huic postea temporis pro-
gressu tumor puris subsidentiam habet. Quodcunque vl-
cus ex inflammatione tumidum non sedatur, dum alia quae
simul inflammari ac tumescere coeperunt sedantur, etiam hoc
non coalescere periculum est. Quaecunque verò ex casu, aut
alio quopiam modo dissecantur, & contunduntur, & intume-
scunt, ita ut vicinae circuncirca partes suppurae, pus de tu-
moribus per vlcus egerat: in talibus quicquid cataplasmate
opus habere visum fuerit, non super ipsum vlcus cataplasma
ponere oportet, sed super circumsitas partes, quo pus secedat,
& indurata molliantur. Postquam autem mollita fuerint, &
inflammatio sedata, spongiis super ea quae obcesserunt deli-
gatis compescito, initio à sana parte facto, atque ita proceden-
do. Supernè verò super spongiam folia sint multa. Quum ve-
rò compesci non poterit caro quae humida existit, in causa est
ut hæc eiicias. Si sub profunda carne vlcus fuerit, ex vtriusque,
& ex deligatione, & ex eo quod insuper compressit, hoc sa-
ne

A nē incuruū subattollitur, & si quis id secet specillo, si fieri poterit ad fluxionem accommodatum ab ore vlcus refecare oportet, vbi commodū tempus esse visum fuerit, atq; ita curationem adhibere, qualicunq; tandem indigere videbitur. Plerunque verò in omni vlcere quod ventrem habet, in directum ad visum conspicua sunt omnia, tumore non præsente. Et si quidem in ipso fuerit putredo, aut caro suberit humida ac putrida, hoc vlcus & complectentes vlcus partes, aspectu nigra subliuida erunt. Et in excedentibus vlceribus, qua parte phagedæna affuerit, vehemētissimēq; depascitur accedit, ea parte circūsitā vlcis pars colorem habebit nigrum, subliuidum. Cataplasma tumorum & inflammationis in circūsitis partibus sunt, verbascum coctū, & trifolij folia cruda, & ligustri folia cocta, & polium. Si verò etiā purgari opus habuerit vlcus, omnia quidem etiam hæc purgāt: Sed & fici & oleæ folia, & marrubium. Coquere autem oportet hæc omnia, & maximē viticē, & fisci & oleæ folia: & mali punicæ folia similiter coquere oportet. Crudis verò his vtēdum est. Maluæ folia terito cū vino, & rutæ folia, & origani viridis. Omnibus his lini semen torrefactum ac tustum quam leuissimē, ammiscere oportet. Vbi verò periculū est ignem sacrum in vlceribus oboriturū esse, isatidis folia trita cruda cum lini semine imposito. aut lini semen solani aut isatidis succo subactum imposito. Quum autem vlcus purum quidē fuerit, verū inflammatum est & vlcus, & circūsitæ itidem inflammatae partes, lentem vino coctam, ac leuiter tritā, oleo modico subactā imposito, ac deligato: & rubi canini folia in aqua cocta, leuiter trita imposito, linteo tenui subextento, puro, vinōq; ac oleo madefacto. Et vbi committere ac coalescere vlcus voles, rubi canini folia velut lentem præparato. Nasturtium item sauridion à lacerti similitudine appellatum vinum, & lini semen tenuiter tritum commiscentur. Et hæc, lini semen, & vitex crudus, & alumē melium: hæc aceto subacta. Vuam albā immaturā per colum in vas æris rubri expressam, per dies ad solem exponito, noctu autem tollito, vt ne irroretur. Per dies verò indefinenter terito, vt æqualiter siccetur, & de æneo vase quā plurimum assumat. Tanto autem tempore ad solem exponere oportet, donec ad mellis crassitudinem deuenierit. Postea & hūc succum, & mel quā optimum

Ignem sacrum quæ prohibeāt.

Hippocratis Liber

**Medicamē
ta varia ad
vlcera.**

optimum, & vinum dulce, in æneam ollam infundito, ita ta-
men vt ptius resinam terebinthinam in vino coquas, donec
dura fiat instar mellis cocti, & postea resinā eximas, & vinū
affundas. Sit autem plurimus vuæ immaturæ succus. Secūdo
loco vinum. Tertio mel. Myrrham etiam statim quā opti-
mam leuiter tritam, eodem vino paulatim affuso diluito, &
postea ipsam per seipsam cum vino sæpe agitādo coquito, &
vbi ad bonam crassitudinē deuenisse videbitur, ad vuæ im-
maturæ succum affundito, & nitrum optimum torrefactum
sensim ad pharmacū ammisceto, & flori eris minus quā ni-
tri. Hæc postquam miscueris, coquito non minus tribus die-
bus, lignis ficulneis nō multis succensis, aut prunis, vt ne tor-
reatur, & vbi hoc pharmacū illinitur, omnia quæ imponun-
tur sicca sint, & vlcera non humectentur. Vtēdum autem est
hoc pharmaco ad vlcera inueterata ac recentia, & ad pu-
dendi, & capitis ac aurium vlcera. Aliud ad eadem vlcera.

Fel bubulum siccum, mel quā optimū, vinū albū in quo
cocta sint loti ramenta, thus, myrrha æqualis, crocus æqua-
lis, flos æris similiter. Ex liquidis autem vinum fit plurimū,
deinde mel, paucissimum verò fel. Aliud. Vinū, mel, oleū
cedrinum. Sicca verò sint, flos æris, myrrha, malicoriū siccū.

Aliud. Flos æris tostus dimidia parte, myrrhæ duæ partes
dimidiæ, croci partes tres, mel modicū, cum vino hæc torren-
tur. Aliud. Thuris pars, gallæ pars, croci tres. Hæc singula
sicca q̄ leuissimè terito, deinde mixta ad solem calidissimū,
affuso vuæ immaturæ succo, donec viscosa fiant, per tres dies
terito, postea vino austero, nigro odorato paulatim affuso di-
luito. Aliud. In vino dulci albo, ilicis radices coquito, & vbi
probe habere visum fuerit, de vino defuso duas partes sumi-
to, & amurcæ olei quā siccissimæ partē vnā. Postea agi-
tādo coquito, vt ne torrefiant, lento igne donec ad bonā cras-
situdinem deueniant. Aliud. Reliqua quidem eadem sint,

**Alumen
melium.**

Verū pro vino, acetum sit album acerrimū, in quo tinctæ
sint succidæ lanæ. Postea ammixta amurcæ coquito, & succū
caprifici affundito, & alumen melium, & nitrum ac æris flo-
rem, vtraque tosta ammisceto. Hoc magis priore vlcera pur-
gat. Verū prius non minus resiccat. Aliud. Lanæ suc-
cidas paucissima aqua tingito, deinde vini tertiam partē ad
aquam misceto, ac coquito donec bona prouenerit crassitu-
do. Ex

Ado. Ex his recentia vulnera quàm citissimè suppurari possunt. Aliud. Aron siccum inspergito ac adaptato. Aliud. Fici dum succulenta est corticem viridem, in vino tritum immittito: & sine vino: ipsum etiam cum melle. Aliud. Ad acetum in quo cocta sunt loti ramenta: sit autem acetum album: amurcam oliuarum, & picis serum crudum ammisce-
 ro, & illinito, & instillato, & deligato sicca. Hoc recentia vulnera auertit, ne suppurentur: aut aceto abluito, & vino imbuta, sponsia extergito. Aliud. Plumbum tritum cum spodio cyprio leuigatum inspergito. Et loti ramenta inspergito, & squamam æris, & chalcitidem cum ære, & solam per se, & cum loti ramētis. Et aliàs vbi siccis opus fuerit, talibus uten-

Bdum est, & spodio Illyrico trito cum ramētis, & ipsis solis ramentis, & flore argenti solo quàm leuissimè trito, & aristolochiam rasam ac tritam leuiter, inspergito. Aliud ad cruenta vulnera. Myrrha, thus, galla, ærugo, flos eris tostus, Alumen Aegyptium tostum, cenanthe, lanarum sordes, plūbagio. Horū singulorū æquale pondus diluitur cum vino velut superius, & reliqua præparatio fit eodem modo. Aliud. Acetum quàm acerrimum album, mel, alumen Aegyptium, nitrum optimū leuiter tostum, fellis parū, simul coquito. Hoc carnem superexcrecentem consumit, & cauat, & non mordet. Aliud, Herba est paruis foliis prædita, cui nomen est

Partheniū
 microphyllū. Hæc verrucas de pudēdo aufert: & chalcitis ex insula Melo cruda, & elaterium tenue siccum lum.

Cadstringit: & malicorium tenue siccum eodem modo. Maximè autē replet caua, pura, herba Lagopyrus nomine: est autem Lagopyrus
 tritico similis vbi arescit, folio paruo velut olea, sed longiore: & marrubij folium cum oleæ foliis. Aliud. Caricæ siccissimæ internam partem pinguem, mellis speciem referentem duabus portionibus, cum seminis lini tosti non admodum, ac triti quàm tenuissimè parte vna. Aliud. Caricæ partem internam, & florem æris tenuem modicū, & fici succum. Aliud. Caricæ partem internam, chamaeleonem nigrum, bubulum fel siccum. Aliud. Reliqua quidem eadem sint. Verū sicca, nasturtium tenue crudum, irio, vtrunque pari pondere: caricæ verò partes duæ, sint, & seminis lini partes duæ, cum fici succo. Quum autem aliquo horum pharmacorum vteris, splenia aceto imbuta supernè imposito, &

S s

sponsia

Hippocratis Liber

spongia super splenia imposita deligato, & paulò magis ap- **D**
 primito. Si verò circūsitæ partes inflāmatæ fuerint, quicquid
 conferre visum fuerit circūponito: Si liquido vti voles, etiā
 caricum pharmacum illinito, & velut suprā scriptū est deli-
 gato eodem modo. Est autem ex his pharmacum factum, ve-
 ratro nigro, sandaracha, squama æris, plumbo vsto, cū multo
 sulphure, auripigmento, cantharide. Ex his prout visum fue-
 rit cōponito, ac vtor. Diluuntur oleo cedrino. Postquā verò
 satis fuerit illitū, pharmacū eiicito, & aron coctum, tritū im-
 ponito: aut siccum, tritū, oleo subactum. Et si sicco Carico vti
 voles: liquida remouere oportet, & pharmacum inspergere.
 Facit autem siccum ex veratro solo constans ac sandaracha.

Aliud liquidum. Herba est cuius folium simile est aro na- **E**
 tura, verūm albū, lanuginosum, ad hæderæ folij magnitudi-
 nem. Hæc herba cum vino imponitur. Aut ilicis partem eā
 quæ est circum truncum, cum vino tritam imponito. Aliud.
 Vux immaturæ succus, acetum acerrimum, flos æris, nitrū,
 succus caprifici. Ad vux immaturæ succum alumen iniicito
 tenuissimè tritum, & in vas æris rubri immissum ad solem
 exponito ac agitato, & vbi ad bonam spissitudinem deuen-
 rit, tollito. Sicca ad cruenta vulnera hæc faciunt. Vera-
 trum nigrum tenuissimè tritum inspergitur, quandiu ali-
 quid humoris inerit ac depascentis. Deligatio verò eadē est
 quæ in emplastris. Aliud. Salis grana siccissima in æneam
 ollam aut fictilem nouam immittito, magnitudine maximè
 æqualia, non magna: & mel optimū dupla salis mensura pro **F**
 cōiectura facta, ad salem affundito: deinde ollam prunis im-
 ponito, & dum totū combustum fuerit finito, Postea exterso
 ac expurgato per spongiā vlcere inspergito, & velut prius
 deligato, & paulò magis cōprimito. Postridie verò qua par-
 te nō adhæserit pharmacum inspergito, comprimito ac de-
 ligato. Vbi verò pharmacum discedere voles, acetum calidū
 affundito, donec discedat, & rursus eadem facito, si opus fue-
 rit extersione per spongiā facta. Aliud siccum mordax.

Myfi quā leuissimè tritum inspergito ea quæ humida
 sunt ac putrida: & florem æris tenuem non penitus leuiter
 tritum. Aliud siccum similiter mordax. Vbi spongia ex-
 terfisti, lanas quā maximè succidas in testa exurito, face
 admota donec totas combusseris, hoc pharmacū leuiter tri-
 tum

A tum inspergito, & eandem deligationem adhibeto. Aliud ficcum ad eadem vlcera. Chamæleo niger, alumen fici succo subactum, subigito autem tostum, & anchusam misceto.

Aliud. Anagallis & alumen Aegyptium tostum. Aliud. Puluillum insperfilem Orchomenium inspergito. Cæterum ad nomas proserpendo depascentes, alumen Aegyptium tostum, itémq; Meliū facit. Verum nitro tosto insperfo prius præparare ac spōgia extergere oportet. Facit & chalcitis tosta. Torrere autem oportet, donec flammæ speciem induat.

Ad vetera vlcera in tibiis fientia, fiunt autē sanguinolenta & nigra, meliloti florem tritum, melle subactum, cataplas matis modo vttere. At verò supra neruos dissectos, myrti syluestris radices contusas ac cribratas, & oleo subactas deligato. Et herbam quinque folium: est autem alba & lanuginosa, & altior à terra, quàm nigrū quinquefolium: in oleo tritum deligato, & tertia die exoluito. His autem medicamentis in hyeme potius quàm æstate vtendum est. Medicamenta mollientia, quæ etiam cicatrices pulchras faciunt. Scillæ internam partem mucosam terito, & resinā de picea, cum recenti adipe suillo & oleo modico, resināque ac cerusa modica. Et adipem anserinum, ac suillum recentem purum, & oleum modicū, & scillam, & ceram albissimā. Aut scillam, oleum albū, resinæ parum, cerā, adipem, suillū veterē ac recentem. Facit & oleum, & ærugo, & scilla, & resina. Sint autem duæ partes veteris adipis ad recētem. De reliquis autem quantum opportunum esse visum fuerit. Adipem recentem liquefactum in aliam ollam defundito, & plumbaginē leuissimè tritam ac cribratā commiscero ac coquito, & primum agitato. Coquito autem donec destillatū in terram congeletur, deinde tollito, ac reliquum diffundito, præter lapidē subfidentem: & resinā iniicito ac agitato, & modicū oleū cedrinum, & quod prius diffusum ac ablatū fuit ammisceto. Porro in omnibus mollibus in quibus resinam ammisces, vbi pharmacū ab igne abstuleris, in calidum adhuc resinam immittito ac agitato. Aliud. Adeps suillus vetus & nouus, & cera, & oleū: Sicca verò, loti ramenta, thus, plumbago: thuris videlicet pars vna, plumbaginis vna, & ramentorū loti vna. Sint autē adipis veteris partes duæ, ceræ vna, & noui adipis vna. Aut adipem solum veterem suillum, & cum ipso adi-

Hippocratis Liber

pem caprinum recētem, quā minimē cum membrana, sed D
purgatum, parum terito aut contundito, & oleum affundito,
& plumbum cum spodio inspergito, & ramentorū loti dimi-
dium. Aliud. Adeps caprinus, spodium, chalcitis cærulea,
oleum. De Ambustis. Illicis radices coquere oportet tene-
ras. Quarum si cortex crassissimus est ac viridissimus, cōse-
ctum in tenues partes, vino albo affuso, lento igne coquito,
donec ad bonam crassitudinem deueniat, vt illini possit. Po-
test & in aqua coqui eodē modo. Aliud non mordax. Suil-
lum adipem solū veterem liquefactū illinito. Supernē ve-
rō scillæ radicem dissectam imposito ac deligato. Postridie
verō foueto ac perfundito, & adipem suillum veterem liqua-
to, & ceram ac oleum ammisceto, thus item, & loti ramenta, E
ac minium, hoc vbi illeueris, ari folia in vino ac oleo cocta
apponito ac deligato. Aliud. Postquā suillo adipe illeue-
ris vetusto, hastulæ regiæ radices in vino coctas ac tritas su-
perillinito. Aliud. Adipem suillum veterem liquato, & re-
sinam ac bitumen ammisceto, & hæc linteo illita, ad ignem
calefacta, imposito ac deligato. Quum in dorso ex plagis,
aut aliàs vlcus factum fuerit, scilla cocta, trita, ac linteo illita
deligato. Postea verō adipem caprinū, & recentem suillum,
& spodiū, & oleū, & thus illinito. Tumores in pedibus fien-
tes, & sponte, & non sua sponte, in quibus neq; tumores, ne-
que inflammatio, à cataplasmatibus sedatur: & si quis spongas
deliget, aut lanas, aut aliud quia super sanam partem, postea F
intumescunt sua sponte, ac inflammantur: influxio sanguinis
per venas in causa est, si cui nō contusio causa est. Et si alicu-
bi alia in corporis parte tale quid fiat eadē ratio est. Verū
sanguinem detrahere oportet, de venis præsertim influenti-
bus, si conspicuæ fuerint. Sin minus, pertundere tumores
oportet, profundioribus ac frequentioribus vulnusculis impa-
ctis: Sed & in aliis omnibus quæ pertūdis, sic facere oportet,
atque hoc acutissimis ac tenuissimis ferramētis. Quum ve-
rō sanguinem detrahis, specillo ne valde premas, vt ne con-
tusio accedat. Aceto autem perluito, & grumū sanguinis in-
hiatibus ne relinquito: & illito cruentis vulneribus destina-
to medicamēto, lanas succidas, carminatas, molles deligato,
vino & oleo resperfas. Et pertusam partem æger ita habeat,
vt refluxus sit sanguinis, non defluxus; & omnino nō hume-
ctet:

Dorsivlcus

Pedum tu-
mor.

- A** ceto: & parum cibi capiat, & aquā bibat. Si verò vbi solueris, fissuras repereris inflammatas, cataplasma ex vitice ac lini semine imposito. Si verò vlcera fuerint fissuræ ac eruperint, ad rē respiciens, & quod opus fuerit adhibens, de cætero curato. At vbi varix inest in tibia, aut conspicuus, aut in carne, & tibia est nigra & videtur opus habere sanguine ab ipsa defluente: talia nequaquā pertundere oportet. Plerumq; enim magna vlcera ex fissuris fiūt, propter varicis influxū. Verū varicem ipsum aliās atq; aliās compungere oportet, vbi opportunum esse visum fuerit. Cæterum quū venam secueris, postquā sanguinem dimiseris, & fasciam solueris, & nō sistatur, in contrarium, partē habeat, quò refluxus sanguinis fiat, siue manus fuerit, siue crus, utpote sanguine retrò fluente, atque ita tempus longius aut breuius decumbens expectet. Postea ipsum sic habentē deligato, nullo grumo existente in fissura. Deinde spleniū duplum vino imbutum apponito, & super ipsum lanam puram oleo imbutā. Nam etiam si influxus sanguinis fuerit violentus, suppressio fit influentis. Et si grumo in fissura manēte sic inflammetur, suppuratur. Pransum autē & potum plus aut minus venā secare sinere oportet, & aliquantū calefactum: & die calidiore quā in frigidiorē. Si verò influat sanguis, cucurbitam affigere oportet, & si ablata cucurbita, multū sanguinis, aut serosus sanguis fluat, cito priusquā repleatur rursus affigere & quod uestat extrahere. Sin minus, grumi in fissuris inhaerent, & deinde ex ipsis inflammata vlcera fiunt. Aceto autem omnia talia perluere oportet, & postea nō humectare, neque in fissuras decumbere. Verū aliquo medicamento cruentis vulneribus destinato fissuras illinere. Et quum infra genu aut ad genu affigere cucurbitas oportuerit, stanti erecto, si stare potuerit, affigantur.

Varices tibiae.

HIPPOCRATIS

COI LIBER DE FI-

STVLIS, IANO CORNA-

RIO MEDICO PHY-

SICO INTER-

PRETE.

Ss 3

Fistulae

Causa &
origo fistu-
la.



Medela.

Istulae fiunt quidem ex contusionibus & tuberculis, fiunt autem & ex remigatione ac equitatione, quum in natibus congregatus fuerit sanguis prope sedem. Putrescens enim distribuitur ad molles partes nimirum quum & intestinum rectum sit humidum, & caro mollis, in qua distribuitur, donec tuberculum eruperit, & deorsum ad rectum intestinum computruerit. Postquam hoc factum fuerit, in fistulam abit, ac sanie manat, & stercus per ipsam fluit, & flatus, & abominatio multa. Ex contusionibus itaque fit fistula, ubi aliquis circa rectum intestinum locus contusus fuerit ex plaga, aut ex casu, aut vulnere, aut equitatione, aut remigatione, aut quaecunque talia sunt. Congregatur enim sanguis. Putrescens autem suppuratur: à suppurato verò ea quae de tuberculis dicta sunt patitur. Primum igitur quum tale quoddam tuberculum nascens senserit, crudum quam citissimè secare oportet, priusquam suppuretur ad rectum intestinum. Si verò iam agrotatem ex fistula assumpseris, alij caulem recentè accipe, & hominem supino reclinato, diductis cruribus altero huc, altero illuc, caulem immitte donec offendas ac impinguas, & fistulae profunditatem per caulem metire, & seselis radicem tenuissimè tritam, aqua affusa ad dies quatuor macerato, eamque aquam triū cyathorū mensura, melle ammixto ager bibat. **F**ieiunus. Cum hac etiam ascaridas purgato. Quicumque verò relictī fuerint nō curati, moriuntur. Postea linteū byssinum tithymalli magni succo imbutū, flore aris tosto trito insperso, in penicilli figurā intorque longitudine fistulae aequalem, filo per summū penicillū trāsmisso, & rursus per summū caulem: & hominem supino reclinato, adhibito catoptere instrumento sedem expandente, corrosam recti intestini partem inspicito, & sic caulē immittito: & ubi in intestinum incidit, apprehensum retrahito, donec penicillus fuerit intrusus, & superiori ac inferiori parti adaequatus. Postquam verò fuerit intrusus, glandē corneam in intestinum indito, & podice ex terra cimolia oblito finito. Vbi verò ventrem exonerat, eximito, ac rursus indito, donec ad quintū diem peruenerit.

Sexta

- A** Sexta autē eximito, extrahens penicillū ex carne, & alumen terito, eoque glandem expleto, & in intestinū indito ac finito, donec alumen liquidum fiat. Podicem verò myrrha illinito, donec coaluisse visus fuerit. Alia curatio. Crudum linum tenuissimum accipito, & ad palmi longitudinem quincuplicato, & pilum equinum circumdato. Deinde facto specillo stanneo in summa parte perforato, & initio lini complicati in specillum immisso, specillum in fistulam demittito, & simul sinistrae manus digitum indicem in sedē indito: vbi verò specillum contigerit digitū, inflexa summa specilli parte, initium lini quod est in specillo per digitum adducito: & specillum quidē rursus extrahito, lini verò initia bis aut ter
- B** connectito, & reliquam lini partem intortam ad nexum deligato. Postea verò dimissum negocia sua obire iubeto. Ceterum quantum putrescente fistula de lino laxatur, tantum augere oportet, ac intorquere semper singulis diebus. Si verò linum crudum computrescat, priusquam fistula corrodat, aliud linum ad pilum innecte, immitte ac connecte. Pilus enim ea de causa ad crudum linum additur, quod non putrescit. Postquam verò fistula computruerit, spongiam mollem in tenuissima frusta concisam apponere oportet, deinde in fistulam quidem, florem æris tostum multum per specillum immittere. Spongiam verò melle illinere, & subiecto digito indice sinistrae manus, ultra protrudere: & appositam alterā spongiam deligare, eodem modo velut in hæmorrhoidibus.
- C** Postridie verò exoluere, & aqua calida abluere, & cum spongia per sinistrae manus digitum fistulam purgari conari: & rursus æris florem immittere, ac spongiam deligare. Atque hæc facere oportet per dies septenos. In his enim maximè tunica fistulae computrescit, de cætero verò donec sanata fuerit spongiam deligare. Nam dum per hunc modum fistula à spongia cogitur ac explicatur, neque rursus concidere poterit, neque alia ipsius pars sanabitur, alia verò rursus complebitur, sed in seipsa tota sana erit. Verū in hac curatione multa aqua calida proluere oportet, & fame macerare. Si verò Medela non corrosa fuerit fistula, specillo immisso secato donec diduxeris, & æris florem inspergito, & ad dies quinque finito. Deinde aquam calidam affundito, & polentam aqua subactā superimponito, & betarum folia deligato. Vbi verò excide-

Medela altera quā & Celsus sum pfit.

Curatio fistulae.

Medela alia.

Intestinum
rectum in-
flammatū.

Curatio.

Stranguria
quare hisu
perueniat.

rit æris flos, & fistulæ vlcus purum fuerit, velut priorem cu- D
rato. Si verò in loco sit vbi fieri id non possit, & profunda
etiam sit fistula, flore æris, & myrrha, & nitro in vrina dilutis
colluito: & in fistulæ osculum plumbeam glandem indito,
vt ne coalescat. Collutio verò facienda est, pennæ fistula ad
vesicam alligata, & fistula intro immissa, atque sic collutio-
ne infusa. Verum sanus non fit, si non secetur. Si intestinum
rectum inflammatum fuerit, & dolor habeat & febris, & fre-
quenter ad exonerandum aluum desideat, & nihil egerat, &
præ inflammatione sedes exiisse videatur, & aliquando vri-
næ stillicidium corripiat: hic morbus fit, quū pituita ex cor-
pore ad intestinum rectum decubuerit. Conferunt autem ca-
lida. Quum enim hæc adhibentur, pituitam attenuare ac cō E
sumere possunt, & simul acrimonia sua falsam pituitā aquo-
sam reddere, vt non sit ardor, neque morsus aliquis in inte-
stino. Curare itaque oportet hoc modo. Aegrum in cali-
dam aquam collocato, & trita grani cni diij grana sexaginta,
in vini hemina, & olei hemina dimidia diluto, tepefacito, &
infundito. Hæc & pituitā educunt & stercus. Si verò in aqua
non sedet, oua cocta in vino nigro odorato, ad sedem appo-
nito, calido quopiam infernè substrato, aut vesica aqua cali-
da plena. Aut lini semen tostum, mollitum, tritum pari fari-
na, in vino nigro odorato, & oleo ammixta, cataplasmatibus
modo calidissimè imposito. Aut ordeum & alumen Aegy-
ptium tritum misceto, & glandem oblongam efformato, & F
ad ignem tepefaciens digitis effingito, deinde summè repi-
dam effectam in sedem indito. Forinsecus autem cerato ob-
linito, & allium in vino nigro diluto coctū pro cataplasmate
imposito. Postquam verò exemeris, in aquam calidam collo-
cato: & solani succū, & anserinum ac suillum adipē, & chry-
socolam, & resinam, & ceram albam commisceto, simulque
liquefacito, & cum his illinito, & quandiu inflammatio du-
rauerit, allium coctū cataplasma adhibeto. Et si quidem ad
hæc à dolore liberetur, satis fit. Sin minus, bibat peplum, me-
conium album appellatum, aut aliud quoddam quod pitui-
tam purgat. Et quam diu durat inflammatio, eduliis leuibus
nutriatur. Vrinæ stillicidium ex his incidit. Vesica ex in-
testino recto calefscens, caliditate pituitam adducit: à pituita
verò urinæ stillicidium fit. Si quidem igitur vnà cum mor-
bo

A bo sedetur, solet enim plerunque ita fieri, satis est. Sin minus, medicamenta ad vrinæ stillicidium destinata exhibeto. Si verò sedes elabatur, fomento per mollem spongiam adhibito, & cochleæ mucō illito, è manibus deligatum suspendito ad modicum tempus, & redibit. Si verò amplius excidat, & non maneat intus, laterum mollitudines præcingito, & retrorsum fasciam ex cingulo submittitō, & vbi sedem intro protrusisti, spongiam mollem aqua calida, in qua loti ramenta cocta sunt, imbutam imponito. Sed & de aqua ipsa ad sedem affundito, spongiam verò exprimito, deinde fasciam per media crura superextentā, circa vmbilicum deligato. Vbi verò aluum exonerare volet, inter tabulas angustissimas insidens id faciat. Si verò puer fuerit, intra mulieris pedes ad genua acclinatus. Dum autem ventrem exonerat, crura extendat. Sic enim minimè sedes exciderit. At si intestinum rectum humidum fiat, & sanies defluat, face vini vsta & aqua ex myrti decocto abluito, & adiantū siccum, tusum, cribratum inspergito. Si verò sanguis profluat, ablutione ex iisdem facta chalcitidem, & cupressi, aut cedri, aut pini, aut terebinthi ramēta, inspergito, pari mensura de his ad chalcitidē ammixta. Forinsecus autem ceratum crassum oblinito. Quum sedes siue rectum intestinum exciderit, & in loco suo manere noluerit, silphium optimum ac densissimum derafum tenue inspergito: & sternutatorium medicamentum ad nares apponito, & hominem ad iram exacerbato. Aut vbi aqua calida abluisti, malicorium, & alumen, in vino albo trita, ad sedem affundito, deinde panniculos apponito, & femora per dies tres colligato, & ieiunet. Vinum autem bibat dulce. Si verò neq; sic retrocedat, miniū mixtum cum melle illinat. Intestinum rectum si procidat, & sanguis profluat, de ari radice detractum corticem in aqua coquito, deinde tritum farina ammixta calidum imponito. Aliud. Vitis sylvestris, quam aliqui pilothrion vocant, radices tenerri-
mas derasas in vino nigro meraco austero coquito, deinde tritas tepidè imponito. Sed & farinam ammisceto, & in vino albo ac oleo subigito, & tepidè imponito. Aliud. Cicutæ semen vino albo odorato instillatō terito, deinde tepidè imponito. Si verò inflammatum fuerit, hæderæ radicem in aqua coctam, leuiter tritā, ammixta farina optima, in vino

Sedis proci-
dentia.Sedis proci-
dentis va-
ria medela.

S s albo

Hippocratis Liber

albo subactam imponito, & oleū ad hanc ammisceto. Aliud. D
Mandragoræ radicem maximè viridem, sin minus, siccam:
viridem itaq; lotam ac concisam, in vino diluto coquito, ac
imponito: siccam verò tritam similiter imponito. Aliud.
Cucumeris peponis internam partem leuiter tritam impo-
nito. Si verò dolor fiat, & inflammatum non sit, nitrum ru-
brum affato, ac leuiter terito, & alumen ac salem torreto ac
leuiter terito, & pari mensura singula misceto, deinde ad pi-
cem optimam ammisceto, & linteo illita apponito ac deliga-
to. Aliud. Capparidis folia viridia trita, in marsupium con-
iecta adalligato: & ubi vrere videberis auferto, ac rursus ap-
ponito. Si verò folia non affuerint, corticem radicis capparidis
contusum, vino nigro subactum, eodem modo alligato. Hoc **E**
etiam ad splenis dolorem bonum est. Ex his cataplasmatibus
quæ quidem frigefaciunt, fluere prohibent: quæ verò mol-
liunt ac calefaciunt, diffundunt: quæ in sese trahunt, siccant
& attenuant. Porro hic morbus fit, quum bilis & pituita ad
hos locos decubuerit. At recto intestino inflammato medica-
mento in quod resina, & oleū, & cera, & plumbago, & adeps
calidissimus commiscetur, illinere oportet.

H I P P O C R A T I S

COI LIBER DE HAEMOR- RHODIBVS, IANO COR- NARIO MEDICO

PHYSICO IN-
TERPRETE.

*

Causa hæ-
morrhoidū



Hæmorrhoidum morbus hoc modo fit.
Quum bilis aut pituita ad venas recti inte-
stini decubuerit, sanguinē qui in venis est
calefacit. Calefcentes autē venæ ex vicinis
venulis sanguinē attrahunt: & ubi replen-
tur, interna sedis pars intumescit, & capita
venarum supereminēt: & partim dum à stercore exeunte
compri-

A comprimuntur, partim dum à coaceruato sanguine coguntur, sanguinem eiaculantur: atque hoc maximè quidem vnà cum stercore, aliquando verò etiā sine stercore. Curare autē Curatio quæ. oportet hoc modo. Primùm equidē nosse oportet in quo loco sint hæmorrhoides. Rectum enim intestinum & secans, & resecans, & consuens, & vrens, & putrefaciens, etiam si grauissima hæc esse videantur, nihil laferis. Iubeo autem præparari ferramenta septem aut octo, magnitudine palmi, crassitudine specilli crassi, ex summa parte reflexa ac lata, velut in obolo paruo. Et vbi priore die purgatorio medicamēto purgasti, ea qua rem aggredieris vrito, & homine supino reclinato, & puluinari sub lumbos subiecto, sedem quā maximè per digitos foras extrahito: ferramentāq; candētia facito, ac vrito, donec resiccaueris, & hoc ita vt ne contingas. Vrere enim Curatio oportet, & nullam hæmorrhoidem sine vstione finire, sed omnes exurere. Cognosces autem hæmorrhoidas non difficulter. Supereminet enim in internam recti intestini partem, velut vuae acini, liuidæ, & simul vt sedes extrahitur, sanguinem eiaculantur. Detineant autem aliqui ipsius caput & manus, dum vritur, vt ne moueatur: & dum vritur vociferetur, sedes enim magis inde eminet. Postquam verò vsseris, lentes ac eruum coquito, & ex aqua trita imposito, ad quinque aut sex dies. Septima verò die spongiā mollem in tenuissima frusta concidito. Sit autem latitudo spongiæ vndiquaq; sex digitorum, deinde super spongiā linteum tene, ac leue, spōgiæ æquale, melle illitum imposito, & postea subiecto digito indice sinistrae manus, mediam spongiā in sedem quā penitissimè protrudito, deinde supra spongiā lanā apponito, quo in sede quieta permaneat. Et laterum mollitudines præcingito, & retrorsum fasciam ex cingulo submittito, quam per media crura receptam, ad cingulum circa vmbilicum deligato. At pharmacum de quo dixi, ad densam ac robustam carnem faciendam ac producendam deligatur, & non minus quā viginti diebus hæc deligare oportet. Sorbenda autem est semel in die farina, aut milium, aut fursurum decoctum: & aqua bibenda. Si verò ad aluum exonerandam desideat, aqua calida proluito, & tertio quoque die lauet. Alia curatio. Extractā quā maximè sedē, aqua cali Curatio alia. da perfundito, deinde summas hæmorrhoidū partes præsecato. Phar

Hippocratis Liber

Alia.

to. Pharmacū autem ad sectionē præparatū sit hoc. In creum **D**
 vas mingito, & in vrinā, æris florem tostum, tritum, leuem in
 spergito, deinde diluito, ac vas agitato, & in sole siccatum. Vbi
 vero siccatum fuerit, eradito, terito, & leuigatū ad anum ap-
 ponito, & splenia oleo imbuta addito, ac spongiā supra de-
 ligato. Alius modus. Adnascitur ad venā sanguis suā ex-
 tuberantē, velut mori fructus, & si quidem valde extra fuerit
 exuberantia, carnis tectoriū circum ipsam nascitur. Homine
 igitur flexis genibus in duo mortaria siue excisos lapides lo-
 cato, ac videto. Cōperies enim inflatas partes inter nates cir-
 ca sedem, sanguinē verò intrinsecus procedere. Si itaq; mol-
 lis sit, & sub tectorio cedat extuberantia, digito ipsam aufer-
 re oportet. Nihilo enim plus difficultatis hæc res habet, quā **E**
 si quis dum ouicula excoriatur, digitū inter cutē ac carnem
 adigat. Atque hæc interim dum loqueris, agro non animadu-
 uertēte facito. Postquā autē extuberantiā abstuleris, necesse
 est sanguinis cursus ex tota detractione promanare. Itaq; vi-
 no austero in quo gallæ macerate sunt, cito abluere oportet:
 & vena sanguisua vnā cum extuberantia peribit, & tecto-
 rium sedabitur, & quanto vetustior affectio fuerit, tanto fa-
 ciliior sanatio erit. Si verò penitus intus delituerit extube-
 rantia, per catoptrem inspicito, & ne à catoptere decipiaris
 videto. Cum enim aperitur, extuberantiā explanat: dū verò
 rursus cōtrahitur, rectē ostendit. Auferre autē oportet, vera-
 tro nigro in anum sublito: deinde tertia die auferre, ac vino **F**
 austero infuso colluere. Caterum quòd sanguis non fluit,
 quū abstuleris extuberantiā, mirari non oportet. Neq; enim
 si in articulis disseces manus aut crura, sanguis profluat. Si ve-
 rò supra aut infra articulos secueris, cauas ac sanguisuias ve-
 nas cōperies: & difficile fuerit vt expeditē sistas. Sic etiā hæ-
 morrhoidem in sede, si supra aut infra extuberantiā detra-
 ctionem feces, sanguis profluat. Si verò ipsam exuberantiā
 in connexu abstuleris, non profluat. Si quidem igitur ita se-
 datur, bene habet: Sin minus, vrito, cauendo vt ne contingas
 ferro, sed propè admotis ferramentis resiccato, & florem
 æris ex vrina apponito, Alius modus curationis hæmorrhoi-
 dum. Clysterem facere oportet, velut arundinem sepiariam,
 phragmiten appellatam, & in ipsum ferramentū probè con-
 gruū adaptare. Deinde indita in sedē clysteris fistula, fer-
 rament

Alia cura-
tio.

A ramentum candens immittere, ac frequenter eximere, quo magis calefieri sustineat, & neque vlcus ex calore habeat, & venæ resiccatae sanæ fiant. At verò si neque vrere, neq; resicare voles, vbi multa calida aqua proluxi, & sedem euersam extraxisti, myrrham tritam, leuigatā, & gallam, & alumen Aegyptiū vstum, vna & dimidia ac reliqua parte, & melantheriæ tantundem accipe, atque siccis his vttere. Hæmorrhoids enim ab his medicamentis decedet, velut coriū combustum, Hæc facito donec omnes extirpaueris. Et dimidia chalcitidis vstæ pars idem efficit. Si verò glandulis sanare voles, sepiæ testam, plumbaginis tertiam partem, bitumen, alumen, florem æris modicum, gallam, æruginem modicam, commi-
B sceto & mel coctum affundito, & formatam ex his glandem oblongiorem apponito, donec extirpaueris. Muliebre hæmorrhoidē hoc modo curato. Multa calida aqua proluxi. In aqua verò odorata, velut est myrica trita coquito. Deinde spumam argenti tostam, & gallam misceto, & vinum album, & oleum, & anseris adipem affundito, omniāque simul trita, post factam prolutionem illinenda dato. Proluere verò oportet fede quā maximè extracta.

Muliebris
hæmor-
rhoids.

H I P P O C R A T I S

COI LIBER DE VISV,

IANO CORNARIO

C MEDICO PHY-

SICO INTER-

PRETE.

*



Culi corrupti sponte quidem cærulei fi-
 entes, derepente tales fiunt, & vbi facta fue-
 rint, non est talium sanatio. Qui verò ma-
 ris speciem referūt, paulatim per multum
 tempus procedendo corrumpuntur, & sæ-
 pe alter oculus in multo tempore postea
 corruptus est. Huius caput purgare opor-
 tet, & venas vrere. Et si quis ab initio curatus fuerit hoc mo-
 do,

Visus corru-
ptus qualis.

Medela.

do, malum sedatur, & in deterius non procedit. At qui colo-
rem inter cæruleum ac marinum medium referunt, si qui-
dem puero tales fiant, vbi senior fit, sedantur. Si verò senio-
ri septimum annum egresso fiant, melius videt magna val-
de & splendida: & videt quidem procul, sed non clarè: & si
quid valde ad oculum admouerit, etiam hoc videt, aliud au-
tem nihil. Confert autem huic capitis purgatio, & capitis
vstio. Sanguinem verò his detrahare non conducit, neq; cæ-
ruleo, neque maris speciem referenti. Et visum oculorum,
oculo sano existēte, in iunioribus hominibus, tum fœmellis,
tum masculis, quicquam faciendo nihil iuueris, quandiu ad-
huc augefcit corpus. Quum autē nō ampliùs augefcit, ipsius
oculi palpebras intuitus radendo attenuato, & si opus esse
visum fuerit, etiam ferramentis non admodum candenti-
bus intrinsecus inurito. Quum verò palpebras oculi raseris,
lana milesia, crispa, pura, circumfusa obuoluta, radito,
ipsam oculi coronam vitando, vt ne ad chartaliginem vsque
peruras. Signum autem sufficientis rasuræ est, si non am-
pliùs splendidus sanguis exit, sed sanies cruenta aut aquosa.
Tunc verò liquido aliquo medicamento, in quo flos æris est,
defricare oportet. Postea autem vbi & rasionis, & vstionis
crustæ exciderint, & vlcera purgata fuerint ac germinaue-
rint, fissuram per sinciput secare oportet, & quum sanguis
defluxerit, medicamento cruentis vulneribus idoneo illi-
nere: Deinde verò & huius, & omnium caput purgare ope-
ræ precium est. Palpebræ si crassiores quàm pro natura
fuerint, ex inferna parte carne quantum potes quàm exp-
editissimè resecta, postea palpebram inurito, non candenti-
bus ferramentis, vitando naturam pilorum: aut flore æris
tosto tenui adstringito. Quum autem crusta exciderit, ve-
lut reliqua curato. Quum palpebræ scabie laborant, &
pruritus habet, floris æris glebulam ad cotem terito, & ex
ipso palpebram defricato. Et tunc squamam æris quàm te-
nuissimè terito, deinde vix immaturæ succum excolatum
affundito, ac leuiter simul terito. & postea reliquum suc-
cum in vase æris rubri affundens, paulatim terito, donec
crassitudo fiat velut allij intritum, & vbi resiccatum fuerit
Nictalops medicamentum, leuiter trito vtire. Nictalops medica-
mentum bibat deorsum purgans, & caput purgetur, & cer-
uicem

Palpebra-
rum cura-
tio.

Palpebræ
curatio.

Nictalops
quicuretur

- A** uicem eius quàm maximè scarificato, & fame ad multũ tem-
pus premito. Vbi verò remiserit, vnũ aut duo frustra, prout
maxima deuorare potest, de hepate bubulo crudo in melle
tincto exhibeto. Si cui oculi dum sani sunt visum corrup-
pant, huic sectione & insuper excoriatione, in sinciput facta,
os excindere, & aquam auferre oportet, sicque curare: & ita
sani fiunt. Ad lippitudinem annuam ac popularem condu-
cit purgatio capitis, & ventris inferni. Et si corpus habeat,
sanguinis detractio ad quosdam eiusmodi dolores confert.
Conferunt & cucurbitæ circa venas affixæ. Cibus modicus
& aquæ potus. Decumbat autem æger in tenebris, procul à
fumo, & igne, & aliis splendidis. atque hoc in obliquum, mo-
B dò in dextram, modò in sinistram partem. Caput verò ne hu-
meat, neque enim conducit. Cataplasma si dolor nõ adest,
verũ velut ad fluxionem cohibendam, non confert, quum
tumores sint doloris exortes. Verũ post acria medicamen-
ta, quæ ad dolorem illinũtur, postquam dolor sedatus fuerit
ac separatus, post medicamenti illinitionem, tunc cataplas-
mata imponere cõducit, si quod commodum fore visum fue-
rit. Nec verò ad multum tempus contentè intueri confert.
Lachryma enim prouocatur, quũ non possit oculus ad splen-
dida officio suo fungi. Sed neque ad multum tempus clau-
dere oculos conducit, maximè si fluxionem calidam habeat.
Lachryma enim suppressa, calefacit. Si verò fluxio non sit,
C cum puluillo sicco sublitionem facere conducit.

Medela cū
quis sanis
oculis non
videt.
Lippitudi-
nis curatio.

HIPPOCRATIS

COL. LIBER APHORIS-
MORVM, IANO CORNA-
RIO MEDICO PHY-
SICO INTER-
PRETE.

*

Vita



Ita brevis, ars longa, tempus præceptis, experimētum periculosum, iudicium difficile. Oportet autem nō solum seipsum exhibere quæ decet facientem, sed etiā agrotum, & præsentem, & quæ externa sunt. **II.** In perturbationibus alui, & vomitibus sponte fientibus, si quidem qualia purgari oportet purgentur, confert, & leuiter ferunt: Sin minus, vice versa. Sic & vasorum vacuatio, si quidem talis fuit, qualis fieri debet, confert, & bene ferunt: Sin minus, vice versa. Inspicere itaque oportet regionem, & tempus, & ætatem, & morbos, in quibus conuenit, aut non. **III.** In exercitationibus boni habitus ad summum progressi periculosi sunt, si in extremo fuerint. Non enim manere possunt in eodem, neque quiescere. Quum verò non quiescant, non amplius in melius augescere possunt. reliquum est igitur ut in deterius. Ob has igitur causas bonam habitudinem non tardè soluere cōfert, quo corpus rursus renutritionis principium sumat. Neque verò collapsiones ad extremum ducere oportet: periculosum enim est. Sed qualis natura est eius qui perferre debet, ad hoc ducere conuenit. Similiter autem & euacuationes ad extremū ducētes periculosæ sunt. & rursus renutritiones in extremo existentes, periculosæ sunt. **IIII.** Tenuis & exacti victus, & in **F** longis semper affectionibus, & in acutis, ubi non expedit, periculosi sunt. & rursus victus ad extremam tenuitatem progressi, difficiles sunt. Et repletiones ad extremum progressæ difficiles sunt. **V.** In tenui victu delinquentes agrotantes, magis læduntur. Omne enim delictum quod committi poterit, magis magnum committitur in tenui quàm in paulò pleniore victu. Quapropter etiam in sanis periculosus est valde tenuis, & constitutus, ac exactus victus, quoniam delicta grauius ferunt. Ob hoc igitur tenuis & exactus victus periculosus est magis quàm paulò plenior. **VI.** Ad extremos morbos, exactè extremæ curationes, optimæ sunt. **VII.** Vbi igitur peracutus est morbus, statim etiam extremos labores habet, & extreme tenuissimo victu **vbi**

A uti necesse est. Vbi non, sed pleniore victu uti licet, intantum subdescendendum est, inquā tum morbus extremis mollior fuerit. **viii.** Quum in vigore fuerit morbus, tūc tenuis-
simo victu uti necesse est. **ix.** Simul autem coniectare o-
porter, an æger ex victu durare possit ad morbi vigorem: &
vtrum ille prius deficiet, & ex victu durare non possit: aut
morbus prius deficiet ac obtundetur. **x.** Quibus igitur
statim vigor est, his statim tenuis victus exhibendus est.
Quibus verò vigor posterius, his ad illud, & paulò ante illud
tempus subtrahendus est. Antea verò mitius æger victu tra-
ctandus est, quo durare possit. **xi.** In exacerbationibus
subtrahere victum oportet. Nam apponere noxa est. Ex qui-
B bus per circuitus exacerbationes fiunt, in exacerbationibus
subtrahere oportet. **xii.** Exacerbationes & constitutio-
nes indicabunt morbi, & tempora anni, & circuituum inter
se collata incrementa, siue quotidie, siue alternis diebus, siue
per amplius temporis interuallum fiant. Sed & ex apparen-
tibus indicia fiunt, velut in pleuriticis, si sputum statim ap-
pareat incipiente morbo, ipsum abbreviat. Si verò posterius
appareat, producit, & vrinæ, & alui egestionem, & sudores ap-
parentes indicant & ægrè & facile iudicandos, & breues &
longos morbos. **xiii.** Senes facillimè ieiunium ferunt,
Deinde ætate consistentes. Minimè adolescentes: omnium
verò minimè pueri, inter hos ipsos qui ipsi seipsis alacriores
C fuerint. **xiiii.** Qui crescunt, plurimum habent innatū
calorem: plurimo igitur opus habent alimento. Sin minus,
corpus consumitur. Senibus autem modicus est calor: qua-
propter paucis fomitibus opus habent, à multis enim extin-
guuntur. Ob hanc etiam causam febres senibus non simili-
ter acutæ fiunt. Frigidum est enim ipsorum corpus.

xv. Ventres hyeme & vere natura calidissimi sunt, &
somni longissimi: Quapropter in his temporibus alimenta
plura exhibenda sunt. Nam innatum calorem ampliorem
tunc habent, alimento igitur ampliore opus habet. Signum
sunt ætates, & athletæ. **xvi.** Victus humidi omnibus fe-
bricitantibus conferunt. Maximè verò pueris, & aliis ita ali
adsuetis. **xvii.** Et quibus semel aut bis, & plus aut mi-
nus, & ex parte exhibere oportet, considerandum est. Dan-
dum verò etiam aliquid est tempori, & regioni, & ætati, &

T t

conſue

consuetudini. xviii. Aestate & autumno cibos difficil- D
limè ferunt: hyeme facillimè, deinde vere. xix. His qui
in circuitibus exacerbantur, nihil dare oportet, neque co-
gere sed auferre de appositionibus ante iudicationes.

xx. Quæ iudicantur, & iudicata sunt integrè, neque mo-
uere oportet, neque nouare, neque medicamentis, neq; aliis
irritamentis, sed sinere. xxi. Quæ ducere oportet, quò
maximè repunt, eò ducere oportet, per conuenientes locos.

xxii. Concocta medicamentis aggredi oportet, & mo-
uere non cruda, neque in principiis, si non turgeant. plurima
verò non turgent. xxiii. Quæ prodeunt non multitu-
dine æstimare oportet, sed quandiu prodeant qualia oportet,
& facillè æger ferat. Et vbi opus est, vsque ad animi deliquiũ E
ducere oportet: & hoc facere, si sufficiat æger. xxiiii. In
acutis affectionibus rarè etiam in principiis medicamentis
vti oportet: atque hoc facere diligenti prius æstimatione fa-
cta. xxv. Si qualia oportet purgari, purgentur, confert
& facillè ferunt. Contraria verò difficulter.

SECTIO SECVNDA.

I IN quo morbo somnus laborem facit, mortale: Si verò
somnia profit, non lethale. ii. Vbi somnus delirium
sedat, bonum est. iii. Somnus, vigilia, vtrique mo-
dum excedentia, malum. iiii. Non satietas, non fa-
mes, neque aliud quicquam bonum est, quod naturæ modũ F
excedat. v. Lassitudines spontaneæ denunciant morbos.

vi. Quicumque aliqua corporis parte dolentes, plerun-
que dolores non sentiunt, his mens agrotat. vii. Quæ
multo tempore attenuantur corpora, lentè reficere oportet.
Quæ verò breui, breui. viii. Si ex morbo cibum ca-
piens quis non fiat validus, significat quòd corpus vberiore
alimento vtitur. Si verò cibum non accipiente hoc cõtingat,
nosse oportet quòd euacuatione opus habet. ix. Corpo-
ra, quocunque quis purgare voluerit, fluida facere oportet.

x. Non pura corpora quanto plus nutries, tanto magis
lædes. xi. Facilius est repleti potu, quàm cibo. xii. Quæ
relinquuntur in morbis post iudicationẽ, recidiam faciũt.

xiii. Quibuscunque iudicatio fit, his nox grauis ante
exacerbationem. Quæ verò sequitur plerunque tolerabilior
est. xiiii. In alui fluxionibus, mutationes egestionum
profunt

Symptomatum.

A profunt, si non ad prauas mutantur. xv. Vbi fauces agrotant, aut tubercula in corpore nascuntur, excretiones considerare oportet. Si enim biliosae fuerint, corpus simul agrotat. Si verò similes sanis fiant, tutum est corpus nutrire. xvi. Vbi fames, non oportet laborare. xvii. Vbi cibus præter naturam copiosior ingressus fuerit, morbum facit. Ostendit autem sanatio. xviii. Eorum quæ acruatim & velociter nutriunt, veloces etiam egestionem fiunt. xix. Acutorum morborum non omnino tutæ sunt prædictiones, neque mortis, neque sanitatis. xx. Quibus dum iuuenes sunt, ventres humidi sunt, his senescentibus resiccantur. Quibus verò dum iuuenes sunt, ventres ficci sunt, his senescentibus humectantur. xxi. Famem vini potus soluit.

B xxii. Quicumque morbi ex repletionem fiunt, euacuatio sanat. Et quicumque ex euacuationem, repletio. Et aliorum contrarietas. xxiii. Acuti morbi in quatuordecim diebus iudicantur. xxiiii. Septimæ quarta index est. Alterius hebdomadæ octaua principium est. Consideranda verò est undecima. Hæc enim quarta est secundæ hebdomadæ. Consideranda rursus decima septima. Ipsa enim est quarta quidē à decima quarta, septima verò ab undecima. xxv. Aestiuæ quartanæ plerunque sunt breues. Autumnales verò longæ, & maximè quæ ad hyemem pertingunt. xxvi. Febrem in conuulsione fieri melius est, quàm conuulsionem in febre. xxvii. His quæ non secundum rationem leuant, non oportet credere. neque valde timere ea quæ praua fiunt præter rationem. Pleraque enim ex talibus inconstantia sunt, & non valde permanere, neque morari solent.

xxviii. Febricitantium non omnino leuiter, permanere, & nihil minui corpus, aut etiā magis quàm pro ratione colliquari, malum est. Illud enim morbi longitudinem, hoc verò debilitatem significat. xxix. Incipientibus morbis si quid mouendum videtur, moue: vigentibus verò, quietem agere melius est. xxx. Circa principia & fines, omnia debiliora sunt. Circa vigores verò, fortiora. xxxi. Ex ægritudine bene cibum accipienti, nihil augescere corpus, malum est. xxxii. Plerunque omnes malè habentes, ab initio cibum bene capientes, & nihil augescentes, ad finem rursus cibos fastidiunt. At ab initio quidem valde ci-

Tt 2 bum

bum auerfantes, poſtea verò bene cibum capientes, melius **D**
liberantur. **xx xiii.** In omni morbo valere mente, &
bene ſe habere ad ea quæ exhibentur, bonum, contrariũ ve-
rò, malum. **xx xiiii.** In morbis minus periclitantur,
quorum naturæ, & ætati, & habitui, & tempori morbus ma-
gis affinis fuerit, quàm hi quibus non affinis in aliquo horũ
exiſtit. **xx xv.** In omni morbo partes circa vmbilicum
& pectinem, craſſitudinẽ habere melius eſt. At vehemens te-
nuitas & eliquatio, praua eſt. Periculofa verò talis eſt etiam
ad infernas purgationes. **xx xvi.** Sana habentes corpo-
ra, dum medicamentis purgantur, cito exoluuntur. Itẽmque
qui prauo cibo vtuntur. **xx xvii.** Qui bene habent
corpore, eos operoſum eſt medicamentis purgare.

xx xviii. Paulò deterior & potus & cibus, verũ iu-
cundior, melioribus quidem, ſed iniucundioribus præferen-
dus eſt. **xx xix.** Senes iuuenibus plerunque minus ægro-
tant. Quicunque verò ipsis fiunt morbi diuturni, vt pluri-
mum commoriuntur. **xl.** Raucedines & grauedines, in
valde ſenibus non concoquuntur. **xli.** Qui exoluuntur
ſæpẽ & fortiter, abſque manifeſta cauſa, derepente moriun-
tur. **xlii.** Syderationem fortem quidem ſoluere, im-
poſſibile eſt: debilem verò, non facile. **xliii.** Ex his
qui ſtrangulantur, & ſubmerguntur, nondum autem mor-
tui ſunt, non reconualeſcunt quibus ſpuma circa os fuerit.

xliiii. Craſſi admodum ſecundum naturam, magis
cito moriuntur, quàm graciles. **xl v.** Iuuenibus comitia-
libus liberationem faciunt mutationes, maximẽ ætatis, &
regionum, & victuum. **xl vi.** Duobus doloribus ſimul
fiẽtibus, non ſecundum eundem locum, vehemẽtior obſcu-
rat alterum. **xl vii.** Circa generationem puris dolores
& febres magis cõtinent, quàm factò iam ipſo. **xl viii.**
In corporis motu: quum incœperit dolere, quieſcere ſtatim
laſſitudinem eximit. **xlix.** Adſueti conſuetos labores
ferre, etiam ſi fuerint debiles, aut ſenes, non adſuetis forti-
bus ac iuuenibus faciliũ ferunt. **l.** Ex multo tempore con-
ſueta, etiam ſi deteriora fuerint, inſueta minus moleſta-
re ſolent. Oportet igitur etiam ad inſueta tranſmutatio-
nem facere. **li.** Multum & repente euacuare, aut replere,
aut calefacere, aut frigefacere, aut omnino quomodocunque
corpus

A corpus mouere, periculosum est. Et omnis multitudo naturæ contraria est. Quod verò paulatim fit, tutum est, tū aliàs, tum si ex altero ad alterum transitus fit. **LII.** Omnia secundum rationem facienti, si non secundum rationem fiant, non transire oportet ad aliud, manente eo quod visum est ab initio. **LIII.** Quicunque ventres humidos habent, dum quidem iuuenes sunt, melius degunt quàm hi qui siccos habent. Verum ad senectutem deterius degunt. Resiccantur enim plerunque senescentibus. **LIIII.** In corporis magnitudine iuuentutem quidem degere, liberale est, & non indecorum. Senectutē verò degere, inutile, & deterius paruitate.

SECTIO TERTIA.

B Mutationes temporum maximè pariunt morbos, & in temporibus magnæ mutationes frigoris, aut caloris, & reliqua iuxta rationem hoc modo. **II.** Naturarum aliæ quidem ad æstatem, aliæ verò ad hyemem, bene aut male se habent. **III.** Morborum alij ad alia tempora, bene aut male se habent: & ætates quædam ad tempora, & regiones, & victus. **IIII.** In temporibus quum eadem die, modò calor, modò frigus fit, autumnales morbos expectare oportet. **V.** Austri auditum grauantes, caliginosi, caput grauantes, torpidi, dissoluentes. Quum hic præualuerit, talia in morbis patiuntur. Si verò Aquilo fuerit, tussēs, fauces, alui duræ, vrinæ difficultates, horrores, dolores costarum, pectoris. Quum hic dominatur, talia in morbis expectare oportet. **VI.** Quum æstas fit veri similis, sudores in febribus multos expectare oportet. **VII.** In siccitatibus febres acutæ fiunt, & si quidem annus ampliùs talis fuerit, qualem constitutionem fecerit, plerunque tales etiam morbos expectare oportet. **VIII.** In constantibus temporibus, si tempestiue tempestiua reddantur, morbi constantes & iudicatu facilimi fiunt. In inconstantibus autem inconstantes, & qui difficulter iudicantur. **IX.** In autumno morbi acutissimi, & omnino mortiferi. Ver autem saluberrimū & minimè lethale. **X.** Autumnus tabidis malus. **XI.** De temporibus si quidem hyems sicca & aquilonaris fuerit, Ver autem pluuiosum & australe, necesse est æstate febres acutas, & lippitudines, & dysenterias fieri, maximè mulieribus, & viris natura humidioribus. **XII.** Si verò hyems australis, &

Tr 3

pluuio

pluuioſa, ac clemens fiat, Ver autē ſiccum & aquilonare, mu- **D**
 lieres quidem quibus partus ad ver inſtat, ex omni occaſione
 abortiunt. Quæ verò pariunt, impotentes ac morboſos pue-
 ros pariunt, ita vt aut ſtatim pereant, aut tenues ac morboſi
 viuant. Aliis autem dyſenterix, & lippitudines ſiccæ fiunt.
 Senioribus verò deſuxiones breui perimentes. **xiii.** Si
 verò æſtas ſicca fiat & aquilonaris: Autumnus autem pluui-
 ſus & auſtralis, capitis dolores ad hyemem fiunt, & tuſſes, &
 raucedines ac grauedines: quibuſdam etiam tabes. **xiiii.**

Si verò aquilonaris & aquarum exors autumnus fuerit,
 his quidem qui humidæ naturas habent, & mulieribus com-
 modus erit. Reliquis verò fiunt lippitudines ſiccæ, & febres
 acutæ, & grauedines. Quibuſdam verò etiam atræ biles. **E**

xv. Ex anni verò conſtitutionibus, in ſumma ſiccitates
 pluuiſis ſalubriores ſunt, & minus lethales. **xvi.** Mor-
 bi in pluuiſis quidem plerunque fiunt, febres longæ, & alui
 fluxiones, & putredines, & comitiales, & ſyderationes, & an-
 ginæ. In ſiccitatibus verò, tabes, lippitudines, arthritides, vri-
 næ ſtillicidia, & dyſenterix. **xvii.** Quotidianæ verò con-
 ſtitutiones, aquilonares quidem corpora compingunt, & ro-
 buſta, & ad motum idonea, & bene colorata, & melius au-
 dientia faciunt, & ventres reſiccant, & oculos mordent, & ſi
 circa thoracem aliquis dolor prius eſt, magis affligunt. Au-
 ſtrales autem corpora diſſoluunt, & humectant: & grauem
 auditum, ac capitis grauitatem, & vertigines faciunt. In oculis **F**
 autem & corporibus egrum motū, & ventres humectant.

xviii. Secundum tempora vere quidem & prima æſta-
 te, pueri, & qui his ætate cohærēt, optimè degunt, & maximè
 ſani ſunt. Aestate verò & autumno aliquandiu, ſenes. Reli-
 quo autumno & hyeme, mediæ ætatem habentes. **xix.**

Morbi omnes quidem in omnibus temporibus fiunt.
 Quidam tamen magis in quibuſdam ipſorum, & fiunt &
 exacerbantur. **xx.** Vere inſanix, & atræ biles, & comi-
 tiales, & ſanguinis fluxiones, & anginx, & grauedines, & rau-
 cedines, & tuſſes, & lepræ, & impetigines, & vitiligines, &
 puſtulæ vlceroſæ plurimæ, & tubercula, & morbus articula-
 ris. **xxi.** Aestate verò & quidam ex his, & febres con-
 tinuæ, & ardentes, & tertianæ plurimæ, & quartanæ, & vo-
 mitus, & alui profluuia, & lippitudines, & aurium dolores,
 & oris

A & oris exulcerationes, & pudendorum putredines, & papulæ sudorosæ. xxii. Autumno autem & ex æstiuis multi, & febres quartanæ, & erroneæ, & splenes, & hydropes, & tabes, & urinæ stillicidia, & intestinorum leuitates, & dysenteria, & coxendices, & angina, & anhelationes, & voluuli, & comitiales, & infania, & atræ biles. xxiii. Hyeme verò pleuritides, peripneumonia, grauedines, raucedines, tussés, dolores pectorum, laterum ac lumborum, capitis dolores, vertigines, syderationes. xxiiii. In ætatibus autem talia contingunt, paruis ac recens natis pueris feruida oris vlcera, vomitus, tussés, vigiliæ, tumores, vmbilici inflammationes, aurium humiditates. xxv. Ad dentitionem verò accedentibus, gingiuarum pruritus, febres, conuulsiones, alui profluvia, & maximè vbi dentes caninos producunt, tum crassissimis pueris, tum his qui duos ventres habent. xxvi. Senioribus autem sientibus, tonsillæ, verticuli in occipitio intro, luxationes, anhelationes calculorum generationes, lumbrici rotundi, ascarides, verrucæ, tumores glandularum circa aures oblongi satyriasmii appellati, strumæ, & alia tubercula, maximè verò predicta. xxvii. Adhuc verò senioribus, & ad pubertatem accedentibus, pleraq; ex his, & febres diurnæ magis, & ex naribus sanguinis fluxiones. xxviii. Plurimæ verò affectiones pueris iudicantur, partim in quadraginta diebus, partim in septem mensibus, partim in septem annis, partim ad pubertatem accedentibus. Quæ verò permanserint pueris affectiones, & non exolutæ fuerint circa pubertatē, aut fœmellis circa mensiū eruptiones, diurnæ fieri solent. xxix. Iuuenibus autem sanguinis spuitiones, tabes, febres acutæ, comitiales, & alij morbi, maximè verò prædicti. xxx. His verò qui hanc ætatem excesserunt, anhelationes, pleuritides, peripneumonia, lethargi, phrenitides, febres ardentes, alui profluvia diurna, bilis sursum ac deorsum effusiones, dysenteria intestinorum leuitates, hæmorrhoides. xxxi. Senibus autem spirandi difficultates, & defluxiones cum tussi, urinæ stillicidia, urinæ difficultates, articulorum dolores, nephritides, vertigines, syderationes, mali habitus, pruritus totius corporis, vigiliæ, alui, oculorum, & narium humiditates, visus hebetudines, glaucedines, auditus grauitates.

SECTIO QVARTA.

Pregnantes medicamentis purgare oportet, si turget humor, quarto mense, & vsque ad septimum. Minus verò has. Iuniores autem & seniores fœtus vereri oportet. **ii.** In medicamentorum vsu, talia ex corpore ducere oportet, qualia etiam sponte prodeuntia commoda sunt. Contrario autem modo prodeuntia, sedare. **iii.** Si qualia oportet purgari, purgentur, confert & facile ferunt. Contrario verò difficulter. **iiii.** Medicamentis purgare oportet æstate quidem superiores magis: hyeme verò inferiores. **v.** Sub canem, & ante canem, operosæ sunt medicamentorum purgationes. **vi.** Graciles, & facile vomentes, sursum purgare oportet, vitantes hyemem. **vii.** Difficulter vomentes, & moderate carnosos, deorsum, vitantes æstatem. **viii.** Tabescentes autem, vitantes superiores. **ix.** Atrabiliarios verò plenius inferiores. Eadem ratione contraria apponens.

x. Purgare oportet in valde acutis, si humor turget, eadem die. Morari enim in talibus malum est. **xi.** Quibus tormina, & circa vmbilicum dolores, & lumborum dolor, qui neq; à medicamento, neq; aliàs soluitur, in hydropē siccum firmatur. **xii.** Quibus alui intestinorum leuitate affecti, eos hyeme sursum purgare malum est. **xiii.** Ad veratrum, his qui non facile sursum purgantur, ante potionem corpora humectare oportet, ampliore cibo ac quiete.

xiiii. Vbi biberit quis veratrum, ad motus quidem corporum magis ducere oportet, ad somnos autem & quietem minus. Declarat autem nauigatio, quòd motus corpora turbat. **xv.** Vbi volueris magis ducere veratrū, corpus moueto. Vbi verò sistere, somnum facito, & ne moueto. **xvi.** Veratrum periculosum est sanas carnes habentibus. Conuulsionem enim inducit. **xvii.** Sine febre existenti cibi fastidium, & oris ventriculi morsus, & vertigo, & os amarescens, medicamento sursum purgante opus habere significat.

xviii. Dolores supra septum transversum, qui purgatione opus habent sursum versus purgatione indigere significant: qui verò infra, deorsum. **xix.** Qui in medicamentorum potionibus, dum purgantur non sitiunt, non cessant priusquam sitierint. **xx.** Non febrientibus si fiat tormentum, & genuum grauitas, & lumborum dolor, deorsum medica

- A** dicamento purgante opus habere significat. **xxi.** Egestiones alui nigrae, velut sanguis niger, sua sponte prodeuntes, & cum febre, & sine febre, pessimae sunt: & quanto plures fuerint peiores colores, tanto magis malum est. Cum medicamento vero melius, & quanto plures fuerint colores, non malum est. **xxii.** Quibuscunque morbis incipientibus, si atra bilis, aut sursum aut deorsum prodierit, lethale est. **xxiii.** Quibuscunque ex morbis acutis, aut ex diuturnis, aut ex vulneribus, aut alias attenuatis, atra bilis, siue qualis sanguis niger subierit, postridie moriuntur. **xxiiii.** Dysenteria si ab atra bile inceperit, lethalis est. **xxv.** Sanguis sursum quidem qualiscunque fuerit, malus est, deorsum vero bona sunt nigrae subeuntia. **xxvi.** Si a dysenteria occupato, veluti carnes subierint, lethale est. **xxvii.** Quibus in febribus sanguinis multitudo erumpit vndecunque, his in refectionibus alui humectantur. **xxviii.** Quibus biliosae sunt egestionis, surditate fiens cessant. Et quibus surditas, biliosis egestionibus fiens cessat. **xxix.** Quibus in febribus sexta die rigores fiunt, difficulter iudicant. **xxx.** Quibus exacerbationes fiunt, quacunque tandem hora febris dimiserit, si postridie eadem qua antea hora corripuerit, difficulter iudicant. **xxxi.** De lassatis in febribus ad articulos, & circa maxillas maxime, abscessus fiunt. **xxxii.** Quibuscunque resurgentibus ex morbis, si quid doluerit, isthic abscessus fiunt. **xxxiii.**
- Sed & si ante morbum quid doluerit, isthic morbus incumbit. **xxxiiii.** Si a febre occupato, tumore non existente in faucibus, suffocatio derepente contingat, lethale est. **xxxv.** Si a febre occupato collum repente obuersum fuerit, & vix deglutire poterit, tumore non existente, lethale est. **xxxvi.** Sudores febricitanti si inceperint, boni sunt tertia die, & quinta, & septima, & nona, & vndecima, & decimaquarta, & decima septima, & vigesima prima, & vigesima septima, & trigesima prima, & trigesima quarta. Hi enim sudores morbos iudicant. Qui vero non sic fiunt, dolorem significat, & longitudinem morbi, & recidivas. **xxxvii.**
- Frigidi sudores cum acuta quidem febre fiens, mortem significant: cum mitiore vero, morbi longitudinem. **xxxviii.** Et ubi in corpore sudor est, illic morbum esse declarat. **xxxix.** Et ubi in corpore frigiditas aut caliditas, isthic
- Tc 5 morb

morbis est. XL. Et ubi in toto corpore mutationes, & si **D** corpus perfrigeretur, aut rursus calefiat, aut color alius ex alio fiat, longitudinem morbi significat. XL I. Sudor multus ex somno, citra manifestam causam fiens, corpus multo alimento vti significat. Si verò cibum non capienti hoc fiat, significat quòd euacuatione opus habet. XL II. Sudor multus, frigidus aut calidus, semper fluēs: frigidus maiorem, calidus minorem morbum significat. XL III. Febres quacunque non intermittentes per tertiam fortiores fiunt, magis periculosae sunt. Quocunque verò modo intermiserint, quòd sine periculo sint significant. XL IIII. Quibus febres longae, his tubercula ad articulos, aut dolores fiunt. XL V. Quibus tubercula ad articulos, aut dolores, ex febribus longis fiunt, hi pluribus cibis vtuntur. XL VI. Si rigor incidat febre nō **E** intermittente aegroto iam debili, lethale est. XL VII. Excreationes in febribus non intermittētibz, liuidae, & eruentae, & graecolentes, & biliosae, omnes malae sunt. At probè secedētes, bonae, & per alui egestionem, & per vrinas. Si verò nō aliquid ex conducentibus excernatur per hos locos, malū est.

XL VIII. In non intermittētibz febribz, si externae quidem partes frigidae fuerint, internae verò ardeāt, ac sitim habeant, lethale est. XL IX. In febre non intermittēte, si labium aut palpebra, aut superciliū, aut oculus, aut nasus distorqueatur: aut non videat, aut non audiat, aeger iam debilis existens, quicquid horum fiat, propinqua mors est. L. Vbi in febre non intermittēte difficultas spirandi, & delirium **F** fit lethale est. LI. In febribz abscessus qui non solvuntur ad primas iudicationes, longitudinem morbi significant.

LII. Quicunque febribz, aut aliis aegritudinibz, ex voluntate lachrymātur, nihil absurdi est. Qui verò nō ex voluntate, absurdum. LIII. Quibus circa dentes in febribz viscosa adhærēt, his fortiores febres fiunt. LIIII. Quibus plerunque tussis sicca, parum irritantes, in febribz ardentibus, hi non ita valde siticulosi sunt. LV. Ex glandularum tumoribus febres omnes malae sunt, exceptis diariis. LVI. Febricitanti sudor oboriēs febre non remittēte, malum. Morā enim trahit morbus, & multam humiditatem significat.

LVII. A conuulsione, aut distentione neruorum vexato, febris accedens morbum soluit. LVIII. A febre ardente occup

A occupato, rigore accedente, solutio fit. LIX. Tertianæ exacta in septem circuitibus ad summum iudicatur. LX.

Quibus in febribus aures obsuruerunt, his sanguis e naribus effusus, aut alius exturbata, morbum soluit. LXI.

Febrientem si non in diebus imparibus febris dimiserit, recidiuare solet. LXII. Quibus in febribus morbus regius fit ante septimum diem, malum. LXIII. Quibus in febribus quotidie rigores fiunt, quotidie febres solvuntur.

LXIII. Quibus in febribus morbus regius septima, aut nona, aut decimaquarta accedit, bonum, si non præcordium dextrum durum fiat: sin minus, non bonum.

LXV. In febribus circa ventrem æstus vehemens, & cordis siue oris ventriculi morsus, malum. LXVI. In febribus acutis conuulsiones, & circa viscera dolores fortes, malum.

LXVII. In febribus, ex somnis, timores aut conuulsiones, malum. LXVIII. In febribus spiritus offendens, malum. Conuulsionem enim significat. LXIX. Quibus urina crassa, grummosa, paucæ, non sine febribus, ubi copia ex his successit, tenuis prodest. Tales autem maximè prodeunt his quibus ab initio, aut breui subsidentiam habent. LXX.

Quibus in febribus urina conturbata, velut iumentis, his capitis dolores, aut adsunt, aut aderunt. LXXI. Quibus septima die morbi iudicantur, his nubeculam habet urina, quarta die rubrum, & alia secundum rationem. LXXII.

C Quibus urina pellucida, albæ, malæ. Maximè autem in phreneticis comparent. LXXIII. Quibus præcordia eleuata, permurmurantia, lumborum dolore accedente, his alui humectantur, si non flatus erumpant, aut urina copia prodeat. In febribus autem hæc. LXXIII. Quibus spes eū abscessum fore ad articulos, eos liberat ab abscessu urina multa, & crassa, & alba prodiens, qualis in febribus laboriosis quarta die quibusdam fieri incipit. Si verò etiam ex naribus sanguis eruperit, breui admodum soluitur. LXXV. Si quis sanguinem aut pus mingat, rhenum aut vesicæ ulcerationem significat. LXXVI. Quibus in urina crassa existente, carunculæ parvæ, aut veluti pili simul exeunt, his de rhenibus excernuntur. LXXVII. Quibus in urina crassa existente, fursuracea quædam simul minguntur, his vesica scabie affecta est. LXXVIII. Qui sua sponte sanguinè mingunt, his

his in renibus venæ ruptionem significat. LXXIX. **Qui-**
bus in vrina, arenosa subsidunt, his vesica calculo laborat.

LXXX. Si quis sanguinē mingat, & grumos, & vrinæ stil-
licidium habeat, & dolor incidat in imum ventrem, & ani ac-
scroti intercapedinem, partes circa vesicam affectæ sunt.

LXXXI. Si quis sanguinem & pus mingat, & squamas,
& odor grauis sit: vesicæ exulcerationem significat.

LXXXII. Quibus in vrinaria fistula tuberculum nascitur
his suppuratione facta & eruptione, solutio fit. LXXXIII.
Mictio noctu multa fiens, modicā alui egestionem significat.

SECTIO QVINTA.

Conuulsio ex veratro lethalis est. II. Ex vulnere
conuulsio lethalis est. III. Sanguine multo effuso **E**
conuulsio aut singultus accedens, malum.

IIII. Ex superflua purgatione, conuulsio aut singultus
accedens, malum. V. Si quis ebrius derepente voce pri-
uetur, conuulsus moritur, si non febris corripuerit, aut vbi
ad horam qua crapulæ soluuntur peruenit, loquatur.

VI. Quicumq; à distentione antrorsum ac retrorsum cor-
ripiuntur, in quatuor diebus pereunt. Si verò has effugerint,
fani fiunt. VII. Quibuscunq; morbi comitiales ante pu-
bertatem fiunt, transmutationē habent. Quibuscūque verò
vigintiquinque annos natis fiunt, his plerunq; cōmoriuntur.

VIII. Quicumque pleuritici fientes, in quatuordecim
diebus non repurgantur, his ad suppurationem transitio fit. **F**

IX. Tabes maximē fit ætatibus, ab anno decimo octauo,
vsque ad trigesimum quintum. X. Quicumque anginam
effugiunt, his ad pulmonem vertitur, & in septem diebus
moriuntur. Si verò has effugerint, suppurati fiunt.

XI. Qui tabe infestantur, si sputum quodcumque tussien-
do reiecerint, grauē olet, dum prunis iniicitur, & capilli de
capite defluunt, lethale est. XII. Quibuscunque tabe la-
borantibus capilli de capite defluerint, hi alui profluuiū ac-
cedente moriuntur. XIII. Quicumque sanguinem spu-
mosum spuunt, his ex pulmone eductio fit. XIV. A ta-
be occupato, alui profluuium accedens, lethale est.

XV. Quicumq; ex pleuritide suppurati fiunt, si in quadra-
ginta diebus repurgati fuerint, ab ea die qua ruptio facta fue-
rit, liberantur. Si verò nō, ad tabem transeunt. XVI. Cali-
da freq

A da frequenter ea videntibus, has noxas inducit, carniū effec-
minationem, neruorum impotētiā, mentis torporem, san-
guinis eruptiones, animi deliquia. Hæc quibus mors. xvii.

Frigida verò cōuulsiones, antrorsum ac retrorsum disten-
tiones, nigrores, rigores febriles. xviii. Frigida inimi-
ca ossibus, dentibus, neruis, cerebro, spinali medullæ. Calida
verò grata. xix.

Quæcunque perfrigerata sunt, excale-
facere oportet, præterquā à quibus sanguis erumpit, aut
erupturus est. xx. Vlcerebus frigida mordax, cutem obdu-
rat, dolorem non suppuratē facit, nigrefacit, rigores febrile-
inducit, conuulsiones, distentiones. xxi.

B Quandoque verò in distentione sine vlcere, iuueni carnosio, ætate media,
frigida multæ affusio, caloris reuocationem facit. Calor au-
tem hæc soluit. xxii. Calida suppuratoria est, non in
omni vlcere, maximū signum ad securitatem, cutem mollit,
attenuat, dolores eximit, rigores, conuulsiones, distentiones
mitigat, capitis grauitatem soluit. Plurimum autem cōfere
ad ossium fracturas, maximè denudatas. Ex his autem maxi-
mè his qui in capite vlcera habent, & his quæ à frigiditate
moriuntur, aut vlcerantur, & herpetibus exedentibus, sedi,
pudendo, vtero, vesicæ. His calida grata est & iudicās. Frigi-
da verò inimica & occidens. xxiii.

C In his frigida vti
oportet vnde sanguis erumpit, aut erupturus est: non super
ipsas partes, sed circa ipsas vnde fluit. Et quæcūq; inflamma-
tiones, aut flammei ardores, ad ruborem & subcruentum co-
lorem ex nouo sanguine tendunt, ad eas ipsas. nam veteres
nigrefacit, & ad sacrū ignem non exulceratum: nam exulce-
ratum lædit. xxiiii. Frigida velut nix, glacies, pectori
inimica sunt, tusses mouent, & sanguinis eruptiones, ac de-
fluxiones inducunt. xxv. Tumores in articulis, & dolo-
res absque vlcere, & podagricas affectiones. & conuulsiones:
Horū plurima frigida multa affusa leuat, & attenuat, & do-
lorem soluit. Topor enim dolorem soluit. xxvi. Aqua
quæ cito calefcit, & cito perfrigeratur, leuissima est. xxvii.

Quibus bibendi appetētiæ noctu valde sitientibus, si ob-
dormierint bonum est. xxviii. Menses ducit aroma-
rum suffitus. Multis autem modis etiam ad alia commodus
esset, si nō capitis grauitatem induceret. xxix. Prægnan-
tes medicamentis purgare oportet, si turgent humor quarto
mense

menſe, & uſque ad ſeptimum. Minus uero has. Iuniores uero D
& ſeniores foetus uereri oportet. xxx. Mulierem uterum
gerentem ab aliquo acuto morbo corripì, lethale eſt. xxxi.

Mulier uterum gerens ſecta uena abortit, & magis ſi ma-
ior fuerit foetus. xxxii. Mulieri ſanguinem uomenti,
menſibus erumpentibus ſolutio fit. xxxiii. Mulieri men-
ſibus deficientibus, ſanguinem ex naribus fluere, bonum eſt.

xxxiiii. Mulieri uterum geſtanti ſi alius multum flu-
xerit, periculum eſt ut abortiat. xxxv. Mulieri quæ ab
uteri ſtrangulationibus vexatur, aut difficulter parit, ſternu-
tatio accedens, bonum. xxxvi. Mulieri menſes deco-
lores, & non eodem tempore ſemper ſientes, purgatione
opus eſſe ſignificant. xxxvii. Mulieri uterum geſtanti, E
ſi mammae repente graciles ſiant, abortit. xxxviii. Mu-
lieri uterum geſtanti, ſi altera mamma gracilis fiat, gemellos
geſtans alterum abortit. Et ſi quidem dextera gracilis fiat, ma-
ſculum: ſi uero ſiniſtra, foemellam. xxxix. Si mulier quæ
neque prægnans eſt, neque peperit, lac habet: menſes ipſius
defecerunt. xl. Mulieribus quibuſcunq; ad mammæ ſan-
guis colligitur, inſaniam ſignificat. xli. Mulierem ſi ue-
lis cognoscere, an prægnans ſit, ubi dormire uolet, aquam mul-
ſam bibendam dato. Et ſi quidem tormen habuerit circa uen-
tre, prægnans eſt. Si uero non, prægnans non eſt. xlii. Mu-
lier prægnans ſi quidem maſculum geſtat, bene colorata eſt.
Si uero foemellam, malè colorata. xliiii. Si mulieri præ-
gnanti ignis ſacer in utero fiat, lethale eſt. xlv. Quæ-
cunque præter naturam tenues exiſtentes, uterum geſtant,
abortiunt priuſquam craſſeſcant. xlv. Quæcunque uero
moderatè corpus habentes, abortiunt bi-meſtres & tri-meſtres,
ſine cauſa manifeſta, hiſ uteri acetabula muco plena ſunt, &
non poſſunt foetum continere præ grauitate, ſed abrumpi-
tur. xlv. Quæcunque præter naturam craſſæ exiſtentes,
non concipiunt in utero, hiſ omentum oſculum uteri compri-
mit, & priuſquam attenuentur, non concipiunt. xlvii.

Si uterus in coxam incumbens, ſuppuratus fuerit, neceſſe
eſt curationem ex medicamentis, per linamenta ipſi adhibe-
re. xlviii. Foetus maſculi quidem in dextris, foeminæ
uero in ſiniſtris magis. xlix. Ut ſecundæ excidant, ſter-
nutatorio indito, nares & os apprehendito. l. Mulieri
menſes

A menses si cohibere voles, cucurbitā quā maximā ad mammas appone. **L I.** Quæcunque vterum gestant, his osculum vterorum clausum est. **L II.** Mulieri vterum gestanti si multum lac ex mammis fluat, debilem foetum significat. Si verò solidæ fuerint mammae, saniozem foetum significant. **L III.** Quæ corrupturæ sunt foetus, his māmæ graçiles fiunt. Si verò rursus duræ fiant, dolor erit aut in māmīs, aut in coxis, aut in oculis, aut in genibus, & non corrumpunt. **L IIII.** Quibus os vterorum durum est, his necesse est osculum vterorum clausum esse. **L V.** Quæcunque in vtero habentes, à febribus corripuntur, & fortiter attenuantur sine manifesta occasione, difficulter pariūt & periculosa, aut **B** abortum facientes periclitantur. **L VI.** In fluxu muliebri, conuulsio & animi deliquium si accedat, malum est. **L VII.** Mensibus pluribus prodeūtibz morbi fiunt, & non prodeuntibus, ab vtero morbi contingunt. **L VIII.** Ex intestino recto, & vtero inflāmato, vrinæ stillicidium accedit, & ex renibus suppuratis vrinæ stillicidiū accedit. Verūm ex hepate inflāmato, singultus accedit. **L IX.** Si mulier in ventre non concipit, velis autem scire an conceptura sit, vestimentis circūtectam ex infernis suffito. Et si quidem odor per corpus tibi procedere videatur ad nares & ad os, scito quòd ipsa non propter seipsam infœcunda est. **L X.** Si mulieri vterum gestati purgationes prodeunt, impossibile est foetum sanum esse. **L XI.** Si mulieri purgationes non prodeunt, neque horroze, neque febre accedente: verūm cibi fastidia ipsi accidunt, hanc in ventre habere existimato. **L XII.** Quæcunque frigidos ac densos vteros habent, non concipiunt: & quæcunq; humidos habent vteros, non concipiunt. Extinguitur enim in ipsis genitura. Et quæcunq; siccis magis & adustis. Præ inopia enim alimenti corrumpitur semen. Quæcunque verò ex vtrisque temperamentum habet moderatum, tales fœcundæ fiunt. **L XIII.** Similiter autem in masculis. Aut enim propter corporis raritatem, spiritus extra fertur, vt semen non deducat: aut propter densitatem, humor non procedit foras: aut propter frigiditatem non cōcalescit, vt ad hunc locum congregetur: aut propter caliditatem, hoc idem contingit. **L XIV.** Lac dare caput dolentibus, malum. Malum etiam febricitantibus, & quibus præcordia eleuata per
murmur

murmurantia, & siticulosus. Malum & quibus biliosa alui D
 egestiones in febribus acutis sunt, & quibus sanguinis multi
 egestio facta est. Conuenit autem exhibere tabescentibus,
 non valde multum febrientibus, & in febribus longis debi-
 libus, nullo ex prædictis signis præsentē, sed præter rationē
 consumptis. L X V. Quibus tumores in vlceribus appa-
 rent, non valde conuelluntur, neq; insaniunt. His autem de-
 repente dissipatis, retrorsum quidem conuulsiones & disten-
 siones fiunt: antrorsum verò, insanix, lateris dolores acuti,
 aut suppuratio, aut dysenteria, si rubicundi magis fuerint tu-
 mores. L X V I. Si in vulneribus fortibus ac prauis, tumor
 non appareat, magnum malum. L X V I I. Tumores laxi
 boni, crudi mali. L X V I I I. Dolenti posteriorem capitis E
 partem, vena recta in fronte secta prodest. L X I X. Rigo-
 res incipiunt, mulieribus quidem ex lumbis magis, & per dor-
 sum ad caput. Verum & viris magis posteriore corporis par-
 te quam anteriore, velut ex cubitis ac femoribus. Sed & cu-
 tis rara est. Indicat autem pilus. L X X. Qui à quartanis
 corripuntur, non ita valde à conuulsionibus corripuntur. Si
 verò prius corripiantur, & quartana insuper accedat, cessant.
 L X X I. Quibus cutis circuntenditur arida ac dura, hi si-
 ne sudore moriuntur: Quibus verò laxa ac rara, cum sudore
 moriuntur. L X X I I. Morbo regio laborantes, non ita
 valde flatuosi sunt.

S E C T I O S E X T A.

I N diuturnis intestinorum leuitatibus, ructus acidus acce-
 dens, qui prius non erat, signum bonum. I I. Quibus
 nares natura humidiores, & genitura humidior, morbosius
 sani sunt: quibus verò vice versa, salubrius. I I I. In longis
 intestinorū leuitatibus, cibi fastidiū malum, & cum febre pe-
 ius. I I I I. Vlcera circunglabra maligna sunt. V. Dolo-
 res in lateribus, & in pectoribus, & in aliis partibus, an mul-
 tum differunt, considerandum est. V I. Rhenū affectiones,
 & quæ circa vesicam cōsistunt, operosè sanantur in senibus.
 V I I. Dolores circa ventrem fientes, sublimes quidem
 leues sunt, non autem sublimes, fortiores. V I I I. Hy-
 dropicis fientia vlcera in corpore, non faciliè sanantur.
 I X. Latæ pustulæ non valde pruriginosæ sunt. X. Ca-
 put dolenti & circundolenti, pus, aut aqua, aut sanguis fluens
 per

A per nares, aut os, aut aures, soluit morbum. **xi.** Atrabiliaris, & Phreniticis, hæmorrhoides accedentes, bonum. **xii.** Hæmorrhoidas sananti diuturnas, si non vna seruata fuerit, periculum est hydropem aut tabem accedere. **xiii.** A singultu detento, sternutationes accedentes solunt singultum.

xiiii. Ab hydropse detento, ubi aqua in venis ad ventrem confluit, solutio fit. **xv.** A profluuiio alui longo correpto, vomitus sponte accedens, soluit alui profluuium.

xvi. A pleuritide aut peripneumonia occupato, alui profluuium accedens, malum. **xvii.** Lippientem alui profluuiio corripere, bonum. **xviii.** Vesicam dissectam habenti, aut cerebrum, aut cor, aut septum transversum, aut tenue ali-

B quod intestinum, aut ventriculum, aut hepar, lethale est.

xix. Vbi dissectum fuerit os, aut cartilago, aut nervus, aut genæ pars tenuis, aut præputium, neque augetur, neque coalescit. **xx.** Si in ventrem sanguis effusus fuerit præter naturam, necesse est suppurari. **xxi.** In insanientibus, varicibus aut hæmorrhoidibus accedentibus, insanix solutio fit.

xxii. Quicumque dolores ex dorso ad cubitos descendunt, venæ sectio soluit. **xxiii.** Si timor & tristitia multo tempore perseueret, atrabiliarium hoc signum est. **xxiiii.** Si ex intestinis tenuibus aliquod dissectum fuerit, non coalescit.

xxv. Item sacrum ab externis intro conuerti, non bonum: ab internis vero extra, bonum. **xxvi.** Quibus in fe-

C bribus ardentibus tremores facti fuerint, mentis emotio soluit. **xxvii.** Quicumque suppurati aut hydropici, secantur, aut vruntur, hi pure aut aqua acervata effluente omnino moriuntur. **xxviii.** Eunuchi non laborant podagra, neque calui fiunt. **xxix.** Mulier non laborat podagra, si non menses ipsi defecerint. **xxx.** Puer non laborat podagra, ante veris usum. **xxxi.** Oculorum dolores meri potus, aut balneum, aut fomentum, aut venæ sectio, aut medicamenti portio soluit. **xxxii.** Balbi ab alui profluuiio longo maxime corripiuntur. **xxxiii.** Acidum rusticum habentes, non ita valde pleuritici fiunt. **xxxiiii.** Quicumque calui sunt, his varices magnæ non fiunt. Quibuscunque vero caluis varices accedunt, hi rursus hirsuti sunt. **xxxv.** Hydropicis tussis accedens, malum. **xxxvi.** Urinæ difficultatem soluit venæ sectio. Secare vero oportet internas. **xxxvii.** Ab angina

Vv

detento

Hippocratis Liber

detento tumorem fieri foris in collo, bonū est. xxxviii. **D**
 Quibuscunq; occulti cancri fiunt, eos non curare melius est.
 Si enim curantur, citius moriuntur. Si verò nō curētur, mul-
 tum tempus perdurant. xxxix. Conuulsio fit aut à re-
 pletione, aut euacuatione. Sic autem & singultus. xl. Qui-
 buscunque citra præcordium dolores fiunt, absq; inflamma-
 tione, his febris accedens dolorem soluit. xli. Quibuf-
 cunq; suppuratum quid in corpore existens, significationem
 de se non præbet, his propter puris aut loci crassitudinem,
 sui significationem non exhibet. xlii. Morbo regio la-
 borantibus hepar durum fieri malum est. xliii. Qui-
 cunque splenici à dysenteria corripiuntur, his longa accedē-
 te dysenteria, aut hydrops accedit, aut intestinorū leuitas, & **E**
 pereunt. xliiii. Quibuscunque ex vrinæ stillicidio vol-
 uulus accedit, hi in septem diebus pereunt, si non febre acce-
 dente vrina satis fluxerit. xlv. Vlcera quæcunq; annua
 fiunt, aut diutius tempore durant, necesse est os abscedere,
 & cicatrices cauas fieri. xlvi. Quicunq; gibbosi ex an-
 helatione, aut tussi fiunt, ante pubertatē pereunt. xlvii.
 Quibuscunque venæ sectio, aut medicamentū conducit, his
 verē venam secare, aut medicamentum purgans exhibere
 conuenit. xlviii. Splenicis dysenteria accedens, bo-
 num. xlix. Quicunque podagrici morbi fiunt, hi sedata
 inflammatione, in quadraginta diebus restituuntur. l. Qui-
 bus cerebrum dissectum fuerit, his necesse est febrem, & bi-
 lis vomitum accedere. li. Quibuscunque sanis derepen- **F**
 tē dolores fiunt in capite, & statim voce intercepta iacent, ac
 stertunt, in septem diebus pereunt, si non febris apprehen-
 dat. lii. Considerare verò oportet etiam sub oculis ap-
 paritiones in somnis. Si enim albæ partis quid subapparue-
 rit non cōmissis palpebris, si id nō ex alui profluuiō, aut me-
 dicamenti potione fuerit, malum signum & valde lethale
 est. liii. Desipientiæ cum risu quidem fientes, securio-
 res sunt: cum studio verò serio, periculosiores. liiii. In
 acutis affectionibus, quæ cū febre fiunt, luctuosæ respiratio-
 nes, malum. lv. Podagricæ affectiones vere & autum-
 no vt plurimum mouentur. lvi. Atrabiliariis morbis
 periculosi humorū à loco ad locum decubitus, aut syderatio-
 nem corporis, aut conuulsionem, aut insaniam, aut cæcitatē

Atem significant. LVII. Syderationes verò maximè fiunt, ætate à quadragesimo anno vsque ad sexagesimum. LVIII.

Si omentum exciderit, necesse est putrefieri. LIX. Quibuscunq; à coxendicum morbo vexatis, coxa excidit, & rursus incidit, his mucii accedunt. LX. Quibuscunque à coxendicum morbo diuturno vexatis, coxa excidit, his crus tabescit, & claudicant, si non vsti fuerint.

SECTION SEPTIMA.

IN acutis morbis frigiditas extremarum partium, malum. I.

II. Ex osse ægrotante, caro liuida, malum. III. Ex vomitu singultus, & oculi rubicundi, malum. IIII. Ex

B sudore horror, non bonum. V. Ex infania, dysenteria, aut hydrops, aut mentis emotio, bonum. VI. In morbo diuturno cibi fastidiū, & meracæ alui egestiones, malum. VII.

Ex multo potu rigor, & delyrium, malum. VIII. Ex tuberculi intus ruptione, exolutio, vomitus, & animi deliquiū fit. IX. Ex sanguinis fluxu delyrium, aut etiā conuulsio, malum. X. Ex voluulo vomitus, aut singultus, aut conuulsio, aut delyrium, malum. XI. Ex pleuritide peripneumonia, malum. XII. Ex peripneumonia phrenitis, malum.

XIII. Ex ardoribus vehemētibus conuulsio, aut distentio, malum. XIIII. Ex plaga in caput, stupor, aut delyriū, malum. XV. Ex sanguinis sputo, puris sputum, malum.

XVI. Ex puris sputo, tabes, & fluxus, malum. Postquā verò sputum supprimitur, moriuntur. XVII. Ex hepatis inflammatione singultus, malum. XVIII. Ex vigilia cōuulsio, aut delyriū, malum. XIX. Ex ossis denudatione, ignis sacer. XX. Ex igne sacro, putrefactio, aut suppuratio.

XXI. Ex forti pulsu in vlceribus, sanguinis eruptio.

XXII. Ex dolore diuturno partium circa ventrem, suppuratio. XXIII. Ex meraca alui egestione, dysenteria.

XXIIII. Ex ossis dissectione delyrium, si ad vacuum vsque processerit. XXV. Ex medicamento potione conuulsio, lethale. XXVI. Ex dolore forti partium circa ventrem, frigiditas extremarum partium, malum. XXVII. Mulieri vterum gerenti, tenesmus accedens abortire facit. XXVIII.

Quodcunque os præsectum fuerit, aut neruus, in corpore, neque augetur, neque coalescit. XXIX. Si à pituita alba

Hippocratis Liber

detento, vehemens alui profluuium accedat, soluit morbum. **D**

xxx. Quibuscunque spumosa alui egestionis sunt in alui profluuiis, his de capite pituita defluit. **xxxi.** Quibuscunque febricitantibus, in vrinis subsidientia crassiores potentia partes referentes sunt, longum morbum significant.

xxxii. Quibus vero biliosa subsidientia, ab initio tenues, acutum morbum significant. **xxxiii.** Quibuscunque disparata vrina sunt, his vehemens turbatio in corpore est. **xxxiiii.** Quibus in vrinis bullae superstant, rhenum affectiones significant, & morbum fore longum. **xxxv.**

Quibus pingue est id quod superstat, & aceruatum, his rhenum affectiones, easque acutas significat. **xxxvi.** Quibus vero iam nephriticis ex rhenibus affectis praedicta signa **E** accidunt, doloresque circa musculos spinales fiunt, si quidem circa externos locos fiant, etiam abscessus extrinsecus futuros expecta. Si vero dolores magis circa internos locos fiant, etiam abscessus magis intus fore expecta. **xxxvii.** Quicunque sanguinem vomunt, sine febre quidem, salutare est: verum cum febre, malum, Perfrigerantibus autem & adstringentibus curare oportet. **xxxviii.** Defluxiones in ventrem supernum, in viginti diebus suppurantur. **xxxix.**

Si quis sanguinem mingat, & grumos, & vrinae stillicidium habeat, & dolor incidat in ani ac scroti intercapedinem, & imum ventrem ac pectinem, partes circa vesicam agrotare significat. **xl.** Si lingua derepente impotens **F** fiat, aut aliqua corporis pars syderata, atrabiliarium tale existit. **xli.** Si senioribus nimium purgatis singultus accedat, non bonum est. **xlii.** Si febris non a bile habeat, aqua multa calida in caput affusa, febris solutio fit. **xliii.**

Mulier ambidextra non est. **xliiii.** Quicunque suppurati vruntur, si quidem pus purum fluat & album, euadunt. Si vero subcruentum, & carnosum, ac graueolens, pereunt. **xlv.** Quicunque hepar suppuratum vruntur, si quidem pus purum fluat, & album, superstites euadunt. In tunica enim pus his inest. Si vero velut amurca fluat, pereunt. **xlvi.** In doloribus oculorum, ubi merum bibendum dedisti, & multa calida lauisti, venam secato. **xlvii.**

Hydropicum si tussis vexat, desperatus est. **xlviii.**

Vrinae stillicidium, & vrinae difficultatem, vini potus & venae

A venæ sectio soluit. Secare verò oportet internas.

XLIX. Ab angina detento, tumor & rubor in pectore accedens, bonū. Foras enim vertitur morbus. **L.** Quibuscunque corruptum fuerit cerebrum, in tribus diebus pereunt. Si verò has effugerint, sani fiunt. **LI.** Sternutatio fit ex capite, percalescente cerebro, aut vacuo quod est in capite perhumefcente. Aer enim qui intus est, foras erumpit. Strepitum verò edit, quia transitus est ipsi per angustum.

LII. Quibuscunque hepar circumcirca dolet, his febris accedens soluit dolorem. **LIII.** Quibuscunque sanguinem de venis auferre conducit, his verè venam secare conuenit.

LIIII. Quibus inter vētrem & septum transuersum pituita conclusa est, & dolorem exhibet, nō habens exitum ad neutrum ventrem, his per venas ad vesicam cōuersa pituita, morbi solutio fit. **LV.** Quibus hepar aqua repletum, ad omentum eruperit, his venter aqua impletur, & moriuntur.

LVI. Anxietatem, oscitationem, horrorem, vinum æ quali mensura aquæ ammixta potum soluit.

LVII. Quibus in vrinaria fistula tubercula fiunt, his supuratione facta & eruptione, soluitur dolor. **LVIII.** Quibus cerebrū concussū fuerit ex aliqua causa, eos statim voce priuari necesse est.

LIX. Corporibus humiditas carnes habentibus, famem inducere oportet, fames enim corpora ficcet. **LX.** Vbi in toto corpore mutationes, & corpus perfrigeratur, & rursus calescit, aut color alius ex alio mutatur, longitudinem morbi significat. **LXI.** Sudor multus calidus aut frigidus, semper fluens, humorem abducere oportere significat, forti quidem supernè, debili verò, infernè.

LXII. Febres non intermittentes, si per tertiam fortiores fiant, periculosa sunt. Quocunque verò modo intermiserint, sine periculo esse significat. **LXIII.** Quibus febres longæ sunt, his aut tubercula, aut ad articulos dolores fiunt.

LXIIII. Quibus tubercula diutina, aut ad articulos dolores, ex febribus fiunt, hi cibis pluribus vtuntur.

LXV. Si quis febricitanti cibum det, quem sano exhibet, sano quidem robur, a groto verò morbus est.

LXVI. Quæ per vesicam prodeunt inspicere oportet, an qualia sanis prodeūt. Quæ igitur minimè similia his sunt ea morbosiora sunt. Quæ verò similia sanis, ea minimè morbo-

Hippocratis Liber

LXVII. Et quibus alui egestionibus, si stare permiseris, & **D** non moueris, subsistunt veluti ramenta: si paucae fuerint, modicus morbus est: si multae, multus. His confert subpurgare aluum. Si verò non purgata aluo, sorbitiones dederis, laedes, & quanto plures dederis, magis laedes. **LXVIII.** Quibuscunque cruda deorsum secedunt, ex atra bile sunt: si plura copiosiore: si pauciora pauciore. **LXIX.** Excreationes in febribus non intermittentibus liuidae, & cruentae, & graeolentes, & biliosae, omnes malae sunt. At probe secedentes, bonae, & per aluum, & per vesicam, & ubi sanè quid secedens constiterit non purgatum, malum. **LXX.** Corpora quocunque quis purgare voluerit, fluida facere oportet. Et si quidem sursum, sistere aluum. Si verò deorsum, humectare.

LXXI. Somnus, vigilia, utraq; modum excedentia, morbus. **E**

LXXII. In non intermittentibus febribus, si externae quidem partes frigidae fuerint, internae verò ardeant, & febris habeat, lethale est. **LXXIII.** In febre non intermittente, si labium, aut nasus, aut oculus, aut supercilium distorqueatur: aut non videat, aut non audiat, aeger iam debilis existens: quicquid horum fiat, propinqua mors est.

LXXIIII. Ex pituita alba, hydrops accedit. **LXXV.** Ab alui profluuiio, dysenteria. **LXXVI.** A dysenteria, intestinum leuitas accedit. **LXXVII.** Ex corruptione, abscessus ossis. **LXXVIII.** Ex sanguinis vomitu, tabes, & puris purgatio sursum. Ex tabe, fluxus ex capite. Ex fluxu, alui profluuium, ex alui profluuiio, suppressio purgationis sursum ver- **F** fus, ex suppressione, mors. **LXXIX.** Qualia etiam sunt in vesicae ac alui egestionibus, inspicere oportet, & in his quae per carnes excernuntur, & sicubi alibi à natura recedat corpus, si parum, parvus est morbus: si multum, multus: Si verò valde multus sit recessus, lethale hoc est. **LXXX.** Quicunque supra quadraginta annos phrenitici fiunt, non ita valde sani fiunt. Minus enim periclitantur, quorum naturae, & aetati, morbus affinis fuerit. **LXXXI.** Quibuscunque in agitudine oculi ex voluntate lachrymantur, bonum. Quibus verò citra voluntatem, malum. **LXXXII.** Quibus in febribus quartanis sanguis ex naribus fluxerit, malum est. **LXXXIII.** Sudores in diebus iudicatoriis fientes, vehementes & veloces periculosi sunt, qui expelluntur ex fronte velut guttae, &

A guttæ, & aquæ salientes, & frigidi valde ac multi. Neceſſe eſt enim talem ſudorem prodire cum violentia, & doloris exceſſu, ac expreſſione diuturna. LXXXIIII. Ex morbo diuturno, etiam alui deſluxus, malum. LXXXV. Quæcun- que non ſanant medicamenta, ea ferrum ſanat. Quæ ferrum non ſanat, ea ignis ſanat. Quæ ignis non ſanat, ea incurabi- lia putare oportet.

HIPPOCRATIS

COI EPISTOLAE, IANO

B CORNARIO MEDICO

PHYSICO IN-

TERPRETE.



Rex regum magnus Artaxerxes, Peto gaudium.



C

Orbus pestilens appellatus, inuasit exercitus nostros: & quum nos sæpe multa fecerimus, nihil adhuc remiſit. Quare magnopere, & per omnia tibi à me data dona, te rogo, vt aut aliquid ex natura tua excogitatum, aut aliquam ex arte actionem, aut aliquod alterius viri mederi poten- tis conſilium, celerrimè ad nos mit- tas. Propulſa oro hoc malum. Multa enim anxietas populum corripuit, quæ ſpiritum magnū ac denſum habet. Non bel- ligerantes debellamur: quum hoſtem habeamus beſtiam il- lam ouilia deuaſtantem. Sauciauit multos: agrè curabiles fecit: amara ſpicula immittit. Conſilij inops ſum. Non am- plius habeo quod cum viris natura prudentibus conſulem. Solue hæc omnia, neq; nos bono tuo conſilio deſtituas. Vale.

Petus, Regi regum magno Artaxerxe gaudium.

Naturalia auxilia peſtilentis morbi popularem graſſa- tionem non ſoluunt. Qui enim ex natura ſunt mor-

Vv + bi;

Hippocratis

Hippocratis laus.

bi: eos ipsa natura iudicās sanat. Qui verò ex populari grassa D
tione: eos ars curat, artificiose iudicans corporum mutatio-
nem. Hippocrates autem medicus curat hoc malum. Et ge-
nere quidem est Dorienſis: ex ciuitate verò Co, patre Hera-
clida, qui filius fuit Hippocratis, qui Gnoſidici, qui Nebri,
qui Soſtrati, qui Theodori, qui Cleomittada, qui Chriſami-
dis. Hic diuina natura præditus eſt, & ex paruis ac vulgari-
bus ad magna ac artiſicioſa, medicinam euexit. Eſt igitur di-
uinus Hippocrates nonus quidē à Chriſamide rege: decim⁹
autem & octauus ab Aeſculapio: vigefimus verò à Ioue: ex
matre verò Praxithea Phænaretis filia, ex familia Heraclida-
rum. Quare ex vtroque ſemine à diis ortum habet diuinus
Hippocrates: vt qui à patre quidem Aſclepiades eſt, à matre E
verò Heraclides. Didicit autem artem, tum à patre Heracli-
da, tum ab auo Hippocrate. Verum ab his quidem primū,
velut veriſimile eſt, in re medica initiatus eſt, quantum ſanè
credibile eſt hos nouiſſe. Vniuerſam vero artē ipſe ſeipſum
docuit, diuina natura uſus, & in tantum animi induſtria pro-
genitores tranſgreſſus, quantum etiam artis præſtantia eoſ-
dem ſuperauit. Tollit autem non beſtiarum genus, ſed fero-
rum ac agreſtium morborum, per magnam terræ ac maris
partem Aeſculapij auxilia, quemadmodum Triptolemus
Cereris ſemina diſpergens. Proinde iuſtiſſimè in multis ter-
ræ locis diuinos honores etiam ipſe cōſequutus eſt, & iſdem
donariis cū Hercule & Aeſculapio ab Athenienſibus dignus F
factus eſt. Hunc ipſum accerſe, & auri atque argenti quātum
voluerit, ipſi dare iube. Hic enim non vnum modum cura-
tionis huius morbi nouit. Hic eſt ſanitatis pater, hic ſeruā-
tor, hic dolorum curator. In ſumma, hic diuinæ ſciētiae prin-
ceps eſt. Vale.

*Rex regum magnus Artaxerxes, Hyſtani-
di Hellespontis præfecto.*

Hippocratis medici Coi ab Aeſculapio originem ducen-
tis, gloria artis etiam ad me peruenit. Dato igitur ipſi
auri quantum voluerit, & reliqua abundè, quibus opus habet
& ipſum ad nos mittito. Nam optimatibus Perſarum æqua-
liſerit. Et ſi quis alius bonus vir eſt in Europa, cum domus
regiæ

A regia amicum facito, nihil diuitiis parcens. Viros enim inuenire, qui consilio præstent, non est facile. Vale.

*Hystanis Helleponti præfectus, Hippocrati ex
Asclepiadis prognato gaudium.*

Magnus rex Artaxerxes te opus habet, & misit ad nos præfectos, iubens tibi argentum & aurum, & reliqua quibus opus habes, & quæcunque voles, dare, & breui ad se mittere. Fore enim te optimatibus Persarum æqualem. Tu itaque cito adsis. Vale.

Hippocrates medicus, Hystanidi Helleponti præfecto gaudium.

B Ad epistolam quam misisti, à Rege venisse adferens, remitte Regi quæ dico, quàm celerrimè scribens: Quòd & victu, & vestitu, & domo, & omni ad vitam sufficienti opulentia fruimur. Persarum autem diuitiis uti, fas mihi nō est: neque barbaros homines à morbis liberare, qui hostes sunt Græcorum. Vale.

Hippocrates Demetrio sanitatem.

Persarum rex nos accersuit, ignarus quòd apud me maior est sapientiæ ratio, quàm auri. Vale.

C *Regi regum meo magno domino Artaxerxe, Hystanis Helleponti præfectus gaudium.*

Quam misisti epistolam, iubēs demittere ad Hippocratem Coum ab Aesculapio originem ducentem, demissi. Sed & ab ipso responsum tuli, quod scriptum tradidit, & ad domum tuam transmittere iussit. Iraque eius latorem ac nuncium Gymnasben Dieutythen ad te misi. Vale.

Rex regum magnus Artaxerxes Cois hæc dicit.

Date meis nunciis Hippocratē medicum malignis moribus præditum, & in me, & in Persas petulanter se gerentem. Sin minus, cognoscetis, etiam primi peccati pœnam vos daturos esse. Urbem enim vestram deuastatam, & insulam distractam, in pelagus conuertam, ut in posterum tempus nemo sciat, an in hoc loco fuerit insula, aut vrbs Cos.

Vv 5 Coorum

Hippocratis

Coorum responsum.

D

Visum est populo, respondere nuntiis ab Artaxerxe missis. Coi nihil indignum facient, neque Merope, neque Hercule, neque Aesculapio. Quapropter omnes ciues nō dabunt Hippocratem, etiam si pessima morte sint interituri. Nam quum Darius & Xerxes epistolas scripserint, & terram ac aquam à patribus nostris petiuerint, populus non dedit: quum eos ipsos se impetentes, similiter velut alios homines, mortales esse videret. Et nunc idem responsum dat. A Cois discedite: quoniam Hippocratem in manus vestras nō dant. Renuntiate igitur ipsi vos nuntij, quòd neque dei ipsi, nostri negligentes erunt.

Senatus populusq³ Abderitarum Hippocrati gaudium.

E

Nunc maximè vrbi nostræ in periculo versatur vir noster, ô Hippocrates, qui & præsenti tempore & futuro semper gloria vrbi sperabatur. Neq; nunc, ô vos dei omnes, nobis inuideatur, hic præ multa quæ detinet ipsum sapientia ægrotat, vt timor non vulgaris sit, si Democritus mente motus fuerit, reuera urbem nostram Abderitarum pessum ituram esse. Etenim oblitus omnium, & primùm sui ipsius, vigilans & noctu & interdiu, & singula parua ac magna deridens, & totam vitam nihil esse putans, vitam transigit. Ducit aliquis vxorem, alius mercaturam exercet, alius concionatur, alius imperat, alius legatum agit, eligitur, abrogatur, ægrotat, vulneratur, moritur. At hic ridet omnia, dum alios mœstos ac tristes, alios gaudentes videt. Quin & de his, quæ apud inferos sunt, hic vir perscrutatur, & hæc scribit, Et idolis aerem plenum esse dicit. Et volucrum voces intentis aurbus explorat. Et sæpe noctu exurgēs, solus cantilenas sensim canenti similis est. Et se aliquando in rerum immensitatem proficisci dicit, & Democritos esse similes sub ipsi innumerabiles. Et corpus vnà cum mente corrumpens viuit, hæc timeamus ô Hippocrates, ob hæc perturbati sumus. Quapropter nos serua, & patriæ nostræ cōsulturus cito ad sis: neq; nos contempseris. Nam neq; ita viles sumus: & in nobis testimoniū situm est. Ob ipsum enim conseruatum, & gloriam, & pecunias,

F

Anias, & doctrinæ famā consequeris: quanquam doctrinæ ratio multo potior apud te est, quàm fortunæ. Attamen & huius bona multa ac luculenta tibi à vobis obuenient. Et enim animæ Democriti gratia, etiam si vrbs aurum esset nō nostræ voluntati responderet, aut quacunque tandem re illi carendum esset. Leges nostras putamus ægrotare ô Hippocrates, leges præuaricari. Adsis optime vir, curaturus virum insignem. Non medicus. sed conditor, sacrationem tota Ionia murum nobis circundabis. Ciuitatem, non virum curabis: & Senatum ægrotantem, & ne claudatur periclitantē, aperies. Ipse legislator, ipse iudex, ipse princeps, ipse seruator, & horū artifex aduenies. Ob hæc te exspectamus ô Hippocrates, atque hæc etiā fient vbi veneris. Vna ciuitas nō ignobilis, imò tota Græcia rogat te, serua corpus sapientiæ. **Q**uin potius ipsam apud te legationem agere puta doctrinā, ab hac præuaricatione liberari supplicantem. Cognata equidem res est omnibus, velut apparet, sapientia. Verùm his qui propius ipsam complexi sunt, velut nobis, etiam longè amplius. Et, sicut probè nosti, gratificaberis etiam futuro seculo, si nō destitueris Democritū propter veritatem, cuius primas se ratum esse sperat. Tu enim & genere, & arte coniunctus es Aesculapio. Hic verò Herculis est ex fratre nepos. A quo est & Abderus, quemadmodum omnino audiuiisti, cuius cognomē vrbs nostra refert. Quare etiam illi grata fuerit Democriti sanatio. **Q**uum igitur videas ô Hippocrates, & populum, & virum insignem, ad stupiditatem diffluentem: festina, rogamus, ad nos. Heu vt etiam bona redundantia morbi existunt. Quantum enim Democritus ad summam sapientiam generose peruenit, tantum nunc pariter periclitatur, ne mentis stupore & stoliditate affligatur. At reliquum vulgus Abderitarum, quod mansit absque eruditione, communem sanē sensum habet. Imò nunc prudentiores sunt ad sapientis morbum iudicandum, qui prius desipuerunt. Adsis igitur cum Aesculapio patre. Adsis cum Herculis filia Epione. Adsis cum Aesculapij filiis, qui ad Ilium militarunt. Adsis nunc prœonias adferens morbi medelas. Nunc terra radicibus, & herbis, & auxiliariis floribus, insanixque medicamentis fœcunda est. Fermè igitur nunquam fertilius producent, neque terra, neque montium cacumina, quàm nunc profer

Hippocratis

proferunt ea, quæ pertinent ad Democriti sanitatem. Vale. D

Hippocrates Senatui populoque Abderitarum gaudium.

Cuis vester Amelessagoras venit in Co, & erat tunc in illa die Virgæ assumptio, & annua festiuitas, ac publicus, velut nostis, cōuentus, & pompa sumptuosa fiebat, quā mos est eos, qui deo dicati sunt, ad Cyparissum deducere. Quādoquidem autē & ex verbis, & ex aspectu, Amelessagoras festinare videbatur, credens, velut erat, rem ipsam vrgere epistolā vestram legi, & admiratus sum quod ob vnum hominē velut si vnus homo esset ipsa ciuitas, turbati estis. Et beati profectō sunt populi, qui sciunt bonos viros sua esse munimēta, & non E turre, neq; muros, sed sapientium virorū sapientia consilia. Ego verō, qui credo atque quidē esse Deorum dona, homines autē naturæ opera (& ne agrē feratis viri Abderitæ) non vos puto, sed ipsam naturam me vocare, ad conseruandum ipsius opus, quod periclitatur, ne præ morbo collabāt. Quare præ vobis ego nunc, naturæ ac Diis obediens, festino agrotatē Democritū sanare: si quidē sanē & hoc morbus est, & non potius error vobis tenebras offundit: id quod opto, atque vtinā sit hæc vberius vestræ benevolentia, signū. q̃ etiam ad suspicionem turbamini. Argentū autem mihi venienti, neq; natura, neq; Deus promittere poterit. Quare neq; vos viri Abderitæ cogatis: sed liberæ artis etiam opera libera esse sinatis. Qui verō mercedē capiunt, hi scientias seruire cogunt, velut F captiuas faciētes ipsas ex priore libertate. Deinde, velut veri simile est, mētiri etiā poterint, velut de magno morbo: & negarint, velut de paruo: & polliciti nō venerint, & rursus venerint nō vocati. Misera est profectō humana vita: qm̃ per totam ipsam intolerabilis auaritia, velut hybernus vētus, distributa est ac penetrauit. Ad quam vtinā potius omnes medici cōuenissent, quō grauiorem insania morbum curarent: quoniā quum morbus sit, & affligat, etiā laudatur. Ego verō arbitror etiam animæ morbos omnes vehementes esse insanias, quæ opiniones quasdam ac imaginationes rationi inducunt. A quibus qui per virtutem depurgatus est, sanus euadit. Quod si ego omnino ditescere voluissem, viri Abderitæ, non utiq; decem talentorū gratia ad vos proficiscerer: sed ad
Magnum

- A** Magnū accessissem Persarū regem, vbi totæ ciuitates humanis opibus refertæ mihi obtigissent: sanassem autē illic ipsorum pestem. Verū denegaui, inimicam Græciæ regionem à malo morbo me velle liberare. Et ego, quantum in me fuisset, Barbaros expugnassem. Habuissem autē ignominia ipsas à rege diuitias, & opulentiam patriæ inimicā. Hæc verò mihi adfuissent, velut ei qui vrbium Græciæ deuastator esset. Non sunt diuitiæ, vndiquaq; lucrari. Magna enim sunt sacra virtutis, quæ à iustitia non occultantur, sed manifesta existunt. Aut nō æquale peccatum esse putatis, hostes seruare, & amicos mercede sanare? At non hoc modo se res nostræ habent, o Abderitæ. Non capio fructum ex morbis, neq; libenter audiui Democritum mente motum esse. Qui siue sanus est, amicus est: siue ægrotat, curatus magis amicus erit. Audio autem ipsam grauib; ac solidis moribus præditum esse, & vrbis vestræ ornamentum. Valete.

Hippocrates Philopœmeni gaudium.

- L** Egati, qui vrbis epistolā mihi reddiderūt, etiā tuā tradiderunt. Et valde gauisus sum, & hospitium, & reliquū vitū te promittente. Veniemus autē bona fortuna, & meliore spe, velut arbitramur, accedemus, prout in literis est declaratum: quum nō insaniā: sed quandā excellentē mentis sanitatem vir ille declaret, dum neq; liberorū, neq; vxoris, neq; cognatorū, neq; res familiaris, neq; omnino alicuius curam gerit: sed & diu & noctu apud seipsum cōsistit, & priuatim vitā degit, plerunq; in antris & solitudinibus, aut sub arborū vmbis, aut in mollibus herbis, aut apud frequētia aquarū fluenta. Contingunt igitur talia plerunq; atra bile percitis. Taciturni enim aliquādo sunt, & solitarij, ac deserti amātes, & rerū familiariū cōspectū auersantur, alienū putātes. Nec verò dissimile vero est, etiā his qui circa disciplinas versantur ab vna erga sapientiā adfectione, alias curas exclusas esse. Quēadmodū enim famuli ac ancillæ in domibus tumultuātes, & seditionē agentes, vbi derepente ipsis hera cōparuit, consternati cōquiescunt: sic etiā reliquæ in anima cupiditates malorum sunt hominibus ministræ. Postquā autē sapiētiæ cōspectus seipsum ingesserit: reliquæ affectiones velut famulæ discedunt. Non autē omnino insani antra & quietē experūt: sed

Hippocratis

sed etiā hi qui humana negotia contemnunt, ob tranquillitatis cupiditatē. Quum enim mens ab externis curis vexata, corpus reficere voluerit, tūc cito ipsum quieti tradit. Deinde recta exurgens, circūcirca veritatis regionē collustrat, in qua non est pater, nō mater, non vxor, non liberi, non frater, non cognati, non famuli, non fortuna, non omnino quicquam ex his, quæ tumultū inducunt. Omnia autē perturbātia, exclusa stant prae timore: & neq; appropinquare audēt prae reuerentia eorū, quæ isthic habitāt. Habitant autē illam regionē, & artes, & virtutes omnis generis, & Dei, & dæmones, & senatus, & consilia. Et magnus polus in illa regione, stellis multū mobilibus coronatus est: in quam fortassis etiā Democritus prae sapiētia trāsmigrauit. Deinde quum nō videat amplius eos qui sunt in vrbe, vtpote procul profectus: insanix morbo laborare putatur, propter solitudinis amorē. Student autem Abderitæ argenti amorem & studium detegere, & in se manifestum facere, eo quod Democritum non intelligunt. At tu hospitium nobis ò amice Philopœmen præpara. Non enim volo perturbatę vrbi molestiam exhibere, quum veterem te proprium hospitem, velut nosti, habeam. Vale.

Hippocrates Dyonisiō gaudium.

A Ut in Halicarnasso me expecta, aut ipse ad me venire ò amice festina. Per summā enim necessitatē abeundum est mihi in Abderam, Democriti caussa, ad quē ægrotantem vrbs me accersuit. Caterū admiranda est hominū, ò Diony, si, per cōsensum adfectio: velut vna anima cū ciue coægrotāt. Quare mihi videtur etiā ipsi curatione opus habere. Ego verò neq; morbū ipsum esse puto, sed immodicam doctrinam: quæ reuera nō est immodica, sed ab idiotis putatur. Nā nunquam nociua est virtus immodica. Excellentia verò, morbi opinionē de se præbet, propter iudicantiū imperitiā. Vnufquisq; enim ex his, quæ ipse nō habet, iudicat, id quod in alio abundat, superfluū esse. Sic sanē etiā timidus fortitudinē immodestiā putat, & avarus magnanimitatē. Et omnis defectus, virtutis moderationē excedere putatur. Illū igitur vbi viderimus, cū prænotione hinc contingente, & vbi sermones eius audiuerimus: melius cognoscemus. Tu verò, ò Dionysi, studio habe vt ipse accedas. Volo enim te in patria mea cōmorari

Arari donec rediero:quo & rerum nostrarum,& in primis vrbis nostræ curâ geras. Nam haud scio, quomodo ex casu contigit, vt saluber sit annus,& pristinam naturâ habeat. Quare neq; multi infestabūt morbi:attamē venito, Inhabitabis autem meam domum nimis quàm opportunā, nimirū quum & vxor apud parētes maneat propter meam profectiōem. Attamen & illius res inspecta, quo pudicē degat, & non ob viri absentia alios viros approbet. Honeſta equidem ab initio fuit,& parentes bonos habuit. Patrē autem mirificē virilem,& malos valde odio habentem, egregiē senem. Attamē semper opus habet mulier moderatore. Habet enim à natura in se lasciniam:quæ,nisi quotidie refecetur, velut arbores in materia multæ effusionem,exuberat. Ego verò amicum parentibus diligentiorē puto ad vxorē custodiendā. Non enim, velut illis, etiam huic cohabitat beneuolentiæ adfectio,per quam sæpe vmbra admonitioni obtenditur. In omnibus autem rebus prudentior est alienitas ab adfectione,vt quæ minimè à beneuolentia infringatur. Vale.

Hippocrates Damageto gaudium.

Qum apud te Rhodi essem Damagete, vidi nauē illam cui solis inscriptio erat,penitus pulchram, & in puppi probè instructam,& sufficientem carinam habentem. Habebat & trāstra multa. Et tu laudabas etiam in ipsa nauigandi præstatiā, q̃ velox esset,& tuta,& ad inseruiēdum artificiosa. Et insuper prædicabas probū in ipsa nauigatiōis cursum.

C Hāc mitte nobis:verū si fieri potest,non remis, sed alis ad remigium instructā. Vrget enim res ipsa ò amice, vt valde cito in Abderā nauigē. Volo enim ægrotantē curare vrbē, propter vnum ægrotantem Democritum, si vnquam viri fama ad aures tuas peruenit. De hoc patria dicit,quòd insania afflictus sit. Ego autē cupio;imò magis opto,non reuera ipsum insanire, sed illos ita putare. Ridet, inquit, semper, & ridere nō cessat in oībus negotiis. Et hoc ipsis insaniæ signū esse videtur. Quare tuis in Rhodō amicis dicito, vt semp moderatē segerāt, & nō multū rideant, neq; multū tristes sint: sed inter ambo hæc modū teneant, vt aliis comis esse videaris, aliis sollicitus, de virtute cogitās. Est pfectō mali quiddā dū ad singula ille ridet. Si enī immodestia malū est:ea sanè ppetua

Hippocratis

tua longè peior est. Et dicam sanè ad ipsum: Democrite, & si **D** quis ægrotat, & occiditur, & mortuus est, & obsidetur, & quoduis malum ingruit: singula quæ fiunt, materiam risus tibi præbent. Nō autē repugnas deo, si, quum duo sint in mundo, Gaudium & Tristitia, tu alterum ipsorū eiecisti? Beatus profectò fueris (Verū impossibile est) si neque mater tibi ægrotat, neq; pater, neq; postea liberi, aut vxor, aut amicus, sed propter tuum risum conseruantur, penitus felix es. At si dum ægrotant, rides: dum moriūtur, gaudes: & si quid mali audieris, exhilararis: pessimus es ó Democrite, & procul sanè à sapientia. Si verò putas hæc ipsa neq; mala esse, certè atra bile percitus es Democrite, periclitans ne & ipse Abderita sis, prudentior autē sit ipsa ciuitas. Caterū de his exa- **E**ctius illic dicemus Damagete. At verò nauis etiam hoc tempus, quo hæc tibi scribo, remoratur. Vale.

Hippocrates Philopœmeni gaudium.

COgitans ac sollicitus de Democrito, illa ipsa nocte dormiens, sub ipsius auroræ initium somniū mihi oblatū habui, ex quo puto nihil valde periculosi fore. Mirabiliter enim expergefactus sum. Videbar mihi videre Aesculapiū ipsum corā, & iā ad ipsas Abderitarū portas aderamus. Aesculapius autem non vt imagines eum aliās ostendunt, mitis ac blandus apparebat: sed habitu concitato, & aspectu horrendo. Sequebantur autē ipsum dracones reptilium generis im- **F**manes, longum tractū ducentes, & horribile quiddam velut in desertis ac saltibus subsibilantes. Sequebantur & socij, pyxides medicamentarias probè obsignatas gestantes. Deinde porrexit mihi manum deus: quam vbi libētissimè apprehendissem, rogabā vt simul mecū peregeret, & ne me in medendo destitueret. Verū is: Nihil, inquit, in præsens me opus habes: sed hæc immortalī ac mortaliū communis dea te peregrinū deducet. Et ego cōuersus video mulierē pulchram ac magnā, simpliciter ornatā, splēdidam, cuius oculorū circuli puro lumine micabāt, vt stellarū fulgorē putares. Et de⁹ quidem disparuit. Mulier verò illa apprehēsū ne manu, lento gradu benigniter per urbē ducebat. Et vbi prope domū essemus, in qua hospitīū mihi paratū esse putabā, velut spectrū disparuit, hoc saltem dicens: Cras te apud Democritum de-
prehen

Aprehendam. Cū verò iam se illa cōuerteret: Rogo, inquā, opti-
ma fœmina, quānā es, & quo nomine vocari debes? Veritas,
inquit illa. Cæterū quē accedentē vides (& derepentē altera
quædā mihi apparuit) neq; ipsa mala videtur, audacior autē
aspectu & concitatio: Opinio, inquit, appellatur, & habitat
apud Abderitas. Ego igitur vbi de somno surrexissem, mihi-
ipsi somnium interpretatus sum, quòd non indigeret medi-
co Democritus, quando sanè ipse medendi Deus discessisset,
velut qui medendi occasionem & materiam nō haberet, Sed
ipsa quidem veritas, quòd Democritus sanus sit, apud Demo-
critum manet. Opinio verò, quòd Democritus ægrotet, reue-
ra apud Abderitas habitat. Atq; hæc vera esse, mi Philopœ-
Bmen, credo, & sunt sanè. Et non contemno somnia, maximè
vbi etiam ordinem conseruant. Medicina autem & vaticina-
tio valde cognatæ sunt: quandoquidem & pater ambarū ar-
tiū vnus est Apollo progenitor noster, & præsentēs & futuros
morbos prædicens, & ægrotos & ægrotaturos sanans. Vale.

Hippocrates Crateuæ gaudium.

Scio te, ò amice, optimum radicifecam esse, & propter
tuam ipsius exercitationem, & propter progenitorū glo-
riam, adeò vt in hac facultate Crateuæ proauo minimè ce-
das. Proinde nunc, si vnquā aliàs, herbas collige, quot & qua-
les poteris: vrget enim necessitas: atq; has mihi trans mitte,
Cad virum toti ciuitati cōparandum, Abderitam quidem ve-
rum Democritum. Aegrotare enim ipsum dicunt, & purga-
tione valde opus habere, vt qui infania sit correptus. Non
vtemur fortassis medicamentis, quemadmodum etiā credo.
Attamen vndiquaque instructum esse oportet. At verò rem
herbariam apud te saepe admiratus sum, quemadmodum
etiam vniuersorum naturam ac constitutionē, & facerrimū
terræ fundamentum, ex qua animalia, & plantæ, & alimēta,
& medicamēta, & fortuna, & ipsæ diuitiæ exoriuntur. Ne-
que enim aliàs haberet vbi cōsisteret Auaritia, neq; sanè Ab-
deritæ nunc decem talentis inescassent me, pro medico mer-
cenarium declarantes. Si verò possis Crateua amaram aua-
ritiæ radicem exscindere, vt nullæ ipsius reliquiæ restent,
probè scito, quod hominum vnā cum corporibus etiam ani-
mas ægrotantes purgassetus. At hæc quidem vota sunt. Tu

X x

verò

verò, quod fieri potest, nobis mōtanas maximè & in altis col
libus nascentes herbas radicitus refeca. Sunt enim aquosiori
bus solidiores & acriores, propter terræ densitatem, & aeris
tenuitatem. Nam quod attrahunt, frigidius est. Conare ta
men vt etiam de his quæ circa stagna nascuntur, & de palu
stribus, & fluuiatilibus, aut fontanis flores colligas: quas sa
nè debiles, & exolutas ac dulcis succi esse scio. Omnia autem
medicamenta quæ succi & liquores fluidi sunt, in vitreis va
sis ferantur: quæ verò folia, aut flores, aut radices sunt in ficti
libus nouis probè obturatis: vt ne ventis perflata, medica
menti vigorem velut in animi deliquium collapsa, amittāt.
Cæterum statim nobis hæc mittito. Nam & tēpus anni con
gruum est, & necessitas dictæ infantiæ vrget. Ab omni equi
dem arte aliena res est dilatio, verū maximè à Medicina, in
qua dilatio est animæ periculum. Curationum verò animæ
sunt temporum opportunitates, quarum obseruatio finis est.
Spero quidem sanum esse Democritū, etiam citra medelā.
Si verò aliquis error naturæ, aut temporis, aut alterius alicu
ius causæ contingat: multa enim nos qui mortales sumus, la
tent, vtpote non omnino per veritatem corroboratos, ad id
quod obscurum est, omnem vim congregatam esse oportet.
Non enim contentus est is, qui in periculo versatur, his quæ
possumus: sed concupiscit etiam ea, quæ nō possumus. Et fer
mè semper ad duos fines militamus, alterum hominis, alte
rum artis. Quorum alter obscurus est, alter scientiæ determi
natus. Opus est autem in vtrisque his etiam fortuna. Incerta
enim est coniectura eorum, qui in purgationibus cautè pro
cedunt. Nam & stomachi afflictionē veremur, & medicatio
nis congruentiam, ad naturā ignotam cōiectamus. Nō enim
vna & eadem est omniū natura, & aliud semper sibiip̄si de
cernens adsimilat ac familiare facit. Aliquādo verò totū per
dit. Sed & herbis multa reptilia venarum immittunt, & hia
tu suo internæ ipsarum tenēritudini adfectionem pro auxi
lio inspirant. Et huius rei ignorantia erit, nisi sane nota ali
qua aut macula, aut odor ferus & grauis rei factæ indicatio
nem fecerit. Deinde ipsa ars propter fortunæ casum, à rectè
faciendi proposito aberrat. Stabiliore autē semper sunt pur
gationes per veratrū, quibus etiā Melampus in Præri filia
bus, & Anticyreus in Hercule v̄si esse narrantur. Minimè ve
rò

A rō vtemur nos villo aliquo ex his in Democrito: sed contigerit opto illi sapientia, efficacissimorum ac medicatissimorū pharmacorum finis. Vale.

Hippocrates Damageto gaudium.

Hoc erat illud Damages, quod cōiectabamus: non infanit Democritus, sed super omnia sapit, & nos sapiēiores effecit, & per nos omnes homines. Remisi autē tibi amice reuera Aesculapeam nauem: cui cum solis signo etiā sanitatis insigne apponito. Nam reuera secundo numine vela fecit: & illa die in Abderam nauigauit, qua scripserā ipsis, meperuenturū esse. Omnes igitur ante portas cōgregatos inuenimus, nos, velut verisimile est, expectantes, nō viros solum, **B** sed etiā mulieres: insupérq; senes & pueros. per deos, tristes, itémq; infantes. Atque hi quidē sic habebant, velut ob Democritum insanientē. Ille verò syncere tūc in philosophādo excellēbat. Postquā autē me vidissent, visi sunt mihi paululum ad seipsos rediisse, & bonas spes ostentabāt. At Philopœmen me ad hospitium ducere gestiebat, & hoc ab illis cōprobabatur. Ego verò, o viri Abderitæ, inquā, nullū mihi maius operæprecium est, quā Democritū videre. Illi verò hoc audito, collaudarūt, & gauisi sunt, & cōpendio duxerūt me per forū, partim sequētes, partim præcurrētes, alij ab vtraq; parte: Serua, clamātes, auxiliare, medicare. Et ego adhortabar ipsos vt cōsiderent, tanquā fortassis nihil esset mali: aut si quid esset, **C** modicū id esset, & correctu facile, cōfusus horis anni Etesiiis. Et simul hæc dicens ibam. Neq; enim procul erāt ædes: imò neque tota ciuitas. Aderamus igitur: propinquæ enim muro erāt, & me placidè eò deducūt. At retro turrim collis erat altus, lōgis ac dēsis populis nigris vmbrosus, vnde Democriti habitacula cōspiciebātur. Et ipse Democritus sub ampla ac humilima platano sedebat, in veste crassa citra humeros desinente solus, discalceatus, super lapidea sede, valde pallidus ac macilētus, promissa barba. Iuxta ipsum verò à dextra, tenuis aqua per decliuē collē decurrēs leniter resonabat. Erat autē delubrū quoddā super illū collem, quantū equidem cōiectura assequor, Nymphis dicatū, sponte enatis vitibus circundatum. Ipse verò cum multo ornatu super genibus librū habebat. Sed & alij quidem ex vtraque parte adiacebant. Ac

cumulata erant etiam animalia multa, per totum resecta. Et **D**
ipse aliquando concitate incumbens scribebat, aliquando
quiescebat, diu multumque se continens, & in seipso medi-
tans. Deinde non longè post, his peractis, exsurgens deambu-
labat, & viscera animalium inspiciebat, & depositis ipsis di-
gressus, rursus desidebat. At Abderitæ circumstantes me tri-
stes, & non procul à lachrymantibus oculos habentes: Vides,
inquiūt, Hippocrates Democriti vitam, quàm insanit, & ne-
que quod vult nouit, neq; quod facit. Et quidam ex ipsis ap-
huc ampliùs ostendere volens ipsius insaniam, alta voce plo-
rauit instar mulieris ob filij mortē lamentantis. Deinde rur-
sus cum gemitu eiulauit, personā agēs viatoris, qui aliquid
ex his quæ portabat, amisit. Verùm Democritus cum hæc au- **E**
disset, partim ridebat, partim cachinnis explodebat, & nihil
ampliùs scribebat. Caput autem frequēter cōcutiebat. Ego
verò: Vos, inquam, ò Abderitæ, hīc manete: ipse verò vbi &
verbis, & corpori viri propior factus fuero, viderēque ac au-
diero, cognoscā adfectionis veritatē. Et hæc loquutus, placi-
dè descendeabam. Erat autem locus ille asper ac decliuus. Ita-
que vix me suffulciens penetraui. Cū autem appropinquas-
sem, incidi in ipsum nescio quid, quasi ex numinis afflatu &
cum concitatione scribentē. Stabam igitur isthic expectans
tempus quietis ipsius. Ipse verò paulò post, intermisso scri-
bendi imperu, & stilo scriptorio deposito, respexit ad me ac-
cedentem, &: Salue, inquit, hospes. Et ego: Plurimum & tu,
inquam, Democrite vir sapiētissime. At ille, verecundans ar- **F**
bitror, quòd nō nomine me compellasset: Te autem, inquit,
quo nomine vocabimus? Ignorantia enim tui nominis, cau-
sa erat, cur te hospitem appellarem. Hippocrates, inquā, me-
dicus est mihi nomen. Is verò: Asclepiadarum, inquit, nobili-
tas, & magna sapientiæ tuæ in re medica gloria multum ce-
lebris, etiā ad nos peruenit. Quid autem negotij, ò amice,
te huc perduxit? Imò potius præ omnibus confide. Vides au-
tem quòd hæc sedes foliis instrata non est iniucunda, viri-
dis adhuc ac mollis, & ad insidendum lenior inuidiosis for-
tunæ sellis. Cū autem confedissem, rursus inquit. Priua-
tūne, aut publicum negotium agens huc peruenisti? Dic
apertè, nam nos, quantum poterimus, adiuuabimus. Et ego:
Quæ vera causa est, inquam, tui gratia huc venio, vt sapien-
tem

Atem virum conueniam. Habet autem causam patria, cuius legatum ago. Ille verò: Hospitio itaque, inquit, primùm vtere nostro. Ego verò per omnia virum pertentans, etiam si iam mihi manifestum esset, ipsum nō insanire: Philopœmenem, inquam, nosti ciuem vestrum? Etiam, inquit, valde: Damonis filium dicis, qui habitat apud Hermaidem fontē? Hunc ipsum, inquam, cuius ego sum ex patribus peculiaris amicus. At tu Democrite potiore me hospitio excipe, & primùm sanè quid sit hoc, quod hic scribis, dicito. Ille verò ubi paululum se continuisset: De insania, inquit. Et ego, ò rex Iupiter, inquam oportune profectò scribis contra ciuitatem. At ille: Qualem, inquit, ciuitatem Hippocrates? Ego verò: Nihil, inquam, ò Democrite, sed haud scio quomodo hoc verbum mihi excidit. Verùm quid de insania scribis? Quid enim, inquit, aliud quam quid sit, & quomodo in hominibus generetur, & quomodo alleuetur? Nam animalia hæc, quæ vides, inquit, huius gratia refeco, non quòd odio habeam opera dei, sed bilis naturam ac sedem quærens. Nosti enim quòd hæc furoris hominum causa est, ubi nimium redundarit. In omnibus equidem à natura inest: sed in quibusdam minus, in quibusdā amplius. At immodestia ipsius morbi sunt, ipsa velut materia, aliquando bona, aliquando mala subiacente. Et ego, Per Iouem, inquam ò Democrite verè hæc & sapienter dicis. Quare beatum te iudico, qui tanta quiete frueris. Nobis autem huius participes esse non permissum est. Interrogante verò illo: Cur ò Hippocrates, permissum non est? Quoniam, inquam, aut agri, aut res domesticæ, aut liberi, aut vīsuræ, aut morbi, aut mortes, aut famuli, aut nuptiæ, aut eiusmodi quædam opportunitatē nobis commodam eripiunt. Hic sanè vir ille ad solitam adfectionem delatus est, & valde effusè risit, ac cachinnatus est. Et de cætero quiescebat. Et ego: Quid verò, inquam, Democrite rides? vtrum bona quæ dixi, aut mala? Ille verò adhuc magis ridebat. Et Abderitæ de colle id videntes, partim capita sua cædebant, partim frontem. Alij verò capillos euellebant. Nam, velut postea dixerunt, ampliorem quàm aliàs solitus esset, risum effuderat. At verò, inquam, sapientum optime Democrite, cupio causam huius tuæ adfectionis cognoscere: quo risu ego tibi dignus visus sum, aut ea quæ dixi: quo

Hippocratis

hoc cognito, à causa desistam, aut tu reprehensus, intēpesti- **D**
 uos risus coerceas. Ille verò: O Hercules, inquit, si me repre-
 hendere potes, curationem perficies, qualem nullam vnquā,
 ò Hippocrates. Et quomodo non reprehendaris, ò optime?
 Aut nō absurdum te esse putas, dum rides hominis mortem,
 aut morbum, aut mētis emotionem, aut insaniam, aut atrā
 bilem, aut cædem, aut aliud quid peius? Aut vice versa nu-
 ptias aut festiuitates, aut liberorum procreationem, aut my-
 steria, aut magistratus, aut honores, aut aliud quid omnino
 boni? Nam quorum misereri oportet, ea tu derides, & ob
 quæ latari conueniebat, ea itidem derides. adeò vt neque bo-
 num, neque malum apud te sit discretum. At ille: Hæc quidē, **E**
 inquit, rectè dicis, ò Hippocrates: sed non nouisti risus nostri
 causam. Vbi verò cognoueris: satis scio quod meum risum,
 meliorem legatione medelam ac curationem, tuæ patriæ &
 tibi ipsi auferes, & alios prudentes facere poteris. Et pro hoc
 fortassis me vicissim medicinam docebis, vbi cognoueris
 quanto studio circa res nullo studio dignas versantes, & ea
 quæ nullius prætiij sunt facere conantes, omnes homines vi-
 tam cōsumunt, risu digna tractantes. Ego verò: Dic, inquam,
 per deos, nunquid vniuersus mundus ægrotare se non ani-
 maduertit? & non habet quo legationem demittat ad sui cu-
 rationem? Quid enim extra ipsum esse poterit? Ille verò ex-
 cipiens: Multæ, inquit, sunt mundorum infinitates, & nequa-
 quam, ò amice, diuitem naturam malignè extēues. At hæc **F**
 quidem, inquam, Democrite suo tempore docebis. Vereor
 enim ne fortè dum infinitatem recēses, ridere incipias. Scias
 autem nunc, de tuo risu rationem vitæ te reddere debere. Il-
 le autē toruè me intuitus: Duas, inquit, risus mei causas esse
 putas, bona & mala. Ego autē vnum hominem rideo, dēmen-
 tia quidem plenū, rectis autem actionibus vacuum, in omni-
 bus consiliis pueriliter ac stultè se gerentē, nullius vtilitatis
 gratia labores nunquā absoluendos tolerantem, fines terræ
 & infinitos recessus ex immodicis cupiditatibus penetrantē,
 argentum & aurum quærentem, & nunquā ab his adquiren-
 dis interquiescentem: sed semper circa plura adipiscenda tu-
 multuantem, quo ipse inferior non sit, & neq; pudeat si non
 felix appelletur. Rideo itē ipsum eo q̃ hiatum terræ effodit
 manibus eorum perquirens, qui partim à laxa irruēte terra
 oppressi

A oppressi sunt, partim diutissimè in hac necessitate detenti, in supplicio velut in patria permanent, argentum & aurum inquirentes, vestigia pulueris ac ramenta perscrutantes, arenam aliam aliunde eruentes, & terræ venas exscindentes, ad opulentiam semper glebas conflantes, ex matre terra hostilem terram, quum tamen eadem sit, facientes, & hanc admirantes pedibus calcant. Quanto verò risu dignum est, quòd ærumnosam & occultam terram amant, manifestam contumelia afficientes? Alij verò canes emunt, alij equos: alij multam regionem circumscribentes, propriam sibi inscribunt: & multis imperare volentes, neque sibiipsis imperare possunt. Vxores ducunt, quas paulo post eiiciunt. Amant, **B** deinde odio habent. Cum magna cupiditate liberos generant: deinde adultos eiiciunt. Quæ est illa vana ac absurda diligentia, nihil ab insania differens? Bellum intestinum gerunt, quietem non amplectentes. Reges alios deponunt, alios surrogant: occidunt homines: terram fodientes, argentum quærunt. Argento reperto, terram emere volunt. Empta terra, fructus vendunt: fructibus diuenditis, rursus argentum accipiunt. In quot mutationibus versantur? in quanta malitia? dum opes non habent, opes expetunt: dum habent, occultant, dissipant. Rideo, dum improbè agentes video. Intendo risum, dum infelicitè agentes cerno. Veritatis enim Leges transgrediuntur: contentionis studio hostilem inter se litem habent, & cum fratribus, & parentibus, & ciuibus: atque ad hæc, pro eiusmodi opibus, quarum nemo, vbi mortuus est, dominus est, se mutuo occidunt. Illicitam vitam degentes, amicorum ac patriæ penuriam contemnunt. Res indignas & inanimatas diuitiarum loco habent: pro vniuersa opulentia statuas emunt, quoniam effigies ita expressa est, vt loqui videatur. Eos verò qui verè loquuntur, odio habent. Res insuper non faciles expetunt. Nam continentem habitantes, mare cupiunt. Et rursus, cum in insulis sunt, continentem desiderant, & omnia peruertunt ad propriam cupiditatem. Et in bello quidem fortitudinem laudare videntur. Vincuntur autem quotidie à petulantia, ab auaritia. Ex omnibus adfectionibus ægrotant. Theriæ verò vitæ omnes sunt. Cur verò meum risum reprehendisti ô Hippocrates? Non enim quispiam suam ipsius

Hippocratis

dementiam, sed alius alterius deridet: hi quidem ebrios, cum D
 ipsi sibi sobrij esse videntur: alij verò amantes, quàm ipsi gra-
 uiore morbo laborēt: alij nauigantes: alij eos, qui circa agri-
 culturam occupati sunt. Non enim concordant neque arti-
 bus, neque operibus. Ego verò: Hæc quidem, inquam, vera
 sunt Democrite: neque alius aliquis conuenientior sermo
 esse poterit: ad mortalium miseriam declarandam: verum
 ipse res sancit necessitatem, & domesticæ dispensationis,
 & nauium fabricationis gratia, reliquæ item vitæ, in qua
 necesse est hominem esse. Non enim ad otium natura ipsum
 genuit. Ex his autem rursus ambitio effusa, multorum rectè
 sentientem animam decepit, qui omnia quidem rectè ac se-
 rio agere student, velut re certâ ac stabili futura. Non autem E
 ita validi sunt, vt obscuritatem præuidere possint. Si enim
 quis à Democrite vxorem ducens, separationem aut mor-
 tem timeret: aut quispiam liberos educans, ipsorum interi-
 rum: imo neque in agricultura, & nauigatione, & regno, &
 magistratu, & omnibus quæ sunt in vita, vllus vnquam de
errore præsumpsit, sed vnusquisque horum bona spe alitur,
 deteriorum verò ne meminit quidem: nunquid igitur risus
 tuus his minimè conuenit? At Democritus: Valde, inquit, tar-
 do ingenio præditus es, & longè à sententia mea abes. Hippo-
 crates, qui tranquillitatis & perturbationis modum non
 consideras, præ ignorantia. Si enim hæc ipsa prudenti men-
 te disponderent: & ipsi facillè liberarentur, & meum risum le-
 uarent. Nunc autem, velut rebus in vita firmis, dementes illi F
 superbiunt, ob ratiocinationis expertem mentem, inordina-
 tum impetum suum agrè discentes. Sufficiens enim ad-
 monitio ipsis esset, omnium rerum vicissitudo, quæ subitis
mutationibus irruit, & derepentè omnigenam circunrota-
tionem inducit. At ipsi, velut hæc firma sit ac stabilis, obli-
 ti adfectionum assiduè incidentium, aliter alias ea, quæ tri-
 stitiam inferunt, cupientes, & quæ non conferunt, quæren-
 tes, multis calamitatibus inuoluuntur. Si verò quis iuxta
 propriam facultatem omnia facere cogitaret: stabilem sanè
 vitam custodiret, seipsum cognoscens, & sui ipsius compara-
 tionem clarè considerans, & non cupiditatis studium in infi-
 nitum extendens: sed opulentam naturam, & omnium nu-
 tricem, per sufficientiam intuens. Quemadmodum autem
 in opti

A in optimo corporis habitu, adfectionum periculum manifestum est: ita successuū fortunæ magnitudo periculosa est. Insignes autem palam in infelicitatibus conspiciuntur. Alij vero velut proximorum facta non videntes, à propriis malefactoris pereunt, tam manifesta, quàm obscura non prævidentes, quum longam vitam exemplum habeant eorum, quæ fiunt, & quæ non sunt, ex quibus etiam futurum considerare oportebat. Hæc sunt quæ mihi risus materiam præbent, o dementes homines, prauitatis pœnas pendentes, auaritiæ, insatiabilitatis, inimicitiae, insidiarum, doli, inuidentiæ (difficile est enumerare multiplices malorum versutias: sunt enim infinitæ) & in his dolosis versutiis vicissim conuersantes, & maligne sentientes. At virtutis apud ipsos modus est, id quod deterius est. Mendacij enim studium exercent, voluptatem consecrantur, legibus non obediunt. Quidam verò ex ipsis prævidentiam in hominibus esse negat, vt qui neq; visus, neque auditus participes sunt. Solus autem sensus hominis recta intelligentia lucidus, & præsens & futurum præuidet. In omnibus displicentiam habent, & rursus ad eadem accedunt, abnegata nauigatione, naugant, reiecta agricultura, rursus agrum colunt, eiecta vxore, aliam inducunt, genitos sibi liberos sepeliunt: & his sepultis, alios generant, ac rursus educant. Senectam optant: ad ipsam autem peruenientes, gemunt, in nullo rerum statu constantem mentem habentes. Principes ac Reges priuatum prædicant: priuatus autem regnum appetit. Qui Rēipūb. magistratum gerit, attificē laudat, velut extra periculum constitutum: artifex autem illum, velut per omnia potentem. Rectam enim virtutis viam, purā & leuem ac inoffensam, non vident, quam nemo ingredi audet. Feruntur autem in contrariam, difficilem & tortuosam, per aspera incedentes, lapsantes ac offendentes, plerique vero excident, anhelantes velut si quis persequatur, litigantes, modo posteriores existentes, modo præcedentes. Et quidam ipsorum petulanti alieni cubilis corrumpendi amore ardent, per impudentiā inducti, alios auaritiæ morbus infinitus consumit, alij mutuo insidias struunt, alij ab ambitionis studio in aerē sublatis, per malitiæ grauitatem in profundū perniciē præcipites deferuntur. Quidam destruunt, deinde rursus ædificant: largiuntur, deinde pœnitentiæ ducti, amicitiae iura tollunt

Xx 5 lunt

Hippocratis

lunt, malefici per inimicitiam cognationis iura bello impe-
 tentes. Et horum omnium causa est Avaritia. Qua in re hi à
 pueris ludentibus differunt? apud quos consilium quidem iu-
 dicio caret: quod verò se forte fortuna obtulit, id incundum
 est. At verò in desideriis quid brutis animantibus reliqui fa-
 ciunt, quàm quòd intra sufficientiam feræ ipsæ se cōtinent?
 Quis enim leo aurum in terram occuluit? Quis taurus vbe-
 rioris alimēti gratia depugnauit? Quam pardalim vnquam
 infatiabilitas cōpit? Sirit quidem aper, sed vsque ad aquæ ap-
 petentiam. Lupus autem, deuorato necessario alimēto obla-
 to, quiescit. Si dies ac noctes confingat homo, non sentit con-
 uiuandi satietatem. Et annuorum quidem temporum ordo,
 terminus est brutis ad coitum: at homo perpetuo infano li-
 bidinis cestro stimulat. Quæso te Hippocrates, non ridere
 debeo plorantem propter amorem, eo, quòd commodo suo
 exclusus est? maximè verò si quis periculorum contemptor
 sit, & per præcipitia, aut pelagi profunditates feratur, risum
 non extendam? Non ridebo autem eum, qui nauem multis
 mercibus onustam demersit, deinde mari indignatus, quòd
 ipsam plenam submersit? Ego quidem nequaquàm mihi ride-
 re videor. Vellem autem potius aliquid molesti contra ipsos
 excogitare. At neq; medicinam pro his esse oportebat, neque
 aliquem præonia pharmaca præparantem: atq; huius rei do-
 cumentum præbeat tibi tuus ille progenitor Aesculapius,
 qui dum seruaret homines, fulminis ictus gratiam accepit. **F**
 Non vides quòd & ego malicie pars sum, dum infantia cau-
 sam inquirens, animalia mactō ac refeco? Oportebat autem
 ex hominibus causam perscrutari. Non vides quòd etiā ipse
 mundus odio in homines plenus est? Infinitas enim contra
 ipsum adflictiones accumulauit. Totus homo ex natiuitate
 morbus est. Dum educatur, inutilis est, & alienum auxilium
 implorat. Dum crescit, proteruus, insipiens, pædago opus
 habens. Dum in vigore est, audax est. Dum decrescit, misera-
 bilis, vbi labores suos imprudenter recolit ac iactat. Ex ma-
 ternis enim vteri inquinamenti talis prodiit. Et propterea
 alij indignatione ac immodica ira pleni, in calamitatibus ac
 pugnis versantur: alij semper in adulteriis & corrupendis
 puellis: alij in ebrietatibus: alij in rerū alienarū cupiditati-
 bus: alij in suis prodigiis. Vtinam facultas esset nobis, vni-
 uerfor

*Aescul.
 p. m.
 ut.*

A uersorum habitationes reuelare, & nullum rerū in ipsis velamentum dimittere, atq; ita ea, quæ intus aguntur, videre: videremus vtique alios edentes, alios vomentes, alios supplicis torquentes, alios pharmaca miscentes, alios insidias construentes, alios supputantes, alios gaudentes, alios plorantes, alios amicos accusantes, alios propter ambitionem amētes. Quamquam sint quædam actiones profundiores, quæ in animo occultantur. Et ex his quidā sunt iuuenes, quidam senes: petentes, negantes, pauperes, opulenti: fame pressi, luxu grauati: sordidi, vincti, alij deliciis diffluentes, famulitium magnum alentes: alij trucidantes, alij sepelientes: alij ea quæ habent contemnentes, & speratis possessionibus inhiantes: alij impudentes: alij parci: alij inexplēbiles: alij occidentes: alij vapulantes: alij superbientes, alij vana gloria elati. Et ex his aliqui apud equos spectatores consistunt: aliqui apud viros, aut canes, aut lapides, aut ligna, aut æs, aut picturas. Et aliqui legationibus, aliqui militia, aliqui sacerdotiis præsumunt. Et alij coronas gestāt, aliqui armati sunt, aliqui occiduntur. Singuli verò ex his feruntur, partim ad pugnam naualem, partim ad militiam, partim ad rusticationē: alij ad onerarias naues, alij ad forum, alij ad concionem, alij ad theatrum, alij ad fugam, alij aliò. Et rursus, quidam ad voluptatem deliciāsq; ac intemperantiam: quidam ad otium ac socordiam. Quum igitur tot indignas ac infelices animas videamus: quomodo nō vitam ipsarum eiusmodi intemperantia præditam risu exhiberimus? Quin & valde timeo, neq; medicinam tuam ipsis placere. Nam præ intemperantia omnia ipsis displicent, & insaniam sapientiam putant, profectò suspicor pleraq; in scientia tua palam contumelia adfici, aut propter inuidiam, aut propter ingratitude. Aegrotantes enim simul vt seruantur, causam diis aut fortunæ attribuunt. Plerique verò suæ naturæ hoc adscribentes, benefactorem odio habent, & parum abest vt indignè ferant, si debiliores esse putentur. Sed & plerique artis ignorantiam in seipsis habentes, & imperiti existentes, id quod melius est, purgant. Inter stultos enim fiunt suffragia, & neque agroti attestari volunt, neque eiusdem artis artifices testimonium præbere. Inuidia enim obstat. Non autem inexpertus es tu talium nugarum: imò probè scio, ob hæc te sæpe in memorabilibus adfici

Hippocratis

ad afflictionibus accersitum fuisse, & neque causam, aut in- **D**
uidiam libenter derisisse. Veritatis enim neque cognitio
vlla est, neque vllum testimonium. Hæc autem cum dice-
ret, subridebat, & mihi, ò Damagete, diuina specie appare-
bat, & velut qui priorem suam formam exuisset. Et ego: O
magnifice Democrite, inquam, magna xenia & hospitali-
tatis tuæ munera, in Co mecum auferam. Multa enim me sa-
pientiæ admiratione impleuisti, Discedo enim veritatis tuæ
præco, qui humanam naturam inuestigasti ac considerasti.
Quum autem mentis meæ medelam à te acceperim, ab eo
nunc tempore hoc expetente, itémque corporis curatione.
Cras verò, & deinceps, hoc loco rursus conueniemus. Atque
hæc loquutus, surrexi. Et ille paratus erat me sequi. Cùm ve- **E**
rò quidam accederet, haud scio vnde, tradebat ipsi libros. Et
ego concitatus festinaui, & ad Abderitas in specula me ex-
spectantes: Viri, inquam, pro legatione vestra ad me, magna
sit vobis gratia. Vidi enim Democritum virum sapientissi-
mum qui solus potentissimus est homines prudentes facere.
Hæc habui Damagete, quæ de Democrito valde magna ani-
mi lætitia tibi recensere volui. Vale.

Democritus Hippocrati felicitatem.

Accefsisti ad nos velut insanos, ò Hippocrates, veratrum
nobis daturus, persuasus à viris stolidis, apud quos la- **F**
bor virtutis insania iudicatur. Tunc autem de mundi dispo-
sitione, & de polis ac astris cœlestibus scribebamus. Cum ve-
rò horum naturam cognouisses, quòd omnia valde commo-
dè essent creata, & quòd procul ab insania ac desipientia
abessent: meam quidem naturam laudasti: desipientes au-
tem & crudeles ac furiosos illos iudicasti. Nam quæ simula-
chris per aërem vagantia nos decipiunt, quæ sanè mundus
esse comprehenduntur, & vicissitudinem habentia creata
sunt: ea mens meâ, naturam perscrutata, verè in lucem pro-
duxit. Cuius rei testes sunt libri à me conscripti. Oportebat
igitur te, ò Hippocrates, cum viris eiusmodi moribus præ-
ditis minimè congregi ac conuersari, quorum mens super-
ficiaria & inconstans est. Si enim ab illis persuasus, mihi, ve-
lut infano, veratrum bibendum dedisses, prudentia insania
facta

A facta fuisset: & artem tuam reprehendissent, velut quæ insan-
 nia fuisset causa. Veratrū enim sanis datum, menti tenebras
 offundit. Insanis autem valde prodesse consuevit. Arbitror
 equidem, si non deprehendisses me scribentem, verū re-
 cumbentem, aut fortè deambulanti, & mecum colloquen-
 tem, & nunc quidem indignanti, nunc verò ridenti, ob
 ea, quæ mente reuoluam, & familiaribus me alloquentibus
 non attendenti, sed cogitatione instanti, & mirum in
 modum speculanti putasses sanè Democritum, iuxta ocu-
 lorum iudicium, ex his, quæ vidisses, insaniam imaginem præ
 se ferre. Oportet igitur Medicum non solum visu adfectio-
 nes iudicare, sed etiam re ipsa: & rythmos ac consonantias
 B vt plurimum indagare: & vtrum incipiat morbus, aut me-
 dium teneat aut desinat, perscrutari: & differentia, ac anni
 tempore & ætate obseruata, adfectionem curare: itémque to-
 tius corporis naturam considerare. Ex his enim omnibus
 facile morbum inuenies. Porro remissi ad te de insania tra-
 ctationem à te conscriptam. Vale.

Hippocratis Cui, de insania scriptum.

Q Vemadmodum in libello de morbo sacro dixi, Insa-
 nienti necesse est præ humiditate cerebrum, in quo
 animæ sunt opera, moueri: vbi videlicet humidius quàm
 C pro natura fuerit. Eo verò commoto, neque visum, neque au-
 ditum quiescere: sed aliàs alia & videre, & audire: & linguā
 talia loqui, qualia singulis vicibus viderit ac audierit. Quan-
 diu verò cerebrum quieuerit, tandiu etiam homo sapit. Fit
 autem corruptio cerebri à pituita & bile. Vtriusque verò co-
 gnitio sic contingit. Etenim qui à pituita insaniunt, quieti
 sunt, & non vociferantur, neque tumultuantur. Qui verò à
 bile, percussores sunt, & malefici, ac non quieti. Et si quidem
 assidue insaniāt, hæc causæ sunt. Si verò terrores & timores
 fuerint, à transmutatione fiunt, cerebro à bile calescente
 quæ ad ipsum per venas sanguinarias procedit. Cùm autem,
 bilis discesserit rursus in venas, etiam corpus quiescit. Tri-
 statur autem & angitur homo, & præter temporis rationem
 obliuiosus fit, dum cerebrum à pituita perfrigeratur, & præ-
 ter solitum morem compingitur. Postquàm verò cerebrum
 derep

derepente à bile calefactum fuerit, sanguine in prædictis venis efferuescente: insomnia vident horrenda, & facies velut in vigilante flammescit, & oculi rubescunt, & mens aliquid mali operari cogitat. Atque hoc in somno homo patitur. Cum autem sanguis rursus ad venas dispersus fuerit, quiescit. Porro in quinto popularium morborum libro quædam recensui, cui fiebat vocis interceptio, ignorantia, frequentes delirationes, & reuersiones. Lingua autem dura, &, nisi collutione usus esset, loqui non poterat, & plerunque etiam valde amara. Venæ sectio exsoluit, aquæ potus, aqua mulsa, veratrum potiones. Hic ubi modicum tempus superuixisset, mortuus est. Erat & alius quidam, quem, ubi noctu ad conuiuium progrediretur, timor tibicinæ corripiebat, ubi audiret ipsam tibia canentem. Interdiu verò audiens, nihil patiebatur.

Hippocrates Democrito felicitatem.

Artis Medicæ recta facta, ò Democrite, plerique è vulgo hominum non omnino laudant, verum Diis sæpe attribuunt. Si verò natura reluctata perdiderit eum, qui curatur: medicos reprehendunt, numen prætereuntes. Et ego sanè mihi videor, maiorem reprehensionem quàm honorem artis me assequutum esse. Ego enim ad finem Medicinæ non perueni, etiam si iam senex sim. Neque enim ipsius inuentor Aesculapius, sed & ipse in multis à seipso dissensit, quem admodum nobis scriptorum libri tradiderunt. Proinde epistola à te ad nos missa, veratri medicinam reprehendebat. Inductus equidem sum, ò Democrite, velut insanienti veratrum daturus, non perscrutatus qualis quis tandem esses. Vbi verò tecum congressus, cognoui non per Iouem desipientiæ opus, sed ferme omni laude ac commendatione dignum, valde laudaui naturam tuam, optimumque naturæ ac mundi interpretem te iudicaui. Eos verò qui me induxerunt ad te, velut insaniētes reprehendi. Nam ipsi medicamento opus habebant. Quandoquidem igitur casus nos in diem coniunxit, rectè feceris si ad nos frequentius literas dederis, & libros à te cōscriptos impertiueris. Misi autem etiam ipse tibi de veratri usu libellum. Vale.

Hippocr

Aescul.

M. Mui

A

Hippocratis de veratri usu libellus.

His qui non facile sursum purgantur, ante potionē corpora præhumeſtare oportet vberiore alimēto & quiete. Vbi verò quis bibit veratrum, ad motus corporum magis ducere, quàm ad ſomnos. Declarat autem nauigatio, quod motus corpora turbat. Cùm veratrum magis ducere voles, corpora moueto. Veratrum periculofum eſt ſanas carnes habentibus. Quicūq; in pharmacorū portionibus non ſitiunt, dum purgantur, non ceſſant purgari prius quàm ſitierint. Conuulſio ex veratro, lethale. In nimia purgatione, conuulſio aut ſingultus ſuccedens malum. In turbationibus ventris & vomitibus ſpontaneis, ſi quidem qualia purgari oportet, purgantur, conducit, & leuiter ferunt. Sin minus, vice verſa. Quemadmodū autem in prænotionibus dixi, purgatio ſurſum verſus commodat ei, in quo ſine febre eſt cibi faſtidium aut ſtomachi punctura, aut vertigo, aut os amarum, & in ſumma doloribus ſupra ſeptum tranſuerſum: aut deorſum verſus, vbi ſine febre eſt tormen, lumborum dolor, genuum grauitas, menſes agrè prodeuntes, dolores in partibus ſub ſeptotranſuerſo. Vitare verò oportet in pharmacorum portionibus eos, qui bona habent corpora, maximè autem nigros, & humida carne præditos, ſed & ſubſiccos, & balbos, ac blaſos. Quicunque verò inflammata in principio morbi, velut in libello de priſana dixi, ſtatim medicamento ſoluere aggrediuntur, hi de eo quidem quod diſtentum eſt ac inflammatum, nihil auferunt. neque enim remittit qui crudus eſt adfectus. Ea verò quæ morbo reſiſtunt, & ſana ſunt, conſumunt. Corpore verò debili fiente, morbis ſuperat & immedicabile malum habent. Cæterum veratrum hiſ dare oportet, quibus de capite fluxus fertur. Non autem dandum eſt pectore iſſuppuratis. Neque medicamenta danda ſunt decoloratis, raucoſis, lienofiſ, exanguibus, ſpirituofiſ & ſiccum tuſſientibus, ſiriculoſis, flatuoſis, & hiſ qui præcordia, & latera, ac dorſum diſtenta habent, & torpentibus, & obſcurè videntibus, & quibus aurium ſonitus ſunt, & vrinæ meatus impotentibus: neque item morbo regio laborantibus, aut ventre debilibus, aut hiſ qui ſanguinis eruptiones aut tubercula habent. Si verò medicandum eſſe videbitur,

veratro

videt
lent
ex lib.
Hippoc

veratro securus sursum purga, deorsum verò non. Optimum D
autem his est victus rationem cōstituere. Quemadmodum
autem in prædictionibus dixi, non sunt medicamenta danda
his qui nigra euomunt, neq; cibum auersantibus, neque de-
lyris & parum dormientibus, neque dolore vexatis, neq; vi-
sum temerarium inclinatum habentibus, neque tumefactis,
neque vertiginosis, neque decoloratis, neque his qui in febre
æstuosi sunt ac confracti. Sicut autem de ptisana dixi, Sesa-
moides sursum purgat. potio eius est drachma dimidia in
aceto mulso trita. Commiscetur etiam veratris tertia potio-
nis pars, & minus suffocat. Purgat item quartanas diurnas
& diurna febre lipyria vexatos: & eos, in quibus non est fi-
tis, neque excretio. Hos verò non ante tres hebdomadas. E
Aliquando etiã pleuriticos ac voluulosos. Et sicut in mulie-
bribus morbis dixi, purgandum est etiam si vteri purgatio-
ne opus habuerint.

Hippocrates ad Thessalum filium.

A D cognoscendam Geometriam & numerorum scien-
tiam, mi fili multum studij adhibeto. Non enim solum
vicam tuam illustrem, & ad multa commodam, in humana-
rum rerum statu efficient: sed etiam animam acutiorem &
clariorem reddent, ad omnium, quorum vsus in medicina
expetitur, vtilitatem consequendam. Etenim Geometriæ co- F
gnitio, quæ multiformis ac variâ est, & omnia cum demon-
stratione transigit, utilis erit & ad osiũ situs, & ad exarticu-
lationes, & reliquum membrorũ ordinem. Nam ad multi-
plicem horũ adfectionem, & articularum luxatorum repo-
sitione, & osium contritorum refectione, & perforatione,
& compositione, & exemptione, & reliqua curatione, maio-
re industria vtetur quisquis nouerit qualis est locus, & quale
est os, quod ex eo eluxatum est. At verò numerorum ratio,
& ad circuitus, & ad transmutationes febrium præter ratio-
nem fientes, & ad iudicia ægrotantium, ac securitatis in mor-
bis, sufficiens erit. Præclara enim res est, tale ministerium
in medicina habere, quod tibi partes intentionis ac remis-
sionis, cum ex parte inæquales fuerint, facillè cognobiles
exhibet, citra errorem. Quapropter ad huiusmodi experien-
tia

A tix facultatem peruenire sedulo stude. Vale.

Democritus Hippocrati, De natura humana.

OMnes homines artem medicam nosse oportet, ò Hippocrates. Est enim res honesta simul ac utilis ad vitam: & ex his maximè eos, qui eruditionis ac eloquentiæ cognitionem habent. Nam sapientiæ cognitionem medicinæ sororem ac contubernalem esse puto. Sapientia enim animam ab adfectibus liberat; medicina verò morbos à corporibus aufert. Augescit autem intelligentia, præsentē sanitatē: cuius prouidentiam habere, honestum est, eos qui rectè sentiunt, At ubi corporis habitus agrotat: neque mens ipsa alacritatem habet ad virtutis meditationem. Morbus enim præsens animam vehementer obscurat, intelligentiam ad affectionem per consensum ducens. Caterùm naturæ humanæ descriptio, eiusmodi speculationem habet. Cerebrum quidem supremam corporis partem custodit, & securitatis tutelā sibi commissam habet, intra membranas neruosas cohabitās. Super quod duplicatorum ossium naturæ necessariæ firmata, dominum mentis custodem, ipsum cerebrum tegunt. Pilorum decor est, cutem ornare. Oculorum verò vis visiva in multiplici tunica latitatus, ob humoris instantias sub frontē in medellā collocata est, & est vidēdi causa. Pupilla verò syncera, palpebræ marginem opportunitatis custodem sustinet. Duplices autem nares olfactum dinoscentes, oculorum vicinitatem dirimunt. Mollis verò labiorum contactus os circumplicans, verborum sensum, exactamque articulationem gubernans exhibet. Mentum autem in extremitatem desinens, ac lyræ simile, dentium clavis coaptatū est. At sermonum receptacula aures, opifex aperuit: in quibus dum est sermo, non certus temeritatis minister existit. Loquelæ mater lingua, animæ nūcius, gustum custodiens, munitis dentium septis custodita est. Guttur autem & Gula inter se coniuncta, vicina sunt. Illud enim in viam spiritus: hæc in profundum ventris, alimētum demittit, largē id propellens. Regium verò cor, cono ac pineæ nuci simile, irā nutriens, aduersus omnes insidias thoracem induit. Frequenter autem flatuum ca-

Y y uern

uernæ, aere per ipsas erumpente vocis causam flatū pariunt. **D** Quod verò sanguinem supeditat, & in alimētum transmutat, cum apicibus sæpe vena caua circumfluum, hepar est, concupiscentiæ causa. Viridis autem bilis iuxta hæpar manens, vbi superebullit, humani corporis corruptio est, & nocius ac inutilis corporis humani inquilinus. Veruntamen vice versa dormit, nullum negotium exhibens. Inter hæc autem medius omnia suscipiens venter chorū ducit, & accumbit: concoctionem gubernans. Obnoxia verò ventris compositioni, per opificium cōuoluta, circum ventrem euoluuntur intestina, adsumptionis & excretionis causæ. Gemini autem rhenes in coxis firmati, & pinguedine intecti, ab vrinarum excretionē non sunt alieni. At dominus totius ventris, qui **E** Omentum vocatur, totum ventrem complectitur, solo splene excepto. Consequenter, neruosa vesica in coxa osculum firmatum habens, venis complicatis, vrinarum excretionis causa est. Huic autem vicina mater puerorum, vehemens illud malum, infinitarum ærumnarum in muliere causa, vterus ipse latitat. Pylorus autem siue lauitor, ex coxarum recessu emergens caro, neruis adstringitur. Verū de plenitudine naturæ ventris effundit, ex opificij prouidentia. Porro extra corpus pensiles domum incolunt, ad generationem destinati, conditores testiculi, multis tunicis præditi. Iucū dum ex venis ac neruis plicamentum est pubes, quæ vrinarum effusionem facit, & ad coitus ministerium à natura creata est, **F** & pubertatis appetentiam tegit. Crura verò & brachia, & extremæ partes his annexæ, totum ministerij principium coaceruatum habentes, tutum neruorum ministerium perficiunt. At verò incorporea in recessibus natura, omnifaria viscerum genera fabricauit. Quæ fanè mors instans, celeriter à ministerio quæta reddit.

*Hippocrates Cous, Demetrio
regi gaudium.*

NOse quidem etiam prius, ò Rex, studio habentes naturæ humanæ partes in summa considerare, has conscriptas quemadmodum voluisti demisimus. Nunc autē ea, quorum maximè studiosos esse oportet prudētes, partim à prioribus

Aribus transumpta, partim nunc per nos ipsos comperta, tibi conscripsimus. Quæ si tu priorum morborum signis fientibus sequutus, & iisdem sæpe usus fueris: per omne vitæ tempus morborum exors esse poteris. Duo sunt morborum vniuersorum animalium genera, alterum secundum genus, alterum secundum adfectionem, inter se dissimilia. At verò concupiscentias iuxta alimentum, ex subcontrariis cognoscas, dum ea quæ euacuantur, indicant ea quæ plena sunt: & quæ implent, coniecturam præbent eorum quæ vacua sunt. Morbos autem omnes ex subcontrariis constitutos cognoscas, & morbos à morbis fieri. In conuulsionibus febris succedens, sistit morbum: capitis autem dolores, sanguis ex auribus erumpens, aut ex naribus. Conuulsionibus omnibus morbis atræ bilis succedentes, atram bilem sedant. Et in summa, radix humanorum morborum est caput, & maximi morbi ex hoc accedunt. Quum enim ori velut cucurbita medica incumbat: contingit, vt ipsum omnium eorum, quæ ingeruntur, superfluitates attrahat, & tenues humores. Oportet autem animum aduertere, & peculiariter viuere, vbi te ipsum præparaueris in has partes, quo morbi accidentes nullum augmentum capiant, per curam diligentem & per bonum ordinem apud te fientem: ita vt neque rei venerex intemperantia, neque diuersorum eduliorum incontinentia, neque somnis immodicis, in exercitato corpore vtaris: sed signa in corpore contingentia sequaris, & vniuscuiusque corporis occasionem conserues: quo morbum irruere paratam vites, & medelis, quas ego perscribo, vtens, à morbis exors perseueres. Vale.

Decretum Atheniensium.

Visum est ac decretum Senatui & populo Atheniensi. Quandoquidem Hippocrates Cous Medicus, & ab Aesculapio originem ducens, magnam beneuolentiam vnâ cum salute Græcis ostendit, quando etiam peste à barbaris in Græciam proficiscente, discipulis suis ad locos dimissis, indicauit quibus medelis vti oporteat, & accedentem pestem securè effugere, quo medicina Græcis data, ipsorum ægotos tutò seruaret. Sed & scripta sua de arte medica ex-

Hippocratis

asta edidit, multos esse volens Medicos qui seruare possent. D
Et Persarum rege ipsum accersente, & honores optimatibus
Persarum æquales promittente, & dona quæcunque tandem
ipse Hippocrates vellet offerente, Barbari promissiones con
tempnit, eo quod hostis & communis inimicus Græcis esset.
Quo igitur appareat, populum Atheniensem semper ea quæ
utilia sunt Græcis consultare: & ut gratiam condignam Hip
pocrati pro benefactis referat: visum est populo, ipsum pu
blice magnis mysteriis initiare, quemadmodum Herculem
filium Iouis: & coronare ipsum corona aurea mille aureo
rum: & ipsam coronam Quinquatriis magnis Mineræ fe
stis, in certamine gymnico per præconem proclamare. Et
licere omnibus Coorum liberis, ut Athenis pubescant, quem
admodum liberi Atheniensium: quandoquidem patria ipso E
rum huiusmodi virum genuit. Esse verò Hippocrati, & vitam,
& victum prouisum in Pritaneo per omnem vitam.

Oratio Hippocratis ad aram consistentis.

O Vos multi & multarum urbium habitatores, in magna
dignitate constituti, communi nomine Thessali, omni
bus hominibus amara necessitas incumbit, ut quæ à fatis sta
tuta sunt ferant. Quapropter ego nunc cedens cum mea so
bole, oleæ ramulis coronatus, ad Mineræ aram supplex con
fisto. Quis sim, ignorantibus dicere oportet. Hippocrates, ò
viri, medicus Cous, non per piam & honestam causam, me ip
sum & liberos meos vobis commendo. Cognoscitis me ò
plebs. Nam profectò vos estis viri mihi familiares, inter
quos, ut verum dicam, inter plerosque vestrum & in multis
urbibus vestris cognitus sum, ut in summa dicam. At verò
nomen meum longè vterius, quàm formæ meæ aspectus,
processit. Atque hæc causa ex arte mea sanitatis ac vitæ or
tum habuisse videtur, quod non solum hominibus vestram
regionem habitantibus, sed etiam multis Græcis vobis vici
nis cognitus sum. Iam verò qua de causâ tantum negotium
opere peragendum adsumpsi, referam. Athenienses male ha
be bunt, ò viri Thessali, qui Metropolim ac patriam no
stram

Astram Co deuantantes, in seruitutem redigunt ea, quæ libera sunt ex progenitorum acquisitione, priuatim sibi parta facientes: neque cognationem reueriti, quæ ipsis est ab Apolline & Hercule, quæ sanè ad Aenium & Sunium filios illorum peruenit, neque Herculis malorum domitoris beneficia mente recolunt, quæ ille communis & vobis & nobis benefaciens deus, in illos contulit. At vos per Iouē supplicationibus colendū, & per cognatos deos, egredimini, vindicate, liberate, propriæ virtutis memores, & nihil ad gloriam vestram spectans intermittentes.

Oratio Legati Thessali filii Hippocratis, ad Athenienses.

B

Conuenire arbitror viri Athenienses, constitutum apud vos, qui non omni multitudini cognitus est, primū in Exordium dicare quis sit, & vnde sit: postea verò reliquam orationem à docilitate persequi. Mihi equidem pater est Hippocrates: qui quantam in medicina facultatem habeat, vos nouistis. Nomen autē est Thessalus. Cognitus verò & ego sum nō in postremis, neque paucis vestrū. Patria verò mihi est Cos: quæ quomodo vobis cognata sit ab antiquo, alij dicunt, qui in recensenda historia sunt præstantiores. Veni autem missus à patre, quatuor beneficia à nobis in vos collata prolaturus. Primum quidem Amphy- tyones. Narratio.
 Cvetus quoddam, tempore progenitorum nostrorum cōmune in omnes Amphictyonas, quorum vos non minima pars estis. Alterum verò illo adhuc maius, & ad plurimos Græcorum progressum. Atque hæc quidem vrbs & progenitorum meorum esse apparebunt. Tertium autem patris proprium est, & tantum, quantū nemo vnus vir, & vobis & multis Græcis contulit. Postremū verò ex quatuor cōmune est patris & meū, & quod non ad plures, sed ad vos ipsos peruenit. Quod quidem priorum beneficiorum comparatione exiguum videri poterit: verū ad aliorum beneficia collatum, magnū est. Et sanè huiusmodi beneficia sic se habent, quemadmodū esse dixi, vt summam dicam. Oportet autē non solum dicere, sed etiā demonstrare quòd vera sunt. Principiū igitur sermonis, ipsum ministeriorum nostrorum principiū faciam.

Yy 3

Vetust

Hippocratis

Crisæi.
Pythicum
templum.
Locri.

Crisæorum
calamitas
quanta.

Pestilentia
obsidentium
summa.

Vetustissima verò primùm referam: in quibus fortassis longiora ac altius repetita me dicere deprehenderitis. At quisque vetus dici expetit. Erat enim tempus quādo Crisæa gens erat, & habitabat quidem circa pythicum templum: terram verò habebat, quæ sanè nunc Apollini consecrata est. Appellatur autē Crisæus quidem campus, iuxta quem Locri habitant, & cui Melæna adsunt: Cirrhæus verò mons, cui Phocenses adiacent. Hi porrò Crisæi cum essent aliquādo populosi, & fortes, & opulenti, his bonis ad malum vti sunt. Per insolentiam enim multa horrenda ac iniqua facta perpetrarunt, indeum impietatem exercentes, Delphos in seruitutem redigentes, vicinos deprædantes, agricolas spoliantes, vxores ac liberos abducentes, & corpora ipsorum constuprantes. Quæ de causa Amphictyones ira commoti, & exercitu in terram ipsorum inducto, & ipsis pugna deuictis, regionem deuastarunt, & vrbes expugnarunt. Vbi sanè illi, qui multa & impia perpetrarunt, miserè accepti sunt, non minores pœnas persoluentes, quàm ipsi aliis intulerunt. Felicissimi verò ex ipsis fuerunt, qui intra manus hostium perierunt. Secūdo loco, qui manu capti sunt, & qui ad aliā regionē ac vrbes trāsuerunt, sua enim mala oculos nō habuerunt. Qui verò ex captiuis isthic manserunt, infelicissimi fuerunt, quicunque in sua ipsorum regione torquebantur. Nam cum vxoribus & liberis, agros & vrbes igni tradi videbant. His verò adhuc peius degebant hi, qui intra mœnia perseuerabant, quando relata mala partim videbāt, partim percunctabātur, plura veris audientes. Sic enim fieri solet. Et sanè malam salutis spem habebant. Erat autem ipsis vrbs propè hunc locum maxima, vbi nunc certamen equestre peragitur: cuius muros extruxerant, & eos qui ex aliis vrbibus transfugerant, exceperant. Inutilia verò eiecerant, & necessaria importauerant. Et cogitabant obsidionem sustinere, bona spe præditi, neque manuum pugna, neque longi temporis obsidione, urbem capi posse. At verò Amphictyones, tum alia deuastarunt, tum ad hanc urbem præsidio constructo, & ad expugnationem præparato, reliquum exercitum per vrbes dimiserunt. Temporis obsidentium autē progressu, cum pestis in exercitū illapsa esset, & milites agrotarent: quidam verò etiā morerentur: alij verò, propter morbum

A morbum, praesidium reliquissent: Amplietyones turbabantur. Et alij alia consultabant. Solet autem in rebus communibus sic ferè fieri. Tandem verò afflictionem molestè ferentes, & de bello desperantes, Deo rem commiserunt: & quid facere oporteret, interrogauerunt. Ille verò bellum gerere iussit, & ad victores fore promittebat, si ad Co profecti, cerui filium in auxilium adducerent, cum auro: atque hoc festinabundi, vt ne Crisei prius in adyto tripodem deprædarètur. Sin minus, urbem capi non posse. Ipsi verò, his auditis, & ad Co profecti, oraculum proposuerunt. Cùm autem Coi dubitarent, & oraculum non intelligerent: surrexit vir genere quidem Asclepiades, progenitor autem noster. Medicus verò Græcorum eius temporis omnium confessione optimus:

Apollinis
responsum.

B nomen autem ipsi erat Nebrus: qui oraculum dicere inquit, vt ad seipsum venirent. Nam Deus, inquit, admonuit vos, vt profecti ad Co, cerui filium in auxilium adducatis. Cos equidem hæc est. Ceruorum autem filij Nebri appellantur, hoc est, hinnuli. Nebrus autem est mihi nomen. Quod verò aliud auxilium potius contigerit exercitui ægrotanti, quàm medicus? Et profectò non videtur mihi id consequens esse, quòd in tantum diuitiis Græcos omnes superantes, Deus ad Co proficisci iusserit, & aureum numisma petere. Verùm hoc oraculum in meam domum progreditur. Chrysos enim, hoc est aurum vocatur masculus meus filius nati minimus. Est autem omnino & corporis specie, & animi virtute, quantum patri dicere licet, inter omnes ciues præcellens. Ego quidem igitur, nisi vobis aliud videatur, & ipse proficiscar, & filium mecum adducam, naue quæ quinquaginta remis agatur instructa meis sumptibus & ministeriis medicis ac bellicis referta, quo in vtranque partem auxilium feramus. Et hic quidem dixit: illi verò approbauerunt, qui missi fuerunt. At Nebrus hic etiam virum Calydonium apud se educatum, in nauem adsumpsit: de quo statim, vbi res tulerit, dicemus. Cùm igitur peruenissent hi viri ad castra, Deus gaudebat. Nam & mortes militum cessabant, & cum diuina fortuna equus Eurylochi (qui belli dux erat, Theffalus genere, & ex Heraclidis ortum ducens) canalem, per quem aqua in urbem ducebatur, ungula percussisset, vbi in pulvere volutari voluisset: Nebrus aquam medicamentis infecit,

Nebri.

Chrysos.

Calydoni?

Eurylo-
chus.

Chryfus
primus mu-
rum con-
scendit.
Mermodes

Templum
Apollinis.
Equestre
certamen.

Chrysi se-
pultura.

Persarum
rex.

unde ventres Chryſeorū corrupti ſunt:& ſanè multum cōtu-
lit ad hoc vt ciuitas caperetur. Atq; hinc iam animi obſiden-
tium elari ſunt, velut deo iam manifeſtè auxilium ferente.
Cum autem impetus facerent,& præmia proponerēt his qui
primi muros conſcendiſſent:certamen erat fortiffimum,&
vrbs capiebatur. Primus enim muros conſcendit Chryſus,&
turrim occupauit. Sequebatur autem ipſum euſtigio vir il-
le Calydonius, ſub communi ſcutō auxiliū ferens, de quo an-
tea dixi. Et Chryſus quidem haſta percuſſus cecidit ex ſum-
ma turri:percuſſus eſt autem à Mermode Lyci fratre, qui la-
pidibus obrutus mortuus eſt, cū in adytum irrupiſſet, tripod-
em deprædaturus. Hi igitur ciuitatem ſic cœperunt:& Ne-
bri auxilium cum Chryſo, & ſecundum medicam, & ſecun-
dum bellicam facultatē rectè ſucceſſit: & deus vera dixit, &
quæ promiſerat fecit. Qua de cauſa Amphictyones Apollini
quidem templum conſecrarunt, quod nunc eſt in Delphis:&
certamen gymnicum ac equeſtre prius non peragentes, nūc
peragunt: & Chryſeorū regionem vniuerſam dicarunt Deo
contributori, reddentes ea quæ dedit in eo quòd oraculum
dedit. Et Nebri filiū Chryſum in circo equeſtri ſepelierunt:
& Delphis publicè ipſi parentare præceperunt. Aſclepiadis
verò in Co attributa eſt prudentia vaticinandi, quemadmo-
dum his qui mittuntur ex vrbibus ad ſacrum Amphictyonū
conciliū:atq; hoc Nebri gratia. Calydoniis autem ab illo
viro & illo mihiſterio, etiam nunc in Delphis primæ vatici-
nandi partes, & alimenta dantur. Verū redeo ad noſtra. Nam
quod vera dico, hinc clarū eſt. Cum enim pater & ego acceſ-
ſiſſemus, Amphictyones hæc renouarunt, & attribuerunt, &
in columna deſcripta in Delphis dedicauerunt. Atque huius
quidem ſermonis finis clarè oſtendit, noſtros progenitores
eſſe veſtros benefactores. Cæterum hoc relicto, alium de iſſe-
dem non eundem ſermonem, adſumam. Cum enim magnus
ille rex Perſis & aliis Barbaris bellū gereret contra Græ-
cos, qui aquam & terram non dediffent: patria noſtra maluit
in totum peſſundari, vt ne contra vos, & eos qui vobiſcum
ſentirent, hoſtilia arma ſumeret, & in nauibus militarem
expeditionem mitteret. Sed abnuſit, honeſtum quid & di-
gnum patribus meditata, qui Gigantes & Heraclidæ eſſe di-
cuntur. Viſum igitur eſt in ipſis, cum quatuor eſſent muri in
inſula

A insula, omnes relinquere, & ad montes cōfugere, & salutem tutari. Vnde sanè quid non mali obuenit? dum regio fuit deuastata, & corpora libera mancipata, & hostili lege occisa, & vrbs & alia munimenta, ac templa, ad fauillam exusta. Insuper autem & filia Lygdamis Artemisia, circa patrum victoriam datum est, omnia quæ reliqua essent expiscari ac exportare. At enim, velut apparet à diis non sumus neglecti: verum tempestatibus ingentibus exortis, & naues Artemisia omnes in periculo fuerunt, & multæ perierunt: & in exercitum ipsius multa fulmina inciderunt, quum insula nostra paucis fulminibus impeteretur. Dicitur etiam spectra Heroum mulieri conspecta esse. Quorum sanè omnium timore perterrefacta, ab immedicabilibus cœptis destitit, amara confessione facta, quæ & relatu amara est. Quare omittatur. Attribuiam autem & hic progenitoribus meis propriissimè minimè falsa, quod neque contra vos, neque contra Lacedæmonios, aliósque Græcorum socios, Coi voluntaria arma sumperint: & quidem quum multi tum insulas, tum Asiam habitantes, cum Barbaris in bello coniuncti fuerint, nulla violentia coacti. Equidem præfecti vrbs tunc fuerunt Cadmus & Hippolochus. Verum autem est, & Cadmum, & Hippolochum meos progenitores esse. Nam Cadmus qui & Senatum regebat, matris meæ progenitor est: Hippolochus verò ex Asclepiadis, quartus à Nebro, cuius auxilio Chiræi sunt deuastati. Nos autem ex virili genere Asclepiadæ sumus. Quare & hoc bonum à progenitoribus nostris profectum amplectimini. Redeo ad Cadmum. Hic sanè vir adeò commodi Græcorum studiosus fuit, vt cum regio ab Artemisia obsidione liberata esset, isthic relictæ vxore ab sobole, abiuerit cum his qui eadem sentirent in Siciliam, quo Gelonem & fratres eius prohiberet, ne amicitiam cum Barbaris contraherent contra Græcos. Perpetrauit & alia multa egregia facta, quæ longius producere non est tempestiuum. Atque hæc quidem & huiusmodi multa sunt publica progenitorum nostrorum in vos & alios Græcos beneficia. Nam deficit me dicendi facultas. Venio autem iam ad hoc, vt beneficium Hippocratis patris mei apud eos, qui id sciunt, producam: quod hoc modo recensens, vera dicere Pestilentia cognoscat. Cùm pestis ex Barbaria adueneret, quæ supra Illyrica.

Artemisia
Lygdamis
filia.

Cadmus.
Hippolochus.

Gelon.

Yy s Illyr

Illyrios ac Pæonas sita est, & cū malum in hanc regionem D
venisset: harum gentium Reges ad famam medicam, quæ
vera erat, & vndiquaque processerat, & ad patrem meum,
nuncios miserunt in Thessaliam (illic enim pater meus &
prius, & nunc domum habet) vocantes ipsum ad auxilium
ferendum. Et non solum argentum, & aurum, & alias opes
se missuros esse receperunt: sed etiam reportaturū esse quæ
cunq; ipse vellet, si auxilium tulisset. Ipse vero quum inter-
rogasset quales motus partiales fierent, & æstus, ac ventos, &
caligines perscrutatus, itēque alia quæ habitus ex præsen-
ti statu commouere solent: cum sanè omnia didicisset, illos
quidem retro discedere iussit, & nullam sibi facultatem esse
ad illorum regionem proficiscendi, pronunciauit. Verū
ipse quā citissimè Thessalis denunciare studuit, quibus E
modis malum accedens ciuerent: medelam conscriptam
per vrbes proponebat. Me verò in Macedoniam demisit.
Cum regibus enim Heraclidarum, qui isthic imperium ob-
tinent, paterna nobis intercedit amicitia. Et ego quidem
ibam à Thessalia eo, quo me pater iussit, auxilium his qui
isthic essent laturus. Iniunxit autem mihi vt etiam vrbi

Dracon vestræ opem ferrem. At fratrem meum Draconem ex Pa-
Thessali gais profectum, in Hellespontum nauigare iussit, consimili
frater. consilio instructum, quali etiam ipse utebatur. Non enim

Polybius. omnes loci eadem auxilia ferunt, eo quòd non omnis am-
biens nos aer similis est. Polybium verò, qui filiam ipsius,
meam autem sororem habet, & alios discipulos, ad alios F
aliorum conuentus & vias profecturos emisit, quo quā plu-
rimis opitularetur. Postquam autem ipse res in Thessa-
lia perfecit, ad vicinas gentes auxilium laturus proficisceba-
tur, & ad pilas profectus, Doriensibus, & aliis, simulque Pho-
cenibus auxilium tulit. Et quum sanè ad Delphos perue-
nisset, supplicationem Deo pro Græcis fecit: & sacrificio
facto, iter ad Boetos arripuit. Et cum ipsis opem tulisset,
similiter ad vos progressus est, & sufficientia vobis ad salu-
tem, quæ sanè nunc ego produco, ex animo penitus dixit.
Arbitror autem multos vestrum nosse, quòd vera dico. Non
enim ita diu est, sed nonus hic est annus, quando abiui, & in
Pelopōnesum missus sum, isthic habitantibus opem laturus.
At verò vndiquaque nobis, & verbis, & re ipsa, dignus honor
contigit

A contigit, ut minimè poeniteat nos, quòd non hunc cum quaestua ex Illyricis ac Pæonibus oblato permutauimus. Verùm præ reliquis ciuitatibus magna sunt quæ à vobis data sunt. Nam & respublica vestra alias excedit. Athenæ enim altius quiddam sunt aliis vrbibus, quantum ad gloriam attinet. Et corona illa aurea in vestro theatro patri imposita, ad summam, æmulationem ac felicitatem ipsum euexit. Sed & hoc beneficium superastis, dum & patrem, & me publicè Cereris & Proserpinæ mysteriis ac sacris initiaſtis. Atque hæc quidem tria sunt beneficia, quantum ego verbis conſequi potui, & fracta voce proferre, vrbis, & progenitorum, & patris mei, in vos simulque multos Græcos. Quantum nunc dicere aggrediar, quod, velut antea dixi, in vos ego & pater meus collocauimus. Cùm enim Alcibiadem emitteretis in Siciliam, multa quidem potentia, non autem ita multa, velut admiranda: & sermo in concione incidisset de Medico, quem exercitum sequi oporteret: pater meus progressus, me ad curanda corpora vestra se daturum esse promissit, propriis sumptibus instructum, & citra mercedis exactionem, quàm diu classis abesset, paruipendens suam vtilitatē, ut qui sibi persuassisset, hoc in vestrum commodum cessurum esse. Ego enim non solum res meas insumebam, id quod faciebam vobis inseruiens: sed etiam ad alia magna opera destinatus fui. Et hoc minimū est ex his, quæ sum dicturus. Decevit enim **C** pater ob me filium fortunæ fluctibus agitari, & in terra aliena, & in mari, & in periculis bellicis, & in egritudinibus, quæ his qui erroneam vitam degūt, magis accedere solent, quàm his qui ordinatæ vitæ rationem habent. Nouit enim beneficium beneficio metiri: & non velut qui aliquid emisſet, contractu ex manu in manum facto semel, discedere. Et hic quidem talia præstitit. Ego verò, ut qui filius illius sim, nihil studij & artis prætermisi, auxilium ferens, & periclitatus vobiscum, si quando occasio tulisset. Et ad hæc ambo præstanda, neque morbus, neque adſectio, neque timor in mari, & intra hostium manus, me prohibuit. Testes autem huius rei non alios aliquos, sed vos ipsos habeo. Quare si quis contradicere volet, is nihil cunctatus exſurgat. Verùm non puto me mentiri. Cùm autem hæc præstitissem ad annos tres,

& aurea

Hippocratis

& aurea corona coronatus, & adhuc pulchrius laudatus: do-
 mum redij ad nuptias, quo & artis, & generis nostri successio-
 res producerem. Et quæ quidem à ciuitate, à progenitori-
 bus, à patre, & à me, vobis obtigerunt, hæc sunt. Dictum
 est autem & quæ nos à vobis oblata tulimus. Arbitror autē
 multos è vobis admirari, qua de caussa hæc à me ex tam lon-
 gino principio repetita sunt. Quo igitur & vos cognosca-
 tis, & mihi ea quæ cupio, contingant: tempestiuum est vt
 hoc dicam. Pater meus, o viri Athenienses, & ego petimus
 vos (sic enim liberos & amicos loqui decet, quò id quod
 petunt ab amicis liberis consequantur) contra patriam no-
 stram hostilia arma ne sumatis. Si verò oportet, quemad-
 modum fortassis oportet eos, qui sua ipsorum caussa pro-
 gressi sunt, etiam rogamus, vt ne nos, qui eiusmodi & tam
 magna beneficia in vos priores contulimus, seruorum loco
 habeatis. Insuper autem (nam & sic dicere conueniet) sup-
 plicamus, vt ne nostra faciatis vobis ipsis in bello captiua, si
 contigerit vt multo inferiores superetis. Verum & hoc con-
 siderate, quòd fortuna aliàs alia cito versat: & aliquando
magni paruis opus habuerunt: & fortes per debiles salutem
 adepti sunt. Puto autem clarum esse, vt ne clarissimum di-
 cam, quòd ob vnum virum non ciuitas, sed multæ gentes
 iam quandoque vtilitatem in rebus bellicis cōsequutæ sunt.
 Et vbi ars in precio est, neque nos contemnere poteritis.
 Nam neque ita viles ac contemnendi sumus, quemadmo-
 dum in vobis testimonium situm est. Verum ab initio qui-
 dem dei, vnde genus nostrum esse gloriatur, Aesculapius
 & Hercules in hominum vtilitatem prognati sunt. Et hos
 propter virtutem, quam hîc exercuerunt, omnes deorum
 loco habent. Vrbs autem mea, & ego qui ad vos verba fa-
 cio, ad tales originem nostram referimus, quemadmodum
 sanè hominum traditiones habent. Vnde profecto etiam
 pro Græcis ambo hac parte, & in omni bono, ad ipsos tu-
 tandos sterisse apparebimus. Non enim fabula sunt res ad
Troiam gestæ sed factæ, in quibus Cos cum insulis suis non
 minima, sed maxima ad ferendum auxilium existit. Sic ve-
 rò etiam Aesculapij filij, non arte solùm, sed etiam armis,
 Græcis auxilium tulerunt. Machaon equidem animam in
 Troade

Aescula-
 pius, Her-
 culésq; ho-
 mines vt iu-
 uar. nt, po-
 tissimum
 nati sunt.

- A Troade deposuit, quando, velut scriptores de his prodentes dicunt, ex equo in Priami urbem venit. Proinde neque eo quod contribules, neque eo quod ex auxiliariorum numero, auxiliares etiam ipsis Græcis sumus, nos iniuria adfeceritis. Non in longum extendam sermonem, res Chrisæorum, aut Perficæ iterum repetendo, quando & ipsas audiuitis, & in manibus magis sunt, quàm ea quæ paulo ante relata sunt. Quin & sic cogitate, minimè pium esse benefactores iniuria adficere. Nos autem benefactores esse, facta ipsa clamant. Ex quibus partibus prognati esse videbimini (quemadmodum fabulatores dixerunt) si iniuria adficere, quàm benigni esse malueritis? Neque enim amarulentius
- B quicquam dicere volo. Illi enim, ò viri Athenienses, Heraclidis quidem gratias rependerunt. Aliis autem multis, beneficio adfecti, vicissim auxiliati sunt. Deficiat profectò me dies longius narrantem, si recensere velim quot hominibus quanta bona obuenerint, qui nihil de vobis bene meriti fuerunt. Circumspicite vos ipsos, & me nullo dicente, considerate qualia perpetretis. Mala res est potestas, ò viri Athenienses. Non enim quæ sua sunt, mensura disponere nouit. Sed & vrbes quasdam & gentes iam perdidit. Si verò ad alios velut in speculum respexeritis, videritis ipsi quæ facitis, & ego vera dico. Quin & lex noua est: Quicumque felici rerum successu cõsiliis, non etiam ad rerum difficultates respicit: Non est hoc vestrum viri Athenienses. Multum enim etiam sic Deum tentaretis. Nullam vobis iniuriã intulimus.
- C Si verò etiã intulimus: non armis, sed verbis iudicemur. Deprecamur autem vos etiam hoc, vt ne faciatis nos aliis gratiam debere, qui nobis auxilium ferent, auxiliũ enim nobis ferent, si rectè fecerint, & qui intra Thessaliam, Argos, Lacedæmona, Macedoniam, sunt reges, & sicubi alij Heraclidæ, aut Heraclidarũ cognati habitant. Præstat citra violentiam, quàm vi coactos facere quæ iusta sunt. Non dico de insolenti aduersum vos rebellionem: verum hoc vobis manifestum facio, quod multi nostri curam gerunt, aut certè curam habebunt, nisi vndiquaque de terra periit, benignos adhuc esse homines. Ego quidem igitur (exiguæ enim mihi sunt ad dicendum vires, vtpote qui aliarum rerum studio sim ad dictus)

Hippocratis Epistola.

dictus) hic desinam. Rogo autem vos per hospites nostros, D
& per eos qui nobis consiliarij esse cōsueuerunt, & per Deos,
& Heroas, ac gratias, quæ hominibus ab hominibus contin-
gunt, vt inimicitias quidem vestras aduersum nos depona-
tis: ad amicitiam verò vos conuertatis. Si enim non in vestra
ciuitate hæc consequemur: haud scio quò progressi, eorum,
quæ cupimus compotes fitemus.

HIPPOCRATIS COI OPERVM

quæ ad nos extant omnium finis, Iano

Cornario medico physico

interprete.

*

AHIPPOCRATIS

COI, LIBER DE HOMI-

NIS STRUCTURA, AD PER-

DICCAM MACEDONVM

REGEM, NICOLAO

PETREIO COR-

CYRAEO IN-

TERPRETE.

*

Opus antea non editum.



Mundus quatuor ex elementis consti-
 tit, igne, aëre, terra, & aqua: calido
 videlicet, humido, frigido, & sicco.
 Iisdem ex elementis quatuor to-
 tidemque humoribus & homo con-
 sistit: sanguine scilicet, pituita: flaua,
 & atra bili. Et sanguis quidem
 aëri, pituita aqua, flaua autem bilis
 igni, atra verò terræ similatur. San-
 guis enim gustu dulcis est: pituita, salsa: flaua bilis, amara:
 atra verò acetosa, & flauescens. Sanguinis autem locus, &
 spiritus in corde est: A dextris quidem eius sanguis, à sinistris
 verò, spiritus consistit. Flauæ bilis in iecinore: atræ in liene:
 pituitæ quidem in cerebro locus. Sanguis autem calidus,
 & humidus: pituita frigida & humida: flaua bilis, calida &
 sicca: atra verò sicca & frigida. Arteriæ quidem à corde pu-
 rum sanguinem, & spiritum recipiunt. Venæ autē & ipsæ
 à corde sanguinem sumunt: per quas corpori distribuitur,
 Sed iecur cordi sanguinem non præter veri fidem affatim
 suppeditat. Nam ignis absque materia permanere neutiquā
 potest. Quo fit vt nonnulli hominum semper quasi rideant,
 quidam verò tristentur: huius rei ex elementis causam esse
 dicimus. Qui enim puri sanguinis non inexpertes sunt, hi
 usqueq

Mundus ex
 quibus ele-
 mentis, ex
 iisdem etiā
 constat ho-
 mo
 Humores
 quatuor,
 eorūque
 natura.

Arteriæ æ
 venæ qui-
 bus disse-
 rant.
 Iecur.

Risus unde.
 Humores
 quatuor
 quid effi-
 ciāt in ho-
 mine.

**Cerebri ef-
fectus, Re-
miniscētia,
Obliuio,
Phrenesis,**

**Lethargus
Paralysis.
Cerebrum
purgantia.**

**Capitis pas-
siones ex sto-
macho
Capitis su-
turae tres.**

**Capillorum
color iuxta
varietatem
humorum.
Vocis to-
nus à spiri-
tu.**

**Iecur tripli-
citer dige-
rit.**

**Excremen-
torum ratio.**

vsquequaq; rident, & aspectu ac corpore floridi necnon per-
spicui coloris existunt. Qui verò flauē bilis participes sunt,
desides, pusillanimes, pauidi, imbecillēsque esse solent. Pi-
tuitosū verò inertes & frigidi sunt. Reminisci autem, &
esse prudentia præditum, ex cerebro, inter calidum frigi-
dūque admodum temperato prouenit. Obliuio verò, ex ce-
rebri frigidityte procedit. Passio autem, quē phrenesis nūcu-
patur, ex perurentibus febribus fit. Vaporibus enim, ex vi-
sceribus per dorsum ad cerebrum emissis, eius humidū are-
scit, & homo mente captus efficitur: & cerebrum oleo quo-
cunque frigidaē qualitatis per aures, vomitusque humectare
oportet. Lethargus verò & ipse cerebri passio est: cum enim
cerebrū frigidis humoribus repletū fuerit, hinc passio quæ
Lethargus appellatur, hominem occupat: & calefacientibus
cerebro opitulari expedit. Paralysis verò fit à frigido, cru-
dōque humore, qui à cerebro demissus in oculum, siue in ali-
quam labiorum partem, seu in totam dimidiāve faciem
descendit. Per nares cerebrum purgantia adhibere opor-
tet: & extrinsecus isobrium contusum (herba est quæ & Ma-
ros, & Origanis dicitur) ignis suffitu, seu cauteriis per aures
applices. Quæcunque autem passiones in capite fiunt,
ex stomacho oriuntur, exempli causa: Vomica, struma, den-
tium dolores, tonsillæ, angina, suffocationes, anhelitus diffi-
cultas, & reliqua. Caput autem futuras habet tres; inue-
nitur & solidum absque futuris caput, & hoc quidem humi-
dum est. Crispos verò capillos habere, calidioris capitis si-
gnum est. At recti crines, ex superuacuo qui in capite est hu-
more fiunt. Flauedo capillorum, ex flaua bile; caluities verò
ex caliditate prouenit. Articulatae vocis species tres ha-
bentur: Grauis, acuta, & media: hæc à spiritu procedūt. Ie-
cur autem, ipsum alimentum triplici digestionē in succum
redigit. Ex prima digestionē cor alimentī qualitatem, sapo-
rem videlicet, suscipit, & puri sanguinis procreatio fit. Se-
cundam digestionem iecur desumit, & corporis partibus ali-
mentum largitur: vnde flauæ bilis constitutio fit: lien verò
ex sanguinis fece alitur: vnde & melancholicum humorem
constitui certum est. Cerebrum autem à stomacho hume-
ctatur, & pituitæ exuberantiam per agit. Tertia digestionē
alimentum supernè in stomacho in succum vertitur: & tunc
referatur

Areferatur ianitor qui ventriculus nuncupatur, quoniam transitus tantum facultatem subministrat. Inde alimentum in inferiore ventrem demittitur. Alius verò à pituita ciborum acerbitalis gratia, oblectamentum sentit. Humidum autem excrementum, per renes, ac seiunctos ipsius excrementi meatus in vesicam, id est in phuscam descendit: in vesicam enim aqua ingreditur. Sensus in homine quinque habentur, visus, olfactus, auditus, gustus, & tactus. Nam visus ex aethere: olfactus ex aere: auditus ex igne: gustus ex humido: tactus vero ex terra fit. Homo autem ex quatuordecim quibusdam

Sensus in homine quinque.

Homo ex quatuordecim quibusdam consistit.

Bribus quidem sicco & humido excremento, vomitibus, oculis, naribus, sputis, sudoribus, venereis, incertis meatibus, capillis & vnguibus fiunt: Fœminis verò ad hæc duo adduntur, purgationes, lactis videlicet, & menstruorum. Lac autem & eodem modo genitale semen hominis ex sanguine gignuntur, & hoc certum est: si enim homo genitali plus nimio utetur, sanguinem pro semine emittere. Similiter autem & fœminæ, si plus nimio lactare cogentur, sanguis elicitur. Spina autem hominis habet vertebrae xxxiii. costas totidem. Dentes cum maxillaribus duo supra xxx. sunt, anteriores autem diuidentes, qui & secantes appellantur. Stomachus palmos habet quinque. Intestina cubitos

Fœminarum lac & menstrua.

Spinæ vertebrarum numerus, costarum item, ac dentium.

Stomachi amplitudo Intestinarum longitudo Digitorum nomina.

Ctresdecim. Nomina digitorum, Pollex, Index, Medius, Annularis, Auricularis. Vngues frigidi sicci que temperamenti sunt. Anni verò tempora quatuor habentur, ver, æstas, autumnus, & hyems. Ver, calidum & humidum est: ideo sanguinis in corpore incrementum fit. Æstas calida & sicca: ideo flauam auget bilem. Autumnus siccus & frigidus: ideo atram bilem, & sanie auget, sanies quidem sanguinea & aquosa est. Hyems verò pituita in corpore adauget. Nam quatuor hominis elementa, id est humores, ad tempora quatuor diuiduntur. Ideo solarem conuersionem speculari, & affecti temperamentum, & adhæc curationibus uti opus est. Si enim verno tempore iuuenis aduersa premetur valetudine, sanguinis exuperantiæ causa patitur, quem per venæ sectionem ferat sanitate emittere opus est. Et si pleuresi vnius diei spatio, vel duorum ti.

Anni tempora quatuor, eorumque natura.

Quæ vitæ hominis ratio singulis annis temporibus.

Venæ sectionis quoque tempore curatione.

Zz

seu

Medicina-
lis sphaera.

Pituita, san-
guis, ac bi-
lis quibus
anni tempo-
ribus au-
geantur: &
que vite ra-
tio tunc ser-
uanda.

seu trium laborauerit, venæ sectione affecto opitulandum, D.
priusquā ipsum opprimat passio, & affecti vires deficient.
Homini verò venæ sectio perutilis est: & tempus quidem
quo ipsa vtendum, à Februario incipit: & rursus à Septem-
bri principium sumendo, ad septimam eiusdem perduret.
Aestate aliquo ægrotante, ad passionis initia purgamina
adhibenda. Si considerantes (o Rex) & aliorum curam a-
gentes, quid ad vitæ rationem corporibus præstet, & quod
congruè alimenta suggerat, ac debito apponat ordini, non
satis pro diligentia nostra, & qui humana aggrediuntur cor-
pora morbos deprehenderimus, nunc accuratius perspicien-
tes, summamque describentes, medicinalem sphaeram ad
te mittimus, per quam ægritudines, quæ humana corpora E
occupare solent, pernoscere, & ad præsentem horam, ac
decurrentis anni tempora, huiusmodi calamitatibus opitu-
lari queas. Si autem hæc accuratius egeris, diu citra om-
nem aduersam valetudinem per omne tempus vita frueris.
Et si hæc quæ potissimum optimæ valetudini tuæ vim præ-
beant, quæque hominum generi conducant, peregeris, ita
in omnibus te incolumem vitam deprehendes elegisse. Et
quamuis ardua admodum sphaeræ ratio habeatur, eam ta-
men perscriptam tibi præbemus. A Vergiliarum occasu F
ad hyemale solstitium, dies I L. hoc est, à xij. Nouembris,
ad Decembris finem sunt. Hi quidem dies pituitam au-
gent: Balneis autem ieiunus, sudores excitando, detergen-
doque, & venereis ac laboribus vteris. Ab hyemali solsti-
tio, ad vernale æquinoctium, dies LXXXIIII. à prima vi-
delicet Ianuarij, ad quintum supra xx. Martij. hi dies hu-
miditatum, & sanguinis exuberantiam peragunt: Deam-
bulationibus, & siccis quæ ad vi sum pertinent, deliciisque
ac venereis, benèque alentibus vtendum. A vernali æqui-
noctio, ad Vergiliarum ortum, dies I L. à xxv. Martij.
ad xlii. Maij. hi dies sanguinem augment: Redolenti vino,
& venereis, ac laboribus vteris. A Vergiliarum autem exor-
tu ad æstiuum solstitium, dies XXXXII. à tertia decima
Maij, ad xlii. Iunij. hi enim dies flauæ bilis augendæ
facultatem obtinent, dulcibus & aquosis vtendum, ducen-
dæ alui cura agenda, & à venereis, ac laboribus abstinèn-
dum est. Ab æstiuo verò solstitio, ad æquinoctium autum-
nale.

nale, dies xciiii. ab xxxiiii. Iunij, ad xxv. Septembris: hi dies atram bilem augent, frigidis & aquosis, redolenti vino, ac salitis vti opus est: à venereis verò abstinendum censemus. Ab autumnali æquinoctio, ad Vergiliarum occasum, dies iil. à xxv. Septembris ad xii.

Nouembris: hi enim dies saniem augent, acetosis, acerbisque, & venereis, ac laboribus vti expediet.

Si ad hæc obseruanda curam, ò Rex, impenderis, citra omnem tristitiam dolorémque in reliquum vita frue-

ris. Hac se diuisione sic habente, annus in dies v.

ac lx. supra tre-


centos colligitur.

*

H I P P O C R A T I S

*Coi Operum, quæ ad nos
extant, omnium
finis.*

Annus in
dies 365.
colligitur.



L V G D V N I,
Excudebat Symphorianus
Barbier.

De iurandis 2
De 3

De Arte 4

De Vet. Med 8

De Medica 16

De Anatomico 18

De Puerperis 21

De Puer. Luminis 23

De Puer. Ductu 29

De Genitura 31

De Puer. Pueri 34

De Carcin. 44

De Lepros. Pueri 48

De Oct. Mestri 52

De Saffat 53

De Ect. Fals 58

De Tentatione 59

De Corpora u/ea 60

De Officiis
De Officiis

De L. in Sue 71

De Sphat. 83

De Flab. 94

De Medica purg 98

De Arata 99

De Inf. Puer. 124

De Alimenta 128

De Luminis u/ea 131

De Luminis 133

De Morbis 144

De Affect. 192

De Intern. aff. 201

De Urin. m. 229

De Med. m. 225

De Med. m. 244

De Pen. lab 301

De M. pupat 310

De Reg. in Amb 270

De Jactura 396

De dec. ind. 399

Proportiones 401

Productiones 408

Contra primum 423

De exp. vulgari 444

(Singularis off. 450) 166

De fract. 454

De dec. cur. 469

De vltimis 498

De fractis 508

De Hammon 505

De vltis 507

Ap. 508

Exph. 520

l. sal. in h. b.

ττ κατ' ἐκταγείον

